





MARTII

FLORA BRASILIENSIS

VOL. I. PARS II.

MONACHI IN TYPOGRAPHIA REGIA C. WOLF ET FIL. ET IN OFFIC. LITHOGRAPH. S. MINSINGER, TUM B. KELLER.

FLORA BRASILIENSIS

ENUMERATIO PLANTARUM

IN

BRASILIA

HACTENUS DETECTARUM

QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI
DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS

EDIDERUNT

CAROLUS FRIDERICUS PHILIPPUS DE MARTIUS

EOQUE DEFUNCTO SUCCESSOR

AUGUSTUS GUILJELMUS EICHLER

OPUS

CURA MUSEI C. R. PAL. VINDOBONENSIS AUCTORE STEPH. ENDLICHER
SUCCESSORE ED. FENZL

CONDITUM SUB AUSPICIIS

FERDINANDI I. ET LUDOVICI I.

AUSTRIAE IMPERATORIS

BAVARIAE REGIS

SUBLEVATUM POPULI BRASILIENSIS LIBERALITATE

PETRO II.

BRASILIAE IMPERATORE CONSTITUTIONALI ET DEFENSORE PERPETUO FELICITER REGNANTE.

**VOLUMEN I. PARS II.**

ACCEDUNT TABULAE LXXXII.

MONACHII

MDCCCXL—MDCCCLXXXIV.

LIPSIÆ APUD FRID. FLEISCHER IN COMM.

MARTII
FLORA BRASILIENSIS

VOL. I. PARS II.

MUSCI

EXPOSUIT

CHRISTIANUS FRIDERICUS HORNSCHUCH,
BOTANICES ET HISTORIAE NATURALIS PROFESSOR P. O. IN UNIVERSITATE GRYPHICA.

LYCOPODINEAE

EXPOSUIT

ANTONIUS FRIDERICUS SPRING, PHIL. ET MED. DR.
PHYSIOLOGIAE ET ANATOMIAE GENERALIS PROFESSOR P. O. IN UNIVERSITATE LEODIENSI.

OPHIOGLOSSEAE, MARATTIACEAE, OSMUNDACEAE,
SCHIZAEACEAE, GLEICHENIACEAE,
HYMENOPHYLLEAE

EXPOSUIT

DR. JOANNES GUILIELMUS STURM,
NORIMBERGENSIS.

CYATHEACEAE, POLYPODIACEAE

EXPOSUIT

JOANNES GILBERTUS BAKER,
HERBARIUM REGII KEWENSIS CUSTOS ADJUNCTUS.

EQUISETACEAE

EXPOSUIT

JULIUS MILDE, PHIL. DR.
PROFESSOR VRATISLAVIENSIS.

ISOËTACEAE, MARSILIACEAE, SALVINIACEAE

EXPOSUIT

MAXIMILIANUS KUHN, PHIL. DR.
BEROLINENSIS.

MONACHII

MDCCCXL—MDCCCLXXXIV.

LIPSIAE APUD FRID. FLEISCHER IN COMM.

NOTA: MUSCI et LYCOPODINEAE

OPHIOGLOSSAE — HYMENOPHYLLEAE

CYATHEACEAE et POLYPODIACEAE

EQUISETACEAE

ISOËTACEAE — SALVINIACEAE

in lucem prodire anno 1840

„ „ „ die 15. m. Julii 1859.

„ „ „ „ 1. m. Maii 1870.

„ „ „ „ 1. m. Julii 1872

„ „ „ „ 1. m. Aprilis 1884.

M U S C I .

EXPOSUIT

CHRISTIANUS FRIDERICUS HORNSCHUCH,

BOTANICES ET HISTORIAE NATURALIS PROFESSOR P. O. IN UNIVERSITATE GRYPHICA.

M U S C I.

MUSCI *Hedwig. Bridel Bryologia univ. Nees ab Esenb. et Hornschuch Bryologia germ. Introd. 10 — 40. Endlicher Gen. Plant. 46.*

PLANTAE MERE CELLULOSAE (AXYLINAE), ACOTYLEDONEAE, SURCULOSAE, PHYLLIDIOPHORAE, ANANTHAE, SPORANGIO OPERCULATO AUT CLAUSO.

SURCULUS sive CAULIS teretiusculus, erectus aut procumbens, saepe radiculosus, totus e cellulis elongatis exstructus, vasis spiralibus destitutus, ex apice succrescens (anogenus), inferius emoriens, simplex, aut innovatione aut ramificatione compositus. FOLIA bifariam vel plurifariam disposita, saepe conferta et imbricata, undiquaque aut distiche conversa, parva, e strato cellularum plerumque simplici constructa, stomatibus destituta (phyllidia Mart.), enervia aut in speciem uni — binervia, nervo (i. e. fasciculo cellularum angustiorum magisque compactarum) vel ad apicem aut ultra excurrente, vel abrupto, marginibus vel integerrimis vel serrulatis, semper integra, nec incisa, laciniata compositave. FRUCTIFICATIONIS ORGANA (saltem quae similia videantur organis ejusmodi plantarum phanerogamicarum) duplicis generis sunt. MASCULA axillaria et peripherica aut terminalia, foliis PERIGONIALIBUS minoribus tenerioribusque tecta, in gemulam, capitulum aut discum compacta, diclinia et plurimis quidem dioeca, paucis monoeca, quandoque fallacem hermaphroditi floris speciem producentia. ANTHERAE, quas SPERMATOCYSTIDIA quoque dicunt, sive ANTHERIDIA, vel POLLINARIA, rectius forsitan POLLINIS UTRICULO comparandae, e tubo reticulato sursum dilatato, basi plus minus contracto, in vertice mox lato orificio dehiscente constant. Fovent massam subtilem, fluidam, granula minutissima vehementem cito evanescentem*). Adstant fila clavata, septata, PARAPHYSES dicta. Organa FEMINEA in caule ramisve terminalia (in ACROCARPIS), aut lateralia (in PLEUROCARPIS), singula aut plura collecta, foliis PERICHAETIALIBUS circumdata, constant: 1) CALYPTRA seu tubo celluloso simplici, apice clauso (ideo folio, spathae in modum cucullatae coalito comparata) et cum pistilli apice cohaerente (ideo rectius forsitan pro adscensus strato peripherico vel corticali habenda), basi autem in plurimis solubili, cum fructu, ubicunque pedunculo seu seta extollitur, in altum adscendente, campanulata, conica, mitraeformi, laterave fissa et tunc cuculliformi, rarius thoro firmiter adhaerente apiceque laterave tantum dehiscente; 2) PISTILLO sive AXI aut ipsius surculi parte centrali mutata, ab initio filiformi, denique sursum dilatato, atque in fructum altiori breviorique pedunculo (SETA) suffultum, rarius sessilem aut subsessilem, transeunte. Fructus perfectus SPORANGIUM appellatur sive THECA (PYXIS, PYXIDIUM, CAPSULA rel.), cui plura sunt strata, scilicet unum

*) In *Sphagnis*, *Polytrichis* aliisque haec fovilla offert sic dicta animalcula spermatica, cum Vibrionibus comparata, quae in subtilissimis cellulis contenta spiram filii hinc incrassati referunt. Cfr. de *Spirillo bryozoo* Ungerii ejus litt. in *Diar. bot. Ratisb.* 1834. I. 145. t. 1. f. 4—8. *Nova Act. Ac. Nat. Cur.* XVIII. 2. 687 et 702.

exterius, e cellularum elongatarum densiore compage constans, alterum interius laxiusque, quasi diploë (SPORANGIUM Webero et Mohrio, SPORANGIUM Bruchio et Schimpero dictum), intimum denique, quasi setae pars intima continuata, tandem ab exterioribus distans, veluti columnulam centralem denique corrugatam (COLUMELLAM) exhibens. In paucis (ASTOMIS) theca clausa perstat; plerisque autem circumscissa aperitur, OPERCULO inde a superiore parte transversim dehiscente, vario modo rostrato aut mucronato, intus ANNULO cellularum simplici duplicive elastico saepe cincto; quo delapso, orificii fructus sive URNAE margo vel (in GYMNSTOMIS) nudus apparet rectaque truncatus, vel (in AMPHISTOMIS sive PERISTOMIS) dentatus, dentium ordine vel (in HAPLOSTOMIS) simplici vel (in DIPLOSTOMIS) duplici conspicuo, prout vel ambo parietis fructus strata in unum cohaerent, aut in duo discedunt. Horum vero dentium exteriores semper firmioris sunt texturae, interiores autem (e sporangidio orti) laxioris atque membranacea. In juvenili theca intra diploës cellulas matriciales e massa granulosa oriuntur SEMINULA (subquaterna) sive SPORAE vel GONGYLI globosa aut subglobosa, cellulosa, granulata saepe superficie; intus solida et e tela cellulosa conformi exstructa. Quae dum germinant, primum fila conferviformia (PROTONEMATA), cotyledonum neophytorum vices gerentia (PROEMBRYONEM, quasi partem thalloidem, musci partes nobiliores postea exclusuram) proferunt.

FAMILIA I. SPHAGNACEAE.

CALYPTRA MEDIO RUPTA. SPORANGIUM SPECIE EVAGINULATUM, OPERCULATUM, EXANNULATUM, STOMATE NUDO.

Sphagnaceae Endl. Gen. 47. Musci evaginulati seu cladocarpi gymnostomi Brid. Bryol. univ. I. XXIX.

I. SPHAGNUM DILL.

VAGINULA discoidea, SPORANGIUM specie apophyseos excipiens. PERISTOMIUM nullum. CALYPTRA medio vel versus apicem nec basi rumpens. FLOS monoecus, masculus claviformis.

Brid. Bryol. I. 1., Endl. Gen. 47. n. 476.

1. SPHAGNUM SQUARROSUM PERS. ramulis attenuatis recurvis; foliis ovatis oblongis marginibus incurvato-undatis cuspidatis apice reflexis; sporangiis truncatis, pedunculo longe exserto gracili.

Brid. Bryol. univ. I. 5.

Crescit in Brasiliae paludibus et aquis pigris: Desvauz. M. 24

2. SPHAGNUM CYMBIFOLIUM DILL. ramulis attenuatis recurvis; foliis imbricatis ovatis obtusis; sporangiis subglobosis, pedunculis crassis exsertis.

Brid. Bryol. univ. I. 2.

Var. SQUARROSUM foliis acutioribus patentioribus, singulis sub-squarrosis. Bryol. germ. I. 8.

In turfosis inter frutices prope Sebastianopolin, Septembri fructiferum: Beyrich. 24

3. SPHAGNUM COMPACTUM BRID. ramulis inaequalibus confertis patentibus obtusis, deflexis attenuatis; foliis ovato-oblongis apice angusto subtruncatis; sporangio ovato-globozo, pedunculo subexserto.

Brid. Bryol. univ. I. 16.

Caulis plantae brasiliensis minores et graciliores quam in europa, folia saturatius fusciscentia.

In regionibus fluvio Amazonum conterminis. M. 24

FAMILIA II. BRYACEAE.

CALYPTRA BASI CIRCUMSCISSA. SPORANGIUM OPERCULATUM (INDEHISCENS AUT OPERCULO DEJECTO APERTUM), ANNULATUM, VAGINULA SETAE BASIN CIRCUMDANTE.

Bryaceae Endl. Gen. 47. Musci vaginulati, holocarpi Brid. Bryol. univ. I. XXIX.

SERIES I. ACROCARPI GYMNSTOMI.

II. GYMNSTOMUM HEDW.

SPORANGIUM terminale, stomate nudo. CALYPTRA cuculliformis, labilis. FLOS masculus discoideus aut gemmiformis.

Brid. Bryol. univ. I. 57. Endl. Gen. 47. n. 483.

1. GYMNSTOMUM JAMESONI WALK. ARN. foliis late lineari-lanceolatis margine convolutis integerrimis, siccitate incurvo-tortuosus; nervo excurrente; urna turbinata ore amplo, operculo rostrato, urna longiore.

Walk. Arn. in Wern. Trans. V. 200. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris I. 347. Disp. method. des Espèces de Mousses 10.

Caulis 4—8 lin., seta vix ultra 2 lin. longa; annulus nullus. G. tortilis varietatibus majoribus sat simile, at foliorum, thecae et operculi figura distinguitur. In collibus prope Sebastianopolin: Jameson.

III. SCHISTIDIUM BRID.

SPORANGIUM terminale, stomate nudo. CALYPTRA mitraeformis, margini in laciniis subaequales fissa. FLOS monoecus, masculus gemmaceus.

Brid. Bryol. univ. I. 113. Endl. Gen. 48. n. 489.

Anoetangium Hook. Schwaeagr. Helicophyllum Brid.

1. SCHISTIDIUM TORQUATUM BRID. caule repente ramoso subtus tomentoso-radiculoso; foliis lato-lanceolatis obtusis integerrimis confertis distichis erectiusculis subevanidinervis; sporangio immerso, operculo plano umbonato.

Anoetangium torquatum Hook. *Musc. exot.* t. 41. *Schwaegr. Suppl.* II. 1. 5. *Spreng. neue Entd.* I. 107.

Schistidium Brid. *Bryol. univ.* I. 121., *postea Helicophyllum ibidem* II. 771.

SURCULUS repens, 6—15 lin. longus, varie divinus ramosusque, in facie inferiore tomento radicoso ferrugineo dense obsitus. **FOLIA** disticha, dense conferta, erectiuscula, lato-lanceolata, obtusa, integerrima, humiditate parum undulata, margine involuta, apice inflexa, siccitate valde involuta et tortilia, luteo-viridia; nervo crasso ferrugineo plerumque infra apicem evanescente instructa. Utrique in caulis parte aversa foliola accessoria (stipulae Hook.) ceteris similia, sed quater minora, oblique cauli appressa, sparsa, saepe deficientia nec regulari dispositione aut relatione cum ceteris. **FLORES** dioeci: masculos non vidimus; feminei terminales. **FOLIA PERICHAETIALIA** longiora, quam caulina, stricta, sporangio appressa, lanceolata, brevi acuminata, canaliculata nervo continuo, rufescente-viridia. **SETA** subnulla. **SPORANGIUM** oblongum, inter folia perichaetialia profunde immersum, occultatum, laeve, subfuscum. **OPERCULUM** planum, medio umbonatum, sporangio concolor. **CALYPTRA** deest.

Hanc speciem, et a congeneribus et a ceteris Gymnostomis toto habitu maxime discedentem, cum calyptra, quae adhucum ignota, inventa fuerit, genus proprium constitutum esse vix dubitamus. Caulis directione et radice stipatissimis in pagina inferiore, foliorum dispositione et stipularum praesentia Jungermanniis valde accedit.

In montibus ad *Lages* et *Sincorá*, in mediterraneis provinciis *Bahiensis*, *Septembri*, nec non ad ripam fluvii *Tapajoz*. M.

SERIES II. ACROCARPI HAPLOPERISTOMI.

IV. HYMENOSTOMUM R. BROWN.

SPORANGIUM terminale. **PERISTOMIUM**: membrana horizontalis, disco demum perforata. **CALYPTRA** cuculliformis, labilis. **FLOS** dioecus, terminalis.

Brid. Bryol. univ. II. 73. *Endl. Gen.* 48. n. 484.

I. HYMENOSTOMUM SUBGLOBOSUM HORN SCH. caule innovationibus dense fasciculato-ramoso; foliis confertis erecto-patulis lineari-lanceolatis involuto-subulatis; sporangio ovato subgloboso rectiusculo, operculo subulato urnam subaequante.

Hymenostomum subglobosum *Bryol. germ.* I. 103. t. 12. *Brid. Bryol. univ.* II. 78.

Gymnostomum micaceum, *Schld. in Linnæa* X. 1835. p. 443.

CAULES vix lineam unam longi, infra apicem innovationibus confertissimis ramosi, dense foliosi. **FOLIA** caulina lineari-lanceolata, erecto-patentia, flavo-viridia; **PERICHAETIALIA** duplo majora, versus medium folii repente margine involuto, nervo crasso concolore excurrente. **SETA** 1—2 lineas longa, erecta, pallida. **SPORANGIUM** erectum, rotundato-ovatum, luteo-brunneum, ore contracto obliquo purpureo. **OPERCULUM** subulatum, obliquum, flavum. **CALYPTRA** cuculliformis, apice subulata, straminea.

In provincia *Minas Geraës*, in vicinia fluminis *Amazonum* et prope *Sebastianopolin*: M.; — juxta muros in arenosis prope dictam urbem: *Beyrich*. 24

V. OCTOBLEPHARUM HEDW.

PERISTOMIUM octodentatum; dentes sporangii parietis interno sub orificio incrassato adnati, breves, lanceolati, imperforati. **CALYPTRA** cuculliformis. **SPORANGIUM** aequale. **FLORES** monoeci; masculi gemmiformes, axillares.

Brid. Bryol. univ. I. 136. *Endl. Gen.* 51. n. 522.

I. OCTOBLEPHARUM ALBIDUM HEDW. surculo erecto ramoso; foliis e basi latiore lineari-ligulatis mucronatis; sporangio erecto ovato, operculo hemisphaerico-subulato.

Hedw. Stirp. crypt. III. 15. t. 4. *Brid. Bryol. univ.* I. 136.

Bryum nanum lariginis foliis albis, *Dill. Hist. musc.* 364. t. 46. f. 21.

SURCULUS erectus, valde ramosus, 6—12 lin. longus, dense foliosus, siccitate fragillimus, basi radicosus. **FOLIA** inferiora laxo imbricata, superiora patentia, rosulata, omnia e basi ampliore subvaginata pellucida lineari-ligulata, mucronata, plana, integerrima, crassiuscula, nervo obsoleto tandem evanido instructa, humiditate pallide glaucescentia, siccitate albido-viridia; reticuli areolis in basi folii laxissimis irregulariter aut hexa- aut tetragonis, in parte superiore confertis, obsolete tetragonis seriatis minutis. **FOLIA PERIGONIALIA** minuta, ovata, acuta, integerrima, subpellucida, nervo obscuro evanido instructa. **ANTHERIDIA** numerosa, in axillis foliorum perigonalium. minuta, oblonga, truncata, reticulata, ferruginea, filamentis brevissimis suffulta; paraphyses nullae. **FLOS** femineus terminalis. **FOLIA PERICHAETIALIA** exteriora caulinis similima, interiora minor, lanceolato-linearia, acuta, reliquis caulinis similia. **PISTILLIDIA** 3—4, fusca, germine oblongo-ovato, stylo subulato; paraphyses nullae. **VAGINULA** cylindrica, glabra, fusca. **SETA** erecta, duas ad quatuor lineas longa, apice incrassata, siccitate parum tortilis, laevis, pallide lutea, basi et apice purpurascens. **SPORANGIUM** erectum, ovatum, laeve, brunneum, ore incrassato badio. **PERISTOMIUM** octodentatum, dentibus parietis interno sub orificio incrassato adnatis, humiditate conniventibus, siccitate erectis, brevibus lanceolatis imperforatis, levissime trabeculatis, linea perpendiculari per medium instructis, luteis. **OPERCULUM** hemisphaerico-subulatum, parum obliquum, basi sporangio concolor, apicem versus pallidius. **CALYPTRA** cucullata, glabra, straminea, apice subulato fusco.

Variat: Caule innovationibus elongatis fructum superante.

In truncis arborum *Serra d'Estrella* et *Serra dos Orgãos*, *Februario* mense, cum fructibus maturis legit *Beyrich*; prope *Rio de Janeiro* in cortice *Coci nuciferae*, *Jul.* et *Aug.* cum fructibus vetustis beat. *Merkel*. — Per omnem fere *Brasiliam* observavi hanc speciem, radices arborum et lignum subputridum praediligentem, atque magnos caespites saepe formantem, uti in *Europa* *Dicranum glaucum*. In regionibus depressis inque sylvis primariis laetius viget, attamen in montes et sylvas sicciore quoque ascendit. *Martius*.

VI. SYRRHOPODON SCHWAEGR.

PERISTOMIUM simplex, breve; dentibus sedecim intus adnatis, conniventibus. **CALYPTRA** subcampanulata, laevis, latere fissa. **SPORANGIUM** aequale, exannulatum. **FLORES** masculi axillares.

Schwaegr. Suppl. II. 1. 110. *Endl. Gen.* 49. n. 498.

I. SYRRHOPODON HORNSCHUCHII † caule erecto fasciculato-ramoso; foliis rigidiusculis patentibus siccitate tortilibus e basi latiore linearibus acutis marginatis pellucido-serratis; sporangio oblongo, operculo longissimo e basi conica subulato oblique rostellato, calyptra longa.

Syrrhopodon rufus *Hornsch. Ms.*, non *Hooker*.

CAULIS erectus 6—12 lineas longus, fasciculato-ramosus, inferne subnudus, ramis dense foliosis. **FOLIA** rigidiuscula, humiditate patentia, siccitate tortilia, inferiora ovato-lanceolata, denticulata, margine involuta, inde subulata, superiora longiora, e basi membranacea vaginante excavata pallidiora linearia, acutiuscula, carinata, marginata, pellucido-serrata, margine inflexo, rufescentia; nervo crasso ferrugineo plerumque ultra apicem excurrente. **FOLIA PERICHAETIALIA** caulinis similima, sed latiora.

VAGINULA cylindrica, glabra, fusca. SETAE subinde geminatae, 4—5 lin. longae, erectae, siccitate interdum flexuosae, laeves, apice incrassatae purpureae. SPORANGIUM erectum, oblongum, laeve, fuscum. OPERCULUM conico-subulatum, oblique rostellatum, sporangio fere duplo longius, fuscum. CALYPTRA subcampanulata, longa, glabra, straminea, apice subulato fusca, latere fissa.

Calymperi Afzelii Sw. affinis et, ut illa species, statu sicco *Tortulae tortuosae* admodum similis, sed characteribus genericis, operculo longissimo oblique rostellato et seta longiore satis distinctus. Ab inventore in honorem auctoris hujus Mniographiae brasiliensis nominata est species.

In provincia Minarum Generalium et in regionibus fluminis Amazonum: M. 2.

2. SYRRHOPODON PROLIFER SCHWAEGB. surculo innovante ramoso; foliis laxis patentibus siccitate crispabilibus, e basi vaginante excavata pellucida linearibus marginatis canaliculatis, apicem versus argute serratis; sporangio cylindrico, operculo e basi convexa subulato recto, calyptra breviuscula.

Syrrhopodon prolifer Schwaeagr. Suppl. II. 2. 99. t. 180.

RADIX basilaris, capillacea, brunnea. SURCULUS erectus aut adscendens, 4—5 lin. altus, inferne simplex, superne per innovationes parum ramosus, a foliorum basi semivaginate sicco statu albus. FOLIA laxa, patentia, subinde secunda, siccitate crispabilia, e basi vaginante folii quartam partem efficiente excavata integerrima submarginata, pellucida, siccitate alba, linearia, canaliculata, pellucido-marginata, apicem versus argute serrata, sordide viridia; nervo crasso continuo instructa. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora caulinis simillima, interiora seu superiora 3—4 minuta, laxa, lanceolata, obtusa, integerrima, pellucida, nervo valido viridi praedita. VAGINULA cylindrica, glabra, brunnea. SETA solitaria, 4—6 lineas longa, erecta, siccitate parum torta, apice incrassata, laevis, badia. PERISTOMII dentes sedecim infra sporangii marginem adnati, in orificio horizontales, lineari-lanceolati, trabeculati, linea media longitudinali nulla. ANNULUS nullus. OPERCULUM e basi convexa subulatum, longum, rectum, acutissimum, sporangio concolor. CALYPTRA subcampanulata, sporangio paulo brevior, glabra, straminea, apice subulata fusca, basi fissa.

In Serra dos Orgãos, in umbrosis sylvarum prope flumen Paquaquer, Januario mense: Beyrich. 2.

VII. GRIMMIA EHRH.

SPORANGIUM terminale, PERISTOMIO simplici sedecimdentato, dentibus solitariis latiusculis erectis vel reflexis, in plerisque poris vel rimis perforatis, in paucioribus imperforatis, quibusdam apice irregulariter incisis, basi liberis. CALYPTRA mitraeformis, laevis, basi lacera, sporangio multo brevior. FLORES monoeci.

Brid. Bryol. univ. I. 160. Endl. Gen. 48. n. 490.

1. GRIMMIA JULACEA † surculo ramoso prostrato; foliis patentibus siccitate appressis imbricatis ovatis acatis integerrimis concavis, nervo supra medium evanescente; sporangio immerso.

Tab. nostra I. Fig. I.

Caespitosa. SURCULUS prostratus, basi parum radiculosus, ramosus, ramis erecto-patentibus, ut surculo dense foliosis. FOLIA seriata, patentia, siccitate appressa, imbricata, late ovata, acuta, concava, integerrima; nervo supra medium evanescente; retis areolis minutis subquadratis. FOLIA PERICHAETIALIA erecta, sporangio appressa idque superantia, oblonga, margine subundulata, concavinscula, integerrima, tenera, a basi ad medium subhyalina, apice dilute viridia; nervo obscuriore in cuspidem longam excurrente, retis areolis in parte subhyalina parallelogrammis laxis, apicem

versus ut in caulinis. VAGINULA subnulla. SETA brevissima. SPORANGIUM immersum, interdum geminatum, oblongo-cylindricum, laeve, reticulatum, pallide brunneum, ore purpureo. PERISTOMIUM sedecimdentatum: dentes humiditate erecti apice recurvi, siccitate conniventes, liberi, aequidistantes, lanceolato-subulati, solidi, trabeculati, purpurascens. OPERCULUM et CALYPTRAM non vidimus.

Habitus et forma foliorum *Schistidii inberbis*.

In Serra dos Orgãos, supér saxa rivorum, Januario mense, Junio mense in truncis arborum: Beyrich; — in sylvis udis, in vestustis truncis fluctuantibus fluminis Amazonum: M. 2.

VIII. MELICHHOFERIA HORNSH.

SPORANGIUM terminale basi contracta; PERISTOMIO simplici sedecimdentato, dentibus solitariis ex interiori sporangii strato ortis, tenuibus angustis liberis, basi abrupte dilatatis aut membrana tenera conjunctis. CALYPTRA cucullata laevis. FLORES dioeci aut androgyni.

Bryol. germ. 179. Endl. Gen. 51. n. 520.

Oreas Brid., *Apiocarpa* Hüben., *Weissia* Funck., *Hsch. Schwaeagr., Hook., Walk. Arn.*

1. MELICHHOFERIA BREVICAULIS † foliis lato-lanceolatis acutis apicem versus remote serrulatis, nervo apicem subtingente; seta erecta, sporangio cernuo elongato-pyriformi (clavato), dentibus basi membrana connatis, operculo conico mammillato.

Tab. nostra I. Fig. II.

Caespitosa. RADICULAE basilares, capillares, brunneae, tomentum formantes. SURCULUS brevissimus, vix lineam unam altus, innovationibus nonnullis elongatus, erectus, inferne nudus, superne foliosus, tenerrimus, rufus; innovationes 2—3 lin. longae, erectae, filiformes aut clavatae, inferne remote, superne magis magisque dense foliosae. FOLIA caulina in comam terminalem perichaetium formantem conferta, erecta, lanceolata, acuminulata, parum concava, apicem versus remote serrulata, luteo-viridia; folia innovationum latiora, acuta, nec acuminata, ceteris foliis caulinis simillima, omnia nervo crasso concolore apicem subattingente instructa; retis areolis parallelogrammis laxis. FLORES androgyni. FOLIA PERIGONIALIA interiora majora et magis concava, reliquis caulinis simillima. ANTHERIDIA plurima per paria in axillis foliorum perigonalium inserta, oblonga, truncata, filamento brevissimo suffulta, reticulata, rufa. FOLIA PERICHAETIALIA inter omnia suprema, pistillidia et paraphyses circumdantia, duplo longiora, e basi latiore concava lineari-lanceolata, reliquis caulinis simillima. PISTILLIDIA pauca, germine oblongo-cylindrico purpurascens, stylo filiformi duplo longiori subhyalino, stigmatate dentate pellucido. Paraphyses paucissimae, filiformes, latiusculae, quadriarticulae, lutescentes. VAGINULA cylindrica, pistillidiis emarcidis obsita, rufa. SETA semiuncialis et longior, erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, ferruginea. SPORANGIUM cernuum, elongato-pyriforme aut clavatum, aequale, laeve, ferrugineum, ore angustato purpureo. PERISTOMIUM simplex 16dentatum ex interiore sporangii strato oritur: dentes conniventes, filiformes, tenues, obscure articulati, solidi, albidii, basi membrana brevi reticulata concolore connati. OPERCULUM brevissimum, obtuse conicum, mammillatum, saturate ferrugineum. CALYPTRA non visa.

In Monte Video: Sellow. 2.

IX. COSCINODON SPRENG.

SPORANGIUM terminale, aequale; PERISTOMIO simplici, sedecimdentato, dentibus solitariis conniventibus lanceolatis trabeculatis, inter trabes singulas medio lacunosus, interdum bifidis. CALYPTRA cuculliformis. FLORES monoeci vel dioeci; masculi laterales vel terminales.

Brid. Bryol. univ. I. 370. Endl. Gen. 50. n. 519.

1. **COSCINODON LONGIROSTRIS** BRID. surculo erecto simpliciter; foliis erectis vel subsecundis attenuato-lanceolatis, nervo continuo; sporangio subgloboso, operculo convexo subulato oblique rostrato.

Coscinodon longirostris Brid. *Method.* 51. *Bryol. univ.* I. 376. *Weissia longirostris* Schwaegr. *Suppl.* II. 84. t. 118. *Trematodon longirostris* Schwaegr. *Suppl.* I. 343.

Planta minuta, caespitose crescens. RADIX basilaris, capillacea, fuscescens. CAULIS erectus, 1—3 lineas longus, parum ramosus. FOLIA densa, inferiora erecta, lanceolata, superiora subsecunda, attenuato-lanceolata, omnia integerrima, canaliculata, siccitate tortilia, luteo-viridia; nervo crasso concolori plerumque continuo; retis areolis linearibus laxis seriatis. FLORES dioeci: masculos non vidimus; feminei terminales. FOLIA PERICHAETALIA exteriora longiora, angustiora et magis acuminata, quam caulina, ceterum his similia; interiora minora, lanceolata, acuta, nervo infra apicem evanescente. VAGINULA subcylindrica, laevis, fusca. SETA erecta, 2—3 lineas longa, laevis, parum flexuosa, siccitate tortilis, apice incrassata, pallide lutea, apice purpurea. SPORANGIUM subglobosum, rectum, aequale, laeve, annulatum, luteo-brunneum. PERISTOMIUM sedecimentatum: dentes conniventes, lanceolati, trabeculati, inter trabes singulas medio lacunosi, interdum bifidi, pallide lutei. OPERCULUM e basi convexa subulatum, urnae aequale, oblique rostellatum, rufescens. CALYPTRA cuculliformis, subulata, straminea, apice fusca.

In soto limoso ad Fijuca prope Sebastianopolin: Olfers; — in soto limoso humido Serra d'Estrella, Februarii mense, in sylvis antiquissimis prope Novam Friburgam, Januarii mense: Beyrich; — in fossis districtus adamantini inter *Polytricha*, Majo: M. 2.

X. TREMATODON RICH.

SPORANGIUM terminale, cernuum, apophysatum; PERISTOMIO simplici sedecimentato, dentibus solitariis, basi cohaerentibus lanceolato-subulatis, erectis, perforatis. CALYPTRA cuculliformis. FLOS monoecus vel dioecus; masculus lateralis terminalisve.

Brid. Bryol. univ. I. 385. *Endl. Gen.* 51. n. 526.

1. **TREMATODON LONGICOLLIS** RICH. sureulo simplici brevi; foliis patentibus flexuosis lanceolatis acuminatis concavis integerrimis, perichaetialibus lineari-lanceolatis longissime acuminatis vaginatis; sporangio oblongo-cylindrico, apophysi basi duplo longiore, operculo e basi conica rostellato.

Rich. in Mich. Flor. Am. bor. II. 289. *Schwaegr. Suppl.* II. 68. t. 120. *Brid. Bryol. univ.* I. 388.

Dicranum longicollum Brid. *Spec. musc.* I. 203.

Cynotodium Trematodon Pal. Beauv. *Prodr.* 52.

SURCULUS erectus, simplex, 1—4 lineas longus, gracilis. FOLIA inferiora minora, recurvo-patentia, lanceolata, superiora longiora, erecto-patentia, e basi ovata concava in subulam linearem canaliculatam, latam partem duplo superantem, flexuosam producta, integerrima, dilute viridia; nervo valido infra apicem evanescente instructa; retis areolis linearibus, laxis. FLORES dioeci, masculi terminales. FOLIA PERIGONIALIA exteriora caulinis similia; interiora basi excavata, rufescentia. ANTHERIDIA circiter octo, turgida, tenuia et fugacia; paraphyses paucae, filiformes. FLOS femineus terminalis. FOLIA PERICHAETALIA maxima, erecta, oblongo-lanceolata, longissime acuminata, vaginata, reliquis caulinis similia. VAGINULA cylindrica, laevis, amoene castanea. SETA terminalis, $\frac{1}{2}$ —1 unc. longa, erecta, flexuosa, laevis; pallide flava, nitens. SPORANGIUM cernuum, oblongo-cylindricum, in apophysin linearem duplo longiorem paullo dilutius coloratam desinens, juventute viridi-brunneum, senectute flavo-fuscens. ANNULUS simplex. PERISTOMI dentes erecti, apicem versus conni-

ventes, basi cohaerentes, lanceolato-subulati, trabeculati, nodulosi, foraminulis circiter 6 perforati, purpurei. OPERCULUM e basi conica purpurea oblique rostellatum, rostello pallide flavo. CALYPTRA cuculliformis, straminea.

Var. CRISPATISSIMUS, foliis crispatissimis. *Brid. Method.* 52. *Bryol. univ.* I. 389.

In soto argilloso humido prope Novam Friburgam, Januarii mense: Beyrich; — var. β in soto arenoso in Monte Video et prope Sebastianopolin: Setlow. ☉

2. **TREMATODON AMBIGUUS** BRID. surculo erecto simplici; foliis patentibus flexuosis, e basi latiore concava lanceolato-acuminatis; perichaetialibus erectiusculis basi vaginatis brevius cuspidatis; sporangio oblongo cernuo, apophysi cerviculata longitudine aequali, operculo e basi conica rostellato.

Brid. Method. 52. *Hornsch. Neue bot. Zeit.* II. 88. *Schwaegr. Suppl.* II. 1. 68. (excl. var. β .)

Trematodon vulgaris Brid. *Bryol. univ.* I. 386.

Dicranum ambiguum Hedw. *Stirp. crypt.* III. 87. t. 36. *Schwaegr. Suppl.* I. 1. 194. *Brid. Spec. musc.* I. 222.

Præcedenti similis; sed statura minore, foliis longioribus divergentibus, vaginula brevi, conica, apophysi cerviculata, urnam longitudine aequante, dentibus longioribus paullo supra basin fissis usque ad apicem perforatis et plerumque apice bifidis distinctissima.

In sylvis umbrosis montium prope Sebastianopolin, Septembris: Beyrich. ☉

XI. DICRANUM HEDW.

SPORANGIUM terminale inaequale cernuum, vel rectiusculum, apophysi spuria vel nulla, cum et absque annulo; PERISTOMIO simplici sedecimentato, dentibus solitariis arcuato-conniventibus ad medium bifidis trifidisve, cruribus parallelis subaequalibus. CALYPTRA cuculliformis, basi integra aut fimbriata. FLOS dioecus, rarissime monoecus, terminalis.

Brid. Bryol. univ. I. 406. *Endl. Gen.* 51. n. 527.

A. APOPHYSI SPURIA. Spec. 1—7.

§. 1. *Glaucula, fragilia.*

1. **DICRANUM JUNIPEROIDEUM** BRID. surculo ascendente ramoso fragillimo; foliis imbricatis erecto-patentibus rigidulis, e basi oblonga concava lanceolatis cuspidatis canaliculatis lato-marginatis integerrimis enervibus.

Brid. Bryol. univ. I. 409.

CAULIS uncialis, ascendens, ramosus, fragillimus, dense foliosus. FOLIA imbricata, erecto-patentia, rigidiuscula, e basi oblonga concava lanceolata, breviter cuspidata, canaliculata, integerrima, enervia, margine teniore hyalino instructa, glauca, retis areolis laxis, elongato-quadratis. FLORES et FRUCTUS non lecti.

Ad pedem arborum sytoarum antiquissimarum, ad ripas fluminis Paquaquer, in Serra dos Orgãos, Januarii mense: Beyrich. 2.

2. **DICRANUM MEGALOPHYLLUM** BRID. surculo ascendente subramoso fragillimo; foliis longissimis flexuosis subsecundis e basi latiori lanceolatis cuspidatis canaliculatis, margine et dorso denticulatis, frequenter apice radiculosi; seta erecta, sporangio cernuo oblongo curvato strumoso siccitate sulcato ore obliquo, operculo conico rostellato, calyptra basi integra.

Brid. Method. 67. *Raddi Crit. Bras.* 3.

Dicranum albicans Schwaegr. *Suppl.* II. 2. 122. t. 186.

Sphagnum javense Brid. *Muscol. rec.* II. 1. 27. t. 5. f. 3. *Schwaegr. Suppl.* II. 2. 4. t. 102. *Brid. Bryol. univ.* I. 19.

Sphagnum iridans Brid. *Spec. musc.* 1. 20.

Sphagnum clandestinum Pal. Beauv. *Msct.*

Sphagnum macrophyllum Brid. *Bryol. univ.* 1. 10 et 753.

SURCULUS basi radiculosus, assurgens, uncialis ad triuncialis, aliquoties divisus, fragillimus, dense foliosus. FOLIA laxissima, longissima, utpote in caule sterili 8—9, in fertili 5—6 lin. longa, basi imbricata, erecta, apice erecto-patentia aut subsecunda, flexuosa, e basi latiore lanceolata, brevissime cuspidata, margine et dorso denticulata, hemicylindrica, concava, enervia, frequenter margine et apice in radicularum filiformes ramosas purpurascens dissoluta, pellucida, inferiora sordide fusca, superiora cano-viridia: retis areolis elongato-quadratis, singulis duplici linea limitatis. FLOS masculus non visus. FEMINEI FOLIA PERICHAETIALIA exteriora breviora et basi latiora, quam caulina; interiora erecta, teneriora, basi ad medium lineari-lanceolata, vaginata, supra medium repente angustata, integerrima, subhyalina. PISTILLIDIA numerosa, germine minuto oblongo-fusco, stylo longissimo ferrugineo, versus apicem incrassato, stigmate dilatato; paraphyses non vidimus. SETA terminalis, interdum innovationibus brevibus lateraliter posita, uncialis, erecta, parum flexuosa, siccitate torta, laevis, apice incrassata, purpurascens. SPORANGIUM cernuum, oblongum, gibbosum, curvatum, strumosum, siccitate sulcatum, fusco-brunneum, ore obliquo purpureo. PERISTOMII dentes erecti, apice conniventes, siccitate incurvi, lanceolato-subulati, trabeculati, ab apice usque ad medium fissi, purpurei, cruribus subulato-filiformibus hyalinis. OPERCULUM conico-rostellatum, badium, versus apicem pallidius. CALYPTRA cuculliformis, laevis, straminea, apice fusca.

Var. β . foliis brevioribus angustioribus, siccitate crispatis, integerrimis. *Dicranum Beyrichii nobis MS.*

Planta sterilis omni partium numero major est et robustior, praetereaque foliis gaudet magis secundis, quam planta fertilibus.

Fertilem prope Tjjea in vicinia Sebastianopoleos et ad radices arborum sylvarum antiquissimarum ad flumen Paquaquer, in Serra dos Orgãos, Januario mense, primus omnium: Beyrich; — statu sterili in prov. Minas Gerais: Mart.; — var. β in Serra dos Orgãos, ad radicem arborum, Februario: Beyrich. 2.

3. DICRANUM MARTIANUM \dagger surculo assurgente fragillimo fastigiato-ramoso; foliis secundis falcatis lanceolatis acuminatis, basi concavis apicem versus canaliculatis integerrimis enervibus luteo-albis; seta erecta, sporangio cernuo oblongo-ovato curvato strumoso, operculo — calyptra —.

SURCULUS ascendens, 1—1½ unc. longus, nudus, fuscus, fastigiato-ramosus; rami suberecti, dense foliosi. FOLIA imbricata, secunda, falcata, lanceolata, acuminata, basi concava, apicem versus canaliculata, integerrima, enervia, luteo-alba, siccitate albida; retis areolis elongato-quadratis. FLORES dioeci. MASCULUS non visus. FEMINEI: FOLIA PERICHAETIALIA exteriora minus falcata; interiora breviora, erecta, e basi ovata concava repente angustata, acuminata, reliquis caulinis similia. VAGINULA cylindrica, glabra, fusca. SETA innovationibus lateraliter posita, uncialis, erecta, siccitate parum flexuosa, laevis, purpurea. SPORANGIUM cernuum, oblongo-ovatum, curvatum, gibbosum, siccitate sulcatum, strumosum, fuscum, ore obliquo purpureo. PERISTOMII dentes erecto-conniventes, lanceolato-subulati, trabeculati, ab apice usque ad medium fissi, purpurei, cruribus subulato-filiformibus. OPERCULUM et CALYPTRA non visa. — Species ob folia falcata distinctissima.

In prov. Minarum Gener. ad Ouro preto, prope Sebastianopolin in montosis, et ad ripas fluminis Amazonum, in cortice arborum: M. 2.

§. 2. Crassinervia.

4. DICRANUM CONCOLOR Hook. surculo erecto flexuoso prolifero-ramoso; foliis erecto-patentibus siccitate erectis, lanceolato-acuminatis argute serratis canaliculatis, perichaetialibus longissimis erecto-flexuosis lanceolato-subulatis serrulatis; setis

aggregatis arcuatis; sporangio ovato curvato strumoso sulcato, operculo conico rostellato.

Dicranum concolor Hooker *Musc. exot.* 1. 138.

Campylopus concolor Brid. *Bryol. univ.* 1. 476.

SURCULUS biuncialis et longior, erectus, flexuosus, prolifero-elongatus, parce dichotomo-divisus, foliosus, inter axillas foliorum radiculoso-tomentosus. FOLIA rigida, erecto-patentia, siccitate erecta cauli adpressa, lanceolata, acuminata, argute serrata, canaliculata, inferiora fusciscentia, superiora luteo-viridia: nervo latissimo fusco integro plus quam tertiam totius folii latitudinem occupante striatoque instructa; retis areolis minutis orbicularibus seriatis. FLORES feminei terminales, plurimi in perichaetium universale congesti. FOLIA PERICHAETII universalis in comam congesta, recurvato-patentia, majora, in acumen longius subulatum excurrentia, ceteris caulinis similia. FOLIA PERICHAETIALIA propria lanceolata, vaginata, in acumen subulatum longitudine aequali, argutissime serratum, flexuosum, apice recurvum producta. PISTILLIDIA 6, germine brevi ovato purpureo, stylo longissimo filiformi rufescente, stigmate incrassato bidentato subhyalino; paraphyses paucae, gracillimae, breves, hyalinae. VAGINULA cylindrica, glabra, fusca. SETAE 4—7, in perichaetio singulo universali aggregatae, 4—6 lin. longae, arcuatae, siccitate flexuosae, laeves, luteae. SPORANGIUM ob setae flexuram nutans, oblongo-ovatum, curvatum, sulcatum, strumosum, brunneum. ANNULUS simplex. PERISTOMII dentes erecti, apicibus conniventes, lanceolato-subulati, infra medium fissi, trabeculati, purpurei, cruribus albidis. OPERCULUM conico-subulatum, obliquum, rufo-fuscum. CALYPTRA dimidiata, straminea, basi elegantissime fimbriata, fimbriae tenuissimae, albiae.

In arenosis ad margines viarum umbrosarum prope Porto d'Estrella, prov. Sebastianopot., Augusto mense, statu maturo: Beyrich. 2.

5. DICRANUM FILIFOLIUM \dagger surculo erecto prolifero-elongato interrupte folioso; foliis longissimis in comas congestis vaginantibus flexuosis lanceolatis longissime acuminatis versus apicem argute serratis; seta solitaria arcuata, sporangio oblongo-ovato curvato strumoso laevi, operculo conico-rostellato.

SURCULUS erectus, 6—8 lin. longus, basi radiculosus et fastigiato-ramosus, proliferationibus elongatus, interrupte foliosus, fuscus. FOLIA longissima (4—6 lineas longa), vaginantia, flexuose, in comas congesta, lanceolata, in acumen duplo longius, apicem versus argute serratum producta; canaliculata, flavo-viridia, senectute lurido-viridia: nervo latissimo plus quam tertiam totius folii latitudinem occupante striatoque instructa; retis areolis laxis, elongato-quadratis. FOLIA PERICHAETIALIA magis erecta et breviora, quam caulina, ceterum simillima. PISTILLIDIA 6—8, longa, germine brevi ovato fusco, stylo longissimo inferne purpurascens superne hyalino, stigmate incrassato. VAGINULA cylindrica, glabra, fusca. SETA gracilis, 6—8 lin. longa, arcuata, flexuosa, siccitate suberecta, laevis, pallide-flava. SPORANGIUM ob setam flexuosam nutans, oblongum vel obovatum, curvatum, strumosum, laeve, siccitate plicatum, viridi-brunneum, ore contracto obliquo purpureo. PERISTOMII dentes incurvati, lanceolati, trabeculati, ab apice ad medium fissi, purpurei. OPERCULUM conicum rostellatum, obliquum, pallide luteum. CALYPTRA non observata. — Ob folia longissima species distinctissima.

In truncis demortuis sylvarum antiquissimarum prope Novam Friburgam Januario mense: Beyr.; — ad Sincora et Rio dos Contas Octobri: M. 2.

6. DICRANUM ARCTOCARPUM \dagger surculo erecto fastigiato-ramoso; foliis secundis subfalcatis lanceolato-acuminatis apice serratis; seta erecta solitaria, sporangio cernuo arcte cylindrico curvato sulcato strumoso, operculo subulato obliquo, calyptra dimidiata basi elegantissime fimbriata.

SURCULUS erectus, uncialis et longior, fastigiato-ramosus, dense foliosus. **FOLIA** laxa, secunda, subfalcata, siccitate flexuosa, lanceolata, acuminata, apicem versus magis serrata, canaliculata, inferiora lurido-viridia, superiora flavo-viridia: nervo latissimo concolore ultra tertiam totius folii latitudinem occupante striatoque; retis areolis elongatis seriatis. **FOLIA PERICHAETIALIA** erecta, exteriora lanceolato-subulata, interiora e basi oblonga vaginata repente in acumen subulatum longitudine aequali attenuata, omnia apicem versus argute serrata. **VAGINULA** cylindrica tenuis, glabra, flavo-viridis, apice fusca. **SETA** innovationibus brevibus lateralis, erecta, solitaria, circiter sex lineas longa, laevis, siccitate parum flexuosa, pallide lutea. **SPORANGIUM** cernuum, angusto-cylindricum, curvatum, sulcatum, strumosum, brunneum, ore contracto obliquo purpureo. **PERISTOMII** dentes erecti, apicibus conniventes, basi cohaerentes, lanceolati, trabeculati, ab apice usque ad medium bifidi, purpurei. **OPERCULUM** subulatum, obliquum, pallide luteum, apice fuscescens. **CALYPTRA** dimidiata, straminea, apice fusca, basi elegantissime fimbriata, fimbriis tenuissimis albidis.

In campis montevidensibus: Setlow. 2.

7. DICRANUM SUBFALCATUM † surculo ascendente flexuoso fastigiato-ramoso; foliis secundis subfalcatis lanceolatis acuminatis concavis integerrimis.

SURCULUS ascendens biuncialis, flexuosus, fasciculato-ramosus, dense foliosus. **FOLIA** rigida, secunda, subfalcata, lanceolata, acuminata, concava, integerrima, inferiora fusca, superiora luteo-viridia, nervo lato striato concolore excurrente instructa; retis areolis linearibus obscurioribus. **FRUCTUS** non lectus.

In montibus sylvestribus prope Sincora prov. Bahiensis, Octobri: M. 2.

B. EXAPOPHYSATA. Spec. 8—11.

§. 1. *Foliis secundis. Scoparia.*

I. Latifolia.

8. DICRANUM PENICILLATUM † surculo robusto assurgente fastigiato-ramoso, ramis cuspidatis; foliis falcatis siccitate crispabilibus rigidiusculis lanceolato-subulatis argutissime serratis, nervo latissimo striato.

SURCULUS robustus, assurgens, bi- ad triuncialis, fastigiato-ramosus, dense foliosus, ramis cuspidatis. **FOLIA** longa, falcata, siccitate torta, rigidiuscula, lanceolato-subulata, argutissime serrata, canaliculata, suprema erecta, duplo longiora, vaginata, convoluta, teneriora, quasi penicillum formantia, inferiora fuscescencia, superiora luteo-viridia: omnia nervo latissimo obscure colorato plus quam tertiam totius folii latitudinem occupante striatoque instructa; retis areolis basi laxioribus subquadratis, in reliqua folii parte linearibus. **FLOS** et **FRUCTUS** non lecti.

In prov. Minas Geraës et ad ripas fluvii Rio de Contas, prov. Bahiensis, Sept. et Octobri: M. 2.

9. DICRANUM CUSPIDATUM † surculo robusto ascendente fasciculato-ramoso, ramis cuspidatis pungentibus; foliis subsecundis dense imbricatis siccitate appressis rigidis oblongo-lanceolatis acuminatis piliferis concavis integerrimis.

SURCULUS ascendens, bi- ad triuncialis, robustus, fragilis, fastigiato-ramosus, dense foliosus; rami cuspidati, pungentes. **FOLIA** subsecunda, dense imbricata, siccitate cauli appressa, rigida, oblongo-lanceolata, acuminata, brevopilosa, integerrima, concava, apicem versus marginibus involutis, inferiora fusca, superiora straminea, nitentia; nervo crasso, e cellulis linearibus composito, concolore, excurrente instructa; retis areolis parallelogrammis confertis. **FRUCTUS** deest.

Prope Sincora et ad Rio de Contas, Octobri: M. 2.

II. Augustifolia.

10. DICRANUM PARVULUM † surculo erecto, brevissimo subsimplici; foliis subsecundis lanceolato-subulatis integerrimis, nervo crasso continuo; sporangio rotundato-ovato, operculo rostellato.

Weissia exigua Schwaegr. Suppl. II. 2. 93. t. 179.

SURCULUS erectus, brevissimus, nempe linearis ad bilinearis, subsimplex. **FOLIA** subsecunda, lanceolato-subulata, canaliculata, integerrima, pallide viridia; nervo crasso continuo ferrugineo viridi instructa; retis areolis linearibus. **FLOS** dioicus: masculus, gemmiformis, terminalis, in caule gracili innovante. **FOLIA PERICHAETIALIA** exteriora patentia, e basi latiore vaginata subulata; interiora erecta, ovata, breviter et obtuse acuminata, concava, integerrima, enervia, fuscescencia; retis areolis linearibus laxis. **ANTHERIDIA** 4—6, oblonga, truncata, reticulata, filamento brevi suffulta, ferruginea; paraphyses numerosae, filiformes, articolatae, hyalinae. **FOLIA PERICHAETIALIA** erecta, angustiora, ceterum caulinis similia. **PISTILLIDIA** 4—6, germine oblongo fusco, stylo et stigmatibus hyalino; paraphyses paucae, filiformes, articolatae, hyalinae. **VAGINULA** oblongo-cylindrica, glabra, fusca. **SETA** terminalis, 3—5 lineas longa, erecta, flexuosa, laevis, juventute pallide lutea, senectute purpurascens. **SPORANGIUM** erectum, rotundato-ovatum, laeve, juventute badium, senectute fuscum, ore contracto. **PERISTOMII** dentes conniventes, breves, lanceolati, trabeculati, ab apice usque infra medium fissi, ferruginei. **OPERCULUM** e basi latiori subulatum, rostellatum, badium. **CALYPTRA** cucullata, glabra, straminea, apicem versus fusca.

Differt 1. a Dicrano curvato Hedw. statura humiliori, foliis brevioribus lanceolato-subulatis rigidioribus, nec e basi latiore subulatis heteromallis; sporangio magis rotundato et operculo magis incurvato; **2. a Cuscinodonte longirostri** Brid. dentibus fissis, foliis siccitate non tortilibus, sporangio rotundato-ovato, operculo curvirostro.

In solo limoso Serra d'Estrella, Augusto mense, et in umbrosis montium prope Sebastianopolin Octobri mense: Beyrich; — in Minis generatibus: M. ☉

§. 2. *Foliis siccitate flexuosis vel torquescentibus, nec secundis, nec reflexis.*

11. DICRANUM SELLOWII † surculo erecto simplici parvulo; foliis caulinis erecto-patentibus, siccitate tortilibus lanceolatis obtusis integerrimis, nervo crasso evanescente, perichaetialibus longioribus lanceolato-linearibus; sporangio oblongo-ovato, operculo conico-subulato rostrato.

SURCULUS parvus, 1—1½ lin. longus, erectus, simplex, basi radiculosus. **FOLIA** inferiora seu caulina erecto-patula, siccitate tortilia, lanceolata, obtusa, canaliculata, integerrima, amoene viridia; nervo crasso concolore infra apicem evanescente; retis areolis basi laxioribus parallelogrammis superne minutis subtortundis. **FOLIA PERICHAETIALIA** seu superiora longiora et magis erecta, quam caulina, lanceolato-linearibus, reliquis caulinis similia. **VAGINULA** erecta, cylindrica, glabra, brunnea, apice fusca. **SETA** erecta, circiter tres lineas longa, parum flexuosa aut curvata, laevis, juventute pallide lutea, aetate purpurascens. **SPORANGIUM** erectum, oblongo-ovatum, laeve, brunneum, ore fusco. **PERISTOMII** dentes geminati, erecti, conniventes, lanceolato-subulati, ab apice usque infra medium fissi, cruribus filiformibus, trabeculatis, lutescentibus. **OPERCULUM** conico-subulatum, rostratum, juventute basi fuscescens, superne pallide flavum, aetate urnae concolor. **CALYPTRA** dimidiata, seu cucullata, glabra, straminea, apice fusca.

Dicrano xanthodonti Hedw. propius accedit, satis tamen diversum foliorum atque sporangii forma.

In campis montevidensibus: Setlow; prope Sebastianopolin Julio et Augusto: Merckl. ☉

XII. THYSANOMITRION SCHWAEGR.

SPORANGIUM terminale, aequale, erectum, exapophysatum, basi exasperata, PERISTOMIO simplici, sedecimdentato, dentibus conniventibus lanceolato-subulatis integris aut profunde bifidis, cruribus filiformibus in spiram subcontortis. **CALYPTRA** campanulata, fissa, laevis, basi fimbriata. **FLORES** dioeci, gemmiformes, terminales, plures in discum unum congesti.

Schwaegr. Suppl. II. 1. 61. t. 118. Campylopus Brid. Bryol. univ. 1. 468. Endl. Gen. 49. n. 499.

1. **THYSANOMITRION RIGIDUM** † surculo ascendente, sterili ramoso, fertili subsimplici proliifero; foliis imbricatis erecto-patulis rigidis lanceolato-acuminatis canaliculatis integerrimis, marginibus involutis, nervo crasso excurrente, perichaetialibus piliferis; setis aggregatis inflexis, sporangio oblongo-cylindrico basi exasperato, operculo brevi subulato.

Caespites pulvinati. **RADICULAE** basillares et ex axillis foliorum caulis parte inferiori orientes, capillares, fuscae. **SURCULUS** ascendens, 1—1½ lin. longus, sterili ramosus, dense foliosus; fertili subsimplex et pariter sterili, dense foliosus, proliiferus: proliferatione graciliore, remote et parce foliosa, ad apicem comosa. **FOLIA** imbricata, erecto-patentia, siccitate appressa, lanceolata in acumen subulatum longitudine aequali attenuata, integerrima, canaliculata, marginibus involutis, rigida, atro-fusca, suprema luteo-viridia: nervo concolore latissimo integro ultra tertiam totius folii latitudinem occupante striatoque; retis areolis laxis parallelogrammis. Folia proliferationis humiditate strictiora, siccitate magis appressa et remotiora quam caulina, cum brevi mucrone. **FOLIA** comae seu anthodii universalis longius pilosa, pilo serrato. **FLORES** dioeci terminales: masculi 5—6 in discum unum congesti et in anthodium compositi, gemmiformes. **FOLIA PERIGONALIA** propria imbricata minuta; exteriora 3—4 late ovata, acuminata, ventricosa, integerrima, fusco-viridia: nervo lato excurrente; retis areolis laxis linearibus; interiora minora, brevius acuminata, fuscocentia. **ANTHERIDIA** numerosissima, maxima, oblonga, parum curvata, truncata, reticulata, rufa, filamenta brevi suffulta; paraphyses numerosissimae, filiformes, 10-articulae, articulis inferioribus brevibus, superioribus elongatis, lutescentibus. **FLORES** foeminei 4—5 in anthodium disciforme congesti, gemmiformes. **FOLIA PERICHAETIALIA** propria minora et angustiora, quam folia anthodii, imbricata, exteriora lanceolata, in acumen longum apice in mucronem serratum desinentia, angustata, vaginata; interiora minuta e basi lanceolata in acumen duplo longius et longe cuspidatum attenuata, fuscocentia. **VAGINULA** oblongo-cylindrica, glabra, fusca. **SETAE** 3—4 lineas longae, plures in perichaetium unum universale aggregatae, reflexae, siccitate plerumque erecto-flexuosae, laeves, purpurascens. **SPORANGIUM** erectum, flexura setae pendulum, oblongo-cylindricum, substrumensum, laeve, basi exasperatum, flavo-brunneum, ore purpureo. **Dentes PERISTOMII** lanceolato-subulati, trabeculati, profunde neque vero usque ad basin fissi, lutei, cruribus filiformibus in spiram communem fere subcontortis, pallide luteis. **OPERCULUM** breve, longitudine dimidii sporangii, subulatum, basi dilatatum, rectum, purpureum. **CALYPTRA** campanulata, sporangio brevior, laevis, straminea, basi elegantissime fimbriata, apice subulata fuscocens.

In Minis Generatibus ad urbem Ouro preto, Aprilis: M. 4

2. **THYSANOMITRION INTROFLEXUM** † surculo erecto gracili clavato dichotomo-ramoso; foliis imbricatis erectis siccitate appressis e basi lata concava margine pellucido lanceolatis piliferis, pilo imposito serrato, nervo latissimo in pilum excur-

rente, foliis anthodii oblongis, ceteris caulinum similibus (seta incurvata, sporangio ovali laevi, Schwaegr. l. c.).

Dicranum introflexum Hedw. Spec. musc. 147. t. 29. fig.

1—7. Brid. Spec. musc. 1. 210. Schwaegr. Suppl. 1. 1. 190.

Dicranum capitiflorum Pal. Beauv. Prodr. 53.

Campylopus introflexus Brid. Bryol. univ. 1. 472.

Caespites pulvinati, habitu et crescendi modo *Dryptodonti pulvinato* Brid. similes. **SURCULUS** erectus, uncialis ad sesquiuncialis, gracilis, clavatus, dichotomo-ramosus, foliosus. **FOLIA** imbricata, erecta, siccitate cauli appressa, apicem caulis versus magis magisque conferta anthodium cyathiforme formantia; e basi lata concava marginibus pellucidis lanceolata, integerrima, pilifera, pilo imposito serrato, lurido-viridia: nervo latissimo striato in pilum excurrente instructa; retis areolis subquadratis minutis. **FLORES** dioeci: masculos non vidimus; foeminei 4—5 in unum anthodium congesti, gemmiformes: folia anthodii erecto-patentia, oblonga, obtusa, longius pilosa, ceterum caulinis similia. **FOLIA PERICHAETIALIA** propria erecta, apice patentia, exteriora minora, lanceolata, vaginata, intima minuta, omnia ceteris caulinis similia. **PISTILLIDIA** 5—6, longa, gracilia: germine parvo subrotundo fusco, stylo longo filiformi pellucido, stigmatem dilatato purpurascens. (**PEDUNCULUS** siccus serpentinus, madore incurvatus, hinc sporangia exigua, virentia, inaequilatera, perigoniis immergens. **PERISTOMII** dentes ad divisuram usque saturate rubri, transversim striati, crura alba reflexo-divergentia, Hedw. l. c.)

In Monte Video sterilia specimina legit Sellow. 4

3. **THYSANOMITRION GRISEUM** † surculo assurgente subsimplici innovanti-ramoso; foliis erecto-patentibus apice recurvis siccitate appressis antice patentibus flexuosis lanceolato-subulatis canaliculatis apice serratis piliferis, nervo latissimo.

SURCULUS uncialis ad biuncialis, assurgens, subsimplex, innovantibus simplicibus ramosus, foliosus. **FOLIA** erecto-patentia, flexuosa, lanceolato-subulata, canaliculata, in extremo apice serrata pilifera, sensim in pilum dimidiam folii longitudinem aequantem, denticulatum, apice serratum desinentia, luteo-viridia: nervo latissimo fusco-viridi excurrente instructa; retis areolis laxis, basi linearibus pellucidis, medio parallelogrammis, apicem versus subrotundis minutis et congestis. **FLORES** masculos non vidimus. Foeminei 8—10 in anthodio cyathiformi terminali, plerumque autem innovatione lateraliter posito, congesti: **FOLIA** anthodii caulinis similia. **FOLIA PERICHAETIALIA** propria imbricata, minora, quam caulina, e basi latiore concava repente in subulam longiorem attenuata, brevopilosa: nervo angustiore excurrente instructa; retis areolis laxioribus parallelogrammis pellucidis; intima minuta, lanceolata, epilosa, tenerima. **PISTILLIDIA** 6—7, longa, filiformia: germine parvo subrotundo fusco, stylo filiformi purpurascens apice albescente, stigmatem incrassato pellucido. **FRUCTUS** deest.

Thysanomitron Richardi Schwaegr. proxime accedit, sed foliis apice recurvis serratisque differt.

In campis montevidensibus: Sellow. 4

XIII. TRICHOSTOMUM HEDW.

SPORANGIUM terminale, erectum, aequale, exapophysatum. **PERISTOMIUM** simplex sedecimdentatum, dentibus ad basin usque in crura duo tria quatuorve filiformia fissis. **CALYPTRA** cuculliformis. **FLOS** monoecus, masculus gemmiformis, alaris.

Brid. Bryol. univ. 1. 488. Endl. Gen. 51. n. 529.

1. **TRICHOSTOMUM SQUARROSUM** BRID. surculo ascendente flexuoso-ramoso; foliis recurvis siccitate tortilibus lanceolatis cuspidatis undulatis duplicato-serratis, nervo excurrente, perichaetialibus erectis angustioribus subvaginatis; sporangio cylindrico, operculo subulato curvato.

Trichostomum squarrosum Brid. *Mant.* 85. *Schwaegr. Suppl.* II. 1. 78. t. 123. *Brid. Bryol. univ.* I. 498.

Didymodon squarrosum Hook. *Musc. exot.* II. 10. t. 150.

Encalypta squarrosa Brid. *Spec. musc.* I. 93.

Neckera viticuloides Pal. *Beauv. Prodr.* 78.

RADIX in parte inferiore caulis fasciculatim sparsa. SERCULI 1—4-unciales, caespites magnos densos efformantes, basi procumbentes, inde erecti, dichotomo-ramosi, foliosi; rami longitudine aequali. FOLIA densa, undique inserta, recurva, ita squarrosa, siccitate tortilia, amplexicaulia, lanceolata, undulata, canaliculata, versus apicem duplicato-serrata, luteo-viridia; nervo crasso cuspidem brevem formante pallidior; reticuli areolis minutissimis circularibus, seriatis. FLORES nobis desunt. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora longiora, subvaginata, apice reflexa, ceterum caulinis similia, interiora erecta, angustiora. VAGINULA oblonga, glabra, luteo-rufa. SETA terminalis, solitaria, sesquiuncialis, erecta, laevis, apice incrassata, luteo-purpurascens. SPORANGIUM erectum, subcylindricum, utrinque levissime attenuatum, laeve, flavo-brunneum. PERISTOMII dentes erecti, apicibus conniventes, lineari-lanceolati, ad basin usque bi-tri-quadrifidive, ut geminos vel tergeminos diceret, infra orificium interno lateri adnatis, cruribus linearibus angustissimis e cellularum simplici ordine compositis purpurascens. OPERCULUM e basi dilatata brunnea subulatum, parum curvatum, urna brevior, pallide luteum. CALYPTRA cucullata, angusta, longitudine sporangio aequalis, glabra, straminea, apice fuscenscens. — Muscus antea in ins. Mauritii et in Nepalia observatus habitum refert *Barbulae tortuosae* madidae.

Crescit in prov. Bahiensi, in montibus ad Lages et Sincora, Octobri: M. 24

XIV. HOLOMITRIUM BRID.

SPORANGIUM terminale, erectum, aequale, conicum vel elongato-cylindricum, exannulatum, exapophysatum. PERISTOMIUM simplex, dentibus sedecim, ad basin usque bipartitis, recurvis, lanceolato-subulatis, per paria approximatis. CALYPTRA magna, campanulata, laevis, latere fissa, basi integerrima. FLORES dioeci? MASCULUS axillaris, gemmiformis; femineus terminalis, foliis perichaetialibus longissimis vaginatis.

Endl. *Gen.* 48. n. 494. *Holomitrium* Brid. *Bryol. univ.* I. 226.

1. HOLOMITRIUM CRISPULUM Mart. surculo innovando-ramoso; foliis recurvatis e basi latiore vaginata lanceolato-subulatis argute serratis, nervo excurrente, perichaetialibus longissimis lanceolato-subulatis arcte vaginatis; sporangio erecto conico-cylindrico, operculo —.

Holomitrium crispulum Mart. *Icon. pl. cryptog. bras.* 35. t. 18. f. 2.

SURCULUS biuncialis, ascendens, innovando-ramosus, dense foliosus, basi radiculosus. FOLIA imbricata, recurvata, e basi latiore vaginata, undulata, integerrima, lanceolato-subulata, canaliculata, argute serrata, luteo-viridia, dentibus serraturae subhyalinis; nervo crasso obscuriore excurrente; retis areolis ad basin vaginatam linearibus confertis, in parte folii superiore subrotundatis minutis confertissimis. Flos dioecus? masculus nobis non visus; femineus terminalis gemmiformis. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora caulinis similia, interiora 4—6 lanceolato-subulata, vaginata, apice argute serrata, nervo crasso rufescente, in subulam longam argute serratam prominentem, instructa. PISTILLIDIA numerosa, 12—14, longa, gracilia, germine minuto ovato-oblongo obscure viridi, stylo filiformi purpurascens; paraphyses paucae, pistillidiis longiores, gracillimae, filiformes, hyalinae. FOLIA PERICHAETIALIA in statu fructifero longissima, circa setam arcte convoluta, integerrima, apice

nervo crasso prominente formata, subulata, argute serrata, exteriora breviora apicibus recurvatis, interiora 3—4 longissima, stricta. VAGINULA cylindrica, glabra, basi pistillidiis paraphysibusque destructis circumdata, fusca. SETA 6—8 lin. longa, stricta, laevis, pallide lutea, apice purpurascens. SPORANGIUM erectum, lineam unam longum, cylindrico-conicum, laeve, brunneum, ore fuscio. PERISTOMIUM simplex; dentes peristomii 32 per paria arctissime approximati, lanceolati, breves, solidi, purpurei. OPERCULUM non vidimus. CALYPTRA campanulato-conica.

In sylvis ad flumen S. Francisci in prov. Minas Geraës, in Minis novis, in mediterraneis prov. Bahiensi, nec non in Serrados Orgãos, prov. Sebastianopolitanae. Primis anni mensibus fructificat. M.

2. HOLOMITRIUM OLFERSIANUM † surculo innovando-ramoso; foliis patentibus e basi latiori ventricosa integerrima lanceolatis argute serratis, nervo excurrente, perichaetialibus longissimis vaginatis sporangium conicum superantibus; operculo subulato erecto.

Tab. nostra I. Fig. III.

SURCULUS innovando ramosus, uncialis ad sesquiuncialis, ascendens, basi radiculosus, superne dense foliosus. FOLIA imbricata, e basi latiore ventricosa integerrima lanceolata, patentia, canaliculata, argute serrata; nervo crasso rufescente in apiculum brevissimum excurrente; retis areolis basi laxioribus linearibus in parte superiore minutis confertissimis rotundatis seriatis. FLORES non vidimus. FOLIA PERICHAETIALIA statu fructifero circa setam arcte convoluta et hanc obteguntia, lanceolata, integerrima, in acumen longum subulatum serratum repente angustatum elongata; nervo crasso rufescente prominente instructa: exteriora breviora, apice recurvata, interiora 2—3 longissima, stricta, apicibus sporangium superantibus. VAGINULA cylindrica, laevis, fuscenscens. SETA terminalis, 3—5 lin. longa, stricta, laevis, flava. PYXIS erecta, conica, laevis; brunnea, ore fuscio. PERISTOMIUM simplex, 32-dentatum; dentes humiditate recurva, siccitate conniventes, per paria approximati, lanceolato-subulati, solidi, densissime obscureque trabeculati, pallidi. OPERCULUM e basi convexa subulatum, vix longitudine sporangii, erectum, illi concolor. CALYPTRA magna, campanulata, basi integra, latere fissa, straminea, apice fusca.

In monte Corcovado: ab Olfers, in arenosis ad latera viae inter Porto d'Estrella et Mandioca, Augusto mense, in truncis arborum sylvarum, prope Novo-Friburgum Januario mense, cum fructibus perfectissimis: Beyrich; — in vicinia urbis Ouro preto Minarum, Majo: M. 24

XV. BARBULA HEDW.

SPORANGIUM terminale, subaequale, cum vel absque annulo. PERISTOMIUM simplex, dentibus numero indefinito a sedecim ad triginta et duo, basi membrana intessellata brevissima rarius nulla connexis, filiformibus, spiraliter convolutis. CALYPTRA cuculliformis. FLORES monoeci dioecive: masculus disciformis.

Brid. *Bryol. univ.* I. 527. Endl. *Gen.* 52. n. 535.

1. BARBULA LURIDA † surculo erecto simplici gracili; foliis erecto-patentibus siccitate torquescentibus, lanceolatis obtusis integerrimis, nervo infra apicem evanescente; sporangio cylindrico-oblongo parum curvato, operculo conico brevissimo.

SURCULUS erectus, uncialis, gracilis, simplex, inferiore parte radiculosus, superne foliosus. FOLIA erecto-patentia, siccitate torquescentia, lanceolata, obtusa, planiuscula, integerrima, lurido-viridia; nervo crasso carinato rufescente infra apicem evanescente; retis areolis subquadratis, minutis. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora erecta, lanceolata, basi vaginata, ceteris caulinis similia; interiora

minuta, lanceolato-acuminata, basi vaginata. VAGINULA cylindrica, glabra, brunnea. SETA aut terminalis aut innovationibus brevibus lateralis, 6—8 lin. longa, erecta, siccitate flexuosa, laevis, purpurea. PYXIS erecta, parum curvata, cylindrico-oblonga, laevis, brunnea. PERISTOMII semidestructi dentes, ut videtur, basi liberi, spiralliter contorti. OPERCULUM conicum, brevissimum, pyxidi concolor. CALYPTRA longa, cucullata, glabra, straminea, apice fuscescens.

In Musis Generalibus: M. 24

2. BARBULA LINEARIS SCHWAEGR. surculo brevissimo simplici; foliis confertis fastigiatis linearibus acutis siccitate tortilibus; sporangio cylindrico, operculo conico-subulato brevi.

Schwaegr. Suppl. I. 1. 119. t. 30. Brid. Bryol. I. 533. et 826. Schulz rec. de Barbula 8. t. 32. f. 6.

Tortula linearis Swartz. Fl. Ind. Occid. III. 1765. Hook. et Grev. in Edinb. Journ. of Scienc. I. 298.

Prope Sebastianopolin, teste Walker Arnott.

3. BARBULA CIRRHATA surculo erecto-ramoso; foliis patentibus siccitate tortuosis lineari-lanceolatis breve acuminatis undulatis integerrimis, nervo excurrente; sporangio erecto subcylindrico, operculo conico-rostrato.

Barbula cirrhata Walker Arnott in Wern. Transact. V. 5.

Trichostomum Barbula Schwaegr. I. 1. 144. t. 36.

Tortula lusitanica Brid. Spec. musc. I. 249.

Trichostomum barbuloides Brid. Spec. musc. I. 233. Mant. 83. Bryol. univ. I. 493.

SURCULUS erectus, 4—12 lin. longus, basi et inferiore parte radiculosus, ramosus, dense foliosus. FOLIA patentia, apice ramulorum rosulas formantia, siccitate tortuosa, lineari-lanceolata, breve acuminata, margine undulata, canaliculata, integerrima, pallide viridia: nervo crasso rufescente in apiculum brevem excurrente; retis areolis minimis contiguis. FLORES masculos non vidimus. Feminei terminales, gemmiformes: FOLIA PERICHAETIALIA exteriora breviora, basi erecta latiora pellucida concava seu subvaginata, superne patentia caulinis conformia; interiora minora e basi latiore linearia, obtusa, vaginata: nervo in cuspidem brevem excurrente; pistillidia 6—8; germine oblongo purpureo, stylo filiformi purpurascens, stigmate incrassato; paraphyses numerosae, longiores quam pistillidia, filiformes, breviter et multi-articulatae, flavescens. VAGINULA brevis, subconica, glabra, fusca. SETA terminalis, solitaria, semi-vel sesquialteralis, stricta vel flexuosa, siccitate parum tortilis, apice incrassata, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, subcylindricum, basi paulo amplius, laeve, e luteo-brunneo. PERISTOMII dentes 16 profunde fissi, lineares, angustissimi, leniter torti et ad basin membrana brevissima connexi, purpurei. OPERCULUM breve, tertiam partem sporangii longitudine aequans, conico-rostratum, rufum. CALYPTRA longa, cucullata, laevis, pallide straminea, apice fuscum.

In collibus prope Sebastianopolin: Jameson, ad aquaeductum: Offers; in truncis arborum prope Novo-Friburgum, Januario, supra saxa et truncos vetustos in Serra d'Estrella, Junio: Beyrich; et in arboribus ad Villa Rica prov. Minarum, Apriti: M. 24

XVI. BRACHYSTELEUM REICHENB.

SPORANGIUM terminale, erectum, aequale. PERISTOMIUM simplex. Dentes 16, apice conniventes, per paria approximati, lanceolato-subulati, basi ad apicem versus fissi. CALYPTRA mitraeformis, apice subulata, longitudine sporangio aequali, glabra, sulcata, basi in lacinias quatuor bipartitas divisa.

Endl. Gen. 49. n. 507. Brachypodium Brid. Bryol. univ. I. 147. (non Palis. Beauv.)

Glyphomitrium Brid. Mant. Musc., Encalypta Hedw., Schwaegr., Orthotrichum Hook.

1. BRACHYSTELEUM CRISPATUM † surculo erecto fasciculatim ramoso; foliis basi imbricatis patentibus e basi latiori lanceolatis acutis integerrimis, nervo continuo; sporangio cylindrico striato, operculo subulato recto longitudine sporangio subaequali.

Brachypodium crispatum Brid. Bryol. univ. I. 147 et 717.

Orthotrichum crispatum Hook. et Grev. in Edinb. Journ. of Scienc. 1824. I. 115.

Glyphomitrium crispatum Brid. Mant. 30.

Encalypta crispata Hedw. Spec. Musc. 61. t. 10. f. 1—9. Schwaegr. Suppl. I. 1. 60. t. 17. f. 1. icon punctis inclusa.

SURCULUS erectus, subuncialis, fasciculatim ramosus, atrofusus, basi radiculosus: rami erecti, simplices, dense foliosi, clavati. FOLIA basi imbricata, patula, apice incurva, siccitate apice involuta et crispa, e basi latiore vaginata lanceolata, acuta, canaliculata, apicem versus marginibus involutis, integerrima, inferiora fusco-viridia, suprema luteo-viridia: nervo crasso carinato fusco continuo instructa; retis areolis basi linearibus apicem versus obscurioribus subrotundis seriatis. FLORES monoeci: masculi ad basin vaginulae, gemmiformes, ovati, fusci; FOLIA PERICHAETIALIA minuta, e basi lato-ovata acuminata: nervo continuo; retis areolis laxioribus, quam in caulinis; antheridia 8—10, oblonga, curvata, truncata, rufescentia, filamenta brevi suffulta; paraphyses desunt. FLOS femineus terminalis; FOLIA PERICHAETIALIA caulinis similia. VAGINULA cylindrica, glabra, fusca. SETA innovationibus lateralis evadit, 3—4 lin. longa, erecta, siccitate parum tortilis, laevis, pallide lutea. SPORANGIUM cylindricum, erectum, aequale, striatum, viridi-brunneo, ore purpureo. PERISTOMIUM simplex, 16-dentatum: dentes apice conniventes, siccitate patuli, per paria approximati, lanceolato-subulati, basi ad apicem versus fissi, purpurei. Annulus adest. OPERCULUM e basi convexa subulatum, rectum, fere sporangii longitudine, basi purpureum, pallide luteum. CALYPTRA mitraeformis, apice subulata, longitudine sporangio aequali, sulcata, glabra, basi in lacinias quatuor bipartitas divisa, straminea, apice fusca.

Habitus Trichostomi polyphylli.

In campis montevidensibus: Sellow. 24

SERIES III. ACROCARPI DIPLOPERISTOMI.

A. GENUS PERISTOMIO NUNC SIMPLICI NUNC COMPOSITO:

XVII. MACROMITRIUM BRID.

SPORANGIUM terminale, aequale. PERISTOMIUM simplex vel duplex; simplex 16-dentatum, externum vel internum: internum dentibus lateri sporangii interno adnatis per paria approximatis horizontalibus lanceolatis obtusis brevissimis solidis turgidis albescentibus; externum dentibus geminatis vel subgeminatis, erectis vel reflexis lanceolato-trabeculatis, linea media longitudinali exaratis; duplex: exterius dentibus 16 solitariis vel per paria approximatis erectis lanceolatis trabeculatis, linea media longitudinali exaratis, interius membrana lacera vel multifida. VAGINULA paraphysibus pluribus adultis obsita. CALYPTRA mitraeformis, campanulata conicave, basi in lacinias numerosas subaequales fissa, glabra vel pilosa pilosissimave. FLORES monoeci: masculi gemmiformes, axillares; feminei terminales.

Brid. Bryol. univ. I. 306. Endl. Gen. 50. n. 511.

1. PERISTOMIO SIMPLICI. Spec. 1—8.

a) *Membrana tenera, integra, reticulata, albida, apice fatiszens.*

1. MACROMITRIUM TOMENTOSUM † surculo repente radiculoso-tomentoso ramoso; foliis erectis linearibus mucronulatis basi ad medium denticulatis, nervo infra mucronulum dissoluto; sporangio erecto oblongo-cylindrico angusto quadrisulcato, siccitate tortili, operculo subulato recto, calyptra sporangio dimidio fere brevior, campanulato-conica sulcata, basi octofida.

RADICULAE longae, capillares, rufae, in tomentum surculum et ramos dense vestiens contextae. SURCULUS repens, biuncialis et longior, aphyllus, ramosus; rami erecti, 6—9 lineas alti, simplices, aut innovationibus brevibus apice dichotomi, inferne radiculoso-tomentosi, superne foliosi. FOLIA densa, erecta, apice paulo incurva, siccitate tortilia, linearia, mucronulata, carinata, basi ad medium denticulata, apicem versus integerrima, inferiora fusca, suprema luteo-viridia; nervo valido rufo infra mucronulum dissoluto; retis areolis circularibus minutis seriatis. FLORES masculos non vidi. Feminei terminales, gemmiformes, conici: FOLIA PERICHAETIALIA pauca, lanceolata, latiora, ceterum caulinis simillima. PISTILLIDIA plurima, germine oblongo purpurascens, stylo subulato triplo longiori ferrugineo, stigmatate lobato, lobis recurvatis; paraphyses numerosissimae, filiformes, crassiusculae, 12-articulatae, lutescentes. VAGINULA ovata, basi ad medium pistillidii sterilibus plurimis et paraphysibus numerosissimis obsita, brunnea. SETA erecta, vix semiuncialis, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, oblongo-cylindricum, angustum, lineam unam et dimidiam longum, quadrisulcatum, siccitate tortuosum, brunneum, ore angustato fusco. PERISTOMIUM simplex: membrana tenera, integra, reticulata, albida, subhyalina, apice fatiszens. OPERCULUM subulatum, rectum, sporangio duplo brevius, luteo-album. CALYPTRA sporangio dimidio fere brevior, campanulato-conica, glabra, sulcata, basi octofida, lobis ovatis brevibus, inferne ferruginea, superne fusca.

Macromitrio longirostri Schwaegr. simillimum, sed differt: caulibus et ramis radiculoso-tomentosis, foliis linearibus mucronulatis inferne denticulatis, sporangio oblongo-cylindrico longo angusto 4-sulcato siccitate tortili, peristomii membrana integra et calyptra breviori 8-fida, lobis latioribus et brevioribus. — *Macromitrium* illud a cl. Baddio ad Sebastianopolin lectum et pro *M. longirostre* descriptum, ad nostram speciem pertinere puto, cum *M. longirostre* Schwaegr. Novae Hollandiae sit indigena.

In campis montevidensibus: Setlow. 24

b) *Dentibus intus adnatis. Sporangium ore plicato. Microstoma.*

2. MACROMITRIUM MICROSTOMUM † surculo repente fasciculatim ramoso; foliis erectis lanceolatis acutis integerrimis, nervo excurrente; sporangio ovato ore plicato, operculo subulato obliquo, calyptra —.

SURCULUS repens, subnudus, atrofuscus, fasciculatim ramosus; ramis erectis brevibus iterum fasciculatim ramulosis densissime foliosis fuscis. FOLIA densissime imbricata, erecta, subflexuosa, siccitate crispa, lanceolata, acuta vel breviter acuminata, integerrima, carinata, luteo-viridia; nervo rufescente infra apicem obscuriore subinde autem in mucronem brevissimum subhyalinum porrecto; retis areolis basi linearibus medium versus subrotundatis minutissimis, seriatis. FOLIA PERICHAETIALIA majora, lanceolata, acuminata, reliquis caulinis similia. VAGINULA cylindrica, brunnea, apice fusca, paraphysibus plurimis 7-articulatis basi fasciculatim connatis lutescentibus circumdata. SETA 4—6 lin. longa, flexuosa, laevis, apice incrassata, siccitate parum torta, inferne purpurascens, superne lutea. SPORANGIUM erectum, ovatum, laeve, ore contracto, 8-plicato, badius. PERISTOMIUM simplex, dentibus 16 interno sporangii lateri adnatis, per paria approxi-

matibus, horizontalibus, lanceolatis obtusis brevissimis solidis turgidis albescentibus. OPERCULUM subulatum, obliquum, flavum. CALYPTRA —. SPORAE magnae, globosae.

Macromitrium Richardi Schwaegr. haud dissimile, attamen, ut ex definitione atque descriptione elucet, distinctum.

In truncis demortuis sylvarum prope Novo-Friburgum, prov. Sebastianopolitanae, Decembri: Beyrich. 24

3. MACROMITRIUM FIMBRIATUM SCHWAEGR. surculo repente ramoso, ramis erectis brevibus fastigiato-divisis; foliis confertis subincurvis oblongo-lanceolatis mucronatis integerrimis ruptinervis; sporangio oblongo laevi siccitate sulcato, operculo subulato parum obliquo, calyptra conica glabra striata basi crenato-laciniata.

Schwaegr. Suppl. II. 1. 37. t. 111. Brid. Bryol. univ. I. 797.

Macromitrium uncinatum Brid. Bryol. univ. I. 308.

Orthotrichum fimbriatum Pal. Beauv. Prodr. 80. Hook. et Grell. Edinb. Journ. 1824. I. 115.

Weissia uncinata Brid. Spec. musc. I. 115. Method. 42.

SURCULUS repens, ramosus, nudus, badius; ramis erectis fastigiato-divisis, foliosis. FOLIA densa, erectiuscula, apice incurva, siccitate involuta et tortilia, oblongo-lanceolata, mucronata, parum canaliculata, integerrima, e luteo-viridia, aetate ferruginea; nervo crasso subferrugineo, plerumque proxime infra apicem evanescente, interdum in mucronulum excurrente; reticuli areolis minutis seriatis subrotundis. FOLIA PERICHAETIALIA majora, oblongo-lanceolata, acuminata, ceterum caulinis similia. VAGINULA cylindrica, paraphysibus plurimis emarcidibus obsita, fusca. SETA erecta, 4—5 lin. longa, laevis, purpurea. SPORANGIUM oblongum, laeve, siccitate sulcatum, badius, ore contracto-plicato, siccitate clauso, purpureo. PERISTOMIUM simplex, dentibus 16 subgeminatis, brevissimis, lanceolatis obtusis pallidis. OPERCULUM convexo-subulatum, dimidia parte longitudine sporangii, iique concolor. CALYPTRA conico-acuminata, angusta, multisulcata, glabra, sporangium obtgens, basi crenato-laciniata, crenis introflexis, ad basin straminea, apicem versus fusca.

In truncis demortuis sylvarum prope Novo-Friburgum, Decembri mense: Beyrich; — in districtu adamantium, Majo: M. 24

4. MACROMITRIUM DIDYMODON SCHWAEGR. surculo ascendente ramosissimo; foliis erecto-patulis apice incurvis siccitate involutis oblongo-lanceolatis acutis, sporangio parvo ovato striato, ore contracto plicato, operculo —, calyptra campanulata glabrescente.

Schwaegr. Suppl. II. 2. 138. t. 190.

SURCULUS ascendens, biuncialis, inferne radiculosus, ramosissimus; rami ramulique erecti, graciles, dense foliosi. FOLIA erecto-patentia, apice incurva, siccitate torquata, apice insigniter involuta, oblongo-lanceolata, obtusiuscula, brevissime mucronulata, canaliculata, integerrima, margine paulo undulato, interdum subdenticulata, inferiora fusciscentia, superiora flavo-viridia; nervo valido rufescente, infra mucronulum dissoluto, interdum continuo; retis areolis subrotundis minutis seriatis. FLORES monoeci: masculi in inferiore parte ramorum, ovati, foliis caulinis sextuplo breviores, ferruginei: FOLIA PERIGONIALIA 8, breviter acuminata, profunde concava, integerrima; nervo angustiori infra mucronulum dissoluto; antheridia 8—10, oblonga, curvata, truncata, reticulata, filamento brevissimo suffulta, ferruginea paraphyses numerosae, filiformes, antheridiis paulo longiores; hyalinae. Feminei terminales: FOLIA PERICHAETIALIA erecta, lanceolata, acuminata, basi vaginata; nervo infra apicem dissoluto; pistillidia numerosa; paraphyses numerosissimae, filiformes, lutescentes. VAGINULA cylindrica, brunnea, apice fusca, pistillidiis abortivis et paraphysibus numerosis vestita. SETA erecta est et

innovationibus lateraliter posita, 5—6 lin. longa, siccitate parum tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM parvum, erectum, ovatum, striis octo exaratum, brunneum, ore constricto 8-plicato. PERISTOMIUM simplex 16-dentatum, dentibus intus adnatis conniventibus subgeminatis brevissimis latis triangularibus obtusis albidis. OPERCULUM deest. CALYPTRA campanulata, 8-sulcata, basi subpilosa, aetate glabra, ferruginea, apice fusco.

In truncis demortuis sylvarum prope Novo-Friburgum in societate *M. fimbriati* et *M. microstomi*, Decembri: Beyrich. 24

r) *Dentibus externis.*

5. MACROMITRIUM LONGIROSTRE SCHWAEGR. surculo repente nudo, ramis erectis subsimplicibus; foliis densis erecto-patulis siccitate tortilibus lineari-lanceolatis acuminatis bilineatis carinatis integerrimis, nervo continuo; sporangio oblongo sulcato, operculo conico-subulato medioeri, calyptra conica sulcata glabra, basi in laciniis fissata.

Schwaegr. Suppl. II. 1. 38. t. 112. Brid. Bryol. univ. I. 310 et 735.

Orthotrichum longirostre Hook. Musc. exot. t. 25.

Kunth Synops. pl. aeq. I. 54. Raddi Crittog. bras. n. 4. Hook. et Grev. l. c. 118.

SURCULUS repens, uncialis ad biuncialis, nudus, valde ramosus; ramis erectis 6—12 lin. longis, subsimplicibus subclavatis densis foliosis. FOLIA imbricata, erecto-patula, siccitate tortilia, lineari-lanceolata, acuminata, carinata, integerrima, lineis duabus lateralibus obscurioribus, quas Hookerius contra Schwaegrichenium pro striis aut plicis habet, instructa, luteo-viridia; nervo crasso ferrugineo continuo; retis areolis subquadratis minimis. FOLIA PERICHAETALIA caulinis similia; paraphyses numerosae, filiformes, lutescentes. VAGINULA conica, fusca, paraphysibus numerosis obtecta. SETA aut terminalis aut subinde innovationibus brevibus lateralis, 4—6 lin. longa, erecta, siccitate parum tortilis, laevis, apice incrassata, ferrugineo-badia. SPORANGIUM erectum, oblongum, sulcatum, juventute luteo-viride, ore purpureo, aetate sordide fuscum. PERISTOMIUM simplex, externum; dentes 16 erecti, conniventes, siccitate reflexi, vix per paria approximati, lanceolati, obtusi, breves, dimidium sporangii diametrum vix aequantes, transversim striati, linea media longitudinali exarati, pallide badii. OPERCULUM conico-subulatum, rectum, sporangium longitudine aequans, basi rufescens, flavo-brunneum. CALYPTRA conica, usque ad apicem sulcis circiter 16 profundis insculpta, glabra, basi ad dimidiam partem in laciniis angustas fissata, ferruginea, apice fusca. — Differt a congeneribus similibus: foliis bilineatis acuminatis.

In cortice arborum in monte Corcovado prope Sebastianopolin: Raddi, M. 24

6. MACROMITRIUM SWAINSONI BRID. surculo repente, ramis erectis fasciculato-divisis; foliis dense imbricatis erecto-patentibus siccitate tortis lineari-ligulatis mucronulatis longitudinaliter plicatis, nervo in mucronulam prominente; sporangio oblongo-ovato laevi, operculo hemisphaerico subulato, calyptra conica, sulcata glabra, basi laciniata.

Brid. Bryol. univ. I. 318. Schwaegr. Suppl. II. 2. 133; III. 1. 1. t. 202.

Leiotheca Swainsoni ibid. 730.

Orthotrichum Swainsoni Hook. Musc. exot. t. 127. Hook. et Grev. l. c. 113. Raddi Critt. bras. 4.

FOLIA PERICHAETALIA caulinis similia, erecta, iis minus plicata, teneriora. SETA innovationibus brevissimis lateralis evadit, erecta, semiuncialis, laevis, parum flexuosa, pallide lutea. SPORANGIUM erectum, oblongum, laeve, brunneum. PERISTOMIUM simplex: dentes sedecim per paria approximati, erecti, conniventes, lanceolati, trabeculati, linea media longitudinali notati, interdum apice fissi, lutescentes. COLUMELLA

longe exserta. OPERCULUM e basi conica subulatum, dimidium sporangium longitudine paulo superans. CALYPTRA conica, glabra, sulcata, basi ad medium usque in laciniis numerosas angustas fissata, rufo-fusca, basi lutea.

Prope Sebastianopolin: Swainson, ibidem in monte Corcovado: Raddi. 24

7. MACROMITRIUM FILIFORME SCHWAEGR. surculo praelongo ramoso gracillimo, ramis fasciculatim ramulosis; foliis patentibus siccitate adpressis ovato-lanceolatis acutis integerrimis, nervo evanescente; sporangio oblongo basi parum plicato, operculo brevi e basi convexa rostrato, calyptra campanulata pilosissima basi laciniato-fissa.

Schwaegr. Suppl. II. 2. 1. 64. t. 171., ibid. II. 2. 139.

Leiotheca filiformis Brid. Bryol. univ. I. 727 et 795.

Orthotrichum filiforme Hook. et Grev. l. c. 116. t. 4.

Lasia orthotrichoides Raddi Critt. 38.

Leskia orthotrichoides Raddi MS.

SPORANGIUM erectum, oblongum, basi attenuatum et parum plicatum. PERISTOMIUM simplex: dentes 16 inflexi, lanceolati, sporangio decuplo breviores, linea media longitudinali exarati, trabeculati, siccitate lutei, madore grisei. COLUMELLA exserta, conica, obtusa. OPERCULUM e basi convexa rostratum, sporangio quadruplo brevius, eique concolor. CALYPTRA campanulata, totam pyxidem obtegens, basi in laciniis regulares fissata, pilosissima, rufescens, juventute ferruginea. — Habitus *Pterigynandri* vel *Antitrichiae*.

Prope Sebastianopolin: Raddi; in sylvis antiquissimis ad truncos arborum prope Novo-Friburgum, Dec.: Beyrich; — in campis montevidensibus: Setlow. 24

8. MACROMITRIUM MUCRONIFOLIUM † surculo repente ramoso, ramis erectis brevibus subsimplicibus; foliis stellulatis siccitate spiraliter tortis lingulatis obtusis mucronulatis integerrimis striato-carinatis; sporangio ovato-turbinato laevi, operculo convexo-subulato brevioris, calyptra glabra basi laciniata.

Leiotheca mucronifolia Brid. Bryol. univ. I. 729.

Orthotrichum mucronifolium Hook. et Grev. l. c. 116. t. 4.

Muscus hujus nominis a cl. Schwaegrichenio in Supplemento suo II. 3. p. 60. t. 170. descriptus et delineatus species est a nostra diversa, quam etiam a cl. Siebero acceptam *M. elegantis* nomine designamus. VAGINULA oblonga, paraphysibus numerosissimis lutescentibus obsita, fusca. SETA innovationibus brevissimis lateralis, erecta, circiter 2—3 lin. longa, laevis, siccitate flexuosa et parum torta, apice incrassata, flava seu flavo-brunnea. SPORANGIUM erectum, ovato-turbinatum, laeve, rubro-brunneum. PERISTOMIUM simplex, in specimenibus nostris destructum. OPERCULUM convexo-subulatum, sporangio brevius, luteo-ferrugineum. CALYPTRA campanulata, basi regulariter in laciniis 8 lineares fissata, glabra, fusco-brunnea.

In truncis arborum Serra d'Estrella, Augusto: Beyrich. 24

2. PERISTOMIO DUPLICI. Spec. 9—15.

a) *Sporangio laevi.*

9. MACROMITRIUM APICULATUM BRID. surculo repente, ramis erectis fastigiato-divisis; foliis patulis siccitate tortilibus lineari-oblongis apiculatis integerrimis undulatis; sporangio oblongo laevi, operculo conico subulato, calyptra conica basi laciniata bifidis.

Macromitrium apiculatum Brid. Bryol. univ. I. 311. Schwaegr. Suppl. II. 2. 58. t. 170.?

Macromitrium macrostomum Schwaegr. Suppl. II. 2. 132. t. 190.

Leiotheca apiculata Brid. Bryol. univ. I. 734.

Orthotrichum apiculatum Hook. Musc. exot. t. 45. Hook. et Grev. l. c. 115.

VAGINULA ovata, pistillidiis et paraphysibus demortuis numerosissimis oblecta, fusca. SETA per innovationes lateralis, 4—6 lin. longa, erecta, laevis, incrassata, purpurascens. SPORANGIUM magnum, erectum, oblongum, laeve, siccitate basi plicatum, badium. PERISTOMIUM duplex; externum e dentibus solitariis purpureis, internum e membrana lutescente constare videtur. OPERCULUM conico-subulatum, luteum. CALYPTRA sporangio brevior, conica, striata, glabra, ferruginea, apice fusca, basi usque ad medium in lacinias lineares fissa, lacinias basi bifidas.

In Serra dos Orgãos ad sylvarum primaevarum truncos demortuos, Februario, sporangis effectis: Beyrich. 4.

10. MACROMITRIUM CIRRHOSUM BRID. surculo repente ramoso, ramis ascendentibus flexuosis; foliis recurvato-patentibus siccitate crispis flexuosis lineari-lanceolatis acuminatis apicem versus serrulatis, nervo excurrente; sporangio turbinato laevi, operculo conico-subulato, calyptra campanulata glabra profunde laciniata.

Macromitrium cirrhosum Brid. *Bryol. univ. I. 316, 738 et 798.*

Orthotrichum cirrhosum Hook. et Grev. l. c. 130. t. 6.

Schlotheimia cirrhosa Schwaegr. *Suppl. I. 2. 43.* Brid. *Methođ. 114.* Schwaegr. *Suppl. III. 1. t. 201.*

Neckera cirrhosa Swartz. *Fl. Ind. Occ. III. 1802.*

Anoetangium cirrhosum Hedw. *Sp. musc. 42. t. 5. f. 1—3.*

Hypnum cirrhosum Swartz. *Prodr. 142.* Gmel. *Syst. nat. II. 1347.*

Hypnum cirrhatum Brid. *Musc. rec. II. 2. 185.*

SPORANGIUM erectum, turbinatum, urna subrotunda, ore contracto, laevi; juventute brunneum, senectute fuscum. PERISTOMIUM exterius: dentes 16 erecto-recurvi, siccitate revoluti, lato-lanceolati, obtusi, linea longitudinali exarati, ferruginei; interius: membrana lutea reticulata, dentibus brevior, apice irregulariter fissa. OPERCULUM conico-subulatum, rectum, longitudine sporangio subaequali, luteum. CALYPTRA campanulata, apice subulata, glabra, longitudinaliter sulcata, profunde multifida, lacinias regularibus basi iterum fissilibus, ferruginea, nitida. — *Macromitrio longifolio* affine, sed foliis longioribus lineari-lanceolatis acuminatis serrulatis, nec lanceolatis integerrimis, sporangio subrotundo laevi, nec sulcato differt.

In montibus Aracocara et Cupati, secundum flum. Japurá, prov. Rio Negro, Novembri, Decembri, et in Lages et Sincora prov. Bahiensis Octobri: M.; — prope Tijuca in vicinia Sebastianopoleos: Olfers; — et in Serra d'Estrella ad truncos putridos sylvarum antiquissimarum, Augusto: Beyrich. 4.

b) *Sporangio sulcato.*

11. MACROMITRIUM VITICULOSUM BRID. surculo repente ramoso, ramis subsimplicibus erectis flexuosis, foliis erecto-patentibus subtortilibus, siccitate tortilibus retortisque, lanceolatis integerrimis; sporangio ovato sulcato, calyptra campanulata striata glabra, basi ad medium multifida.

Macromitrium viticulosum Brid. *Bryol. univ. I. 738.*

Schlotheimia viticulosa Raddi *Crittog. Bras. 4.*

Schlotheimia brachyrhyncha Schwaegr. *Suppl. II. 2. 53. t. 168.* Brid. *Bryol. univ. I. 800.*

Caespites minus densi, praecalti et habitu *Neckerae viticulosae* Hedw. SURCULUS repens, foliis jam destitutis fuscus, inferne dense radiculosus, ramosus; rami unciales et biunciales, vel erecti vel ascendentes, fastigiati, flaccidi, bis vel ter divisi, dense foliosi, purpurei. FOLIA dense imbricata, erecto-patentia, subtortilia, siccitate tortilia et retorta, lanceolata, acuta, carinata, integerrima, inferiora ferruginea, superiora flavo-viridia; nervo exiguum cuspidem sistente, ferrugineo; retis areolis in basi folii elongatis, in superiore parte subquadratis. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora caulinis similia; interiora lanceolata, longe acuminata, denticulata; pistillidia numerosa, 17—20, germine oblongo purpureo, stylo subulato germi concolori, stigmate incrassato

hyalino; paraphyses numerosae, filiformes, articulae, lutescentes. VAGINULA oblongo-cylindrica, paraphysibus demortuis oblecta, fusca. SETA innovationibus brevibus lateralis, 2—4 lin. longa, erecta, laevis, siccitate parum tortilis, apice in sporangium dilatata, purpurascens. SPORANGIUM erectum, ovatum, basi angustatum, sulcatum, badium. PERISTOMIUM: externum in speciminibus nostris destructum; internum membrana lutea, apice tantum fissa. OPERCULUM sporangii tertiam partem metiens, conico-subulatum, parum obliquum, aurantiacum. CALYPTRA campanulata, sulcata, a basi ad medium in plures lacinias fissa, sporangio brevior, glabra, ferruginea, apice fusca.

In truncis demortuis sylvarum antiquissimarum prope Tijuca, vicinia Sebastianopoleos, Septembri, et ad sava M. Corcovado, Januario: Beyrich et Raddi. 4.

12. MACROMITRIUM XANTHOCARPUM † surculo repente, ramis erectis subsimplicibus; foliis erecto-patentibus, siccitate tortilibus oblongo-ligulatis mucronulatis concavis integerrimis parum plicatis; sporangio oblongo sulcato, operculo conico-subulato recto brevi, calyptra —.

SURCULUS repens, uncialis ad biuncialis, radiculosus, ramosus; rami erecti, 6—12 lin. longi, subsimplices, incrassati, foliosi, apicem versus innovationibus brevissimis stellulato-foliosis. FOLIA laxa imbricata, erecto-patentia, siccitate tortilia, oblongo-ligulata, mucronulata, concava, integerrima, plica laterali una alterave, inferiora rufescentia, superiora luteo-viridia; nervo valido ferrugineo excurrente; retis areolis subrotundis minutissimis. FOLIA PERICHAETIALIA oblonga, acuta, subvaginata, ceterum caulinis similia. VAGINULA cylindrica, brunnea, pistillidiis abortivis et paraphysibus numerosis tenerimis filiformibus albidis vestita. SETA medio inter duas innovationes brevissimas terminalis, 4—5 lin. longa, erecta, siccitate parum tortilis, laevis apice incrassata, purpurascens. SPORANGIUM erectum, oblongum, octosulcatum, luteum. PERISTOMIUM duplex, externum 16-dentatum: dentes erecti, conniventes, siccitate reflexi, lato-lanceolati, geminati, linea longitudinali divisi, lutei; internum e membrana alba, basi integra, superne laciniata. OPERCULUM conico-subulatum, erectum, breve, sporangio concolor. CALYPTRA deest.

Macromitrio Moorcroftii Hook. et Grev. et punctato Raddi proxime affine, sed ab illo statura minore, foliis oblongo-ligulatis et peristomio duplici, ab hoc autem foliis oblongo-ligulatis, nervo excurrente distinctum.

In sylvis flumini Amazonum conterminis: M. 4.

13. MACROMITRIUM QUINQUEFARIUM † surculo declinato ramoso apice stoloniformi, ramis secundis erectis; foliis quinquefariis patentibus cordato-ovatis obtusiusculis integerrimis, nervo crasso infra apicem dissoluto; sporangio clavato octosulcato, operculo —, calyptra —.

SURCULUS 2—4 lin. longus, declinatus, ramosus, foliosus, fuscus, apice stoloniformis, subnudus; rami secundi, erecti, simplices aut dichotomi, dense foliosi, rufi; ramus primarius, ut caulis, iterum declinatus et apice stoloniformis. FOLIA quinquefaria, patentia, siccitate appressa et crispabilia, cordato-ovata, obtusiuscula, integerrima, concava, margine parum revoluta, viridiferruginea; nervo crasso solido ferrugineo infra apicem dissoluto instructa; retis areolis rotundis seriatis pusillis. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora caulinis simillima; interiora basi submembranacea, oblongo-lanceolata, longe acuminata; nervo angustiore quam in caulinis, concolore, supra medium evanescente; retis areolis laxis in basi folii subquadratis; intima 2—3 lanceolata, in mucronem linearem sub dimidia folii longitudine exeuntia; nervo infra mucronem evanescente. Pistillidia numerosa, germine oblongo-cylindrico purpurascens, stylo subulato duplo longiore pallide luteo, stigmate dilatato; paraphyses numerosissimae, filiformes, crassae, plurimae basi in fasciculum connatae,

interdum etiam ramulosae, longitudine inaequales, 5—11-articulatae, lutescentes. VAGINULA ovata, pistillidiis sterilibus nonnullis et paraphysibus numerosissimis obsita, pallide-brunnea. SETA semiuncialis, erecta, stricta, apicem versus magis magisque incrassata et in sporangium transiens, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, clavatum, octosulcatum, amoene badium, ore angustato. PERISTOMII exterioris dentes 8 humiditate conniventes, siccitate reflexi, lato-lanceolati, fere ad basin bifidi, cruribus perforatis articulatis, articulis biserialiter subquadratis, ferruginei; interioris octodentatum, dentibus conniventibus, cum exterioribus alternantibus filiformibus articulatis ex una serie cellularum formati, lutescentibus. OPERCULUM et CALYPTRA non visa.

Habitat in montibus ad Lages, Sincora et ad Rio de Contas, rel. in mediterraneis prov. Bahiensis: M. 24.

14. MACROMITRIUM SULCATUM BRID. surculo repente ramoso, ramis erectis fasciculatis; foliis imbricatis patentibus flexuosis siccitate tortilibus lineari-lanceolatis apiculatis seu breve acuminatis integerrimis; sporangio ovato profunde octosulcato, operculo e basi hemisphaerico subulato, calyptra campanulata sulcata glabra basi multífida.

Macromitrium sulcatum Brid. *Bryol. univ. I. 319 et 738.*

Schlotheimia sulcata Hook. *Musc. exot. t. 156.*

Orthotrichum sulcatum Hook. et Grev. *l. c. 129.*

SPORANGIUM erectum, ovatum, profunde octosulcatum, ferrugineum. PERISTOMIUM exterius dentibus 16 erectis, siccitate recurvis, per paria approximatis linearibus truncatis submarginatis arcte trabeculatis, linea media longitudinali exaratis, ferrugineis; interioris membrana reticulata brevior, erecta, margine superiori irregulariter fissa alba. OPERCULUM e basi hemisphaerica subulatum, rectum, fere sporangii longitudine, pallide ferrugineum. CALYPTRA campanulato-conica, sulcata, glabra, basi ad medium usque in lacinias numerosissimas lineares basi plerumque crenatas fissa, ferruginea.

In montibus Araracoara et Cupati in prov. Rio Negro, nec non in montibus ad Sincora et in vicinia Rio de Contas prov. Bahiensis: M. 24.

15. MACROMITRIUM STELLULATUM BRID. surculo repente pinnato-ramoso, ramulis erectis brevissimis; foliis stellulatis, siccitate tortilibus, lineari-ligulatis mucronulatis; sporangio obovato sulcato, operculo e basi conico subulato, calyptra campanulata sulcata glabra basi multipartita.

Brid. Bryol. univ. I. 314 et 741.

Orthotrichum stellulatum Hook. et Grev. *l. c. 119. Walker Arn. Disposit. meth. 17.*

Schlotheimia stellulata Hornsch. in *Hor. phys. Berol. 61. t. 12. Schwaegr. Suppl. III. t. 149.*

VAGINULA oblonga, pallescens, apice fusca, pistillidiis 6—8 abortivis purpurascens-fuscis et paraphysibus plurimis tenerimis filiformibus articulatis albidis vestita. SETA erecta, duas ad quatuor lineas longa, laevis, siccitate parum tortilis, inferne sanguinea, apice pallescens. SPORANGIUM erectum, obovatum, 8-sulcatum, brunneum. PERISTOMIUM duplex: dentes 16 exterioris conniventes, siccitate revoluti, lato-lanceolati, obtusiusculi, articulati, linea verticali notati, turgidi, pallide ferruginei; interioris membrana hic illic perforata, subhyalina in dentes 16 lanceolatos acutos, margine erosos, siccitate et madore erectos profunde partita. OPERCULUM e basi conico subulatum, rectum, dimidium sporangii longitudine, brunneum, apice ferrugineum. CALYPTRA sporangio dimidio fere brevior, conico-campanulata, sulcata, glabra, basi multipartita, lutea, nitida.

In Brasilia: Pohl, loco natali non indicato; in Minis Generatibus: M. 24.

3. PERISTOMIO IGNOTO. Spec. 16.

16. MACROMITRIUM PUNCTATUM RADDI surculo decumbente; foliis patulis, siccitate insigniter involutis laxis, lineari-ob-

longis acutis pellucido-punctatis planis evanidinerviis; sporangio obovato sulcato, operculo rostrato brevi, calyptra conica, juniore apice subpilosa inferne sulcata basi fimbriato-lacinata.

Brid. Bryol. univ. I. 739. Schwaegr. Suppl. II. 2. 1. 134.

Orthotrichum punctatum Hook. et Grev. *l. c. 119. t. 5.*

Folia evanidinervia dicunt cl. auctores, solidinervia sistit icon. Ipso hanc speciem non vidi.

In Serra d'Estrella: Raddi. 24.

B. GENERA PERISTOMIO DUPLICI:

XVIII. SCHLOTHEIMIA BRID.

SPORANGIUM terminale, aequale, laeve, exannulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus sedecim per paria approximatis, erectis, siccitate extrorsum in spiram revolutis, lanceolatis obtusis, sulcatis; interioris membrana conica in lacinias sedecim pluresve irregulares, dentiformes fissa. VAGINULA laevis, apice margine membranaceo coronata, basi pistillidiis paraphysibusque circumdata. CALYPTRA conico-mitraeformis, glabra aut pilosa, appendicibus quatuor ad octo trapeziformibus convergentibus tenerioribus basi aucta. FLORES dioeci, terminales.

Brid. Bryol. univ. I. 320. Endl. Gen. n. 512.

1. SPORANGIUM COSTATUM. Spec. 1.

1. SCHLOTHEIMIA NITIDA SCHWAEGR. surculo repente fastigiato-ramoso, ramis erectis divisis; foliis imbricatis erecto-patentibus, siccitate spiraliter contortis cauli appressis, ovatis obtusis mucronulatis corrugatis carinatis integerrimis, nervo continuo, perichaetialibus oblongis longissime acuminatis; sporangio erecto oblongo-cylindrico octocostato, calyptra campanulata scabra, basi appendicibus 8 adaucta.

Schwaegr. Suppl. II. 3. 51. t. 167. Brid. Bryol. univ. I. 798.

Caespites densi, radiculis capillaribus fascis arctissime conjuncti. SURCULUS repens, uncialis, ramosissimus, radiculosotomentosus, fuscus: rami erecti, unciales, fastigiato-divisi, dense foliosi. FOLIA imbricata, erecto-patentia, siccitate contorta cauli appressa, ovata, obtusa, mucronulata, apicem versus corrugata, carinata, integerrima, longitudinaliter plicata, inferiora fusciscentia, superiora luteo-viridia, subpellucida: nervo continuo instructa, retis areolis subquadratis basi laxioribus. FOLIA PERICHAETIALIA erecta, majora, quam caulina; exteriora lato-ovata, acuminata, concava, interiora oblonga, longissime acuminata, vaginata, longitudinaliter plicata, subpellucida, ceterum caulinis similia. VAGINULA cylindrica, glabra, basi pistillidiis paraphysibusque numerosis circumdata, apice annulo membranaceo irregulariter lacero, fusca. SETA terminalis, erecta, 2—3 lin. longa, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, dimidium fere setae longitudinem metiens, octocostatum, costis versus orificium evanescentibus, badium, ore purpureo. PERISTOMIUM externum dentibus 16 erectis conniventibus, siccitate in spiram revolutis, lanceolatis, linea longitudinali divisis, trabeculatis, purpurascens; internum membrana basi integra alba, ab apice ad medium in lacinias irregulares fissa. OPERCULUM deest. CALYPTRA campanulata, scabra, auro-nitens, apice fusca, basi appendicibus octo aequalibus conniventibus tenerioribus stramineis adaucta.

In truncis arborum sylvarum antiquissimarum, ad flumen Paquaquer, prov. Sebastianopolitanae, Januario: Beyrich. 24.

2. SPORANGIUM LAEVE. Spec. 2—16.

§. 1. Calyptra pilosa.

2. SCHLOTHEIMIA TRICHOMITRIA SCHWAEGR. surculo repente ramoso radiculoso-tomentoso, ramis fasciculato-divisus

erectis; foliis recurvis, siccitate tortilibus, lanceolato-lingulatis mucronulatis longitudinaliter plicatis corrugatisve, nervo continuo, perichaetialibus lineari-lingulatis apiculatis, seta brevissima; sporangio subcylindrico laevi, operculo conico-acuminato, calyptra pilosissima.

Schwaegr. Suppl. II. 3. 1. 55. t. 169. Brid. Bryol. univ. I. 501.

SURCULUS repens, 1—2 poll. longus, tomento denso fusco e radice capillaribus formato tectus, ramosus; rami erecti, unciales, vel sesquiunciales, fasciculato-divisi, appropinquati, basi radiculoso-tomentosi, superne dense foliosi. **FOLIA** recurva, siccitate tortilia, lanceolato-lingulata, mucronulata, longitudinaliter plicata, corrugata, integerrima, canaliculata, inferiora fusciscentia, suprema luteo-viridia, subpellucida: nervo continuo ferrugineo; retis areolis subquadratis minutis seriatis. **FOLIA PERICHAETIALIA** erecta, exteriora majora, oblonga, apiculata, interiora 4—5, duplo longiora quam caulina, lineari-lingulata, apiculata, undulata, vaginata, ceterum caulinis similia; pistillidia et paraphyses ut in congeneribus. **VAGINULA** cylindrica, basi pistillidiis et paraphysibus circumdata, glabra, apice membranaceo-marginata, brunnea, apice fusca. **SETA** erecta, innovationibus brevibus lateralis, 2—3 lin. longa, laevis, lutea. **SPORANGIUM** erectum, subcylindricum, laeve, vetustum fuscum. **PERISTOMIUM** destructum, congeneribus aequale videtur. **OPERCULUM** conicum, acuminatum, in fructu immaturo sporangio brevius. **CALYPTRA** campanulata, apiculata, pilosissima, aurea, basi appendicibus quatuor adacta.

In campis montevidensibus: Sellow. 2.

§. 2. *Calyptra scabra.*

3. SCHLOTHEIMIA MERKELII † surculo repente, ramis erectis crassis fastigiato-divisis; foliis dense imbricatis erecto-patentibus, siccitate appressis, contortis late oblongo-lingulatis mucronulatis plicato-corrugatis integerrimis, perichaetialibus late lanceolatis longe acuminatis, seta brevi; sporangio magno oblongo-cylindrico laevi, calyptra scabra.

Tab. nostra I. Fig. IV.

SURCULUS repens, basi radiculosus, fasciculato-ramosus; rami erecti, unciales, crassi, iterum in ramulos breves fastigiato-divisi, foliosi. **FOLIA** densissime imbricata, erecto-patentia, siccitate appressa, spiraliter quasi in funiculum torquata, late oblongo-lingulata, mucronulata, a medio versus apicem oblique et irregulariter plicata, corrugata, integerrima, inferiora fusciscentia, superiora luteo-viridia, sub microscopio composito hyalina: nervo valido rufescente continuo; retis areolis parallelogrammis minutis. **FOLIA PERICHAETIALIA** erecta, exteriora majora, acuta, caulinis similia, interiora longiora lato-lanceolata, longe acuminata, vaginata, ceterum caulinis similia; pistillidia numerosa, germine ovato parvo, stylo pellucido-rufescente. stigmatibus incrassato emarginato; paraphyses numerosissimae, filiformes, pistillidiis breviores, articolatae, lutescentes. **VAGINULA** cylindrica, laevis, basi pistillidiis paraphysibusque cincta, brunnea, apice fusca, margine membranaceo lacero hyalino coronata. **SETA** erecta, innovationibus brevibus lateralis, circiter duas lineas longa, laevis, parum torta, ferruginea seu purpurascens. **SPORANGIUM** erectum, dimidiam setae longitudinem aequans, oblongo-cylindricum, laeve, brunneum. **PERISTOMIUM** externum: dentes 16 erecti, conniventes, siccitate spiraliter revoluti, lanceolati, obtusi, trabeculati, linea longitudinali exarati, purpurei; internum: membrana conica lutescens ad basin usque in 16 lacinias lanceolatas perforatas regulariter fissa. **OPERCULUM** conicum, cum acumine longitudine aequali, luteum. **CALYPTRA** longa, campanulata, glabra, praesertim apicem versus scabra, ferruginea, basi appendicibus 8 stramineis acta.

Prope Rio de Janeiro in truncis arborum, Julio et Augusto: Merkel; — in Brasilia australi: Sellow. 2.

4. SCHLOTHEIMIA JULACEA † surculo repente ramosissimo, ramis fasciculato-divisis dense foliosis; foliis parvis densissime imbricatis erecto-patentibus siccitate contortis appressis ovatis mucronulatis corrugatis, perichaetialibus lanceolatis acutis longitudinaliter plicatis, sporangio oblongo ovato laevi, calyptra ad apicem scabra 8-appendiculata.

SURCULUS repens, uncialis et longior, radiculosus, ramosus; rami erecti, unciales, fasciculato-divisi, basi nudi, superne foliosi, ramulis subsimplicibus. **FOLIA** parva, densissime imbricata, erecto-patentia, siccitate cauli appressa, spiraliter, quasi in funem, torquata, ovata, mucronulata, longitudinaliter plicata, corrugata, concava, integerrima, inferiora fusca, suprema luteo-viridia: nervo valido ferrugineo continuo; retis areolis subquadratis minutis seriatis. **FLOS** femineus terminalis: **FOLIA PERICHAETIALIA** erecta, duplo longiora quam caulina, lanceolata, acuta, vaginata, longitudinaliter plicata, non rugosa, integerrima: nervo excurrente; retis areolis linearibus; pistillidia et paraphyses numerosae, ut in congeneribus. **VAGINULA** cylindrica, laevis, basi pistillidiis paraphysibusque emarcidis circumdata, apice membranaceo-marginata, brunnea, apice fusca. **SETA** erecta, innovationibus lateralis evadit, 2—3 lin. longa, laevis, siccitate parum tortilis, purpurascens. **SPORANGIUM** erectum, oblongum, laeve, brunneum. **PERISTOMIUM** exterius 16-dentatum, dentes erecti, conniventes, siccitate spiraliter revoluti, lanceolati, obtusi, solidi, purpurei; interius membrana conica, albidula, ad basin usque in 16 lacinias lanceolatas, linea media longitudinaliter divisas, fissa. **OPERCULUM** deest. **CALYPTRA** conica, apiculata, apicem versus scabra, badia, basi appendicibus 8 tenerioribus stramineis adacta.

In Serra d'Estrella in cortice arborum: M. 2.

§. 3. *Calyptra laevi.*

5. SCHLOTHEIMIA JAMESONI BRID. surculo repente, ramis erectis divisis; foliis erecto-patentibus, siccitate torquatis appressis, oblongo-lingulatis mucronulatis longitudinaliter plicatis integerrimis, nervo continuo, perichaetialibus oblongo-lanceolatis acuminatis, seta longiuscula; sporangio ovato-oblongo laevi, calyptra longa campanulata laevi.

Brid. Bryol. univ. I. 742. Schwaegr. Suppl. III. 1. 1. t. 202.

Orthotrichum Jamesoni Walker Arnott. in Act. Soc. Wern. 5. 201. Hook. et Grev. l. c. 129. t. 6.

Prope Sebastianopolin locis sylvaticis montanis: Chamisso, Olfers, Raddi, Jameson, Beyrich; — in campis montevidensibus: Sellow. 2.

6. SCHLOTHEIMIA RUGIFOLIA BRID. surculo repente ramoso, ramis erectis seu ascendentibus gracilibus fasciculato-ramulosis; foliis imbricatis erecto-patentibus siccitate cauli appressis oblongo-lingulatis corrugatis integerrimis, nervo mucronulato, seta erecta torta; sporangio oblongo, calyptra campanulata laevi,

Brid. Bryol. univ. I. 322. (excl. synon. S. rugifoliae Schwaegr.) et 741.

Orthotrichum rugifolium Hook. Musc. excol. t. 128. Hook. et Grev. l. c. 113. Raddi l. c. 4. Walker Arnott. Disposit. meth. 18.

SURCULUS repens, nudus, atrofuscus, ramosus; rami erecti vel ascendentes, unciales ad biunciales, graciles, inferne nudi, superne foliosi, fasciculato-ramulosi, ramulis apice iterum fastigiato-divisis. **FOLIA** imbricata, supra medium patentia, siccitate cauli appressa, oblongo-lingulata, mucronulata, canaliculata, integerrima, medio apicem versus corrugata, fusciscentia: nervo crasso ferrugineo in mucronulum parvum prominente; retis areolis rotundis minutis seriatis basi laxioribus. **FOLIA PERICHAETIALIA**

erecta, exteriora caulinis conformia, interiora longiora et angustiora, vaginata; pistillidia 6—8, ut in congeneribus; paraphyses numerosae, articulatae, filiformes, lutescentes. VAGINULA cylindrica, laevis, basi pistillidiis et paraphysibus circumdata, apice margine membranaceo lacero instructa, fusca. SETA innovationibus brevissimis lateralis evadit, 3 lin. longa, erecta, torta, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, oblongum, laeve, brunneum. PERISTOMIUM duplex: externum 16-dentatum: dentes erecti, conniventes, siccitate in spiram revoluti, lanceolati, obtusi, sulco medio longitudinali exarati, fusciscentes; internum membrana conica, albida, superne in lacinias lineares conniventes siccitate incurvas, irregulariter fissa. OPERCULUM deest. CALYPTRA campanulata, acuta, laevis, fusciscentes, basi appendicibus aequalibus tenerioribus conniventibus pallide ferrugineis adaucta.

Prope Sebastianopolin: Swainson; — in Serra d'Estrella ad corticem arborum, Januario: Beyrich; — et in vicinia urbis dictae Villa Rica ad radices arborum: M. 2.

7. SCHLOTHEIMIA SINUATA † surculo repente ramoso, ramis brevibus erectis subsimplicibus; foliis imbricatis patentibus, siccitate cauli appressis torquatis, lingulatis medio subsinuatis brevissime mucronulatis plicato-corrugatis integerrimis, nervo continuo, perichaetialibus oblongis laevibus; sporangio oblongo-cylindrico laevi, operculo conico-acuminato recto, calyptra sporangio longiori.

Schlotheimia rugifolia Schwaegr. Suppl. II. 2. 139. t. 150.

SURCULUS repens, biuncialis et longior, radiculis capillaceis fuscis obtectus et in caespites densos arctissime conjunctus, ramosus; rami erecti subsimplices, breves, 5—6 lin. longi, apice subinde innovationibus brevissimis fastigiatis, dense foliosi. FOLIA parva, imbricata, parum patentia, siccitate cauli appressa, torquata, lingulata, medio subsinuata, brevissime mucronulata, integerrima, supra in medio plicato-corrugata, inferiora fusca, superiora pallide viridia; nervo valido lurido-ferrugineo continuo; retis areolis subquadratis minutis seriatis. FOLIA PERICHAETIALIA majora, oblonga, non corrugata, ceterum caulinis similia; pistillidia numerosa, ut in congeneribus, paraphyses numerosissimae, breves, filiformes, articulatae, lutescentes. VAGINULA conica, laevis, basi pistillidiis paraphysibusque vetustis circumdata, apice membrana lacera lutescenti coronata, fusca. SETA 4—6 lin. longa, innovationibus lateralis evadit, erecta, siccitate parum torta, apicem versus incrassata, purpurascens. SPORANGIUM oblongo-cylindricum, apicem versus angustatum, laeve, brunneum, aetate fusco-badium. PERISTOMIUM externum: dentes 16 erecti, conniventes, siccitate spiraliter revoluti, lanceolati, obtusi, trabeculati, linea longitudinali exarati, lurido-purpurei; internum: membrana conica, albida in statu maturitatis ad basin usque in lacinias plurimas irregulariter fissa. OPERCULUM conicum, acuminatum, sporangii parti tertiae aequale, rectum, luteum. CALYPTRA campanulata, sporangio longior, laevis, ferruginea, basi appendicibus quatuor stramineis adaucta.

A Schlotheimia rugifolia Brid. differt: ramis brevibus subsimplicibus erectis, foliis latioribus et obtusioribus subsinuatis.

In Brasiliae insula S. Catharina: Chamisso. 2.

8. SCHLOTHEIMIA CHAMISSONIS † surculo repente ramoso, ramis erectis simplicibus crassis; foliis densissime imbricatis erectis, siccitate torquatis appressis lineari-lanceolatis obtusis canaliculatis integerrimis, nervo in mucronulum brevissimum excurrente; sporangio cylindrico angusto laevi, calyptra campanulata laevi.

Dense caespitosa. SURCULUS repens, biuncialis, dense ramosus, radiculosus, atrofuscus: rami erecti seu stricti, breves, 6—8 lin. longi, simplices, densissime foliosi, crassi. FOLIA imbricata, erecta, siccitate cauli appressa torquata, lineari-lan-

ceolata, obtusa, canaliculata, integerrima, margine parum involuta, subinde longitudinaliter plicata fusca: nervo crasso carinato ferrugineo in mucronulum brevissimum excurrente; retis areolis basi folii linearibus, supra medium rotundis obscuris. FLOS femineus terminalis, gemmiformis. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora caulinis similia, interiora oblongo-lanceolata, intima 5—6, minuta, ovato-acuminata, tenuissima, vaginata, basi hyalina, apicem versus pellucida, nervo crasso viridi infra apicem evanescente; pistillidia 10—12, germine brevi ovato fusco, stylo quadruplo longiori quam germe ferrugineo, stigmatate incrassato emarginato; paraphyses numerosissimae, pistillidiis breviores, filiformes, articulatae, lutescentes. VAGINULA cylindrica, glabra, margine membranaceo coronata, fusca. SETA terminalis, erecta, circiter 2 lin. longa, parum torta, laevis, inferne purpurascens, superne pallide-lutea. SPORANGIUM erectum, cylindricum, angustum, laeve, pallide brunneum, ore purpureo. PERISTOMIUM externum: dentes 16 erecti, conniventes, siccitate spiraliter revoluti, lanceolati, obtusi, sulco longitudinali obscuro medio exarati, lutescentes; internum membrana conica, hyalina, basi integra, ab apice ad medium irregulariter fissa. OPERCULUM deest. CALYPTRA campanulata, laevis, fusciscentes, basi appendiculata.

In Brasiliae insula S. Catharina: Chamisso. 2.

9. SCHLOTHEIMIA FUSCOVIRIDIS † surculo repente ramoso, ramis brevibus erectis subsimplicibus; foliis patentibus, siccitate appressis spiraliter torquatis, oblongis apiculatis integerrimis, nervo continuo, perichaetialibus longioribus lanceolatis apiculatis vaginatis longitudinaliter plicatis; sporangio juvenili cylindrico, calyptra sporangio longiori nitida, aurea.

SURCULUS repens, uncialis et longior, radiculosus, ramosus, rami erecti, breves, subsimplices, basi radiculosi, superne foliosi. FOLIA patentia siccitate cauli appressa, spiraliter, quasi in funem, torquata, oblonga, apiculata, canaliculata, integerrima, inferiora fusco-viridia, superiora obscure viridia; nervo carinato ferrugineo excurrente; retis areolis minutis subquadratis. FOLIA PERICHAETIALIA erecta, exteriora in parte superiori folii plicata, caulinis similia; interiora duplo longiora, lanceolata, apiculata, basi vaginata, in parte inferiori pluries longitudinaliter plicata; pistillidia numerosa; paraphyses numerosissimae, ut in congeneribus. VAGINULA conica, glabra, basi pistillidiis paucis et paraphysibus numerosissimis circumdata, apice membranaceo marginata, brunnea, sursum fusca. SETA erecta, innovationibus lateralis posita, 2—3 lin. longa, laevis, siccitate parum tortilis, purpurascens. SPORANGIUM juvenile cylindricum, laeve, viride. OPERCULUM conicum, acuminatum, luteum. CALYPTRA campanulata, sporangio longior, laevis, nitida, aurea, apice fusca, basi appendicibus tenerioribus adaucta.

In cortice arborum prope Villa Rica: M. 2.

10. SCHLOTHEIMIA MARTIANA † surculo repente ramossissimo, ramis erectis fastigiato-divisis; foliis imbricatis erecto-patentibus, siccitate spiraliter torquatis, oblongo-ovatis integerrimis, nervo in mucronulum parvum prominente, perichaetialibus lanceolato-acuminatis; sporangio cyacuato cylindrico laevi, calyptra longiori.

SURCULUS repens, uncialis ad biuncialis, subnudus, ramossissimus, fuscus: rami erecti vel assurgentes, inferne subsimplices, superne fastigiatim divisi, dense foliosi. FOLIA imbricata, erecto-patentia, siccitate spiraliter torquata cauli appressa, oblongo-ovata, basi concava, integerrima, fusco-brunnea; nervo crasso ferrugineo in mucronulum parvum excurrente; retis areolis basi laxioribus subquadratis, supra medium subrotundis seriatis minutissimis. FOLIA PERICHAETIALIA erecta, majora, quam caulinea, exteriora oblongo-lanceolata, acuta, concava intima longiora, lanceolato-acuminata, vaginata, longitudinaliter plicata

ceterum caulinis similia; pistillidia 6—10, germine oblongo-ovato parvo, stylo germine quadruplo longiori subhyalino, stigmate incrassato; paraphyses numerosissimae, pistillidiis longiores basi fasciculatim ramosae, rami longitudine subaequali, lutescentes. VAGINULA conica, laevis, basi pistillidiis paraphysibusque emarcidis circumdata, badia, apice membranaceo-marginata, brunnea. SETA innovationibus brevibus lateralis evadit, erecta, 4—5 lin. longa, laevis, siccitate tortilis, luteo-brunnea. SPORANGIUM evacuatum cylindricum, laeve, brunneum, ore fusco. PERISTOMIUM duplex: externi 16-dentati dentes erecti, conniventes, siccitate spiraliter revoluti, lanceolati, obtusi, sulco medio longitudinali exarati, fusciscentes; interius membrana conica albida dimidiam dentium exteriorum longitudinem metiens, basi integra, superne in lacinias lineares seu lanceolatas erectas, siccitate incurvas, irregulariter fissa. OPERCULUM deest. CALYPTRA campanulata, apiculata, sporangio longior, nitida, straminea, apicem versus pallide ferruginea, basi appendicibus quatuor aequalibus tenerioribus conniventibus adacta.

Prope Rio de Janeiro, Mandioca, in Serra dos Orgãos et prope Villa Rica, ad truncos arborum demortuorum sitarum: M.;—in Serra d'Estrella prope Corrego secco, Februario: Beyrich. 24

11. SCHLOTHEIMIA TORQUATA BRID. surculo repente, ramis erectis divisis; foliis erecto-patentibus, siccitate tortis, oblongis obtusis integerrimis, nervo in mucronulum excurrente, perichaetialibus oblongo-lanceolatis acutis; sporangio cylindrico laevi, operculo conico acuminato, calyptra conica acuta laevi.

Schlotheimia torquata Brid. *Bryol. univ. I. 323 et 743?*

Schlotheimia torta Schwaegr. *Suppl. I. 2. 39.*

Orthotrichum tortum Hook. et Grev. *l. c. 127.*

Orthotrichum laeve Pal. Beauv. *Prodr. 80. Schrad. neues Journ. III. 2. 325.*

Neckera torta Swartz. *Fl. Ind. occ. III. 1886.*

Hypnum torquatulum Hedw. *Spec. musc. 246. t. 63 (fig. mala.)*

In insula S. Catharinae: Chamisso;—prope Sebastianopolin in truncis arborum, Octobri: Beyrich;—in districtu adamantium et in regione Amazonica: M. 24

12. SCHLOTHEIMIA LAXA † surculo repente vel assurgente ramoso, ramis erectis fasciculato-divisis; foliis laxis patentibus, siccitate crispatis, e basi oblonga canaliculata lineari-lanceolatis apiculatis integerrimis, nervo continuo, perichaetialibus lanceolatis acuminatis, seta brevi; sporangio cylindrico angusto laevi, calyptra conica sporangio longiore 8-appendiculata.

SURCULUS repens seu assurgens, uncialis ad biuncialis, laevis, inferne radiculosus, ramosus, fuscus: rami assurgentes vel erecti, fasciculatim divisi, laxi, basi nudi, superne foliosi. FOLIA laxa, patentia, siccitate crispata, e basi oblonga lineari-lanceolata vel lanceolata, apiculata, basi canaliculata, integerrima, plerumque longitudinaliter plicata, rufa: nervo crasso ferrugineo continuo; retis areolis in basi latioribus subquadratis antice rotundis minutissimis obscurioribus. Flos femineus terminalis: FOLIA PERICHAETIALIA exteriora caulinis simillima, interiora erecta, lanceolata, acuminata, ceterum caulinis similia; pistillidia 8—10, germine brevi globoso fusco, stylo germine sextuplo longiori, stigmate incrassato submarginato; paraphyses numerosae, pistillidiis paullo longiores, lutescentes. VAGINULA conica, laevis, fusca. SETA innovationibus brevibus lateralis, brevis, circiter 2 lin. longa, erecta, laevis, siccitate parum tortuosa, purpurea. SPORANGIUM erectum, dimidiam setam aequans longitudine, cylindricum, angustum, laeve, badium. PERISTOMIUM duplex: externum dentibus 16 erectis, conniventibus, siccitate in spiram revolutis, lanceolatis obtusis, sulco medio longitudinali exaratis, fusciscentibus; internum membrana conica, lutescens,

basi integra, superne in lacinias lineares humiditate erectas, siccitate incurvas, irregulariter fissa. OPERCULUM conicum, acuminatum, sporangio quadruplo brevius, pallide ferrugineum. CALYPTRA conica, sporangio longior, acuta, apiculata, fusciscentes, basi appendicibus 8 tenerioribus conniventibus pallide ferrugineis adacta.

Ad Villam ricam in Minis generalibus, Aprili: M. 24

13. SCHLOTHEIMIA LONGIFOLIA † surculo repente nudo ramoso, ramis ascendentibus ramulosis, ramulis apice recurvis interdum radicantibus; foliis patentibus, siccitate crispatis, e basi latiore lineari-lanceolatis apiculatis, nervo in brevem cuspidem prominente, perichaetialibus lineari-lanceolatis acutis vaginatis; sporangio cylindrico laevi, calyptra sporangio longiore nitida.

Schlotheimia Ottonis Schwaegr. *Suppl. II. 3. 54. t. 168?*

SURCULUS repens, 1—2 poll. longus, nudus, ramosus: rami ascendentes, iterum fasciculato-ramulosi, basi nudi, superne foliosi, ramulis erectis seu recurvatis interdum apice radiculosus. FOLIA patentia, siccitate crispata, lineari-lanceolata, apiculata, canaliculata, integerrima, inferiora fusciscentia, superiora luteo-viridia: nervo valido, ferrugineo, in brevem cuspidem excurrente; retis areolis minutissimis obscuris. Flos femineus terminalis: FOLIA PERICHAETIALIA erecta, exteriora majora quam caulina, interiora e basi latiore lineari-lanceolata, acuta, vaginata, ceterum caulinis similia; pistillidia numerosa, paraphyses numerosissimae, ut in congeneribus. VAGINULA cylindrica, basi pistillidiis paraphysibusque vetustis circumdata, laevis, apice membranaceo-marginata, brunnea, apice fusca. SETA erecta, 4—5 lin. longa, parum flexuosa, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, cylindricum, angustum, laeve, badium. PERISTOMIUM destructum. OPERCULUM deest. CALYPTRA conica, longa, acuta, laevis, nitida, appendiculata, aurea.

Schlotheimiae Ottonis Schwaegr. l. c. affinis: sed foliis siccitate crispatis lineari-lanceolatis, nec cauli appressis ovatis, foliis perichaetialibus e basi latiore lineari-lanceolatis acuminatis, nec lanceolato-acuminatis, sporangio laevi, nec basi costato differt.

In regione montevidensi ad truncos arborum: Sellow. 24

§. 4. Calyptra ignota.

14. SCHLOTHEIMIA SPRENGELII † surculo repente ramoso, ramis erectis fasciculato-divisis; foliis erecto-patentibus, siccitate torquatis appressis, oblongis apiculatis integerrimis corrugatis, nervo continuo, perichaetialibus oblongo-lanceolatis longissimo acuminatis; sporangio oblongo-cylindrico laevi, opercule sporangio parum breviori.

Schlotheimia torquata Sprengel. *in litt.*

SURCULUS repens, uncialis ad sesquiuncialis, propagines emittens: rami erecti, unciales, fasciculato-vel dichotomo-divisi, foliosi. FOLIA densa, erecto-patentia, siccitate torquata cauli appressa, oblonga, apiculata, carinata, apicem versus corrugata, integerrima, subinde longitudinaliter plicata, inferiora fusciscentia, superiora luteo-viridia: nervo crasso ferrugineo continuo; retis areolis parallelogrammis. Flos femineus terminalis: FOLIA PERICHAETIALIA erecta, majora quam caulina, oblongo-lanceolata, longissime acuminata, vaginata, laevia, integerrima, apicem versus margine involuto, luteo-brunnea; pistillidia ut in congeneribus; paraphyses numerosae, pistillidiis breviores, filiformes, articulatae, lutescentes. VAGINULA cylindrico-conica, glabra, ceteris ut in congeneribus. SETA erecta, innovationibus brevibus lateralis, circiter tres lineas longa, laevis, parum torta, purpurascens. SPORANGIUM erectum, oblongo-cylindricum, laeve, viridibrunneum, ore purpureo. PERISTOMIUM duplex: externum 16-dentatum, dentes sporangio triplo breviores, erecti, conniventes,

siccitate spirally revoluti, lanceolati, obtusi, sulco medio longitudinali exarati, purpurascens; internum membrana conica lutescens, basi integra ab apice ad medium in laciniis lineari-lanceolatas, perforatas, conniventes, regulariter fissa. OPERCULUM conicum, acuminatum, rectum, parum sporangio brevior, luteum. CALYPTRA deest.

E Brasilia altatam communicavit b. Sprengel. 2

15. SCHLOTHEIMIA RECURVIFOLIA † surculo repente ramoso, ramis ascendentibus basi nudis; foliis imbricatis recurvato-patentibus, siccitate tortilibus, oblongis apiculatis concavis, nervo continuo, perichaetialibus lineari-ligulatis apiculatis apicem versus undulatis corrugatis; sporangio oblongo cylindrico laevi.

SURCULUS repens, ramosus, inferne radiculosus; ramis fasciculatis divisis, basi nudis superne foliosis. FOLIA imbricata recurvato-patentia, siccitate spirally, quasi in funem laxum, contorta, oblonga, apiculata, concava, integerrima, inferiora fuscescentia, superiora flavo-viridia; nervo valido ferrugineo continuo; retis areolis subquadratis seriatis. FLOS femineus terminalis: FOLIA PERICHAETIALIA duplo longiora, quam caulina, erecta, lineari-ligulata, apiculata, infra apicem undulata, corrugata; pistillidia et paraphyses ut in congeneribus. VAGINULA conica, laevis, brunnea, basi pistillidiis paraphysibusque numerosis demortuis circumdata, apice membranaceo-marginata, fusca. SETA erecta, circiter 2—3 lin. longa, laevis, siccitate parum tortilis, pallide lutea. SPORANGIUM erectum, oblongo-cylindricum, laeve, badium. PERISTOMIUM duplex: externi sedecimdentati dentes erecti, conniventes, siccitate spirally revoluti, lanceolati, linea longitudinali divisi, purpurei; internum membrana conica, albida, brevior, ad basin usque in 16 laciniis lanceolato-subulatas regulariter fissa. OPERCULUM et CALYPTRA deest.

Per Brasiliam variis locis, in montibus Araracoara et Cupati, prov. Rio Negro, prope Vilam Ricam, nec non prope Lages et Sincora et Rio de Contas prov. Bahiensis M. 2

16. SCHLOTHEIMIA OTTONIS SCHWAEGR. surculo repente ramoso, ramis ascendentibus sparsis ramulosis, siccitate teretibus; foliis patentibus recurvis, siccitate imbricatis appressis, ovatis obtusis concavis margine parum involuto, nervo in cuspidem brevem excurrente, perichaetialibus duplo longioribus e lanceolato cuspidatis plicatis intimis longissimis; sporangio basi costato.

Schlotheimia Ottonis Schwaegr. Suppl. II. 3. 54. t. 168. Brid. Bryol. univ. I. 601.

Hanc speciem non vidimus.

In campis montevidensibus: Sellow. 2

3. SPECIES OBSCURIOR.

17. SCHLOTHEIMIA GRACILIS † surculo repente ramoso, ramis ascendentibus sparsis ramosis; foliis remotis patentibus recurvis, siccitate tortilibus, oblongis acutis canaliculatis integerrimis.

SURCULUS repens, gracilis, nudus, ramosus; rami ascendentes, graciles, sparse ramulosi, foliosi. FOLIA remota, patentibus recurva, siccitate torta, oblonga, acuta, canaliculata, integerrima, fuscescentia; nervo valido ferrugineo excurrente; retis areolis subquadratis minutis obscuris. FRUCTUS desunt.

In Brasilia, loco natali non indicato: M. 2

XIX. ORTHODONTIUM SCHWAEGR.

SPORANGIUM terminale, basi aequale, annulatum. PERISTOMIUM duplex erectum, dentibus sedecim, interioribus basi connatis, erectis. FLORES masculi terminales.

Schwaegr. Suppl. II. 123. Endl. Gen. n. 513.

ORTHODONTIUM JULACEUM SCHWAEGR. surculo ramoso fastigiato; foliis imbricatis oblongis obtusis; sporangio oblongo basi attenuato, operculo convexo mammillato.

Schwaegr. Suppl. II. 2. 123. t. 188.

Muscus, qui habitu ad *Splachnum* accedit, nobis non visus.

In Brasilia lectus, loco natali non indicato: Hooker. 2

XX. BRACHYMENIUM HOOK.

SPORANGIUM terminale, aequale, exannulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus sedecim lanceolato-linearibus; interius membrana brevis plicata, plicis dentibus respondentibus, apice dilacerato in processus (sedecim?) irregulares producta. CALYPTRA cuculliformis. FLOS monoecus, terminalis.

Schwaegr. Suppl. II. 1. 131. t. 135. Brid. Bryol. univ. I. 601.

1. BRACHYMENIUM PULCHELLUM † surculo erecto basi radiculoso-tomentoso apice fasciculato-ramoso; foliis erecto-patentibus siccitate appressis subtortis, lato-ovatis, repente in acumen angustatis concavis integerrimis, nervo supra medium dissoluto; sporangio erecto crasso ovato, ore angusto.

SURCULI erecti, 4—5 lin. longi, basi radiculoso-tomentosi et tomento inter se arcte conjuncti, inferne nudi, apice fasciculato-ramosi, dense imbricato-foliosi; rami patentes, breves, 1—1½ lin. longi. FOLIA erecto-patentia, siccitate appressa, inferiora remota, oblongo-lanceolata, acuminata, canaliculata, apicem surculi versus magis magisque conferta et latiora, superiora, ut folia ramorum imbricata, lato-ovata, acuminata, concava, integerrima, pellucida, pallide viridia, nervo crasso rufescente supra folii medium dissoluto; retis areolis laxissimis subquadratis. FLORES monoeci: masculos non vidimus; feminei terminales, disciformes. FOLIA PERICHAETIALIA erecta, imbricata, exteriora majora, oblonga, acuminata, concava, integerrima, margine involuto: nervo crasso ferrugineo infra apicem evanescente instructa; interiora duplo minora, angustiora, lanceolata, acuminata, plana, amoene viridia: nervo viridi in apice dissoluto; retis areolis parallelogrammatis, triplo majoribus, quam in foliis perichaetialibus exterioribus et caulinis; pistillidia numerosa: germine oblongo purpureo, stylo pellucida, stigmatibus incrassato hyalino; paraphyses filiformes, articulae, lutescentes. VAGINULA conica, pistillidiis et paraphysibus emarcidis obsita, fusco-ferruginea. SETA terminalis, 6—8 lin. longa, erecta, siccitate torta, laevis, apice incrassata, purpurascens. SPORANGIUM erectum, crassum, ovatum, laeve, brunneum, ore angusto. PERISTOMIUM duplex: exterius dentes 16, humiditate erecto-patuli, siccitate conniventes, lanceolato-lineares, solidi, articulati, subnodosi, inferne ferruginei, superne albi: interius membrana albida dentibus exterioribus dimidio brevior, plicata, apice dilacerata, in processu 16 irregulares producta. OPERCULUM et CALYPTRA deest.

In Minis generatibus ad cortices arborum: M. 2

2. BRACHYMENIUM HORNSCHUCHIANUM † surculo erecto inferne radiculoso superne folioso apice fasciculato-ramoso; foliis laxis subspirally tortis lanceolatis repente in acumen pili-forme excurrentibus undulatis marginatis canaliculatis denticulatis, nervo infra apicem dissoluto; sporangio erecto crasso pyriformi, ore constricto.

Brachymenium Hornschuchianum Mart. Icon. crypt. bras. 36. t. 20. f. 4.

Caespites minus densi, sed latiores, quam in antecedenti. RADICES surculos supra medium obtegunt, capillares, inter se tomentum formant et illos in inferiore parte in caespites laxos

conjungunt, fusco-brunnei. SURCULUS erectus seu adsurgens, semiuncialis ad uncialis, inferne radiculosus, superne foliosus, infra apicem fasciculatim ramosus; rami breves, 3—4 lin. longi, curvati seu parum flexuosi, dense foliosi. FOLIA laxa, humiditate et siccitate subspiraliter torta, inferiora minora, versus apicem sureculi sensim sensimque majora, lanceolata, acuminata, undulata, marginata, canaliculata, denticulata, subpellucida, obscure viridia: nervo valido rufescente infra apicem dissoluto; retis areolis subquadratis laxis. FLORES non vidimus. FOLIA PERICHAETALIA erecta, imbricata, exteriora lato-lanceolata, sensim sensimque acuminata, canaliculata, integerrima, intima (seu suprema) minora et angustiora, ceterum exterioribus similia: omnia nervo apicem pertingente; retis areolis parallelogrammis laxissimis. VAGINULA conica, glabra, pistillidiis et paraphysibus demortuis circumdata, fusca. SETA terminalis, 6—9 lin. longa, erecta, siccitate torta, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, crassum, pyriforme, laeve, brunneum, ore constricto. PERISTOMIUM, OPERCULUM et CALYPTRA in Martii icone laudata depicta.

In praeruptis viarum, nec non in radice arborum annosarum in prov. Minarum passim. Fructificat primis anni mensibus: M. 4.

XXI. PEROMNION SCHWAEGR.

SPORANGIUM aequale, laeve. PERISTOMIUM duplex: externum dentibus sedecim erectis conniventibus lanceolatis trabeculatis; internum membrana lutescens ciliis sedecim cum dentibus exterioribus alternantibus simplicibus subulatis regularibus. FLORES dioeci, terminales, disciformes.

Schwaegr. Suppl. III. 1. 2.

1. PEROMNION RADICULOSUM SCHWAEGR. surculo erecto subsimplici inferne nudo; foliis in comam rosulaeformem congestis, siccitate flexuosis, oblongo-lanceolatis longissime acuminatis undulatis marginatis apicem versus remote serratis, nervo excurrente, seta longa erecta; sporangio erecto cylindrico, operculo conico.

Schwaegr. Suppl. III. 1. 2. t. 250. Ejusd. Spec. musc. 36. *Pohlia flexifolia* nob. mscpt.

Habitus *Mni*. SURCULUS erectus, semiuncialis ad uncialis, subsimplex, infra apicem innovans aut divisus, basi radiculosus, radiculis longis capillaribus fuscis, deinde nudus, rufus, apice ut innovationes seu ramuli foliosus. FOLIA in apice sureculi in comam brevem rosulaeformem congesta, erecto-patentia, siccitate flexuosa, oblongo-lanceolata, longissime acuminata, inferiora duplo minora, acuta, dissita, omnia undulata, canaliculata, marginata, apicem versus remote serrata, amoene viridia: nervo carinato rufescente, in foliis inferioribus ad apicem in superioribus in cuspidem longissimam excurrente; retis areolis hexagonis laxis. FLORES dioeci, discoidei. FOLIA PERIGONIALIA erecta, ovato-acuminata, subintegerrima, concava, subhyalina: nervo supra medium dissoluto; retis areolis laxioribus; antheridia circiter duodecim, oblonga, truncata, turgida, reticulata, filamenta brevi suffulta, rufescentia; paraphyses numerosae, antheridiis tertia parte longiores, filiformes, apicem versus attenuatae, articulatae. FOLIA PERICHAETALIA interiora angustiora, versus apicem interdum dentata, flexuosa, ceteris caulinis similia; intima 2—3, erecta, duplo minora, lanceolata, integerrima, pellucida, retis areolis laxissimis parallelogrammis, ceterum exterioribus similia. Pistillidia 12, germine oblongo viridi, stylo filiformi germine longitudine aequali, fusco, stigmatate dilatato atro-fusco; paraphyses copiosae, filiformes, pistillidiis quarta parte longiores, articulatae, saepe basi per paria connatae, hyalinae. VAGINULA conica, paraphysibus numerosis demortuis obsita, fusca. SETA terminalis, 9—15 lin. longa, erecta, siccitate parum tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM rectum, interdum cernuum, cylindricum, in solo humido brevius et

oblongo-cylindricum, laeve, brunneum. PERISTOMIUM duplex: externum 16-dentatum; dentes erecti, conniventes, lanceolati, trabeculati, rufescentes; internum membrana vix carinata lutescens ciliis 16 cum dentibus exterioribus alternantibus, absque intermediis minoribus, simplicibus, subulatis, regularibus. ANNULUS latus, triseriatus, cellulis oblongis. OPERCULUM conicum, pallide luteum. CALYPTRA cucullata, sporangii dimidii longitudine, pallide straminea.

Etsi peristomium *Peromnii* peristomio *Pohliae* conveniat, mihi tamen persuasum est, ex hoc musco distinctum genus constituendum esse, cum et floribus disciformibus dioecis et foliorum structura, nec non habitu a *Pohlia* discedat et magis *Mni* generi appropinquetur.

In Serra d'Estrella, Junio, et prope Novo-Friburgum, Januarii, ad radices arborum sivaticarum: Beyrich. 2.

XXII. POHLIA HEDW.

SPORANGIUM terminale, apophysatum, aequale, pyriforme aut clavatum, annulatum. PERISTOMIUM duplex, utrumque sedecimdentatum; internum membrana ad mediam partem fissa in dentes bicures, cum externis alternantes. CALYPTRA cuculliformis. FLORES terminales, capituli- aut comaeformes, androgyni aut sexu distincti.

Brid. Bryol. univ. II. 607. Endl. Gen. n. 547.

1. POHLIA MICROCARPA † surculo brevi infra apicem innovante; foliis in comam fastigiatam congestis imbricatis ovato-lanceolatis breviter acuminatis canaliculatis integerrimis, rameis ovatis obtusis concavis, nervo excurrente; sporangio pendulo pyriformi, operculo conico apiculato.

SURCULUS gracilis, erectus, 2—3 lin. longus, infra apicem innovans, innovatione longitudine aequali. FOLIA inferiora dissita, erecto-patentia, ovata, acuta, superiora in comam fastigiatam conferta, imbricata, lato-lanceolata, acuminata, canaliculata, integerrima, pallide viridia: nervo excurrente; retis areolis parallelogrammis; folia ramea imbricata, appressa, lato-ovata, obtusa, concava, ceterum caulinis similia; nervo crasso viridi in apiculum brevissimum excurrente; retis areolis parallelogrammis laxis. VAGINULA ovata, pistillidiis et paraphysibus emarcidis obsita, fusca. SETA 6—8 lin. longa, erecta, parum flexuosa et curvata, laevis, purpurascens. SPORANGIUM parvum, pendulum, pyriforme, laeve, fuscum. PERISTOMIUM congenerum. OPERCULUM conicum, brevi apiculatum.

Prope Sebastianopolin ad terram nudam, Augusto: Merkel. 2.

XXIII. ACIDODONTIUM SCHWAEGR.

SPORANGIUM terminale, apophysi lineari, annulatum. PERISTOMIUM duplex; utrumque dentibus sedecim, utrisque e membrana basilari communi lanceolatis, cuspidate lineari terminatis, externis retortis. FLORES dioeci, terminales.

Schwaegr. Suppl. II. 2. 152. *Bryum* Kunth.; *Megalangium* et *Macrothecium* Brid. Bryol. univ. II. 28. I. XLIV. Endl. Gen. n. 546.

ACIDODONTIUM KUNTHII SCHWAEGR. surculo erecto simplici infra apicem innovante; foliis oblongo-lingulatis piliferis serrulatis, nervo infra apicem evanescente; sporangio horizontali aut erecto lageniformi, operculo minuto convexo-conico.

Schwaegr. Suppl. II. 2. 152. t. 196. Ejusd. Spec. musc. 84.

Megalangium Kunthii Brid. Bryol. II. 28., et in icone sub *Macrothecio*.

Bryum megalocarpon Kunth. Synops. pl. uequin. 59.

In campis montevidensibus: Setlow. 2.

XXIV. FUNARIA HEDW.

SPORANGIUM terminale, inaequale, pyriforme, plerumque annulatum. PERISTOMIUM duplex; exterius: dentes 16 incurvi, obliqui, lanceolato-subulati, trabeculati, apice cohaerentes; interius: cilia totidem membranacea, lanceolato-acuminata, transversim striata, basi connata, dentibus exterioribus breviora. CALYPTRA cuculliformis, ventricosa, inferne subtetragona. FLORES monoeci, dioecive: masculus disciformis femineusque terminales.

Brid. Bryol. univ. II. 49. Endl. Gen. n. 556.

1. FUNARIA HYGROMETRICA HEDW. surculo brevissimo subsimplici; foliis conniventibus ovatis breve acuminatis valde concavis integerrimis solidinervis; sporangio cernuo pyriformi profunde sulcato, operculo planiusculo.

Funaria hygrometrica Brid. *Spec. musc. III. 65. Ejusd. Bryol. univ. II. 51. Schwaegr. Suppl. I. 2. 75. Hedw. Spec. musc. 172.*

Koelreuteria hygrometrica Hedw. *Fund. musc. I. t. 5. f. 21—26. II. 95. t. 3. f. 11., t. 5. f. 25, 26., t. 6. f. 27., t. 10. f. 58—61.*

Mnium hygrometricum Linn. *Sp. pl. 1575.*

Bryum bulbiforme, aureum etc. Dill. *Hist. musc. 407. t. 52. f. 75.*

Ad muros aquaeductus prope Rio de Janeiro, Septembri, in Serra dos Orgãos, in ruderalis prope Soumidouro, Februario, et in Serra do Registro inter muscos ad truncos arborum, Decembri: Merhel et Beyrich. 24

2. FUNARIA CALVESCENS SCHWAEGR. surculo erecto brevi gracili simplici; foliis dissitis flexuosis, siccitate crispatis, oblongo-lanceolatis canaliculatis integerrimis subundulatis evanidinervis; sporangio nutante oblongo-pyriformi inaequali sulcato, operculo convexo-mammillato.

Funaria calvescens Schwaegr. *Suppl. I. 2. 77. t. 65. Brid. Spec. musc. III. 66. Ejusd. Bryol. univ. II. 53 et 739. Walk. Arn. Disp. meth. 42. Kunth. Synops. pl. aequinoct. I. 56.*

Funaria hygrometrica var. β. Schwaegr. *Spec. musc. 45.*

In Minis generatibus: M. ☉

3. FUNARIA FONTANESII SCHWAEGR. surculo erecto subsimplici; foliis stellatis oblongis acutis serratis ruptinervis; sporangio cernuo elongato-pyriformi subinaequali laeviusculo, operculo convexo mucronulato.

Schwaegr. Suppl. I. II. 79. t. 66. Ejusd. Spec. musc. I. 46. Brid. Bryol. univ. II. 56 et 739.

In Brasilia, loco non indicato. 24

XXV. BARTRAMIA HEDW.

SPORANGIUM terminale, inaequale aut subinaequale, orificio obliquo coarctato, exannulato. PERISTOMIUM duplex: exterius dentes 16 cuneiformes aut acuti, inflexi; interius membrana plicato-carinata in processus 16 integros bifidosve segmentis divaricatis, interdum ciliis interjectis, producta. CALYPTRA cuculliformis. FLORES hermaphroditii, monoecive terminales.

Brid. Bryol. univ. II. 32. Endl. Gen. n. 550.

1. BARTRAMIA LONGIFOLIA Hook. surculo elongato-ramoso flexuoso; foliis longissimis patentibus flexuosis siccitate crispatis lanceolato-subulatis serrulatis nervosis, seta erecta flexuosa; sporangio subgloboso sulcato, operculo conico-obtusio.

Hook. Musc. exot. t. 68. Brid. Bryol. univ. II. 39.

SURCULUS erectus, triuncialis et longior, flexuosus, inferne nudus, superne foliosus, atropurpureus, elongato-ramosus; rami simplices, dense foliosi. FOLIA longissima, conferta, patentia, flexuosa, siccitate crispata, basi vaginata, lanceolato-subulata, serrulata, amoene viridia: nervo obscuro concolore excurrente; retis areolis in medio folii minutissimis rotundis seriatis, versus margines linearibus angustissimis. SETA terminalis, in statu maturo autem innovationibus brevibus interdum lateralis, erecta, 6—8 lin. longa, flexuosa, purpurea. SPORANGIUM cernuum, subglobosum, inaequale, sulcatum, brunneum, ore coarctato. OPERCULUM conicum obtusum, sporangio concolor. CALYPTRA ignota.

In Serra d'Estrella in statu sterili, Septembri: M. 24

2. BARTRAMIA GLAUDESCENS † surculo brevi apice fasciculatim ramoso, ramis brevibus laxis; foliis laxis erectis lineari-lanceolatis planiusculis serrulatis, nervo apicem attingente; sporangio parvo globoso sulcato reticulato, operculo hemisphaerico mammillato.

SURCULI erecti, brevissimi, 1—2 lin. longi, radiculosotomentosi, in caespites humiles arcte conjuncti, apice fasciculatim ramosi. FOLIA laxa, erecta, lineari-lanceolata, planiuscula, serrulata, glaucescentia; nervo crasso rufescente ad apicem excurrente, retis areolis linearibus laxis. FLOS femineus gemmiformis, terminalis: FOLIA PERICHAETIALIA exteriora e basi latiore concava et hyalina, lanceolato-subulata, margine involuta, serrulata: nervo excurrente; interiora 2—3, tenerrima, lato-lanceolata, integerrima, hyalina: nervo in cuspidem subulatam folium longitudine aequantem excurrente; retis areolis obscurioribus. Pistillidia pauca: germine ovato parvo, stylo triplo longiori, stigmatate incrassato; paraphyses filiformes, hyalinae, pistillidiis paullo longiores et numero subaequali. VAGINULA oblonga, pistillidiis paraphysibusque emarcidis obsita, fusca. SETA terminalis, erecta, 6—9 lin. longa, parum flexuosa, laevis, apice incrassata, purpurea. SPORANGIUM parvum, cernuum, globosum, sulcatum, reticulatum, fuscum, ore obliquo coarctato purpureo. PERISTOMIUM duplex: externum dentes incurvi, lanceolati, solidi, trabeculati, rufo-ferruginei; internum membrana brevior sedecies fissa, laciniis lato-lanceolatis, bifidis, transversim striatis, flava. OPERCULUM hemisphaericum, mammillatum, sporangio concolor.

B. radicata Schwaegr. proxime affinis, sed statura humilior et foliis lineari-lanceolatis glaucescentibus, nec lanceolato-cuspidatis differt.

In truncis vetustis silvarum prope Sebastianopolin, Octobri: Beyrich. 24

3. BARTRAMIA FILIFORMIS † surculo erecto gracillimo inferne radiculoso-tomentoso apice fastigiatis ramoso, ramis brevibus; foliis minutis erecto-patentibus lato-ovatis seu subcordatis acutis aut subacuminatis concavis rigidis subserrulatis solidinervis, rameis minutissimis strictis appressis ovato-lanceolatis, evanidinervis; seta erecta; sporangio cernuo subgloboso obliquo sulcato reticulato, ore obliquo coarctato, operculo hemisphaerico mammillato.

Tomentum RIDICULAREM, inde a surculi basi ad apicem ascendens, fuscum. SURCULI erecti in densum humilemque caespitem congesti, gracillimi, unciales et longiores, inferne simplices, radiculoso-tomentosi, apice ramos multos bilineares ad semi-unciales; simplices, erectos, filiformes ex uno fasciculo exserunt. FOLIA parva, erecto-potentia, lato-ovata seu subcordata, acuta aut acuminata, concava, subserrulata, rigida, pellucida, amoene viridia: nervo crasso rufescente ad apicem excurrente; retis areolis subquadratis, laxis; folia ramea minutissima, appressa, stricta,

ovato-lanceolata; nervo infra apicem evanescente, ceterum caulinis similia. FLORES dioeci. SURCULUS masculus ramosus; folia remota, erecto-patentia, ovato-lanceolata, ceterum rameis similia; flores terminales, interdum innovationibus laterales, gemmiformes: FOLIA PERIGONIALIA imbricata, erecta, exteriora foliis caulinis femineis similia; interiora ovata, brevius obtuse acuminata, concava, integerrima, rufescentia: nervo infra apicem dissoluto; retis areolis linearibus laxioribus. Antheridia 6—8, oblonga, parum curvata, reticulata, subhyalina; paraphyses paucae, filiformes, 6-articulatae, antheridiis paulo longiores, hyalinae. Flores feminei terminales, gemmiformes: FOLIA PERICHAETALIA imbricata, erecta, tenera, e basi lato-ovata, concava, longissime acuminata, integerrima, pellucida, pallide viridia: nervo plerumque ad apicem excurrente; retis areolis sublinearibus laxis. Pistillidia pauca: germine oblongo crasso purpureo, stylo paulo longiore subulato purpurascens, stigmate dilatato submarginato hyalino; paraphyses paucae, filiformes, graciliores, quam in flore masculo, lutescentes. VAGINULA oblonga, paraphysibus nonnullis emarcidibus obsita, fusca. SETA terminalis, semiuncialis et longior, erecta, parum flexuosa, apice incrassata, nitida, purpurascens. SPORANGIUM cernuum, subglobosum, obliquum, sulcatum, reticulatum, brunneum, ore coarctato obliquo, purpureo. PERISTOMIUM duplex: exterius dentes 16, incurvi, lato-lanceolati, subulati, trabeculati, rufescentes; interius membrana reticulata, plicato-carinata, flava, apice in processum 16 connatis lato-lanceolatis bifidos transversim striatos producta. OPERCULUM hemisphaericum, mammillatum. SPORAE minutae, subglobosae. CALYPTRA non visa.

Difert a congeneribus omnibus caule gracillimo ramisque filiformibus; a *B. Muehlenbergii*, cui proxime affinis est, caule longiore gracillioreque, ramis brevioribus filiformibus, foliis lato-ovatis seu subcordatis, iis ramulorum erectis et appressis, seta breviori et sporangio minore.

In *Minis generalibus solo humido, Aprili: M. 24*

4. BARTRAMIA UNCINATA BRID. surculo erecto seu asurgente inferne radiculoso-tomentoso apice fasciculato-ramoso, ramis uncinatis; foliis subfalcatis lanceolato-cuspidatis canaliculatis serrulatis, nervo excurrente; sporangio cernuo subgloboso obliquo sulcato reticulato, operculo plano mammillato.

Schwaegr. Suppl. I. 2. 60. t. 67., in tabula sub nomine B. scabrisetae. Ejusd. Spec. musc. I. 93. Brid. Spec. musc. III. 91. Ejusd. Meth. 116.

Philonotis uncinata Brid. Bryol. univ. II. 22.

Difert a *B. fontana*, quae proxime affinis: statura duplo minore, ramis uncinatis et foliis lanceolatis cuspidatis.

In *Serra d'Estrella, supra saxa rivorum, Augusto: Beyrich; — similibus locis in prov. Minarum: M. 24*

5. BARTRAMIA RUFIFLORA † surculo erecto radiculoso apice fasciculatim ramoso, ramis brevibus; foliis parvis heteromallis subfalcatis lanceolatis subserrulatis, nervo excurrente; seta erecta semiuncialis; sporangio cernuo subgloboso laevi, operculo hemisphaerico mammillato.

SURCULUS erectus, semiuncialis, gracilis, simplex, radiculosus, radiculis capillaribus, superne fasciculatim ramosus; ramis brevissimis 1—3 lin. longis patentibus subuncinatis dense foliosis. FOLIA parva, rigida, heteromalla, subfalcata, lato-lanceolata, canaliculata, serrulata, luteo-viridia: nervo crasso obscure excurrente; retis areolis subquadratis laxis. Surculus masculus minor et gracilior, quam femineus; folia magis remota et directione magis aequali, quam in femineo, latiora tamen et obtusiora, nervo interdum infra apicem dissoluto; retis areolis laxioribus. FLORES masculi rufi: FOLIA PERIGONIALIA circiter 8, imbricata, erecta, caulinis majora, e basi latissima concava rufescente, repente in acumen folii longitudine pallide viride angustata, integerrima: nervo celluloso concolore in acumine evanescente; retis areolis in basi latissima linearibus aut parallelogrammis

laxissimis, in acumine linearibus angustis. Antheridia numerosa, magna, oblonga, parum curvata, truncata, reticulata, pallide rufescentia aut hyalina, filamento brevi; paraphyses numerosissimae, clavatae, 10-articulatae, inferne hyalinae, superne rufescentes, illis paulo longiores. FOLIA PERICHAETALIA imbricata, exteriora e basi ovato-lanceolata longissime acuminata, concava, subintegerrima, interiora minora, lanceolata, acuminata, subvaginata, dilute viridia: nervo rufo excurrente; retis areolis laxioribus, quam in caulinis; pistillidia congenerum et paraphyses filiformes, graciliores, quam in masculis. VAGINULA ovata, glabra, fusca. SETA terminalis, innovationibus autem interdum lateralis, uncialis, erecta, parum flexuosa, nitida, inferne purpurascens, superne pallidior. SPORANGIUM cernuum, globosum, reticulatum, laeve, viridi-brunneum, ore coarctato plicato purpureo. PERISTOMIUM congenerum. OPERCULUM hemisphaericum, mammillatum. CALYPTRA cucullata, straminea, rufescens.

B. uncinatae proxime affinis, sed difert: statura minori et graciliori, foliis brevioribus latioribus et obtusioribus, floribus masculis rufis, foliis perigonalibus e basi latissima, concava rufescente repente in acumen ejusdem longitudinis angustatis, sporangio laevi.

In *Serra d'Estrella supra saxa rivorum et in solo glareoso, Augusto: Beyrich. 24*

6. BARTRAMIA SPHAEROCARPA SCHWAEGR. surculo erecto, apice fasciculatim ramoso, basi tomentoso; foliis imbricatis subsecundis lanceolato-acuminatis serrulatis, dorso scabris; sporangio oblique sphaerico, operculo convexo mucronulato.

Bartramia sphaerocarpa Schwaegr. Suppl. I. 2. 59. Spec. musc. I. 95.

Philonotis sphaerocarpa Brid. Bryol. univ. II. 25.

Mnium sphaericarpon Hedw. Stirp. crypt. III. 93. t. 38.

Prope Sebastianopolin: Staunton. 24

XXVI. WEBERA HEDW.

SPORANGIUM terminale, aequale, cylindricum aut clavatum, rarius pyriforme, laeve, annulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus 16 lanceolatis acutis liberis; interius membrana carinato-sulcata, basi integra, apice in processum totidem lanceolatos, perforatos, ciliis capillaribus interjectis, producta. CALYPTRA cuculliformis. FLORES monoeci: masculi gemmiformes, inferiores; feminei terminales.

Bryi Spec. Brid. Bryol. I. 624. Endl. Gen. n. 542. a.

1. WEBERA PULCHELLA † surculo brevi fastigiato-ramoso, foliis imbricatis erecto-patentibus oblongo-ovatis acuminatis carinatis integerrimis, nervo crasso carinato excurrente; sporangio pendulo cylindrico, operculo conico apiculato.

SURCULI breves, 2—3 lin., basi fastigiato-ramosi, radiculosi, dense caespitosi. FOLIA imbricata, erecto-patentia, oblongo-ovata, acuminata, carinata, integerrima, lurido-viridia: nervo crasso carinato fusco excurrente; retis areolis parallelogrammis. FLORES masculi numerosi, axillares, antheridiis atque pistillidiis sterilibus nonnullis intermixtis. FOLIA PERIGONIALIA exteriora caulinis simillima, interiora longiora, angustiora, longius acuminata. Antheridia 6—8, maxima, oblonga, curvata, truncata, reticulata, filamento brevi, purpurascens. Paraphyses numerosae, crassae, filiformes, longe articulatae, lutescentes. FLORES feminei pauci terminales: FOLIA PERICHAETALIA ut in masculis. Pistillidia 8—10, germine oblongo-viridi, stylo purpurascens, stigmate incrassato; paraphyses ut in masculis. VAGINULA brevis, ovata, fusca. SETA semiuncialis, erecta, parum flexuosa, apice reflexa, laevis, purpurascens. SPORANGIUM pendulum, cylindricum, laeve, viridi-brunneum, statu siccato et

deoperculato angustatum, ore amplo purpureo. PERISTOMIUM externum: dentes erecti apicibus conniventes, in parte postica et latiore trabeculati rufescentes, in antica subulata albicantes; interius membrana tenera lutescens in processu 16, cum dentibus alternantes, ciliis binis tenerrimis interpositis, producta. ANNULUS adest. OPERCULUM conicum, cum apiculo dimidio brevior, rufescens.

In muris prope Sebastianopolin, Julio et Augusto: b. Merkel; — ibidem ad Tijuca: Olfers. 2.

XXVII. BRYUM SCHWAEGR.

SPORANGIUM terminale, aequale, pyriforme, rarius cylindricum, laeve, annulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentes 16 lanceolato-subulati, trabeculati; interius membrana carinato-sulcata in processu totidem lanceolatos, carinatos, perforatos, ciliis capillaribus interjectis, producta. CALYPTRA cuculliformis. FLORES dioeci: masculi gemmiformes, terminales, sessiles.

Schwaegr. Suppl. I. 2. 88. Brid. Bryol. univ. I. 638. Endl. Gen. 542. b.

1. BRYUM ARGENTUM β LANATUM \dagger surculo erecto ramoso, ramis teretibus obtusis erectis; foliis dense imbricatis quinquifariis lato-ovatis concavis integerrimis albido-argenteis, nervo in pilo squaroso-patenti excurrente; sporangio pendulo oblongo-pyriformi, operculo convexo-mammillato.

Bryum lanatum Brid. Spec. musc. III. 20. Method. 118. Bryol. univ. I. 659.

Mnium lanatum Pal. Beauv. Prodr. 75.

Prope Sebastianopolin in muris et ad terram, Julio et Octobri: Merkel; — in humidis montium prope Novo-Friburgum Decembri, cum fructibus maturis: Beyrich; — in insula S. Catharinae Brasiliae: Dumont d'Urville. 2.

2. BRYUM JULACEUM SCHRAD. surculo gracili, fructifero ramoso; foliis dense imbricatis cauli appressis lato-ovatis obtusis concavis integerrimis, nervo supra medium evanescente; sporangio pendulo cylindrico, operculo convexo mammillato.

Bryum julaceum Schrad. Spicil. Fl. Germ. 70. n. 2. Brid. Bryol. univ. I. 659.

Bryum pendulum surculis teretibus rel. Dill. Hist. musc. 394. t. 50. f. 63.

In prov. Minarum solo humido inter Bartramiam filiformem steritem: M. 2.

3. BRYUM CONICUM \dagger surculo brevissimo fastigiato-ramoso julaceo, ramis simplicibus; foliis quadrifariis imbricatis appressis oblongis apiculatis carinatis integerrimis crassinervibus; sporangio horizontali oblongo-cylindrico, operculo conico obtuso.

RADIX basilaris, capillacea, fusca. SURCULUS erectus, brevissimus, fastigiato-ramosus, ramis brevibus, 2—3 lin. longis, julaceis, densissime foliosis. FOLIA caulina in perichaetium congesta, ramea quadrifaria, imbricata, appressa, oblonga, apiculata, canaliculata, carinata, integerrima, flavo-viridia: nervo crasso carinato ferrugineo in apiculum exeunte; retis areolis parallelogrammis laxis. FOLIA PERICHAETIALIA lato-lanceolata, cuspidata: retis areolis laxioribus; intima tenera subhyalina. VAGINULA cylindrica, fusca. SETA semuncialis et longior, erecta, parum flexuosa aut curvata, laevis, basi purpurascens, apicem versus pallide lutea. SPORANGIUM horizontale, parvum et angustum, oblongo-cylindricum, laeve, luteo-brunneum, ore purpureo. OPERCULUM brevissimum, conicum, obtusum, purpureum.

A Bryo Funckii Schwaegr., cui summoere affine, differt: statura minore, caule brevissimo fastigiato-ramoso, foliis appressis flavo-viridibus, perichaetialibus lato-lanceolatis, sporangio horizontali, oblongo-cylindrico, operculo conico obtuso.

Ad latera rivorum prope Novo-Friburgum, Decembri maturum: Beyrich. 2.

4. BRYUM GRACILISSETUM \dagger sureulo brevissimo, innovante ramoso; foliis lanceolatis cuspidatis canaliculatis integerrimis, nervo in cuspidem exeunte; sporangio pendulo oblongo-cylindrico, operculo brevissimo conico-apiculato.

RADIX capillacea, basilaris, fusca. SURCULUS brevissimus, innovationibus brevibus apice incrassatis. FOLIA erecto-patentia, inferiora remota, lanceolata, superiora conferta, lanceolata, cuspidata, canaliculata, integerrima, amoene viridia: nervo valido ferrugineo in cuspidem brevem exeunte, retis areolis parallelogrammis angustissimis. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora caulinis similia, interiora longiora, angustiora, longius cuspidata. VAGINULA subglobosa, brevis, paraphysibus longis lutescentibus, fusca. SETA erecta, 6—18 lin., gracilis, parum flexuosa, laevis, purpurascens. SPORANGIUM pendulum, oblongo-cylindricum, laeve, flavo-brunneum, aetate atropurpureum. OPERCULUM brevissimum, conico-apiculatum, purpureum, apiculo fusco.

Bryo longiseti Schwaegr. proxime accedit, differt autem: statura duplo minore, foliis breviter cuspidatis, seta duplo brevior, sporangio oblongo-cylindrico, operculo conico-apiculato.

In solo argillito humido inter Trematodontem longicollem prope Novo-Friburgum, Januario: Beyrich. 2.

5. BRYUM CAESPITICIMUM LINN. surculo brevi erecto fastigiato-ramoso, ramis brevibus incrassatis; foliis strictis ovato-lanceolatis cuspidatis concavis integerrimis, nervo in cuspidem excurrente; sporangio pendulo obovato, operculo hemisphaerico mammillato.

Br. caespiticium Linn. Spec. pl. 1586. Hedic. Spec. musc. 180. Brid. Spec. musc. III. 16. Schwaegr. Suppl. I. 2. 109. Brid. Bryol. univ. I. 669.

Bryum pendulum, ovatum, caespiticium, rel. Dill. Hist. musc. 396. t. 50. f. 66.

In sylvis umbrosis montis Serra dos Orgãos, Januario: Beyrich. 2.

6. BRYUM APICULATUM SCHWAEGR. surculo erecto elongato apice innovante-ramoso; foliis erecto-patentibus oblongo-lanceolatis cuspidatis integerrimis; seta arcuata, sporangio nutante pyriformi longicollis, operculo convexo mucronulato.

Bryum apiculatum Schwaegr. Suppl. I. 2. 102. t. 22. Brid. Bryol. univ. I. 644. Meth. 117. Spec. musc. III. 12.

Stirps nostra ab icone et descriptione Schwaegrichenianis l. c. differt: surculo breviori, foliis latioribus oblongo-ovatis, sporangio majore magisque pendulo. SURCULUS erectus, uncialis ad biuncialis, basi usque ad medium radiculosus, apice innovante ramosus, innovationibus simplicibus foliosis. FOLIA laxa, erecto-patentia, oblongo-lanceolata, cuspidata, concava, integerrima, amoene viridia: nervo valido ferrugineo in cuspidem brevem excurrente; retis areolis parallelogrammis laxis. SETA uncialis, erecta, apicem versus arcuata, laevis, ferruginea. SPORANGIUM nutans, e basi attenuatum a longe et anguste pyriforme, brunneum. ANNULUS simplex e cellulis elongatis. OPERCULUM convexum, mucronulatum.

In campis montevidensibus: Sellow. 2.

7. BRYUM TURBINATUM HEDW. (MINUS) surculo brevi, innovante ramoso; foliis ovato-acuminatis subintegerrimis, marginibus paululum recurvatis, nervo excurrente; sporangio elongato-pyriformi pendulo. Hook. in Kunth. Synops. plant. aequinoct. T. 1. 57.

Bryum turbinatum var. minus Walk. Arnott. in Act. soc. Wern. V. 201.

Prope Sebastianopolin: Jameson. 2.

XXVIII. MNIUM SCHWAEGR.

SPORANGIUM terminale, aequale, cylindricum aut oblongum, laeve, annulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentes 16 lanceolato-acuminati, trabeculati; interius membrana carinato-plicata, producta in processus totidem lanceolato-acuminatos, carinatos, perforatos, ciliis capillaribus subinde trabeculis tenerimis inter se conjunctis interjectis. CALYPTRA cuculiformis. FLORES dioeci terminales; masculi disciformes.

Schwaegr. Suppl. I. 2. 122. Polla Adans. Bryum Polla Brid. Bryol. I. 688. Endl. Gen. n. 542. c.

1. MNIUM BEYRICHIANUM † surculo erecto seu assurgente simplici aut innovante; foliis in apice caulis in rosulam congestis patentibus, siccitate angustatis undulatis, lato-ovatis acuminatis argute serrato-dentatis, seta solitaria, sporangio horizontali obconico curvato, operculo convexo brevissime rostellato.

Bryum roscum Walk. Arnott. l. c. 201.

RADICULAE capillares fuscae. SURCULUS erectus aut ascendens, 18—30 lin., simplex aut innovationibus ramosus, inferne calvus aut foliis sparsis minimis instructus, amoene purpureus. FOLIA inferiora sparsa, erecto-patentia, minuta, apicem versus densiora et majora, lato-ovata, longissime acuminata, canaliculata, serrata, acuminis apice argute serrato-dentata, subhyalina; nervo dilute viridi in acumine dissoluto; retis areolis parallelogrammis laxissimis; intima 4 minutissima, lanceolato-subulata, hyalina. Pistillidia 17 germine obovato stipitato viridi, stylo duplo longiori purpureo, ambitu pellucido, stigmatate capitato; paraphyses numerosissimae, pistillidiorum longitudine, filiformes, articulatæ, hyalinae. VAGINULA conica, fusca. SETA solitaria, 2 poll. vel longior, erecta, parum flexuosa, siccitate torta, laevis, nitida, rubro-ferruginea, sursum pallidior. SPORANGIUM horizontale, acetate cernuum, obconicum, curvatum, laeve, brunneum, ore purpureo, acetate fuscum. PERISTOMII externi dentes erecti, apice incurvi, lanceolato-acuminati, trabeculati, ferrugineo-brunnei, superne hyalini; internum: membrana reticulata, plicato-carinata, lutea, in processus lanceolatos lacunis magnis pertusos, ciliis binis ternisve interjectis hyalinis, producta. ANNULUS simplex. OPERCULUM convexum, brevissime rostellatum, rubrum.

Mnium roseum Hedw. et Mnium giganteum Schwaegr. proxime affinia sunt. Differt autem ab illo: foliis late ovatis longius acuminatis argute serrato-dentatis pellucidis; seta solitaria, sporangio horizontali seu cernuo obconico curvato, operculo convexo rostellato; ab hoc foliis late ovatis acuminatis, argute serrato-dentatis, sporangio obconico, operculo convexo brevissime rostellato.

In vicinia Sebastianopoleos, e. g. ad Tijuca; in montibus Serrae dos Orgãos, ad radices arborum, locis humidis vel. Merkel, Olfers, Beyrich, Sellow. Junio, Julio fructus maturat. 4

2. MNIUM AUBERTI SCHWAEGR. surculo ascendente innovante; foliis recurvato-patentibus oblongo-ovatis acutis concavis immarginatis serrato-dentatis, nervo excurrente; sporangio pendulo cylindrico basi plicato, operculo convexo-mammillato.

Tab. nostra II. Fig. I.

Mnium Auberti Schwaegr. Suppl. I. 2. 130. t. 80. (sterile). Brid. Spec. musc. III. 62.

Bryum Auberti Brid. Meth. 119. Walk. Arnott. Disp. meth. 44. Schwaegr. Suppl. II. 2. 196. Ejusd. Spec. I. 53. Bryum Polla Auberti Brid. Bryol. univ. I. 711, 855.

FOLIA PERIGONIALIA exteriora minorum quam caulina, e basi latiore et ventricosa lanceolata, acuminata, patentia, canaliculata; interiora 4—5 minima, erecta, latissima, cordata, acuminata, concava, marginata, subintegerrima. Antheridia numerosissima, oblongo-ovata, parum curvata, truncata, albicantia. Paraphyses numerosissimae, filiformes, parum curvatae, basi brevissimi —, apicem versus breve —, in medio longe-articulatae, lutescentes. FOLIA PERICHARTALIA exteriora caulinis superioribus simillima, interiora erecta, decrescendo angustiora et acutiora, e basi latiore longitudinaliter plicata lanceolata; nervo crasso fusco in cuspidem serratam excurrente; intima 3—4 minuta, ovato-acuminata, concava, serrulata, pellucida; nervo crasso obscure viridi excurrente; retis areolis parallelogrammis laxis. Pistillidia 12—15, germine oblongo viridi, stylo longitudine aequali purpureo, stigmatate incrassato. Paraphyses numerosae, paulo longiores, filiformes, articulatæ, lutescentes. VAGINULA conica, fusca. SETA solitaria, uncialis ad biuncialis et longior, erecta, basi geniculata, parum flexuosa, laevis, purpurascens, apicem versus pallidior.

In districtu adamantium prov. Minarum, ad Rio de Contas, Lages et Sincora prov. Bahiensis, Sept.: M.; — in campis montevidensibus: Sellow; — in silvis antiquissimis, prope Novo-Friburgum, Jan.; — prope Rio de Janeiro, in lapidibus vel in terra uliginosa silvarum, Jun. et Aug.: Merk., Beyr., M. 4

3. MNIUM RIGIDUM † surculo erecto brevi simplici innovante; foliis confertis erecto-patentibus siccitate tortilibus rigidis oblongo-lanceolatis canaliculatis marginatis argute serratis; nervo excurrente; sporangio pendulo oblongo-cylindrico, operculo convexo apiculato.

SURCULUS 3 ad 4 lin., erectus, simplex, innovans, inferne remote superne dense foliosus. FOLIA inferiora remota, minor et latiora, superiora conferta comam laxam formant, erecto-patentia, oblongo-lanceolata, canaliculata, marginata, serrato-dentata, nigro-viridia, in innovationibus juvenilibus amoene viridia; nervo rufo excurrente; retis areolis parallelogrammis parvis et angustis. FLOS femineus terminalis in apice innovationum. FOLIA PERICHARTALIA in rosulam parvam congesta, exteriora patentia, oblonga; interiora minor, lanceolata, argute serrata; intima minuta, tenera, ovato-acuminata, concava, obtuse serrulata, subdiaphana; omnia nervo valido viridi excurrente; retis areolis subquadratis. Pistillidia 4—6, germine oblongo-lanceolato virescente, stylo subulato subhyalino, stigmatate capitato purpurascente; paraphyses paucae, filiformes, tenues, hyalinae. VAGINULA ovata, atrofusca. SETA solitaria, erecta, apice incurva, 10—12 lin., interdum flexuosa, laevis; inferne purpurascens, superne pallide flava, nitida. SPORANGIUM pendulum, oblongo-cylindricum, laeve, brunneum. Dentes PERISTOMII exterioris lanceolato-subulati, apice incurvo subbifidi, trabeculati, ferruginei, superne hyalini; interius membrana reticulata lutescens, producta in processus 16 erectos, pertusos, ciliis binis brevioribus filiformibus hyalinis interjectis. ANNULUS duplex, speciosus, seriei interioris cellulis rotundatis parvis, ferrugineis; exterioris duplo vel triplo longioribus, oblongis hyalinis. OPERCULUM convexum, brevissime apiculatum, purpureum.

In campis montevidensibus: Sellow. 4

4. MNIUM ROSTRATUM SCHWAEGR. surculo erecto flagella repentia emittente; foliis oblongo-rotundatis mucronulatis marginatis serrulatis; setis subaggregatis, sporangio horizontali oblongo aequali, operculo conico-rostrato.

Mnium rostratum Schwaegr. Suppl. I. 2. 136. t. 79.

Bryum Polla rostrata Brid. Bryol. univ. I. 700.

Bryum longirostrum Brid. Meth. 119. Mnium ejusd. Spec. III. 51.

Bryum rostratum Hook. et Tayl. Muscol. britt. 126. t. 30.

Bryum pendulum, vel. Dill. Hist. 415. t. 53. f. 80.

In campis montevidensibus: Sellow. 4

SERIES IV. ACROCARPI PERI-EPISTOMI.

XXIX. CATHARINEA EHRH.

SPORANGIUM terminale, cylindricum, aequale, exannulatum, exapophysatum. PERISTOMIUM simplex: dentibus 32 vel 64 brevissimis inflexis, membranam aridam orificium obtegentem apicibus prehendentibus. CALYPTRA cuculliformis, pilis strictis brevibus vel denticulis hirta. FLORES terminales dioeci; masculi disciformes.

Brid. Bryol. univ. II. 97. Polytrichum Endl. Gen. n. 560. c.

(PERISTOMII DENTIBUS 64.)

1. CATHARINEA MAGELLANICA BRID. surculo innovante; foliis erecto-patentibus, siccitate appressis, e basi latiore subvaginata subulatis canaliculatis cartilagineo-serratis; sporangio oblongo-ovato, operculo e basi conica curvirostro.

Catharinea magellanica Brid. Mant. 204. Bryol. II. 106. Polytrichum magellanicum Linn. Suppl. 449. Hedw. Spec. musc. 101. t. 20. f. 1. 2. Schwaegr. Suppl. musc. I. 2. 332. Menzies Act. Soc. Linn. Lond. IV. 71. t. 6. f. 1. Brid. Spec. musc. I. 79. Muscol. rec. II. 1. 105. t. 5. f. 5. Schwaegr. Spec. musc. 18.

Pogonatum magellanicum Pal. Beauv. Aethog. 84. Catharinea Pseudopolytrichum Radd. in Memor. di mate-mat. et fis. della Soc. Ital. Moden. XVIII. 143. t. 18. f. 1.

In Serra d'Estrella ad latera montium, mense Februario c. fr. maturis: Beyrich, Raddi. 2.

XXX. POLYTRICHUM LINN.

SPORANGIUM terminale, exannulatum, exapophysatum vel basi apophysi distincta auctum; columella cylindrica vel 4—8-alata. PERISTOMIUM simplex: dentibus 32 ad 64 brevibus incurvis, membranam epiphragmaticam aridam orificium obtegentem apice prehendentibus. CALYPTRA cuculliformis indumento tenui aut tomentoso aut longo, floccoso, ejus apici agglutinato. FLORES terminales, dioeci; masculi disciformes.

Pogonatum et Polytrichum Brid. Bryol. univ. II. 108. 135. Endl. Gen. n. 560. a. b.

1. SPORANGIO EXAPOPHYSATO: POGONATUM SPEC. PAL. BEAUV. ET BRID.

1. POLYTRICHUM BREVICAULE BRID. surculo brevissimo simplici; foliis rectis cordato-ovatis breviter et obtuse acuminatis grosse serratis; seta unciali; sporangio cylindrico erecto, operculo hemisphaerico, brevissime rostellato.

Polytrichum brevicaule Brid. Musc. II. 1. 87. Spec. musc. II. 68. Mant. 199.

Pogonatum brevicaule Pal. Beauv. Aethog. 84. Brid. Bryol. II. 114 et 743.

Polytrichum pensilvanicum Hedw. Spec. musc. 96. t. 21. f. 1—6. Rich. fl. bor. Amer. 2. 204. Schwaegr. Suppl. III. 14. t. 106. Spec. musc. 15.

Polytrichum tenue Menzies Act. Soc. Linn. Lond. IV. 68. Mnum polytrichoides γ Linn. Spec. pl. XII. 1577.

Polytrichum acaulon capillaceum rel. Dill. Hist. musc. 434. t. 55. f. 12.

FOLIA parva, 6—8, imbricata, apicibus patulis, siccitate appressa apicibus curvatis; in perichaetio fructifero 6, erecta, stricta, oblongo-

lanceolata, acuta, integerrima aut suberoso-dentata. Cl. Bridelius et Schwaegrichenius folia perichaetialia loco caulinarum descriperunt.

In montosis glareosis prov. Minarum ad Tejuco et Villam Riccam: M.;—prope Novo-Friburgum in solo limoso, mense Januario: Beyrich;—prope Rio de Janeiro, mense Julio et Augusto: Merket. 2.

2. POLYTRICHUM SEMIANGULATUM † surculo erecto simplici innovanteque ramosiusculo; foliis patenti-strictis, siccitate appressis, lanceolatis obtusiusculis marginato-serratis; sporangio cernuo ex ovato subquadrato, operculo convexo curvirostro.

Pogonatum semiangulatum Brid. Bryol. univ. II. 744.

In Brasilia habitat, Bridetio et Persoonii testibus. 2.

2. SPORANGIO APOPHYSATO: POLYTRICHA GENUINA AUCT.

§. 1. Foliis integerrimis, margine ut plurimum introflexo.

Juniperifolia.

3. POLYTRICHUM JUNIPERINUM HEDW. surculo simplicissimo assurgente; foliis e basi vaginata membranacea lineari-lanceolatis patulis integerrimis, margine inflexis, costa scabris; sporangio apophysato parallelepipedo, operculo e basi planiuscula rostrato.

Polytrichum juniperinum Hedw. Spec. musc. 89. t. 28. Schwaegr. Suppl. I. 2. 309. Brid. Bryol. univ. II. 136.

Prope Sebastianopolin, teste Bridetio. 2.

4. POLYTRICHUM ANTILLARUM RICH. surculo erecto simplicissimo; foliis patentissime recurvis e basi oblonga vaginata lineari-subulatis marginibus pellucidis integerrimis involutis, versus apicem argute serratis; sporangio cernuo tetragono apophysi minuta discoidea, operculo convexo rostro conoideo, calyptra longissima.

Polytrichum Antillarum Rich. mspt. Brid. Bryol. II. 138 et 747.

Polytrichum appressum Schwaegr. Suppl. I. 2. 311 et II. 2. 5. t. 152. excl. synon. Brid. Schwaegr. Spec. musc. I. 8.

Polytrichum scabriusculum Brid. Mant. 195.

Folia quam in *P. juniperino* dimidio angustiora, tota carina papilloso-scabra, madore non erecto-patula, sed ad angulum rectum patentissima, apice recurva.

Ad latera viarum prope Novo-Friburgum, Decembri c. fr. maturis: Beyrich. 2.

5. POLYTRICHUM APPRESSUM BRID. surculo simplicissimo stricto; foliis erecto-patulis e basi latiore vaginata lanceolatis canaliculatis integerrimis; sporangio parvo parallelepipedo rugoso, apophysi minuta discoidea, operculo e basi convexiuscula brevissime curvirostro obtusiusculo, calyptra campanulata.

Polytrichum appressum Brid. Spec. musc. I. 51. Mant. 195. Bryol. univ. II. 141 et 747.

Antea a Schwaegrichenio cum *P. appresso* suo (*P. Antillarum* Br.) commixtum, recentiori tempore ad *P. commune* L. ductum est. Ab utroque tamen maxime distinguitur: surculo gracilliori, foliis erecto-patulis, siccitate arcte appressis, brevioribus, lanceolatis, integerrimis, nervo in cuspidem subulatam scabram excurrente instructis, seta breviori, sporangio minori parallelepipedo rugoso, operculo brevissime curvirostro obtusiusculo; a *P. Antillarum* calyptra campanulata breviori differt. *P. stricto* quoque proxime affine, sed sporangii operculi et forma recedit.

In Brasilia meridionali: Sellow et Pohl. 2.

6. POLYTRICHUM STRICTUM MENZ. surculo simplici innovanteque; foliis confertis patulis, siccitate strictis, lanceolatis integerrimis margine involutis; sporangio cuboideo apophysato, operculo planiusculo rostellato.

Polytrichum strictum Menz. Act. Soc. Linn. Lond. IV. 77. t. 4. f. 1. Brid. Spec. musc. 1. 49. Mant. 195. Bryol. univ. II. 139.

In Brasilia, teste Schwaegrichenio. 2.

7. POLYTRICHUM GLABRUM BRID. surculo simplici vel innovationibus brevibus ramuloso; foliis patentibus e basi ovata lanceolatis planis integerrimis, nervo scabriusculo; sporangio apophysato parallelepido angusto longo, operculo plano brevissime et obtusiuscule rostrato, calyptra conico-campanulata aurea.

Polytrichum glabrum Brid. Muscol. II. 85. Bryol. II. 141 et 747. Schwaegr. Suppl. I. 2. 311. Spec. musc. I. 3. Raddi Crüll. bras. 9. n. 23.

In solo tutoso in Serra d'Estrella: Beyrich, Setlow. 2.

SERIES V. PLEUROCARPI HAPLOPERISTOMI.

XXXI. FABRONIA RADDI.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum. PERISTOMIUM simplex, dentibus 16, infra orificium intus adnatis membranaceis, per paria approximatis, involutis siccitate stomateque reflexis, saepe iterum in duos fissis. CALYPTRA cuculliformis. FLORES monoeci, axillares, gemmiformes.

Brid. Bryol. univ. II. 168. Endl. Gen. n. 567.

1. FABRONIA MACROBLEPHARIS SCHWAEGR. surculo tenuerrimo repente vage ramoso; foliis subdistichis ovato-acuminatis patulo-ciliatis enervibus pellucidis; sporangio ovato supra basin coarctato, operculo curvirostri.

Fabronia macroblepharis Schwaegr. Suppl. III. II. t. 247.

Ad ligna putrida in Brasiliae sive: Pohl. 2.

XXXII. HYDROPOGON BRID.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum, immersum. PERISTOMIUM simplex, dentibus 16, valde incurvis (siccitate reflexis) brevibus, lanceolatis, linea media longitudinali obscuriori instructis solidis. CALYPTRA mitraeformis, subaequalis, integra. FLORES dioeci? Feminei laterales, gemmiformes.

Brid. Bryol. univ. II. 769. Endl. Gen. n. 491. Grimmiac et Dryptodontis Spec. Auct.

1. HYDROPOGON FONTINALOIDES BRID. surculo elongato subbipinnato-ramoso fluitante, ramis ramulisque alternis clavatis; foliis imbricatis oblongo-ovatis acutis apice serratis enervibus; sporangio immerso, operculo convexo apiculato.

Hydropogon fontinaloides Brid. Bryol. univ. I. 770.

Dryptodon fontinaloides Brid. Bryol. univ. I. 205.

Grimmia fontinaloides Hook. Musc. exot. 9. t. 2. Kunth. Syn. pl. aequinoct. I. 50.

SERCULUS 6—15 poll., inferne, ut rami ramulique, foliis destructis obsitis, strictus, gracilis, fuscescens. Rami elongati, 5—6 poll., ut ramuli breves pinnati, alternantes, apicem versus densissime foliosi, inde quasi clavati, ex apice subinde innovantes. FOLIA dense imbricata, erectiuscula, concava, luride fusco-viridia. FLORES dioeci? Feminei axillares, gemmiformes, statu fructifero autem in ramulis inferioribus ob destructionem summitatum ramulorum terminales videntur, inter folia caulina reconditi; FOLIA PERICHAETALIA exteriora 5—6, oblonga, acuminata, concava,

subintegerrima, enervia, tenera, subpellucida, albo-viridia; interiora 6—7, minora, lanceolato-acuminata, integerrima, pellucida. Pistillidia 6—8, germine pallide-viridi, stylo purpurascente, stigmatate subhyalino; paraphyses nullae. Vaginula annuliformis, fusca. SETA brevissima, vix dimidiam lineam longa, laevis, flavescens. SPORANGIUM minutum, erectum, oblongo-ovatum, reticulatum, ore coarctato fuscescens. PERISTOMII dentes breves, valde incurvi, siccitate reflexi, lanceolati, linea media longitudinali obscuriori instructi, densissime trabeculati, integerrimi, pellucidi, ferruginei. OPERCULUM purpureum. (CALYPTRA mitraeformis subaequalis, integra: BRID.)

Habitus *Cinclidoti fontinaloidis* aut *Fontinalis*, sed floribus femineis axillaribus et peristomii forma distinctissimum.

In silvis adis, in vetustis truncis fluitantibus fluminum Amazonum, Solimões et Japurá, et prope Teffé, in provincia fluminis nigri: M. 2.

XXXIII. LEUCODON SCHWAEGR.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum. PERISTOMIUM simplex, membranaceum, sporangii parieti interno adnatum: dentibus 16, lanceolatis, obtusis, albis, basi interdum usque ad medium membrana tenera concolori conjunctis, perforati bipartibiles bifidive. CALYPTRA cuculliformis. FLORES dioeci, gemmiformes, axillares.

Brid. Bryol. univ. II. 207. Endl. Gen. n. 580.

1. LEUCODON POHLII SCHWAEGR. surculo assurgente, ramis erectis dendroidibus compressis; foliis sparsis oblongis breviter acuminatis subintegerrimis, nervo excurrente; sporangio oblongo-ovato, operculo conico rostrato.

Leucodon PohlII Schwaegr. Suppl. III. 2. t. 232.

SERCULUS 2—4 poll., tenuissimus, fuscus. Rami, 1½—2 poll., compressi, basi simplici, apice ramulosi, ramulis pinnatis vel subsimplicibus, fasciculatis. FOLIA erecto-patula, valde concava, versus apicem plicata, lentibus maxime augmentibus illustrata subtiliter serrulata, lurido-viridia: nervo plerumque excurrente interdum sub apice evanescente (nec in folii medio evanescent, qualem cl. Schwägrichenius tradidit) concolori; retis areolis confertissimis sublinearibus. FLORES masculi in minoribus caulibus nati, foliis caulinis duplo breviores, oblongi, acuminati. FOLIA PERIGONIALIA imbricata, ovato-acuminata, obliqua, concava, enervia, viridia. Antheridia copiosa, teretiusecula, filamenta brevi, viridia, demum albescentia; paraphyses filiformes, articulatae, antheridiis longiores, hyalinae. FLORES feminei subcylindrici, longissimi. FOLIA PERICHAETALIA caulinis angustiora et duplo longiora, lanceolato-acuminata, exteriora ruptinervia, interiora enervia, subvaginata. Pistillidia copiosa, purpurascens; paraphyses filiformes, articulatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, angusta, pistillidiis paraphysibusque emarcidis obsita, badia. SETA erecta, semiuncialis, siccitate tortilis, purpurea. SPORANGIUM erectum, aequale, oblongo-ovatum, laeve, brunneum. PERISTOMII dentes aequidistantes, lanceolati, crassi, solidi, spongiosi, basi ad medium membrana tenera concolori inter se conjuncti et interdum etiam apice duo connati, lutescentes. OPERCULUM paullo curvatum, dimidia sporangii longitudine, ferrugineum.

In Brasilia, loco natali non indicato: Pohl. 2.

XXXIV. PTEROBRYON HORNSCHII.

SPORANGIUM laterale, aequale, ovato-rotundatum, exannulatum, immersum. PERISTOMIUM simplex, spongiosum, sporangii pariete interno adnatum basi planum, dein contractum in exiguum conum, album: dentibus 16,

aequidistantibus lanceolatis obscure transversim striatis solidis turgidis. CALYPTRA minuta, mitraeformis, basi lobata, glabra. FLORES dioeci?, feminei gemmiformes. — Habitus dendroideus et ramificatio *Neckerae pennatae* et affinium.

Nomen ob ramulos eleganter pinnatos, e vocibus *πετρον*, ala, et *βρῶν*, muscus, compositum.

1. PTEROBRYON DENSUM † surculo repente, ramis erectis dendroideis; foliis sparsis confertis ovato-acuminatis striatis serratis ruptinervis; sporangio ovato, operculo conico acuto.

Pterogonium densum Schwaegr. *Suppl. III. 2. t. 283. b.*

Cryptotheca densa Hsch. *Mscrpt.*

SURCULUS primarius nudus, radiceformis, nigro-fuscus, secundo-ramosus. RAMI 2—4 poll., basi radiculosi, inferne nudi, compressi et subcapites, superne eleganter pinnatim ramulosi, senectute interdum prostrati et iterum ramulos singulares emittentes; ramuli breves, semunciales, patentes, terminales, interdum attenuati, declinati et apicibus radiculosi. FOLIA erecto-patentia, concava, grosse serrata, plicis plurimis apicem versus evanescentibus, nitentia, luteo-viridia, basi ferruginea; nervo tenui concolori versus apicem evanescente; retis areolis oblongis obscuris. FLORES dioeci: feminei in ramulis, gemmiformes, oblongi, fuscii; FOLIA PERICHAETIALIA (a cl. Schwaegrichenio minus accurate descripta) imbricata, inferiora minuta, lato-ovata, obtusa, concava, superiora magis magisque elongata et acutiora, suprema s. intima ovata, breviter acuminata, vaginata, omnia integerrima, enervia, pellucida, rufescentia. Pistillidia constanter 12, brevia, germine oblongo-cylindrico fusco, stylo turgido lutescente, stigmatibus exciso subbicorni; paraphyses nullae. Folia perichaetalia in fructu maturo 10, ab illis in flore diversa sunt: erecta, sporangium superantia, oblongo-lanceolata, longe acuminata, concava, integerrima, tenera, pellucida, dilute virentia; nervo tenerrimo ad apicem evanescente, retis areolis dense linearibus. VAGINULA cylindrica, seta crassior et longior, fusco-brunnea. SETA brevissima, sporangii dimidii longitudinis, erecta, badia. SPORANGIUM perichaetio immersum, rotundato-ovatum, laeve, badium. PERISTOMIUM simplex, spongiosum, parieti interno adnatum, planum, dein contractum in exiguum conum, sporangii diametrum dimidium longum, album: dentibus 16, aequidistantibus lanceolatis obscure transversim striatis solidis turgidis pallide rufescentibus. COLUMELLA crassa, oblonga, sporangio parum tenuior, solida, mucrone tenui, inter dentes peristomii elevato, virescens. OPERCULUM urna duplo brevius, rectum, crassum, ut peristomii dentes comprimat, urnae concolor. CALYPTRA minuta, glabra, operculo vix longior, mitraeformis, basi tri- ad quadrilobata, apice in subulum rigidum attenuata, rigida, rufescens, apicem versus fuscescens.

In cortice arborum, loco natali non indicato: Sellow. 2.

2. PTEROBRYON OBLIQUIFOLIUM † surculo repente, ramis erectis bipinnatis complanatis, foliis distichis cordato-ovatis obliquis mucronulatis concavis integerrimis ruptinervis.

SURCULUS primarius repens vel pendulus, fragilis, ramosus, fuscus, radiculosus; rami erecti, dendroidei, 3—4" longi, basi radiculosi, inferne simplices foliis destructis obsiti, fuscii, superne inordinatim bipinnato-ramulosi, dense foliosi, complanati. FOLIA imbricata, disticha, cordato-ovata, obliqua, mucronulata, valde concava, integerrima, tenera, pellucida, nitentia, luteo-viridia; nervo tenerrimo versus medium evanescente concolori; retis areolis oblongis confertis. FLORES et FRUCTUS non observati.

In cortice arborum: Sellow. 2.

XXXV. SCLERODONTIUM SCHWAEGR.

SPORANGIUM laterale, subinaequale, exannulatum. PERISTOMIUM simplex: dentibus 16 distinctis (nulla membrana basilari junctis), coriaceis, rimis longitudinalibus pertusis. CALYPTRA parva, cylindrico-subulata, basi fissa, laevis. FLORES dioeci aut monoeci, axillares, gemmiformes.

Brid. Bryol. univ. II. 205. Endl. Gen. n. 579.

1. SCLERODONTIUM PALLIDUM SCHWAEGR. surculo procumbente ramoso, ramis assurgentibus subdivisis teretiusculis; foliis oblongo-ovatis in pilum excurrentibus concavis integerrimis, nervo pellucido excurrente, seta longa flexuosa; sporangio inclinato oblongo-ovato, operculo longe rostrato.

Sclerodontium pallidum Schwaegr. *Suppl. II. I. 124. t. 134.*

Brid. Bryol. univ. II. 206.

Leucodon pallidum Hook. *Musc. exot. 12. t. 172.*

In Brasilia: teste Bridetio. 2.

2. SCLERODONTIUM PELLUCIDUM SCHWAEGR. surculo repente subbipinnatim ramoso, ramulis semipollicaribus; foliis semipatentibus ovatis acutis concavis integerrimis solidinervis pellucidis; sporangio cylindrico erecto, operculo brevi conico acutiusculo.

Sclerodontium pellucidum Schwaegr. *Suppl. III. 2. 242.*

Leskea pellucida Hook. *Mscrpt.*

In Brasilia: teste Schwaegrichenio. 2.

SERIES VI. PLEUROCARPI DIPLOPERISTOMI.

XXXVI. ANTITRICHIA BRID.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus 16, lineari-lanceolatis inflexis, interius cilia e basi dentium eademque e sporangii pariete interno orta, iis subopposita, fugacissima. CALYPTRA cuculliformis. FLORES dioeci, laterales: masculi ad ramulos, gemmiformes, ovati.

Brid. Bryol. univ. II. 222. Endl. Gen. n. 584. Neckerae spec. Schwaegr. et aliorum.

1. ANTITRICHIA BRASILIENSIS † surculo repente longissimo vage ramoso, ramis subsimplicibus erectis; foliis dense imbricatis seriatis erecto-patentibus late ovatis obtusis mucronulatis profunde concavis integerrimis ruptinervis; sporangio —.

SURCULUS longissimus, 4—6-unc., repens, flexuosus, fasciculatim ramosus, nudus, rufus. Rami nunc sparsi nunc subpinnati, subsimplices, 1—2 poll., erecti, subincurvi, teretes, attenuati, laxi. FOLIA dense imbricata, seriata, erecto-patula, siccitate appressa, late ovata obtusa, mucronulata, profunde concava, integerrima, inferiora fusco-viridia, superiora pallide viridia; nervo debili concolori supra medium dissoluto instructa; retis areolis paralleogrammicis angustissimis. FLORES dioeci: masculi in ramulis frequenter gemmiformes, ovati, axillares, rufi; FOLIA PERIGONIALIA exteriora caulinis similia, interiora latiora, brevissime mucronulata, enervia, subhyalina; antheridia copiosa, 10—14, maxima, oblonga, paulo curvata, truncata, filamento brevissimo, dum facta medio granulosa marginibus hyalinis, effoeta reticulata, cellulis subquadratis laxissimis, ferruginea. Paraphyses antheridiis paulo longiores, filiformes, crassiusculae, articolatae, articulo supremo interdum explanato, hyalinae. FLORES feminei et fructus non visi.

Prope Mandioccam, praedium in Serra dos Orgãos, et in districtu adamantium, Majo — Augusto: M. 2.

XXXVII. NECKERA HEDW.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum. **PERISTOMIUM** duplex: exterius dentibus 16 lanceolato-linearibus erectis; interius ciliis totidem cum dentibus alternantibus filiformibus erectis. **CALYPTRA** cuculiformis glabra. **FLORES** monoeci, rarius dioeci hermaphroditique, gemmiformes, laterales.

Brid. Bryol. univ. II. 226. Endl. Gen. n. 575.

1. FOLIIS IMBRICATIS. Spec. 1—5.

1. **NECKERA JULACEA** SCHWAEGR. surculo repente, ramulis erectis simplicibus semiuncialibus amentaceis; foliis imbricatis sexfariis lato-ovatis breviter acuminulatis integerrimis enervibus, seta longa; sporangio erecto oblongo-cylindrico brachyodonte, operculo conico-obliquo brevi.

Neckera julacea Schwaegr. Suppl. III. 1. 2. t. 265.

Neckera amentacea Hsch. Mscrpt.

Pterogonium myurum Raddi Crittog. bras. 6. n. 11. 1

RADIX capillacea, fasciculata, fusca. **SURCULUS** biuncialis, filiformis, flexuosus, fuscus. Ramuli multi, 4—6 lin., siccitate teretes, amentacei, foliorum apicibus tamen patentibus. **FOLIA** concava, luteo-vel lurido-viridia, apice rufescentia: retis areolis parallelogrammis, marginalibus basilaribus in series subsenas dispositis rhomboidibus. **FLORES** monoeci, axillares, cauligeni, gemmiformes: masculi ovati, truncati, foliis caulinis dimidio breviores; **FOLIA** PERIGONIALIA erecta, rotundato-ovata, repente in acumen longius quam in caulinis angustata, integerrima, enervia; exteriora breviter acuminata, virescentia; interiora hyalina, acuminulo dilute rufescente: retis areolis parallelogrammis laxissimis. **ANTHERIDIA** circiter 20, exigua, cylindrica, flavescens; paraphyses pauciores, antheridiis longitudine aequales, filiformes, articulate, hyalinae. **FLORES** feminei oblongo-acuminati, foliis caulinis longiores; **FOLIA** PERICHAETALIA integerrima, enervia, dilute virescentia, exteriora ovato-acuminata, interiora lanceolato-acuminata, vaginata. **PISTILLIDIA** 10, germine subcylindrico purpurascens, stylo germinis crassitudine lutescente, stigmate dilatato hyalino; paraphyses copiosae, pistillidiis dimidio aut duplo longiores, filiformes, articulate, crassiusculae, subhyalinae. **VAGINULA** urna paulo brevior, cylindrica, angusta, flavescens, apice fusca. **SETA** uncialis, erecta, laevis, siccitate valde tortilis, purpurascens. **SPORANGIUM** laeve, badium. **PERISTOMIUM** sporangii diametro triplo brevius, siccitate erecto-recurvatum, madore paulo incurvum, parieti interno infra orificium adnatum, et totum quantum facile solubile: dentes externi inter se non cohaerentes, lato-lanceolati, obtusiusculi, obscure trabeculati, linea media verticali, foraminibus pertusi, rigidi, turgidi, fusco-badii, apice rufescentes; interni filiformes, externis trientem breviores, basi connati, fugacissimi, hyalini. **OPERCULUM** conico-obliquum, breve, badium. **CALYPTRA** cucullata, laevis, sporangii fere longitudine, lutescens.

In trunco Swartziae ejusdem prope Mandioca: Raddi; — in rupibus montis Serra d'Estrella, Februario, et in trunci arborum inter alios muscos prope Novo-Friburgum, Junio, c. fr. maturis: Beyrich. 24

2. **NECKERA INCURVATA** † surculo repente subpinnatim ramoso complanato apice radicante; foliis subdistichis homomallis late oblongo-ovatis subobliquis acutis apice serrulatis enervibus, seta longa; sporangio erecto subcylindrico ore angustata, operculo —.

SURCULUS foliosus, rubellus, interdum subbipinnatim ramosus. **FOLIA** erecto-patentia, concava, luteo viridia: retis areolis parallelogrammis longissimis angustissimis, basilaribus brevioribus laxioribus. **FLORES** dioeci; feminei axillares, gemmiformes, ovati. **FOLIA** PERICHAETALIA exteriora latissime ovata, acuminata, integerrima, basi concava, apice recurvata, pellucida, interiora sensim

angustiora longiusque acuminata, intima 5—6 oblongo-lanceolata, basi vaginata, longissime acuminata; retis areolae laxae. **PISTILLIDIA** 4—5, germine subcylindrico purpurascens, stylo crasso ferrugineo, stigmate incrassato emarginato; paraphyses circiter 12, filiformes, articulate, flavescens. **VAGINULA** cylindrica, membranacea, viridi-brunnea, apice ferruginea. **SETA** erecta, circiter unciam longa, paulo flexuosa, siccitate tortilis, laevis, pallide lutea. **SPORANGIUM** magnum, erectum, subcylindricum, ore angustato fusco, laeve, badium. **PERISTOMIUM** orificii diametro transverso longius; dentes madore conniventes, conum formantes, siccitate paulo patentes: externi liberi, lanceolato-subulati, margine inaequali, nodosi, trabeculati, linea media verticali notati, ferruginei; interni paulo breviores, cum exterioribus alternantes, e basi latiore linearis-subulati, foraminibus angustissimis pertusi, purpureo-ferruginei.

In Brasilia, loco natali non indicato: Pohl. 24

3. **NECKERA STRAMINEA** † surculo repente gracili subpinnatim ramoso, ramis brevibus subsimplicibus assurgentibus parum curvatis; foliis secundis arcte imbricatis late ovatis acutis integerrimis enervibus; sporangio cernuo oblongo-obovato ruguloso, operculo convexo longe rostrato urna parum brevior.

SURCULUS biuncialis et longior, fasciculatim radiculosus, rufus. **FOLIA** acuta vel brevissime acuminata, profunde concava, pellucida, nitentia, straminea: retis areolis in medio folio linearibus ad margines et apicem versus oblongis parvis. **FLORES** monoeci, gemmaeformes, axillares. **MASCU**li minutissimi, ovati, rufescentes; **FOLIA** PERIGONIALIA 8—10, exteriora ovata, acuta, interiora sensim minora et obtusiora, intima minima et obtusiuscula, retis areolis laxioribus subparallelogrammis. **ANTHERIDIA** 8, ovata, filamentobrevissimo, reticulata, rufescentia; paraphyses nullae. **FEMINEI** conici, longe majores; **FOLIA** PERICHAETALIA 12, exteriora erecto-patentia, ovata, acuminata, interiora maxima, erecta, oblongo-lanceolata, acuminata, intima 2 tenera, lanceolato-acuminata, plicata, retis areolis in laxissimis subquadratis, in medio linearibus, versus apicem oblongis parvis. **PISTILLIDIA** 4, germine ovato ferrugineo, stylo subulato duplo longiore, stigmate incrassato subhyalino; paraphyses nullae. **VAGINULA** cylindrica, membranacea, luteo-brunnea, nonnullis striis seu costis verticalibus rufis notata. **SETA** vix 3 lin. longa, erecta, paulo flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens, apice pallidior. **SPORANGIUM** cernuum, oblongo-obovatum, rugulosum, brunneum, apice rufum. **PERISTOMIUM** exterioris dentes 16, humiditate incurvi, siccitate erecti, lanceolato-acuminati, a basi ultra medium linea media verticali notati, apice serrulati, costati, costis ad margines cristatis prominentibus et inflexis, albescentes, basi rufescentes; interius membrana angusta, areolata albida, in dentes 16, dentibus exterioribus longitudine aequales, lanceolato-subulatos, carinatos, solidos, articulatos producta. **OPERCULUM** convexum, longe rostratum, urna parum brevius, ferrugineum.

Habitu et sporangii forma N. curvirostri Schwaegr. simillima, ramis autem gracilioribus brevioribusque distincta; folia eadem fere sunt quam N. myurae, enervia tamen.

In montosis prope urbem Villam Ricam: M. 24

4. **NECKERA BEYRICHI** SCHWAEGR. surculo decumbente aliquoties diviso, ramis pinnato-ramulosis depressis apice radiculosus; foliis dense imbricatis ovatis acutis subobliquis integerrimis enervibus; sporangio erecto oblongo-cylindrico laevi, operculo conico brevi acuminato.

Neckera Beyrichii Schwaegr. Suppl. II. 2. 162. t. 197.

SURCULUS praelongus, tenuis, ramis biuncialibus aut triuncialibus rigidiusculis distichis siccitate incurvatis, radicantibus et denovo ramosis. **FOLIA** dorsalia appressa, lateralia patula, subsecunda, concava, nitentia, luteo-viridia: retis areolis parallelogrammis angustis. **FLORES** monoeci gemmaeformes, axillares. **MASCU**li in

junioribus caulis partibus etiam ad basin ramulorum, foliis duplo breviores, ovati, fuscii aut rufescentes; FOLIA PERIGONIALIA fere 20, minuta, ovato-acuminata, concava, enervia, rufescentia. Antheridia 20, minutissima, ovata, truncata, obliqua, turgida, lutea; paraphyses copiosae, tenuissimae, filiformes, illis dimidio longiores, articulatae, articulis duplo longioribus quam latoribus, hyalinae. Feminei ad basin ramorum, oblongi: FOLIA PERICHAETALIA numerosissima, imbricata, erecta, apice recurva, inferiora cordato-ovata, acuminata, concava, integerrima, enervia; superiora longiora, oblonga, longe acuminata, vaginata. Pistillidia copiosa, germine oblongo viridi-brunneo, stylo ejus longitudinis purpurascente, stigmatate truncato; paraphyses iis masculorum similes, copiosae. VAGINULA cylindrica, glabra, fusco-brunnea. SETA 6-8 lin., erecta, apice incrassata, siccitate flexuosa et tortilis, laevis, basi purpurea, sursum pallidior. SPORANGIUM erectum, oblongo-cylindricum, laeve, fusco-badium. PERISTOMIUM longitudine diametri transversae urnae; exterioris dentes erecti, lanceolati, obscuri trabeculati, solidi, lutei; interioris totidem, externis paulo breviores, lineares, perforati, albi. COLUMELLA subulata, flexuosa, demum erecta, peristomium penetrans et superans, in media parte curvata, operculo dejecto prominens, fusca. OPERCULUM conicum, breve acuminatum, urnae concolor. CALYPTRA cucullata, angusta, latere fissi, laevis, straminea, apice fuscescens.

In rupibus silvarum Serra dos Orgãos Februario: Beyrich. 24

5. NECKERA IMBRICATA SCHWAEGR. surculo polymorpha, aut repente nudo tenui vage ramoso, ramis prostratis bipinnatis superne pinnatis, aut debili filiformi pendulo flexuoso inferne subpinnato superne pinnato dense folioso, ramis brevibus remotis alternantibus; foliis caulinis confertis elliptico-lanceolatis brevissime acuminatis, rameis imbricatis quinquefariis subcochleariformibus brevissime et obtuse mucronulatis enervibus; sporangio obovato, operculo convexo breviter rostellato.

Neckera imbricata Schwaegr. *Suppl. II. 1. 42. t. 165.*

Pilotrichum imbricatum Brid. *Bryol. univ. II. 760.*

Leskea mollis Hedw. *Stirp. crypt. IV. t. 40.?*

Leskea flexilis β Brid. *Spec. musc. 59.*

Hypnum pendulum Pal. Beauv. *Prodr. 67.*

Hypnum imbricatum Pal. Beauv. *Aethog. 65. Schwaegr. Suppl. I. 2. 209.*

Hypnum pentastichum Brid. *Musc. spec. II. 2. 100. t. 3. f. 3.*

Isoetecium pentastichum Brid. *Bryol. univ. II. 378. et imbricatum ibid. 379.*

Specimina tum caule longiori et pendulo, tum toto habitu, tum foliorum, setae, sporangii et operculi forma, tum denique et floris feminei indole ita cum *Leskea mollis* Hedw. congruunt, ut etiamsi peristomium foliorumque dispositio iconi Hedwigianae neutiquam respondeant, tamen *Neckeram imbricatam* ipsam *Leskeam mollem* Hedw. esse mihi persuasum sit. Signum? autem ea ratione tantum ad *Leskeam mollem* adjecti, quod planta genuina Hedwigiana nostrae comparanda, mihi ad manus non esset.

In Serra d'Estrella in arboribus silvarum antiquissimarum, Augusto, c. fr. maturis: Beyrich, Raddi; — prope Novo-Friburgum: Beyrich; — ad flumen Amazonum et in Minas Geraës: M. 24

2. FOLIIS DISTICHIS: DISTICHIA BRID. *Bryol. univ. II. 238. Spec. 6-9.*

6. NECKERA (DISTICHIA) UNULATA HEDW. surculo decumbente pinnato-ramoso; foliis distichis verticalibus e basi lateri concava oblongis subtruncatis crenulatis transversim undulato-plicatis nervo debili versus apicem evanescente; sporangio immerso ovato, operculo conico rostellato.

Neckera Distichia undulata Brid. *Bryol. univ. II. 241.*

Neckera undulata Hedw. *Stirp. crypt. III. 51. t. 21,*

Brid. in omnib. operib. priorib. Schwaegr. Suppl. I. 2. 145. Sw. Ind. occ. III. 1780.

Dallonia undulata Arnoll. in *Ann. Soc. Linn. Par. 1826. 295.*

Pilotrichum undulatum Pal. Beauv. *Prodr. 83.*

Hypnum Jamaicense Gmel. *Syst. nat. II. 1311.*

Fontinalis crispa Sw. *Prodr. 138. Gmel. Syst. nat. II. 1324.*

Sphagnum pennatum, undulatum, vagina pilosa Dill. *Hist. musc. 294. t. 32. f. 8.*

In truncis arborum silvarum umbrosarum prope Sebastianopolin, Julio: Beyrich; — ad Mandioca, in Serra dos Orgãos, in provincia Minarum et ad flumen Amazonum: M. 24

7. NECKERA (DISTICHIA) DISTICHA HEDW. surculo repente, ramis erectis subpinnatis; foliis distichis verticalibus subdimidiatis oblongis planis retusis apice suberenulatis, nervo lato supra medium evanescente; sporangio immerso parvo oblongo, operculo hemisphaerico brevissime rostellato.

Neckera disticha Hedw. *Stirp. crypt. 58. t. 22. Spec. musc. 201. Brid. in omnib. operib. excl. Bryol. univ. Schwaegr. Suppl. I. 2. 145. Sw. Fl. Ind. occid. III. 1784.*

Neckera Distichia retusa Brid. *Bryol. univ. II. 243.*

Dallonia disticha Walk. Arnoll. *l. c. 54.*

Pilotrichum distichum Pal. Beauv. *Prodr. 83.*

Fontinalis disticha Sw. *Prodr. 138. Gmel. Syst. nat. II. 1324.*

In sitis fluminibus Amazonum et Japurá conterminis: M. 24

8. NECKERA (DISTICHIA) OBLIQUIFOLIA surculo erecto bipinnato ramoso, ramis patentibus; foliis distichis basi obliquis oblongis acutis serratis, nervo evanescente; sporangio —.

SURCULUS sesquiuncialis, basi radiculosus, foliosus, rufus. Rami apicem versus angustati. FOLIA simpliciter disticha, patentia, pellucida, pallide viridia, nervo concolori infra apicem evanescente; retis areolis parallelogrammatis angustis. FRUCTUS non observatus.

In Brasilia australiori: Sellow. 24

9. NECKERA (DISTICHIA) TENERA † surculo prostrato aut declinato debili pinnato ramoso; foliis subdistichis remotis erecto-patulis ovatis acutis argute serratis, nervo infra apicem dissolvente; sporangio —.

SURCULUS apice radicans, uncias 2-3 longus, flexuosus, foliosus; rami brevissimi. FOLIA concava, amoene viridia; nervo mediocri obscuriore infra apicem evanescente; retis areolis parallelogrammatis. FRUCTUS non observati.

In Brasilia australiori: Sellow. 24

3. SETA BREVIOR ARCATA: CYRTOPUS BRID. *l. c. 235.*

10. NECKERA CRASSA † surculo repente vage ramoso, ramis erectis vel assurgentibus sub simplicibus vel aliquoties divisis; foliis confertis erecto-patulis lanceolatis acuminatis longitudinaliter buplicatis argute serratis, nervo infra apicem dissoluto; sporangio —.

Hypnum densum Sw. *Prodr. 141. Fl. Ind. occ. III. 1829. excl. syn. Dill. Hedw. Spec. musc. 232. t. 74. Brid. Spec. musc. 202. Schwaegr. Suppl. I. 2. 278. Brid. mant. 176.*

SURCULUS firmus, nudus, fuscus. Rami 4-6 poll., dense foliosi, ob foliationem apicem versus confertiore subclavati. FOLIA sparsa, longitudinaliter buplicata, basi latiore carinata integerrima, in parte superiore et angustiore planiuscula, remote et argute serrata, amoene viridia aut rufescentia; nervo crasso concolori infra apicem extremum dissoluto instructa; retis areolis spissis suborbicularibus in medio basi parallelogrammatis.

In Brasilia: Sellow. 24

XXXVIII. PILOTRICHUM PAL. BEAUV.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum, exsertum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus 16, erectis; interius dentibus totidem cum exterioribus alternantibus basi liberis. CALYPTRA mitraeformis, conica, basi integra subfissave, pilis hirta. FLORES dioeci, rarius monoeci vel specie hermaphroditi, laterales, gemmiformes.

Brid. Bryol. II. 256. Cryphaea Web. Endl. Gen. n. 569. Neckerae Spec. Hedw. Schwaegr. Hook. rel.

1. ERECTA; CALYPTRA INTEGRATA VEL SUBINTEGRATA: PILOTRICHA GENUINA BRID. *Bryol. univ. II. 257. Spec. 1—4.*

1. PILOTRICHUM BIPINNATUM BRID. surculo repente ramoso, ramis assurgentibus bipinnatis; foliis imbricatis subdistichis ovatis breviter et obtuse acuminulatis integerrimis, nervis duobus divaricatis, seta brevi incurva; sporangio cylindrico, operculo conico-subulato.

Pilotrichum bipinnatum Brid. Mant. 140. Bryol. univ. II. 263.

Neckera bipinnata Schwaegr. Suppl. I. 2. 156. t. 83.

Daltonia bipinnata Walk. Arnott. l. c. 55.

RADIX exigua, basilaris. SURCULUS filiformis, nudus, fuscus, aliquoties divisus. RAMI assurgentes aut prostrati, 2—4 poll., basi simplices, superne eleganter bipinnatim ramulosi; ramulis subaequalibus alternis patulis distichis dense foliosis. FOLIA concava, pallide viridia seu rufescentia; nervis duobus crassis rufescentibus basi approximatis antice divaricatis marginem folii infra apicem aut penetrantibus aut non attingentibus, dorso in gibbos duos prominulis; retis areolis minutissimis linearibus obscurioribus. FLORES specie hermaphroditi, gemmiformes, copiosi, in ramis et ramulis primariis sparsi. FOLIA PERICHAETIALIA circiter 10—12, exteriora caulinis majora, angustiora et longius acuminata, nervis concoloribus brevioribus et obscurioribus; intima enervia, omnia lutescentia, retis areolis parallelogrammis laxiusculis. Antheridia copiosa, circiter 30, oblongo-cylindrica, paulo curvula, truncata, reticulata, filamenta brevi suffulta, ferruginea. Pistillidia 8, antheridiis paulo longiora, germine brevi oblongo purpurascens, stylo germen duplo superante ferrugineo, stigmate incrassato truncato concolori. Paraphyses circiter 30, antheridiis dimidio longiores, filiformes, e cellulis elongatis ad basin interdum biserialis conformatae. VAGINULA cylindrica, pallide viridis, apice fusca. SETAE copiosae, sparsae, breves 1—2 lin., inferne incrassatae, superne arcuato-incurvae, siccitate tortiles, pallide rufescentes. SPORANGIUM cernuum vel nutans, operculatum cylindricum, aequale, deoperculatum elongato-pyriforme, laeve, amoene brunneum. PERISTOMII externi dentes lanceolato-subulati, trabeculati, siccitate inter dentes interiores arcuato-inflexi, albidii; interni dentes totidem, lanceolato-lineares, erecto-conniventes, duplici areolarum serie compositi, subhyalini. OPERCULUM longitudine urnae, basi rufescens apicem versus magis pallidum. CALYPTRA conico-subulata, pilis nonnullis erectis instructa, basi lacera, pallide straminea.

In prov. S. Pauli ad Morro do Lobo, in prov. Minarum et Bahiensis; nec non ad fluvium Amazonum: M. 4.

2. ? PILOTRICHUM PINIFORME BRID. surculo repente vel assurgente, divisionibus erectis inferne simplicibus superne irregulariter bipinnatis; foliis subquadrifariis erecto-patentibus rotundato-ovatis brevissime et obtuse acuminulatis, apice serratis abruptinerviis, sporangio —.

Pilotrichum piniforme Brid. Bryol. univ. II. 260.

Muscus arbusculiformis, facie *Hypopterygii sticutiformis* Brid. SURCULUS filiformis, rigidus, fuscus, aliquoties divisus; divisiones erectae,

biunciales et altiores, inferne simplices remote foliosae, superne dense nec tam regulariter bipinnatae, quam in *Pilotr. bipinnato*. Ramuli apicem versus angustati et in Pini Piceae modum decrecentes. FOLIA in parte divisionum inferiore simplici remota, in ramulis confertiora, concava, apicem versus argutissime serrata, lutescenti-viridia, vel rufescenti-fuscidula: nervo crasso concolori, supra medium evanescente: retis areolis e hexagono subrotundis. FLORES dioeci?; feminei copiosi, gemmiformes, axillares, ad latera divisionum. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora subtriangularia, acuminata, concava, integerrima, enervia, interiora 3—5 e basi latiore concava lanceolata, serrulata, enervia, subhyalina. Pistillidia 16—18, germine oblongo purpurascens, stylo filiforme duplo longiori rufescente, stigmate dilatato hyalino. Paraphyses copiosae, pistillidiis longiores, filiformes, articulatae, hyalinae. FRUCTUS non observati.

In Brasilia australiori; Sellow. 4.

3. ? PILOTRICHUM FLAGELLIFERUM BRID. surculo repente diviso, divisionibus erectis elegantissime simpliciter pinnatis flagelliferis; foliis subsexfariis patulis ovato-lanceolatis acutis apice grosse serrulatis, nervo infra apicem evanescente; sporangio —.

Pilotrichum flagelliferum Brid. Bryol. univ. II. 259.

Neckera domingensis Spreng. Linn. Syst. pl. Suppl. IV. 1. 185. Schwaegr. Suppl. III. 1. 2. t. 231. b.

SURCULUS subnudus fuscus. RAMI 2—3 poll., erecti, inferne subnudi vel foliis minimis adpersi, superne foliis obtecti. Ramuli inaequales, patentes, stricti, simplices, siccitate erecti, interdum incurvati, teretes, apice attenuati. FOLIA siccitate appressa, carinata, lurido-viridia, in ramis junioribus luteo-viridia; instructa nervo concolori infra apicem evanescente, nec excurrente, uti *Bridellus* docuit, nec enervia, uti cl. Sprengellus et Schwaegrichenius auctores fuerunt; retis areolis parallelogrammis a basi ad marginem in series 10 dispositis subrotundis. FLORES et FRUCTUS non observati.

Loco natali non addito tradidit: Sellow. 4.

4. PILOTRICHUM CAPILLACEUM † surculo assurgente pinnatim ramoso, ramis patentibus; foliis confertis patentibus subcordato-lanceolatis longissime acuminatis serrulatis, nervo medio dissoluto, seta curvata brevi; sporangio minuto oblongo, operculo hemisphaerico-conico oblique rostellato.

Neckera capillacea Hornsch. olim in litt.

SURCULUS circiter 2 poll., inferne nudus, apice dense foliosus, fuscus. FOLIA concava, amoene viridia: nervo viridi in medio dissoluto instructa; retis areolis parallelogrammis angustis. FLORES monoeci? dioeci? FOLIA PERICHAETIALIA minora, serrata, exteriora ovata, acuminata, interiora latissima, vaginata, repente in acumen brevius angustata. VAGINULA cylindrica, laevis, brunnea. SETA circiter 2 lin., tortilis, purpurascens, apice curvata et pallidior. SPORANGIUM minutum, seta curvata cernuum, oblongum, laeve, brunneum, siccitate infra os constrictum. PERISTOMII externi pyramidati dentes lanceolato-subulati, trabeculati, rufescentes, apicem versus flavescens; interni cilia totidem, basi libera, subulata, articulata, flavescens. OPERCULUM pallide luteum. CALYPTRAM non vidimus.

Ad radices arborum prope Sebastianopolin, Novembri, c. fr. maturis: Beyrich. 4.

2. PENDULA; CALYPTRA BASI FISSA: METEORIUM BRID. l. c. II. 264. Spec. 5—10.

5. PILOTRICHUM RECURVIFOLIUM † surculo pendulo radicante filiformi irregulariter ramoso; foliis quadrifariis vel quinquefariis recurvatis late cordatis acutis serrulatis ruptinerviis, seta brevi; sporangio erecto obovato operculo conico acuminato.

Pilotrichum patulum Brid. Bryol. univ. II. 750. excl. synonymo Hedwigii.

Neckera patula Schwaegr. Suppl. II. 2. 1. 45. t. 166. excl. synonymis Swartzii et Hedwigii.

SURCULUS pendulus, saepe pedalis et longior, irregulariter ramosus, rufus aut fuscus. Rami semiunciales ad unciales et longiores, inferiores ramulosi dense foliosi. FOLIA in caule primario destructa, in ramis quadrifaria aut quinquifaria, concava seu ventricosa, amoene viridia; nervo debili infra apicem evanescente; retis areolis parallelogrammis angustissimis. FLORES dioeci? feminei gemmiformes, conico-acuminati, axillares. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora erecta, caulinis similia, longissime acuminata, acumine recurvato, interiora angustiora, lanceolata, acuminata, acumine latiori et obtusiori, remotius serrulata, enervia, subhyalina, intima 1—2 minutissima, lanceolato-acuminata, enervia, hyalina; retis areolis laxiusculis. Pistillidia circiter 16, germine oblongo purpurascete, stylo duplo longiori, stigmate incrassato et emarginato. Paraphyses pistillidiis dimidio longiores, filiformes, articulae, articulis paullo longioribus, quam latioribus, lutescentes. VAGINULA cylindrica, brunnea, apice fusca. SETA erecta, lin. longa, apice incrassata, siccitate parum tortilis, badia. SPORANGIUM erectum, obovatum, seta parum brevius, laeve, badium. PERISTOMI dentes apicem versus conniventes conum acuminatum formantes, urnae dimidiae longitudine: externi lanceolato-subulati, apice tenuissimo, solidi, lineis transversis fere quinquaginta elevatis instructi (ad speciem fere cornu lbicis) rufescentes; interni cum externis alternantes, quadrante parte breviores, angusta membrana basilari connati, e lanceolato capillares, spongiosi, bicurves, lacunis circiter 10 angustis magnitudine inaequali pertusi, apice integri, lutescentes. OPERCULUM conicum, in acumen parum curvatum productum, urna paullo brevius, luteum, basi rufescens. CALYPTRA operculi longitudine, conico-campanulata, pluries et profunde fissa, basi pilis longissimis e serie cellularum plurimarum erectis, calyptra longioribus, instructa, superne laevis, viridigrisea. GONGYLI subrotundi.

Cl. Schwaegrichen hanc speciem, nomine *Neckerae patulae* a se descriptam, *Hypnum patulum* Hedw. esse censet, a quo quidem foliis lato cordatis acute serrulatis distinguitur. Folia *Neckerae patulae* inasper integerrima esse perhibet, licet ipse apicem folii serratum (Fig. 5) depinxerit et nervo destituta, nimirum, quem Hedwigius nervum appellaverit, esse plicam. Nostra autem species (quae non *Hypnum patulum* Hedw.) folia habet nervo apicem versus evanescente instructa.

Ad corticem arborum in Serra d'Estrella, Augusto, cum fructibus maturis: Beyrich. 24.

6. ? **PILOTRICHUM AMBIGUUM** † surculo filiformi pendulo vage ramoso; foliis squarrosopatulis latissime cordatis basi marginibus inflexis breviter acuminatis subintegerrimis, nervo supra medium dissoluto; sporangio —.

SURCULUS laxus, rufus; ramis brevibus dense foliosis. FOLIA concava, nigro-viridia, in ramis junioribus longe acuminata, obsolete serrulata, amoene viridia; nervo tenuissimo obscure concolori supra medium dissoluto instructa, retis areolis parallelogrammis angustissimis. FLORES et FRUCTUS non observati. — *Pilotricho recurvifolio* simile, sed caule graciliore, foliis squarrosopatulis, nec recurvatis, latissime cordatis, margine basico inflexo subintegerrimis distinctum.

In Brasilia australiori: Setlow. 24.

7. ? **PILOTRICHUM AURO-NITENS** † surculo assurgente rigido, ramis erectis brevibus secundis; foliis quadrifariis squarrosopatentibus ovatis acuminatis argute serratis nitentibus, nervo infra apicem evanescente; sporangio —.

SURCULUS foliosus, rufescens. Rami subsimplices. FOLIA parum concava, flavo-viridia; nervo viridi; retis areolis parallelogrammis linearibus. FLORES et FRUCTUS desunt. — *P. ambiguo* simile sed statura robustiore, foliis ovatis acuminatis, nec latissime cordatis margine basi inflexis et nervo fere ad apicem excurrente distinctum.

In Brasilia aequinoctiali: M. 24.

8. ? **PILOTRICHUM REMOTIFOLIUM** † surculo pendulo gracili filiformi, ramis vagis brevibus; foliis remotis recurvato-

patulis ovatis longissime acuminatis serrulatis, nervo supra medium evanescente, sporangio —.

SURCULUS gracillimus, rufus; rami breves. FOLIA canaliculata, pallide viridia; nervo tenui concolori, retis areolis linearibus angustissimis. FLORES et FRUCTUS non observati. — *P. recurvifolio* et *P. ambiguo* affine, sed foliis remotis ovatis longissime acuminatis distinctum.

In vicinia Sebastianopoleos prope Tijuacam: Olfers et Setlow. 24.

9. ? **PILOTRICHUM CIRRI-FOLIUM** † surculo pendulo vage vel subfasciculato-ramoso, ramis elongatis iterum remote ramulosis; foliis patentissimis cordato-lanceolatis repente in acumen subulatum longitudine aequali angustatis integerrimis, nervo infra medium evanescente; sporangio —.

Hypnum (?) *longissimum* Radd. Critt. brasil. 9. Brid. Bryol. univ. II. 510.?

SURCULUS pedalis et longior, firmus, fuscus. Rami penduli, 6-unciales et longiores, dense foliosi; ramulis brevibus. FOLIA conferta, subquadrifaria, concava, flavo-viridia; nervo debili obscuro; retis areolis linearibus in acumine laxioribus. FLORES et FRUCTUS nondum lecti.

Epidendron in montibus ad Villam Riccam: M. — in Serra d'Estrella: M., Raddi et Beyrich. 24.

10. ? **PILOTRICHUM OBTUSIFOLIUM** BRID. surculo repente radiciformi, divisionibus erectis parce vageque subpinnatim ramosis; foliis laxis distichis oblongis obtusis binerviis; sporangio breviseto, calyptra parce pilosa.

Pilotrichum obtusifolium Brid. Bryol. univ. II. 760.

Stirps nobis non visa, forsitan *Hookeriae* congener.

In Brasiliae arboribus crescit teste Desvauxio.

XXXIX. LEPIDOPILUM BRID.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum, exsertum. **PERISTOMIUM** duplex: exterius dentibus 16, dimidia urna longitudine, linearibus erectis; interius dentibus totidem cum exterioribus alternantibus iisque aequalibus, basi media fissa conniventibus, apice in conum acuminatum adnatis. **CALYPTRA** mitraeformis, basi lacera et ciliata, paleis solutis scabra. **FLORES** monoeci, axillares, gemmiformes. — **Habitus** *Hookeriae*. Folia disticha, diversiformia.

Brid. Bryol. II. 267. Endl. Gen. n. 591. *Neckerae* et *Hookeriae* Spec. Schwaegr., Hook.

1. **LEPIDOPILUM SUBNERVE** BRID. surculo repente parum ramoso, ramis simplicibus erectis complanatis; foliis distichis ovato-lanceolatis inaequalibus grosse serratis, nervo duplici brevissimo tenuissimo, seta scabra; sporangio oblongo angusto, operculo conico-acuminato suberecto.

Lepidopilum subnervae Brid. Bryol. univ. II. 268.

Pilotrichum scabrisetum Brid. Mant. 141. Radd. Critt. Bras. 7.

Daltonia scabriseta Walk. Arnoll. l. c. 55.

Neckera scabriseta Schwaegr. Suppl. I. 2. 268.

RADIX fasciculata, sparsa, capillacea. **SURCULUS** nudus, rufus; ramis semiuncialibus aut uncialibus, dense foliosis. FOLIA basi remotiuscula, amplexicaulia, superiora disticha, verticalia, forma et directione inaequalia, nempe haec patula, falcata, illa obliqua subdimidiata, caetera verticalia, aequilatera, concava, margine grosse serrata, lutescenti-viridia, nitentia: omnia nervo duplici brevissimo tenuissimo sextam folii partem metiente rufo; retis areolis maximis parallelogrammis. FLORES monoeci, axillares, gemmiformes: masculi conici, foliis sextuplo breviores. FOLIA

PERIGONIALIA 6—8, lanceolata, obtusiuscula, integerrima, enervia, subhyalina; retis areolis parallelogrammis laxioribus, quam in caulinis. Antheridia 6—8, filamento brevi, oblonga, truncata, reticulata, rufescentia. Paraphyses paucae, filiformes, antheridiorum longitudine, tenerimae, hyalinae. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora 3—4 lanceolata, intima 2—3, lanceolato-acuminata, angusta, omnia integerrima, enervia, hyalina; retis areolis parallelogrammis laxissimis. Pistillidia 6—8, germine oblongo rufescente in stylum crassum longitudine aequali stigmate dilatato coronatum excurrente. Paraphyses ut in masculo. VAGINULA cylindrica, luteo-brunnea. SETA 4—6 lin. longa, erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, punctis squamulisque scabra, purpurascens. SPOANGIUM parvum, oblongum, angustum, laeve, erectum vel paululum inclinatum, deoperculatum constrictum, ore dilatato, fusco-brunneum. PERISTOMII externi dentes dimidia urnae longitudine, humiditate recurvi, siccitate erecti vel incurvi, lineares, trabeculis quasi nodosi, urnae concolores, intus membrana squamosa lutescente, ipsis latiore, vestiti; interni dentes cum exterioribus alternantes, eosque longitudine et latitudine aequantes, spongiosi, obscure trabeculati, basi media fissi, conniventes, apice in eorum acuminatum adnati, albescentes. OPERCULUM conico-acuminatum, vix paululum curvatum, dimidia urnae longitudine, rufescens. CALYPTRA campanulata, acuminata, basi lacera et ciliata, aliquot paleis solutis scabra, pellucida, apice fuscens. (Sporangii, peristomii interni et calyptrae descriptio Schwaegricheniana minus accurata.)

Var. β INTEGRIFOLIUM Brid. foliis subintegerrimis.

Ad truncos putridos sitearum umbrosarum in Serra d'Estrella et prope Novo-Friburgum, Decembri, c. fr. maturis: Beyrich et Raddi. 24

XL. HOOKERIA SMITH.

SPOANGIUM laterale, exannulatum. PERISTOMIUM duplex conicum: exterius dentibus 16 lanceolato-subulatis basi ad medium linea media diaphana verticali notatis, dense trabeculatis; interius membrana in dentes 16 uniformes, rarissime ciliolis interjectis, producta. VAGINULA plerumque foliis perichaetialibus adnatis tecta. CALYPTRA mitraeformis, glabra, rarius pilis hirta, basi plerumque in lacinas plurimas subaequales fissa. FLORES monoeci dioecive, axillares, gemmiformes.

Endl. Gen. n. 587. *Chaetophora* et *Pterygophyllum* Brid. *Bryol. univ.* II. 335. 341.

1. HOOKERIA LANGSDORFFII Hook. surculo repente vage aut subpinnatim ramoso, ramis subsimplicibus compressis; foliis distichis oblongis acutis submarginatis apice grosse serratis, nervis duobus abruptis; sporangio nutante ovato, operculo convexo breviter rostellato.

Hookeria Langsdorffii Hook. *Musc. exot.* II. 17. t. 21. *Schwaegr. Suppl.* II. 2. 34. t. 162. Hook. et Grevill. in *Edinb. Journ. of scienc.* 1825. II. 230.

Chaetophora Langsdorffii Brid. *Bryol. univ.* II. 337.

In prov. Minarum: M. — in Serra dos Orgãos ad truncos arborum sitearum, inter *Leskiam caespitosam*, Februario, c. fr. maturis: Beyrich. 24

2. HOOKERIA INCURVA Hook. et GREVILL. surculo repente vage ramoso, ramis incurvis, foliis distichis subdimidiatis ovatis subrotundatis aut brevissime mucronatis submarginatis grosse serratis, nervis duobus inaequalibus abruptis; sporangio nutante oblongo aequali, operculo conico-subulato rectiusculo.

Hookeria incurva Hook. et Grevill. l. c. 231. *Schwaegr. Suppl.* III. 2. 1. t. 275. b.

Chaetophora incurva Hornsch. *Hor. phys. berol.* 65. t. 13. *Brid. Bryol. univ.* II. 336.

In Serra dos Orgãos ad radices arborum antiquissimarum, Februario, c. fr. deoperculatis: Beyrich; — in prov. Minarum: Setlow et M. 24

3. HOOKERIA MERKELII † surculo repente pinnatim aut bipinnatim ramoso, ramis complanatis; foliis subdistichis lingulatis brevissime mucronulatis basi subdimidiatis serrulatis, nervis duobus prope apicem abruptis, seta scabriuscula; sporangio parvo oblongo, operculo conico obtuse acuminato.

Tab. nostra III. Fig. I.

SURCULUS 1—3 poll., fastigiatis radiculosus. Rami breves, interdum pinnatim ramulosi, depressi et complanati. FOLIA rotundata aut brevissime mucronulata, cellulis prominulis serrulata, concava, pellucida, pallide viridia; nervis duobus crassis obscurioribus divergentibus infra ipsum apicem abruptis; retis areolis minutis subrotundis confertis, basilariibus linearibus laxissimis hyalinis. FLORES androgyni, oblongi, cauligeni, axillares. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora antheridia includentia late ovata, acuta, apice extremo serrulata, concava, binervia: nervis divergentibus dilute pallide viridibus apicem versus abruptis; retis areolis basilariibus sublinearibus apicem versus confertioribus et angustioribus subparallelogrammis, supremo apice minutis dense confertis subhexagonis; interiora sensim latiora et minoria, rotundato-ovata, acutiuscula, integerrima, concava, enervia; retis areolis laxis parallelogrammis; intima pistillidia includentia e basi lata concava lingulata, acuta, apicem versus argute serrata, binervia, pellucida: nervis crassis pallide viridibus apicem versus evanescentibus; retis areolis laxis parallelogrammis, medio apicem versus confertioribus et brevioribus oblongis, supremo apice minutis subrotundis. Antheridia 8, oblonga, obtusa, filamento brevissimo, turgida, pellucida. Pistillidia 4—6, antheridiis longiora, germine oblongo hyalino, stylo duplo longiore rufescente, stigmate incrassato hyalino. Paraphyses pistillidibus vix longiores, filiformes, 6—7 articolatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, brunnea, apice fusca. SETA uncialis, erecta, apice curvata, incrassata et paulo granulata, flexuosa, siccitate tortilis, ferruginea. SPOANGIUM ob setam curvatam horizontale, inaequale, curvulum, rugosum, fuscum. PERISTOMII exterioris dentes 16, humiditate apice incurvi, siccitate patentes, lanceolati, repente in acumen subulatum subnodosum pallidius ad tertiam partem longitudinis angustati, parte inferiori latiori linea media verticali lata diaphana notati, subtilissime transversim costati, costis ad marginem prominentibus, fuscis; interius membrana lutea, plicata, in dentes 16 exterioribus vix breviores, lanceolatos carinatos pertusos articulos producta. OPERCULUM convexum, rostello brevi obtusiusculo recto rufescente, badium. CALYPTRA mitraeformis, subulata, sulcata, basi decemfida, scabriuscula, straminea, apice fusca.

Hookeria scabrisetae Hook. affinis, sed foliis lingulatis brevissime mucronulatis serrulatis, operculoque convexo rostellato distincta.

In utiginosis ad terram prope Sebastianopolin, Julio et Augusto, c. fr. maturis: Merkel. 24

4. HOOKERIA MICROCARPA † surculo repente, fasciculatim ramoso, ramis vage vel pinnatim ramulosis compressis; foliis parvis distichis, oblongo-lingulatis brevissime mucronulatis aut acutis serrulatis binerviis; sporangio cernuo parvo oblongo aequali, operculo conico-subulato.

Tab. nostra III. Fig. II.

RADIX capillaris. SURCULUS 2—3 poll., laxis, rufus, fasciculatim ramosus; rami prostrati, laxi, ut ramuli breves compressi, foliosi. FOLIA concaviuscula, inferiora sordide rufescentia, superiora pallide viridia, binervia: nervis inaequalibus divergentibus pallide rufescentibus infra apicem abruptis; retis areolis parvis subrotundis confertis hyalinis. FLORES monoeci; masculi

oblongi, folio caulino duplo breviores; FOLIA PERIGONIALIA exteriora ovata, acuta, concava, subhyalina, interiora 5—6, minutissima, late ovata, obtusa, concava, integerrima enervia, hyalina; retis cellulis elongatis amplissimis. Antheridia 6—8, oblonga, parum curvata, truncata, griseo-viridia. Paraphyses filiformes, 6-articulatae, hyalinae, articulis medioeribus. Feminei magnitudine et forma masculorum; FOLIA PERICHAETIALIA interiora ovato-acuminata, sursum angustiora et lanceolata, concava, apice serrulata; intima 3—4 e basi latiore concava lingulata, antice profundius serrata, omnia binervia hyalina; nervis paullum infra apicem abruptis. Pistillidia 4—5, germine oblongo pellucido, stylo duplo longiori filiformi rufescente, stigmatem paulo incrassato apice hyalino. Paraphyses copiosae, filiformes, pistillidiis longiores, articulatae, articulis brevibus, hyalinae. VAGINULA cylindrica, brunnea, apice fusca, foliis perichaetialibus adnatis tecta. SETA $\frac{1}{2}$ —1 poll., erecta, apice curvata et incrassata, parum flexuosa, siccitate tortilis, inferne laevis, supra scabruscula, purpurascens. SPORANGIUM parvum cernuum, oblongum, subaequale, sub ore parum angustatum, badium. PERISTOMIUM apice incurvum: exterioris dentes lanceolati, parte antic dimidia in acumen subulatum nodosum albescens contracti, a basi ad medium linea media lata diaphana perpendiculari notati, subtilissime transversim costati, costis ad margines prominentibus, badii; interius membrana lutea plicata in dentes carinatos, lanceolato-acuminatos, flexuosos, solidos, articulatos, exteriorum longitudine, partita. OPERCULUM longitudine $\frac{2}{3}$ urnae, badium, rostro pallidior. CALYPTRA mitraeformis, subulata, basi in 8—10 laciniis profundas partita, glabra, straminea, apice fusca.

In prov. *Minarum Ger. et ad Fanado in Minis novis*: M. 24.

5. HOOKERIA PENDULA Hook. surculo decumbente vage ramoso, ramis pinnatis curvatis compressis, foliis imbricato distichis ovatis obtusiusculis integerrimis, nervis duobus divergentibus infra medium evanescentibus; sporangio obovato nutante, operculo conico rostrato.

Hookeria pendula Hook. *Musc. exot.* 17. t. 53. Kunth. *Synops. pl. aequin.* 1. 60.

Chaetophora pendula Brid. *Bryol. univ.* II. 338 et 764. Radd. *Critlog. bras.* 4.

In arborum truncis prope Tejuca vicinia Sebastianopoleos: Raddi. 24.

6. HOOKERIA MARTIANA † surculo repente subpinnato ramoso, ramis compressis; foliis distichis late ovatis basi subdimidiatis apice subrotundatis brevissimis mucronulatis integerrimis binerviis; sporangio nutante oblongo inaequali, operculo hemisphaerico acuminato recto.

Tab. nostra III. Fig. III.

SURCULUS 1—2 poll., radiculosus, aliquoties divisus indeque subpinnatus. Rami simplices aut ramulosi, compressi, repentes, fasciculatim radiculosi. FOLIA basi quasi pterygoidea, concaviuscula, apicem versus cellulis prominulis denticulata, amoene viridia; nervia duobus latis divergentibus in folii dorsum prominentibus infra apicem abruptis concoloribus: retis areolis subrotundis seu rhomboideis laxis hyalinis. FLORES dioeci? monoeci? Feminei ramuligeni: FOLIA PERICHAETIALIA exteriora, pellucida, binervia; in perichaetio fructifero late ovata, acuminata, integerrima, interiora 5—6 e latiore basi subligulata, acuta, apice serrata. Retis areolae elongato-hexagonae. Intima 2—3 ovata, longe acuminata, integerrima, enervia: retis areolis laxissimis parallelogrammis. VAGINULA cylindrica, brunnea, apice fusca. SETA 6—9 lin., erecta, parum flexuosa, apice curvata et incrassata, siccitate tortilis, laevis, purpurascens, sursum rufescens. SPORANGIUM —, angustum, inaequale, latere superiori gibbosa, laeve, badium. PERISTOMIUM hemisphaericum: exterioris dentes lanceolati, in acumen subulatum dimidiae longitudinis contracti, linea media diaphana perpendiculari notati, sub-

tilissime transversim costati, costis ad margines prominentibus, badii, apicibus pallidioribus; interius membrana lutea, plicata, in dentes 16 carinatos lanceolato-acuminatos exteriores aequantes solidos trabeculatos (articulatos) partita. OPERCULUM rectum, dimidiam urnam longum, badium. CALYPTRA mitraeformis, subulata, basi in 8—10 laciniis breves partita, glabra, straminea, apice rufescens.

In inundatis ad flumen S. Francisci prope Joazeiro in prov. Bahiensi, Aprili: M. 24.

7. HOOKERIA PALLIDA † surculo prostrato subpinnatim ramoso, ramis subsimplicibus brevibus compressis prostratis; foliis distichis ligulatis breviter mucronulatis serrulatis binerviis, seta scabra; sporangio brevi nutante obovato gibboso, operculo conico-subulato longitudine urnae.

Tab. nostra III. Fig. I.

SURCULUS uncialis, basi radiculosus, vage interdum subpinnatim ramosus, fuscus; rami plerumque simplices. FOLIA erecto-patentia, apicem versus cellulis prominulis serrulata, basi concaviuscula, luteo-viridia, nervis 2 crassis concoloribus divergentibus in folii dorsum prominentibus infra apicem abruptis: retis areolis in basi folii sublinearibus laxis ad medium versus magis magisque minoribus et confertioribus irregularibus subrotundis. FLORES androgyno-approximati, gemmiformes, ovati, axillares. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora 3—4 ovata, longius mucronulata, quam caulina, apice serrulata, concava, binervia, pellucida: nervis tenuioribus laxioribus infra apicem abruptis; retis areolis basi ad medium folii laxis elongatis, a medio versus apicem minoribus et confertioribus, apice subrotundis; interiora 4—6 minora, ovata, breviter acuminata, integerrima, binervia, hyalina: nervis latis laxis dilute viridibus; retis areolis subhexagonis laxis apice duplo minoribus irregularibus; intima 2—3 minutissima, ovata, acuta, integerrima, concava, enervia, hyalina, retis areolis parallelogrammis subaequalibus laxis. Antheridia 4—6, oblonga, filamentum brevi reticulata, rufescentia. Pistillidia 3—4, illis paulo longiora germine oblongo albescente, stylo lineari duplo longiori fusciscente, stigmatem incrassato. Paraphyses filiformes, pistillidiis longiores, 7-articulatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, badia, apice fusca. SETA 6—8 lin., erecta, apice curvata et incrassata, parum flexuosa, siccitate tortilis, scabra, purpurascens. SPORANGIUM breve, nutans, obovatum, gibbosum, laeve, badium. PERISTOMIUM exterioris dentes humiditate incurvi, siccitate patentes, lanceolato-subulati, a basi sursum linea media diaphana perpendiculari notati, subtilissime transversim costati costis ultra margines prominentibus, badii, apice pallidiores; interius membrana lutescens, plicata, in dentes 16 humiditate et siccitate conniventes, carinatos, lanceolato-acuminatos, exterioribus longitudine aequantes, solidos, articulatos producta. OPERCULUM rectum, basi badium, apicem versus luteum. CALYPTRA mitraeformis, subulata, basi in 8—10 laciniis profunde fissa, glabra, pallide rufescens, apice atro-fusca.

Hookeriae depressae Walk. Arnott. affinis, sed differt: caulibus ramisque compressis, foliis distichis ligulatis nervis fere ad apicem excurrentibus, seta scabra, operculo conico-subulato longitudine urnae, calyptra basi profunde laciniata.

Epidendrum secundum flumen Amazonum et in Minis generat. e. g. ad Villam Riccam: M.; — ad truncos putridos sitvarum umbrosarum prope Tijuca et alibi in prov. Rio de Janeiro, Octobri: Beyrich et Olfers. 24.

8. HOOKERIA OLFERSIANA † surculo repente fastigiatim ramoso, ramis brevibus compressis; foliis distichis laxiusculis oblongis acuminatis integerrimis pellucidis binerviis, nervis supra medium dissolutis; sporangio nutante oblongo-ovato, operculo hemisphaerico acuminato recto obtusiusculo.

Tab. nostra III. Fig. IV.

SURCULUS $\frac{1}{2}$ —1-unc., radiculosus, rufus. Rami simplices, interdum pinnati, ut caulis, compressi et foliosi. **FOLIA** laxiuscula, erecto-patentia, basi concaviuscula, pellucida, binervia: nervis divergentibus tenuibus dilute viridibus supra medium evanescentibus; retis areolis irregularibus subhexagonis amplissimis hyalinis. **FLORES** monoeci, cauligeni, masculi folio caulino triplo minores, ovati. **FOLIA PERIGONIALIA** exteriora late-ovata, acuminata; interiora sursum latiora et breviora, ovata, acuta; intima minutissima, rotundato-ovata, omnia profunde concava, integerrima, enervia, hyalina: retis areolis hexagonis aut rhomboideis quam in foliis caulinis parum minoribus et confertioribus. Antheridia 8—10, late oblonga, truncata, filamenta brevissimo, reticulata, rufescentia. Paraphyses paucissimae, antheridiis vix longiores; subulatae, 4-articulatae, articulo supremo longissimo, hyalinae. Feminei conici; **FOLIA PERICHAETIALIA** lanceolata, longissime acuminata, integerrima, basi concava, enervia, hyalina: retis areolis hexagonis amplissimis. Pistillidia 4—6, germine oblongo fusciscente, stylo filiformi purpurascens, stigmate incrassato. Paraphyses filiformes, articulatae, hyalinae. **VAGINULA** ovata, brevis, brunnea. **SETA** 6—8 lin., erecta, apice curvata et incrassata, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. **SPORANGIUM** aequale, badium. **PERISTOMIUM** humiditate incurvum, siccitate erecto-patulum: exterioris dentes lanceolato-subulati, e basi ultra medium linea media longitudinali diaphana notati, subtilissime transversim costati, basi rufescentes, apicem versus sordide lutei; interius membrana lutescens plicata in dentes 16 lanceolatos, carinatos, articulatos, exterioribus longitudine aequales, solidos producta. **OPERCULUM** urnae longitudine, rectum, basi urnae concolor, apicem versus albescens. **CALYPTRA** mitraeformis, subulata, basi 8-fida, glabra, straminea apice fusciscente.

Ad Tijuca in vicinia Sebastianopoleos: Olfers; — loco natali haud indicato: Sellow. 2.

9. HOOKERIA NITENS † surculo repente vage ramoso, ramis elongatis complanatis; foliis distichis patentibus apice subrecurvatis, oblongo-acuminatis, basi subdimidiatis, apice remote et argute serratis binerviis, nervis infra medium evanescentibus; sporangio suberecto ovato brevi, operculo —.

SURCULUS uncialis et longior, inferne fasciculatim radiculosus. Rami elongati, interdum ramulis brevibus, depressi, pennaeformes. **FOLIA** basi subdimidiata seu pterygoidea, concava, binervia, luteo-viridia, nitentia: nervis divergentibus concoloribus tenuissimis laxis vix conspicuis infra medium evanescentibus; retis areolis parallelogrammibus angustis. **FLORES** aut dioeci aut monoeci. Feminei copiosi, axillares, folio caulino duplo breviores, ovati, gemmiformes; **FOLIA PERICHAETIALIA** exteriora late ovata, acuminata, integerrima, concava, enervia, hyalina: retis areolis parallelogrammibus angustis; interiora sensim minora et brevius acuminata aut acuta, retis areolis laxioribus; intima 2—3 minutissima, subrotunda, ad apicem margine inaequali, cellulis laxioribus. Pistillidia 20—36, germine oblongo albescente turgido, stylo triplo longiori subulato rufescente, stigmate incrassato hyalino. Paraphyses copiosae, illis vix longiores, filiformes, 6—7-articulatae, hyalinae. **VAGINULA** cylindrica, griseo-viridis, apice fusca. **SETA** vix semiuncialis, erecta, apice incrassata, laeviuscula, purpurascens, superne pallidior. **SPORANGIUM** suberectum, ovatum, breve, reticulatum, badium. **PERISTOMIUM** exterioris dentes humiditate incurvi, siccitate recurvato-patentes, lanceolato-subulati, linea media perpendiculari diaphana a basi ultra medium notati, subtilissime transversim costati, costis ad margines prominentibus, intense rufi, interius membrana lurido-lutea, plicata, in dentes 16, exteriorum longitudine et cum iis alternantibus, humiditate conniventes, siccitate erectos, pertusos et trabeculatos producta. **OPERCULUM** non vidi. **CALYPTRA** mitraeformis, subulata, basi 6—8-fida, glabra, straminea, apice fusca.

Ad truncos putridos sitvarum umbrosarum prope Novo-Friburgum in societate Lepidopili subenervis; Decembri, c. fr. maturis: Beyrich. 2.

10. HOOKERIA SELLOVII † surculo declinato inferne simplici superne subfastigiatim ramoso, ramis brevibus complanatis pinnatis; foliis binerviis caulinis remotis conspersis subcordatis breviter acuminatis serrulatis, rameis distichis ovato-lanceolatis acutis argute serratis, nervis infra medium dissolutis; sporangio oblongo aequali, operculo —.

SURCULUS uncialis, apice radicans, rufus. **FOLIA** conspersa, patentia seu subsquarrosa, concaviuscula; ramea disticha, erecto-patentia, concava, omnia binervia, pallide viridia: nervis debilibus concoloribus; retis areolis linearibus laxiusculis. **FLORES** monoeci, cauligeni. Masculi ovati; **FOLIA PERIGONIALIA** exteriora ovato-lanceolata, acuminata, basi subvaginata, apicem versus obscure serrulata, dilute viridia; retis areolis linearibus laxis; interiora sensim breviora et latiora, intima 2 minuta, latissime ovata, breviter et obtuse acuminata, profunde concava, integerrima, hyalina; retis areolis parallelogrammibus laxissimis; omnia enervia. Antheridia 12, oblongo-cylindrica, parum curvata, truncata, reticulata, filamenta brevissimo, ferruginea. Paraphyses numerosae, antheridiis dimidio longiores, filiformes, crassae, 5—9-articulatae, articulo terminali acuto, hyalinae. Feminei conici; **FOLIA PERICHAETIALIA** exteriora ovato-lanceolata, acuminata, concava, pallide viridia; retis areolis parallelogrammibus laxis; interiora longiora et angustiora; intima 2—3 lanceolata in acumen subulatum flexuosum longitudine aequali producta, subhyalina; retis areolis parallelogrammibus laxioribus, quam in exterioribus; omnia subintegerrima enervia. Pistillidia 8, germine oblongo virescente, stylo duplo longiori purpurascens, stigmate dilatato. Paraphyses numerosae, pistillidiis duplo longiores, filiformes, 14—16-articulatae, hyalinae. **VAGINULA** cylindrica, dilute brunnea, apice fusca. **SETA** 8—9 lin., erecta, apice curvata, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. **SPORANGIUM** ob curvaturam setae horizontale, oblongum, aequale, paulo rugosum, badium, ore purpurascens. **PERISTOMIUM** exterioris dentes 16 destructi erant, interius: membrana lutescens plicata in dentes 16 late lanceolato-subulatos, carinatos, medio perforatos, articulatos, ciliis binis subulatis articulatis hyalinis interpositis, producta. **OPERCULUM** hemisphaericum, acuminulo brevissimo conico-obliquo, badium. **CALYPTRA** non visa.

Hookeriae hypnoidi maxime affinis, sed differt: foliis distichis patentibus ovato-lanceolatis acutis argute serratis et sporangio oblongo.

In Brasilia, loco natali non indicato: Sellow. 2.

11. HOOKERIA HYPNOIDES † surculo repente irregulariter subpinnatim ramoso, ramis brevibus erectis curvatis; foliis dense imbricatis subsecundis late ovatis acuminatis obscure serrulatis binerviis, nervis debilibus obscuris infra medium dissolutis; sporangio obovato brevi inaequali curvato, operculo hemisphaerico-conico paulo incurvo, calyptra cucullata pilosa.

SURCULUS 1—2 unc., fastigiatim radiculosus, dense foliosus, fuscus. Rami curvati, breviter ramulosi. **FOLIA** erecto-patentia, concava, obscure et remote serrulata, luteo-viridia, nervis 2 debilibus obscuris infra medium dissolutis concoloribus; retis areolis linearibus confertis. **FLORES** monoeci, cauligeni, minutissimi. Masculi ovati; **FOLIA PERIGONIALIA** exteriora antheridiis duplo longiora, lanceolata, acuminata, incurvata, carinata, remote et argute serrata, viridia; nervis 2 obscuris brevissimis concoloribus instructa; retis areolis parallelogrammibus angustis; interiora breviora rotundato-ovata, acuminata, acumene patente, profunde concava, subintegerrima, enervia, retis areolis laxioribus; intima parva, latissime ovata, acuta, integerrima. Antheridia 4—6, oblonga, truncata, reticulata, filamenta

brevissimo, ferruginea; paraphyses nullae. Feminei conici, rarissimi. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora ovata, breviter acuminata, concava; interiora longiora, oblonga, longe acuminata; intima 2—3 minuta, lanceolata; omnia integerrima, enervia, dilute viridia; retis areolis parallelogrammis laxis. Pistillidia 3, magna, germine oblongo fusciscente, stylo duplo longiori purpurascens, stigmatem dilatato hyalino. Paraphyses paucae, filiformes, 8—9-articulatae, pistillidiorum longitudine, hyalinae. Folia perichaetialia circa fructum lanceolato-subulata, basi subvaginata apice parum recurvata. VAGINULA cylindrica, membranacea, glabra, brunnea. SETA uncialis et longior, erecta, apice curvata et incrassata, flexuosa, siccitate tortilis laevis, purpurascens, apice pallidior. SPORANGIUM ob curvaturam setae nutans, obovatum, breve, inaequale, curvulum, paulo rugosum, badium. PERISTOMI exterioris dentes humiditate incurvi, siccitate patentes, lanceolati, acuminati, a basi ad medium linea media verticali angustissima diaphana notati, subtilissime transversim costati, costis ad margines prominentibus, ferruginei, apicem versus subhyalini; interiorum membrana lutescens plicata in dentes 16, exterioribus longitudine aequales, lato-lanceolatos, carinatos, solidos, articulatos, ciliis subulatis, articulo inferiori plerumque bifido, hyalinis interpositis, producta. OPERCULUM longitudine dimidii sporangii, apice paulum incurvatum, badium. CALYPTRA cucullata, apice pilis solitariis longis et crassis obsita, straminea.

Hookeriae praelongae Walk. Arnott., in Wern. Transact. V. 203., simillima, sed differt: foliis imbricatis subsecundis serrulatis binerviis. — Etsi hujus speciei peristomium a structura, generi *Hookeriae* peculiari, in eo discedat, quod cilia dentibus peristomii interni interjecta sint, huic generi tamen potius quam *Hypnis* consociandum esse existimo.

Prope Tijuca in vicinia Sebastianopoleos: Olfers. 24

12. HOOKERIA GIGANTEA † surculo repente irregulariter pinnato, ramis brevibus erecto-patentibus compressiusculis obtusis; foliis subbifariis imbricatis subsecundis oblongo-lanceolatis obtusis undulatis flexuosis serrulatis binerviis, nervis supra medium abruptis; sporangio nutante oblongo-subclavato, operculo —.

SURCULUS $\frac{1}{2}$ —1 ped., firmus, crassus, foliosus, fuscus, latere inferiore radiculosus, radiculis capillaribus fuscis. Rami circiter semiunciales, densissime foliosi, apice subincurvi. FOLIA in latere ramulorum inferiore appressa, in superiore assurgentia, lateralia incurva, a medio ad apicem remote serrulata, concava, pallide viridia, adultiora rufescentia, nitentia, binervia: nervis crassiusculis parum divergentibus obscure viridibus supra medium abruptis; retis areolis linearibus angustissimis. FLORES probabiliter dioeci. Feminei ramigeni, parvi, conici; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora adpressa, ovato-acuminata, apicem versus leniter serrulata, concava, binervia, nervis obscuris infra medium evanescentibus; interiora e basi latiore ovata concava, lineari-lanceolata, apicem versus remote serrata, nervis duobus vix visibilibus infra basin latiore evanescentibus; intima 3—4 lanceolata, acuminata, subintegerrima, enervia; omnia subhyalina, retis areolis angustissimis subserpentinis. Pistillidia copiosissima, circiter 32, germine oblongo brevi fusco, stylo triplo longiori lineari fusciscente, stigmatem incrassato hyalino. VAGINULA brevis, cylindrica, brunnea. SETA semuncialis, erecta, apice parum curvata, crassa, laevis, fusco-purpurea. SPORANGIUM coriaceum, fusco-badium. PERISTOMIUM apice incurvum; exterioris dentes ad medium lato-lanceolati, linea media angusta diaphana perpendiculari notati, subtilissime transversim costati, costis ad margines prominentibus, pallide rufescentes, supra medium repente angustati, subulati, subnodosi et denticulati, pallidiores; interiorum membrana lutea plicata in dentes 16 exterioribus paulo longiores subulato-capillares, carinatos, apice flexuosos, articulatos, solidos producta. OPERCULUM non observatum. CALYPTRA juvenilis subulata, glabra, straminea, apice fusca.

Conspicua et maxima specierum generis *Hookeriae* hactenus cognitarum, quae foliis sursum curvatis, idcirco fere secundis primo intuitu maxime discrepare videtur, diligenter vero disquisita cum reliquis optime convenit.

In silvis prov. Paraënsis et ad ripas fluminis Amazonum: M. 24

13. HOOKERIA LEPTORHYNCHA Hook. et GREVILL. surculo repente gracili laxo vage ramoso, ramis brevibus ascendentibus; foliis laxe imbricatis laxis erecto-patulis lanceolatis acuminatis apice serrulatis binerviis, nervis apicem versus evanescentibus; sporangio parvo cernuo oblongo aequali, operculo conico-subulato erectiusculo.

Hookeria leptorhyncha Hook. et Grevill. l. c. 228. t. 5. *Schwaegr. Suppl. III. 2. 1. t. 174.*

SURCULUS vix uncialis. Rami copiosi, adscendentes vel erecti, semunciales, pauci simplices, plurimi ramulosi, nonnulli subpinnati, radicales. FOLIA concava, scabra, minus pellucida, quam pro coloris defectu autumnales, lurido-viridia, nervis 2 latis paulo divergentibus concoloribus; retis areolis parallelogrammis obsoleteis. FLORES probabiliter dioeci. Feminei minutissimi, axillares, gemmiformes; FOLIA PERICHAETIALIA 5—6, e basi latiore concava lanceolato-acuminata, apice serrata, enervia, hyalina; retis areolis laxioribus, quam in foliis caulinis. Pistillidia 6—8, germine oblongo purpurascens, stylo longiore subulato rufescente, stigmatem hyalino. Paraphyses paucissimae, filiformes, pistillidiis paulo longiores, articulatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, laevis, fusca. SETA 3—4 lin., erecta, apice curvata et incrassata, flexuosa, siccitate tortilis, laevis, inferne fusca, apicem versus purpurascens. SPORANGIUM deoperculatum ore amplo, laeve, badium. PERISTOMI externi dentes humiditate apice incurvi, siccitate erecti, lanceolati, acuti, a basi sursum linea media diaphana verticali notati, subtilissime transversim striati, basi rufescentes, lutei; interiorum membrana hyalina plicata in dentes 16 lanceolatos carinatos exterioribus longitudine aequales, solidos producta. (OPERCULUM urnae longitudine, conico-subulatum. CALYPTRA subulato-campanulata, basi sexfida, laevis, straminea, apice fusco: SCHWAEGR.)

In francis demortuis sitvarum antiquissimarum supra montes Serra dos Orgãos, Februario, cum fr. deoperculatis: Beyrich. 24

14. HOOKERIA REPENS Hook. et GREVILL. surculo repente irregulariter pinnato-ramoso, ramis brevibus compressis; foliis bifariis imbricatis subfalcatis lanceolatis longe acuminatis serratis binerviis, nervis obsoleteis supra medium evanescentibus; sporangio exiguo nutante obovato-oblongo paulo inaequali, operculo elongato-conico acuto.

Hookeria repens Hook. et Grevill. l. c. 231. t. 5. *Schwaegr. Suppl. III. 2. 1. t. 274. a.*

Hypnum Guadeloupense Brid. *Spec. musc. II. 96. Mant. 155. Bryol. univ. II. 395. Schwaegr. Suppl. I. 2. 189.*

SURCULUS $\frac{1}{2}$ —1 unc. FOLIA lateralia subfalcata, carinata, amoene viridia, nervis 2 obsoleteis supra medium folii evanescentibus; retis areolis parallelogrammis angustis obscuris. FLORES specie hermaphroditii, gemmiformes, ovati, axillares; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora patentia, caulinis similia, sed angustiora, longius acuminata, enervia; interiora magis magisque basi latiore concava et brevius acuminata, immo ovato-acuminata, concava, hyalina; intima 2—3 minora, lato-ovata, breviter acuminata, concava, subintegerrima, apice tantum serrulata, enervia, hyalina; retis areolis parallelogrammis. Antheridia 4—6, oblonga, filamento brevissimo, dilute fusciscentia. Pistillidia 3—4, germine oblongo in stylum filiformem, stigmatem dilatato coronatum exeunte, rufescentia. Paraphyses copiosae, antheridiis et pistillidiis tertia parte longiores, filiformes, articulis 6, versus apicem longioribus, hyalinae. VAGINULA cylindrica, adscen-

denti-curvata, membranacea. SETA 6—8 lin., erecta, apice arcuato-curvata et incrassata, substrumosa, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM exiguum, laeve, fusco-badium. PERISTOMIUM humiditate apice incurvatum, siccitate recurvato-patens: exterioris dentes lanceolato-subulati a basi ultra medium linea media verticali diaphana notati, subtilissime transversim costati, costis ad margines prominentibus, sordide lutei, basi rufescentes; interius membrana dilute lutescens, plicata in dentes 16 carinatos, lanceolato-acuminatos, exterioribus longitudine aequales, solidos, articulatos producta. OPERCULUM trientem urnae longum, basi illi concolor, sursum albescens, apice rufescens. CALYPTRA mitraeformis, subulata, glabra, integra, basi plicata, rufescens.

Flores non monoeci, ut Schwaegrichen eos l. c. descripsit, sed hermaphroditi vel potius androgyni, cum antheridia atque pistillidia iis foliis ex quarum axillis oriuntur disjungantur. Cum vero pauca tantum pistillidia adsint, Schwaegrichenium haec neglexisse puto, quod in examine microscopico facile fieri potest. In hanc opinionem eo magis inclino, quod flores femineos non descripsit.

Prope Sebastianopolin ad Tijuca: Olfers. 2.

15. HOOKERIA STRUMOSA † surculo repente laxo pin-natim ramoso; ramis confertis brevibus subsimplicibus compressiusculis; foliis dense imbricatis subhomomallis laxissimis ovatis longe acuminatis subpiliiferis integerrimis nervibus pellucidis; sporangio nutante oblongo inaequali strumoso, operculo conico longe rostrato.

SURCULUS 1 — 1½ unc., inferne fasciculatim radiculosus. Rami saepe iterum divisi. FOLIA subsecunda, erecto-patula, laxissima, concava, dilutissime viridia; retis areolis parallelogrammatis maximis. FLORES specie hermaphroditi, conici; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora minora, latiora, breviter acuminata, magis concava, quam caulina, interiora decrescentia et latiora, brevius acuminata. Antheridia circiter 12, oblongo-cylindrica, truncata, filamentum brevissimo, reticulata, turgida, effoeta ferruginea. Pistillidia circiter 8, antheridiis longiora, germine oblongo viridibrunneo, stylo longiore subulato purpurascens, stigmate vix incrassato subhyalino; paraphyses paucissimae, pistillidiis duplo longiores, biarticulatae aut sextarticulatae, articulo supremo longissimo, hyalinae. VAGINULA cylindrica, membranacea, glabra, viridi-brunnea, apice fusca. SETA vix semuncialis, ascendens, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM curvulum, basi strumosum, rugulosum, fuscum. PERISTOMIUM exterioris dentes humiditate apice incurvi, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali lata diaphana notati, subtilissime transversim costati, costis ad margines cristato-prominentibus inflexis, fuscis; interius membrana lutea plicata, areolata, in dentes 16 exterioribus vix breviores, lanceolatos, carinatos, solidos, articulatos producta. OPERCULUM longe et oblique rostellatum, urnae longitudine, ferrugineum. CALYPTRA cucullata, pilosa, straminea.

Chaetophora orthotrichoides Brid. Bryol. univ. II. 334. (Leskia orthotrichoides Radd. Critt. bras. 6.) ad hoc genus non pertinet, sed, ut mihi saltem videtur, species est aliqua generis Macromitrii aut Schlottheimiae, jam supra descripta.

In truncis demortuis silvarum antiquissimarum, in Serra dos Orgãos, Februario, et prope Sebastianopolin, Octobri: Beyrich; — in lapidibus ibidem, Julio et Augusto, c. fr. maturis: Merkel; — prope Tijuca: Olfers. 2.

XLI. HELICODONTIUM SCHWAEGR.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus 16, humiditate pyramidalibus, siccitate ad basin usque fere involutis lanceolato-subulatis trabeculatis; interius membrana in dentes totidem cum exterioribus alternantes et lon-

giores lanceolato-subulatos a basi usque ad medium perforatos fissa. CALYPTRA cucullata, glabra. FLORES monoeci, axillares, gemmiformes. — Genus heterooclitum Leskiae, forsitan melius cum illo conjungendum.

Schwaegr. Suppl. III. 2. 2. t. 293. Leskiae Spec. Auct. Endl. Gen. n. 572.

1. HELICODONTIUM TENUIROSTRE SCHWAEGR. surculo repente gracili vage ramoso, ramis brevibus subsimplicibus; foliis erecto-patentibus ovatis acuminatis integerrimis submarginatis, nervo supra medium evanescente; sporangio erecto oblongo, operculo hemisphaerico longe rostellato obliquo.

Helicodontium tenuirostre Schwaegr. Suppl. III. 2. 2. t. 293.

SURCULUS uncialis et longior, interdum subpinatim ramosus, rufus. Rami plerumque erecti et simplices. FOLIA densa, sparsa, concava, luride-viridia; nervo lato obscurius colorato; retis areolis parallelogrammatis laxis, marginalibus duplo majoribus seriem unam constituentibus magis pellucidis. FLORES monoeci, cauligeni, gemmiformes; masculi ovato-acuminati, foliis caulinis duplo breviores; FOLIA PERICHAETIALIA late ovata, profunde concava, integerrima, enervia, angustissime marginata, pellucido-viridia; retis areolis centralibus maximis parallelogrammatis, iis, quae marginem spectant magis magisque minoribus et subrotundis, marginalibus linearibus angustis. Antheridia 4—6 (ex Schwaegrichenio 12) brevia, ovata, truncata, reticulata, filamentum brevissimo, rufescentia. Paraphyses paucissimae, antheridiis triente longiores, filiformes, articulatae, hyalinae. Feminei conico-acuminati, foliorum caulinarum longitudine; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora lanceolato-ovata, acuminata, concava, integerrima, dilute viridia, aut enervia aut nervo debili obsoletissimo medium versus dissoluto instructa, retis areolis parallelogrammatis magis aequalibus et laxioribus, quam in foliis caulinis; interiora e basi ovata concava in tenuissimum acumen contracta, enervia, subhyalina, retis areolis parallelogrammatis laxis; intima 2—3 minutissima, vix dimidia longitudine, lanceolato-subulata, enervia, hyalina; retis areolis sublinearibus. Pistillidia 8—10, germine breviter stipitato parvo ovato-fusco, stylo duplo longiore subulato ferrugineo; stigmate dilatato laciniato hyalino. VAGINULA oblonga, glabra, badia. SETA 4—5 lin., erecta, paulum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM erectum, oblongum, siccitate infra os constrictum, deoperculatum ore dilatato, laeve, brunneum, ore rufescente. PERISTOMIUM externi dentes humiditate pyramidato-conniventes, siccitate fere ad basin usque involuti, lanceolato-subulati, trabeculati, solidi, pallide rufescentes; interius membrana reticulata flava, in dentes totidem cum exterioribus alternantes et longiores lanceolato-subulatos carinatos, articulatos, a basi supra medium lacunis angustis perforatos, apice solidos fissa. OPERCULUM flavum. CALYPTRA cucullata, parva, glabra, straminea.

In truncis arborum ad Novo-Friburgum et in Serra dos Orgãos, inter Leskiam apophysiatam, Decembri — Februario: Beyrich; — in Minis Generalibus, Majo: M. 2.

XLII. LESKIA HEDW.

SPORANGIUM laterale, aequale, exannulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus 16 conniventibus lanceolato-subulatis; interius membrana reticulata, carinato-sulcata in 16 processus lanceolato-subulatos, uniformes, aequidistantes, fissa. CALYPTRA cuculliformis, glabra. FLORES monoeci vel dioeci, rarissime specie hermaphroditi, laterales, gemmiformes.

Brid. Bryol. univ. II. 283. Endl. Gen. n. 572.

1. IMBRICATAE, LESKIAE GENUINAE, *Brid. Bryol. II. 284.*
Spec. 1—7.

(Folii imbricatis bifariis appresso-patulis, ramulis compressis.)

1. LESKIA CAESPITOSA HEDW. surculo repente vage ramoso, ramis prostratis; foliis imbricatis subsecundis oblongis breviter acuminatis integerrimis enerviis; sporangio subcernuo oblongo subapophysato, operculo hemisphaerico oblique rostellato.

Leskia caespitosa Hedw. *Spec. musc. 233. t. 49. f. 1—5.*
Sw. Fl. Ind. occ. III. 1807. Brid. Spec. musc. II. 55.
Schwaeagr. Suppl. I. 2. 166. Brid. Mant. 144. Brid. Bryol. univ. II. 288.

Hypnum caespitosum Sw. *Prodr. 142. Gmel. Syst. nat. II. 1345. Pal. Beauv. Prodr. 61. Brid. Musc. rec. II. 2. 51. Walk. Arnott. l. c. 62.*

Ad truncos arborum silvarum antiquissimarum prope Novofriburgum et in Serra dos Orgãos: Beyrich; — in prov. Minarum: M.; — primis anni mensibus fructificat. 4.

2. LESKIA AMBIGUA SCHWAEGR. surculo repente vage ramoso, ramis erectis; foliis sparsis ovato-acuminatis serrulatis ruptinerviis; sporangio urceolato substrumoso, operculo hemisphaerico longirostre.

Leskia caespitosae Hedw. simillima, sed foliis ruptinerviis nec enerviis distincta videtur. Stirpem hanc non vidi.

In Brasilia prope Sebastianopolin et ad fluvium Paquaquer, in truncis arborum: Beyrich. 4.

3. LESKIA AFFINIS † surculo repente fasciculato-ramoso, ramis subsimplicibus flexuosis, incurvatis; foliis densis subsecundis oblongis acuminatis integerrimis enerviis; sporangio parvo suberecto oblongo, operculo —.

SURCULUS 2—4 unc., hic illic radiculosus, fuscus. Rami 1—1½ unc., copiosi, laxi, erecti, incurvati, dense foliosi, rufi. FOLIA erecto-patentia, concava, involuta, enervia, straminea, nitentia; retis areolis linearibus obsolete. FLORES specie hermaphroditii, minutissimi, brevissime pedicellati, conici, fuscii. FOLIA PERIGONIALIA exteriora latissime ovata, acuminata, profunde concava, obscure serrulata, enervia, dilute rufescentia, retis areolis amplioribus, quam in caulibus; interiora latiora et brevius acuminata; intima 2—3 minutissima, latissima, subrotunda, mucronata; retis areolis parallelogrammibus laxis. Antheridia 4, oblonga, truncata, reticulata, filamenta brevissima suffulta, rufescentia. Pistillidia antheridiis triente longiora, germine oblongo fusco, stylo subulato purpureo, stigmate incrassato hyalino. Paraphyses nullae. VAGINULA cylindrica, glabra. SETA erecta, 3—4 lin., gracilis, flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM minutum, suberectum, oblongum, laeve, rufescens. PERISTOMII exterioris dentes conniventes, siccitate apice incurvi, lanceolati, a basi ultra medium linea media diaphana perpendiculari fissa et trabibus valde prominentibus notati, apicem versus simplices, rufescentes; interius membrana albida plicata reticulata in processu 16, dentibus exterioribus angustiores, lanceolatos subulatos articulatos, solidos producta. OPERCULUM et CALYPTRA non visa.

Leskia stramineae Hornsch. et *L. constrictae* Brid. simillima, sed a priori statura minori, ramificatione diversa, seta ter breviori et sporangio multo minori, a posteriori foliis oblongis nec cordatis et seta breviori facilis est distincta.

In silvis ad arbores prope Tijuca vicinia Sebastianopoleos, Aprili: Beyrich. 4.

4. LESKIA ADNATA RICH. surculo repente vage ramoso, ramis ascendentibus subsimplicibus compressiusculis; foliis remotiusculis vagis utrinque subpatentibus lanceolato-acuminatis integerrimis enerviis; sporangio minuto subcernuo subpyriformi

brevicollis, operculo conico-subulato subcurvato sporangio paullo longiori.

Leskia adnata Rich. in *Mich. Fl. Amer. bor. II. 73. Brid. Spec. musc. II. 56. Schwaeagr. Suppl. I. 2. 167. t. 84.*

Leskia microcarpa Brid. *Spec. musc. II. 73. Mant. 144. et Bryol. univ. II. 289.*

Hypnum apiocarpum Walk. *Arnott. l. c. 62.*

SURCULUS radiculosus, uncialis aut longior. FOLIA concava, pallide viridia; retis areolis parallelogrammibus angustissimis. FLORES monoeci: masculi minutissimi, gemmiformes, subglobosi, fusciscentes; FOLIA PERIGONIALIA exteriora circiter 6, ovata, acuminata; interiora duplo minor, magis magisque latiora et breviora; intima subcordato-ovata; omnia rufescentia, enervia, retis areolis laxioribus. Antheridia 12, minuta, ovata, lurido-rufescentia, reticulata, filamenta brevissima. Paraphyses nullae. FOLIA PERICHAETIALIA conico-convoluta, 4 exteriora caulibus simillima sed angustiora et longius acuminata, interiora magis magisque longiora et angustiora; intima 2 basi lanceolata in acumen longissimum subulatum exeuntia, dilute fusciscentia. Pistillidia 16, parva, germine oblongo pallide rufescente, stylo subulato fusco longitudine aequali, stigmate obsolete hyalino. Paraphyses nullae. VAGINULA cylindrica, glabra, rufescens. SETA erecta, apice parum curvata, 4—5 lin., parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM minutum, operculatum, subcernuum, subpyriforme, collo brevi contracto, deoperculatum, nutans, obovatum, siccitate infra os contractum, laeve, brunneum. PERISTOMII exterioris dentes humiditate conniventes, siccitate incurvi, lanceolato-subulati, trabeculati a basi rufescente ultra medium linea media obscura verticali notati aut fissi, apice solidi, subhyalini; interius membrana lutea plicata, producta in processu 16, dentibus exterioribus breviores, subulatos, articulatos, solidos, una cellularum serie compositos, ciliis capillaribus singularibus longioribus interpositos. OPERCULUM urna paullo longius, basi rufescens, apice flavescens.

Quamquam nobis non licuerit stirpem nostram cum specimine originali comparare, nec icon, nec descriptio foliorum perichaetialium et peristomii interni, a Schwaeagr. datae, plantae nostrae penitus conveniant, tamen *Leskia adnatam* Richard. genuinam nos hic descripsisse persuasum est; praeter folia enim perichaetialia dentata (quae nostro musco re vera integerrima), et peristomii interni structuram (quoniam processibus hic illic cilia singula interjecta observavimus) descriptio illa Schwaeagr. optime quadrat cum *Leskia* nostra.

Ad arbores prope Sebastianopolin: Olfers; — et prope Novofriburgum, Novembri: Beyrich. 4.

5. LESKIA PATENS † surculo repente, vage ramoso, ramis prostratis simplicibus compressis; foliis confertis bifariis patentissimis vel subsquarrosis cordato-oblongis integerrimis enerviis, seta subverrucosa; sporangio parvulo erecto elongato-cyathiformi, operculo conico longissime rostellato urna longiori.

SURCULUS 1—2 poll., fuscus, rami erecto-patentes, prostrati, simplices, 6—8 lin., rigidiusculi. FOLIA acuta, concava, interdum convoluta, luteo-viridia, nitentia; retis areolis linearibus angustissimis. FLORES androgyni, minutissimi, subglobosi, breviter petiolati; FOLIA PERICHAETIALIA dense imbricata, exteriora 1—2 minutissima, lato-ovata, obtusiuscula, concava, integerrima, enervia, dilute viridia, retis areolis parallelogrammibus; interiora 2—3, antheridia includentia, duplo majora, subcordata, mucronata, concava, retis areolis parallelogrammibus; intima 2—3, pistillidiis incumbentia, longiora, angustiora, ovata, acuta, reliquis exterioribus aequalia. Antheridia circiter 20, pistillidia circumdantia, oblonga, parva, angusta, truncata, reticulata, filamenta brevissima, rufescentia. Pistillidia 3—4, illis tertia parte longiora, rufescentia, germine oblongo, stylo lineari, stigmate incrassato. Paraphyses nullae. VAGINULA oblonga, laevis, brunnea, apice fusca. SETA 3—5 lin., erecta, flexuosa, tortilis,

subverrucosa, purpurascens. SPORANGIUM laeve, badium. PERISTOMI exterioris dentes humiditate conniventes, siccitate incurvi, lanceolato-subulati, basi ultra medium linea media perpendiculari fissi, trabibus valde prominentibus instructi, apicem versus simplices, pallide lutei; interius membrana lutescens plicata reticulata, producta in processus 16 dentibus exterioribus longitudine aequales, lanceolato-subulatos, carinatos, a basi usque fere ad apicem in crura duo fissos, articulatos. OPERCULUM obliquum et longissimum, basi ferrugineum, rostro luteo. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca.

Leskia rufae Hornsch. similima, sed foliis subbifariis patentissimis vel subsquarrosis cordato-oblongis acutis, seta breviori et sporangio multo minori distincta est.

In Minis generalibus: M. 24

6. LESKIA CYLINDRICA † surculo repente irregulariter pinnatim ramoso, ramis patentibus prostratis plerumque simplicibus laxiusculis; foliis confertis erecto-patentibus lanceolatis longe acuminatis integerrimis enerviis; sporangio cernuo cylindrico-angusto, operculo conico-subulato oblique rostellato urna longiore.

SURCULUS uncialis et longior, fuscus; ramis rarius ramulosis, 3—5 lin., laxiusculis, dense foliosis. FOLIA concava, rufescentia; retis areolis linearibus angustis. FLORES non vidimus. FOLIA PERICHAETIALIA in perichaetio fructifero lanceolata, longissime acuminata, concava, marginibus involutis, integerrima, enervia, lurido-viridia; retis areolis laxioribus. VAGINULA cylindrica, laevis, pistillidiis emarcidis nonnullis obsita, brunnea. SETA 3—4 lin., erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, fuscescens, apicem versus pallidior. SPORANGIUM laeve, brunneum, ore purpurascens. PERISTOMI exterioris dentes humiditate conniventes, siccitate incurvi, lanceolato-subulati, basi ultra medium linea media perpendiculari fissi, trabibus parum prominentibus instructi, sursum simplices, rufescentes; interius membrana lutea, plicata, reticulata, in pressus 16, dentibus exterioribus longitudine aequales carinatos, articulatos producta. OPERCULUM basi ferrugineum, rostro luteo. CALYPTRA cucullato-subulata, glabra, straminea, apice fusca.

Leskia patenti et *L. fulvae* similima, ab utraque autem foliis lanceolatis longe acuminatis, porro a *L. patente* sporangio cylindrico, nec elongato-cyathiformi, et a *L. fulva* statura gracili, seta brevi et sporangiis longioribus angustis facile distinguenda.

In Serra d'Estrella ad truncos arborum silvestrium, Augusto: Beyrich. 24

7. LESKIA FULVA † surculo repente ramoso, ramis erectis simplicibus, rarius ramulosis dense foliosis; foliis dense imbricatis patentibus oblongis longe acuminatis integerrimis enerviis nitentibus; sporangio parvo suberecto seu cernuo oblongo parum inaequali, operculo subulato obliquum urnam longitudine aequante.

Leskia cirrifolia Schwaegr. Suppl. III. 2. t. 290.?

RADICULAE fasciculatae, capillares, purpurascens. SURCULUS 2—3 unc., rufus. Rami unciales, laxi, rarius nonnullis ramulis brevibus instructi, rufescentes. FOLIA in acumen ipsius folii dimidii longitudine parum flexuosum integerrimum excurrentia, profunde concava, pellucida, inferiore parte fusciscentia, superiore pallide viridia, nitentia: retis areolis linearibus confertis. FLORES monoeci. Masculi minutissimi ovati; FOLIA PERIGONIALIA late ovata, acutiuscula, concava, pallide viridia; interiora decrescentia, latiora, obtusiora et magis pellucida; intima 1—2 minutissima et hyalina, omnia integerrima, enervia. Antheridia 12—15, parva, oblonga, truncata, reticulata, filamentum duplo breviora instructa, rufescentia; paraphyses nullae. FOLIA PERICHAETIALIA fructifera ovato-acuminata, intima longiora, lanceo-

lata, longe acuminata, subvaginata, reliquis caulinis similia. VAGINULA cylindrica, membranacea, glabra, brunnea. SETA erecta, 8—9 lin., parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM parvum, suberectum vel cernuum, oblongum, parum inaequale, laeve, brunneum, basi fuscum. PERISTOMIUM hemisphaericum; exterioris dentes humiditate incurvi, siccitate erecti, lanceolati, acuminati, trabeculati, a basi ad medium ferruginei et linea media verticali angustissima diaphana notati, apicem versus solidi et hyalini; interius membrana subhyalina, in processus 16 exterioribus longitudine aequales, lanceolatos, carinatos, articulatos, solidos producta. OPERCULUM urnae longitudine. CALYPTRA cucullata, glabra, basi trifida, straminea, apice fusca. SEMINA subglobosa, virescentia.

In prov. Rio Negro ad fluvium Japurá, in montibus Arara-coara et Cupati, Decembri — Martio fructificat: M. 24

2. DISTICHAE, OMALIAE BRID. Bryol. II. 325.

8. LESKIA APOPHYSATA † surculo prostrato gracili vage ramoso, ramis compressis decumbentibus ramulis brevibus; foliis subdistichis remotis patentibus ovato-lanceolatis serratis, nervo evanescente; sporangio cernuo parvo ovato apophysato, operculo urna longiori e basi convexa subulato.

SURCULUS 1—1½ unc. Rami unciales, tenues, laxi, subpinnatim ramulosis, ramulis brevibus patentibus vel erectiusculis. FOLIA pallide viridia, nervo carinato, concolori supra medium evanescente instructa; retis areolis parallelogrammis angustis. FLORES monoeci, minutissimi, sessiles. Masculi ovati; FOLIA PERIGONIALIA 8, exteriora maxima et angustissima, lanceolata, acuminata, concava, leniter serrulata; interiora minora et latiora e basi ovata concava acuminata, integerrima; intima 2—3 minuta et latissima, lato-ovata, repente et breviter acuminata, profunde concava, integerrima, omnia enervia, dilute viridia; retis areolis parallelogrammis, interioribus magis magisque laxioribus. Antheridia 8, oblonga, truncata, paulo curvata, reticulata, filamentum brevissimo, ferruginea; paraphyses 12, filiformes, antheridiis duplo longiores, articulae, hyalinae. Flores feminei conici, angusti: FOLIA PERICHAETIALIA exteriora ovato-acuminata, concava; interiora longiora, lanceolata, longe acuminata in acumen longissimum subuliforme exeunte, dilute viridia; intima minuta, e basi lanceolata subulata, subhyalina; omnia integerrima, enervia; retis areolis parallelogrammis angustis. Pistillidia 6, brevia, germine oblongo basi hyalino ferrugineo, stylo subulato ferrugineo, stigmatibus incrassato hyalino. Paraphysis unica filiformis, articulata, pistillidiis plus quam duplo longior, hyalina. VAGINULA cylindrica, brunnea. SETA erecta, gracilis, sursum incrassata, laevis, parum flexuosa, siccitate tortilis, inferne purpurascens, superne flavescens. SPORANGIUM glabrum, brunneum, ore dilatato purpurascens. PERISTOMI externi dentes humiditate conniventes, siccitate erecti, lanceolato-subulati, trabeculati, solidi, ferruginei, apice pallidiores; interius membrana lutea, plicata, reticulata in processus 16 dentibus exterioribus longitudine aequali, lanceolato-subulatos, articulatos, carinatos a basi usque fere apicem fissos producta. OPERCULUM e basi convexa rufescente longissime subulatum flavescens. CALYPTRA deest.

Haec species, quodammodo ad *Hookerianam* accedens, crescit in Serra dos Orgãos ad truncos arborum silvestrium, Februario fructificat: Beyrich. 24

XLIII. HYPNUM DILL.

SPORANGIUM laterale, plerumque inaequale, latere superiore convexius, cum vel absque annulo. PERISTOMIUM duplex: exterius dentes 16 lanceolato-subulati, reflexiles; interius membrana carinato-sulcata, in dentes totidem nunc perforatos (in *Hypnis genuinis*

Brid.) nunc solidos (in *Stereodonte* Brid.), ciliis interjectis, fissa. CALYPTRA cucullata, glabra. FLORES monoeci, dioeci, rarissime polygami, gemmiformes, laterales.

Brid. Bryol. univ. II. 388. Endl. Gen. n. 566.

1. FOLIIS DISTICHIS. Spec. 1—10.

a) *Surculo vage ramoso, ramis subcompressis, foliis erecto-patentibus, laxiusculis. Praelonga.*

1. HYPNUM ELEGANTULUM Hook. surculo repente irregulariter pinnatim ramoso, ramis compressis pinnato-ramulosis apice radicantibus; foliis laxe subimbricatis subdistichis late subcordato-ovatis breviter acuminatis subplicatis serrulatis binerviis; sporangio cernuo obovato inaequali, operculo hemisphaerico-conico brevissime rostrellato.

Hypnum elegantulum Hook. *Musc. exot. II. 20. t. 184. Kunth. Synops. pl. aequin. I. 64. Brid. Bryol. univ. II. 411.*

FLORES monoeci, cauligeni: masculi ovati; FOLIA PERIGONIALIA exteriora 2—3 minuta, ovata, acuta, interiora oblongo-ovata, brevissime acuminata, intima 3—4 late cordato-ovata, abrupte longe acuminata, omnia integerrima, concava, enervia, retis areolis laxioribus, quam in foliis caulinis, parallelogrammis. Antheridia 9—10, oblonga, paulo-curvata, reticulata, filamento brevi, truncata, rufescentia; paraphyses nullae. Flores feminei duplo majores, conici; FOLIA PERICHAETIALIA caulinis longiora, apice recurva, exteriora 3—4, ovata, acuminata, concava; interiora e basi latiore abrupte in acumen longissimum canaliculatum excurrentia concava; intima 1—2 triplo minora, lanceolato-subulata; omnia subintegerrima, enervia, retis areolis laxiusculis linearibus. Pistillidia 20, germine oblongo angusto luride-viridi, stylo duplo longiori subulato rufescente, stigmatate dilatato hyalino. Paraphyses copiosae, filiformes, pistillidiis triente longiores, 10-articulatae, articulis sursum majoribus, lutescentes. VAGINULA cylindrica, luteo-brunnea. SETA 1½ unc., solitaria, erecta, apice paulo curvata et incrassata, gracilis, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM laeve, fusco-badium. PERISTOMII exterioris dentes 16 conniventes, siccitate patentes lato-lanceolato-subulati, solidi, subtilissime transversim costati, costis in marginibus prominentibus, apicem versus subdenticulati, ferruginei, apice hyalini; interius membrana lutescens plicata, producta in processu 16 exterioribus vix breviores lato-lanceolatos, apicem versus repente in subulam angustatos, canaliculatos, solidos, articulatos, ciliis solitariis lanceolato-subulatis paulum brevioribus interpositis. OPERCULUM luteo-rufescentis. CALYPTRAM non vidimus.

In prov. Minarum silvis primaevae ad S. Joannem Bapt., in prov. Sebastianopolitanae monte Corcovado et in tractu dicto Serra dos Orgãos, nec non in silvis ad fluv. Amazonum: Olfers, Beyrich, Merkel, Setlow, M. 24 Julio et Augusto fructificat.

2. HYPNUM ACORRHIZON † surculo ramisque erectis rigidis, apice descenditibus et radicantibus, bipinnatis, ramulis parum recurvatis; foliis subdistichis erecto-patentibus enerviis, caulinis lato-cordatis acuminatis serrulatis, rameis ovato-lanceolatis acutis argute serratis; sporangio nutante parvo breviter obovato aequali, operculo conico acuto parum curvato.

RADICULAE fasciculatae, capillares, ferrugineae. SURCULI 2—3 unc., ramique arcuato-declinati apicibus radicantes, ramulis 3—4 lin. FOLIA caulina remotiora, parum concava; ramea densiora, concaviuscula, omnia amoene viridia; retis areolis parallelogrammis, laxiusculis. FLORES monoeci, masculi ovato-acuminata; FOLIA PERIGONIALIA exteriora minuta, cordata, obtusa; interiora sursum majora et angustiora; intima 2 maxima, ovata, longe acuminata; omnia concava, integerrima, enervia, retis areolis parallelogrammis laxis. Antheridia 3—8, oblonga, truncata, stipite brevi, reticulata, ferruginea; paraphyses illis tertia

parte longiores, paucae, filiformes, 5-articulatae, articulo extremo subulato, hyalinae. Feminei conico-acuminati; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora ovato-acuminata, concava, pallide viridia; interiora longissima, e latiori basi concava subulata, pellucida; intima iterum breviora, lineari-subulata, subhyalina, omnia apicem versus remote et obscura serrulata, enervia; retis areolis laxioribus. Pistillidia 3—5, germine oblongo-rufescente, stylo filiformi hyalino, stigmatate incrassato; paraphyses numerosae, filiformes, duplo longiores quam pistillidia, et tertia parte longiores quam paraphyses in flore masculo, 11-articulatae, articulis inaequalibus, pallide virescentes. VAGINULA cylindrica, membranacea, virescens, apice fusca. SETA unc. et longior, erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, apice incrassata et parum curvata, inferne purpurascens, superne pallidior. SPORANGIUM nutans vel pendulum, rugosum, fuscum. PERISTOMIUM hemisphaericum: exterioris dentes humiditate incurvi, siccitate erecti, lanceolato-subulati, solidi, a basi ad medium linea media perpendiculari obscura notati, trabeculati, basi ferruginei, apicem versus hyalini et denticulati; interius membrana pallide lutescens, producta in dentes 16, exterioribus parum breviores, lanceolato-subulatos, solidos, articulatos, ciliis tribus dentibus tertiam partem brevioribus, subulatis subnodoso-articulatis hyalinis interpositis. OPERCULUM urnae dimidiae longitudine, ferrugineum. SPORAE minutissimae, angulatae. CALYPTRA non observata.

Hypno laxifolio Schwaegr. simillimum, sed differt: ramis bipinnatis, foliis distichis et seta laevi.

Ad arbores prope Novo-Friburgum, Januario: Beyrich. 24

3. HYPNUM ACUMINULATUM † surculo aliquoties diviso decumbente, ramis irregulariter ramulosis ramulisque complanatis; foliis distichis lato-ovatis acutiusculis cochleariformibus, apice lenissime denticulatis, enerviis; sporangio cernuo brevi obovato inaequali, operculo convexo acuminato dimidia urnae longitudine.

SURCULUS 2—3 unc. et longior, fuscus. Ramuli ½—1 unc., simplices, erecti, apice curvati, ut rami complanati. FOLIA laxe imbricata, subsecunda, erecto-patentia, in hemisphaerii formam excavata, pallide viridia, inferiora fusciscentia: retis areolis valde obscuris parallelogrammis angustis seriato-punctatis. FLORES dioeci. Masculi minutissimi, subglobosi, rufi; FOLIA PERIGONIALIA latissima, subrotunda, obtuse acuminata, subintegerrima, pellucida, enervia, interiora decrescenti-minora et pellucida, intima 2—3 minuta, mucronulata, subhyalina: retis areolis parallelogrammis laxis. Antheridia 14—16, breviter, oblonga, curvata, truncata, stipite brevissimo, reticulata, ferruginea. Paraphyses paucae, breves, filiformes, 4-articulatae, articulis inaequalibus hyalinae. Flores feminei conici: FOLIA PERICHAETIALIA exteriora lanceolata, acutiuscula, interiora lanceolato-acuminata, basi ventricosa, intima 2—3 minora, lanceolato-acuminata, subvaginata, omnia argute denticulata, amoene viridia, retis areolis linearibus laxis. Pistillidia 3, germine oblongo virescente, stylo filiformi purpurascens, stigmatate incrassato; paraphyses paucae, illis duplo longiores, filiformes, articulatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, membranacea, glabra, brunnea. SETA vix uncialis, erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens, apice incrassata et lutea. SPORANGIUM parvum, suberectum vel cernuum, glabrum, brunneum. PERISTOMII exterioris dentes lanceolato-subulati, a basi usque ad medium linea media verticali impressi, apice subdenticulati, costati, costis ad margines prominentibus, pallide ferruginei, apice subhyalini; interius membrana lutea reticulata plicata, promissa in dentes 16, exteriorum longitudine, lanceolato-subulatos, carinatos, lacunis angustis verticalibus perforatos, articulatos, ciliis solitariis seu binis subulatis articulatis pallidioribus interpositis. OPERCULUM badium. CALYPTRAM non vidimus.

In silvis udis ad fluvios Amazonum, Tefé, Japurá, e. g. prope oppidum Ega, Decembri: M. 24

4. HYPNUM OXYPOMA SCHWAEGR. surculo repente aliquoties diviso, ramis subpinnatis; foliis densis patentissimis subsquarrosis cordato-ovatis acuminatis serrulatis enervibus; sporangio horizontali oblongo parum inaequali, operculo conico acuto paulum curvato.

Hypnum oxypoma Schwaeagr. Suppl. III. 2. 1. t. 259. a.

SURCULUS gracilis, 2 unc. et longior, radiculis capillaribus fuscis obsitus, ramis fructiferis pinnatis, sterilibus plerumque simplicibus erectis vix semiuncialibus. FOLIA sparsa, inferiora brevissime, superiora increscenti-acuminata, concava, pellucida, pallide viridia; retis areolis oblongis, inferioribus laxioribus. FLORES monoeci. Masculi ovati; FOLIA PERIGONIALIA exteriora secunda, e basi latiore fusciscente longe acuminata, interiora sensim breviora et latiora, intima minuta, ovata, breviter acuminata, profunde concava, subhyalina; omnia integerrima, enervia, apice areolis ut in caulibus, sed laxioribus. Antheridia 10—12, oblonga, truncata, turgida, lutescentia. Paraphyses non numerosae, antheridiis triente longiores, filiformes, 8-articulatae, articulis tertiam partem longioribus quam latis, hyalinac. FOLIA PERICHAETIALIA sub fructu exteriora minuta, ovato-acuminata, interiora longiora, lanceolata, longissime acuminata, intima longissima, e basi latiore concava, subulata; omnia enervia, integerrima, retis areolis laxissimis. VAGINULA oblonga, brunnea, apice fusca. SETA uncialis, erecta, apice paulo incurvata et incrassata, laevis, siccitate tortilis, purpurascens. SPORANGIUM horizontale, oblongum, parum inaequale, siccitate ovato-oblongum, infra orificium constrictum, laeve, fuscum. PERISTOMII externi dentes humiditate apice conniventes, siccitate erecti, lanceolato-subulati, trabeculati, solidi, basi luteo-ferruginei, apice subhyalini; interius membrana lutea in dentes producta 16 exteriorum longitudine, lanceolato-subulatos, longissime acuminatos, solidos, articulatos, ciliis solitariis dentium fere longitudine subulato-filiformibus articulatis pallidioribus, cum basi sua in membranam descendente, interjectis. OPERCULUM urnae quadrantem partem longum, ferrugineum, basi fusciscentis.

Speciem H. elegantula affinem e Brasilia, loco non indicato, retulit Pohl. 2.

5. HYPNUM SPLENDIDULUM † surculo repente gracili laxissimo irregulariter ramoso, ramis brevibus subsimplicibus compressis; foliis distichis erecto-patentibus oblongo-acuminatis integerrimis enervibus; sporangio parvo cernuo obovato brevi inaequali, operculo hemisphaerico brevissime rostellato dimidia urnae longitudine.

SURCULUS $1\frac{1}{2}$ lin. ad 2 unc. longus, compressus, radiculosotomentosus, rufus, innovationibus nonnullis interdum subsfasciculatim aut inordinatim ramosus. FOLIA laxa imbricata, paulo obliqua, concaviuscula, dilute pallide viridia, nitentia; retis areolis parallelogrammis angustissimis longis. FLORES monoeci, cauligeni. Masculi minutissimi, subglobosi, rufi; FOLIA PERIGONIALIA 6—8, arcte imbricata, exterius minutissimum, ovatum, acutiusculum, concaviusculum, interiora 3 maxima, ovato-acuminata, concava, intima 3 minora, lato-ovata, acuminata, concava; omnia integerrima, enervia, subhyalina, apicem versus dilutissime ferruginea, retis areolis oblongis laxis. Antheridia 8, ovata, oblique truncata, reticulata, turgida, subhyalina, effoeta ferruginea. Paraphyses paucae dimidia illorum longitudine, filiformes, 5-articulatae, articulis sursum longioribus, hyalinac. Flores feminei brevissime pedicellati, conici; FOLIA PERICHAETIALIA 12, erecta, imbricata, exteriora 2—3 minuta, lato-ovata, acuminata, concava, interiora maxima, ovato-lanceolata longe acuminata concava, intima 2—3 lanceolato-subulata, subvaginata; omnia integerrima, enervia, subhyalina, retis areolis parallelogrammis laxis. Pistillidia 12, germine subcylindrico rufescente, stylo subulato germine duplo longiori purpurascens, stigmatem incrassato. Paraphyses paucissimae, pistillidiis vix longiores, filiformes, in-

aequaliter 6-articulatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, membranacea, brunnea. SETA 4—6 lin., erecta, parum flexuosa, gracilis, apice curvata et incrassata, laevis, siccitate tortilis, purpurascens, superne ferruginea. SPORANGIUM cernuum aut pendulum, oblongum, parum curvatum, substrumosum, deoperculatum orificio dilatatum iccirco obtuse subcylindriciforme, laeve, brunneum. PERISTOMII exterioris dentes incurvati, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali notati, costati, costis ad latera dentium cristato-prominentibus et inflexis, pallide ferruginei, apicem versus subdenticulati, punctati, hyalini; interius membrana lutescens areolata, producta in dentes 16 exterioribus paulo breviores, lanceolato-subulatos, carinatos, articulatos, solidos, ciliis solitariis paulo brevioribus capillaribus articulatis hyalinis interpositis. OPERCULUM subrectum basi rufo-fuscum, rostro luteo. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca.

In Serra dos Orgãos supra saxa et ad truncos arborum sit-vestrium, Februario, cum fr. maturis: Beyrich; — prope Tijuca in vicinia Rio de Janeiro: Olfers, Sellow, Merkel; — in Serra d'Estrella et prope urbem S. Pauli: M. 2.

6. HYPNUM GRACILLIMUM † surculo repente, innovationibus fasciculatim ramoso, ramis compressis subsimplicibus; foliis distichis erecto-patentibus subsecundis subobliquis ovato-acuminatis integerrimis enervibus; sporangio pendulo oblongo-ovato aequali, operculo conico acuto recto.

SURCULUS 1—2 lin., gracillimus, radiculosotomentosus, rufus; innovationes plerumque simplices, interdum brevissime ramulosae. FOLIA concava, pallide viridia; retis areolis sublinearibus angustissimis. FLORES monoeci: masculi minutissimi, subglobosi, rufescentes; FOLIA PERIGONIALIA 12, exteriora 2—3 minuta, lato-ovata, acutiuscula, interiora majora et latiora, mucronulata, intima 2—3 minima, subrotundo-ovata, acuta, profunde concava, omnia integerrima, enervia, subhyalina, apicem versus dilutissime virescentia; retis areolis parallelogrammis laxissimis. Antheridia 8, parva, ovata, truncata, reticulata, ferruginea. Paraphyses nullae. Flores feminei in basi caulis, masculis triplo majores, conici, brevissime pedicellati; FOLIA PERICHAETIALIA erecto-patentia, exteriora 2 minutissima, ovato-acuta, interiora sensim majora et acuminata, intima 3 erecta, longissima, e basi latiore concava vaginata lanceolato-subulata; omnia integerrima, intima subserrulata, enervia, subhyalina, retis areolis in basi folii subquadratis laxis, in medio et apicem versus parallelogrammis confertioribus. Pistillidia 12, longa, germine oblongo angusto rufo, stylo subulato ferrugineo, stigmatem incrassato. Paraphyses paucissimae, pistillidiis vix longiores, filiformes, articulatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, membranacea, laevis, viridi brunnea, apice fusca. SETA 4 lin., erecta, apice curvula, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, ferruginea, apicem versus pallidior et incrassata. SPORANGIUM deoperculatum, obconicum, curvatum, laeve, fusco-brunneum. PERISTOMII externi dentes incurvati, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, trabeculati, solidi, ferruginei; interius membrana lutea, areolata, producta in dentes 16 lanceolato-subulatos, carinatos, solidos, articulatos, ciliis solitariis brevioribus subulatis articulatis pallidioribus interpositis. OPERCULUM dimidia urnae longitudine, ferrugineum. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca.

Hypno splendidulo valde affine, sed operculo conico-acuto, nec hemisphaerico brevissime rostrato, distinctum est.

In prov. Minarum, locis umbrosis: M. 2.

7. HYPNUM BREVISETUM † surculo gracillimo repente subsfasciculatim ramoso, ramis vagis subsimplicibus complanatis; foliis distichis patentibus lanceolatis acuminatis subobliquis integerrimis enervibus; sporangio suberecto obovato brevi aequali, operculo hemisphaerico brevissime curvirostro.

RADICULAE capillares, fasciculatae, fuscae. **SURCULUS** tenerimus, 2—12 lin., basi innovationibus nonnullis subfasciculatim ramosus, ramis longitudine caulis, radicantibus. **FOLIA** laxè imbricata, concaviuscula, amoene viridia, pellucida: retis areolis parallelogrammis longis angustis. **FLORES** monoeci, cauligeni. **Masculi** minutissimi, subglobosi; **FOLIA PERIGONIALIA** dense imbricata, exteriora 2—3 minuta, ovata, acuta, concaviuscula, interiora majora et latiora, acuminata, intima 3 minora, rotundato-ovata, mucronulata, profunde concava; omnia integerrima enervia, subhyalina, retis areolis subquadratis laxissimis. **Antheridia** 8—12, parva, ovata, truncata, hyalina. **Paraphyses** nullae. **Flores** feminei in basi caulis, conico-acuminati, masculis duplo majores, brevissime pedicellati; **FOLIA PERICHAETIALIA** exteriora 2 ovato-acuminata, interiora majora lanceolata longe acuminata, intima 3 longissima e basi latiore concava lanceolato-subulata; omnia subintegerrima enervia, pellucida, pallide virescentia, retis areolis in basi folii subquadratis laxis, apicem versus confertioribus parallelogrammis longis angustis. **Pistillidia** 8, longa, germine oblongo angusto viridi-brunneo, stylo subulato rufo, stigmate incrassato; **paraphyses** nullae. **VAGINULA** cylindrica, membranacea, glabra, basi et apice fusca. **SETA** radicalis, 3 lin., erecta, gracilis, paulo flexuosa, siccitate tortilis, apice parum curvata et incrassata, laevis, ferruginea. **SPORANGIUM** suberectum, ob curvaturam setae cernuum, obovatum, breve, aequale, laxè areolatum, laeve, pallide brunneum, deoperculatum horizontale, fuscum. **PERISTOMII** exterioris dentes apice incurvi, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali impressa, apicem versus simplices, costati, basi rufescentes, superne albidii; interius membrana lutea areolata plicata, promissa in dentes 16 exterioribus longitudine aequales, una cellularum serie compositos, lanceolato-subulatos, articulatos, solidos, punctatos, ciliis brevioribus singularibus subulatis articulatis punctatis hyalinis interpositis. **OPERCULUM** dimidiae urnae longitudine, luteum, basi ferrugineum. **CALYPTA** cucullata, glabra, straminea.

Ad truncos arborum prope Rio de Janeiro, Julio et Augusto: Merkel. 24.

b) Surculo pinnatim ramoso. Taxiformia.

8. HYPNUM AUBERTI SCHWAEGR. surculo repente vage interdum subpinnato-ramoso, ramis complanatis subsimplicibus; foliis distichis amplexicaulibus ovatis acumine brevissimo recurvo, integerrimis, enervibus; sporangio subcylindrico, basi curvato et inaequali horizontali, operculo conico obtusiusculo parum obliquo.

Hypnum Auberti Schwaegr. Suppl. I. 2. 200. t. 88. Brid. Bryol. univ. II. 556.

Leskia nitens Brid. Spec. musc. II. 50.

In prov. Minarum et ad fluvium Amazonum: M. 24.

9. HYPNUM SELLOWII † surculo repente vage ramoso, ramis prostratis complanatis; foliis subdistichis cordato-ovatis breviter acuminatis remote et spinuloso-serratis, nervo debili evanescente; sporangio cernuo vel horizontali oblongo-cylindrico aequali, operculo conico longe rostrato rostro subulato-obliquo.

SURCULUS 1—2 unc. et longior, fuscus, juvenilis viridis. **Rami**, ut caulis, laxè foliosi, virides. **FOLIA** erecto-patentia, concava, a basi usque ad apicem remote sed spinuloso-serrata, viridipellucida, nervo concolore supra medium evanescente; retis areolis parallelogrammis angustissimis. **FLORES** monoeci. **Masculi** conici, minutissimi; **FOLIA PERIGONIALIA** exteriora minuta, ovata, acuta; interiora longiora, oblongo-lanceolata, intima maxima e basi latissima concava acuminata, apice patentia; omnia integerrima, enervia, hyalina, retis areolis parallelogrammis laxissimis. **Antheridia** 5, maxima, oblonga, lata, parum curvata, truncata, stipite brevissimo, pallide ferruginea, apice obscuriora. **Paraphyses** nullae. **Flores** feminei masculis duplo majores; **FOLIA**

PERICHAETIALIA exteriora lato-ovata, acuta, concava, integerrima, apice extremo obscure serrulata; interiora longiora, oblongo-lanceolata, acuminata, basi vaginata, serrulata, intima breviora, angustissima, e basi paulum latiore linearia, acuta, spinuloso-serrata; omnia enervia, retis areolis parallelogrammis laxissimis. **Pistillidia** 16, longa, germine parvo oblongo pallide rufescente, stylo fere duplo longiori, filiformi obscure rufescente, stigmate incrassato. **Paraphyses** paucae, pistillidiis longitudine aequali, filiformes, articulatis, articulis inaequalibus, hyalinae. **VAGINULA** oblonga, apicem versus solida, brunnea, apice fusca. **SETA** 12—15 lin., erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, apice incurvata et incrassata, gracilis, laevis, purpurascens. **SPORANGIUM** laeve, brunneum, ore purpureo. **ANNULUS** nullus. **PERISTOMII** exterioris dentes humiditate apice incurvi, siccitate recurvi, lanceolato-subulati, solidi, trabeculati, a basi ad medium ferruginei, apicem versus subhyalini; interius membrana lutea plicata, porrecta in dentes 16 exterioribus longitudine subaequales, lato-lanceolatos, carinatos, solidos, articulatos, ciliis 1—3 subulatis perforatis aut capillaribus articulatis interpositis. **OPERCULUM** urna longius, rufescens. **CALYPTA** cucullata-subulata, glabra, straminea.

In campis monteridensibus: Sellow. 24.

c) Surculo subsimplici. Fissidentoidea.

10. HYPNUM LANGSDORFFII HOOK. surculo repente ramoso; foliis distichis planiusculis ovato-lanceolatis subacuminatis enervibus, apice serratis; sporangio cernuo ovato, operculo longirostro.

Hypnum Langsdorffii Hook. in Kunth. Syn. plant. aequin. I. 62. Brid. Bryol. univ. II. 391.

Stirps nobis non visa.

In lignis putridis Brasiliae, loco non indicato: Langsdorff. 24.

2. FOLIIS CONFERTIS, SUBDISTICHIS. SPINIFORMIA.

11. HYPNUM SPINIFORME LINDL. surculo erecto simplicissimo rigidiusculo fragili; foliis remotis alternis sparsis erecto-patentibus lineari-lanceolatis planis marginatis remote et argutissime serrulato-dentatis, nervo excurrente, seta subbasilari; sporangio cernuo obovato curvato inaequali, operculo conico-acuminato incurvo.

Hypnum spiniforme Linn. Sp. pl. 1585. Syst. naturae 702. Syst. veget. 949. Hedw. Stirp. crypt. III. 59. t. 25. Schwaegr. Suppl. I. 2. 184. Brid. Bryol. univ. II. 557. (H. Stereodon.)

Hypnum erectum, non ramosum, spinarum halecum aemulum Dill. Hist. musc. 332. t. 43. f. 68.

Prope Sebastianopolin, in Serra d'Estrella, in districtu adamantium rel., Augusto fructificat: Olfers, Sellow, Beyrich, M. 24.

3. FOLIIS IMBRICATIS PATULIS RECTIS. Spec. 12—17.

a) Ramis vagis inordinatis. Species 12 et 13.

Ramulis compressiusculis vel subteretibus: Rutabula (Laeviset).

12. HYPNUM MEGAPOLITANUM WEB. et MOHR. surculo repente laxo vage ramoso, ramis ramulisque planiusculis; foliis sparsis erecto-patulis remotiusculis subdistichis lato-ovatis brevissime acuminatis serrulatis, nervo tenui evanescente; sporangio cernuo obovato curvato subaequali, operculo e basi conica curvirostri.

Hypnum megapolitanum Web. et Mohr. bot. Taschb. 326. Brid. Spec. musc. II. 187. Bryol. univ. II. 491 et 769. Schwaegr. Suppl. I. 2. 241.

In prov. Minarum: M.; — prope fluvium Paquaquer in truncis putridis silvarum antiquissimarum, Januario: Beyrich. 24.

13. HYPNUM BEYRICHII † surculo assurgente subsimplici crassiusculo; foliis imbricatis subsecundis lanceolatis longe acuminatis integerrimis enervibus subnitentibus; sporangio minuto cernuo obovato, operculo convexo oblique rostellato urnam parum excedente.

Tab. nostra IV. Fig. I.

SURCULUS uncialis, laxus, crassiusculus, non raro simplex, plerumque superne ramo uno alterove brevi 3—4 lin. erecto-patente seu patente, rarissime ramulis plurimis instructus, dense foliosus, rufus. FOLIA concaviuscula, luteo-viridia: retis areolis linearibus angustissimis. FOLIA PERICHAETIALIA infra fructum erecta: exteriora ovata, acuminata, interiora magis magisque longiora, angustiora et longius acuminata, intima 3—4 erecto-patentia, lanceolata, longissime acuminata; omnia apicem versus leniter serrulata, concava, enervia, retis areolis laxioribus, quam in caulinis. VAGINULA cylindrica, laevis, brunnea, apice fusca. SETA gracilis, semuncialis, erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, inferne purpurascens superne pallidior. SPORANGIUM siccitate infra os constrictum, laeve, brunneum, ore purpurascens. PERISTOMII externi dentes incurvi, siccitate erecto-patentes, lanceolato-subulati, costati, costis ad margines dentium subcristato-prominentibus inflexis, a basi usque ad medium linea media verticali obscura notati, pallide ferruginei, apicem versus hyalini; interius membrana pallide lutea, areolata, plicata, porrecta in dentes 16 exterioribus longitudine aequales, lanceolato-subulatos, solidos, carinatos, articulatos, ciliis subulatis solitariis apicem versus bifidis articulatis pallidioribus interpositis. OPERCULUM ferrugineum, rostello pallide luteo. CALYPTRA cucullata, mucronata, glabra, straminea, apice fusca.

Leskiaea adnatae Rich. simillima, sed differt: surculo subsimplici, foliis subsecundis confertioribus, sporangio obovato, peristomii interioris forma structurae et operculo oblique rostellato.

Ad truncos putridos silvarum umbrarum prope Rio de Janeiro, Octobri: Beyrich. 24

b) Ramis confertis erectis. Velutina.

14. HYPNUM MACRORHYNCHUM † surculo repente gracili vage ramoso, ramis subpinnatifid ramulosis; foliis laxo imbricatis subsecundis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis enervibus; sporangio horizontali parvo obovato parum curvato, operculo hemisphaerico longissime rostellato urna longiore.

SURCULUS uncialis et longior, radiculosus, rufus, ramis brevibus subpinnato-ramulosis, ramulis ascendentibus. FOLIA erecto-patentia, concava, pallide viridia aut lurido-lutescentia; retis areolis parallelogrammis angustissimis. FLORES probabiliter monoeci. Feminei cauligeni, conici; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora 2 minuta, patentia, ovata, acuminata, interiora erecta, lanceolata, breviter acuminata, magis magisque angustata, ceterum exterioribus et caulinis aequalia. Pistillidia 6, germine oblongo viridi-brunneo, stylo subulato purpurascens, stigmate incrassato subhyalino. Paraphyses nullae. VAGINULA cylindrica, glabra, viridi-brunnea, apice fusca. SETA 3 lin., erecta, flexuosa, gracilis, siccitate tortilis, laevis, purpurascens, apice pallidior. SPORANGIUM reticulatum, laeve, viridi-brunneum, ore purpurascens. PERISTOMII exterioris dentes apice incurvi, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali notati, subtilissime et densissime transversim costati, costis ad margines cristato-prominentibus inflexis, inferne lutei, superne hyalini; interius membrana lutea plicata, areolata, in dentes 16, exterioribus longitudine aequales, subulatos, carinatos, solidos, articulatos, ciliis solitariis paulo brevioribus capillaribus articulatis hyalinis interpositis, producta. OPERCULUM hemisphaericum, longissime rostellatum, urna longius, basi pallide ferrugineum, apice subhyalinum. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca.

Leskiaea adnatae Schwaegr. simile, sed differt: foliis latioribus longius acuminatis, sporangio magis nutante obovato et peristomio Hypni.

Ad corticem arborum prope Rio de Janeiro: Sellow et Merkel. 24

15. HYPNUM MACRODONTIUM † surculo arcuato-declinato radicante pinnato, ramis ramulisque recurvis; foliis caulinis subtriangularibus acuminatis, rameis lanceolatis, utrisque argute serratis binerviis, nervis divergentibus evanescentibus; sporangio nutante ovato obliquo, operculo —.

RADIX fasciculata, capillaris, purpurascens. SURCULUS 2—3 unc. et longior, rigidulus, plerumque ascendens vel erectus, apicem versus declinatus et ex apice radicans, et rursus ascendens, pinnatus, aut prostratus ramis erectis fasciculato-ramulosis. FOLIA caulina remota, erecto-patentia, concaviuscula, ramea laxiuscula planiuscula, pallide viridia: nervis infra medium evanescentibus viridibus, retis areolis linearibus confertis. FLORES monoeci, cauligeni. Masculi conici, rufescentes; FOLIA PERIGONIALIA exteriora minuta, erecta, appressa, ovata, breviter acuminata, concava, interiora longiora, erecto-patentia, oblonga, longe acuminata, concava, ut exteriora viridia et integerrima, retis areolis linearibus laxiusculis; intima longissima, secunda, falcata, e basi latiore concava hyalina longissime acuminata remote et leniter serrulata, viridia, retis areolis in basi latiore folii parallelogrammis apicem versus linearibus compactioribus; omnia enervia. Antheridia 12, maxima, oblonga, parum curvata, truncata, reticulata, ferruginea. Paraphyses numerosae, antheridiis longiores, filiformes, 5-articulatae, lutescentes. Feminei ovati, virides; FOLIA PERICHAETIALIA 16, imbricata, e basi latissima concava in acumen longissimum subulatum recurvatum cuspidata, enervia, subintegerrima, amoene viridia; retis areolis linearibus, in basi laxioribus. Pistillidia 16, longa, germine oblongo angusto ferrugineo, stylo duplo longiori subulato purpurascens, stigmate paulo incrassato. Paraphyses numerosissimae, longitudine inaequali, pistillidiis duplo longiores, filiformes, articulatae, lutescentes. VAGINULA oblonga, membranacea, brunnea, apice fusca. SETA uncialis, erecta, flexuosa, siccitate tortilis, gracilis, laevis, purpurascens, apicem versus ferruginea. SPORANGIUM laeve, brunneum, apice fuscum. ANNULUM non vidimus. PERISTOMII externi dentes apice incurvi, siccitate patentes, longi, lato-lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali notati, costati, costis ad margines cristato-prominentibus inflexis, postice ferruginei, antice hyalini, punctati; interius membrana lutea, plicata, areolata, porrecta in dentes 16 exteriorum longitudine, lanceolato-subulatos carinatos, solidos, articulatos, ciliis 3 brevioribus subulatis articulatis hyalinis interpositis. OPERCULUM et CALYPTRA non visa.

In districtu adamantium, prope Villam Riccam et prope Salgado ad flumen S. Francisci inter Hypnum circinate: M.; — prope Tijuca, vicinia Sebastianopoleos: Olfers. 24

16. HYPNUM PAPILLOSUM † surculo repente inordinate et fastigiato-ramoso, ramis brevibus crassis; foliis erecto-patentibus interdum subhomomallis laxis lanceolatis longe acuminatis, perichaetialibus antice serrulatis, enervibus, in superficie exteriori papillis brevibus obtectis (!); sporangio parvo pendulo aut cernuo oblongo, operculo hemisphaerico oblique rostrato.

Tab. nostra IV. Fig. II.

Caespitosum, parvulum. SURCULUS repens, $\frac{1}{2}$ — 1 unc., inferne radiculis capillaribus fuscis tectus; ramis interdum parum curvatis dense foliosis. FOLIA concava, obscure serrulata aut integerrima, in superficie exteriori papillis brevibus obtectis, lutescentia; retis areolis parallelogrammis angustissimis. FOLIA PERICHAETIALIA exteriora lanceolato-subulata, subvaginata, obsolete serrulata, interiora parva, oblonga, acuminata, argute serrata, intima minutissima, ovata, brevius acuminata; omnia retis areolis laxioribus. VAGINULA cylindrica, brunnea, apice fusca. SETA

vix semuncialis, assurgens, apice incurvata, flexuosa, siccitate tortilis, laevis, purpurascens. SPORANGIUM oblongum, siccitate constrictum, ore fusco dilatato, laeve, brunneum. PERISTOMII exterioris dentes incurvi, siccitate patentes, lanceolati, acuti, trabeculati, linea obscura perpendiculari medio notati, lutei; interius membrana lutescens plicata, promissa in dentes 16, exterioribus longitudine aequales, lanceolato-subulatos, carinatos, articulatos, solidos, conniventes, ciliis capillaribus interpositis. OPERCULUM hemisphaericum, oblique rostratum, urnae longitudine.

In truncis demortuis silvarum antiquissimarum prope fluvium Paquaquer, Januario, cum fr. deoperculatis: Beyrich; — in prov. Minarum, Dicrano Martiano intermixtum, Majo: M. 24

17. HYPNUM OLFERSII † surculo repente laxo irregulärer pinnato-ramoso, ramis brevibus subsimplicibus patentibus prostratis; foliis subdistichis laxe imbricatis secundis subhomomallis oblongo-lanceolatis longissime acuminatis integerrimis enervibus; sporangio horizontali parvo oblongo aequali, operculo hemisphaerico longe rostrato longitudine urnam aequante.

SURCULUS uncia vix longior, fasciculato-radiculosus, rufus. Rami breves, nonnunquam ramulosi. FOLIA concava, viridi-albescentia, retis areolis linearibus confertis. FLORES monoeci. Masculi minutissimi, globosi, rufescentes; FOLIA PERIGONIALIA 8, dense imbricata, exteriora ovata, breviter acuminata, concava, interiora sensim minor, latiora, breviter acuminata, intima minuta, rotundato-ovata, acutiuscula, profunde concava, omnia integerrima, enervia, rufescentia; retis areolis oblongis brevibus laxiusculis. Antheridia 12, ovata, reticulata, turgida, hyalina; effoeta rufescentia. Paraphyses nullae. Flores feminei masculis triplo majores, conici; FOLIA PERICHAETIALIA 8, exteriora minuta, ovata, acuminata, interiora maxima, oblongo-lanceolata, longius acuminata, intima angustissima et longissima e basi latiore lanceolata longissime acuminata; omnia integerrima enervia, concava, dilute pallide viridia, retis areolis iis foliorum caulinarum aequalibus. Pistillidia 8, germine ovato brevi rufescente, stylo quadruplo longiori subulato purpurascente, stigmatate incrassato. Paraphyses nullae. VAGINULA cylindrica, membranacea, viridi-brunnea. SETA 3 lin., erecta, paulo flexuosa, siccitate tortilis, gracilis, laevis, apice parum curvata et incrassata, purpurascens. SPORANGIUM angustum, siccitate erectum, obconicum, laeve, brunneum, ore purpureo. PERISTOMII exterioris dentes apice incurvi, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali notati, dense et subtilissime costati, costis ad margines cristato-prominentibus inflexis, ferruginei, apicem versus articulati, hyalini; interius membrana lutea, plicata, areolata, producta in dentes 16 lanceolato-subulatos, carinatos, solidos, articulatos, ciliis brevioribus subulatis hyalinis interpositis. OPERCULUM ferrugineum. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca. SPORAE rotundatae, virentes.

Prope Tijuca in vicinia Sebastianopoleos: Olfers. 24

4. FOLIIS IMBRICATIS APPRESSIS VEL APPRESSO-PATENTIUSCULIS. Spec. 18—23.

a) Surculo bipinnato — aut tripinnato — ramoso. Tamariscina.

18. HYPNUM TAMARISCINUM Hedw. surculo subtriplicato-pinnato; foliis imbricatis cordato-acuminatis, apice piliformi serrulatis, striatis, dorso papilloso subevanidinerviis; sporangii ovati arcuato-cernui operculo conico-rostrato.

Brid. Bryol. univ. II. 438.

Hypnum tamariscinum Hedw. Spec. Musc. 261. t. 67. f. 1—5.

Hypnum filicinum tamarisci foliis non splendidibus Dill. Hist. musc. 276. t. 35. f. 14.

Var. 5 DELICATULUM Brid. duplicato-triplicatove pinnatum, habitu elegantissimo delicato, operculis longius tenuisque rostratis. Brid. Bryol. univ. II. 441.

Hypnum delicatulum Linn. Spec. pl. 1599. Hedw. Stirp. IV. 57. t. 33. Spec. musc. 260. Schwaegr. Suppl. I. 2. 236.

Hypnum filicinum, tamarisci foliis vel. Dill. Hist. 546. t. 83. f. 6.

In vicinia urbis Sebastianopoleos: Chamisso. 24

Var. 2 TENERRIMUM Brid. triplicato-vel quadruplicato-pinnatum; foliis omnibus appressis, caulinis breviter acuminatis. Brid. Bryol. univ. II. 443.

In prov. Minarum: M.; — in Brasilia australiore: Sellow. 24

b) Surculo vage ramoso; ramulis confertis erectis. Muralia.

19. HYPNUM LOXENSE Hook. surculo repente ramoso, ramis subsimplicibus erectis; foliis dense imbricatis erecto-patentibus ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis enerviis pellucidis; sporangio suberecto vel cernuo parvo oblongo brevi inaequali, operculo convexo oblique rostrato dimidia urnae longitudine.

Hypnum loxense Hook. in Kunth. Syn. pl. aequin. I. 62. Schwaegr. Suppl. III. 2. I. t. 259.

Hypnum Stereodon loxensis Brid. Bryol. univ. II. 590.

In Minis novis et in districtu adamantium Majo: M.; — prope fluvium Paquaquer in umbrosis, Januario: Beyrich. 24

20. HYPNUM LITHOPHILUM † surculo repente ramoso, ramis confertis vage aut pinnatim ramulosis; foliis dense imbricatis subsecundis subrotundis obtusis brevissime mucronulatis vel ovatis acutis integerrimis enerviis; sporangio suberecto vel cernuo obovato brevi inaequali, operculo e basi conico curvirostro urnae longitudine.

SURCULUS 1—2 unc. et longior, fuscus. Rami ascendentes, aut aliquoties divisi, aut pinnati. FOLIA profunde concava, obscura viridia; retis areolis parallelogrammis, a basi ad medium laxis, versus apicem confertioribus. FLORES monoeci. Masculi minutissimi, subglobosi, rufi; FOLIA PERIGONIALIA 12, ovata, subrotunda, brevissime mucronulata; interiora latiora et obtusiora, pellucida, rufescentia; retis areolis laxioribus, quam in caulinis. Antheridia 12, parva, ovato-oblonga, truncata, reticulata, rufescentia. Paraphyses nullae. Feminei conici; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora oblongo-lanceolata, acutiuscula, interiora longiora et angustiora, lanceolata, acuta, subvaginata; retis areolis parallelogrammis, apicem folii versus confertioribus minoribus, oblongis. Pistillidia 2—3, germine oblongo rufescente, stylo filiformi purpurascente, stigmatate incrassato; paraphyses nullae. VAGINULA cylindrica, membranacea, glabra, rugosa, brunnea, apice fusca. SETA 8—12 lin., laevis, purpurascens, apice incrassata et pallidior. SPORANGIUM breve, laeve, brunneum, siccitate et deoperculatum infra os constrictum. PERISTOMII externi dentes conniventes, siccitate incurvi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali impressi, costati, costis ad dentium margines parum prominentibus, pallide ferruginei, apice hyalini; interius membrana lutescens reticulata plicata, abiens in dentes 16, exteriorum longitudine, lanceolato-subulatos, carinatos, solidos, articulatos, ciliis binis brevioribus capillaribus hyalinis interpositis. OPERCULUM ferrugineum. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca. GONGYLI minuti, rotundati, virentes.

Species Hypno loxensi affinis, attamen distincta, crescit in lapidibus rivulorum prope Novo-Friburgum, in Serra dos Orgãos locis similibus: Beyrich et Sellow; — in Minarum prov. passim, e. g. prope Villam Riccam, Tejuco, Fanado: M. 24

21. HYPNUM MICROCARPUM † surculo repente gracili laxo vage ramoso, ramis 3—4 lin. longis ascendentibus flexuosis; foliis erecto-patentibus subsecundis lanceolatis acutis integerrimis submarginatis enerviis; sporangio minutissimo nutante urceolato, operculo hemisphaerico oblique rostrato, urnam superante.

Tab. nostra IV. Fig. III.

SURCULUS vix uncialis, dense foliosus, rufus. **FOLIA** concaviuscula, lurido-rufa; retis areolis parallelogrammibus laxiusculis. **FLORES** monoeci, minutissimi. **MASCU**LI subglobosi; **FOLIA PERIGONIALIA** 4—5, dense imbricata, exteriora ovato-acuminata, concava, interiora 1—2 minora, latiora, brevius acuminata, tenera, pellucida, subhyalina, retis areolis oblongis laxis. **ANTHERIDIA** 8, parva, congesta, oblonga, truncata, filamentum brevissimo, reticulata, rufescentia. **PARAPHYSES** nullae. **FEMINEI** conici; **FOLIA PERICHAETIALIA** 6—7, exteriora 2 erecto-patentia, ovata, acuminata, concava, interiora 3 e basi latiore concava acuminata, ut exteriora serrulata, pellucida, amoene viridia, intima 2 minuta, lanceolata, planiuscula, grosse serrata, subhyalina; omnia enervia, retis areolis parallelogrammibus laxis. **PISTILLIDIA** 10, germine oblongo brunneo, stylo subulato longitudine germinis purpurascens, stigmatem incrassato capitato. **PARAPHYSES** nullae. **VAGINULA** cylindrica, membranacea, glabra, brunnea, apice fusca. **SETA** circiter 4 lin., erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, gracilis, glabra, purpurascens. **SPORANGIUM** obconicum, ore dilatato, deoperculatum oblongum, siccum infra os constrictum, rugosum, fuscum. **PERISTOMII** externi dentes incurvi, siccitate erecto-patentes, lanceolato-subulati, a basi usque ultra medium linea media verticali impressa, apice subdenticulati, costati, costis ad margines dentium suberistato-prominentibus et inflexis, pallide ferruginei, apicem versus hyalini; interius membrana subhyalina, plicata, dentes 16, exterioribus longitudine aequales, lanceolatos, solidos, carinatos, articulatos, ciliis solitariis, paulo brevioribus, subulatis articulatis interpositis, emittens. **OPERCULUM** purpurascens, rostro pallidiori. **CALYPTRA** cucullata, glabra, straminea, apice rufescens. **SPORAE** subangulatae, virescentes.

Ad urbem Para et in ripa fluvii Amazonum: M. 24 — Quoad habitum et structuram foliorum generi *Fabroniae* proxime accedit.

22. HYPNUM PUSILLUM † surculo exiguo innovationibus brevissimis fastigiato-ramoso; foliis confertis erecto-patentibus lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis, marginibus inflexis, nervibus valde pellucidis; sporangio minuto horizontali aequali subpyriformi, operculo hemisphaerico longe rostrato, urna longiori.

SURCULUS 1½—2 lin., innovationes brevissimas gemmiformes cuspidatas fastigiatas emittens, rufus, fasciculatim radiculosus, radice capillaribus purpurascens. **FOLIA** concaviuscula, dilute viridia; retis areolis longis parallelogrammibus angustis sublinearibus. **FLORES** monoeci. **MASCU**LI minutissimi, ovati; **FOLIA PERIGONIALIA** 5, dense imbricata: exterius minutum, ovatum, obtusiusculum, interiora 2 majora, ovata, acuta, concava, intima 2 longiora, ovato-acuminata, ventricosa; omnia integerrima, enervia, hyalina, retis areolis parallelogrammibus in foliis interioribus magis magisque laxioribus. **ANTHERIDIA** 10—12, parva, ovata, filamentum brevissimo suffulta, reticulata, turgida, hyalina, effoeta rufescentia. **PARAPHYSES** nullae. **FEMINEI** floris conici **FOLIA PERICHAETIALIA** 3: exterius minutum, oblongo-ovatum, acutiusculum, interius majus, ovato-lanceolatum, acutum, intimum maximum, lanceolatum, acutum; omnia integerrima, enervia, hyalina, retis areolis parallelogrammibus laxissimis. **PISTILLIDIA** 2, parva, germine oblongo angusto pallide rufescente, stylo subulato ferrugineo, stigmatem incrassato. **PARAPHYSES** nullae. **VAGINULA** ovata, membranacea, glabra, ferruginea. **SETA** 2—3 lin., erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, ferruginea. **SPORANGIUM** statu sicco urceolatum, deoperculatum obconicum, laeve, pallide brunneum. **PERISTOMII** exterioris dentes conniventes, siccitate erecto-patentes, apice parum incurvi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali pellucida impressi, costati, costis ad dentium latera cristato-prominentibus et inflexis, albidis; interius membrana albida areolata promissa in dentes 16, exteriorum longitudine, lanceolato-subulatos, solidos, carinatos, articulatos, ciliis capillaribus articulatis paulo minoribus hyalinis interpositis. **OPERCULUM** basi ferrugineum, rostro apicem versus hyalino.

CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca. **SPORAE** subglobosae.

Prope Tijuca vicinia Sebastianopoleos, inter Jungermannias in solo turfoso: Olfers. 24

23. HYPNUM INCONSPICUUM † surculo repente tomentoso radiculoso aliquoties diviso, ramulis subsimplicibus; foliis laxe imbricatis erecto-patentibus oblongis acutis vel breviter acuminatis integerrimis enervibus; sporangio suberecto vel cernuo oblongo inaequali, operculo —.

SURCULUS ½—1 unc., ramis simplicibus semuncialibus interdum ramulosis et longioribus. **FOLIA** profunde concava, luridoviridia; retis areolis basi et medio folii parallelogrammibus, ad margines et apicem versus oblongis. **FLORES** monoeci. **MASCU**LI minuti, ovati, rufescentes; **FOLIA PERIGONIALIA** 12, imbricata: exteriora 3—4 minora, latissime ovata, obtusiuscula; interiora 5—6 majora, lato-ovata, acuminata, concava; intima 2—3 minutissima, latissima, mucronulata, profunde concava, pellucida; omnia integerrima, enervia, retis areolis oblongis laxis. **ANTHERIDIA** circiter 20, conferta, parva, ovata, reticulata, filamentum brevi articulo, turgida, hyalina, effoeta rufescentia, paraphyses nullis adstantibus. **FEMINEI** flores conici; **FOLIA PERICHAETIALIA** exteriora minuta, aneolata, acuta, interiora longiora, lanceolato-acuminata, basi latiora, intima longissima, lineari-lanceolata, acuminata, vaginantia; omnia integerrima, enervia, pellucida, retis areolis longis sublinearibus angustis. **PISTILLIDIA** 3, germine oblongo, rufescente, stylo filiformi purpurascens, stigmatem incrassato. **PARAPHYSES** nullae. **VAGINULA** cylindrica, membranacea, glabra, brunnea. **SETA** 5 lin., erecta, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, inferne purpurascens, apicem versus pallidior. **SPORANGIUM** siccitate infra os dilatatum, constrictum, rugosum, brunneum. **PERISTOMII** externi dentes incurvi, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, costati, costis ad dentium margines suberistato-prominentibus et inflexis, a basi usque ad medium linea media verticali notati, pallide ferruginei, apicem versus subhyalini; interius membrana lutescens areolata plicata, elongata in dentes 16, exteriorum longitudine, lanceolato-subulatos, solidos, carinatos, articulatos, ciliis brevioribus subulatis articulatis subhyalinis interpositis. **OPERCULUM** et **CALYPTRA** non visa. **GONGYLI** globosi.

In Brasilia loco natali non indicato: M. 24

5. FOLIIS IMBRICATIS PATULIS SUBREFLEXIS. STELLATA.

24. HYPNUM FRAGILE BRID. surculo repente subdiviso, ramis confertis longitudine aequali subsimplicibus erectis brevissimis; foliis imbricatis apicibus patentissimis saepe subsecundis cordato-ovatis longe acuminatis subintegerrimis margine inflexis, nervo crasso evanescente; sporangio horizontali cylindrico inaequali curvulo, operculo elongato-conico papilloso, dimidia urnae longitudinae, tenuissimo incurvo.

Hypnum fragile Brid. *Spec. musc. II. 198.* *Schwaegr. Suppl. III. 258., II. 1. 162. t. 145.* *Brid. Manl. 175.*

Hypnum Stereodon fragilis Brid. *Bryol. univ. II. 597.*

Specimina, quae nobis presto sunt, ab illis quidem quae Bridel et Schwaegrichen, viri clariss., descriperunt et delineaverunt, minori surculorum fragilitate, foliis cum per lentem vitream valde augmentem spectentur, subtilissime serratis, cellulis parvis subtrotundis nervoque instructis, porro foliis perichaetialibus non plicatis, et operculo papillato differunt, nolimus tamen separare, cum ab altera parte quoad habitum peculiarem, foliorum nervum, sporangii et peristomii formam satis superque congruant.

In silvis prov. Sebastianopolitanae ad radices arborum, Aprili: Beyrich. 24

6. FOLHS SECUNDIS CIRCINATO-FALCATUS. Spec. 25—29.

a) *Surculis subpinnatis. Cupressiformia.*

25. HYPNUM CIRCINALE Hook. surculo flexuoso repente dense pinnato, ramis alternis simplicibus; foliis lanceolato-subulatis circinato-falcatis secundis subserratis nervibus; sporangio ovato arcuato-cernuo, operculo conico.

Hypnum circinale Hook. *Musc. exot. II. 21. t. 107.*

Hypnum Stereodon circinalis Brid. *Bryol. univ. II. 621.*

Prope Villam Ricam nonnulla specimina haud fructifera legit Martius. 24.

26. HYPNUM APICULATUM † surculo repente vage ramoso, ramis inaequalibus pinnatim ramulosis; foliis subdistichis imbricatis late lanceolato-acuminatis circinatis serrulatis nervibus; sporangio cernuo obovato truncato subaequali, operculo hemisphaerico apiculato.

SURCULUS 1—1½ poll., per interstitia radiculosus, rufescens. Rami 1—2 poll. FOLIA concava, pallide viridia; retis areolis laxi parallelogrammis. FLORES monoeci. Masculi minutissimi, foliis caulinis duplo minores, ovati; FOLIA PERIGONIALIA exteriora ovata, acuminata, concava, subintegerrima, extremo apice interdum serrulata, enervia, viridia, retis areolis parallelogrammis laxi; interiora minora, teneriora, lato-ovata, mucronulata, profunde concava, integerrima, enervia, subhyalina, retis areolis laxissimis. Antheridia 8—10, oblonga, truncata, parum curvata, reticulata, rufescentia. Paraphyses nullae. Feminei flores conici, masculis majores; FOLIA PERICHAETIALIA vaginantia, erecta, apice recurvata; exteriora caulinis simillima; interiora latiora et longiora, e basi vaginante ovata, concava, subintegerrima, in acumen longissimum argute serrulatum apice subulatum attenuata, retis areolis laxioribus. Pistillidia 3—4, germine oblongo virescente, stylo purpurascens duplo longiori, stigmatate dilatato germine concolori. Paraphyses paucissimae, filiformes, 5-articulatae, articulis longitudine inaequali, subhyalinae. VAGINULA cylindrica, membranacea, glabra, reticulata, dilute viridia, apice fusca. SETA 6—8 lin., erecta, flexuosa, apice incurvata, siccitate tortilis, laevis, purpurascens, apice pallidior. SPORANGIUM interdum subpendulum, deoperculatum sub ore valde constrictum indeque urceolatum, rugulosum, fuscum. ANNULUS nullus. PERISTOMII externi dentes incurvi, siccitate recurvi, lato-lanceolato-subulati, solidi, trabeculati, rufescentes, apicem versus hyalini; interius membrana lutea plicata, reticulata, producta in processum 16, dentium exteriorum longitudine, lanceolato-subulatos, carinatos, articulatos, solidos, ciliis interjectis. OPERCULUM urna pallidius. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea.

Prope Tijuca et in monte Corcovado, in vicinia Sebastiano-peteos: Olfers; — prope Salgado ad flumen S. Francisci in prov. Minarum, Septembri: M. 24.

27. HYPNUM URCEOLATUM † surculo repente aliquoties diviso, divisionibus pinnatim ramulosis, ramulis patentibus depressis complanatis; foliis subdistichis, (praesertim ultimis) subsecundis subfalcatis, ovatis acuminatis obliquis serrulatis, nervo tenuissimo et brevissimo, aut binis; sporangio pendulo urceolato, operculo convexo-conico obtusiusculo recto.

Tab. nostra IV. Fig. IV.

RADICULAE capillaeae, fasciculatae, purpurascens. SURCULUS 2 unc. et longior, ramulis copiosis semuncialibus. FOLIA valde pellucida, pallide viridia; retis areolis parallelogrammis longis. FLORES monoeci. Masculi minuti, ovati; FOLIA PERIGONIALIA 8—10, imbricata, e basi latissima ovata, profunde concava, acuminata, valde pellucida, virescentia; interiora sensim minora, latiora, magis pellucida; intima 2—3 minutissima et latissima, brevius acuminata, subhyalina; omnia integerrima, enervia, retis areolis

parallelogrammis laxissimis. Antheridia 12, maxima, oblonga, truncata, reticulata, turgida, subhyalina aut ferruginea. Paraphyses numerosae, filiformes, antheridiis vix longiores, 4-articulatae, articulis longitudine inaequali, infimo brevissimo, supremo longissimo, hyalinae. Feminei floris subrosulaeformis, masculo duplo majoris, FOLIA PERICHAETIALIA 8—10, erecto-patentia; exteriora 3—5 lanceolata, breviter acuminata, concaviuscula, serrulata, pellucida, virescentia, nervo brevissimo instructa; interiora 3 duplo fere longiora, e basi latissima concava longissime acuminata; intima 2 minuta, lanceolato-subulata et ut interiora subintegerrima, enervia, hyalina; retis areolis parallelogrammis laxissimis. Pistillidia 16, maxima, germine oblongo fusciscente, stylo subulato ferrugineo, stigmatate paulo incrassato subhyalino. Paraphyses copiosae, pistillidiis parum longiores, filiformes, articulatae, hyalinae. VAGINULA oblonga, membranacea, viridi-brunnea, apice fusca. SETA unciam et quod excedit longa, erecta, apice incurva, parum flexuosa, siccitate tortilis, laevis, inferne purpurascens, superne ferruginea. SPORANGIUM rugosum, ferrugineum. PERISTOMII exterioris dentes 16 incurvi, siccitate conniventes, lanceolato-subulati, solidi, interdum apicem versus lacunosos, costati, costis ad dentium margines suberistato-prominentibus et inflexis, pallide ferruginei, apice hyalini; interius aequilongum est membrana flava, plicata, producta in processum 16, lanceolato-subulatos, solidos, carinatos, articulatos, ciliis solitariis dentibus longitudine aequalibus lanceolato-subulatis articulatis interdum inferne in 2—3 crura fissis punctatis hyalinis interpositis. OPERCULUM pallide ferrugineum. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca.

Prope urbem Sebastianopolin in silvis montanis, Augusto: M. 24.

28. HYPNUM CYPARISSOIDES † surculo ascendente aliquoties diviso, ramis erectis subpinnatis, ramulis brevibus subsecundis; foliis dense imbricatis secundis subfalcatis oblongis acuminatis obliquis integerrimis nervibus; sporangio nutante vel cernuo obconico, operculo hemisphaerico brevirostrato.

SURCULUS 1—2 unc., rufus, ramis sesquincialibus. FOLIA concava, laete virentia; retis areolis linearibus confertis. FLORES monoeci. Masculi minutissimi, subglobosi, rufescentes; FOLIA PERIGONIALIA 8, dense imbricata, appressa, latissime ovata, acuminata, profunde concava, integerrima, enervia, dilute rufescentia; retis areolis parallelogrammis brevibus laxiusculis. Antheridia 12, breviter, ovata, curvata, reticulata, hyalina. Paraphyses nullae. Feminei floris masculo duplo majoris, cauligeni, conici FOLIA PERICHAETIALIA 16; exteriora 4 minuta, ovata, acuta; interiora 6 oblonga, acuminata, concava; intima 6 lanceolata, longissime acuminata, subvaginata, margine inflexa, plicata. Pistillidia 8, germine ovato ferrugineo, stylo triplo longiore subulato purpurascens, stigmatate paulo incrassato. Paraphyses paucissimae, pistillidia longitudine aequantes, filiformes, tenerrimae, obscure articolatae, hyalinae. VAGINULA cylindrica, membranacea, viridi-brunnea, apice fusca. SETA unc. et longior, erecta, parum flexuosa, laevis, apice paululum incrassata et incurva, purpurascens. SPORANGIUM deoperculatum oblongum, laeve, brunneum, ore purpureo. PERISTOMII externi dentes apice incurvi, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, subtilissime costati, luteo-ferruginei, apice subhyalini; interius membrana lutescens fere usque ad dimidiam partem fissa in dentes 16 lanceolato-subulatos, solidos, carinatos, articulatos, ciliis capillaribus interpositis.

Hypno recurvanti Mich. affine, sed differt: surculo ascendente, ramis erectis, ramulis subsecundis, foliis dense imbricatis subfalcatis oblongis acuminatis obliquis, sporangio obconico.

In districtu adamantium, mense Majo: M. 24.

29. HYPNUM TENUIROSTRE Hook. surculo ascendente flexuoso diviso, ramis suberectis irregulariter pinnato-ramulosis, ramulis brevibus incurvis; foliis dense imbricatis falcato-secundis

oblongis longe acuminatis vertice papillosis apice leniter serrulatis; (sporangio oblongo-ovato cernuo, operculo longe rostrato Hook.)

Hypnum tenuirostre Hook. *Musc. exot. II. 21. t. 111.*

Hypnum Stereodon tenuirostris Brid. *Bryol. univ. II. 616.*

SURCULUS 2—3 unc., inferne subnudus, fuscus. Rami 2 unc., laxi. FOLIA concava, enervia, lurido-viridia. FLORES et FRUCTUS nobis non visi.— Habitu et foliorum forma plane congruit cum *Hypno tenuirostri* Hook. Cl. auctor tamen papillas foliorum nec verbis attingit neque depinxit.

Prope urbem Villam Ricam in prov. Minarum, terrestre: M. 24

7. FOLII LAXE PATULIS, RAMULIS CONFERTIS ERECTIS VEL SUBPINNATIS. SERPENTIA.

30. HYPNUM MICROPHYLLUM Sw. surculo repente flexuoso subpinnatim ramoso, ramis brevibus simplicibus depressis aut erectiusculis teretibus; foliis laxe imbricatis minutis semiamplexicaulibus, apicibus subfalcatis, subcordato-ovatis longe acuminatis, apicem versus subtilissime serrulatis, nervo crasso in extremo apice dissoluto; sporangio cernuo oblongo curvato obliquo, operculo convexo conico-acuminato.

Hypnum microphyllum Sw. *Prodr. 142. Fl. Ind. occ. III. 1821. Cmel. Syst. nat. II. 1345. Pal. Beauv. Prodr. 66. Brid. Musc. rec. II. 110. Hedw. Spec. musc. 269. t. 69. Brid. Spec. musc. II. 248. Schwaegr. Suppl. I. 2. 261. Brid. Mant. 183.*

Hypnum Stereodon microphyllum Brid. *Bryol. univ. II. 649.*

Prope Mandioccam, praedium in Serra dos Orgãos, in truncis vetustis silvarum antiquissimarum, Augusto: Beyrich. 24

SPECIES OBSCURIORES. Spec. 31—34.

31. ? HYPNUM CHLOROPHYLLUM † surculo repente simpliciter compresso; foliis subimbricatis-distichis patentibus subalternis subligulatis basi obliquis mucronatis integerrimis, nervo lato brevissimo evanido; sporangio —.

SURCULUS 1—2 poll., fasciculatim radiculosus, rufo-viridis. FOLIA sordide viridia; nervo lato brevissimo concolori evanescente instructa; retis areolis parallelogrammatis longis laxis, altero latere baseos subquadratis amplissimis. FLORES et FRUCTUS non observati.— *Hypno diaphano* Hedw. habitu et dispositione foliorum simillimum, differt tamen: foliis subligulatis nervoque brevissimo instructis.

In prov. Minarum ad terram: M. 24

32. ? HYPNUM CIRRI-FOLIUM SCHWAEGR. surculo decumbente vel pendulo vermiculari aliquoties diviso, ramis primariis remote subpinnatim ramulosis, ramulis brevibus erectiusculis copiosis teretibus; foliis dense imbricatis cordato-ligulatis inde a basi marginibus inflexis in acumen subulatum paulo flexuosum productis subtilissime denticulatis valde concavis, nervo evanescente; sporangio —.

Hypnum cirrifolium Schwaegr. *Suppl. III. 1. t. 218.*

SURCULUS 4—12 poll., vermicularis, humiditate laxus, siccitate fragilis, atro-fuscus. Rami primarii 2—6 unc., ramulis erectiusculis brevibus $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ poll., apicem versus sensim brevioribus, copiosis, sed remotis, simplicibus aut uno alterove ramulo brevissimo instructis teretibus, inferne atro-fuscis superne flavis. FOLIA acumine instructa dimidiae totius longitudinis, valde concava, fere hemisphaerici in formam, basi plicis duabus notata, nitida, flavescens, senio fusca, nervo viridi supra medium evanescente; retis areolis linearibus angustissimis. FLORES et FRUCTUS non observati.— Forsan *Leskia* vel *Neckera* species.

In Brasilia australiore: Setlow. 24

33. ? HYPNUM APPRESSUM † surculo assurgente vel erecto aliquoties diviso, ramis irregulariter pinnatim dense ramulosis, ramulis brevibus simplicibus teretibus; foliis dense imbricatis erecto-patulis latissime cordatis in acumen breve subulatum productis subamplexicaulibus subintegerrimis profunde concavis, marginibus paulo recurvis plicatis, nervo in medio folio evanescente.

SURCULUS 2 unc., rigidiusculus. Rami longitudine aequales. Ramuli $\frac{1}{2}$ —1 poll., inferiores interdum iterum ramulosi, foliosi, inferne atro-fusci superne flavi. FOLIA siccitate appressa, levissime denticulata vel subintegerrima, plicata, flavescens, senio atro-fusca, nervo viridi; retis areolis parallelogrammatis, versus margines folii oblongis minimis.— *Hypno cirrifolium* proxime accedit, statura autem multo minore, foliisque late cordatis acuminatis satis distinguitur; utrumque vero sine dubio uni eidemque generi, post fructus detectos illustrando, adnumerari debet.

In prov. Minarum ad terram: M. 24

34. ? HYPNUM RADDIANUM BIRD. surculo vage ramoso vel ramoso-subdichotomo gracili; foliis lanceolatis longe acuminatis divaricato-patulis integerrimis, perichaetiis lateralibus numerosissimis.

Hypnum Raddianum Brid. *Bryol. univ. II. 511. Radd. Critt. bras. 9.*

Ad Corrego Secco in Serra d'Estrella, prov. Sebastianopolitanae, terrestre: Raddi.— Stirps nobis non visa. 24

SERIES VII. ENTOPHYLLOCARPI:

id est sporangio in folii consimilis gremio, duplicatura vel fissura oriundo.

XLIV. DREPANOPHYLLUM RICH.

SPORANGIUM terminale, exannulatum, aequale. STOMA nudum, praeter membranulam angustissimam lacunculatam, in orificio interiore ortam. FLOS dioecus, terminalis, e basi concava folii perichaetialis. FOLIA disticha, equitantia.

Brid. Bryol. univ. II. 668. Endl. Gen. n. 596.

1. DREPANOPHYLLUM FULVUM RICH. surculo erecto simplici; foliis verticalibus semiamplexicaulibus inaequalibus falcatis, apice denticulatis; sporangio erecto subgloboso-ovato, operculo conoideo.

Drepanophyllum fulvum Hook. *Musc. exot. II. 3. t. 145. Schwägr. Suppl. II. 85. t. 125. Brid. Bryol. univ. II. 669.*

Dicranum falcifolium Hook. *Musc. exot. I. t. 83.*

Fissidens falcifolius Brid. *Mant. 191. Schwaegr. Suppl. I. 2. 9.*

In arboribus silvarum aboriginum secundum fluvium Amazonum: M. 24

XLV. PHYLLOGONIUM BRID.

SPORANGIUM laterale, exannulatum, aequale. PERISTOMIUM simplex, dentibus 16 aequidistantibus, integris, subulatis. CALYPTRA cuculliformis, subpilosa. FLORES verosimiliter dioeci, laterales, gemmiformes. FOLIA disticha, equitantia, subinde quasi viscosa.

Brid. Bryol. univ. II. 671. Endl. Gen. n. 597.

1. PHYLLOGONIUM FULGENS BRID. surculo repente, ramis pendulis complanatis parvaeque ramulosis; foliis dense imbricatis oblongis complicato-carinatis mucronatis enervibus; sporangio ovato brevisepto, operculo conico-rostrato incurvo.

Phyllogonium fulgens Brid. *Bryol. univ.* II. 671.

Phyllogonium viride Brid. *ibid.* 673.

Pterigynandrum fulgens Hedw. *Stirp.* IV. 101. t. 39. *Spec. musc.* 86. *Raddi Critt. bras.* 5.

Pterogonium fulgens Sw. *Fl. Ind. occ.* III. 1776. *Schwaegr. Suppl.* I. 2. 108.

Hypnum fulgens Sw. *Prodr.* 140.

Phyllogonium viride Brid. a *Ph. fulgente* vix diversum est; notae enim characteristicae a *Bridelio* allatae haud stabiles sunt, foliorum statura major a vegetazione luxuriante pendet, et coloris diversitatem in aliis ex nostris speciminibus magis in aliis minus observandam, a humidiori loco atque magis umbroso exortam esse diceret.

Prope Tijuca et alibi in vicinia Sebastianopoleos: Olfers; — in Serra d'Estrella et in provinciae Minarum arboribus: M. 24

XLVI. FISSIDENS HEDW.

SPORANGIUM subaequale, exannulatum. PERISTOMIUM simplex, dentibus 16 latiusculis bifidis inflexis, cruribus subinaequalibus divergentibus. CALYPTRA cuculliformis. FLORES monoeci dioecive, nunc laterales, nunc terminales; masculi femineique in folii fissura nidulantes. FOLIA dense disticha, oblique inserta, equitantia, nervo excurrente.

1. FISSIDENS FLABELLATUS † surculo decumbente brevissimo subfasciculatim ramoso, ramis ascendentibus per innovationes brevissimas ramulosi flexuosis basi nudis superne magis magisque dense foliosis; foliis 8-jugis versus apicem magis patentibus et longioribus, linearibus obtusis apice suberenulatis, evanidinervis; sporangio suberecto parvo cylindrico-oblongo parum curvato inaequali, operculo convexo-rostrato urna breviori.

Tab. nostra II. Fig. II.

SURCULUS brevissimus, vix lineam longus, decumbens, radiculosus, subfasciculatim ramosus, flabelliformis; rami adscendentes, 3 lin., innovationibus brevissimis ramulosi, flexuosi, basi nudi, rufi, superne magis magisque dense foliosi, virescentes. FOLIA 8-juga, disticha, jugorum 3 inferiorum remota, minuta, subsquamiformia; apice fere duplicato-fissa, subinde vaginata, apice lineari-lanceolata, obtusa, ultra medium duplicato-fissa, antice suberenulata, intense lurido-viridia, siccitate se involventia et crispabilia, nervo crasso pallidior pellucido infra apicem evanescente; retis areolis rotundatis subtilissimis. FLORES probabiliter dioeci. Feminei in basi fissa folii supremi innovationum juniorum. Pistillidia 12, germine parvo ovato fusco, stylo quadruplo longiori crasso areolato ferrugineo, stigmate dilatato subbilobo lutescente. Paraphyses nullae. VAGINULA cylindrica, paraphysibus emarcidis obsita, viridi-brunnea, apice fusca. SETA circiter 3 lin., flexuosa, siccitate tortilis, laevis, inferne purpurascens, superne pallidior. SPORANGIUM suberectum, parvum, cylindrico-oblongum, infra os parum constrictum, paullo curvatum, inaequale, laeve, brunneum, ore purpureo. PERISTOMII dentes incurvi, siccitate erecti, coriacei, latiusculi, profunde bifidi, trabeculati, purpurei, cruribus ferrugineis. OPERCULUM convexum, rostratum, urna brevius, ferrugineum, rostro vix curvato luteo. CALYPTRA cucullata, glabra, straminea, apice fusca.

Fissidenti palmato simillimus, sed surculo lineari eleganter longifolio et ramoso, foliisque linearibus obtusis crenulatis, nervo denique infra apicem evanescente satis distinctus.

In humidis umbrosis supra Serra dos Orgãos terrestri, Januario: Beyrich. 24

2. FISSIDENS SERRULATUS BRID. surculo brevissime ascendente innovante; foliis 9-jugis alternis erecto-patentibus versus apicem surculi longioribus, ovato-lanceolatis mucronulatis ensiformi-

mibus subtilissime denticulatis evanidinervis; sporangio suberecto, oblongo-cylindrico obliquo, operculo conico-rostellato longitudine urnam subaequante.

Fissidens serrulatus Brid. *Bryol. univ.* II. 704.

Tab. nostra II. Fig. III.

Gregatim crescit. SURCULUS brevissimus, vix lin. longus, ascendens, per innovationes ramosus, humiditate planus, siccitate retrorsum convolutus, basi radiculosus, ad basin foliosus, rufus. FOLIA 9-juga, alterna, disticha, equitantia, jugorum 3 inferiorum minuta, remota, squamiformia, ovata, acuta; superiorum sursum majora et confertiora, lato-lanceolata, acuta, obliqua, ut infima fere ad apicem usque duplicato-fissa; summa imbricata, plusquam duplo majora, ovato-lanceolata, mucronulata, ensiformia, ad tertiam partem duplicato-fissa; omnia subtilissime denticulata, saturate viridia, nervo crasso pallidiori infra apicem evanescente instructa; retis areolis minutis circularibus seriatis. FLORES probabiliter dioeci. Feminei inter folia duo caulibus supra maxima, erecta. Pistillidium unicum, germine cylindrico brunneo, stylo subulato vix longiore purpurascens, stigmate dilatato hyalino. VAGINULA ovata, laevis, brunnea, apice rufescens. SETA erecta, interdum paullulum curvata, 1—2 lin. longa, laevis, siccitate tortilis, pallide purpurascens. SPORANGIUM suberectum, oblongo-cylindricum, obliquum, deoperculatum, infra os constrictum, laeve, pallide brunneum, ore purpureo. PERISTOMII dentes inflexi, lanceolato-subulati, profunde bifidi, trabeculati, ferruginei, cruribus pallidioribus. OPERCULUM conico-rostellatum, urnam longitudine subaequans, basi purpurascens, rostro obliquo pallide luteo.

In Serra d'Estrella et in prov. Minarum, terrestri: M. 24

SERIES VIII. HYPOPHYLLLOCARPI:

id est sporangio infra folium a reliquis forma diversum (stipulam, folium accessorium, amphigastrium seu tegmen Auct.) oriundo.

XLVII. RACOPILUM PAL. BEAUV.

SPORANGIUM subclavatum, inaequale, striatum, annulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus 16 lanceolatis extremitate subulatis; interius membrana carinato-plicata, divisa in dentes 16 in parte inferiore latiore fissos, ciliis interjectis. CALYPTRA campanulata vel mitraeformis, glabra, latere fissa, basi que laciniata. FLORES monoeci, cauligeni, gemmiformes, axillares. SURCULUS ramosus, compressus. FOLIA disticha, accessoriis aucta, laxè reticulata, evanidinervis.

Brid. Bryol. univ. II. 718. *Endl. Gen.* n. 588.

1. RACOPILUM TOMENTOSUM BRID. surculo repente postice tomentoso-radiculoso, vage pinnatim ramoso; foliis alternis patentibus ovatis cuspidatis serratis, amphigastriis cordato-lanceolatis longe cuspidatis subintegerrimis; sporangio cernuo subclavato parum curvato inaequaliter striato, operculo convexo breviter suboblique rostellato.

Racopilum tomentosum Brid. *Mant.* 152. *Bryol. univ.* II. 719.

Racopilum mnioides Pal. *Beauv. Prodr.* 87. et in *Mem. Soc. Linn. par.* I. 469. t. 9. f. 6.

Hookeria tomentosa Walk. *Arnott. l. c.* 57.

Hypnum tomentosum Sw. Prodr. 141. Fl. Ind. occ. III. 1823. Hedw. Stirp. crypt. IV. 48. t. 19. Spec. musc. 240. Brid. Spec. musc. II. 88. Schwaegr. Suppl. I. 2. 183. Raddi Crittog. bras. 8.

Hypnum mucronatum Pal. Beauv. Prodr. 66.

Hypnum arcuatum Hedw. Spec. musc. 245. t. 62. f. 1—7. Schwaegr. Suppl. I. 2. 208.

Pterygophyllum arcuatum Brid. Bryol. II. 348.

Hypnum ornithopodioides Lin. Spec. plant. 1589. Gmel. Pal. Beauv.

Leskia ornithopodioides Brid. Mant. 143. Spec. musc. II. 52. Musc. rec. II. 2. 124.

Leskia Omalia ornithopodioides Brid. Bryol. univ. II. 330.

Hypnum pennatum, ornithopodioides, pinnulis pellucidis Dill. Hist. musc. 270. t. 34. f. 9. a.

SURCULUS biuncialis valde radiculosus, radiculis in latere surculi inferiori tomentum molle ferrugineum formantibus. Rami prostrati vel repentes, simpliciusculi, ut surculus complanati. FOLIA simpliciter disticha, planiuscula, apicem versus serrata, siccitate marginibus involuta, laete viridia; nervo crasso in cuspidem excurrente, retis areolis parvis subrotundis irregularibus. Folia accessoria in latere superiori valde remota, lateralibus triplo minora, ceterum foliis lateralibus similia. FLORES monoeci, gemmiformes, cauligeni, axillares. Masculi ovati, foliis lateralibus duplo minores; FOLIA PERIGONIALIA exteriora ovato-acuminata, concava, integerrima, nervo continuo concolore; interiora magis magisque latiora et brevius acuminata; intima 2—3 parva, ovato-acuta, enervia; omnia viridia retis areolis hexagonis laxis; antheridia 8—10, oblonga, truncata, ferruginea, filamento brevi suffulta. Paraphyses subclavatae, antheridiis duplo longiores, articulatae, flavescentes. Feminei conici; FOLIA PERICHAETIALIA exteriora ovata, acuminata, concava, integerrima, viridia, nervo laxissimo concolore medium versus vel supra medium evanido instructa, retis areolis subhexagonis vel rhomboideis laxis; interiora magis magisque angustiora et longius acuminata, e basi latiore concava subulata, integerrima, viridia, nervo lato laxissimo versus apicem baseos latioris evanido instructa, retis areolis in basi latiore hexagonis amplis antice vero parallelogrammis angustis; intima 2—3 breviora, aut basi lanceolata aut subulata, enervia, ceterum exterioribus similia. Pistillidia circiter 10, germine oblongo, fusciscente, stylo fere triplo longiori subulato rufescente, stigmatibus subscutellato hyalino; paraphyses filiformes articulae, flavescentes, pistillidiis longiores. VAGINULA cylindrica, fusca, foliis perichaetialibus, pistillidiis, paraphysibus et apice etiam radiculis tecta. SETA uncialis, solitaria, erecta, apicem versus interdum parum curvata et in pseudoapophysin incrassata, laevis, siccitate tortilis, purpurascens. SPORANGIUM inaequale, leviter arcuatum, siccitate sulcatum, badium. PERISTOMII externi dentes lato-lanceolati, extremitate subulati, trabeculati, pallide rufescentes; interioribus est membrana plicata, hyalina, in dentes 16, exteriores longitudine aequantes et cum iis alternantes, lato-lanceolatos, carinatos, apice subulatos, in parte inferiore latiore fissos, articulatos, ciliis brevioribus tenerrimis interpositis, divisa. ANNULUS ex serie una cellularum constat. OPERCULUM urnae concolor.

In truncis silvarum aboriginum prope Sebastianopolin: Olfers; — ad rupes umbrosas in Serra d'Estrella, Augusto: Raddi et Beyrich; — in prov. Rio Grande do Sul: Sellow; — in prov. Minarum: M. 2.

XLVIII. HYPOPTERYGIUM BRID.

SPORANGIUM aequale, exannulatum. PERISTOMIUM duplex: exterius dentibus 16 lanceolato-subulatis incurvis; interius membrana reticulata plicata, divisa in dentes totidem perforatos, interdum ciliis interjectis. CALYPTRA mitraeformis. FLORES probabiliter dioeci; feminei ad basin ramis inserti, gemmiformes. FOLIA disticha et amphigastria in surculo complanato.

Brid. Bryol. univ. II. 709. Hookeriae Spec. Sm. Brown. Endl. Gen. n. 587.

1. HYPOPTERYGIUM LARICINUM BRID. surculo repente, divisionibus dendroideis erectis, inferne simplicibus, superne pinnato-ramosis, ramis erecto-patentibus subsimplicibus complanatis; foliis oblique insertis patentissimis lato-ovatis acuminatis obliquis argute serratis pellucidis, nervo crasso medio evanido; amphigastriis duplo minoribus subappressis subcordato-acuminatis, nervo brevissimo; sporangio nutante obovato (operculo e basi conica curvirostro BRID.).

Hypopterygium laricinum Brid. Bryol. univ. II. 714.

Hypnum laricinum Hook. Musc. exot. I. t. 35. II. 19. Kunth. Synops. plant. aequinoct. I. 62.

Hookeria laricina Walk. Arn. l. c. 57.

SURCULUS repens, filiformis, radiculosus, divisionibus dendroideis erectis, inferne simplicibus radiculosus, superne pinnato-ramosis. Ramuli simplices, rarius pinnati, erecto-patentes, complanati, in latere inferiori amphigastriis squamiformibus obsiti. FOLIA disticha, oblique inserta, patentissima, lato-ovata, acuminata, indistincte marginata, argute serrata, pellucida, intense viridia, nervo crassiusculo concolori medio evanido; retis areolis rotundato-parallelogrammis laxis. AMPHIGASTRIA foliis duplo minora, subappressa, cordato-acuminata, serrulata, foliis caulinis concoloria, magis pellucida, nervo brevissimo; retis areolis laxioribus. FLORES probabiliter monoeci. Feminei in superficie ramorum inserti, gemmaeformis; FOLIA PERICHAETIALIA 10—12, exteriora 2—3 parva, ovata, obtusiuscula; interiora magis magisque acuminata, intima subvaginata et longe acuminata; omnia concava, integerrima, enervia (nervum brevem, quem HOOKERUS l. c. his foliis tribuit, videre haud contigit), pallide viridia, pellucida; retis areolis in folii basi subquadratis, medio et antice parallelogrammis laxissimis. Pistillidia 8, longa, germine oblongo fusciscente, stylo duplo longiori lineari reticulato hyalino, stigmatibus dilatato. Paraphyses nullae. VAGINULA brevis, ovata, pistillidiis emarcidibus obsita, ferruginea. SETA erecta, interdum apicem versus curvata, solitaria, subuncialis, laevis, siccitate tortilis, purpurascens. SPORANGIUM nutans vel cernuum, obovatum, deoperculatum interdum subpyriforme, laxe areolatum, fusciscente, PERISTOMII exterioris dentes incurvi, siccitate erectiusculi, lanceolato-subulati, a basi ad medium linea media verticali obscura notati, subtilissime transversim costati, costis ad margines cristato-prominentibus inflexis, pallide ferruginei, apice subhyalini; interius membrana albicans, plicata, areolata, in dentes 16 producta, exterioribus vix breviores, lanceolato-subulatos, carinatos, perforatos, articulatos, ciliis geminis subulatis articulatis subhyalinis interpositis. (OPERCULUM e basi conica curvirostrum, urna duplo minus BRID.) CALYPTRA dimidiata, glabra.

In Serra d'Estrella ad saxa humida, Augusto, cum fructibus deoperculatis: Beyrich. 2.

ICONES MUSCORUM EXPLICATAE.

- TAB. I. FIG. I. *Grimmia julacea*, pag. 7.
 II. *Mielichhoferia brevicaulis*, pag. 8.
 III. *Holomitrium Olfersianum*, pag. 18.
 IV. *Schlotheimia Merkelii*, pag. 29.

- TAB. II. FIG. I. *Mnium Auberti*, pag. 45.
 II. *Fissidens flabellatus*, pag. 91.
 III. *Fissidens serrulatus*, pag. 91.

- TAB. III. FIG. I. *Hookeria Merkelii*, pag. 62.
 II. *Hookeria microcarpa*, pag. 62.
 III. *Hookeria Martiana*, p. 63.
 IV. *Hookeria Olfersiana*, pag. 64.

(Icon ad *Hookerian* pallidam p. 64 citata delenda.)

- TAB. VI. FIG. I. *Hypnum Beyrichii*, pag. 81.
 II. *Hypnum papillosum*, pag. 82.
 III. *Hypnum microcarpum*, pag. 84.
 VI. *Hypnum urceolatum*, pag. 87.

Siglae, quibus singulas iconum partes intelligi volumus.

I. Plantam ejusve partem magnitudine naturali depictam esse notat.
 Quae numeris arabicis inscriptae sunt figurae, omnes varia magnitudine sub lente tam simplici quam composita visae representantur.

1. Surculus vel ejus pars.
2. Folium (phyllidium).
- 2 a. Folium magis auctum.
- 2 b. Pars folii basilaris.
- 2 c. Pars folii apicalis.
- 2 d. Sectio per folium transversa.
- 2 e. Folium surculi aut rami fertillis inferius.
- 2 f. Folium surculi aut rami fertillis superius.
- 2 g. Folium surculi aut rami sterilis.
- ♂ Flos sic dictus masculus.
- ♀ Flos sic dictus femineus.
3. Folium perigonii exterius.
4. Folium perigonii interius.
5. Spermatozystidia HEDW., sive antherae auct., antheridia BISCHOFFIO aliisque dicta, cum adstantibus paraphysibus s. adductoribus.

6. Folium perichaetii exterius.
7. Folium perichaetii interius.
- 7 d. Sectio per folium perichaetii transversa.
8. Vaginula, adhaerentibus saepe paraphysibus et pistillidiis depauperatis.
9. Pistillidia, sive archegonia.
10. Calyptra, sive epigonium archegonii.
11. Operculum aut separatam aut urnae adhucdum connexum.
12. Urna integra aut ejus pars, in orificio peristomium integrum aut ejus partem exhibens.
13. Peristomii pars magis aucta.
14. Gongyli.
15. Annulli pars.

Icones, quas hic repetitas vides, a cl. F. W. SCHIMPERO, apud Argentoratenses Musei historiae naturalis custode, quam accuratissime sunt delineatae.

EXCURSUS PHYTO-GEOGRAPHICUS.

Expositis Muscorum frondosorum Brasiliae generibus et speciebus diligenti HORN-SCHUCHII nostri opera, nonnulla de plantularum istarum per vastum Florae nostrae imperium distributione et sedibus observata addere e re videtur. Species hoc loco recensitae 196 non excedunt, parvus numerus ingentem illum terrae tractum considerantibus, magnus mihi reputanti, botanicis ante hos triginta annos nec unicum Muscum brasiliensem innotuisse. Sunt inter has species 76 ab HORN-SCHUCHIO primum constitutae, ita ut tertia pars omnium recensitarum novis, ut vocant, speciebus sit accensenda. Creditur plerumque in regionibus tropicis circulis inclusis minorem Muscorum copiam generari, terras polo propius adsitas majorem numerum alere. Facile tamen quis sibi persuadeat, ingentem pusillarum istarum plantarum in naturae oeconomia utilitatem mente revolvens, in regionibus illis, tanta omnigenarum stirpium copia praecellentibus, multo majorem Muscorum gigni copiam, quam vulgo censetur. Quam multae nos latent in Brasilia species, humano invisae oculo et mortalibus intactae manibus, quam multae silvarum aeternarum inaccessis innascuntur arboribus, et in paludum a diris draconibus defenso delitescunt recessu, in vagis fluminum rapidissimorum ripis vigent, vel in uberi lucorum solo scrutatorem fugiunt, continuo a minutis istis plantulis avocatum et splendidissimae naturae irretitum illecebris!

Quod Muscorum frondosorum per imperium Brasiliae distributionem attinet, crediderim eodem modo, quo plantarum universitati certas provincias natura assignavit, etiam Muscorum species suis quamque sedibus ab ea fuisse adscriptas. Quodsi Florae nostrae imperium, quemadmodum alio loco docuimus*), secundum principum plantarum habitum et specierum diversae familiae numerum, in regiones quinque dividimus, (regionem nempe extratropicam valliculosam, cujus plantas brevitas causa *Napaeas* voco, regionem montano-campestrem plantarum *Oreadum*, montano-nemorosam *Dryadum*, calido-siccam *Hamadryadum* sedem, denique calido-humidam, sive aestuantem et udam aequatorialem, plantarum *Najadum* feracem) ex iis, quae Muscorum generationem efficiunt et secundant, conjicere licet, simili ratione, qua plantas nobiliores per Brasiliam distributas observavimus, vilem etiam Muscorum catervam pro formarum diversitate et specierum numero esse distributam. Regio montosa, silvis consita, imprimis montium tractum littoralem (Serra do Mar incolis) constituens, *Dryadum* territorium, aptissima Muscorum sedes, illorum creditur feracissima. Rupes primigeniae, perpetua umbra roridae et aeternis irriguae fontibus, solum argillaceum ferri particulis grave, vastarum arborum, in silvis intactis propinqui sideris et adjacentis oceani efficacia fecundis, et perenni fronde decoris, annosus cortex Muscorum generationi imprimis conveniunt, et revera plurimae nostrarum specierum e

talibus locis adlatae fuerunt, quos tamen diligenti prae aliis opera exploratos fuisse caute memineris. Etiam regio calida et humida specierum partim arborum truncis, partim aquae innascentium, saxa tamen arenaria fugientium, ferax. In regione montano-nemorosa et calido-humida vetustae arbores denso Muscorum et Jungermanniarum pulvino vestitae reperiuntur. In regione montana, Minarum nempe districtu, et in interioribus Bahiensis provinciae dittonibus, quae celsiori clivo assurgunt et soli genere admodum vario gaudent, Musci non sunt infrequentes, etsi paucas tantum species a POHLO, SELLOWIO et me ipso, celeri itinere properantibus, ibi lectas enumeratio nostra exhibet. Napaeorum regionem (Rio Grande et Monte Video) silvis vastis destitutam, et in universum reliquae Brasiliae satis dissimilem, Muscorum minus feracem credimus. Inter paucas species ex australibus hisce imperii nostri regionibus, a SELLOWIO missas, nonnullae capenses, velut *Brachysteleum crispatum* et *Hypopterygium laricinum*, quod ab aliis in Andibus Peruviae lectum fuerat, reperiuntur. Pauperrima omnium est regio calido-sicca (Brasilia centralis et boreali-orientalis, provinciarum Goyaz, Pernambuco et Bahia) *Hamadryadum* sedes, humili fruteto vel talibus silvis consita, quibus deficiente pluvia frondium decus defluit, humorum copiae in universum expers. Quot qualesve Muscorum species Brasiliae sint propriae hodierna experientia definiri nequit, parvum credimus numerum, reputantes plurimas Muscorum species latissime per terrarum orbem esse diffusas, et sub diversissimo coelo, nonnullas etiam in diverso admodum solo vivere. Muscorum species brasilienses in aliis simul regionibus observatas paucis indicamus.

E Muscis latissime per terrarum orbem observatis, qui in Brasilia lecti sunt, nominamus: *Sphagnum cymbifolium*, *Funariam hygrometricam*, *Bryum argenteum* et *caespitium*; e speciebus Europaeis: *Sphagnum squarrosum* et *compactum*, nec non *Polytrichum strictum*, etiam in America boreali indigenum. — Europae australi et Brasiliae communes sunt: *Hymenostomum subglobosum*, *Barbula cirrhata* et *Funaria Fontanesii*, in Aegypto et Barbaria simul obvia. — Musci late per regiones tropicis circulis inclusas et vicinas diffusi et in Brasilia simul reperti sunt: *Octoblepharum albidulum*, *Hyppnum spiniforme* et *Drepanophyllum fulvum*, etiam in Antillis, Gujana, Peruvia et in longe dissitis insulis Mascarenis collecti. — *Neckera undulata* per omnem Americam tropicam, terram Patagonium et in insulis Marianis reperitur. *Racopilum tomentosum* in Brasilia, Mexico, Antillis et insulis Mascarenis viget. *Schlotheimia torquata*, latissime diffusa, in Asia nondum reperta fuit.

Insulae Mascarenae, Plutonis opus basalticum, Muscos gignunt plures, quod miror etiam e Brasilia adlatis: *Macromitrium fimbriatum*, *Mnium Auberti*, *Polytrichum glabrum* et *P. adpressum*. *Neckera imbricata* et *Dicranum juniperoideum* sicut in Brasilia et Mascarenis, etiam in Teneriffa nascuntur; in hac

*) Herbarium Florae Brasil. ein Beiblatt zur Flora s. Regensb. bot. Zeitung 1837 II. p. 57.

insula etiam *Fissidens flabellatus*, species pariter brasiliiana, vivit. — *Dicranum megalophyllum* et *Trichostomum squarrosum* in Mascarenis, Nepalia et Brasilia reperiuntur.

America borealis et Brasilia communes habent: *Polytrichum brevicaulis*, *Hypnum fragile* et *Hypnum microphyllum*; imperium mexicanum: *Macromitrium apiculatum* et *Leskiam caespitosam*, etiam in insulis Antillanis indigenam.

Insulae Antillanae, a Swartzio et postea a bryologis Gallis et Anglis exploratae, Muscorum satis feraces, species brasilienses plures alunt: *Barbulam linearem*, *Macromitrium mucronifolium*, *cirrhosum*, *Bartramiam uncinatam* et *sphaerocarpam*, *Polytrichum antillanum*, *Pilotrichum flagelliferum* et *piniforme*, *Hookeriam repentem*, *Phyllogonium fulgens*, in insula Tristan d'Acunha et in Mascarenis simul indigenum, et *Neckeram disticham* a Palisoto in Africae littore occidentali repertum. — *Schistidium torquatum* simul in Peruvia et *Funaria calvescens* etiam in Nova Hollandia vivunt.

Regna quae Brasiliae a septemtrione et occidente adita sunt, nempe regio Orinoci, Peruvia et Chile, quorum Musci olim ab Humboldtio et Bonplandio, nostris diebus ab Anglis indagati fuerunt, plures species largiuntur Florae nostrae cives, e quibus *Dicranum juniperoideum*, *Acidodontium Kunthii*, *Bartramiam longifoliam*, *Hydropogonem fontinaloidem*, *Hookeriam*

incurvam et *Hypnum loxense* nominasse sufficiat. — Aliae species brasilienses, in Patagonia, Peruvia et Chile indigenae, velut *Macromitrium longirostre* et *Catharinea magellanica*, etiam in Nova Zeelandia proveniunt. *Sclerodontium pallidum* et *Thysanomitrium introflexum*, etiam in Mascarenis obvium, Brasilia cum Nova Hollandia habet communia.

Paucissimas species brasilienses, e quibus *Macromitrium sulcatum* nomino, in Asia repertas fuisse observandum est.

Atque haec de Muscorum brasiliensium distributione hoc loco dicta sufficiant, satis peritis indicantia, minutissima plantularum istarum semina juxta leges penitus ignotas, nec facile ratiocinio nostro assequendas, per telluris superficiem fuisse dispersa, nec ullam plantarum familiam, si Muscos hepaticos et Filices excipimus, tam vagis sedibus esse disjunctam. Ceterum imperii brasiliensis Flora bryologica omnium fere, quas in naturali Muscorum familia distinguimus, formarum typos quosdam exhibet, quod ut clarius appareat in tabula hic proponimus Muscorum brasiliensium genera, juxta sectiones naturales a BRIDELIO introductas disposita, quo loco simul monendum est, sectiones istas, bryologis omnibus familiares, etsi plura adversus illa quibus superstruuntur principia possent moneri, in hoc opere admittere, quam alieno quasi in loco Muscos in naturales sectiones disponere, satius visum fuisse.

SECTIONES NATURALES.	GENERA BRASILIENSIA ADJECTO NUMERO SPECIERUM.	Nus.
Musci: <i>Sphagnoides</i> :	<i>Sphagnum</i> , 3 species	3.
<i>Phascoidei</i>	—
<i>Gymnostomoides</i> :	<i>Gymnostomum</i> , 1 } <i>Hymenostomum</i> , 1 }	2.
<i>Grimmioides</i> :	<i>Schistidium</i> , 1 } <i>Grimmia</i> , 1 } <i>Hydropogon</i> , 1 } <i>Holomitrium</i> , 2 }	5.
<i>Campytopodes</i> :	<i>Thysanomitrium</i> , 3	3.
<i>Splachnoides</i>	—
<i>Orthotrichoides</i> :	<i>Brachysteleum</i> , 1 } <i>Macromitrium</i> , 16 } <i>Schlotheimia</i> , 17 }	34.
<i>Weissioidei</i> :	<i>Coscinodon</i> , 1 } <i>Octoblepharum</i> , 1 } <i>Syrrophodon</i> , 2 }	4.
<i>Dicranoides</i> :	<i>Dicranum</i> , 11 } <i>Trematodon</i> , 2 }	13.
<i>Trichostomoides</i> :	<i>Trichostomum</i> , 1	1.
<i>Barbuloidei</i> :	<i>Barbula</i> , 3	3.
<i>Bryoidei</i> :	<i>Bryum</i> , 7 } <i>Webera</i> , 1 } <i>Mnium</i> , 4 } <i>Brachymenium</i> , 2 } <i>Mielichhoferia</i> , 1 }	15.
		83.

SECTIONES NATURALES.	GENERA BRASILIENSIA ADJECTO NUMERO SPECIERUM.	Nus.
Musci: <i>Bryoidei</i> :	<i>Orthodontium</i> , 1 } <i>Acidodontium</i> , 1 } <i>Peromnium</i> , 1 } (15 +) } <i>Pohlia</i> , 1 } <i>Funaria</i> , 3 }	7.
<i>Bartramiae</i> :	<i>Bartramia</i> , 6	6.
<i>Polytrichoides</i> :	<i>Catharinea</i> , 1 } <i>Polytrichum</i> , 7 }	8.
<i>Hypnoidei</i> :	<i>Hypnum</i> , 34 } <i>Leskia</i> , 8 } <i>Helicodontium</i> , 1 } <i>Hookeria</i> , 15 } <i>Fabronia</i> , 1 } <i>Neckera</i> , 10 } <i>Antitrichia</i> , 1 } <i>Leucodon</i> , 1 } <i>Pilotrichum</i> , 10 } <i>Lepidopilum</i> , 1 } <i>Sclerodontium</i> , 2 } <i>Pterobryon</i> , 2 }	86.
<i>Filicoidei</i> :	<i>Drepanophyllum</i> , 1 } <i>Phyllogonium</i> , 1 } <i>Fissidens</i> , 2 }	4.
<i>Jungermannioidei</i> :	<i>Hypopterygium</i> , 1 } <i>Racopilum</i> , 1 }	2.
		196.

Sunt Gymnostomi 5, Peristomi 191; Acrocarpi 104, Pleurocarpi 92 et deductis Orthotrichoideis, qui inter utramque seriem ambigunt, 58.

MARTIUS.

LYCOPODINEAE.

EXPOSUIT

ANTONIUS FRIDERICUS SPRING,

PHIL. ET MED. DOCT. PHYSIOLOGIAE ET ANATOMIAE GENERALIS PROFESSOR P. O.
IN UNIVERSITATE LEODIENSI.

LYCOPODINEAE.

Swartz. Syn. Fil. 87. R. Brown. Prodr. 164. Mart. Ic. plant. crypt. bras. 37. Lycopodiaceae
Lindley Natur. Syst. of Botan. edit. 2. 403. Endl. Gen. pl. 69. Ord. 36.

PLANTAE MUSCOIDEAE, JUNGERMANNIOIDEAE VEL FILICOIDEAE, TERRESTRES, HERBACEAE AUT SUFFRUTESCENTES, PAUCISSIMIS EXCEPTIS PERENNES, LONGAEVAE, PARVIFOLIAE, CENTRALI - VASCULARES, FOLIIIS OPPOSITIS GERMINANTES, FOLIORUM EPIDERMIDE STOMATIBUS GAUDENTE, FRUCTIFICATIONE NUNC HOMOGENEA NUNC HETEROGENEA (PSEUDO-SEXUALES), ORGANIS PROPAGATORIIS NUDIS, SEJUNCTIS, RIMA HIANTIBUS, EPIPHYLLIS SPECIE AXILLARIBUS.

RADIX (PRIMARIA) fugax, fibrosa, fibrillis ramulosis, intus lignescentibus, extus tomento obductis. RADICULAE SEU RADICES SECUNDARIAE (STOLONES Auct.) sub exortum simplices, apice demum ramulosae, vel immediate humo innascentes, vel super bifurcationes ramorum antrorsum refractae elongatae. CAULIS repens vel adscendenti-erectus, nonnunquam hypogaeus, paucis pendulus vel scandens, e foliis abstersis demum cicatrisatus, alternatim et dichotome divisus; constans fasciculo vasorum centrali densissimo saepe lignoso, et strato corticali celluloso laxiori fasciculis vasorum, ramulis foliisque destinatarum, oblique percurso. VERNATIO vix circinata. FOLIA simplicia, sessilia et utrinque plus minus decurrentia, quin imo cauli ita coadunata, ut stratum corticis exterius per se formare videantur, nunquam articulata neque delabentia sed sphacelo quasi deorsum marcescentia, uninervia, nunc homomorpha, nunc dimorpha, aliis nimirum LATERALIBUS majoribus, aliis INTERMEDIIS (SUPERFICIALIBUS Willd., STIPULIS Hook. Grev.) minoribus solenniter anticis. FRUCTIFICATIO efficitur nunc uno nunc duplici genere THECARUM (CAPSULARUM V. SPORO-CARPIORUM), semper distinctarum, minutissime stipitatarum (stipite s. pedicello capillari brevissimo cum folio semper connato), nunc per caulem dispersarum, nunc in AMENTA s. STROBILOS (ramos transmutatos) collectarum; quarum ANTHERIDIA (SPORANGIA Web. et Mohr., Desv. et aliorum, CAPSULAE FARINIFERAE Dill. Kaulf.) solenniter 1-locularia, paucis 2- et 3-locularia, 1—2—3-valvia, rima nempe transversali hiantia, reniformia, subglobosa vel oblonga, FARINA POLINARI seu SPORALI subtilissima, inflammabili, flava vel rubra, foeta. OOPHORIDIA (CAPSULAE SEMINALES Dill., GLOBULIFERAE Kaulf., PROPAGULIFERAE Desv., RECEPTACULA TUBERCULIFERA Bischoff.) unilocularia, aliis minima, numerosa, aliis majuscula solitaria, 3—4-coeca, 3—4-valvia, valvulis plerumque inaequaliter rumpendis laceris, GLOBULOS SEMINALES 3—4 continentia. SPORAE (antheridiorum, s. GONGYLI minores) largissimae, minutissimae, in cellulis matricilibus mox delitescens oriundae, quaternatim conglobatae indeque facie contigua tetraëdrae, in facie libera rotundata, (ex communi sporodermate) plerumque hispidula, papillosa vel echinata. GLOBULI SEMINALES (s. GONGYLI majores, TUBERCULA SPOROIDEA Bischoff.) membrana alba (PERISPERMIO vel PERIPROTOTHALLO) haud raro reticulata et nucleo vitellino (PROTOTHALLO) constantes, ex contiguitate rhaphe tricruri radiata decorati.

DE LYCOPODINEARUM MORPHOSI.

RADICES PRIMARIAS *Lycopodinearum* plerumque vidimus fugaces, ingresso nempe fructificationis processu a caule resolvendas seu necrosi pereundas, crebro etiam nullas: semper autem ea ratione conformatas, ut Ascensui s. partibus sursum directis solitum atque nobilioribus plantis necessarium aequipondium obtinere non potuerint. *Lycopodia* nobis indigena radicem primariam quotannis perdere, ejusque loco apicem caulis solo immittere solent, qui in iteratam radicem prolis futurae transformatur: unde fit, ut stirps de uno loco in alterum crescendo migrare videatur. Innixus analoga semper radicem formatione lubenter credo, idem de omnibus *Lycopodineis* extraneis quoque valere. Liquet vero exinde cuinam scopo destinatae sint RADICULAE seu STOLONES, quos ante hac nominaverunt. Sunt quasi brachia vel ramuli, quibus super terram procedere et migrare valent *Lycopodia*, subeunt munus radicis primariae jam exhaustae vel saltem exhauriendae, et optime comparantur insuper cirrhis, quibus plantae scandentes vel volubiles solenniter sunt instructae. Declaratur porro GEMMULAS s. d. PROLIFICAS in *L. Selaginis*, *serrati*, *luciduli*, aliorum summitatibus observatas, nil esse nisi gemmas quasi radicales, terrae immergendas seu bulbos veros ad reproducendas radices destinatos.

CAULIS ET RAMI neque gemmis praecedentibus, neque ulla alia mediante causa, sed principali nisu centrifugo dividuntur. Omnis igitur RAMIFICATIO consistit in simplicissima partitione fasciculi vasorum centralis, et observationes docuerunt, non solum foliorum vasa longe infra insertiones externas de illo solvi, sed singulos quoque ramos inde a partitionis loco externo quasi radicibus per contextum cellulosum disjunctos descendere usque ad truncum caulis communem.

CORTICIS CAULINI STRATUM EXTERNUM minus cauli ipsi quam foliis attinere videtur. Constat partibus foliorum decurrentibus atque inter se connatis. Singula vero s. d. FOLIA revera nil sunt, nisi pinnulae folii compositi, cujus partes inferiores confusae, coadunatae et caulem vaginantes. Axillas igitur formare i. e. axi nequeunt ita apponi, ut novarum formationum v. g. ramulorum vel florum conditio et fundamentum fiant. Fructificationes econtra revera sunt epiphyllae, ut in *Filicibus*, et specie solummodo axillares.

CAPSULAS FARINIFERAS et GLOBULIFERAS non de essentia sed per accidens solummodo esse diversas neutiquam credo. Est omnino antithesis inter ipsas, sexuali analoga, licet non eadem. Causa, quae prohibet antithesin sexualem veram, ponitur in deficientia earum antitheseon, quae omnem sexus evolutionem praecedere debent. Indevincibilis enim per regnum vegetabile valet lex, unde omne organon propagato-

rium — a stirpe originaria demum sejungendum — aliquam, ut evolvatur, exposcit oppositionem systematum plantae fundamentalium: radicis, caulis, foliorum. Quum vero per cunctos plantarum ordines haec systemata nec eundem evolutionis gradum assequi nec eadem ratione sibi opponi soleant, sequitur: organa propagatoria, ab illis semper mediata, non eandem utique reddere posse dignitatem s. d. individuaalem. Diversa potius esse debent ex diversa systematum sibi oppositorum dignitate atque ex diverso oppositionem praecedentium numero. Antithesis folii cum folio ad procreandum organon propagatorium tentans dicitur discrimen sexuale: et productum hujus antitheseos SEMEN. Discrimen igitur sexuale tunc demum possibile, quum folium (perfectum) masculinum folio (perfecto) femineo opponi potest. Folium vero perfectum est, si a caule penitus sejunctum et propria lege evolutum, i. e. si cauli rite oppositum. Haecine itaque oppositio praecedere semper debet oppositionem sexualem, uti eadem ratione oppositio caulis cum radice praecedere debet oppositionem foliorum cum caule; nam folium nunquam praesumitur prae radice, flos nunquam prae folio. Vegetabilia minoris ordinis, quibus folia non inter se sed cauli solummodo opponi incipiunt, non seminibus, sed GONGYLIS sive SPORIS: inferiora etiam, quibus nec folia inter se nec cauli sed caulis radici solummodo opponi incipit, nec seminibus, nec sporis, sed SPORIDIIS propagantur. *Lycopodinea* vero, quum inde a *Muscis* atque *Filicibus* in Vegetabilia majoris ordinis transitum jam ostendant, non homogenea utique gaudere fructificatione, sed discrimini sexuali analogon quoddam proferre, non est quod miremur. Sunt enim species foliis a caule magis liberatis atque inter se diversis (sibi suboppositis) decoratae (generi *Selaginellae* attinentes), quae protrudunt duo fructificationis genera, quorum alterum antheris (Phanerogamorum), alterum ovarii comparari debent. Non sunt antherae, non ovaria, quia non commercium sexuale inter illa. Sunt autem antheris atque ovariiis similia, quia formationem quasi intermediam expriment fructificationes inter simplices seu agamas et compositas seu sexuales. Vagos igitur atque minime convenientes adhuc usitatos terminos omittentes, genus alterum diximus ANTHERIDIA, alterum OOPHORIDIA. Globulos seminales oophoridiis contentos germinare viderunt praeter ceteros BROTERO, SALISBURY (Transact. of Linn. Soc. XII. p. II. 360. t. 19.) et nuperrime cl. BISCHOFF (Krypt. Gew. II. addit.). Farinam vero pollinarem seu sporas antheridiis contentas testibus LINDSAY, Jos. FOX (Usteri Annal. XX. ss.) et WILDENOW (Spec. Pl. V. p. VIII.) aequae nonnunquam germinare non obstat opinioni nostrae de vera Antheridiorum natura. Etenim farina pollinaris non est pollen verum, uti globuli seminales oophoridiorum non ovula vera: sed facultas propagatoria ambobus eotenus est communis, donec differentia

sexualis (polaris) eandem alteri (masculo) polo deripiat ut alteri (femineo) contribuat. Constat insuper, farinam pollinarem usquedum iis solummodo speciebus rite germinavisse, quae oophoridiis sunt destitutae i. e. *Lycopodius*, dum *Setaginellis* ad propagationem non amplius sint apti*).

*) Annotante Martio, viro dilectissimo.

I. LYCOPODIUM.

ANTHERIDIA unilocularia. OOPHORIDIA nulla. *Plurima musciformia, foliis conformibus aequaliteris, 8-16-, raro 4-fariis, caule amorpho.*

ANTHERIDIA reniformia, subdidyma, raro transversim ovalia (*L. inundatum*), rima transversali apice, raro prope basin (*Chamaectinis Mart. olim. in Hort. Reg. Monac. 1829. 3*) hiantia, indeque specie bivalvia, pedicello capitato vel capillari brevissimo: GONGYLIS (quaternis) subglobosis, facie contigua tetraquetris. *AMENTA vel nulla vel teretiuscula.*

Endlich. Gen. n. 696. Ad Brongniart Hist. de Végét. fossil. II. 2. Spring in Regensb. Botan. Zeit. 1838. I. 148. *Lycopodii* sp. Linn. Gen. n. 1185. Swartz. Syn. Fil. 173. Willd. Sp. Pl. V. 10. *Selago et Lycopodium Dillen. Hist. muscor. 435 et 441. Plananthis et Lepidotis Palis. Beauv. Prodr. des cinq. et six. Fam. de l'Aethéogamie 100 et 101.*

SECTIO I. ANTHERIDIIS SPARSIS. SELAGINES DILLEN.

§. 1. *Caule erecto, rigido.* Spec. 1—3.

§. 2. *Caule pendulo, flaccido.* Spec. 4—10.

SECTIO II. ANTHERIDIIS IN AMENTA CONGESTIS. AMENTACEA LYCOPODIA DILLEN.

§. 3. *Foliis caulinis homomorphis, caulem circa circum obsidentibus. Homoeophylla.*

a) *Ramis cum caule conformibus.* Spec. 11—13.

b) *Ramis (sterilibus et fertilibus) difformibus.* Spec. 14—15.

§. 4. *Foliis caulinis dimorphis, caule vel compresso vel dorso nudo. Heterophylla.*

a) *Caule dorso aphylo, ramis humo adpressis Cylindrostachya Mart.* Spec. 16—17.

b) *Ramis complanatis, erectis. Complanata Hook. et Grev.* Spec. 18—19.

SECTIO I. ANTHERIDIIS SPARSIS. SELAGINES.

§. 1. *Caule erecto, rigido.*

1. *LYCOPODIUM REFLEXUM* LAM. caule adscendente, aequali-diviso; foliis 8-fariis, *undique reflexis*, planis, lineari-subulatis, subintegerrimis, *uniformibus*; antheridiis suborbiculari-reniformibus.

Lam. Enc. Bot. III. 653. Willd. Spec. Pl. V. 52 (sepos. synonym. Plum. et Dillen. Cfr. Linnæa 1830. 622.)

Lycopodium rigidum Gmel. Syst. nat. 1287. Swartz. Syn. fil. 176. Raddi Fil. bras. 78. (neque Willd. aut Kunth.)

Lycopodium reversum Presl. Reliqu. Haenk. 82.

Lycopodium squarrosum Swartz. Flor. Ind. occ. III. 1571.

In generibus limitandis atque definiendis servavimus leges a summis Botanices excultoribus adhuc latas. Ingenue autem fatemur, nos placide expectare tempus, quo concessum erit, affines familias omnes, in quibus fructificatio minoris revera momenti est quam foliorum relatio ad caulem et distributio vasorum caulis (et venarum foliarium), ex hisce memoratis characteribus in genera dividendi, id quod cel. AD. BRONGNIART in dislocandis Filicibus fossilibus feliciter jam est conatus.

CAULES $\frac{1}{2}$ —1—1 $\frac{1}{2}$ pedales, humiliores erecti, proceriores subadscendentes, e foliis decurrentibus striati, undique foliosissimi, crassitie pennam corvinam vix adaequantes, semel usque quater aequaliter dichotomi, DIVISIONIBUS fastigiatis, ex angulo 45° parallelis. FOLIA 2 lineas longitudine, $\frac{1}{2}$ lin. latitudine ad basin excedentia, undique patentissima et recurva, summa confertissima erecto-fasciculata, lineari-subulata, pungenti-acuta seu mucronulata, subintegerrima vel potius inaequaliter et obscure serrulata, marginibus non revolutis, lucidulis, uninervia, in nervo plurimis carinato, laete viridita, rigida, siccitate transversim rugulosa, supra per lentem minutissime striolata, et subtus ad nervum hispidula, ad basin decurrentem gibbosa. ANTHERIDIA densissime congesta, suborbiculari-reniformia, subcuneata, brevissime pedicellata, sublente composita minute punctulata, hispidula, colore cerino, demum sordide fusco, magnitudine seminis Sinapeos. GONGYLII albidii, echinati.

Occurrit quoque foliis spinuloso-dentatis, quibus in *L. bifidum* Humb. et Bonpl. (de quo Botan. Zeit. 1838. I. 152.) transire tentat.

In montibus d'Estrella frequens: Raddi; — alias in silvis montanis prov. Sebastianopolitanae et in silvis prov. Paraënsis passim: M. 2.

2. *LYCOPODIUM MANDIOCCANUM* RADDI *juniperoideum*, lignosum; caule erecto, *purpureo*, crasso, aequali-diviso; foliis sparsis, divaricatis, *longissimis*, lineari-subulatis, supra sulcatis, subtus nervosis, subdifformibus; antheridiis majusculis, late reniformibus.

Lycopodium mandioccanum Raddi Fil. bras. 77. t. 4. Ad Brongniart Végét. fossil. II. t. 1.

Lycopodium dichotomum Hook. et Grev. En. fil. n. 22. (minime Jacqu. Sw.) Kunze Synops. in Linnæa IX. 5. (neque Jacqu. et Swartz.)

Lycopodium pithyoides Cham. et Schlecht. in Linnæa V. 623.

CAULES 10—12 pollices longus, basi saepe pennam cygneam crassitie adaequans, mox 4—5-aequali-divisus: DIVISIONIBUS furcato-divergentibus, sursum decrecentibus, fastigiatis. FOLIA subverticillata, inferne dimote 16-, sursum 8-faria, conferta, divaricato-reflexa, vix summa erecta, pollicem fere longa, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata, aceroso-rigida, subfalcata, acutissima, marginibus late subreflexis, decurrentia, parte decurrente purpurascente, ampliata, trilineata; FRUCTIGERA (superiora) breviora, incurvata. ANTHERIDIA majuscula, exacte reniformia, flavida, per lentem punctulis nigris sparsis notata, FARINA albedo-flavescente repleta.

Species pulcherrima, distinctissima, prolem Pini silvestris habitu repraesentare videtur. Variat ramis recte divergentibus, incurvatisque. Folia in junioribus magis sunt erecta. — Planta mexicana (*L. pithyoides* Cham. et Schlecht.) differt foliis longioribus, evidentius bisulcatis, sub insertionem carinatis, cristaque decurrentibus.

In opacissimis silvis ad Mandioccam, solo humido: Raddi, M.; — et alibi in prov. Sebastianopolitanae, nec non in altis prov. S. Pauli: M.; — in silvis Morro d'Arara: Maximil. seren. Princ. Vidensis; — in Serra d'Estrella: Beyrich. 2.

3. LYCOPODIUM RUBRUM CHAM. caule adscendente, subaequali-diviso; foliis confertissimis, 8-, sursum 6-fariis, adpresso-erectis, dorso carinatis, subulatis, longis, *difformibus*, fructigeris ventricosos-amplicatis; antheridiis semiorbicularibus, subreniformibus.

Lycopodium rubrum Chamisso in Linnaea VIII. 389.

Species praestantissima per se dignoscitur colore. Plantae pars inferior, sterilibus dispositione et forma foliorum omnino convenit cum *L. crasso Willd.* et *L. Saururo Lam.* Pars vero superior, fertilibus quasi medium tenet inter ramum fructificantem et amentum. Nam transmutatio rami teretis in hexaquetrum si non pedetentim fieret, pro sequente generis sectione reponi debuisset haec species. — CAULIS 6—9 pollices longus est, foliis undique tectis et cum iisdem pennam cygneam basi crassus, lignosus, durus, 2—4 dichotomiis divisus: DIVISIONIBUS secundi ordinis in alias fertiles, eximie hexaquetras (quas spicas s. amenta vocares) sensim transfigurandis. FOLIA STERILIA subincurva, lineari-subulata, acuta, integerrima dorso obtuse carinata, pollicem dimidium circiter longa, lineam et quod excedit lata, sursum abeuntia in FRUCTIGERA ovata, acuminata et ex conduplicatione specie apiculata, eximie carinata, continue hexasticha, adpressa, 2 lin. longa, easdemque lata. ANTHERIDIA sub foliis latent semiorbicularia, basi emarginata, depressa, majuscula, sordide straminea. Tota planta sanguineo-ruberrima.

In Brasilia intratropica: Sellow. 24.

§. 2. *Caule pendulo, flaccido.*

4. LYCOPODIUM INTERMEDIUM † caule flaccido, aequaliter pluries diviso; foliis confertissimis, rigidis, *undique patentirecurvatis*, integerrimis, subulatis, *nervo supra prominulo*, crista unica decurrentibus, *uniformibus*; antheridiis suborbicularibus, bilobis.

Lycopodium reflexum Presl. Reliqu. Haenk. 82. (non Willd.)

Medium quasi tenet *L. reflexum* inter et *L. acerosum*. Distinguitur ab illo caule multo, foliis angustioribus, brevioribus, integerrimisque; o *L. aceroso* foliis rigidioribus, recurvatis, supra convexiusculis. — CAULIS pedem circiter longus, pendulus, flexibilis, crassitie filum emporeticum aequans, utique in modum *L. acerosi* aequaliter 7—8 dichotomiis divisus: DIVISIONIBUS binis divergentibus, dein incurvatis parallelis, demum fastigiatis. FOLIA 8-faria, semiverticillata, 1½ lin. longa, ½ lin. lata, aceroso-rigida, mucronulo cartilagineo acutissima, excepto apice minute serrulato integerrima, marginibus paulo revolutis. ANTHERIDIA suborbiculari-reniformia, e basi profunde biloba, FARINAM flavidam contentia.

Prope Rio de Janeiro: Freyreiss, Sellow. 24.

5. LYCOPODIUM ACEROSUM Sw. *pendulum*; caule aequaliter multidiviso, filiformi-flaccido; foliis 8- vel 4-fariis *incurvatis*, *lineari-capillaceis*, subnervibus, difformibus; fructigeris basi ampliatis; antheridiis suborbicularibus, profunde bilobis.

Hook. et Grev. En. fil. n. 19. Spring. Botan. Zeit. 1838. I. 157.

Lycopodium acerosum α: foliis undique 8-fariis, patulis; fructigeris abrupte ampliatis.

Lycopodium acerosum Swartz. flor. Ind. occ. III. 1575. Willd. Spec. Plant. V. 53. Ersc. Sieb. Syn. filic. n. 149.

Lycopodium setaceum Lam. Enc. Bot. III. 653. (non Don.) Desv. Prodr. Fil. in Annal. Soc. Linn. par. VI. 181.

Lycopodium verticillatum Swartz. Syn. fil. t. 175. (excl. syn. Linn.)

Plananthus angustifolius Pal. Beauv. Mag. enc. n. 20. (Dill. Hist. musc. t. 56. f. 3. — Plum. Fil. t. 166. f. B.)

β. *filiforme*: foliis quadrifariis, adpressis, fructigeris sensim (nec abrupte) ampliatis.

Lycopodium filiforme Swartz. Syn. fil. 174 et 398. — Willd. Sp. Pl. V. 54. — Raddi Fil. brasil. 77. (Swartz. l. c. t. 4. f. 3. Raddi l. c. t. 4. bis f. 1.)

Formam β nil nisi ramos juniores exhibere libenter credo. Etenim nostra specimina pleraque ima caulis parte folia gerunt octosticha, et forma foliorum fructigerorum valde variat.

In provincia Sebastianopolitana: Schott; — ad radices montium Frade et Corco-secco, cum Aspidio pendulo permiste: Raddi; — in caudice Palmae cujusdam in silvis asperis, ventosis prope Itheos: Maxim. Princ. Videns; — ad Ega oppidulum prov. Rio Negro: M. 24.

6. LYCOPODIUM TENUE HUMB. et BONPL. (*Subspecies L. acerosi*) pendulum; caule aequaliter multidiviso, *tenuissimo*, filiformi-flaccido; foliis undique *quadrifariis*, patentibus, incurvatis, lineari-capillaceis, angustissimis, subnervibus, difformibus; fructigeris basi *abrupte ampliatis*, abbreviatis; antheridiis *oblongis*, subcuneatis.

Lycopodium tenue Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. pl. V. 55. Kunth. Nov. Gen. et Spec. I. 41. t. 671. — Cfr. Annot. cl. Kunze in Linnaea IX. 4.

L. curvifolium Kunze (Linnaea IX. 5) parum differt, nisi ratione fructificationis et caule foliisque insuper etiam tenuioribus. — Specimina brasiliensia a Humboldtiano (Herb. Willd. n. 19423.), deflectunt ramis magis divergentibus, foliisque majoribus.

In silvis inter civitates S. João d'el Rey et Villa Rica, et prope Salgado prov. Minarum: M. 24.

7. LYCOPODIUM FONTINALOIDES † pendulum, *filiformi-flaccidum*; caule aequaliter multidiviso, *basi puniceo*; foliis erecto-patentibus, carinatis, quadrifariis, *oppositis, decussatis*, late ovatis, minutis, subdifformibus; antheridiis oblongis, albidis.

Tab. nostra V. Fig. II.

RADIX fibrosa, subramosa, e fusco rubella, lanugine oblecta. CAULIS pedalis et ultra, cum foliis specie quadrangularis, undique aequalis, filiformi-flaccidissimus, crassitie filii mediocris, basi pulcherrime puniceus, in modum *L. tenuis* pluries dichotomo-divisus, DIVISIONIBUS subfastigiatis, elongatis, furcato-divergentibus, mox parallelis. FOLIA opposita, decussata, itaque quadrifaria, conferta, caulem non penitus obvelantia, erecto-patentia, minima, 1 lin. longa, ⅓ lin. lata, rigida, late ovata, acuta, integerrima, pallide marginata, subtus carinata, convexa, basi quidquam attenuata, sessilia, linea unica decurrentia. FOLIA FRUCTIGERA paulo latiora, breviora. ANTHERIDIA loco fortuito congregata, oblonga, ultra medium exacte biloba, magnitudine folium adaequantia, candide albida. FARINA —.

In arborum truncis in Brasilia, loco natali non indicata: Sellow. 24.

8. LYCOPODIUM QUADRANGULARE † pendulum; caule inaequaliter paucidiviso, *quadrangulari*; foliis 4-fariis, ex ovato lanceolatis, *adpressis*, acute carinatis, *parte decurrente sulcatis*, uniformibus; antheridiis oblongis, basi bifidis, albidis.

Tab. nostra V. Fig. I.

RADIX densissime fibrosa, subramosa, lanuginosa, ferruginea. CAULIS longissimus, sesqui-2½-pedalis, fragilis, ima basi impedito cruentus, per se filum emporeticum crassus, quadrangulari-alatus et ob insertiones foliorum undulato-dentatus, cum foliis exacte et continue quadrangularis, pennam corvinam crassus, undique aequalis, 3—4 alternatim divisus: DIVISIONIBUS nempe alternis multo brevioribus, simplicibus, alias quam maxime coarctatis, sursum decrescentibus. FOLIA opposita, decussata, tetrasticha, undique confertissima, subimbricata, adpresso-erecta, apice vero soluto patente, ad angulos caulis incisus inserta, basi non

gibbosa, fere caulescenti-decurrentia, parte decurrente angustata, profundius sulcata, demum in caulem abeunte, ad 2 lin. usque longa, 1 lin. lata, rigida, acerosa, crassiuscula, prasina, nonnulla maculis sanguineis notata, ex ovato lanceolata seu apiculata, acutissima, carinata, fere conduplicata, pallide submarginata, denticulis minutis sparsis obsita, uniformia. ANTHERIDIA loco fortuito congregata, campanulato-oblonga, ultra medium exacte biloba, basi bifida, magnitudine folium aequantia, albida, marginibus fuscidula, in foliis cauli adpressis quasi equitantia, indeque conduplicato-triquetra; PEDICELLO facile conspicuo, miniato. FARINA —.

In silvis primaevae de arboribus pendens, e. g. in Serra dos Orgãos: Sellow, Lhotsky. 2

Lycopodium (Phlegmaria) biforme Hook. Icon. t. 228. utrum ad hanc speciem, utrum ad praecedentem pertineat non liquet.

9. LYCOPODIUM MOLLICOMUM MART. (*Subspecies L. dichotomi*) pendulum; caule inaequaliter paucidiviso, ramis coarctatis; foliis subverticillatis, 8-fariis, lineari-subulatis, supra convexiusculis, subtus subcanaliculatis, erecto-patentibus; antheridiis suborbicularibus, albis.

Lycopodium mollicomum Mart. MS. Spring in Botan. Zeit. 1838. I. 162.

E RADICE fibrosa, ramosa, undulosa, subferruginea, tomentosa prodeunt CAULES plures spithamei et ultra, fragiles, flaccidi, graciles, crassitiam filii emporetici vix adaequant, foliosissimi, inaequaliter 2—4-dichotomi: DIVISIONIBUS coarctatis, erectis. FOLIA subverticillata, quaterna cum quaternis alternantia, indeque 8-faria, subremota, erecto-patentia, siccitate flexuosa atque etiam tortuosa, glabra, sublaevia, 5 lin. longa, ½ lin. lata, lineari-acuminata, subintegerrima (marginibus sub lente composita sparsim denticulatis, subrevolutis); supra convexa et ad nervum sulcata, subtus concava, nervosa, ad basin gibbosam carinata, nervo decurrentia. ANTHERIDIA sursum congregata, albissima, compresso-suborbicularia, ultra medium biloba, PEDICELLO flavido, FARINA flavida.

Prae *L. dichotomo* Jacq. Sw. (neque Hook. et Grev.) excellit foliis brevioribus, ramisque coarctatis; praee *L. pulcherrimo* Wall. (Hook. et Grev. Icon. fil. t. 38) ex Nepaliae montibus, solummodo foliis magis acutatis, minutissime denticulatis, et antheridiis angustioribus, basi profundius emarginatis. — A *L. subulifolio* Wall. (Hook. et Grev. Icon. fil. t. 49.) differt magnitudine, foliis flaccidioribus, nervo foliari magis prominente, et antheridiis angustioribus.

In silvarum prov. Paraënsis arboribus: M.; — nec non in prov. Sebastianopolitana: Schott. Fructificat April. 2

10. LYCOPODIUM LINIFOLIUM LINN. pendulum; caule subaequaliter paucidiviso, divisionibus coarctatis; foliis sparsis, remotis, patentissimis, elongatis, basi constrictis, tortis, subfalcatis, supra canaliculatis, nervo subtus valde prominente, subdifformibus; antheridiis majusculis, orbiculari-reniformibus.

Lin. Spec. Pl. 1563. Willd. Spec. Pl. V. 47. Kunth. Nov. Gen. et Spec. I. 41. Presl. Reliqu. Huenh. 81.

CAULIS sesqui- aut bi-pedalis, crassitiam filii emporetici non adaequans, e foliis scalariformi-cictrisatus. Caulis nec non singula folia nonnullorum speciminum pro parte sanguineo-tincta. Caulis ad insertiones foliorum saepius hispidulus. FOLIA 6—8 lin. longa, interdum pollicaria usque, 1 lin. fere lata, lineari-acuminata, integerrima, acuminata elongato, subcartilagineo, colorato: FRUCTIFERA minora, magis erecta. ANTHERIDIA sursum conferta, deorsum solitarie dispersa, biloba, nigro punctulata, FARINAM albedo-sulfuream effundentia.

Ex arboribus vetustis pendulum in silvis ad Pará: M.; — ad Sebastianopolin et alibi in Brasilia meridionali: Sellow, Beyrich. 2

SECTIO II. ANTHERIDIIS IN AMENTA CONGESTIS. AMENTA CEA.

§. 3. Foliis caulinis homomorphis, caulem circa circum obsidentibus. Homoeophylla.

a) Ramis cum caule conformibus.

11. LYCOPODIUM CERNUUM LINN. caule erecto, ramississimo, ramis conformibus; foliis subulatis, incurvatis, densis, a medio teretibus, divergenti-patentibus, dorso sulcatis; amentis sessilibus, cernuis, bracteis 8-fariis; antheridiis prope basin hiantibus.

Lin. Spec. Pl. 1566. Willd. Spec. Pl. V. 30. Swartz. Syn. fil. 178. Raddi Fil. bras. 78. Kaulfuss Enum. fil. 15. Exsicc. in Mart. Herb. Flor. bras. n. 196. Dillen. Hist. musc. t. 63. f. 10. Plum. Fil. t. 155. f. A.

Speciminum brasiliensium plurima varietati attinent a b. Willdenowio olim dictae *L. capillaceum*: foliis patentissimis, uncinato-reflexis, capillaceis.

Intra tropicos ubique communissima. In Brasilia fovetur praecipue silvis siccioribus: M. 2

12. LYCOPODIUM CLAVATUM LINN. caule repente, radicante, foliosissimo, aequali-ramoso, ramis conformibus; foliis lineari-subulatis, erecto-incurvis denticulatis, utrinque nervosis, apice piliferis; amentis pedunculatis, geminis-quaternis-octonis, erectis, pedunculis 8-sulcatis; bracteis suborbicularibus, membranaceis.

Lin. Spec. Pl. 1564. Willd. Spec. Pl. V. 16. Spring in Botan. Zeit. 1838. I. 169.

β. *Raddianum*: pedunculis polystachyis, amentis majoribus, ramificationibus erectis, subpyramidalis, foliis patentibus-incurvis, integerrimis, nervo utrinque acute prominente, caulinis ipso parenchymate, ramis lineis tribus magis minus manifestis decurrentibus.

Lycopodium piliferum Raddi Fil. bras. 79. t. 3. (haud penitus congrua.)

In Serra d'Estrella: Pohl, Luschnath; — prope oppidum Barbacena prov. Minarum: Pohl; — in prov. S. Pauli passim: M. — in Brasilia meridionali: Sellow. Fructificat April. 2

13. LYCOPODIUM ARISTATUM HUMB. et BONPL. (*Subspecies L. clavati*) caule inaequali (s. divergenti-) ramoso, ascendente, foliosissimo; ramis conformibus; foliis lineari-subulatis, integerrimis, solenniter binerviis, apice setigeris; amentis pedunculatis, quaternis-octonis, erectis; pedunculis 8-sulcatis; bracteis membranaceis.

Willd. Spec. Pl. V. 17. Spring in Botan. Zeit. 1838. I. 173.

β. *Desvauxianum*: caule decumbente, remote diviso, late extenso; foliis remotioribus, patentissimis, quam *L. aristati* veri tenuioribus, planis, junioribus integerrimis, caulinis nonnunquam remote denticulatis, subtus binerviis, supra acute uninerviis.

Lycopodium trichophyllum Desv. Prodr. fil. n. 61.

Prae diversis *L. aristati* varietatibus nostra excellit habitu torrido, foliis undique patentissimis, planis, ramisque elongatis, divergentibus.

In silvis subsiccis altis prov. Rio de Janeiro et S. Pauli passim, e. g. in Serra d'Estrella: M.; — ad fluv. Paraíba: Pohl. 2

b) Ramis (sterilibus et fertilibus) difformibus.

14. LYCOPODIUM ALOPECUROIDES LINN. caule repente, radicante; ramis biformibus: sterilibus ramulosis, flaccidis: fertilibus subsimplicibus, erectis, monostachyis; foliis lineari-subulatis, densis, patulis, setigeris, subintegerrimis vel ad basin serrato-spinulosis, supra nervosis; amentis sessilibus, inflatis, erectis; bracteis subconformibus; antheridiis prope basin hiantibus.

Linn. Spec. Pl. 1565. Willd. Spec. Pl. V. 26.

Lycopodium longipes et alopecuroides Hook. et Grev. En. fil. n. 53. Schkuhr Krypt. Gew. t. 160. — Spring in Bot. Zeit. 1838. I. 167.

α. Foliis serrato-spinulosis: *Lycopodium alopecuroides* Hook. et Grev. l. c.

β. Foliis subintegerrimis: *Lycopodium longipes* Hook. et Grev. l. c.

In Serra Frio et alibi in prov. Minarum: M.; — in Chapada da Serra de S. Marcos prov. Goyaz: Pohl; — Var. α. in patudosis, β. in locis siccoribus. 24

15. LYCOPodium CONTEXTUM Mart. caule radicante-repente, foliosissimo; ramis difformibus, duplo crassioribus, erectis, funiformibus, inter se conformibus; foliis rameis linearisubulatis, integerrimis, enerviis, inflexis; amentis distinctis, erectis; antheridiis profunde sinuatis.

Mart. Icon. sel. plant. crypt. 38. t. 20. f. I.

Species ex affinitate *L. diaphani* Swartz. Syn. fil. 179. (Herb. Willd. n. 19358.)

In campis graminosis apricis in summo monte Arara-Coara, fluvii Japurá cataractae imminente, altitud. supra Oceanum circiter 1200 pedum: M. Fructificat Januario. 24

§. 4. Foliis caulinis dimorphis, caule vel compresso, vel dorso nudo. Heterophylla.

a) Caule dorso aphylo, ramis humo adpressis.

16. LYCOPodium REPENS Sw. caule radicante-repente, dorso aphylo; foliis dimorphis, laxe patentibus, obliquis, subenerviis: intermediis anticis, vix minoribus, divergentibus; amentis solitariis, cylindricis, pedunculatis.

Swartz. Syn. fil. 180. Willd. Spec. Pl. V. 15. Schlechtend. Adumbr. t. 4. Dillen. Hist. musc. t. 62. f. 5.

Lycopodium carolinianum Linn. Spec. Pl. 1567. Willd. Spec. Pl. V. 14. Hook. et Grev. En. fil. n. 83.

Lycopodium affine Bory de St. Vincent. Voyage II. 204. *Lycopodium ericetorum* Schrad. in Goetting. gel. Anzeig. 1818. 920.

Lepidotis repens Pal. Beauv. Prodr. Aeth. 109.

CAULIS spithameus, filum emporeticum crassitie paene superans, humo arcissime adpressus, parte faciali foliosissimus, in PEDUNCULUM monostachyum, elongatum, erectum, stramineum subinde excurrans. RAMI brevissimi, simplices, patentissimi. FOLIA LATERALIA obscure disticha, oblique inserta, caulescenti-decurrentia, rectangularia et ad axin (praesertim superiora) subinclinata, 2—3 lin. longa, 1 lin. lata, e basi lata lanceolata, inaequilatera, acuminatissima, integerrima, marginibus revolutis inaequaliter convexa; INTERMEDIA paullo minora, disticha quidem, sed inaequaliter divergentia, indeque specie tri- et plurifaria, cauli adpressa, linearilanceolata, recta, elongata, apice quasi mucronulata, integerrima, enervia. AMENTA 1—2-pollicaria, erecta, cylindrica; BRACTEIS 8-fariis, flavis, abrupte acuminatis, subbiconvexis, margine obscure denticulatis, adpressis, demum squarroso-patentibus. ANTHERIDIA bracteis paullo minora, late reniformia, compressa, membrana, quam vidi in *Lycopodiis* omnibus tenerima eformata, FABINAM minutissimam, fovillaceam, sulfureo-albidam effundentia.

L. carolinianum Linn. (Herb. Willd. n. 19345) varietas *L. repentis* habetur. Excellit vero habitu quodam proprio, graciliori, pedunculis tenuioribus, spicisque longioribus, foliis nervo percursis. Nomen Swartzianum licet recentius datum Linnaeano a loco habitationis desumpto praefereendum fuit.

In regionibus intratropicis Brasiliae: Sellow; — e. g. in Serra dos Orgãos: Luschnath; — ad Tocáia prov. Sebastianopolin: Schott; — solo turfoso, humido; in humidis prope Bahiam: Satzmann. 24

17. LYCOPodium PARADOXUM Mart. caule radicante-repente, dorso aphylo; foliis dimorphis, inaequilateris, continue seriatis (s. aequaliter patentissimis): lateralibus supra binerviis: intermediis 3-plo minoribus, arcte adpressis, convergentibus, subenerviis; amentis solitariis, cylindraceis, pedunculatis.

Mart. Icon. sel. pl. crypt. 38. t. 20. f. II.

Ex affinitate *L. repentis* Sw., cui infoliatione, ramificatione et caule prorsus congruens. FOLIA LATERALIA quam antecedentis breviora, quasi truncata, latiora, abbreviato-ovata, latere exteriori soluto-decurrentia, obliqua, imbricata, aequaliter patentia, versus axin subadscendentia, humo adpressa, margine inferiore versus apicem reflexo, superiore inflexo, indeque quasi lanceolato-acuminata, nervo supra prominente, late sulcato condecorata, indeque manifestim binervia, facie inferiore longitudinaliter (siccitate quidem) rugulosa. FOLIA INTERMEDIA fere triplo minora, arcte adpressa, exacte biseriata, convergentia, ovato-oblonga, breviter acuminata, paullulum falcata, marginibus retroflexis, nervo solenniter non conspicuo. PEDUNCULUS quam praecedentis speciei quidquam crassior, brevior, foliis laxiusculis, latioribus, brevioribus, distincte nervosis vestitus. BRACTEAE distant. ANTHERIDIA basi profundius emarginata, marginibus valvularum revolutis.

Cl. Kunze (in Linnaea X. 485) hanc speciem praecedenti immiscuit, quod probare debet adumbratio nostra.

In terra glebosa, ad abrupta vicarum umbrosarum in prov. Minarum parte meridionali, nec non in silvis montanis prov. Sebastianopolitanae: M. Decembri fructificat. 24

b) Ramis complanatis, erectis.

18. LYCOPodium COMPLANATUM Linn. caule repente, ramis erectis, pluries subaequali-dichotomis, compressis; foliis caulescentibus, tetrastichis, dimorphis: lateralibus unilateris, connatis, pungentibus: intermediis utrinque uniseriatis, adpressis, rectis; pedunculis pleiostachyis.

Hook. et Grev. En. fil. n. 84. Linn. Spec. Pl. 1567. Willd. Spec. Pl. V. 12. Cfr. Chamiss. et Schlechtend. in Linn. V. 622. Spring in Bot. Zeit. 1828. I. 179.

β. tropicum: robustius, pedunculis 4—8-stachyis, amentis subtetragonis, foliorum apicibus minus patentibus.

Lycopodium thyoides. Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Pl. V. 18. Kunth. Nov. Gen. et Sp. I. 28. Presl. Rel. Haenk. 77. Raddi. Fil. bras. 80. Icon. Phum. Fil. t. 165. f. B. Dillen. Hist. musc. t. 60.

In Serra d'Estrella prov. Sebastianopolitanae: M., Schott; — in silvis aridis ad S. Gonçato d'Amarante prov. Piauiensis: M. Major fructificat. 24

19. LYCOPodium COMPTONIOIDES Desv., caule erecto; ramis dichotomis, compressis, flabellatis, supra bisulcatis; foliis bifariis, oppositis, falcatis, connato-decurrentibus, acutis, setigeris: caulinaris alternis, adpressis, subulatis. *L. Jussieui* β. *microphyllum* Desv. Enc. Botan. Suppl. III. 543. *L. Jussieui* Kunth. Nov. Gen. et Spec. I. 38. excl. syn. — Crescit in locis montosis Brasiliae. — Spicas non vidi. A *L. thyoides* Humb. Bonpl. distinctissimum foliis oppositis, latissime decurrentibus. 4 Desv. in Ann. Soc. Linn. Par. VI. 1827. 185. n. 70.

Speciem vage descriptam in Herbariis nostris reperire non potui. Ad explicandam affinitatem alius, quacum antea commixta fuit, speciei exhibeamus descriptionem:

LYCOPodium JUSSIEUI Desv. caule erecto, tereti, fasciculato-ramoso, ramis erectis, conformibus, ramulis denique compressis, subfastigiatis; foliis caulinis subverticillatis, senis, parte dimidia scarioso-membranaceis: ramulorum lateralibus

bifariis, caulescenti-connatis, acutis, subimbricatis: intermediis *posticis*, *trifariis*, squamaeformibus, rectis, scariosis; pedunculis pleiostachyis.

Desv. in Enc. Botan. Suppl. III. 543. (neque Kunth).

CAULIS erectus, strictus, durus, sesquipedalis et ultra, calamus scriptorium adaequans, teres, subexcurrentis, fasciculato-ramosus, aequali-foliosus; FOLII subverticillatis, senis, remotis, elongato-subtriangularibus, 2 lin. longis, $\frac{3}{4}$ lin. latis, crassiusculis, carinatis, decurrentibus, adpressis, parte marginali et apicali (folii dimidia) scarioso-membranacea, albida. RAMI erecti, alterni, teretes, cauli infoliatione quoque conformes, apice in pedunculos divisi, cuneato-ramulosi. RAMULI RAMIQUE MINORES mox supra basin compressi, dichotomi, subfastigiati, singulis divisionibus in pedunculos sensim excrecentibus. FOLIA LATERALIA antica, bifaria, alterna, patentia, verticaliter affixa, connata, caulescenti-decurrentia, ovato-falcata, acuta, subimbricata, margine inferiore recto, superiore tegente, indeque oblique quasi torta, ob marginem inferiorem prope apicem revolutum specie acuminata, ceterum integerrima, enervia, crassa, coriacea, aspera, supra nitentia, 1—2 lin. longa: INTERMEDIA postica, trifaria, erecta, squamaeformia, recta, oblongo-lanceolata, margine apiceque scariosa, parte inferiore cauli coadunata, superiore libera, adpressa, carinata. Ad ramulorum faciem anticam folia exhibentur nulla, quorum vero loco ex carinis foliorum lateralium decurrentibus formatur sulcus profundus. PEDUNCULI teretes, cauli infoliatione quoque conformes, sed duplo tenuiores, ramulorum elongati, reliqui amento breviores. AMENTA (nostris) numerosa, cylindrica, 2—3-pollicaria, caule duplo crassiora, solitaria, in singulis pedunculi partitionibus. BRACTEAE suboctofariae, patulae, planae, ovato-acuminatae, basi fulcratae, margine apiceque scariosae, fusco-ferruginae. ANTHERIDIA bracteis duplo minora, magnitudine seminis Brassicae, semiorbicularia, basi evidenter sinuata, reniformia, flava, FARINA flava repleta.

Distat a *L. Haenkei* Presl. (Beliqu. Haenk. 78.) foliis lateralibus majoribus, mucronulatis, nec non ramulis divergenti-dichotomis.

Hab. in prov. Chiquitos Peruviae: Haenke; — et verosimiliter in Mallo Grosso Brasiliae. 24

II. SELAGINELLA.

ANTHERIDIA unilocularia. OOPHORIDIA 3—4-coeca, globulos 3—4 continentia. *Jungermannioideae* vel *fili-coideae*, *amentaceae*, foliis plerumque *tetrastichis*, *dimorphis*, caule tetragono, dorso aphylo.

ANTHERIDIA solemniter erecto-oblonga vel globosa, basi integra, apice hiantia, specie bivalvia, minutissima, pedicello brevissimo capitato: SPORIS quaternariis e globoso-tetraquetris. OOPHORIDIA tumida, inaequaliter rumpentia, antheridia magnitudine nunc aequantia iisque intermixta, nunc superantia atque dein solitaria ad basin amentorum. AMENTA tetragona: bracteis *tetrastichis*.

Spring in Botan. Zeit. 1838. I. 148. Stachygyndrum Ad. Brongn. Végét. fossil. II. 2. Lycopodii Spec. Linn. Gen. n. 1185. Endlich. Gen. n. 696. Auct. plurim. Selaginoides et Lycopodioides Dillen. musc. 460 et 462. Selaginella, Gymnogymn., Diplostachyum et Stachygyndrum Patis. Beauv. Prodr. Aethiops. 101—105.

Longe maxima specierum pars convenit habitu aequae memorabili quam spectabili. Quarum quum diagnosis nonnunquam sit difficillima, characteres adhibuimus adhuc inusitados, quos bre-

vissimis verbis explicare liceat. — CAULIS omnibus tetragonus paucis in teretiusculum abire nititur: *pleurotropum* dicimus, cujus latus anticum et posticum plano quod foliis lateralibus efficitur congruum (parallellum), s. qui latere solo incumbit; *goniotropum*, cujus latera plano foliorum decussantur s. qui angulo solo incumbit. RADICULAE nunquam ex axillis, sed proxime ad axillas facie caulis vel anteriore vel posteriore nascuntur, indeque sunt vel *anticae* vel *posticae*. RAMIFICATIONES i. e. rami foliis vestiti quoad circumferentiam dicuntur *pinnatae*, si lineis parallelis ad utrumque latus definiuntur: *pyramidatae*, si lineis convergentibus: *cuneatae*, si lineis divergentibus. RAMIFICATIO *universalis* caulem cum cunctis ramis, *singularis* solos ramos primarios comprehendit. Quoad partitionem omnis ramificatione quidem dichotoma, sed raro *simpliciter dichotoma* s. *peripherica* s. *dichotomo deliquescens*, saepius *alternatim (inaequali-) dichotoma* s. (caule vel ramis) *centrali-excurrentis*, interiore nempe divisionis ramo validiore novamque quancunque divisionem ita mediante, ut caulis non in ramos dissolvi sed usque ad apicem excurrere videatur. RAMI vel e lateralibus caulis proveniunt: *cathedri* vel ex angulis: *synedri*. FOLIA aequali ratione *cathedra* et *synedra*. FOLIA LATERALIA vel *transversim* vel *verticaliter* vel *oblique* affixa. Dicuntur *horizontalia*, si aequaliter ita sunt expansa, ut planum non interruptum invicem efficiant: *rectangularia*, si angulo recto a caule distant: *antica* si caulis parte anteriore: *postica* si posteriore inseruntur. FOLIA INTERMEDIA vel *transversim* vel *oblique* affixa, basi vel simpliciter producta — *pellata* vel inaequaliter *cordata*, vel *auriculata*. Ex nervo solemniter sunt incurvata — *convergentia* atque dein incuba — *convergenti-convergentia*, vel *recta* — *parallela* vel *divergentia*.

SECTIO I. FOLII HOMOMORPHIS, POLYSTICHIS.

HOMOEOPHYLLAE. Spec. 1.

SECTIO II. FOLII DIMORPHIS, TETRASTICHIS.

HETEROPHYLLAE.

§. 1. Foliis atque ramis siccitate planis. Planifoliae.

a) Caule continuo. ENODES.

α) *Flaccidae, parvulae (annuae?)*. Spec. 2—4.

β) *Firmatae, proceriores (perennes)*.

αα) Caule repente. Spec. 5—10.

ββ) Caule erecto. Spec. 11—14.

b) Caule articulato. ARTICULATAE.

α) Caule goniotropo. Spec. 15—18.

β) Caule pleurotropo. Spec. 19—22.

§. 2. Foliis atque ramulis siccitate convolutis. Circinatae. Spec. 23.

SECTIO I. FOLII HOMOMORPHIS, POLYSTICHIS, CAULEM CIRCA CIRCUM OBSIDENTIBUS. HOMOEOPHYLLAE.

1. SELAGINELLA RUPESTRIS † caespitosa, undique foliosissima, foliis imbricatis, *incanis*, lineari-lanceolatis, ciliatis, setigeris, dorso carinatis *sulcatis*; amentis *distinctis*, acute quadrangularibus.

Lycopodium rupestre Linn. Spec. Pl. 1564. Willd. Spec. Pl. V. 30. Kaulfuss En. fl. 14. Hook. et Grev. En. fl. n. 56. Icones: Moris. Hist. III. 624. sect. 15. t. 5. f. 4. Dillen. Hist. musc. t. 63. f. 11. Schkuhr Krypt. Gew. t. 165. Raddi Fil. bras. t. 4. bis. f. 2.

Antheridia minima, globosa, basi subintegra, sporis cinnabarinis repleta. Oophoridia vix majora, tetracoeca, subglobosa, antheridiis intermixta.

In montibus prope Sebastianopolin: Raddi; — in siveis montanis altis provinciae Minarum passim, e. g. in montibus Itacolumi, Itambé, in Morro de Villa Rica, altitudine 4000 pedum et ultra: M. 24

SECTIO II. FOLIIS DIMORPHIS TETRASTICHIS, ANTRORSIS.
HETEROPHYLLAE.

§. 1. Foliis atque ramulis siccitate planis. *Planifoliae*.

a) Caule continuo. Enodes.

α) *Flaccidae, parvulae (annuae?)*.

2. SELAGINELLA APUS † caespitosa, flaccida; caule repente folioso; foliis undique dimorphis, *exauriculatis*: lateralibus rectangularibus, ovato-oblongis, integerrimis, acutis, latere superiore basi ampliato, rotundato, nervo supra prominente, subtus sulcato: intermediis duplo minoribus, *rectis*, acuminatis, planis, pallide marginatis, patulis, *divergentibus*.

Lycopodium apudum Linn. *Spec. Pl.* 1568. Willd. *Spec. Pl.* V. 38. Swartz. *Syn. fil.* 184. Michx. *Flor. bor. amer.* II. 284. Hook. et Grev. *En. fil.* 174. Dillen. *Hist. musc.* t. 64. f. 3. *Lycopodium brasiliense* Raddi *Fil. bras.* 82. t. 1. f. 1. *Lycopodium patulum* Gaudich. in Freyc. *Voy. Bot.* I. 285. *Lycopodium albidulum* Hook. et Grev. *En. fil.* n. 173. (non Swartz.).

CAULES 3—4 pollices longi, flaccidi, stramineo-nitentes, quadrangulares, siccitate corrugandi, pleurotropi, enodes, ultra filum lineum crassi, undique foliosissimi, caespitosi. RADICULAE numerosissimae, capillares, axillares, posticae. RAMIFICATIO pinnata, caule subexcurrente: RAMIS flaccidissimis, brevibus, inferioribus apice solemniter bifidis: RAMULORUM apices e foliis rotundati. FOLIA synedra, undique dimorpha, pallidescencia, micantia, flaccida, deorsum remotiora, sursum confertissima: LATERALIA vix 1½ lin. longa, 1 lin. lata, plana, postica, rectangularia, horizontaliter patentia, ovato-oblonga, acuta, integerrima vel denticulo uno alterove praesertim ad lobum superiorem baseos munita, plerumque pallide marginata, nervo supra lineari-prominente, subtus sulcato, basi integra, vix cordata, lateribus liberis, superiore valde ampliato, rotundato: INTERMEDIA duplo minora, recta, ovalia, longe acuminata et aristato-mucronata, planiuscula, nervo lineari-prominente, pallide marginata, sub lente minutissime denticulata, patula, divergentia, basi incisa potius quam cordata, lobis fere inaequalibus: AMENTA 2—4—6 lin. longa, vel pyramidata vel oblonga, foliacea. BRACTEAE e basi lata longe acuminatae, modo adpressae, modo patentis, carinatae, minutissime marginatae. ANTHERIDIA paucissima, minima, oblonga, intermixta oophoridibus globosis, tricoccis, minimis, globulis tribus albidis repletis.

β. *tetragonostachya*: magis conferta, densissime foliosa, amentis longiusculis, tetragonis.

Exempla ex America boreali repetita a brasiliensibus prorsus non differunt. — *L. pusillum* Desv. (Prodr. fil. n. 125.) synonymis forsitan adscribendum.

In *umbrosis, montosis communissima per prov. Sebastianopolitanam*: Raddi: — in *Calçada da Estrela*: Gaudichaud; — in *silvis Caa-tingas inter Cachoeira et Monte Santo prov. Bahiensis*: M. — β. *Ad margines viarum inter Pedro Alvez et João Gomez, praedia prov. Sebastianopolitanae*: Pohl. ☉

3. SELAGINELLA CRASSINERVIA † caule repente, obtuse tetragono, e foliis striato, pleurotropo, folioso, fasciculato-ramoso; foliis undique dimorphis: lateralibus rectangularibus, ovalibus, integerrimis acutis, basi oblique cordatis, nervo supra sulcato, subtus incrassato, subtrato: intermediis multo minoribus, *rectis*, aristatis, carinatis, pallide marginatis, patulis, *divergentibus*.

Lycopodium crassinervium Desv. *Prodr. fil.* n. 131.

Lycopodium pallidum Gaudich. in Freyc. *Voy. Bot.* 285.

CAULIS humo diffusus, tenuis, filiformi-flaccidus, palmaris et ultra, obtuse tetragonus et e foliis decurrentibus striatus, con-

tinuus, foliosus, symmetrice et fasciculatim ramosus, subexcurrentis: RAMIS pinnatis, excurrentibus, sub angulo acuto abeuntibus: RAMULIS simplicibus, brevibus, apice rotundatis, flaccidis, humo adpressis. RADICULAE numerosae, capillares, axillares, posticae. FOLIA flaccida, pallide viridia, pellucida, synedra, undique dimorpha, CAULINA remotiora, RAMEA magis conferta, denique imbricata: LATERALIA postica, ovalia, acuta, integerrima vel sub lente minutissime denticulata et ad basin ciliata, inaequilatera, basi oblique cordata, parte superiore in lobum sat magnum, ciliis stipatum producta, nervo supra evidenter sulcato, subtus valde incrassato, colorato: INTERMEDIA multo (5-plo) minora, ovata, pallide marginata, vix denticulata, basi in auriculam brevioram producta, nervo valde prominente in aristam apice producto, recta, parallela vel divergentia. AMENTA —.

Species valde problematica, a praecedente ramis erectis, fasciculatis et nervo incrassato, colorato distinguenda. Nervus coloratus vix erit character perstans atque essentialis.

Prope Rio de Janeiro: Gaudichaud, Langsdorff. (Herb. Mart.) ☉

4. SELAGINELLA MUSCOSA † caule repente, (siccitate) corrugato, torto, caespitoso, folioso, fasciculato-ramoso; foliis biauriculatis; lateralibus inaequaliter patentibus, distortis, ovatis, *obtusiusculis*, basi ciliolatis, nervo supra non manifesto, subtus sulcato: intermediis vix minoribus, *curvulis*, aristatis, laxis, *convergentibus*: caulinis homomorphis.

Planta tenella, flaccida, 3—4-pollicaris, caespitosa. CAULIS repens, continuus, filum lineum crassus, evanido-tetragonus vario modo et inaequaliter tortus, manifestum striatus, foliosus. RADICULAE capillares, ad basin caulis numerosissimae, sibi intertextae, subextraaxillares, anticae, haud raro ad foliorum quoque axillas provenientes. RADICES ipsae fusciscentes, convolutae. RAMIFICATIO fasciculata, caule excurrente, ramis brevibus, ad caulem erectis, inferioribus brevissime 3—4-divisis, divisionibus ramo adpressis, amento terminatis. FOLIA laxa, remotiora, flaccida, sordide viridia (cathedra?), CAULINA homomorpha, basi longius producta, biauriculata: RAMEA dimorpha; LATERALIA 1 lin. longa, ovata, vix acuta, laxa et inaequaliter patentia, nunc inflexa, nunc magis minus reflexa, distorta, basi subcordata, parte superiore latiore rotundata, minutissime ciliolata, inferiore membranacea, medio decurrentia, nervo supra haud conspicuo, subtus leviter sulcato: INTERMEDIA vix minora, ovata, quidquam incurvata, a basi acuminata, aristato-mucronata, inaequaliter subcordata, albide submarginata, nervo prominente leviter carinata, laxa erecta, convergentia. AMENTA distincta, 2 lin. longa, subpyramidata, tetragona, solitaria, vel ramulis abbreviatis solemniter gemina. BRACTEAE e basi lata acuminatae s. ovato-deltoidae, late carinatae, adpressae, demum patulae. ANTHERIDIA paucissima, minuta, ad apicem amenti, ovato-erecta. OOPHORIDIA minima, albida, globosa, GONGYLOS tres minutissimos albos continentia, numerosa.

Oophoridia non solum in amentis reperiuntur, sed quod in genere hoc usque adhuc inauditum in axillis quoque foliorum lateraliu.

In *silvis Macahé prov. Sebastianopolitanae, locis udis, paludosis*: Luschnath. ☉

β) *Firmutae, rigidiores, proceriores (perennes)*.

αα) Caule repente.

5. SELAGINELLA THUJAEFOLIA † pusilla; caule filiformi, rigidiusculo, exacte quadrangulati, pleurotropo, caespitoso-ramuloso; foliis rigidis, synedris, undique dimorphis, exauriculatis, basi obliquis, confertissimis: lateralibus *subverticalibus*, erectis, ovatis, acutis, convexis, enervibus, margine superiore ciliolatis: intermediis vix minoribus, subconformibus, acutis, *rectis*, adpressis, *divergentibus*.

Planta pusilla, e contubernio *S. ornithopodioidis*. CAULIS continuus, humo adpressus, fili mediocri crassitie, vix trium pollicum longitudine: RAMIS distichis, a caule divergenti-patentibus, humo adpressis, radicanibus, pinnato-ramulosis, excurrentibus; RAMULIS brevibus, 1—2-divisis. RADICULAE capillares, axillares, posticae. FOLIA minuta, subaeruginoso-viridia, rigida, crassiuscula, synedra, undique dimorpha, confertissima, adpresso-imbricata, nonnunquam prolis *Thujae* cujusdam memoriam quasi dimensionibus minutis revocantia: LATERALIA vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. longa et lata, subverticaliter inserta, antrorsum tendentia, erecta, basi obliqua, integra, tota cauli adnata, late ovalia, simpliciter acuta, margine superiore prope basin dense ciliolata, inferiore subintegerrima, lateraliter revoluta, convexa, nervo conspicuo nullo; INTERMEDIA vix minora, lateralibus subconformia, pallide marginata, utroque margine ciliata, acuta, vix juniora in macronulum album producta, basi obliqua integra, convexa, adpressa, imbricata, recta, divergentia. AMENTA —.

Ob exiguitatem facile commutari poterit, nibilo tamen secius praesertim habitu et dispositione foliorum ab omnibus est diversa.

In muscosis in Monte Video: Sellow. 24?

6. SELAGINELLA BREYNI \dagger caule aequaliter quadrangulati, supra bisulcato, pleurotropo, foliosissimo, excurrente, pinnato-ramoso; foliis *cathedris*, undique dimorphis, contiguis, basi obliqua *exauriculatis*, subtus *aureo-nitentibus*: lateralibus rectangularibus, planis, *anticis*, ovato-oblongis, *obtusis*, margine superiore ciliatis: intermediis triplo minoribus, *ciliatis*, cuspidatis, albo-marginatis, falcatis, adpressis, *convergentibus*.

Lycopodium marginatum Raddi Fil. bras. 82. t. 1. f. 2. Hook. et Grev. En. fil. n. 150. (non Humb. neque Gaudich.)

Lycopodium plumosum Schkuhr Krypl. Gew. t. 165. f. 4. Brey. exot. Cent. I. 194. t. 100. (sterilis). Dillen. Hist. musc. t. 66. f. 9. A. B.

CAULIS semipedalis et ultra, continuus, repens, crassitie fili emporetici, flaccidus, flexuosus, undique foliosissimus. RADICULAE numerosissimae, elongatae, filum lineum crassae, angulato-striatae, stramineo-nitentes, antrorsum orientes, demum refractae, posticae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS subpinnata, caule distiche ramoso, subexcurrente, singulis RAMIS brevibus, simplicibus aut apice semel, bis, aut raro ter dichotomis, divergenti-patentibus, apice recurvatis, humo adpressis. FOLIA pulchella, rigidiuscula, opaca, subtus pallida, oculo remotiori aureo fulgore splendentia, undique dimorpha, aequaliter disposita, contigua, demum subimbricata, cathedra; LATERALIA antica, majuscula (2 lin. longa, vix 1 lin. lata), e basi lata lineari-oblonga, basi evidenter ciliata, alias integerrima, vix inaequilatera, basi non producta, integra, nervo supra vix notato, subtus leviter sulcato, fuscescente: INTERMEDIA sulcis caulinis anterioribus inserta, subrotunda, falcata, latere exteriori dilatato-rotundato longius ciliato, interiore integerrimo adpresso, plana, longe cuspidata s. p. aristato-mucronata, cuspidate adpresso, convergenti-conniventia, basi integra non producta, nervo sursum valde prominente, deorsum vix visibili, interdum sulcato. AMENTA elongata (3—6 lin. longa), tenuia, linearia, pluries curvata, solitaria vel ramulis abbreviatis specie gemina: BRACTEIS ovato-lanceolatis, arcte adpressis, carinatis, vix denticulatis. ANTHERIDIA bracteis minoribus, erecto-oblonga, fusciscentia. OOPHORDIA haud majora (3- vel) 4-coeca, pallide fusciscentia, antheridiis intermixta.

In Brasilia aequatoriali: M.; — prope Sebastianopolin: Raddi; — in Guyana: Breynius.

7. SELAGINELLA JUNGERMANNIOIDES GAUD. (Subspecies *S. Breynei*) caule inaequaliter quadrangulati, pleurotropo, foliosissimo, excurrente, fere rectangulari-ramoso; foliis *synedris*, subtus aureo-nitentibus, undique dimorphis, contiguis, basi

obliqua *exauriculatis*: lateralibus *posticis*, rectangularibus, planis, ovato-oblongis, *obtusis*, margine superiore ciliatis; intermediis duplo minoribus, *ciliatis*, mucronatis, albo-marginatis, falcatis, adpressis, *convergentibus*.

Lycopodium jungermannioides Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 286.

Planta nitida, omnium elegantissima. CAULIS, uti videtur, palmae longitudinem vix excedens, continuus, quadrangularis (specie triangularis), angulis anterioribus valde approximatis, filum emporeticum crassus, flaccidus. RADICULAE numerosissimae, capillares, elongatae, nitidae, posticae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS centrali-subexcurrente; PARTIALES subpyramidatae; RAMIS divergenti-patentissimis (sub angulo 80° abeuntibus), humo adpressis; RAMULIS brevissimis, simplicibus vel brevissime bifidis. FOLIA flaccida, facie adversa aureo fulgore splendentia, synedra: LATERALIA postica, 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, horizontalia, apice quidquam inflexa, rectangularia, plana, ovato-oblonga, obtusa, praesertim versus basin margine superiore ciliata, latere superiore basi dilatato rotundato, nervo supra vix manifesto, subtus lineato; INTERMEDIA ovato-falcata, plana, vel e nervo prominente apice subcarinata, nonnihil patula, breviter cuspidata, peltata, basi valde obliqua, dilatata, extrorsum producta. AMENTA breviter (2—3 lin. longa), solitaria: BRACTEIS ex ovato-lanceolatis, carinatis, erectis, albido marginatis, ciliolatis. ANTHERIDIA bracteis minoribus, erecto-oblonga, farina aurantiaca repleta. OOPHORDIA haec intermixta, copiosiora, non majora, tetracoeca, albida, globulos 4 minutissimos, albos continentia.

Cum *S. Breynei*, praecedente, tantum convenit, ut ad distinguendas attentione insigniore opus sit. — *L. jungermannioides* Gaudich. ab auctore dicitur affine *L. serpenti* et *ornithopodioidi*, quod nos haesitare fecit de conjunctione cum nostra. — *A. S. semicordato* (*Lycopodium*) Wall. Cat. n. 126; Hook. et Grev. En. fil. n. 158. (secundum exemplar Herb. Wight. propr. n. 18.) diversa est foliis majoribus, rectangularibus, et caule angulato, latiori, nec dorso confluyente.

Prope Sebastianopolin: Langsdorff, M. 24

8. SELAGINELLA FLEXUOSA \dagger caule elongato, *teretiusculo*, *flexuoso*, folioso, pleurotropo; radice *compressis*; foliis undique dimorphis, basi obliqua *exauriculatis*: lateralibus *posticis*, convexiusculis, *subrhomboideis*, *obliquis*, obtusiusculis, integerrimis; intermediis triplo minoribus, subrotundis, rectis, aristatis, parallelis vel *divergentibus*, adpressis.

Lycopodium stoloniferum Raddi Fil. bras. 81. t. 2. (excl. synon.).

Lycopodium brasiliense Desv. Prodr. fil. n. 134.

Lycopodium nudatum Hook. et Grev. En. fil. n. 154.

? *Lycopodium didymostachyum* Desv. in Enc. Bot. Suppl. III. 553.

CAULIS repens, pedalis, continuus, duriusculus, strictus, cicatrisatus, ceterum laevis, stramineo-nitens. RADICULAE posticae, teretes et compressae, elongatae, crassitie fili mediocri. RAMIFICATIO UNIVERSALIS flabellato-pyramidata caule subexcurrente; PARTIALES pinnatae, RAMIS sub angulo acuto abeuntibus, excurrentibus, valde approximatis, elongatis, flexuosis, crassioribus, strictis, apice haud raro fusciscentibus: RAMULIS simplicibus aut 1—2-divisis, brevibus. FOLIA $1\frac{1}{2}$ lin. longa, 1 lin. lata, cathedra, ubique aequaliter conferta, rigidiuscula, supra opaca, sub lente minutissime granulata, subtus albide nitentia, foveolata, undique dimorpha; LATERALIA horizontaliter et rectangulariter patentia, apice quidquam inflexa, basi inaequaliter ovata integra, oblonga, inaequilatera, subdiaphana, nervo obscuro, folium oblique percurrente, supra prominente; INTERMEDIA infra remotiora, sursum confertissima, minutissime serrulata, apice in arctam elongatam arrecto-patentem albidam excurrentes, albido

marginata, plana, nervo prominente, basi late emarginata. AMENTA 4—6 lin. longa, squarrosa, basi aequalia, solitaria, raro gemina, curvata: BRACTEIS majusculis, patentibus, ex ovato deltoideis minute denticulatis, carinatis, albido marginatis. ANTHERIDIA reniformi-globosa, subbiloba, pallida, farina miniata repleta. OOPHORIDIA subglobosa, valvulis 2 trilobis, GONGYLIS 3 reticulatis: Raddi.

Cum praecedentibus valde convenit, sed caule tereti, duro, foliis integerrimis, intermediis non incurvatis apice longe aristatis recedit. — Specimen Jamaicense a cl. Greville sub nomine *L. denudati* communicatum nil differt, nisi foliis magis obtusis, brevioribus, ramificatione laxiore.

In umbrosis Brasiliae: Desvauz, Sellow; — copiose in silvis montis Corcovado, circa Rio de Janeiro: Raddi, Langsdorff. 24

9. SELAGINELLA MACROSTACHYA † (*Subspecies S. flexuosae*) caule elongato, teretiusculo, flexuoso, folioso, pleurotropo; radiculis subtragonis, sulcatis; foliis undique dimorphis, basi obliqua exauriculatis: lateralibus posticis, oblique ovatis, apice tortis, pungenti-acutis, basi superiore ciliatis; intermediis vix duplo minoribus, subrotundis, incurvatis, convergenti-conniventibus, ciliatis, aristatis.

CAULIS fere pedalis, repens, teretiusculus s. p. evanescenti-tetragonus, strictus, durus, continuus, foliosissimus. RADICULAE pluries sulcatae, posticae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS subpyramidata (quam in *S. flexuosa* magis peripherica, ad deliquescentiam tendens), caule subexcurrente; PARTIALES laxae subpyramidatae, RAMIS divergenti-patentibus, apice recurvatis, strictis, 6—7-ramulosis; RAMULIS inferioribus bis divisus, superioribus simplicibus. FOLIA synedra, rigida, opaca, undique dimorpha: LATERALIA 1 lin. longa, postica, basi integra parte superiore dilatata ciliata, ceterum integerrima, margine quidquam revoluto, fere rectangularia, vix ad axin erecta, inflexa, apice deorsum torta, nervo supra sulcato, subtus vix manifesto; INTERMEDIA vix duplo minora, orbicularia, ciliata, aristato-mucronata, basi vix emarginata, plana, albido marginata, adpressa, nervo vix conspicuo. AMENTA elongata (10—12 lin. longa), linealia, basi aequalia, quadrangularia, solitaria: BRACTEIS ex ovato deltoideis, denticulatis, carinatis, adpressis. ANTHERIDIA oblongo-erecta, minima, pallide fuscescentia. OOPHORIDIA prioribus immixta, minima, subglobosa, tricocca, fuscescentia, globulos 3 minimos, albos, reticulatos continentia.

In Brasilia, loco natali non indicato: Sellow. 24

10. SELAGINELLA DECOMPOSITA † caule elongato, tetragono, subflexuoso, folioso, goniotropo, pyramidato-ramosissimo; radiculis angulatis, posticis; foliis cathedris, biauriculatis: lateralibus posticis, divergentibus, ovato-oblongis, obtusiusculis; nervo supra prominente, subtus sulcato: intermediis vix duplo minoribus, falcatis, planis, aristato-mucronatis, adpressis, convergentibus.

Lycopodium sulcatum Hook. et Grev. En. fil. n. 145. (non Desv. et excl. syn. Raddiano.)

CAULIS sesquipedalis et ultra, repens, continuus, tetragonus, angulis antico et postico obtusatis, lateralibus acutis, undique laevis, stramineus, nitidus, foliosissimus, pennam corvinam crassitie valde excedens. RADICULAE filum emporeticum crassae, angulato-striatae, elongatae, versus extremitatem longius bifidam fuscescentes. RAMIFICATIO UNIVERSALIS pyramidata, caule sursum aequaliter ramosissimo, subexcurrente: SECUNDARIAE subpinnatae, ramis anticis, cathedris, subexcurrentibus, versus apicem fuscescentibus, sub angulo 60° a caule abeuntibus: TERTIARIAE pyramidatae, mox dichotomo-subcuneatae, ramulis flaccidis, 5—6-divisis, patentibus, divisionibus inferioribus breviter bifidis. FOLIA cathedra, rigidiuscula, supra opaca, subtus aereo-nitentia, viridula, sub lente hirtella; undique dimorpha: CAULINA remo-

tiora, RAMEA sensim valde approximata: LATERALIA vix 2 lin. longa, 1 lin. lata, postica, quidquam incurvata, versus axin erecta, inaequaliter convexa, ovato-oblonga, obtusiuscula, margine albido minutissime denticulata, basi oblique semicordata, latere superiore ampliato, lobis longitudine subaequalibus, nervo supra lineari-prominulo, subtus sulcato fuscescente; INTERMEDIA ovato-subrotunda, minutissime denticulata, plana, nervo lineari-prominente, apice in mucronulum producto, basi semicordata, lobis subaequalibus vel exteriore saepius rostriformi-producto. AMENTA 3 lin. longa, elongato-pyramidata, solitaria: BRACTEIS ovato-acuminatis, ad margines et carinam denticulatis, carinatis, adpressis. ANTHERIDIA minima, globosa, brevissime pedicellata, ad rhaphen compresso-attenuata indeque quasi cristata, pallida, ad rhaphen obscurius colorata, farina aurantiaca repleta. OOPHORIDIA —.

Ab affinis: *S. sulcata* distinguitur caule goniotropo, enodis, radiculis posticis; a *S. stolonifera* insuper foliis obtusis, ad axin erectis.

In provincia Sebastianopolitana: Langsdorff, Guillem. 24 Colitur in horto regio parisiensi.

ββ) Caule erecto.

11. SELAGINELLA AMAZONICA † caule exacte tetragono, goniotropo, duriusculo, pyramidato-ramoso, ramis synedris; foliis cathedris, exauriculatis, caulinis homomorphis, rameis lateralibus posticis, divergentibus, oblongis, acutiuseulis, subaequilateralis, nervo non prominente: intermediis quadruplo minoribus, subfalcatis, oblongis, mucronatis, patulis, convergentibus.

Tab. nostra VI.

CAULIS e basi radicante erectus, enodis, non sulcatus, ubique regulariter foliosus, pennam scriptoriam fere crassus, sesquipedalis et ultra. RADICULAE breves, crassiusculae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS divaricato-expansa, pyramidata, caule excurrente; SECUNDARIAE pulcherrime pinnatae (plumosae), RAMIS teretibus, ex angulis caulibus lateralibus provenientibus, sub angulo recto abeuntibus, postremo in ramulos pinnatos desinentibus: divisionibus RAMULORUM fere omnibus simplicibus, rectis, patentidivergentibus, parallelis, confertis. FOLIA rigidiuscula, obscure virentia; CAULINA cicatricibus assidentia, homomorpha: RAMEA dimorpha: LATERALIA 2 lin. longa, postica, ad axin quidquam erecta, oblonga, subfalcata, acutiusecula, subimbricato-conferta, basi rotundata, subaequalia, integerrima vel margine superiore ad basin minutissime sub lente denticulata, convexa, marginibus nonnihil reflexis, nervo neque prominente neque sulcato, subtus vero distinguendo: INTERMEDIA ovato-oblonga, conferta, basi adpressa, dein patula, nervo valde prominente subcarinata, integerrima vel minutissime denticulata, mucronata. AMENTA longissima, 2—2½ pollicaria, flaccida, curvata, solitaria, numerosa, aequalia, haud raro apice divisa: BRACTEIS ovato-lanceolatis, longe acuminatis, basi ventricosis, carinatis, erecto-patentibus, integerrimis. ANTHERIDIA subglobosa, minima, glabra, farina miniata repleta. OOPHORIDIA —.

Speciosa haec species recedit a *S. Wallichii* (*Lycopod.*) Hook. et Grev. En. fil. n. 106. (*L. elegante* Wallich. Cat. n. 128.) caule exacte tetragono, aequaliter folioso, ramificatione plerumque diffusa, foliis obscurioribus, rigidioribus, lateralibus convexis neque sulcatis.

In silvis udis ad flumen Amazonum, prov. a Rio Negro dictae et Paraënsis: M. 24

12. SELAGINELLA BAHIENSIS † caule quadranguli, pleurotropo, corrugando, inaequaliter cuneato-ramoso; foliis cathedris; caulinis homomorphis; lateralibus oblique affixis, ovato-oblongis, acutiuseulis, non auriculatis, convexis, nervo supra prominente: intermediis 4—5-plo minoribus, ovatis, longe apiculatis, planis, patulis, divergentibus, biauriculatis.

CAULIS adscendens, pleurotropus, enodis, laevigatus, stramineo-nitens, aequaliter foliosus, fere pedem longus, pennam

corvinam crassus. RADICULAE breves, numerosae ad basin caulis. STOLONES insuper adsunt sarmentosi, foliosi. RAMIFICATIO UNIVERSALIS deliquescenti-cuneata (inaequaliter cuneata): PARTIALES pinnatae: RAMIS elongatis, excurrentibus, aequaliter flexuosis; RAMULIS 2—3-divisis. FOLIA supra saturate viridia, subtus micantia, rigidiuscula: CAULINA homomorpha, aequidistantia, adpressa, transversim sessilia, acuminato-apiculata, sensim abeuntia in RAMEA dimorpha. LATERALIA fere 2 lin. longa, 1 lin. lata, horizontalia, ad axin erecta (angulo 45° patentia), oblique affixa, ovato-oblonga, subfalcata, acutiuscula, non auriculata, integerrima vel ad basin minutissime denticulata, convexa, marginibus valde reflexis, nervo supra prominente; INTERMEDIA 4—5plo minor, ovata, longe apiculata seu aristata, subintegerrima, excepto nervo lineato plana, basi biauriculata, patula, divergentia. AMENTA 2—3 lin. longa, quadrangularia: BRACTEIS ovato-lanceolatis, longe acuminatis, acute carinatis, apice patulis, quam antheridia majoribus. ANTHERIDIA minima, oblonga, farina miniata repleta. OOPHORBIA vix majora, globulos 4 continentia, antheridiis parce immixta.

In vicinia urbis Soteropoleos: Blanchet. 2 (Herb. Deless.)

13. SELAGINELLA LAEVIGATA † caule scandente, elongato, anguloso, sulcato, paucifolio, pyramidato-ramoso, ramis cathedris; foliis flaccidis, cathedris, inaequaliter auriculatis, caulinis homomorphis, ramis lateralibus anticis, lineari-oblongis, obtusiusculis, basi inferiore excisa, nervo utrinque perspicuo: intermediis triplo minoribus, oblongo-falcatis, obtusiusculis, parallelis, laxis.

Lycopodium laevigatum Willd. Sp. Pl. V. 45. (non Lamk.)

Lycopodium Willdenovii Desv. in Enc. Bot. Suppl. III. 552. Blume Fl. Jav. 267. Exsicc. Plant. Wallich. n. 122.

Stachygyndrum laevigatum Pal. Beauv. Prodr. Aethiop.

113. Brongniart. Végét. fossil. II. t. 5.

CAULIS bipedalis, angulosus nec distincte tetragonus, sursum in teretiusculum abiens, leniter sulcatus, supra vero sulco profundiore exaratus, enodis (pleurotropus), laevigatus, stramineus, nitidus, foliis paucis sparsis obsitus, crassitiem pennae corvinae excedens. RAMIFICATIONES pyramidatae, RAMIS excurrentibus, distichis, sub angulo acuto abeuntibus, remote foliosis: RAMULIS ad 10-divisis, confertim foliosis, flaccidis, divisionibus iterum dichotomis, apicibus rotundatis. FOLIA CAULINA erecto-patula, ovato-lanceolata, integerrima vel ciliolis solitariis ad marginem stipata: RAMEA LATERALIA subfalcata, obtusa, integerrima, pellucida, fusco-punctulata, horizontalia, convexa, marginibus inaequaliter revolutis, medio baseos ad cicatricem caulis affixa, inaequaliter auriculata, superiora basi integra: INTERMEDIA fere triplo minor, mox confertim imbricata, laxa, leviter carinata, nervo valde prominente, parallela vel a basi divergentia, basi obliqua extrorsum producta. AMENTA elongato-subpyramidata, apice acuminata, solitaria, 3—4 lin. longa: BRACTEIS late ovatis, brevissime acuminatis, minimis, globoso-ventricosis, carinatis, integerrimis. ANTHERIDIA majuscula, bracteam excedentia, pallide flava, suborbicularia, basi emarginata, glabriuscula. OOPHORBIA majora etiam, amentum excedentia, sordide flava, globulos 4—6 verrucosos, vitellinos, continentia, plerumque ad basin, raro in medio amenti solitaria.

Variet foliis majoribus minoribusve, ramulis magis minus approximatis, caule nonnunquam trigono. — Discrimen plantam inter americanam et asiaticam invenire non potui.

In silvis prov. Sebastianopolitanae et S. Pauli passim: M. 24

13. SELAGINELLA ERYTHROPUS † caule erecto, undique foliis oblecto, basi puniceo, pyramidato-ramoso, ramis flaccidis; foliis cathedris, inaequaliter auriculatis; caulinis homomorphis, squamiformibus, vaginantibus: ramis lateralibus oblongo-lan-

ceolatis, subfalcatis, inflexo-erectis, nervo supra sulcato, subtus prominente: intermediis triplo minoribus, oblongo-ovatis acuminatis, adpressis, convergentibus.

Lycopodium erythropus Mart. Icon. sel. pl. crypt. 39. t. 20. f. 3.

CAULIS tetragonus, superne obtusangulus, continuus, filum emporeticum crassus, palmam vel spithamam longus, inde a basi colore kermesino tinctus. RADIX ramoso-fibrosa, kermesina. RADICULAE filiformes, striatae, angulosae, kermesinae, nudeae vel squamis foliaceis nitide coloratis, irregulariter dispositis vestitae, ramulosae, ad basin caulis provenientes. RAMIFICATIO pyramidata, caule excurrente, pluribus terminali-radicante: RAMIS erectis vel patentibus adscendentibus, flaccidis, excurrenti-ramulosis, pinnatis, supra sulcatis. FOLIA inferiora cathedra, superiora synedra: CAULINA inferiora vaginantia, adpressa, late ovata, acuminata, kermesina, superiora alterna, subaequidistantia, patentia, oblongo-lanceolata, subfalcata, viridia, omnia albide denseque ciliata, lineam longa; RAMEA LATERALIA approximata, oblongo-lanceolata, subfalcata, magis minus serrulato-ciliata, vix lineam longa, subtus pallida, inflexo-erecta, margine potius involuto quam revoluta, supra leviter sulcata, subtus nervosa, basi semicordata, inaequalia, auriculata, auricula rotundata, ciliata: INTERMEDIA erecta, adpressa, superne soluta, oblique ovata, mucronata, ciliolata, convergentia, mucronulis divergentibus et subsecundis, basi obliqua subcordata, auricula exteriori rotundata, majore, interiori in sulco ramulorum abscondita. AMENTA brevia (3 lin. longa), numerosa, tetragona, aequalia: BRACTEIS ovato-acuminatis, ad nervum et marginem minutissime denticulatis, adpressis. ANTHERIDIA erecto-oblonga, minima, pallide flavescens, glaberrima. OOPHORBIA —.

Speciem hanc distinctissimam in Chile quoque legit Cumming. — *S. haematodes* (*Lycopodium*) Kunze in Linnaea IX. 9. differt magnitudine (est nempe pedalis et ultra), ramis et ramulis strictioribus, foliis evidentius ciliatis, intermediis simpliciter acutis nec mucronatis, magis curvatis, conniventibus convergentibus.

In silvis aridis prov. Piauiensis, e. g. ad Oeiras: M.; — prope Villa Boa et inter Buccaina et Rio dos Índios grande prov. Goyaz: Pohl. Fructificat. Mato. 24

14. SELAGINELLA COARCTATA † caule obsolete tetragono, subaphyllo, laevigato, subdigitato-ramoso; foliis rigidissimis, minutis, exauriculatis: caulinis homomorphis, sessilibus; ramis lateralibus adpresso-succubis, ovato-falcatis, mucronatis, nervo subtus prominulo, supra non conspicuo; intermediis vix minoribus, imbricato-adpressis, mucronatis, convexis, divergentibus.

Lycopodium coarctatum Mart. MS.

CAULIS erectus, strictus, usque pedalis, inferne simplex, irregulariter subaphyllus, stramineo-nitens, laevigatus, sursum denique pubescens, enodis, crassitiem pennam corvinam vix adaequans, superne deliquescenti-ramosus: RAMIS erectis, conduplicatis, inferne subsimplicibus, dein excurrenti-ramulosis; RAMULIS distichis, frondosis, subdigitatis vel potius fastigiatis, rigidis, foliis undique oblectis, compressis, plerumque iterato-bifidis. FOLIA aceroso-rigida: caulina sparsa, irregulariter disposita, non producta, erecto-adpressa, ovato-oblonga, acuminata, serrulato-ad basin magis ciliolata, pallida; RAMEA LATERALIA minima (vix ½ lin. longa), confertissima, acuminata, mucronata, margine reflexo minute serrulata, convexa, horizontalia; INTERMEDIA ovata, nervo vix conspicuo, sub lente inaequaliter serrulata, apice parallela vel divergentia. AMENTA subsolitaria, brevissima (1 lin. longa), ovata, (nostris) pauca: BRACTEIS squarrosas, ovato-lanceolatis, convexis, dorso rotundatis, acuminatis, mucronato-scutigeris, serrulato-ciliatis. ANTHERIDIA minima. OOPHORBIA —.

Affinis est *S. lepidophylla* (*Lycopodium*) Hook. et Grev., planta mexicana.

In monte Arara-Coara prov. Rio Negro, ad fines imperii brasiliensis: M. 24

b) Caule articulato. Articulatae.

a) Caule goniotropo.

15. SELAGINELLA ASPERULA † caule *adscendente*, quadrangulari, *acute nodoso*, *pinnato-ramoso*; foliis cathedris, caulinis *homomorphis*: rameis lateralibus posticis, ovatis, *subfalcatis*, acutis, breviter biauriculatis, nervo supra prominente, subtus sulcato: intermediis duplo minoribus, curvatis, mucronatis, oblique peltatis, apice patulis, convergentibus.

Lycopodium asperulum Mart. MS.

CAULIS pedalis, filum emporeticum crassus, laevigatus, stramineo-nitens, utrinque simpliciter concavus, neque supra bisulcatus neque facie prona convexus, strictus, nodis articularibus valde et acute prominentibus, superioribus circumsulcis. RADICULAE teretiusculae, tenues, laevigatae, ad basin caulis. RAMIFICATIO UNIVERSALIS pinnata, superne truncata: PARTIALES confertae, pinnatae: RAMIS erecto-patentibus, strictis; RAMULIS abbreviatis. FOLIA opaca, subtus glaucescentia, rigida: CAULINA remotiora, deorsum subnulla, erecto-adpressa, ovato-lanceolata, acuta, minutissime denticulato-ciliata, basi incisa, biauriculata, auricula altera maxima, altera minori, lobulari, nervo supra leniter sulcato. RAMEA: LATERALIA 1 lin. longa, contigua, quidquam inflexa, versus axin erecta, subconvexa, pungentia, apice modice curvata, ad marginem superiorem denticulata, basi semicordata, auriculis brevissimis, acutis, subaequalibus; INTERMEDIA ovato-falcata, acuminata, mucronata, praecipue margine exteriori serrulata, basi oblique producta, plana, convergenti-conniventia, apice patula. AMENTA pyramidalia, brevia (1 — 1½ lin. longa): BRACTEIS ovatis, longe acuminatis, carinatis, submarginatis, ciliolatis, adpressis. ANTHERIDIA minuta, subglobosa, subbiloba, fuscescentia, FARINA flavo-virente, repleta. OOPHORIDIA solitaria ad basin amenti, subglobosa, tricocca, GONGYLOS tres, favoso-reticulatos, albissimos continentia.

Ab affinis: *S. stellata*, *stolonifera*, *chitensi* facile distinguitur caule erecto, simpliciter quadrangulari, neque supra bisulcato, foliis confertis, rigidis, caulinis heterogeneis, ramificatione dein truncata.

In silvis ad fluvium Amazonum prov. Paraënsis et ad flumen de S. Francisco prov. Bahiensis: M. 24

16. SELAGINELLA MARGINATA † caule *teretiusculo*, parcifolio, repente, *excurrente*; radiculis anticis; foliis cathedris, uniauriculatis: caulinis subdimorphis: rameis lateralibus, linearibus, acutis, nervo supra sulcato, subtus valde prominente: intermediis falcatis, longe cuspidatis, albo-marginatis, cuspidibus laxis, *divergentibus*.

Lycopodium marginatum Humb. et Bonpl. in Willd. Spec. Pl. V. 41. Kunth. Nov. Gen. et Sp. I. 39. Spring in Bot. Zeit. 1838. I. 194.

Tab. nostra VII.

CAULIS longissimus, 2—3-pedalis, filum emporeticum crassus, undique radicans, e tetragono teretiusculus, goniotropus, articulatus. RADICULAE refractae, teretiusculae, filum emporeticum crassae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS pulchre alternans per dichotomias: SECUNDARIAE pyramidatae, coarctatae, foliosissimae: RAMIS remotis, erectis: RAMULIS 3—4 dichotome divisus, apice rotundatis. FOLIA rigida; CAULINA remota, ovato-oblonga, irregulariter patentia, basi margineque superiore longius ciliata, longe producta itaque peltata, lobo basilari maximo, rotundato, sinuato; RAMEA confertissima: LATERALIA 1—1½ lin. longa, quam caulina basi angustiora, subantica, linear-oblonga, acuta, minutissime serrulata, margine superiore versus basin ciliata, si vis uniauriculata, i. e. auricula altera magna, calcariformi, inferiore subnulla, aegrius conspicua, horizontaliter patentia, ad axin rectangularia, subconvexa, marginibus subreflexis; INTERMEDIA duplo

minora, late ovata, falcata, elongato-cuspidata, minutissime ciliolata, peltata, lobo basilari majusculo, extrorsum leviter sinuato, subdeplana, adpressa, apicibus solutis divergentibus vel subsecundis. AMENTA 3—4 lin. longa, lineari-quadrangularia; BRACTEIS adpressis, imbricatis, ovato-lanceolatis, acuminatissimis, minutissime ciliolatis, dorso acutis. ANTHERIDIA minima, exacte reniformia. OOPHORIDIA solitaria ad basin amenti, majuscula, 4-cocca, globulos 4 reticulatos, albos continentia.

Specimina nostra a Willdenowiano (Herb. n. 19394. f. 1.) mexicano differunt habitu vegetiore, foliis, caule radiculisque majoribus, crassioribus.

Ad Rio da Prata prov. Minas Geraës, in umbrosis ad S. Sebastião in via a Serra dos Cristais prov. Goyaz: Pohl. 24

17. SELAGINELLA DISTORTA † (*Subspecies S. marginatae*) caule repente, *teretiusculo*, *divaricato-ramoso*; radiculis anticis; foliis cathedris, uniauriculatis: caulinis homomorphis; rameis lateralibus *irregulariter reduplicatis*, ad axin rectangularibus, ovato-oblongis, nervo supra sulcato, subtus prominente: intermediis parum minoribus, *rectis*, longe cuspidatis, albo-marginatis, adpressis, parallelis vel divergentibus.

Lycopodium distortulum Mart. MS.

CAULIS palmaris usque spithameus, procumbens, goniotropus, subarticulatus, laevigatus, nitidus, rigidulus, crassitie filii emporetici. RADICULAE paucae ad basin apicemque caulis. RAMIFICATIO UNIVERSALIS varie divaricata, caule nimirum inaequaliter diviso, dein pluries excurrente: SECUNDARIAE pyramidatae, angulo recto patentes, variae magnitudinis: RAMULIS divergenti-patentibus, rigidiusculis. FOLIA rigida, subopaca, crassiuscula: CAULINA deorsum rariora exarefacta, sursum inaequaliter disposita, basi longe producta, patentia, solenniter declinata adpressa. RAMEA: LATERALIA vix 1 lin. longa, postica, saepissime divaricato-reflexa, refracta vel reduplicata, ovalia, pungentia, margine incrassato integerrima vel denticulo uno alterove ciliisque sparsis sub lente conspicuis munita, pallide marginata, inaequaliter convexa, basi inferiore producta, lobo auriculari angusto, ciliolato, patulo, basi superiore valde dilatata; INTERMEDIA ovato-oblonga, integerrima, longe acuminata et cuspidata, cuspidibus patulis divergentibus saepius uncinato-deflexis, lobo basilari subaequali, ciliolato, integro, nervo parum prominente. AMENTA brevissima (2—3 lin. longa), tetragona: BRACTEIS adpressis, ovatis, acuminatis, basi subcordatis, quam folia tenuioribus, semipellucidis, margine serrulato-ciliatis. ANTHERIDIA —. OOPHORIDIA ad basin amenti solitaria, didymo-globosa, globulis 4, ellipticis immo subtriquetris referta.

β. *minor*: humilior, humo adpressa, compacta, sibique involuta, folia minus distortuens. (Num forma juvenilis?)

S. albidulae (*Lycopodium*) Swartz (cfr. Spring in Botan. Zeit. 1839. I. 214.) foliis quodammodo respondet, sed caule, qui isti est pertenuis, filiformis, flaccidus, abhorret.

In Brasilia intratropica: Sellow; — in silvis caedius, umbrosis, ad Salgado, Muhlada, atibi in prov. Minas et Bahiensis: M. — in silvis ad Rio de Janeiro: Langsdorff. — β. *Locis aridis legit* M. 24

18. SELAGINELLA EXCURRENTIS † caule repente, *tetragono*, *exacte excurrente*; radiculis anticis, filiformibus; foliis cathedris, *undique dimorphis*, *aequidistantibus*: lateralibus ovatis, acutis, integerrimis, oblique peltatis, uniauriculatis, rectangulari-patentibus, supra sulcatis, subtus nervosis: intermediis vix triente minoribus, *rectis*, acutis, peltatis, adpressis, *divergentibus*.

CAULIS 3—6-pollicaris, ad insertiones ramorum nodosus, undique radicans, filum emporeticum crassus. RADICULAE compressae, glaberrimae, uti caulis stramineo-nitens, apice

fuscescenti-lanuginosae. RAMIFICATIO elongato-pyramidata, caule apice flagelliformi-excurrente, subsimplice; RAMIS angulo acuto abeuntibus, humo adpressis, radicanibus, RAMULIS brevissimis, simplicibus vel inferioribus bifidis. FOLIA rigida, pallide viridia, nitentia, conferta: LATERALIA $\frac{3}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, subantica, ovata, acuta, integerrima, albido marginata, margine quidquam revoluta, inaequilatera, fere deorsum falcata, basi producta obliqua subacuta vix emarginata, oblique inflexa, ad axin rectangularia, nervo subtus lineari-prominente, supra sulcato: INTERMEDIA adpresso-erecta, excepto apice subincurvo divergentia, ovalia, integerrima vel sub lente minutissime denticulata, convexa, nervo distincte prominente, crebro sulcato, margine revolutopatente, lobo basilari magno integro soluto. AMENTA —.

In prov. Minarum: Sellow, Ackermann. 24

β) *Caute pteurotropo (latera advertente).*

19. SELAGINELLA CONDUPLICATA † caule erecto, quadrangulari, parcifolio, aequali-dichotomo-deliuescente; foliis cathedris, subauriculatis: lateralibus anticis, ovato-lanceolatis, supra sulcatis, subtus subnervis: intermediis 3—4-plo minoribus, curvatis, mucronulatis, adpressis, convergenti-coniventibus.

CAULIS pedalis, filum emporeticum et quod excedit crassus, erectus sive potius e basi repente mox ascendens, strictus, quadrangularis, supra profundius 3—4-sulcatus, inferne simplex, subaphyllus vel remote foliosus, glaberrimus, stramineo-nitens, (in speciminibus nostris, uti folia, punctulis dispersis inaequaliter maculatus,) exactissime ad ramulos usque articulatus, ad articulos circumsulcatus aequaliter incrassatus. RADICULAE perpaucae ad basin caulis, immediate infra articulos provenientes, primo adscendentes, mox refractae, subtetragonae, striatae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS orditur dichotomia aequali, perfecta et finitur sensim transeundo in excurrentem, centralem: duplex est et quasi bifrons, quia caulis ab initio aequali-bifidus, et frondes sibi adversae nidulum quasi exhibent ramulis incurvato-convergentibus ad latera clausum. RAMI elongati, excurrentes, angulo 45° abeuntes: RAMULI simplices. FOLIA obscure viridia, siccitate straminea, membranacea, nitida, rigida: CAULINA ovato-lanceolata, homomorpha, sursum sensim dimorpha: RAMEA LATERALIA ultra 1 lin. longa, contigua, subimbricata, horizontalia, patenti-divergentia, convexiuscula, subfalcata, subintegerrima, margine superiore ad medium usque minute denticulata, acutiuscula, basi superiore quidquam dilatata, adpressa, auriculam quasi effingente brevem, inferiore libera, soluta: INTERMEDIA ovato-lanceolata, falcata, carinata, minute denticulata, ad marginem nonnihil involuta, ad latera carinae concava. AMENTA 4—8 lin. longa, lineari-quadrangularia: BRACTEIS ovatis, adpressis, longe acuminatis, integerrimis, nervo ad apicem carinato. ANTHERIDIA minima, globosa, hispida. OOPHORIDIA solitaria ad basin amenti, majuscula, pallide fuscescentia, per lentem alutacea.

Ab affinis omnibus excellit caule articulo, subaphyllo, canaliculo et ramificatione exacte dichotoma. — Specimen ex Porto Bello (Herb. Reg. Berol.) differt foliis majoribus, praesertim latioribus, ovatis, nec non caulinis rectis, horizontaliter patentibus. — *Lycopodium gracile* Desv. (Enc. Bot. Suppl. III. 551.) valde propinqua, si non eadem species.

Ad flumen Amazonum in herbis silvarum, in prov. Paraënsi: M. 24

20. SELAGINELLA STELLATA † caule repente, elongato, quadrangulari, supra bisulcato, excurrente, stolonifero; radiculis tetragonis, anticis; foliis cathedris, biauriculatis: caulinis homomorphis: rameis lateralibus ovato-lanceolatis, subintegerrimis, supra sulcatis, subtus nervosis: intermediis quadruplo minoribus, curvatis, mucronatis, denticulatis, adpressis, convergenti-coniventibus.

Lycopodium stellatum et stoloniferum Willd. Herb.

Lycopodium stoloniferum Auct. neque Sw. et Hook. Grev. Dillen. Hist. musc. 471. (excl. syn. Plumieri?) t. 66. f. 10. Breyn. exot. Cent. I. t. 101. Herb. Willd. n. 19392. f. 1.

Tab. nostra VIII.

CAULIS humo longe lateque diffusus, STOLONES veros loco ramorum saepius emittens, longissimos, subsimplices, flagelliformes, remote foliosos, radicanes, supra bisulcatos, filum emporeticum crassitie excedens, nodis articularibus inferioribus acute prominentibus, superioribus minus conspicuis. RADICULAE hic illic, praesertim ad apicem caulis, provenientes, filum emporeticum crassae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS pinnata, caule simpliciter excurrente, apice flagelliformi-elongato, stolonum ad instar radicante: PARTIALES elongato-pyramidatae, RAMULIS dein dichotome divisus, divisionibus subfastigiatis. FOLIA rigidiuscula, laete viridia, subtus glaucescentia: CAULINA deorsum subnulla, minora, ovato-lanceolata, acuminatissima, subintegerrima, subnervia, aequaliter biauriculata, sursum mox dimorpha, majora, basi inaequaliter biauriculata, auricularum altera lobulari majori adpressa, altera minori membranacea, patentissima: RAMEA LATERALIA $\frac{1}{2}$ lin. longa, horizontalia, ovato-lanceolata, subfalcata, pallide marginata, marginibus prope apicem recurvis, superiore minute denticulato, basi biauriculata, auricula inferiore latiore brevissima, superiore membranacea albida lineari longissime denticulata: INTERMEDIA confertissima, imbricata, oblongo-falcata, acuminata, mucronata, extus minutissime denticulata, basi biauriculata, auricula exteriori rotundata magna, interiore membranacea angustissima lineari-elongata denticulata. AMENTA 3—4 lin. longa, quadrangularia: BRACTEIS ovato-acuminatis, adpressis, sub lente serrulatis, carinatis. ANTHERIDIA erecto-oblonga, minima. OOPHORIDIA solitaria ad basin amenti, majuscula, tetra-cocca, globulis 4 repleta.

A *S. stolonifera* differt caule sulcato et foliis lateralibus supra sulcatis, subfalcatis, biauriculatis. Prae ceteris omnibus insuper excellit forma humifusa, elongata, stolonibusque genuinis. — Singularem vero affinitatem ostendit cum *L. cordifolium* Desv. (Enc. Bot. Suppl. III. 548. Herb. Willd. n. 19389.), quod vero faccidius est et folia gerit remotiuscula, basin versus distincte ciliata, nec non intermedia fere recta et a basi divergentia.

In siccis siccioribus passim, e. g. ad flumen Amazonum, prope Obidos prov. Paraënsis: M., Sieber, servus com. ill. de Hoffmanns-egg. 24

21. SELAGINELLA SULCATA † caule quadrangulari, supra bisulcato, repente; radiculis anticis; foliis cathedris, rigidiusculis, undique dimorphis: lateralibus anticis, oblongis, basi angustatis, rectangulari-patentibus, acutis, supra nervosis, subtus sulcatis, biauriculatis, auricularum superiore majore: intermediis 3—4-plo minoribus, cuspidatis, planis, imbricatis, basi pellatis, cuspede patulo divergente.

Spring in Bot. Zeit. 1838. I. 184.

Lycopodium sulcatum Desv. in Enc. Bot. Suppl. III. 549. (non Hook. et Grev.) Ersicc. in Mart. Herb. Flor. Bras. n. 197.

CAULIS elongatus, pedalis et ultra, durus, strictus, pemam corvinam solenniter crassus. RADICULAE numerosae, elongatae, refractae, laevigatae, pallide virides, filum emporeticum crassae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS nunc inaequaliter dissoluta, divaricata, nunc pinnata: SECUNDARIAE dichotomo-subcuneatae: RAMIS divergenti-patentibus, elongatis, humo prostratis: RAMULIS adpressis, excurrentibus, brevissime iterum divisus. FOLIA undique aequaliter conferta, sordide viridia: LATERALIA majuscula (2 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata), oblonga, paululum falcata, basi marginibus revolutis angustata (oblanceolata Desv.), acuta, integerrima vel minutissime denticulata, vix inaequilatera, plana, horizontalia, vix versus axin erecta, auricula superiore calcariformi-elongata

membranacea ciliolata, inferiore brevissima herbacea deltoidea acuta: INTERMEDIA ovato-acuminata (sub lente composita uti lateralibus undique aequaliter serrata), adpressa, planiuscula, nervo vix carinato, lobo basilari majusculo rotundato introrsum longiore herbaceo rarissime leviter emarginato. AMENTA erecta, tetragona, elongata (4—9 lin. longa): BRACTEIS ovato-lanceolatis, longe acuminatis, carinatis, adpressis, ad marginem et carinam minutissime denticulatis. ANTHERIDIA subglobosa, minutissima, basi cordata, pallide helvola, farina ochracea repleta. OOPHORIDIA magnitudine seminis *Brassicae*, tricocca, ad basin amenti solitaria, globulis 3, albis, favoso-rugosis repleta.

β. *cruenta*: caule radiculisque aut omnino aut pro parte sanguineo-tinctis.

Praeter supra descripta aliud quoque pluries vidi genus Oophoridiorum, subglobosorum, semen *Papaveris* magnitudine aequantium, gonygium unicum continentium, numerosorum in singulis amentis, antheridiis immixtorum.

In monte Corcovado: Luschnath; — prope praedium Mandioca: M., Harrison; — ad Lorena in prov. S. Pauli: M.; — in via Felisbertia prov. Bahiensis: Maximil. Princ. Videns. 24

22. SELAGINELLA SUAVIS † (*Subspecies S. sulcatae*) caule tetragono, siccitate corrugando plano, supra bisulcato, repente, excurrente; radiculis anticis; ramis foliisque flaccidis: lateralibus anticis, oblongis, planis, acutiusculis, rectangulari-patentibus, supra nervosis, subtus sulcatis, basi superiore dilatatis, auriculatis, auricularum inferiore longiore: intermediis 3—4-plo minoribus, longe cuspidatis, planis, imbricatis, distincte *biauriculatis*, a basi divergentibus, patulis, albomarginatis.

Spring in Bot. Zeit. 1838. I. 185.

Lycopodium marginatum Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 286.

CAULIS pedalis, erassitie filii emporetici, succulentus adeoque siccitate planus irregulariter contractus striatus vel alatus (amorphus), articulis non prominentibus sed obscure deorsum coloratis carnosulis. RADICULAE compresso-angulatae. RAMIFICATIO UNIVERSALIS subpinnata, caule excurrente: SECUNDARIAE aliae pyramidatae, aliae cuneatae: RAMIS 6-dichotome divisio, erectis, fuscis: RAMULIS confertis, divisio. FOLIA laete viridia, subtus pallide nitentia: LATERALIA oblonga, subensiformia, integerrima, latere superiore albo-marginata, auricula superiore abbreviata rotundata, inferiore elongata attenuata calcariformi vix ciliolata: INTERMEDIA obovata, nervo valde prominente, in sinum baseos excurrente. AMENTA (in nostris) 3 lin. longa; BRACTEIS acute carinatis. ANTHERIDIA transversim oblonga (?!), farina crocea foeta. OOPHORIDIA majuscula, solitaria ad basin amenti.

Venustissimam hanc speciem, licet habitu diversissimam, in *S. sulcatam* transire vario modo tentare, ex magno exemplorum, quae mihi suppetierunt acervo comprehendere. Majorem etiam affinitatem cum *S. Poeppigiana* (*Lycopodium* Hook. et Grev. En. fil. n. 143., cui subscribendum *L. marginatum* Presl. Rel. Haenk. 78.) exhibet. Differt vero foliis auriculatis, basi dilatatis, intermediis, integerrimis, divergentibus.

In umbrosis, praesertim ad arborum truncos: in Brasilia meridionali: Sellow.; — in Morro queimado (ad Novo Friburgo) prov. Sebastianopolitanae: Merkel; — in umbrosis ad Matthias Ramos et Engenho da Vargem prov. Minarum: Pohl; — in Morro formoso prov. S. Pauli: M.; — prope Rio de Janeiro, ad Catçada da Estrela: Gaudichaud, M. Fructificat Martio. 24

§. 2. Foliis atque ramulis siccitate convolutis. *Circinatae*.

23. SELAGINELLA CONVOLUTA † multicaulis, caulibus rosulatis, undique foliis obtectis, erectis, a tergo colore piceo tinctis; foliis rigidis, undique dimorphis, peltatis, denticulato-asperis: lateralibus basi subvaginantibus, imbricatis, adpressis,

inflexis, mucronatis, subtus nervosis: intermediis parum minoribus, continuo biserialis, mucronulatis, convergentibus.

Lycopodium convolutum Walk. Arnott in Mem. of the Wern. Soc. V. 199.

Lycopodium hygrometricum Mart. Reise in Brasil. II. 792.

Lycopodium revolutum (per mendum typographicum juxta litt. a cl. auctore exhibit.) Hook. et Grev. En. fil. n. 97.

RADIX fibrosa, dense caespitosa. CAULIS jam sub exortum pluries divisus, divisionibus in formam rosulae dispositis, circinato-inflexis, 2—3 pollicaribus, (foliis abstertis) evanescenti-tetragonis, duriusculis, filum emporeticum crassis. RADICULAE stolonum vices gerentes. RAMIFICATIO pyramidato-pinnata, caule excurrente: RAMIS brevibus, erecto-patentibus, 2-rarissime 4-divisis: RAMULIS brevissimis, rotundatis. FOLIA aceroso-rigida, nitentia, supra obscure viridia, subtus pallide lucida, synedra, inde a basi caulis undique confertissima, imbricata: LATERALIA 1 lin. longa, ½ lin. lata, postica, antrorsum inflexa, versus axin quidquam erecta, latere inferiore versus apicem reflexo, late ovato-falcata, breviter acuminatissima s. p. mucronata, basi producta integra, pallide et quasi cartilagineo-marginata: INTERMEDIA ovato-falcata, plana, nervo valde prominente, in mucronulum pungentem desinente, lobo basilari integro truncato. Series foliorum lateralium dorso colore badio vel piceo continue sunt tinctae. AMENTA —.

Vidi exemplum in Herb. Reg. Berol. a b. Sprengelio sub nomine *L. circinatis* datum, caulibus ad 6 pollices elatis, ultra medium simplicibus excellens. — *S. patlescens* (*Lycopodium*) Presl. deflectit foliis longius acuminatis, longe denseque cillatis, albidis, intermediis late albomarginatis. — *L. circinate* Hortulan. Brasiliae vulgo adscriptum sine dubio alias indigena est.

In interioribus prov. Bahiensis: Sims.; — in deserto Bahiensis et Pernambucano passim: Paiva, M.; — prope Rio de Janeiro: Pohl. 24 Potentiam virilem amissam hujus plantae decocto iteratis vicibus sumto reduci posse, fabulantur incolae provinciae pernambucanae.

III. PSILOTUM.

ANTHERIDIA 3-locularia, rima verticali 3-semivalvia. OOPHORIDIA nulla.

CAULES dichotomo-furcati, compressi, subtriquetri, subnudi. FOLIA minima, squamaeformia, subulata, FRUCTIFERA breviora, bifida. ANTHERIDIA subtricocca, majuscula, septicida, polyspora, valvis semipartitis medio septiferis. SORAE flavae, hyalino-pellucidae, ovaes vel elongato-reniformes, aqua aspersae, tarde convolvendae. „Semina? ovalia, in cumulo alba, seorsim semipellucida, in aqua fovillam minutissimam explodentia.“ R. Br.

Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 109 et 132. Synops. fil. 187. Bernhardia Willd. Act. Acad. Erford. 1802. II. Hoffmannia Willd. in Usteri Magaz. VI. 17. Ipphia Noronha apud Pel. Thouars Prodr. phytol. in Mélang. de Botan. „Tristeca Pal. Beauv.“ *Psiloti* sp. R. Brown. Prodr. 164. Endlich. Gen. n. 695. Bernhardiae sp. Kaulfuss En. fil. 21. *Lycopodium* sp. Linn. *Lycopodioidis* sp. Dillen.

Generi *Tmesipteridem* Bernh. subjauerunt cel. R. Brown. et Kaulfuss, quo pergere nolui, quia antheridia bilocularia in *Psilotis* rarissime tantum obveniunt, et habitus utrorum totidem sit diversus.

1. *PSILOTUM TRIQUETRUM* SWARTZ. caule dichotomo, ramis undique triquetris.

Swartz Syn. fil. 187. R. Brown Prodr. 164. Desv. Prodr. fil. in Ann. Soc. Linn. Par. 192. Hook. Grev. in Bot. Miscell. II. 362.

Psilotum floridanum Mich. Fl. bor. Amer. II. 281.

Bernhardia dichotoma Willd. Sp. Pl. V. 56. *Bernhardia* in Schrad. Journ. 1800. 132. Kaulfuss En. fil. 21.

Hoffmannia aphylla Willd. in Usteri Bot. Magaz. VI. 17.

Ipphia polyquestra Noronha apud Pet. Thouars Prodr. Phyt.

Lycopodium nudum Linn. Sp. Pl. 1564. Lam. Enc. Bot. III. 649. Plum. Fil. t. 170. f. AA. Dillen. Hist. musc. t. 64.

f. 4. Schkuhr Krypt. Gew. t. 163. b. Ad. Brongn. Végét. fossil. II. t. 6. f. 1.

Var. β . *gracile* ramis longioribus angustioribusque Hook. et Grev. Bot. Misc. II. 362.

RADIX repens, pilis ferrugineis rigidis tecta (Kaulf.). CAULIS ultra dimidiam longitudinem simplex, angulosus, dein cuneato-ramosissimus, saepe pendulus, 8—12-pollicaris: RAMIS triquetris, quasi triangularis. ANTHERIDIA per ramos dispersa; basi excavata, infra fissuram foliorum stipite brevissimo assidentia. PLANTA obscure viridis, sicca quidem nigricans.

Prope Rio de Janeiro, in silvis montis Corcovado et Serrae dos Orgãos et alibi in prov. Sebastianopolitana: Leschenault, Langsdorff, M.; — in prov. Minar. gen.: M. 2. (Essicc. Sieber herb. Martinic. Suppl. n. 58. Syn. fil. n. 142. Fl. Nov. Holl. n. 486. Plantae Waltich. n. 46.)

ICONES LYCOPODINEARUM EXPLICATAE.

TAB. V. FIG. I. *Lycopodium quadrangulare*, pag. 112.

II. *Lycopodium fontinaloides*, pag. 112.

TAB. VI. *Selaginella amazonica*, pag. 124.

VII. *Selaginella marginata*, pag. 127.

VIII. *Selaginella stellata*, pag. 129.

S i g l a e :

I. Planta magnitudine naturali. — Figurae, quae arabicis numeris describuntur, omnes varia magnitudine auctae sunt.

1. Pars caulis cum foliis et fructibus.

2. Folium laterale.

3. Folium intermedium.

3 a. Folii apex, magis auctus.

4. Folium oophoridium fulciens.

5. Oophoridium sive ejus pars.

6. Gongylus oophoridio contentus.

7. Folium antheridium fulciens.

8. Antheridium.

9. Spora antheridii.

LYCOPODINEARUM PER BRASILIAM DISTRIBUTIO ET USUS.

Lycopodinearum, quae a SPRINGIO amico nostro tamquam Brasiliae describuntur propriae, numerus 44 complectitur species, quarum 19 *Lycopodia*, 24 *Selaginellae*, 1 *Psilotum*. Earum quidem 19 nisi in Brasilia non sunt inventae, eaque ea ratione distributae, ut si in hoc imperio magnas, quas jam supra p. 97. memoravimus partes vel regiones sejunxerimus, veluti totidem Florae illius imperii provincias, illarum videantur esse *Dryades*: *Lycopodium fontinaloides*, *quadrangulare*, *Selaginella crassinervia*, *muscosa*, *jungermannioides*, *decomposita*; ad plantas regionis montano-campestre vero pertinent tamquam *Oreades*: *Lycopodium rubrum*, *paradoxum*, *Selaginella excurrens*. In regione extratropica et valle-

culosa habitant *Napaeae*: *Selaginella thujaeifolia* et *macrostachya*. *Hamadryades* vero sive regionis calidosiccae incolae sunt: *Selaginella erythropus* et *bahiensis*. Patriae *Najadum*, sive udo calidoque, quod Amazonum irrigat flumen, regno accedunt: *Lycopodium mollicomum*, *contextum*, *Selaginella amazonica*, *coarctata* et *asperula*. Plantarum denique *vagarum* est *Selaginella distorta*. Ceterum non abhorret a veri similitudine fore ut harum quoque specierum in aliis terrae regionibus inveniantur nonnullae, cum plantarum illarum natura, pariter ac Muscorum, magnam externarum rerum varietatem et cum coeli tum humi et irrigationis diversitatem videatur posse sustinere; qua conditionum discrepantia haud raro solet fieri, ut speciei externa forma quodam modo mutetur, unde adducuntur interdum botanici ut ejusmodi speciei apomorphosin distinctam speciem

esse sibi persuadeant. Jam igitur inde profectus harum descriptionum auctor complures, quae huc spectant plantas, alicujus speciei proposuit subspecies; quam ob causam botanicos, qui his rebus dant operam, admonitos velim, explorent, sitne ejusmodi subspecies huic illive speciei tamquam declinatio coeli temperie effecta, subjungenda, an propria enumeranda in systemate. Ut Muscos ita has quoque ejusdem speciei plantas per multas terras orbisque partes vagari apparuit. Ita *Lycopodium clavatum* tota Europa, America septentrionali, et Brasilia occurrit; *Lycopodium complanatum* latius etiam patet, quippe quod in tota Europa, in Asia, in utraque America, in insulis Indiae occidentalis cernitur. *Selaginella rupestris* in America septentrionali, in Quito, Peruvia et Brasilia, orbis antiqui vero in Camtschatka, inque Indiae orientalis provincia Madras est inventa. *Lycopodium acerosum* ex India occidentali, Peruvia, insulis Sandvicensibus et Mascarenis in lucem est editum; *Lycopodium aristatum* crescit ut in Americae ora septentrio-occidentali, ita in America septentrionali, quae vergit ad Orientem, in India occidentali, in montosis novogratensibus et peruvianis. In parte Americae orientali emergunt *Lycopodium alopecuroides* et *Selaginella apus* inde a Virginia per Floridam in Indiam occidentalem patentia et ad Brasiliam usque. *Lycopodium cernuum* jam supra dictum est indigenam esse omnium fere regionum, quae a tropicis cinguntur. *Lycopodium mandioccanum* non minus in Brasilia quam in imperio Mexicano, India occidentali, et in Java conspicitur. *Psilotum* quoque *triquetrum* longissime est dispersum, cum inde ab America septentrionali per Floridam, Indiam occidentalem, Terram Firmam descendat ad S. Catharinae insulam usque, in ora brasiliensi. Id vero mirum est, quod paucissimae Lycopodineae, quas profert orbis recens detectus, non gignuntur in Africa praeter unam, quam afferre debemus speciem, *Lycopodium repens* dico, quod non solum in America septentrionali, in Guinea, in Mascarenis, in Madagascariae et Ceilonae insulis est inventum, sed etiam in promontorio Bonae Spei.

Omnino *Lycopodia Selaginellis* latius regnare est observatum, quae posteriores multo teneriore sunt structura et fere a tropicis circulis continentur, quum illa haud exigui frigoris patientia non nunquam adscendant ad altos montes. *Lycopodium acerosum*, quod in Andibus Loxensibus inventum est in altitudine pedum 9500, eminet in Serra do Mar juxta oram maritimam Brasiliae

in altitudine 2000 — 3000 pedum, ad flumen vero Amazonum non nisi 500 — 700 pedum supra maris aequor. *Lycopodium aristatum*, in Silla de Caracas in altitudine 5800 pedum detectum, in montibus regionis montanone-morosae Brasiliae ad altitudinem 2400 pedum assurgit, quam eandem assequuntur ibi *Lycopodium reflexum* et *mandioccanum*. *Lycopodium contextum*, species, quae sub linea aequinoctiali occurrit, circa 1200 pedum altitudinem in monte Arara-Coara, Japura fluvio imminente, deprehendi. Species altissime adscendentes e Brasilia cognitae sunt *Lycopodium alopecuroides* et *Selaginella rupestris*, quae in jugo Itambé in provincia Minarum ad altitudinem pedum 4600 evadit. *Lycopodium complanatum*, quod in Silla de Caracas tendit in altitudinem pedum 5100, in Brasilia locis multo inferioribus est conspectum. *Lycopodia* crescunt modo in caudicibus et arborum radicibus, quae humo emergunt (quem locum *Psilotum* quoque *triquetrum* adamat), — modo in solo silvarum argillaceo ac multis semiputridis lignorum particulis commixto, nonnullae etiam locis uliginosis. *Selaginellae* crescunt in terra, saepe magna multitudine consociatae; amant silvarum loca herbosa nec nimis occulta, quibus aliquam certe diei partem solibus sunt expositae.

Quod adinet ad parvae hujus plantarum familiae utilitatem non possit dubitari, quin species multis antheridiis praeditae queant adhiberi ad colligendum pulverem illum singularem et combustibilem, qui medicis nominatur Pulvis seminum Lycopodii; neque vero de usu pulveris illius ad medendum apti hucusque cogitatum est, quod sub coelo calidiori infantes saucii et facilius et melius sanantur aqua frigida, quam pulvere illo Lycopodii inspergendo. Neque ad emeticam *Lycopodiorum* vim deducuntur Brasiliae incolae, quae terra magnam optimorum et efficacissimorum emeticorum possideat multitudinem. Quodsi indigenae, de quo jam supra diximus, decocto *Selaginellae convolutae* potentiam virilem arbitrantur redintegrari, id inde videtur declarandum, quod planta tempestate madida expanditur, veluti rosa Jerichus, sicca autem contrahitur in glomum; ob quam virtutem hygroskopicam haec planta non minus possit haberi pro hygrometro quam apud nostrates fructus *Geranii* aut apud Lusitanos aristae *Stipae arenariae* *).

MARTIUS.

*) De hygrometro cum aristis *Stipae arenariae* Brot. instituendo egit A. J. das Neves Mello in tractatu proprio, Rio de Jan. 1811. 8.

**OPHIOGLOSSEAE,
MARATTIACEAE, OSMUNDACEAE,
SCHIZAEACEAE, GLEICHENIACEAE
ET
HYMENOPHYLLEAE.**

EXPOSIT

**DR. JOANNES GUILIELMUS STURM,
NORIMBERGENSIS.**

OPHIOGLOSSAE.

OPHIOGLOSSAE *Rob. Brown Prodr. Flor. Nov. Holl. 163. Kaulfuss Wesen d. Farrenkr. 27. Endl. Gen. Plant. 65 et Suppl. I. 1352. Meisner Gen. Plant. 435. (337.) Mettenius Fil. hort. bot. Lipsiens. 119. — STACHYOPTERIDES Willd. Spec. Plant. V. XXXV. — OPHIOGLOSSACEAE Lindley Natur. Syst. of Botany ed. 2. 402. Presl Suppl. Tent. Pterid. 41.*

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPOROCARPICAE, FRONDIBUS VERNATIONE STRICTIS VEL INCLINATIS, IN SEGMENTO ANTICO SPORANGIA GERENTIBUS. SPORANGIA FIRMA, EXANNULATA, RIMA LONGITUDINALI DEHISCENTIA VEL BIVALVIA. SPORAE GLOBOSAE.

SPORANGIA coriacea, sessilia, globosa, exannulata, aut libera (BOTRYCHIUM), aut glomerata (HELMINTHOSTACHYS), aut biserialia, inter se connata (OPHIOGLOSSUM), unilocularia, vel septo transverso incompleto subbilocularia, rima longitudinali extrorsa dehiscentia vel bivalvia. SPORAE globosae vel tetraëdrae. INDUSIUM nullum.

RHIZOMA subglobosum v. oblongum; rudimentis plantulae futurae in tertium usque annum praecocibus instructum. *STIPES* teres, supra planus, aut fasciculum vasorum unicum, centralem, teretem, magnum, aut fasciculos plures, tenuissimos, in circulum simplicem dispositos includens. *FRONDES* vernatione strictae vel inclinatae in segmenta bina partitae; *SEGMENTUM* posticum sterile, aut in laminam simplicem, aut pinnatisectam ima tripinnatisectam expansum; *SEGMENTUM* anticum fertile in paniculam vel spicam pedunculatam contractum; vel frondes ad basin laminae segmenti sterilis et ad apicem stipitis spicas plurimas gerentes. *NERVUS PRIMARIUS* saepe nullus, raro excurrentis. *NERVI SECUNDARI* segmentorum sterilium aut pinnati- vel flabellato-dichotomi, apice liberi desinentes, aut flabellati, ramosissimi, in areolas hexagonas conjuncti et intra areolas reticulato-venosi.

Spicis ebracteatis a LYCOPODIACEIS, sporangiis simplicissimis, exannulatis a reliquis ordinibus Filicum satis distinctae. Plantae hujus ordinis a regionibus tropicis ad circulos polares usque totius orbis obviae.

ADNOTATIO. Segmentum frondis fertilis generis BOTRYCHII in paniculam ramosissimam, disticham, OPHIOGLOSSI in spicam compressam disticham, in utrisque generibus sporangia biserialia gerentem, HELMINTHOSTACHYDIS in paniculam spicaeformem, sporangia glomerata, subsessilia gerentem mutatum.

I. OPHIOGLOSSUM LINN.

OPHIOGLOSSUM Linn. Gen. Plant. n. 1171. (excl. sp.). Kaulf. in Flora od. bot. Zeit. 1822. I. 97. ss. Endl. Gen. Plant. 66. n. 671. Hook. Gen. Fil. tab. 59. B. Meisner Gen. Plant. 435. (337.) Presl Suppl. Tent. Pterid. 48. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 120. — OPHIODERMA Blume Enum. Plant. Jav. II. 259. Endl. l. c. 66. n. 672. Meisner l. c. Presl l. c. 55. — RHIZOGLOSSUM ET CHEIROGLOSSA Presl l. c. 47 et 56.

SPORANGIA coriacea, sessilia, globosa, exannulata, horizontalia, laevissima, biserialia, cum margine rhacheos et inter se connata, unilocularia vel incomplete bilocularia, in valvas duas aequales transversim dehiscencia, effoeta hiantia. SPORAE globosae, striis tribus notatae, pellucidae, albo-flavescentes.

RHIZOMA subglobosum, nodosum vel tuberosum, RADICULIS cylindricis, simplicibus, subinde in stolones mutatis praeditum. STIPES teres, basi VAGINA laxa involucreta. FASCICULI vasorum in stipite 5—7, teretes, tenuissimi, in circulum simplicem dispositi. FRONDES in segmenta bina partitae, segmento postico sterili expanso; antico fertili contracto. LAMINA SEGMENTI STERILIS plerumque indivisa, ovata vel lanceolata, aut linearis, apicem versus dichotomo-divisa, aut palmato-partita, subcarnosa vel membranacea, segmentum fertile saepe amplectens. NERVUS PRIMARIUS plerumque nullus. NERVI SECUNDARIJ flabellati, rarius pinnati, ramosissimi, in areolas hexagonas, appendiculatas conjuncti. SEGMENTA FERTILIA indivisa, aut solitaria, aut plura, aut a segmento sterili usque ad insertionem in rhizomate distincta, aut e basi aut e medio laminae segmenti sterili orta, SPICAM longe pedunculatam, disticham, linearem, compressam mucronatamque exhibentia.

Stirpes hujus generis pleraeque terrestres, duae tantum pseudo-parasiticae pendulaeque, per totum orbem distributae.

ADNOTATIO. Secundum circumscriptionem laminae segmenti sterili, numerum insertionemque segmentorum fertilium a nonnullis auctoribus quatuor genera distinguuntur. 1. RHIZOGLOSSUM Presl: segmentum fertile a segmento sterili linearis, angustissimo usque ad insertionem in rhizomate distinctum; 2. OPHIOGLOSSUM L.: segmentum fertile e basi laminae segmenti sterili ovalis, integri ortum; 3. OPHIODERMA Endl.: segmentum fertile e media lamina segmenti sterili linearis superne divisi ortum; 4. CHEIROGLOSSA Presl: segmenta fertilia bina aut plura e margine laminae segmenti sterili palmato-partita orta.

SECTIO 1. EUOPHIOGLOSSUM.

Spica e basi laminae segmenti sterili oriens.

1. OPHIOGLOSSUM RETICULATUM LINN. lamina segmenti sterili late cordata vel reniformi-cordata, apiculata, basi cuneata in stipitem decurrente, vaginante; nervo primario nullo; nervis secundariis flabellatis, in areolas hexagonas conjunctis, et intra areolas reticulato-venosis; spica perlonge pedunculata, lineari, compressa, disticha, apice mucronulata; sporangiis in quovis latere 25—50; stipite erecto, tereti, superne incrassato; rhizomate quotannis frondem singulam evolvente, cylindrico,

elongato, praemorso, descendente radicle longis robustisque praedito.

Ophioglossum reticulatum Linn. Sp. Pl. 1518. Swartz Syn. Fil. 170. Willd. Sp. Pl. V. 60. Hook. et Grev. Icon. Fil. tab. 20. Vellozo Flor. Flum. XI. tab. 52. — Blume Enum. Pl. Jav. II. 259. Presl Tent. Pterid. 52. Ejusd. die Gefässbünd. im Stip. d. Farrn tab. 2. fig. 10. Kunze in bot. Zeit. 1846. 417. et 1848. 100. Plum. Fil. tab. 164. Brackenridge Unit. Stat. Exploring Expedition XVI. 315.

Ophioglossum cordifolium Roxb. ex Wallich Cat. n. 47.

Ophioglossum ovatum Bory de St. Vincent Voyage II. 206. — Swartz l. c. 169. — Willd. l. c. V. 58.

Ophioglossum sarcophyllum Desv. Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 193.

Species spectabilis. RHIZOMA 2—3 poll. longum. STIPES crassitie culmi secalini, 4—6-pollicaris. LAMINA segmenti sterili $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. longa, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. lata, coriacea. SPICA angustissima 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longa, pedunculo 4—8-pollicari vix crassior. — Specimina americana teste Kunze (bot. Zeit. l. c.) semper humiliora et debiliora sunt, quam illa ex insulis Java, Philipp. et ex Africa australi.

Habitat in provincia Sebastianopolitanae: Vellozo; in paludosis sub radicibus Serra d'Estrella (teste Brackenridge); prope Panuré ad Rio Uaupés: Spruce n. 2898; — in Guiana batava: Kegel n. 430; in Venezuela prope Caracas: Moritz n. 7; in Guatemala: Friedrichsdal; in Mexico: Schiede et Deppé, Galeotti n. 6601; in insula St. Domingo: Plumier; in Jamaica: Swartz; in Promontorio b. spei, ad Port Natal: Krauss; in Nova Zeelandia: A. Cunningham; in Java: Jungbluth, Blume, Zollinger; in insul. Philippin.: Cumming n. 284; in insul. Mascarenis: Commerson, Sieber (Syn. Fil. n. 19 et fl. mixta n. 284); in Bengalía: Wallich.

2. OPHIOGLOSSUM NUDICAULE LINN. FIL. lamina segmenti sterili elliptica vel ovali, basin versus subito angustata, in stipitem decurrente, vaginante, apice acutiuscula; nervo primario basi lato, apicem versus evanescente; nervis secundariis in areolas late hexagonas conjunctis, et intra areolas reticulato-venosis; spica perlonge pedunculata, lineari, compressa, disticha, apice mucronulata; sporangiis in quovis latere ad 30 usque; stipite tenui, tereti, superne parum incrassato; rhizomate quotannis frondes 2—3 evolvente, demum elongato, praemorso, radicle subverticillatis robustis praedito.

Ophioglossum nudicaule Linn. fl. Suppl. 443. — Swartz Syn. Fil. 169 et 397. tab. IV. fig. 2. Willd. Sp. Pl. V. 59. Kunze Farrnkr. I. 59. tab. 29. fig. 3. Presl Suppl. Tent. Pterid. 54.

Ophioglossum lusitanicum Thunb. Prodr. Fl. Cap. 171. (excl. syn.)

Ophioglossum capense Schlechtend. Adumbrat. Pl. I. 9. tab. 1. fig. 2.

Ophioglossum ellipticum Hook. et Grev. Icon. Fil. I. tab. 40.

Ophioglossum ypanemense Martius Icon. Pl. Crypt. Brasil. 39 et 130. tab. 73. fig. 1.

Ophioglossum surinamense Reichb. in Weigelt Pl. Surinam. exsicc.

Ophioglossum flavicaule Klotzsch in Herb. Reg. Berol.

STIPES $\frac{1}{2}$ —2 poll. longus, diametrum vix 1 lin. attingens. LAMINA segmenti sterili $\frac{1}{2}$ —2 poll. longa, 3—9 lin. lata, tenuis, submembranacea. SPICA 5—17 lin. longa, vix 1 lin. lata, pedunculo 9—33-lineari suffulta. — Planta valde variabilis est. Specimina e Demerara secundum iconem cel. Hookeri et Grevillei $6\frac{1}{2}$ -pollicaria sunt, dum specimina Brasiliensia $3\frac{1}{2}$ poll. tantum attingunt et frondem subbasilarem gerunt. Plantae Surinamenses, medium inter utraque tenentes, sicut specimina e Demerara frondem longe stipitatum habent.

Species late obvia et excepto Ophioglosso reticulato inter congeneres maximam extensionem geographicam praebet.

Habitat in Brasilia absque indicatione loci natalis: Sellow; in pascuis camporum ad Ypanema, prov. S. Pauli, altitudine supra Oceanum circiter 1700 ped.: M.; in Piahy: Gardner n. 2991; in pascuis graminosis subaridis ad Ega, regionis fluvii Amazonum: Poeppig; — in Guiana gallica: Leprieur; in Guiana batava: Weigelt, Splitgerber, Kegel n. 429, Hostmann n. 521; in Guiana anglica ad Demerara: Parker; in America boreal. ad flumen Savannah Georgiae: Beyrich; in Promontorio b. sp.: Thunberg; in Karroo ad Olifantsriver: Mund et Maire; in Arabia: Schimper (Herb. Arab. Un. itin. n. 984).

3. OPHIOGLOSSUM MACRORRHIZUM KUNZE lamina segmenti sterilis minima, ovato-lanceolata, acuta, in stipitem decurrente; nervo primario excurrente, inferne subtusque distinctiore; nervis secundariis anastomosantibus, inconspicuis; spica longe pedunculata, elliptica, compressa, disticha, margine subcrenulata vel sinuosa, sporangia excedente, apice mucronata; pedunculo demum cernuo vel nutante; sporangiis in quovis latere plerumque sex; stipite erecto, tereti; rhizomate quotannis frondes 2—3 evolvente, minimo, tuberoso, radice longis, plantam subaequantibus praedito.

Ophioglossum macrorrhizum Kunze *Analecta Pteridogr.* 2. *Ejusd. Farrnkr.* I. 57. tab. 29. fig. 1. *Presl Suppl. Tent. Pterid.* 54.

Ophioglossum pusillum Leprieur *Mss.* (nec Rafn. et Nutt.)

Species huius generis minima, vix sesquipollicaris. RADICULAE rhizomatis ad $1\frac{1}{2}$ poll. usque longae. STIPES circiter 6 lin. longus. LAMINA segmenti sterilis ad 3 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, coriacea, laete viridis. SPICA $1\frac{1}{2}$ lin. longa, pedunculo 4-lineari, gracili suffulta.

Planta rarissima. Habitat prope Novo Friburgo: Beyrich; prope San Gabriel da Cachoira, ad Rio Negro: R. Spruce n. 2041; — in Guiana gallica: Leprieur.

SECTIO 2. CHEIROGLOSSA.

Spicae binae aut plures e margine ad basin laminae segmenti sterilis et e summo stipite oriundae.

4. OPHIOGLOSSUM PALMATUM PLUM. lamina segmenti sterilis palmato-partita, basi cuneiformi; nervo primario nullo; nervis secundariis flabellatis, in areolas elongato-hexagonas

conjunctis et intra areolas tenuius reticulato-venosis; spicis pluribus, patentibus pendulisve, pedunculatis, linearibus, compressis, distichis, obtusis, apiculatis; sporangiis in quovis latere circiter 30; stipite inferne tereti, nervis e lamina decurrentibus longitudinaliter striato; rhizomate subgloboso, repente, radice longis praedito.

Tabula nostra IX.

Ophioglossum palmatum Plum. *Fil. Amer.* 139. tab. 163. *Limn. Sp. Pl.* 1518. *Swartz Syn. Fil.* 170. *Willd. Sp. Pl.* V. 61. *Turpin in Dict. des sc. nat. Acotyl.* tab. 97. *Hook. Icon. Pl. I.* tab. 4. *Kunze in Linnaea IX* (1834). 4. *Klotzsch in Linnaea XVIII* (1844). 529. *Martens et Galeotti Syn. Fil. Mexican.* 14.

Cheiroglossa palmata Presl *Suppl. Tent. Pterid.* 57. (excl. syn. *Ramondia palmata* Mirb.). *Ejusd. die Gefässbündel im Stipes d. Farrn.* 16. tab. 2. fig. 12. *Klotzsch in Linnaea XX* (1847). 437.

Cassiopteris gen. nov. *Karsten Mss.*

Herba pseudo-parasitica pendula. RHIZOMA stipitem basi usque incrassatis et pilis albidis, linearibus, articulatis dense obtectum. STIPES 7—11 poll. longus, diametrum 2 lin. attingens. LAMINA segmenti sterilis 6—9 poll. longa, superne 7—9 poll. lata, laciniis 4—6 oblongo-lanceolatis, integerrimis, subaequalibus, sinibus rotundatis, statu exsiccato membranacea, flaccida, semipellucida, glaberrima, intense (subtus pallidius) viridis. SPICAE marginales 10—19 lin. longae, 1—2 lin. latae, pedunculo 1—3-lineari insidentes, altero latere 3—6, altero latere 2—4. SPORANGIA subglobosa, coriacea, pallide fusca, lateraliter transverse bivalvia, primum poro rotundo dehiscentia, eoque versus maturationem ampliata, semiaperta, effoeta in valvas duas annulares, aequales, margine revolutas, ad rhachim usque aperta.

In sylvicis, locis humidis umbrosis ex arboribus radicibusve dependens, prope Rio de Janeiro: Tweedie n. 519; super Serra dos Orgãos: Sellow, Beyrich; — in truncis emortuis ad coloniam Tocari Venezuelae: Moritz n. 156, Karsten Coll. II. n. 22; in arboribus montium ad Cucheros Peruviae: Poeppig; in Mexico ad Chinantla prope Petlapa, altitud. 3000 ped.: Galeotti n. 6603; in insula St. Domingo, prope Leogana: Plumier.

MARATTIACEAE.

MARATTIACEAE *Kaulf. Enum. Fil. 31 et Wesen der Farrenkr. 32. Endl. Gen. Plant. 65 et Suppl. I. 1351. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Suppl. Tent. Pterid. 7. De Vriese Monogr. d. Maratt. 1. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 117.* — FILICES SPURIE AGYRATAE *Swartz Syn. Fil. 7 (ex parte).* — *Poropterides Willd. Spec. Plant. V. XXXXVI.* — DANAEACEAE *Agardh Aphorism. 117. Lindley Veg. Kingd. ed. II. 402. Presl l. c. 33.* — MESODMEAE *Blume Enum. Plant. Javae II. 260.*

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPORANGIOPHORAE, FRONDIBUS VERNATIONE CIRCINATIS. SPORANGIA EXANNULATA, AUT LIBERA AUT CONNATA, SORUM PLURILOCULAREM FORMANTIA, AUT RIMA LONGITUDINALI INTROSA AUT PORO APICALI DEHISCENTIA. SPORAE GLOBOSAE VEL OBLONGAE, STRIIS 1—3 NOTATAE.

SORI (SYNANGIA Auct. nonnullor.) superficiales, raro immersi, sessiles vel pedicellati, dorso nervorum secundariorum insidentes; aut oblongi, thecaeformes longitudinaliter bilobi, utrinque e sporangiis 6—12 connatis (MARATTIA); aut orbiculares, concavo-hemisphaerici, e sporangiis 10—12 in orbem concretis facti (KAULFUSSIA); aut lineares, semiteretes, carnosii, e sporangiis 30—200 connatis structi (DANAEA); aut denique oblongi, e sporangiis 5—15 liberis, obovatis, biseriatis compositi (ANGIOPTERIS). SPORANGIA sessilia, exannulata, rima longitudinali introrsa, aut apice poro orbiculari dehiscencia. INDUSIUM nullum. SORI interdum paleis piliformibus indusii instar circumdati, aut immersi substantia laminae cincti. SPORAE globosae vel oblongae, striis 1—3 notatae, hyalinae.

RHIZOMA obliquum, repens vel adscendens, squamis (PROTOPHYLLIS) magnis basin stipitis includens. STIPES elongatus, aut enodis, aut nodosus, aut articulatus, teres, saepe supra canaliculatus, nunc fasciculum vasorum unicum semilunarem, nunc fasciculos 4—32 in circulos periphericos dispositos, tenues, teretes includens. FRONDES vernatione circinatae; LAMINA aut indivisa, aut ternato-quinata, aut bitripinnata, PINNIS oppositis alternisve, fere omnibus circumscriptione lanceolatis. RHACHIS supra canaliculata, interdum superne alata, ad ortum pinnarum nodoso-incrassata. NERVUS PRIMARIUS medianus percurrentes. NERVI SECUNDARIJ creberrimi, raro simplices, plerumque 1—3-furcati, apice liberi, rarissime anastomosantes.

Ab OPHIOGLOSSEIS pinnis fertilibus non contractis, ab OSMUNDACEIS sporangiis exannulatis pinnulisque fertilibus non contractis distinctissimae. Filices hujus ordinis interdum arborescentes, in regionibus tropicis et extratropicis Africae, Asiae, Oceaniae, Australiae, Americae insularumque Antillarum habitantes.

GENERA BRASILIENSIA.

- I. Sori superficiales, thecaeformes, longitudinaliter bilobi; lobi 6—12-loculares; loculi rima longitudinali introrsa dehiscentes MARATTIA.
- II. Sori immersi, lineares semiteretes, multiloculares; loculi poro apicali dehiscentes DANAEA.

I. MARATTIA SMITH.

MARATTIA Smith Icon. inedit. tab. 47. Schott. Gen. Fil. III. tab. 5. Endl. Gen. Plant. 66. n. 670. Hook. Gen. Fil. tab. 26. Meisner Gen. Plant. 435. (337.) Presl Suppl. Tent. Pterid. 8. De Vriese Monogr. des Maratt. 3. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 118. — GYMNOTHECA Presl l. c. 12. De Vriese l. c. 8. — EUPODIUM J. Smith in Hook. Journ. of Botany IV. 190. Hook. Gen. Fil. tab. 118. Presl l. c. 16. De Vriese l. c. 12. — STIBASIA et DICOSTEGIA Presl l. c. 11 et 15. De Vriese l. c. 7 et 11.

SORI in latere inferiore pinnularum nunc supra medium, nunc infra marginem uniseriatim dispositi, dorso nervorum secundariorum affixi, superficiales, sessiles, raro pedicellati; thecaeformes, longitudinaliter bilobi, lobi demum patentissimi, utrinque e sporangiis 6—12 connatis structi. SPORANGIA sessilia, biseriata, acumventia, exannulata, rima longitudinali introrsa dehiscencia. RECEPTACULUM lineare, oblongum vel subrotundo-ellipticum, nudum vel basi paleis, nunc laxis nunc confertis, cinctum. SPORAE oblongae vel rotundae, striis 1—3 signatae, tuberculato-asperae, hyalinae.

RHIZOMA oblique ascendens, caudiciforme, semi-exsertum, angulatum, SQUAMIS (PROTOPHYLLIS) magnis, semiorbicularibus, coriaceis, basin stipitem involucentibus oblectum, deorsum agens radicales brunneas, ubique fibris tenuissimis obsitas. STIPES crassus, fere teres, pedalis et ultra. RHACHIS PRIMARIA saepe pluripedalis, inferne teretiuscula, supra bicanaliculata, subtus convexa, ad ortum pinnularum incrassata, paleacea. FASCICULUS vasorum in rhachi primaria semilunaris, aut simplex, tenuis, interdum cruribus inflexis, aut parvis fasciculis teretibus, 4—18 in circulos periphericos exteriores interioresque dispositis circumdatus. RHACHES SECUNDARIAE ad ortum pinnularum incrassatae densiusque paleaceae, pariter ac primariae supra canaliculatae, superne alatae. RHACHES TERTIARIAE a basi interrupte alatae. LAMINA frondis aut bipinnata aut tripinnatisecta; PINNAE sicut SEGMENTA oppositae vel alternae. PINNULAE coriaceae, cum rhachi articulatae, simplices oblongo-lanceolatae vel lineares plus minusve argute serratae; SEGMENTULA ovato-oblonga, inciso-dentata, apice segmentorum confluentia. NERVUS PRIMARIUS medianus, percurrentes, supra planus, subtus convexus, elevatus, paleis adpersus. NERVI SECUNDARIJ patuli, supra immersi, subtus parum elevati, raro simplices, plerumque 1—3-furcati, liberi, in serraturis marginis excurrentes, fere in omnibus speciebus pellucidi.

FILICES in regionibus intratropicis Asiae, Oceaniae et Americae, paucae tantum in Oceania et Africa extratropica provenientes.

ANOTATIO. Beatus Presl genera: DICOSTEGIAM, GYMNOTHECAM, STIBASIAM EUPODIUMQUE a MARATTIA segregavit, quorum discrimen in praesentia aut absentia indusii, extensione receptaculi et soris sessilibus aut pedicellatis positum est, quae genera autem delenda esse disquisitiones cl. Mettenii probant.

SECT. 1. Lamina frondis bipinnata. Sori sessiles. Sp. 1—6.

§. 1. Rhaches secundariae apicem versus alternatim alatae. Sp. 1—4.

1. MARATTIA RADDIANA Schott lamina frondis bipinnata, pinnis lanceolatis; pinnulis oblongo-linearibus, apice angustatis, longe acuminatis, basi inaequalibus superiore truncatis inferiore cordatis, subaequaliter patentemque argute serratis; nervis secundariis pinnularum superiorum furcatis; soris sessilibus, oblongis, extus laevibus; rhachibus secundariis superne flexuosis, apicem versus alternatim late alatis.

Marattia Raddiana Schott Gen. Fil. fasc. III. tab. 5.

Marattia Raddi Desv. Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. (1827.) 207.

Marattia fraxinea Raddi Fil. Brasil. 74. tab. 82. (excl. syn.)

Marattia cicutaefolia Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. tab. 70. (pinnularum juga duo media).

Gymnotheca Raddiana Presl Suppl. Tent. Pterid. 13. Ejusd. Die Gefässbündel im Stipes der Farnn 13. tab. 1. fig. 8. De Vriese Monogr. des Maratt. 9.

STIPES erectus, glaber (Raddi l. c.). RHACHIS PRIMARIA SECUNDARIAEQUE supra planiusculae bicanaliculatae, subtus convexae, dilute rufescentes, paleis hinc illinc obsitae. LAMINA frondis bipedalis et ultra. PINNAE 15—16 poll. longae. PINNULAE infimae ad 2 poll., superiores ad 5 poll., summae ad 3 poll. longae, omnes circiter 8 lin. latae, in quovis latere 15—19, interstitiis aequidistantibus 9—10-linearibus remotae, alternae, patentissimae v. patulae, inferiores sessiles, superiores breviter petiolatae, margine non profunde, sed argute serratae, serraturis (in medio pinnularum) sinu obtuso disjunctis, coriaceae, supra intense, subtus pallidius virides, utrinque nitentes, bombycinae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus, subius vix elevatus, fuscus. NERVI SECUNDARIJ ad basin circiter 2 lineas remoti, patuli, furcati, nunquam bifurcati, apice leviter prorsum curvati, pellucidi, subtus sparse, in axillis dense paleacei. SORI 1 lin. longi, dorsales, supra medium nervorum secundariorum receptaculo lineari-elliptico, paleaceo affixi, thecaeformes, oblongi, saturate cinnamomei, supra longitudinaliter profunde bilobi, lobis supra planis subconvexis, utrinque rimis 6—11 lineari-ellipticis dehiscencia. PALEAE axillarum anguste lanceolatae, in acumen longum, subulatum, genuflexum, dentatum productae, e cellulis laxis, irregularibus, amplis, oblongis, flexuosis, fusciculis, nonnullis intense fuscis intermixtis constructae, ad marginem in dentes runcinatos, incurvos vel decurvos, spinaeformes, longos, flaccidos lobatos fissae.

Species haec pinnulis utrinque nitore bombycino inter omnes florum nostrae congeneres insignis.

Habitat in sylvis aboriginibus montis Corcovado, ad Angra dos Reys, Aqua de Serra, prope Rio de Janeiro: Raddi, Pohl n. 3863, Schott, Gardner (Pl. Bras. exs. n. 86).

2. MARATTIA POLYODON PRESL (sub GYMNOTHECA) lamina frondis bipinnata; pinnis oblongo-lanceolatis; pinnulis oblongo-lanceolatis, acuminatis, basi inaequalibus superiore subtruncatis inferiore cordatis, inaequaliter dense incumbentem serratis; nervis secundariis pinnularum superiorum bifurcatis; soris sessilibus oblongis, extus laevibus; rhachibus secundariis superne flexuosis, apicem versus alternatim late alatis.

Gymnotheca polyodon Presl Suppl. Tent. Pterid. 14. De Vriese Monogr. des Maratt. 9.

Marattia cicutaefolia Martius Icon. Pl. Crypt. Brasil. tab. 70. (pinnularum juga tria infima).

Neque STIPITEM, neque RHACHIAM PRIMARIAM vidi. RHACHES SECUNDARIAE ad 13 poll. longae, diametrum 1—1 1/4 lin. attingentes, supra planiusculae,

bicanaliculatae, subtus convexae, pallide rufescentes sparseque paleaceae. PINNAE alternae, patulae. PINNULAE in quovis latere 13—16, inferiores 2 poll., mediae 3 poll., summae 5 poll. longae, 6—9 lin. latae, interstitiis aequidistantibus 8-linearibus remotae, alternae, nonnunquam oppositae, patulae, inferiores sessiles, superiores brevissime petiolatae, margine serratae, serraturis acutissimis, sinu angustissimo disjunctis, supra saturate virides, nitentes, subtus pallidiores, opacae. NERVUS PRIMARIUS utrinque elevatus, fuscus, supra non sulcatus. NERVI SECUNDARIJ patuli, furcati, raro bifurcati, leviter prorsum curvati, parum pellucidi, ad basin $1\frac{1}{4}$ lineam distantes. SORI dorsales, supra medium nervorum secundariorum receptaculo lineari, paleis cincto affixi, thecaeformes, rotundati, extus laeves, obscure cinnamomei, intus vix pallidiores, longitudinaliter profunde bilobi, lobis patentissimis, utroque rimis 6—8, linearibus dehiscentibus. PALMAE axillarum anguste lanceolatae, in acumen longum, oblique truncatum, flexuosum, obtuse dentatum productae, e cellulis laxis irregularibus, amplis, oblongis, flexuosis, elongatis, fuscidulis, nonnullis intensius coloratis intermixtis constructae, ad marginem in dentes runcinatos, incurvos vel decurvos, spinaeformes, longos lobatos fissae.

Habitat in sylvis aboriginibus ad Rio de Janeiro: M.

3. *MARATTIA OBTUSIDENS* PRESL (sub *GYMNOTHECA*) lamina frondis bipinnata; pinnis oblongis; pinnulis linearibus, apice angustatis longeque acuminatis, basi subaequalibus rotundatis, subcordatis, subaequaliter grosse obtuse dentatis; nervis secundariis plerumque simplicibus, nunquam bifurcatis, remotis; soris sessilibus ellipticis; rhachibus secundariis apicem versus alternatim angustissime alatis.

Gymnotheca obtusidens Presl Suppl. Tent. Pterid. 15. De Vriese Monogr. des Maratt. 9.

Marattia cicutaefolia Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. tab. 70. (figurae duae supremae apicem pinnae exhibentes).

STIPES ET RHACHIS PRIMARIA mihi ignota. RHACHES SECUNDARIAE pedales, diametrum in basi incrassata 3 lin., medio $1\frac{1}{2}$ lin. attingentes, supra planiusculae, bicanaliculatae, subtus convexae, rufescentes, sparsim paleaceae. PINNULAE in quovis latere 10—13, omnes fere aequilongae, ad 4 poll. longae, 7—8 lin. latae, inferiores interstitiis 11-linearibus, summae 8-linearibus remotae, oppositae, patentissimae, superiores alternae, patulae, brevissime petiolatae, marginis dentibus grossis, sinu obtuso disjunctis, dense coriaceae, supra obscure virides, subtus pallidiores, paleisque ferrugineis sparsim, in axillis dense obsessae. NERVUS PRIMARIUS utrinque elevatus, brunneus, supra sulcatus. NERVI SECUNDARIJ patuli, in pinnularum inferiorum parte postica furcati, in parte antica, sicut in pinnulis superioribus, simplices, remotissimi. SORI dorsales, supra medium nervorum receptaculo elliptico, paleis cincto, affixi, thecaeformes, oblongi, bilobi, lobo utroque rimis . . . dehiscente. (Ob immaturitatem in specimenibus duobus Herb. Reg. Monacensis accuratius describi non possunt.) PALMAE axillarum perangustae, in acumen longum, genuflexum, grosse obtuse dentatum productae, e cellulis densioribus, longioribus, irregularibus, angustioribus, serpentine flexuosis, fuscidulis, paucis intensius coloratis intermixtis constructae, ad marginem hinc illinc in dentes breves, simplices, rarius lobatos fissae.

A reliquis speciebus hujus generis omnino differt: pinnulis grosse obtuseque dentatis, nervis secundariis remotissimis, plerisque simplicibus.

Habitat in sylvis aboriginibus ad Rio de Janeiro: M.

4. *MARATTIA PODOLEPIS* DE VRIESE (sub *GYMNOTHECA*) lamina frondis bipinnata, pinnis lineari-lanceolatis; pinnulis lanceolatis, acutis, basi superiore oblique cuneatis, inferiore subcordatis, aequaliter arguteque serratis; nervis secundariis furcatis vel bifurcatis; soris sessilibus, brevibus, extus sulcatis; rhachibus secundariis apicem versus alternatim angustissime alatis.

Gymnotheca podolepis de Vriese, Monogr. des Maratt. 10.

Secundum cl. de Vriese adsunt duo specimina in herbario Hookeri. Alterum sterile est, alterum fertile. Sterile dignoscitur foliatura latiore, fertile vero angustiore.

FRONS sterilis, sic se habet. RHACHIS PRIMARIA ad insertionem pinnarum tumida. PINNAE fere 8 poll. longae, 4 poll. latae, suboppositae v. alternae, petiolatae, patentissimae. PINNULAE nonnullae alternae, plures tamen oppositae, brevissime petiolatae, ad insertionem petiolorum dense fusco-paleaceae, ovatae, oblongae, acutae, summae et apicales acuminatae, basi inferiore rotundatae, superiore oblique cuneatae, inferiores breviores et latiores, superiores longiores et acuminatae; inter 16—33 lin. longae, inter 7—9 lin. latae, supra virides, subtus pallidae; margine serratae, serratura dentibus brevibus, eorumque intervallis subsinuatis, apicem versus acutius serratae. NERVUS PRIMARIUS fuscus, planus. NERVI SECUNDARIJ pellucidi, unifurcati, in pinnula extrema furcati, altero crure bifurcati.

In specimine fertili RHACHIS PRIMARIA teres, pinnae anserinae crassitie, fusca. PINNAE lineari-lanceolatae, $11\frac{1}{4}$ poll. longae, $3\frac{3}{4}$ poll. latae. PINNULAE fere $2\frac{1}{4}$ poll. longae, 5 linn. latae, margine argute serratae, basi paleaceae. NERVI SECUNDARIJ obliqui, paleacei, in infimis pinnulis simplices, in aliis simplices vel furcati. SORI breves, supra compressi, ad basin suburceolati, extus sulcati, lobi 4—5 rimosi, ad tertiam fere lateris pinnulae distantiam margine remoti, haud indusati. — Non vidi.

Habitat ad Rio de Janeiro: J. D. Hooker.

§. 2. Rhaches secundariae apicem versus utrinque anguste alatae.

5. *MARATTIA CICUTAEOFOLIA* KAULF. lamina frondis bipinnata; pinnis oblongis; pinnulis laete viridibus, subsessilibus, lanceolatis, acuminatis, basi inaequalibus superiore brevior truncatis inferiore rotundatis s. cordatis, subaequaliter acute patentereque, saepe callososerratis, aut interdum pinnulis breviter petiolatis, elongato-oblongis, inciso-serratis, incisuris obtusis, basi nonnunquam pinnatipartitis; nervo primario supra flavescente, subtus cum nervis secundariis 1—4 furcatis pallide viridi; soris sessilibus, oblongis, extus sulcatis; rhachibus secundariis superne flexuosis, apicem versus utrinque anguste alatis.

Marattia cicutaefolia Kaulf. Enum. Fil. 32. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 119. tab. 69. 71 et 72. (excl. syn. Raddei). Metten. Fil. hort. bot. Lipsiensis 118. (excl. syn. Raddei). Brachenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 312. (excl. syn. Raddei).

Marattia excelsa Beyrich Hb. (in Hb. Reg. gen. Berol.).

Gymnotheca cicutaefolia Presl Suppl. Tent. Pterid. 13. Ejusd. Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 13. tab. 1. fig. 7. De Vriese Monogr. des Maratt. 9.

RHIZOMA obliquum, ascendens, subcylindricum, angulatum, pollicis crassitie. STIPES 1 ped. et quod excedit longus, diametrum (ad basin) 1 poll. attingens, teres, basi protophyllis magnis, semiorbicularibus, coriaceis vaginatus, paleis fuscis obsitus. RHACHIS PRIMARIA SECUNDARIAEQVE supra planiusculae, bicanaliculatae, subtus convexae, rufescentes, paleaceae. PINNAE suboppositae, patulae, petiolatae, oblongae, inferiores pedales et ultra, superiores sensim breviores. PINNULAE in quovis latere 10—13, suboppositae alternaeque, imae 2— $2\frac{1}{2}$ poll., superiores ad 5 poll. longae, ad 9 lin. latae, interstitiis 9—12-linearibus remotae, patentissimae patulae, breviter petiolatae, lanceolatae, acuminatae, densius coriaceae, supra saturate virides, subtus pallidiores, utrinque opacae. NERVUS PRIMARIUS utrinque elevatus, subtus olivaceus, paleaceus. NERVI SECUNDARIJ pellucidi, ad basin binas lineas distantes, subpatentissimi, simplices vel 1—4—furcati, recti, ramis arcuate ascendentibus, in apices serraturae excurrentibus. SORI dorsales $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longi, supra medium nervorum secundariorum receptaculo elliptico, paleis cincto, affixi, thecaeformes, oblongi, extus obscure cinnamomei, intus testacei, profunde longitudinaliter bilobi, lobo utroque rimis 6—12, lineari-ellipticis dehiscente. PALMAE axillarum anguste lanceolatae, acuminatae, lobato-dentatae, e cellulis irregularibus, laxis, amplis, brevibus, fuscidulis, intense fuscis intermixtis constructae, ad marginem in dentes runcinatos, incurvos vel decurvos breves productae.

Habitat in sylvis aboriginibus montanis, pror. Sebastianopolitanae passim, e. g. in Serra d'Estrella, Corcovado, locis umbrosis humidis ad torrentes etc.: Sellow, M.

6. *MARATTIA VERSCHAFFELTIANA* DE VRIESE (sub *GYMNOTHECA*) lamina frondis bipinnata; pinnis oblongis, rigidis; pinnulis incretibus, obscure viridibus, sessilibus, lanceolatis, acuminatis, summis brevissime petiolatis, longe acuminatis caudatisque, sinuatis, basi inaequalibus, superiore oblique truncatis, inferiore rotundatis, subduplicato-argute-serratis; nervo primario supra nigricante, subtus cum nervis secundariis furcatis, apicem versus pinnulae simplicibus, nigro; soris sessilibus, oblongis, extus sulcatis; rhachibus secundariis superne flexuosis, apicem versus utrinque anguste alatis.

Tabula nostra X.

Marattia nov. spec. St. Catharinae ins. Ambroise Verschauffelt in Catal. plant. 1851.

Gymnotheca Verschauffeltiana de Vriese in lit. ad Ambr. Verschauffelt d. 31. m. Oct. 1851. Catal. de la 95. exposition de la soc. roy. d'agriculture et de bot. de Gand. 1852. p. 36. De Vriese Monogr. des Maratt. 10.

Marattia excelsa Herb. Reg. gen. Berol.

Neque rhizoma neque rhachim primariam vidi. RHACHIS SECUNDARIAE circiter 15 poll. longae, basi 2 lin. crassae, supra planiusculae, bicanaliculatae, subtus convexae, sicut nervi paleis ferrugineis sparse obsitae. PINNULAE in quovis latere 18—21, inferiores $2\frac{1}{4}$ poll., summae $4\frac{1}{2}$ poll. longae, 6 lin. latae, inferiores interstitiis 11-, superiores 8-linearibus remotae, suboppositae vel inferiores alternae, patentissimae, superiores patulae, inferiores sensim acuminatae, summae longe acuminato-caudatae, margine serratae, serraturis acutissimis, rectis, sinu obtuso disjunctis, coriaceae, supra obscure virides, nitentes, subtus pallidiores, opacae. NERVUS PRIMARIUS utrinque elevatus. NERVI SECUNDARIJ remoti, patuli, subrecti, pellucidi. SORI dorsales $1-1\frac{1}{4}$ longi, supra medium nervorum receptaculo lineari-elliptico, paleis cincto affixi, thecaeformes, oblongi, extus castanei, intus pallide flavi, longitudinaliter profundissime bilobi, lobo utroque rimis 8, lineari-ellipticis dehiscente. PALEAE axillarum oblongae, in acumen grosse obtuse dentatum productae, e cellulis incrassatis elongatis irregularibus flexuosis fuscidulis, paucis intensius coloratis intermixtis constructae, ad marginem in dentes breves curvatos, simplices fissae.

Habitat in insula St. Catharina (teste de Vriese); ad Rio de Janeiro: Gaudichaud in Herb. Reg. gen. Berol.

SECT. 2. Lamina frondis tripinnatisecta. Sori pedicellati.

7. *MARATTIA KAULFUSSII* J. SMITH lamina frondis vasta, tri-quadrupinnatisecto-pinnatifida; segmentis primariis secundariisque oppositis, remotis, petiolatis, deltoideo-ovatis, acuminatis, acutissimis, subfalcatis; segmentis tertiariis oblongis, breviter acuminatis; segmentulis ovato-oblongis, inciso-obtuse-dentatis, summis in apicem pinnatifidum confluentibus; nervis secundariis simplicibus; soris manifeste pedicellatis, subglobosis; rhachi primaria secundariisque superne, tertiariis undique interrupte alatis.

Marattia Kaulfussii J. Smith in Hook. Gen. Fil. sub tab. 26 in nota (sed non figura). Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 118.

Marattia laevis Kaulf. Enum. Fil. 31. (excl. syn. omnib.)

Marattia alata Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 14. Ejusd. Fil. Brasil. 74. tab. 83. 84. (excl. omnib. syn.)

Eupodium Kaulfussii J. Smith in Hook. Journ. of Botany IV. 190. Ejusd. in Hook. Gen. Fil. tab. 118. Presl. Suppl. Tent.

Marattiac.

Pterid. 17. Ejusd. Die Gefässbündel im Stipes der Farn. 13. tab. 1. fig. 10. De Vriese Monogr. des Maratt. 12. Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 313.

STIPES erectus 3 ped. et quod excedit longus, brunneus, tricanaliculatus. RHACHIS PRIMARIA et SECUNDARIAE supra planiusculae, tricanaliculatae, subtus convexae, superne alatae, rufescentes; TERTIARIAE compressae, interrupte alatae, alis sub quoque segmentulo oblique truncatis, membranaceis, deorsum non decrescentibus, subtus cum stipe sparse paleaceae. LAMINA frondis 2—3-pedalis; SEGMENTA PRIMARIA bipedalia et ultra, SECUNDARIA ad 20 poll., TERTIARIA inferiora 2—3 poll. longa, superiora sensim breviora. SEGMENTA TERTIARIA alternata, sessilia, inferiora oblonga, breviter acuminata, pinnatisecta, superiora, uti segmenta secundaria superiora, lanceolata acuminata, falcata, inciso-pinnatifida. SEGMENTULA 4—12 lin. longa, 3—5 lin. lata, in quovis latere 7—10, binas lineas distantia, patula, sessilia, cum rhachi articulata, ovato-oblonga inciso-obtuse dentata, (aut in segmentis inferioribus oblonga, pinnatifida), omnia tenenter coriacea, discoloria, supra hic illic setulis subspinulosis obsita. NERVUS PRIMARIUS gracilis, utrinque elevatus; SECUNDARIJ simplices, in dentes marginis excurrentes, pellucidi. SORI $\frac{1}{2}$ lin. longi, dorso nervorum secundariorum supra medium affixi, thecaeformes, subglobosi, bilobi, lobo utroque rimis sex, lineari-ellipticis dehiscente. RECEPTACULUM nudum, subrotundum ellipticum. PALEAE rhachis anguste lanceolatae, in acumen longum, genuflexum, dentatum productae, e cellulis laxis irregularibus oblongis amplis flexuosis fuscidulis, nonnullis intensius coloratis intermixtis compositae, ad marginem hic illic in dentes breves fissae.

Habitat in umbrosis humidis sylvarum aboriginum montis Corcovado, ad Angra dos Reis et Agua de Serra prope Rio de Janeiro: Raddi, Pohl n. 3870, M., J. D. Hooker, Lyall; ad Rio Paquetaer, in Serra d'Estrella: Beyrich.

II. DANAEA SMITH.

DANAEA J. E. Smith in Act. Turin. V. 420. tab. 9. fig. 11. Endl. Gen. Plant. 65. n. 669. Hook. Gen. Fil. tab. 7. Meisner Gen. Plant. 435. (337.) Presl. Suppl. Tent. Pterid. 34. Mettenius Fil. hort. bot. Lipsiens. 119.

SORI latus laminae inferioris, basi ima apiceque extremo exceptis, occupantes, nervorum secundariorum dorso non incrassato tota longitudine adnati, lineares, semiteretes, paralleli, contigui, recti aut leviter curvati, carnosii, e sporangiis 30—200 connatis constructi, immersi aut substantia laminae, quasi indusium praebente sorosque disjuncte instructi. SPORANGIA sessilia, biseriata, erecta oblique-ovata, exannulata, ore contracta, apice postremo poro orbiculari aperta. RECEPTACULUM tenuissimum. SPORAE oblongae, stria singula, longitudinali signatae, tuberculato-asperae vel aculeolatae.

RHIZOMA lignosum, obliquum, repens, sursum PHYLLOPODIIS brevibus et SQUAMIS (PROTOPHYLLIS) magnis, carnosis, ovatis obtectum, deorsum agens radículas numerosas, fibris tenuissimis obsitas. STIPES plerumque elongatus aut enodus, aut nodosus, aut articulatus, basi incrassatus, angulosus, supra canaliculatus, subtus concavus, fasciculos vasorum 11—32, teretes, tenues, aequales aut subaequales in figuram cordiformem dispositos, includens. RHACHIS supra canaliculata, interdum superne alata, ad ortum pinnularum nodoso-incrassata. LAMINA frondis aut indivisa lanceolato-ovata, aut ternata, aut plerumque pinnata. PINNULAE saepius coriacea, cum rhachi articulatae

vel exarticulatae, oblongo-lanceolatae, acuminatae vel cuspidatae, margine plerumque integrae, in nonnullis speciebus apice serrulatae, subtus imprimis in nervo primario sparse paleaceae. PINNULAE frondium fertile sterilibus difformes, saepissime diminutae et multo angustiores. NERVUS PRIMARIUS medianus, percurrens, utrinque elevatus. NERVI SECUNDARIJ creberrimi, subdivergentes, apice incurvati, in marginem pinnulae excurrentes et arcu marginali calloso conjuncti; in pinnulis sterilibus furcati, raro simplicibus intermixti, in pinnulis fertilibus autem simplices, supra immersi, subtus soros gerentes.

FILICES in America tropica insulisque Antillanis habitantes.

SECT. 1. Lamina frondis simplex vel ternata. Stipes nodosus. Sp. 1—2.

1. DANAEA SIMPLICIFOLIA RUDGE lamina frondis sterilis simplici, lanceolato-ovata, obtuse acuminata, ad basin subinaequali, cuneata, in stipitem decurrente; lamina frondis fertilis sterili brevior, obtusior; stipite infra laminam nodoso.

Danaea simplicifolia Rudge Pl. Guian. rar. ic. et descr. 24. tab. 36. Willd. Sp. Pl. V. 67. Kunze Farrnkr. 1. 107. tab. 50. Presl Suppl. Tent. Pterid. 34.

RHIZOMA oblongum, pollicare, diametrum 6—8 lin. attingens. STIPES frondis sterilis 1½—9 poll. (fertilis 10—16 poll.) longus, obtuse angulatus, infra laminam nodosus, supra canaliculatus, sordide purpureus, basi paleis latis obtusis dilute fuscis obtectus. LAMINA frondis sterilis 5—7 poll. (fertilis 3—5½ poll.) longa, 2—3 poll. lata, coriacea, supra laete, subtus pallidius viridis punctisque parvis glandulosus brunneis obsita. NERVUS PRIMARIUS purpureus, utrinque elevatus, magis in latere inferiore, ubi late brunneo-marginatus. NERVI SECUNDARIJ simplices furcative, remoti, basin versus laminae divergentes, apicem versus patuli, ad extremum vix incurvati. NERVUS PRIMARIUS laminae fertilis supra planus vix elevatus, canaliculatus, subtus angustior elevatus. NERVI SECUNDARIJ ut in lamina sterili, sed supra distinctiores et brunnescentes. SORI lineares, apice obtusiores, supra convexi, basi subincurvati, minus fertili, nec nervum primarium nec apicem attingentes, e sporangiis 60—200, foraminibus minutis apertis constructi, intra indusium undulatum liberi. PALAEAE nervi primarii rotundae, flavo-brunnescentes, pellucidae, e cellulis valde incrassatis elongatis irregularibus constructae, cellularum parietibus pallide castaneis; cellulae marginales in cilia longa, pluriarticulata productae.

Habitat in Guiana gallica: Leprieur; in Guiana batava: Wulfschlaegel n. 1715; in Guiana anglica: Schomburgk; verisimiliter in Brasilia amazonica detegenda.

2. DANAEA TRIFOLIATA REICHE, lamina utriusque frondis subternata, foliolo intermedio petiolato, lateralibus subsessilibus; lamina foliolorum sterilium lanceolato-oblonga, longe acuminata, basi subaequali attenuata cuneata; foliolis fertilibus lanceolatis, acuminatis, apice obtusis, basi attenuatis; stipite in tertia longitudinis parte et in apice nodoso.

Danaea trifoliata Reichenb. Mss. Kunze Analecta Pterid. 4. tab. 2. Ejusd. Farrnkr. 1. 55 in adnat. Presl Suppl. Tent. Pterid. 34. Kunze in Linnaea XXI (1848). 203. in nota.

STIPES 10—12 poll. longus, basi incrassatus, obscure viridis, angulatus, late fusco-paleaceus, nodis incrassatis atro-fuscis, paleis densioribus rufofuscis obtectus. (Stipes frondis fertilis longior, ad 16 poll. usque, paleis fagacibus obtectus.) FOLIOLA lateralia sterilia 6 poll. longa, 2 poll. lata (intermedium circiter 13 poll. longum), coriacea, supra laete, subtus pallidius viridia, glabra, margine repanda. NERVUS PRIMARIUS supra canaliculatus, subtus valde elevatus, ad basin sparse paleaceus. NERVI SECUNDARIJ plerumque furcati, rarius simplices, interdum anastomosantes, patuli, paullo curvati. FOLIOLA fertilia exsiccatione fusca, margine repandula. NERVUS

PRIMARIUS utrinque densius fusco-paleaceus, paleis adpressis ciliatis. SORI lineares, utrinque obtusi, recti, nec nervum primarium, nec marginem occupantes, e sporangiis 140—150, foraminibus rotundis apertis constructi.

Adhuc tantum in Surinam observata, a b. Weigelt detecta, nuperime a Hostmann, n. 1166 et a Kappler, n. 1754 in sylva Kraaken Victoria lecta. In Brasilia septentrionali forsitan reperietur.

ADNOTATIO. Vir cel. Dr. Kappler etiam formam fronde quinata, fertili et sterili observavit. An forma composita *Danaeae simplicifoliae*? Non vid.

SECT. 2. Lamina frondis pinnata.

§. 1. Stipes continuus, enodis. Sp. 3—5.

3. DANAEA SELLOWIANA PRESL lamina utriusque frondis pinnata; pinnulis sterilibus longe petiolatis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, basi aequalibus sensim angustatis; ramis nervorum secundariorum 1/3 lin. remotis, linearibus, longe acuminatis, acutissimis, inferioribus basi aequalibus, angustatis, acutis; stipite enodi.

Danaea Sellowiana Presl in Corda Beiträge zur Flora d. Vorn. tab. 51. fig. 18—23 (rhizoma et basis stipitis). Presl Suppl. Tent. Pterid. 37. Ejusd. Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn. 14. tab. 1. fig. 20.

RHIZOMA (teste Presl) obliquum, lignosum, paleaceum, PROTOPHYLLIS instructum. STIPES bipedalis, diametrum in medio 3 lin. attingens, rubens, supra sulcatus, subtus convexus, basi paleaceus. RHACHIS (in fronde fertili ad 20 poll. longa) supra sulcata, subtus convexa, continua, in medio longitudinis mox supra pinnularum juga sulco transverso articulationem indicante instructa, ad insertiones pinnularum paulisper nodoso-incrassata. PINNULAE STERILES (quarum tantum jugum infimum notum est) coriaceae, nitide virides, 7 poll. longae, 16 lin. latae, petiolo 3/2-lineari suffultae, oppositae, patulae, margine undulatae. NERVUS PRIMARIUS testaceus, utrinque elevatus, supra planus, canaliculatus, subtus convexus, sparsim paleaceus. NERVI SECUNDARIJ subpatuli, furcati, apicem versus incurvati. PINNULAE FERILES coriaceae, infimae 5 poll. longae, ad 3 lin. latae, interstitiis 3-pollicaribus remotae, subpatentissimae, petiolatae, sequentes magis magisque approximatae, superiores decrescentes, erecto-patentes, sessiles, basi inaequales superiore breviores acutae inferiore rotundatae, summae 2½ poll. longae, interstitio 1-pollicari remotae; pinnula terminalis proxima vix longior, basi aequali, obtusiuscula in petiolum longum decurrens; omnes margine undulatae. NERVUS PRIMARIUS validus, supra planus, sulcatus, subtus convexus, paleaceus. NERVI SECUNDARIJ patentissimi, simplices. SORI lineares, supra convexi, paralleli, apicem non occupantes, e sporangiis circiter 60, foraminibus rotundis inaequalibus apertis, constructi. PALAEAE nervi primarii rotundae, flavo-brunnescentes, pellucidae, e cellulis valde incrassatis elongatis constructae; cellulae marginales in cilia breviter articulata saepe furcata productae.

A *Danaea elliptica* stipite continuo, robustiore, pinnulis sterilibus oblongo-lanceolatis; a *D. dubia* et *D. longifolia* basi pinnularum sterilium longe angustata, aliisque notis diversa.

Habitat in Brasilia, loco speciali non indicato: Sellow.

4. DANAEA DUBIA PRESL lamina utriusque frondis pinnata; pinnulis utrinque circiter 14; sterilibus oblongo-linearibus, abrupte acuminatis, apice subserrulatis, basi vix acuminatis, subaequalibus; nervis secundariis plerumque 1/2—2½ lin. supra basin furcatis, rarissime a basi ima furcatis, ramis nervorum 1/3 lin. remotis; fertilibus diminutis, linearilanceolatis, apicem versus angustatis, acuminatis, inferioribus basi aequalibus non angustatis rotundatis et leviter cordatis; stipite enodi.

Danaea dubia Presl Suppl. Tent. Pterid. 36. (collato specimine auctoris).

Danaea elliptica Herb. Reg. gen. Berol. fol. 4. (olim).

Danaea nodosa Herb. Reg. Monac.

STIPES erectus, bipedalis et ultra, diametrum 4—6 lin. attingens, enodis, angulatus, supra sulcatus, subtus convexus, ruber, paleis minutis fuscis adpersus. RHACHIS valida, supra canaliculata, marginata, ad insertionem pinnularum nodosa, subtus convexa. LAMINA utriusque frondis rigida, circumscriptione oblonga. PINNULAE oppositae, patulae, remotae; STERILES inferiores 8 poll. longae, 15 lin. latae, summae 5—6 poll. longae, 12 lin. latae, infimae interstitiis 3-pollicaribus, quae in medio rhachis 15—18-linearibus remotae, membranaceae, pallide virides, subsessiles, basi subaequales, superiore cuneato-rotundatae, inferiore rotundatae, non decurrentes, margine repandulae undulataeque; superiores sensim decrescentes; terminalis proximas magnitudine aequans, basi aequalis, cuneata, in petiolum longum gracilem decurrens. NERVUS PRIMARIUS gracilis, subtus paleaceus. NERVI SECUNDARIJ paralleli, patuli, leviter curvati apiceque incurvati, pellucidi. PINNULAE FERTILES infimae ad 6 poll. longae, 9 lin. latae, summae ad 3 poll. longae, breviter petiolati, superiores basi superiore subcuneatae, inferiore rotundatae, margine undulatae. NERVUS PRIMARIUS validus, olivaceo-brunescens, supra planus, canaliculatus, subtus convexiusculus, paleaceus. NERVI SECUNDARIJ simplices, remoti, subpatentissimi, subrecti, apice incurvati. SORI lineares, supra convexi, marginem apicemque non occupantes, e sporangiis 70—80, foraminibus minutis apertis constructi. PALEAE nervi primarii rotundae, flavo-brunescens, pellucidae, e cellulis incrassatis latis elongatis constructae; cellulae marginales in cilia longa, basi lata fissaque productae.

Habitat in prov. Sebastianopolitana ad Rio de Janeiro: Kulenkamp; ad Tijuca et in Corcovado: M.

OBSERVATIO. *Danaea nodosa* Smith ex insulis Antillarum, quacum species nostra adhuc confundebatur, differt: pinnulis sterilibus longius petiolatis (infimis petiolo sub 6-linearibus insidentibus), apice sensim acuminato-cuspidatis, cuspidibus 1-pollicaribus, sublinearibus, acutissimis, eroso-grossedentatis; nervis secundariis remotioribus, a basi ima furcatis, rectis, apice tantum leviter incurvatis, ad pinnulae apicem duplo remotioribus quam in *D. dubia* minusque pellucidis; porro pinnulis fertilibus longius petiolatis, apice minus acuminatis et ad extremum apicis usque sorophoris; soris rectis, e sporangiis 60—70 constructis, foraminibus majoribus apertis; dissepimentis inter soros angustioribus, non undulatis; colore sororum obscuris olivaceo; rhachi multo tenuiore, alia ut tacem.

5. DANAEA LONGIFOLIA Desv. lamina utriusque frondis vasta pinnata; pinnulis in quovis latere 4 (aut pluribus); sterilibus oblongo-ellipticis, acuminato-cuspidatis, apice manifeste minute serrulatis, basi inaequalibus breviter acuminatis; nervis secundariis plerumque a basi ima furcatis, ramis nervorum $\frac{1}{4}$ lin. remotis; fertilibus diminutis oblongo-linearibus, breviter acuminatis, apice minute serrulatis, basi valde inaequalibus, superiore breviter cuneatis, inferiore rotundatis.

Tabula nostra XI.

Danaea longifolia Desv. in Berl. Magaz. V. (1811). 307. Ejusd. Journ. de Bot. Juin, 1813. I. 267. Ejusd. Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 207. Kunze Commentar. ad Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora od. allg. bot. Zeit. 1839. I. Beibl. 38. n. 339. Presl Suppl. Tent. Pterid. 35.

Neque rhizoma neque stipitem vidi. RHACHIS supra canaliculata marginata ad insertionem pinnularum nodosa, subtus convexus. LAMINA utriusque frondis rigida, circumscriptione ovata. PINNULAE subcoriaceae, laete virides, nitentes, oppositae, erecto-patulae, breviter petiolatae; STERILES $9\frac{1}{2}$ poll. longae, 2 poll. latae, interstitiis 2-pollicaribus remotae, margine undulatae, cartilagineae; pinnula terminalis proximis vix major, basi aequali cuneata in petiolum longum decurrens. NERVUS PRIMARIUS luridus, supra gracilis convexiusculus, subtus latior magis elevatus paleaceus. NERVI SECUNDARIJ approximativissimi, subpatuli, paralleli, furcati, apice incurvati. PINNULAE FERTILES $7\frac{1}{2}$ poll. longae, 15 lin. latae, margine undulatae. NERVUS PRIMARIUS supra planus subcanaliculatus, subtus latior con-

vexus paleaceus. NERVI SECUNDARIJ duplo remotiores quam in pinnulis sterilibus, plerumque furcati, subpatuli, subcurvati, apice incurvati. SORI lineares, supra convexi, paralleli, marginem apicemque non occupantes, e sporangiis 160—170, foraminibus rotundis apertis, constructi. PALEAE nervi primarii oblongae s. rotundae, pallide ferrugineae, subpellucidae, e cellulis valde incrassatis parvis elongatis constructae; cellulae marginales in cilia perlonga, pluriarticulata productae.

A *Danaea dubia*, cui affinis, differt: pinnulis majoribus, densius coriaceis, oblongo-ellipticis, apice distincte serrulatis et nervis secundariis magis approximatis. Nervi secundarii hujus speciei inter omnes congeneres plurimum approximati sunt.

Habitat in udibus umbrosis petrosisque sylvarum locis supra Serra do Mar, et in sylvis udibus primariis ad montem Arara-Coara dittonis fluv. Japurá in prov. do Alto Amazonas: M. — Teste Desv. etiam in Antillis reperitur.

§. 2. Stipes nodosus. Sp. 6—8.

6. DANAEA ELLIPTICA Smith lamina utriusque frondis pinnata; pinnulis utrinque 6—8; sterilibus oblongo-ellipticis, sensim longeque acuminatis, basi superiore cuneatis inferiore subrotundatis, in petiolum attenuatis; ramis nervorum secundariorum $\frac{1}{2}$ lin. remotis; fertilibus diminutis, lineari-lanceolatis, acutis, basi inaequalibus, superiore breviter subcuneatis, inferiore rotundatis; stipite supra medium nodoso.

Danaea elliptica J. E. Smith in Rees Cycl. Hook. et Grev. Icon. Fil. I. tab. 51. Kunze Commentar. ad Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora od. allg. bot. Zeit. 1838. I. Beibl. 38. n. 338. Presl Suppl. Tent. Pterid. 38. Ejusd. Die Gefäßbündel im Stipes der Farn 14. tab. 1. fig. 19.

Danaea geniculata Radde Syn. Fil. Brasil. n. 14. Ejusd. Fil. Brasil. 75. tab. 5. fig. 2.

Filix major etc. Sloane Hist. Jam. I. 85. tab. 41. fig. 1 (frons sterilis juvenilis trifoliato-pinnata).

STIPES pedalis et ultra, diametrum $1\frac{1}{2}$ lin. attingens, ad basin crassior, supra canaliculatus, subtus convexus, glabrescens. RHACHIS supra canaliculata marginata, ad insertionem pinnularum nodosa, subtus convexus. LAMINA utriusque frondis rigida, circumscriptione ovata. PINNULAE subcoriaceae, saturate virides, oppositae, patulae, remotae; STERILES 4—6 poll. longae, $1-1\frac{1}{2}$ poll. latae, interstitiis subaequalibus 12—13-linearibus remotae, inferiores breviter petiolatae, summae sessiles, margine cartilagineae, repandulae subundulatae; pinnula terminalis proximas magnitudine aequans, basi aequalis cuneata in petiolum longum decurrens, omnes subtus (sub lente) minutissime dense glandulosae. NERVUS PRIMARIUS gracilis, supra planus sulcatus, subtus convexiusculus, parum elevatus, paleaceus. NERVI SECUNDARIJ plerumque furcati paralleli subpatentissimi, apice incurvati. PINNULAE FERTILES 2— $2\frac{1}{2}$ poll. longae, 6—8 lin. latae, interstitiis 12—18-linearibus remotae, petiolatae, margine undulatae. NERVUS PRIMARIUS ut in pinnulis sterilibus. NERVI SECUNDARIJ simplices, non raro furcati intermixti, subpatentissimi, recti, apice vix curvati. SORI lineares, supra subplanii, paralleli, totam pinnulae paginam inferiorem ad apicem extremum usque occupantes, e sporangiis 60—80, foraminibus minutis inaequalibus oblongis apertis constructi. PALEAE nervi primarii subrotundae, flavo-brunescens, pellucidae, e cellulis incrassatis irregularibus elongatis constructae; cellulae marginales in cilia perlonga articulata, basi lata fissaque productae.

In Brasilia haud raro obvenit, e.g. in prov. Sebastianopolitana ad torrentes sylvarum humidarum in omni Serra do Mar. Ita in Serra dos Orgãos: Gardner n. 87; in monte Corcovado et in Serra d'Estrella: M. In Bahía: Luschnath n. 14 (Herb. Bras. Berol. n. 84); porro in udibus umbrosis petrosisque sylvarum supra montem Arara-Coara et ad Ega, prov. do Alto Amazonas: M.; — in Guiana gallica: Leprieur; in Venezuela ad Coloniam Tovar: Moritz; in Jamaica: Sloane; in S. Vincent: Guilding; in Dominica: Krauss; in Guadeloupe: Bory.

7. *DANAEA AUGUSTII* KARSTEN ET KLOTZSCH lamina utriusque frondis pinnata; pinnulis utrinque 3—4, laete viridibus; sterilibus ovali-lanceolatis, acuminatis, apice obtusiusculo mucronatis, basi subaequalibus, cuneatis; ramis nervorum secundariorum $\frac{1}{2}$ lin. remotis; fertilibus subdiminutis, sterilibus similibus; stipite binodoso.

Danaea Augustii Karsten et Klotzsch in *Herb. Reg. gen. Berol. Kunze Index Fil. cult. in Linnæa XXIII (1850)*. n. 358.

RHIZOMA mihi ignotum. STIPES 5 poll. et ultra longus, diametrum 1 lin. attingens, (aeque ac rhachis) stramineus, supra canaliculatus, paleis adpersus. RHACHIS gracilis, supra canaliculata, superne anguste alata. LAMINA utriusque frondis circumscriptione ovata. PINNULAE membranaceae, laete virides, subtus pallidiores et sparsim paleaceae, oppositae, patulae, remotae, inferiores petiolatae, summae sessiles; STERILES, quarum mediae 4 poll. longae, 12—14 lin. latae, infimae tantum 2—3 $\frac{1}{2}$ poll. longae, terminalis maxima, cum petiolo 5-lineari ad 6 poll. longa, 18 lin. lata; margine integrae, cartilagineae; terminalis proximis subduplo major, basi cuneata inaequalis in petiolum longum decurrens. NERVUS PRIMARIUS testaceus, gracilis, utrinque elevatus, subtus paleaceus. NERVI SECUNDARIJ furcati, patentissimi, subrecti, apice incurvati. PINNULAE fertiles maxime ad 3 poll. longae, 1 poll. latae, interstitiis (in utrisque frondibus aequalibus) 12—13-linearibus remotae. SORI (in specimine nostro incompleto ut videtur juvenali) disjuncti, saepe brevioribus interpositi, nec nervum primarium, nec marginem, nec apicem attingentes, lineares, recti, supra convexi et sporangii 60—70, foraminibus minutis aequalibus apertis, constructi. PALEAE nervi primarii oblongae, flavo-brunnescentes, e cellulis incrassatis amplis elongatis constructae; cellulae marginales in cilia longa pluriarticulata productae; cellula terminalis globosa, rubra.

Habitat in Venezuela ad Puerto Cabella: Karsten.

ADNOTATIO. Descriptio secundum specimina duo, sterile et fertile, a Cel. Dr. Karsten lecta et in *Herb. Reg. gen. Berol.* asservata, facta est.

8. *DANAEA MORITZIANA* PRESL lamina utriusque frondis pinnata; pinnulis obscure viridibus, utrinque 6—7; sterilibus oblongo-lanceolatis, subfalcatis, abrupte acuminatis, apicem versus mucronato-serratis, basi inaequalibus superiore rectilinei-cuneatis, inferiore linea-curvata acutis; pinnulis jugi infimi diminutis, petiolatis, subovatis; ramis nervorum secundariorum $\frac{1}{3}$ lin. remotis; fertilibus diminutis, anguste linearibus, subfalcatis, acuminatis, apice serrulatis, basi inaequalibus, acutiusculis; stipite infra et supra medium nodoso.

Danaea Moritziana Presl *Suppl. Tent. Pterid.* 35.

Danaea alata Klotzsch in *Linnæa XVIII (1844)*. 529.

RHIZOMA in diametro 6-lineare, obliquum, carnosum, radiculis crebris longis ramosis. STIPES erectus pedalis et quod excedit, 1 $\frac{1}{4}$ lin. crassus, supra canaliculatus, ruber (siccò nigricans), basi incrassata protophyllis semipollicaribus ovatis fuscis involucreto. RHACHIS frondis sterilis circiter 6 poll. longa, supra canaliculata, superne ala angusta utrinque marginata, alis ad insertiones pinnularum interruptis, truncatis. LAMINA utriusque frondis rigida, circumscriptione ovato-oblonga. PINNULAE subcoriaceae, obscure virides, nitidae, oppositae, erecto-patulae, remotae, STERILES infimae 13—17 lin., mediae 2 $\frac{3}{4}$ poll., summae 2 poll. longae, 6—8 lin. latae, infimae interstitiis 1 $\frac{1}{2}$ -pollicaribus, reliquae circiter 1-pollicaribus remotae,

subsessiles, margine repandae, hinc inde subserrulatae; pinnula terminalis proximis vix major, basi aequalis cuneato-angustata in petiolum alatum longum decurrens. NERVUS PRIMARIUS gracilis, utrinque elevatus, subtus paleaceus. NERVI SECUNDARIJ furcati patuli, apice incurvati, in marginem serraturasque excurrentes. PINNULAE FERTILES 2 poll. longae, 3 lin. latae, summae parum minores, breviter petiolatae; pinnula terminalis in petiolum longum, anguste alatum decurrens. NERVUS PRIMARIUS ut in pinnulis sterilibus. NERVI SECUNDARIJ simplices, patentissimi, recti, apice incurvati. SORI lineares, supra plani, paralleli, marginem apicemque non occupantes, e sporangiiis circiter 30, foraminibus marginis rotundis apertis, constructi. PALEAE nervi primarii ovatae orbiculatae, fuscidae, pellucidae, e cellulis incrassatis amplis elongatis constructae, cellularum parietibus obscuris coloratis; cellulae marginales hinc inde in cilia productae.

A *Danaea alata* Smith, cui affinis, differt: stipite nodoso, subglabro, rhachi frondis fertilibus apice tantum alata, sterilibus anguste alata, nervis secundariis multo magis approximatis etc.

Habitat in sylvis umbrosis, palmetis humidis Coloniae Toar, Venezuelae: Moritz n. 257. In Brasilia amazonica inquirenda.

§. 3. Stipes articulatus, articulis saepius secedentibus. Sp. 9.

9. *DANAEA LEPRIEURII* KUNZE lamina utriusque frondis pinnata; pinnulis in quovis latere 4—5; sterilibus ovalibus oblongisve, longe curvato-cuspidatis, basi inaequalibus, superiore cuneatis, inferiore rotundatis, margine integris; ramis nervorum secundariorum $\frac{1}{3}$ lin. remotis; fertilibus diminutis, sterilibus conformibus; stipite 2—3-nodoso-articulato.

Danaea Leprieurii Kunze *Farrnkräuter I. 137. tab. 60. Presl Suppl. Tent. Pterid.* 37.

RHIZOMA 1—2-pollicare, in diametro 1-lineare, subterraneum, oblique descendens, paleaceum, phyllopodis obiectum, radiculis numerosis longissimis terram intrans. FRONDES apice rhizomatis rosulatae, confertae, fragiles, saepe 8—10. STIPES utriusque frondis non diversus, 7—9 poll. longus $\frac{1}{2}$ lin. crassus, aequè ac rhachis rufo-brunnescens, angulatus, supra canaliculatus, subflexuosus, ubique sparse paleaceus. RHACHIS supra canaliculata, superne marginata et late alata. LAMINA circumscriptione ovali. PINNULAE subcoriaceae, obscure virides, subtus pallidiores, glabrae, patulae, inferiores breviter petiolatae, summae sessiles; STERILES infimae 3 $\frac{1}{2}$ poll. longae, 1 poll. latae, interstitio 14-lineari remotae, summae 2—2 $\frac{1}{2}$ poll. longae, 9 lin. latae, interstitio 9-lineari remotae, margine undulatae; pinnula terminalis magnitudine proximis similis, basi cuneata in alam latam decurrens. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus, subtus convexiusculus, paleaceus. NERVI SECUNDARIJ plerumque simplices, patuli, recti, apicem versus valde incurvati. PINNULAE FERTILES 1—1 $\frac{1}{2}$ poll. longae, 4 lin. latae, sterilibus conformes. SORI (ex descriptione Kunzei) lineares, apice obtusi, curvati, e sporangiiis circiter 60, foraminibus ovalibus apertis, constructi. PALEAE nervi primarii oblongae, pallide brunneae, pellucidae, e cellulis incrassatis amplis elongatis constructae; cellulae marginales in cilia perlonga, articulata productae; cellula terminalis ovalis, rubra.

Species haec rarissima parvitate frondium, circumscriptione pinnularum, fragilitate stipitis rhachisque a praecedentibus valde diversa.

Habitat in sylvis udis in fluvii Japurá ditone, prov. do Alto Amazonas: M.; — in Guiana gallica: Leprieur.

OSMUNDACEAE.

OSMUNDACEAE *Martius Conspect. 3. Rob. Brown. Prodr. Flor. Nov. Holl. 161 (ex parte). Kaulf. Wesen der Farrenkr. 40 (ex parte). Endl. Gen. Plant. 65 et Suppl. I. 1351. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Suppl. Tent. Pterid. 61.* — SCHISMATOPTERIDES *Willd. Spec. Plant. V. XXXXVI (ex parte).* —
FILICES SPURIE GYRATAE S. RIMATAE *Swartz Syn. Fil. 7 (ex parte).*

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPORANGIOPHORAE, FRONDIBUS VERNATIONE CIRCINATIS, FERTILIBUS PLERUMQUE CONTRACTIS. SPORANGIA ANNULO INCOMPLETO SUBAPICALI TRANSVERSO INSTRUCTA, LIBERA, MEMBRANACEA, RIMA LONGITUDINALI DEHISCENTIA. INDUSIUM NULLUM. SPORAE GLOBOSAE, STRIIS TRIBUS NOTATAE.

SORI aut lineares, nervos secundarios segmentorum subtus occupantes (TODEA), aut hémisphaerici, margini vel paginae inferiori pinnularum contractarum (praesertim in nervis) insidentes (OSMUNDA). SPORANGIA tenuissime membranacea, pellucida, breviter pedicellata vel subsessilia, obovata aut subglobosa, annulo incompleto gibboso prope verticem sito et transverso instructa, a basi ad anulum usque rima longitudinali dehiscentia. INDUSIUM nullum. SPORAE subglobosae, striis tribus signatae, pallidae aut subhyalinae.

RHIZOMA repens vel adscendens. STIPES erectus, supra canaliculatus, subtus convexus. FASCICULUS VASORUM unicus, convexus, tenuis, cruribus rectis vel inflexis. FRONDES vernatione circinatae. RHACHIS supra canaliculata, subtus convexa, aut utrinque teres. LAMINA frondis bipinnata vel bipinnatopinnatifida; PINNULAE cum rhachi articulatae vel continuatae, aut non contractae, subtus sorophorae, aut mediae vel superiores fertiles in paniculam contractae. Aliis frondes fertiles difformes, PINNIS omnibus contractis. NERVUS PRIMARIUS medianus excurrentis. NERVI SECUNDARIII simplices vel uni-plurifurcati, apice libere desinentes.

Filices hujus ordinis habitu POLYPODIACEIS magis accedunt quam OPHIOGLOSSIS, ob rudimentum annuli sporangiorum et ob vernationem circinatam transitum in SCHIZAEACEAS efficiunt.

Stirpes in regionibus tropicis et extratropicis totius orbis obviae, herbaceae sunt.

OSMUNDA LINN.

OSMUNDA Linn. Gen. Plant. n. 1172. (excl. spec.). Endl. Gen. Plant. 65. n. 665 et Suppl. I. 1351. Hook. Gen. Fil. tab. 46. a. Meisn. Gen. Plant. 435. (336). Presl Suppl. Tent. Pterid. 61. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 116. — APHYLLOCARPA Cav. Ann. sc. nat. V. n. 14.

SORI hemisphaerici, aut pinnularum mediarum paginam inferiorem et imprimis marginem, aut pinnae superiores ad rhachem usque contractas occupantes. SPORANGIA pedicello continuo brevi instructa, obovato-inaequalia, hinc gibbere striato, annulum obsolete dimidiatum, subapicalem transversum exhibente, instructa, inde e basi ad gibberem longitudinaliter dehiscencia. INDUSIUM nullum. SPORAE subglobosae, striis tribus signatae, hyalinae.

RHIZOMA mulliceps, adscendens, **PHYLLOPODIIS** squamiformibus dense obsitum, interdum non solum deorsum, sed etiam sursum radicosum. **FRONDES** vernatione circinatae, aut difformes: fertiles pinnis omnibus contractis paniculaeformes, aut conformes: pinnis superioribus vel mediis contractis fertilibus. **STIPES** inferne teres, superne angustatus, aequae ac rhachis supra planus, canaliculatus, nunc primum lana densa longaque obsessus denique glabrescens, nunc omnino glaber. **FASCICULUS VASORUM** in stipite hippocrepicus seu semiannularis, periphericus, tenuis, cruribus inflexis. **LAMINA** bipinnata v. bipinnato-pinnatipartita; **PINNAE** cum rhachi articulatae. **PINNULAE** aut ovales aut lanceolatae, membranaceae v. coriaceae. **NERVUS PRIMARIUS** medianus subexcurrentis, plerumque utrinque elevatus. **NERVI SECUNDARI** numerosi, patuli, subcurvati, supra immersi, subtus elevati, 2—3-furcati, apice liberi in sinum denticulorum excurrentes et arcu marginali conjuncti.

Species elegantissimae hujus generis in regionibus tropicis et extratropicis utriusque orbis proveniunt.

SECT. 1. Frondes difformes: steriles pinnato-pinnatipartitae; fertiles bipinnatisectae, ad rhachem usque contractae. Sp. 1—2.

1. **OSMUNDA CINNAMOMEA** LINN. lamina frondis sterilis rigida, oblongo-lanceolata, pinnato-pinnatipartita; pinnis remotis, subpatentissimis patulisve, basi rufo-lanuginosis, lineari-oblongis, brevissime acuminatis, profunde pinnatipartitis; laciniis distantibus, ovatis vel oblongis, subfalcatis, obtusis; nervis secundariis subdiagonalibus; frondibus fertilibus contractis, lamina bipinnata, pinnulis subteretibus; rhachi stipiteque utrumque frondium lana ferruginea dense obsitis.

Osmunda cinnamomea Linn. Sp. Pl. 1552. Michaux Flor. bor. Amer. II. 273. Willd. Sp. Pl. V. 98. Schkuhr Krypt. Gewächse 148. tab. 146. Presl Suppl. Tent. Pterid. 68. Kunze Farrnkr. II. 30. Ejusd. in Linnæa XXII (1849). 575. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 116.

RHIZOMA adscendens. **STIPES** pedalis et ultra, basin versus diametrum 2—2½ lin. attingens, sicut rhachis planiusculus, supra late profundeque canaliculatus, subtus convexus, cerineus, dense lanatus, denique glaber. **FRONDIS STERILIS LAMINA** circiter 1 ped. longa, 2½ poll. lata. **PINNAE** in quovis latere 16—24, suboppositae, sessiles, mediae 2—2½ poll. longae,

6—8 lin. latae, interstitiis 8—9-linearibus remotae. **LACINIAE** maxime 2—5 lin. longae, ad basin 3 lin. latae, integerrimae, margine revolutae, pilis crispis rufis ciliatae, subcoriaceae, supra intense, subtus dilutius virides. **NERVUS PRIMARIUS** supra basin versus teres, a medio apicem versus planus, canaliculatus, subtus elevatus. **NERVI SECUNDARI** elevati, subdiagonales, non excurrentes, apice cum **NERVIS TERTIARIIS** furcatis subrectis pellucidi. **LAMINA FRONDIS FERTILIS** lanceolata, bipinnata, contracta. **PINNAE** inferiores remotae, superiores magis approximatae. **PINNULAE** sporangii dense glomerataeque obsitae.

Habitat in sylvis depressis et in paludibus exsiccatis Americae borealis, ubi late diffusa. Teste beat. Kunze etiam a Cel. Regnell in Brasilia, prov. Minas lecta (Regnel. Coll. II. n. 339½). Secundum Presl planta praeterea in Mexico a Leopold et in Guatemala, Americae centralis, a Friedrichthal reperta est. — Specimen brasiliense non vidi.

2. **OSMUNDA IMBRICATA** KUNZE lamina frondis sterilis rigida, lanceolata, pinnato-pinnatipartita; pinnis imbricatis, erecto-patentibus, basi dense rufo-lanuginosis, lineari-oblongis, breviter acuminatis, profunde pinnati-partitis; laciniis deorsum imbricatis, breviter ovatis, rectis, obtusis; nervis secundariis medianis; frondibus fertilibus contractis, lamina pinnata, pinnulis subcompressis, angulatis; rhachi stipiteque utrumque frondium lana ferruginea sparsim obsitis.

Osmunda imbricata Kunze Farrnkr. II. 29. tab. 112.

RHIZOMA adscendens. **STIPES** 4—9 poll. longus, diametrum 1½ lin. attingens, sicut rhachis planiusculus, supra late profundeque canaliculatus, sordide alutaceus, sparsim lanatus, denique glaber. **FRONDIS STERILIS LAMINA** 9½—11 poll. longa, 1½—2 poll. lata. **PINNAE** in quovis latere 19—20, alternae, sessiles, mediae 2—2½ poll. latae. **LACINIAE** maxime 3—3½ lin. longae, circiter 2 lin. latae, integerrimae, margine crassiusculae, subrevolutae, leviter repandae, pilis crispis densius rufo-ciliatae, dense coriaceae, supra latae, subtus pallidius viridi-flavae. **NERVUS PRIMARIUS** validus, flexuosus, utrinque elevatus, planus, supra angustus, subtus latus, partim subcanaliculatus. **NERVI SECUNDARI** flexuosi, non excurrentes, apice cum **NERVIS TERTIARIIS** furcatis, subflexuosi. **LAMINA FRONDIS FERTILIS** lanceolata, bipinnata, contracta. **PINNAE** inferiores remotae, superiores magis approximatae. **PINNULAE** sporangii undique obsitae.

Habitat in pratis humidis, altitud. 7000 ped., Venezuelae, prov. Merida: Funck et Schlim n. 1221. — Hujus speciei exemplar non vidi. Adjectur species in Brasilia nondum lecta, ut inquirent, peregrinantes Botanici, utrum in montibus altioribus Gujanae proveniat.

SECT. 2. Frondes conformes.

§. 1. Pinnae mediae fertiles, contractae. Sp. 3.

3. **OSMUNDA PILOSA** WALL. lamina frondis ovato-lanceolata, bipinnatifida, (junioribus densissime ferrugineo-lanatis); pinnis lanceolatis, obtusis, arcte profunde-pinnatipartitis; laciniis oblongis, obtusis, integerrimis; pinnis mediis fertilibus; sporangii nigricantibus.

Osmunda pilosa Wall. Cat. n. 52. Grev. et Hook. Enum. Fil. in Hook. bot. Misc. III. 229. Presl Suppl. Tent. Pterid. 68.

Secundum Grev. et Hook. l. c. species haec *Osmundae interruptae* Mich. peraffinis, et ab ea fortasse vix diversa, nisi: longitudine majore, frondibus lanatis, pinnis densioribus, inferioribus rhachi magis approximatis.

Habitat ad Rio de Janeiro: Wallich. — Non vidi.

§. 2. Pinnae superiores fertiles, contractae. Sp. 4—5.

4. **OSMUNDA GRACILIS** LINK lamina frondis oblonga vel ovata, bipinnata; pinnis remotis oblongis, inferioribus sterilibus; pinnulis in quovis latere plerumque 5 remotis, brevissime petiolatis, ovalibus oblongisve, obtusiusculis, basi inaequalibus cuneatis, margine crenulato-denticulatis; pinnis superioribus contractis fertilibus; pinnulis pinnatifidis angustis subteretibus; rhachi primaria stipiteque flexuosis.

Osmunda gracilis Link Hort. b. Berol. II. 145. n. 2 (excl. syn.: *O. palustris* Schrad.). Ejusd. Fil. Sp. h. b. Berol. 20. Kunze Farrnkraut. I. 81. tab. 39. Presl Suppl. Tent. Pterid. 64.

RHIZOMA multiceps, capitibus adscendentibus. STIPES 6—9 poll. longus, diametrum 1 lin. attingens, flexuosus, subteres, supra planus, stramineus, glaber. RHACHIS PRIMARIA flexuosa, sicut RHACHES SECUNDARIAE supra plana, marginata; eae pinnularum fertillium filiformes, angulatae. LAMINA ad 12 poll. longa, 5—8 poll. lata. PINNAE in quovis latere 6—8, oppositae, patulae, petiolatae, infimae 3—4 poll. longae. PINNULAE in quovis latere plerumque 5, steriles 1—1½ poll. longae, 4—6 lin. latae, alternae, subpatentissimae, decrescentes; pinnula terminalis ad 2 poll. longa, 10 lin. lata, proximis major, nunc libera in petiolum longum decurrens, nunc cum proxima connata (in speciminibus cultis basi saepe aurita lobatae), omnes membranaceae, tenues, glabrae, lacte virides, subtus opacae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, gracilis, parum elevatus. NERVI SECUNDARIJ patuli, curvati, 2—3-furcati, liberi, in sinus denticulorum excurrentes. PINNAE superiores contractae fertiles. PINNULAE ad marginem 10—20 sporangia laxeglomerata gerentes.

Habitat in Brasilia australi, loco natali non indicato: Sellow; prope fluvium Rio Pardo, prov. Rio Grande-do-Sul: Riedel. — Specimen spontaneum non vidi. Quod cl. Link adnotaverat, hanc speciem Americanam borealem inhabitare, dubium est.

5. OSMUNDA PALUSTRIS SCHRAD., (SUBSP. OSMUNDAE REGALIS LINN.) lamina frondis glabra, rigidissima, ovato-oblonga, bipinnata; pinnis remotis inferioribus sterilibus, lineari-lanceolatis; pinnulis in quovis latere 10—24 remotis, brevissime petiolatis, decrescentibus, lineari-oblongis, obtusis, basi inaequalibus vix auriculatis, superiore subtruncatis inferiore rotundatis, margine crenulato-denticulatis; pinnis superioribus sensim minoribus, contractis, fertilibus; pinnulis pinnatifidis angustis, laciniis brevissimis; stipite robusto, subflexuoso.

Tabula nostra XII.

Osmunda regalis Linn. Subsp.

Osmunda pulcherrima Pohl in Herb. Mus. Palat. Vindob.

Osmunda palustris Schrad. in Goetting. gelehr. Anzeig. 1824 866. Link Fil. Sp. h. b. Berol. 20.

Osmunda regalis L. var. *spectabilis* Willd. β. *brasiliensis* Grev. et Hook. Enum. Fil. in Hook. bot. Misc. III. 230. Kunze in Linnaea XVIII (1844). 308. Brackenk. U. St. Expt. Exped. XVI. 308.

Osmunda spectabilis β. *palustris* Presl Suppl. Tent. Pterid. 63. *Ancimia spec. Gardn. Fil. bras. n. 89.*

Rhizoma mihi ignotum. STIPES 4—16 poll. longus, diametrum 2 lin. attingens, angulosus, supra canaliculatus, sicut rhachis cinnamomeus, glaber. RHACHIS PRIMARIA subteres, supra canaliculata, SECUNDARIAE supra subplanae, interdum submentosae, a basi ad apicem angustissime alatae. LAMINA frondis 12—18 poll. longa, circiter 6 poll. lata. PINNAE in quovis latere 8—10, inferiores ad 6 poll. longae, 2 poll. latae, alternae, superiores oppositae, erecto-patentes, breviter petiolatae. PINNULAE inferiores ad 16 lin. longae, 4 lin. latae (summa usque ad 5 lin. longae), suboppositae alternae patentissimae, superiores patulae, inferiores interstitiis 8-linearibus, summa 5-linearibus remotae; pinnula terminalis proximis duplo major, basi aequaliter cuneata in petiolum longum decurrens vel cum proxima connata; omnes dense coriaceae, rigidae, obscure et subtus pallidius virides (statu sicco rufidulae). NERVUS PRIMARIUS subflexuosus, utrinque elevatus, nonnunquam, ad basin imprimis, tomentosus. NERVI SECUNDARIJ utrinque elevati, patuli, curvati, subflexuosi, 2—4-furcati, liberi. Distantia inter nervos secundarios ad basin 1 lin., inter ramos ad marginem 1/5 lin. (In speciminibus europaeis *Osmundae regalis* distantia inter ramos nervorum secundariorum ad marginem 1/3 lin.) PINNAE superiores contractae fertiles. PINNULAE sporangiis dense glomeratis undique obsitae.

Habitat in Brasilia loco natali non indicato: Sellow; ad praedia Vaz et Rancho novo, prov. Rio de Janeiro: Pohl n. 3459; prope Mandioca, prov. Sebastianopolitanae: Karwinski; in Serra dos Orgãos: Swainson; in montibus Serra do Mar: Langsdorff; in prov. Minarum: Gardner (Pl. Bras. exsicc. n. 5343 et 89.); in patulibus ad fluvium Mucuri: Princ. Max. Neovidens.

SCHIZAEACEAE.

SCHIZAEACEAE *Martius Icon. Plant. Crypt. Brasil. 112. Endl. Gen. Plant. 64. Suppl. I. 1351. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Suppl. Tent. Pterid. 72. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 113. — ANEMIAEAE Link Fil. Spec. Hort. b. Berol. 23. Kaulf. Wesen d. Farrenk. 40 (partim). — OSMUNDACEARUM GEN. Rob. Brown Prodr. Flor. Nov. Holl. 161. — SCHISMATOPTERIDES Willd. Spec. Plant. V. XXXVI (partim). — FILICES SPURIE GYRATAE s. RIMATAE Swartz Syn. Fil. 6 (partim). — LYGO-DIAEAE Presl l. c. 98 (partim).*

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPORANGIOPHORAE, FRONDIBUS VERNATIONE CIRCINATIS. SPORANGIA VERTICE ANNULO COMPLETO TRANSVERSO MULTIRADIATO INSTRUCTA, LIBERA, MEMBRANACEA, EXTRORSUM LONGITUDINALITER DEHISCENTIA. INDIUSIUM SPURIUM VEL NULLUM. SPORAE TETRAEDRAE VEL OBLONGAE, TUBERCULATAE, ACULEATAE VEL STRIATAE, RHAPHE TRICRURI NOTATAE.

SPORANGIA membranacea, sessilia vel breviter pedicellata, ovalia vel oblonga, apice annulo completo transverso multiradiato praedita, extrorsum longitudinaliter dehiscentia; hypophylla: aut disticha, medio dorso nervorum secundariorum affixa, atque dentibus laciniarum fertilium cuculliformibus, indusii lateralis instar, velata (LYGODIUM); aut secus nervum medianum laciniarum fertilium uni-biseriata, parenchymati adnata paleisque taeniaeformibus stipata (SCHIZAEA); aut ad nervos segmentorum fertilium uniseriata, marginalia vel intramarginalia, nuda, parenchymati adnata (ANEMIA); aut singula binave apici incrassato nervorum imposita, dente fertili revoluta subvelata (MOHRIA). SPORAE tetraedrae vel oblongae, nunc tuberculato-asperae, nunc elevato-striatae, nunc aculeolatae, rhaphe tricruri notatae.

RHIZOMA repens vel adscendens. STIPES rectus, teres, vel quadrangularis, supra canaliculatus, FASCICULUM VASORUM aut teretem, crassum, centram, aut semilunularem vel hippocrepicum includens. FRONS vernatione circinata, aut stipitiformis simplex vel dichotoma, aut lamina frondis flabelliformis indivisa vel flabelliformi-dichotoma, apice vel margine segmenta fertilia gerens; aut lamina segmenti sterilis expansa, pinnato-bipinnatisecta, segmenta fertilia contracta, bi-tripinnatisecta, PANICULAS longe pedunculatas referentia; aut lamina bipinnata, pinnis conjugatis, segmentorum fertilium margine lacinulas spiciformes gerentia; aut lamina bipinnatisecta, laciniis fertilibus sub margine subrevoluta sporangia gerentibus. RHACHIS PRIMARIA teretiuscula, supra plana vel canaliculata, in LYGODIO longissima, scandens, volubilis. NERVUS PRIMARIUS indivisus vel dichotomus. NERVI SECUNDARIJ simpliciter dichotomi, aut flabellato-dichotomi, liberi vel anastomosantes.

Plantae hujus ordinis annulo sporangiorum apicali, transverso, completo ab OSMUNDACEIS GLEICHENIACEISQUE diversa.

Filices in regionibus tropicis, rarius extratropicis totius orbis, Europa exclusa, provenientes.

GENERA BRASILIENSIA.

- I. Laciniae fertiles marginales, spicaeformes, gerentes sporangia disticha, medio nervorum secundariorum affixa, singula dentibus laciniarum fertilibus cuculliformibus, indusii lateralis instar velata . . . LYGODIUM.
- II. Laciniae fertiles marginales vel apicales, digitatae vel pinnatae, gerentes sporangia bi-quatriseserialia, secus nervum primarium, parenchymate adnata, paleis taeniaeformibus stipata . . . SCHIZAEA.
- III. Partes laminae laterales fertiles, paniculas referentes, bi-tripinnatisectae. Segmenta gerentia sporangia biserialia secus nervum primarium parenchymate adnata, nuda (In *Aneimia elegante* frons triloba, laciniae laterales fructiferae non in paniculam mutatae) . . . ANEIMIA.

I. LYGODIUM SWARTZ.

LYGODIUM Swartz in Schrad. Journ. 1801. II. tab. 2. fig. 2. Endl. Gen. Plant. 65. n. 663. Hook. Gen. Fil. tab. 28. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Suppl. Tent. Pterid. 99. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 113. — HYDROGLOSSUM Willd. in Act. Acad. Erfurt. 1802. 20. Presl l. c. 112. — LYGODICTYON J. Smith in Hook. Gen. Fil. tab. 111. B.

LACINIAE marginales fertiles spiciformes, serratae, subtus sporangia biserialiter disposita gerentes. SPORANGIA alterna, brevissime pedicellata, ovali-oblonga, apice attenuata, annulo completo transverso instructa, rima longitudinali extrorsa dehiscentia, singula medio dorso nervorum secundariorum affixa, resupinata, indusiata. INDUSIUM spurium squamiforme, cucullatum, nervis transverse adnatum, imbricatum, supra liberum, scariosum, persistens. SPORAE tetraedrae, basi convexae, tuberculato-asperae.

RHIZOMA parvum, horizontale, superne pilis articulatis aut paleis squamatis (fide Kunze) obsitum, inferne radículas copiosas longasque emittens. STIPES brevis. RHACHIS PRIMARIA longissima, non raro in 20 pedem et ultra altitudinem elata, diametrum 1—2 lin. attingens, volubilis, scandens, supra plus minusve distincte marginata subtomentosa, subtus convexa glabra, FASCICULO VASORUM unico tereti aut semitereti. RHACHES SECUNDARIAE flexuosae, semiteretes, semper tomentosae, superne saepe marginatae. PINNAE inferiores alternae, superiores conjugatae. PETIOLUS communis pinnularum conjugatarum brevis vel brevissimus, rarius bi-trilinearis, apice gemmam ovatam dense hirsutam, saepe abortientem gerens. PINNULAE pinnatisectae aut bipinnatisectae. SEGMENTA petiolo articulato aut continuo, sterilia fertilibus non raro dissimilia, elliptica, lanceolata, triangularia, inferne interdum pinnatisecta, serrulata, glabra vel subtus puberula. NERVUS PRIMARIUS medianus excurrentis. NERVI SECUNDARIi magis minusve crebri, utrinque elevati, rarius simplices vel unifurcati, plerumque dichotomi, liberi aut rarissime anastomosantes, in serraturas marginis aut in segmentis fertilibus in lacinulis spiciformes excurrentes. SEGMENTA FERTILIA margine aut a basi ad apicem, aut infra medium ad apicem usque, aut a basi ad medium et ultra lacinulis fructiferis angustis serratis compressis vel teretiusculis, subtus in quovis latere 5—15 sporangia gerentibus, dense obsessa.

Schizaeac.

Plantae perennes, quarum frondes quotannis pereunt, nonnullis speciebus exceptis, regionem intratropicam Asiae et Americae incolunt.

ANOTATIO. Genus HYDROGLOSSUM secundum Presl (LYGODICTYON J. Sm.) ex speciebus tribus insulas Societatis et Madagascariam inhabitantibus formatum, a LYGODIO non nisi nervis secundariis anastomosantibus differt.

OBSERVATIO I. Gemmae sunt pilis articulatis cylindricis, basi simplicibus vel ramosis, apice subulatis curvatis, hyalinis aut flavescens, nunquam paleis squamiformibus obsitae.

OBSERVATIO II. Quum apex segmentorum fertilibus nudus, i. e. sterilis, tum plus minusve acuminatus, nonnunquam longe acuminatus; quum autem apex ad extremum fertilibus, tum magis minusve rotundatus.

Species hujus generis difficillime distinguendae et in herbariis et in scriptis valde confusae, non nisi ex permultis exemplaribus in statu juniore et adulto, fertilibus et sterilibus recte cognoscuntur.

SECT. 1. Segmenta pinnularum continua non articulata. Sp. 1—2.

1. LYGODIUM PALMATILOBUM J. W. STURM pinnulis superioribus fertilibus conjugatis, petiolo communi $1\frac{1}{2}$ -lineari, bipinnatisecto-pinnatifidis; segmentis primariis in quovis latere 3—4, petiolo membranaceo-alato, triangularibus; secundariis triangularibus, inferioribus profunde pinnatifidis petiolatis, superioribus adnatis, summis confluentibus; laciniis ovatis, basi cuneatis, adnatis, decurrentibus, margine palmatilobis et in lacinulas fertiles productis, supra glabris, subtus puberulis.

Tabula nostra XIV. f. 6. Segmentum.

Lygodium venustum Swartz varietas? in Herb. Zuccarinii et Martii.

RHACHIS PRIMARIA sine dubio pluripedalis, diametrum $\frac{3}{4}$ lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana marginata, subtus convexa, ubique glabra testacea. RHACHES SECUNDARIAE semiteretes, flexuosae, basi marginatae, superne cum rhachibus tertiariis membranaceo-alatae, puberulae. PINNULAE circiter 6 poll. longae, ad basin 5 poll. latae. SEGMENTA PRIMARIA inferiora petiolo 5-lineari, superiora 1-lineari tenui tereti apice continuo puberulo instructa (summa sessilia adnata), infima circiter 3 poll., basi 2 poll. lata, interstitio in eodem latere 21-lineari remota, superiora 1 poll. longa, summa magis magisque decrescentia denique confluentia, alterna, patula. SEGMENTA SECUNDARIA inferiora 1 poll. longa, 9 lin. lata. LACINULAE infimae circiter 4 lin. longae lataeque, membranaceae, supra saturate, subtus pallidius virides, opacae. NERVUS PRIMARIUS gracilis, flavescens, supra hirtulus mox evanescens. NERVI

SECUNDARIUM remotissimi, dichotomi, liberi. LACINULAE FERTILES 1—3-lineares subcurvatae subglabrae, laxe dispositae, subtus in quovis latere 8—10 sporangia gerentes, basi raro utrinque serratura sterili instructae. PILI gemmarum basi non furcati, nodoso-articulati, hyalini, farti; e cellulis 4—5 compositi; cellula infima subbulbosa, terminalis subulata curvata. SPORAE tetraedrae, basi convexae, in angulis obtusissimae, itaque subglobosae, vix asperae, virescentes pellucidae. — Pinnulas steriles non vidi.

Habitat ad Rio de Janeiro: Döllinger in Hb. Martii.

2. **LYGODIUM MUCRONULATUM** J. W. Sturm pinnulis inferioribus sterilibus, conjugatis, petiolo communi 2—3-lineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 1—3, petiolo membranaceo-marginato, inferioribus rotundato-ovatis quinquepartitis, superioribus aut tripartitis aut simplicibus, basi cuneatis, laciniis lateralibus lanceolatis, intermedia oblonga obtusa, lateralibus vix dimidio longiore, omnibus margine inciso-pinnatifidis, lacinulis linearilanceolatis, apice inaequaliter serratis, serraturis rectis mucronulatis, in nervis utrinque hirtulis.

Tabula nostra XIV. f. 9. Pinnula.

Lygodium polymorphum frons steril. in Herb. Reg. gen. Berol. et

Lygodium polymorphum var. subglabrum Coll. Moritz n. 77. in Herb. Reg. Berol.

RHACHIS PRIMARIA sine dubio pluripedalis, diametrum $\frac{1}{4}$ lin. attingens, gracillima, volubilis, scandens, supra plana marginata tomentosa, subtus convexa puberula. RHACHES SECUNDARIAE semiteretes subflexuosae, membranaceo-marginatae, ubique dense albo-pilosae. PINNULAE circiter 3 poll. longae, $2\frac{1}{2}$ poll. latae. SEGMENTA petiolo 1— $1\frac{1}{2}$ -lineari tereti apice continuo pubescenti late membranaceo-marginato instructa, 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longa (terminale plerumque tripartitum interdum tripollicare), 9—12 lin. lata, interstitiis in eodem latere 6—7-linearibus remota, alterna, patentissima patulave, membranacea, laete viridia subopaca. NERVUS PRIMARIUS gracilis, palmatus, supra hirtulus. NERVI SECUNDARIUM remoti, dichotomi, liberi, elevati. PILI gemmarum basi non furcati, nodoso-articulati, hyalini, farti, e cellulis 5 compositi; cellula infima subbulbosa, flava, terminalis subulata magis vel minus curvata. — PILI basi stipitis (in planta juvenili) cylindrici, articulati, fusciduli, ad articulationes constricti, obscuriores, impellucidi, e cellulis 5—6 compositi.

A *Lygodio commutato*, planta unica, quaecum confundi possit, facile distinguitur: lacinula intermedia segmentorum sterillum oblonga, obtusa, lacinulis lateralibus vix dimidio longiore, margine profundiore inciso-pinnatifidis, serraturis rectis.

Habitat in Guiana batava prope Paramaribo: A. Ehrhard, 1856, in Hb. Sturmiano (sterile); ad Caracas, Venezuela: Moritz, in Hb. Reg. gen. Berol. (specimina 2 sterilia vidi). Verisimiliter Brasiliae aequatorialis incolata.

SECT. 2. Segmenta pinnularum articulata.

§. 1. Segmenta sterilia margine incisa. Sp. 3—4.

3. **LYGODIUM VENUSTUM** SWARTZ pinnulis inferioribus sterilibus, conjugatis, petiolo communi subtri-lineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere circiter 6, petiolatis, oblongis, 5—7-partitis, basi profunde cordatis, laciniis lateralibus minoribus, ovato-lanceolatis, basi lobatis, intermedia oblongo-lanceolata, acuminata lateralibus triplo-longiore, margine inciso-crenulatis, indistincte incumbente-serrulatis, utrin-

que pubescentibus; pinnulis superioribus fertilibus, subbipinnatisectis; segmentis subtriangulari-lanceolatis obtusiusculis, inferioribus basi profunde cordatis, inciso-subtrilobis aut pinnatisectis, omnibus margine a basi ad medium et ultra inciso-serratis et in lacinulas fertiles productis.

Tabula nostra XIV. f. 1—5. Segmenta.

Lygodium venustum Swartz in Schrad. Journ. 1801. II. 303. Swartz Syn. Fil. 153 et 383. Schkuhr Krypt. Gewächse 140. tab. 139. Presl Reliq. Haenk. I. 72. Presl Suppl. Tent. Pterid. 105. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 119. tab. 57. fig. 2. Presl Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 21. tab. 4. fig. 14.

Lygodium polymorphum Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. et Spec. I. 25. Kunze in Linnaea IX (1834). 18. Klotzsch ibidem XVIII (1844). 528. Link Fil. Sp. H. Berol. 29. Spitzgerb. Enum. Fil. Surinam. in Tydschrift 1840. 436 (excl. syn. Kauf.).

Hydroglossum hastatum Willd. Sp. Pl. V. 79.

Hydroglossum hirsutum Willd. l. c. 80.

Ugena polymorpha Cav. Icon. VI. 75. (excl. patria) tab. 595. fig. 1.

RHACHIS PRIMARIA longitudinem usque ad vigintipedalem (teste Presl), diametrum $\frac{1}{4}$ lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana submarginata tomentosa, subtus convexa subglabra, pallide cinnamomea. RHACHES SECUNDARIAE teretes submarginatae, tomentoso-hirtulae. PINNULAE 1 pedes longae, ad 6 poll. latae. SEGMENTA inferiora petiolo circiter 4-lineari, superiora 1-lineari, tereti angustissimo-marginato, ad basin tumido, ad apicem nodoso-articulato instructa, 2—3 poll. longa, ad basin 15—18 lin. lata, interstitiis in eodem latere 18-linearibus remota, alterna, patentissima, dense membranacea, saturate viridia nitentia; segmentum terminale proximo conatum, itaque bi-tripartitum. NERVUS PRIMARIUS luteus, supra hirtulus. NERVI SECUNDARIUM valde approximati, dichotomi, liberi, elevati. LACINULAE FERTILES trilineares curvatae, laxe dispositae utrinque dense hirsutae, subtus in quovis latere 9—11 sporangia gerentes, plerumque basi utrinque serratura sterili instructae. PILI gemmarum nodoso-articulati, plerumque saturate flavofusciduli, e cellulis 5—6 compositi; cellula infima subinflata, terminalis acicularis curvata. SPORAE tetraedrae, basi convexae, in angulis obtusissimae subulato-asperae, flavo-virescentes.

In fruticetis humidis scandens per magnam partem Americae tropicae, e. g. in Brasilia in monte Corcorado prope Rio de Janeiro: Mikan, Pohl, (teste Presl); in proc. Ceara: Gardner n. 1910; ad Para: Sieber; in vicinia Santarem, prov. Para: Spruce n. 578; ad fluvium Amazonum: Poeppig n. 2099. — in Guiana batava et anglica; in Venezuela; in Equador; in Peruvia; in insulis S. Domingo et Trinidad.

4. **LYGODIUM POHLIANUM** PRESL pinnulis inferioribus sterilibus, conjugatis, petiolo communi 1— $1\frac{1}{2}$ -lineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 3—5, petiolatis, cordato-ovatis, 3—5 partitis, laciniis margine inaequaliter inciso-pinnatifidis, lateralibus lineari-lanceolatis, intermedia oblongo-lanceolata, basin versus angustata, apice rotundata, quam laterales duplo longiore; lacinulis linearibus, apice acute serrulatis; supra hirtulis.

Tabula nostra XIV. f. 10. 11. Segmenta.

Lygodium Pohlmann Presl Suppl. Tent. Pterid. 105. Presl Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 22. tab. 4. fig. 15.

Lygodium potentilloides Pohl in Herb. Mus. Pal. Vind. n. 743 et 1156 et in Herb. Martii.

RHACHIS PRIMARIA pluripedalis, diametrum 1 lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana submarginata subtomentosa, subtus convexa glabra, lutea. RHACHES SECUNDARIAE teretes, supra planae marginatae tomentosae. PINNULAE inferiores circiter 7 poll. longae, $2\frac{1}{2}$ poll. latae. SEGMENTA petiolo 1—3-lineari semitereti marginato apice nodoso-articulato tomentoso instructa, 3—15 lin. longa, circiter 12 lin. lata, interstitiis in eodem latere 5—11-linearibus remota, alterna, patentissima, membranacea, saturate viridia subtus pallidiora; segmenta superiora decrescentia; terminale majus,

longe petiolatum. NERVUS PRIMARIUS palmatus, luteus, supra hirtulus. NERVI SECUNDARIJ graciles, dichotomi, liberi, elevati. PILI gemmarum basi ramosi s. furcati, subnodoso-articulati, flavi, e cellulis circiter 5 compositi; cellula terminalis subulata curvata vel hamata.

Hujus speciei insignis adhuc solummodo pinnulae steriles observatae sunt.

Habitat in Serra de S. Isabel et S. Luzia, prov. Minarum: Pohl.

§. 2. Segmenta sterilia margine integra. Sp. 5—12.

5. LYGODIUM EXPANSUM Desv. pinnulis inferioribus sterilibus, conjugatis, petiolo communi vix semilineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 3—4, petiolatis, inferioribus aut trisectis aut hastatis, basi profunde cordatis, lacinia intermedia lateralibus triplo longiore oblongo-lanceolata, acuta, superioribus elongato-oblongis, apice rotundatis, basi horizontaliter truncatis, margine subrepandis incumbenti-serrulatis, supra glaberrimis, subtus in nervis puberulis; pinnulis superioribus fertilibus, pinnatisectis; segmentis lanceolatis, acuminatis vel elongato-oblongis apice rotundatis, inferioribus basi profunde cordatis, interdum tripartitis, margine plerumque a basi ad medium, rarius ultra, inciso-serratis et in lacinulas fertiles productis.

Tabula nostra XIII.

Lygodium expansum Desv. in Hamilt. Fl. Ind. occ. 463. Desv. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 205.

Lygodium volubile (Sw.) in Herb. Mus. Pal. Vindeb. (n. 272 ex Herb. Mus. Paris).

Hydroglossum expansum Poir. Enc. Suppl. III. 77.

RHACHIS PRIMARIA ut videtur pluripedalis, diametrum 2 lin. attingens, robusta, volubilis, scandens, supra plana, subtus convexa, glaberrima, cinnamomea. RHACHES SECUNDARIAE semiteretes, supra distincte marginatae, subtomentosae. PINNULAE ad 8 poll. longae, 6 poll. latae. SEGMENTA petiolo 3—4-lineari semitereti marginato, ad basin tumido, ad apicem nodoso-articulato, tomentoso instructa, 2—4 poll. longa, in medio 6—8 lin. lata, interstitiis in eodem latere 12-linearibus remota, alterna, patula; segmenta infima — aut trisecta, segmentis secundariis lateralibus sessilibus, raro petiolatis, lanceolatis, basi superiore oblique truncatis inferiore profunde cordatis, segmento intermedio lateralibus triplo longiore, oblongo-lanceolato, acuto, basi cuneato, — aut hastata, basi cordata, lacinulis lanceolatis inaequilongis; segmenta superiora elongato-oblonga interdum lanceolata, acuminata, vel non raro apice rotundata, basi subcordata, vel horizontaliter truncata, plus minusve auriculata, dense coriacea, supra saturate, subtus pallidius viridia, nitentia. NERVUS PRIMARIUS flavus, supra hirtulus. NERVI SECUNDARIJ minus approximati validi, parum curvati, dichotomi, liberi, valde elevati. LACINULAE FERILES bilineares rectae, laxae dispositae, parum hirsutae, subtus in quovis latere 5—6 sporangia gerentes, basi hinc inde serratura sterili instructae. PILI gemmarum basi crassiores, ramosi s. furcati, nodoso-articulati, e cellulis 4—5 compositi, subhyalini, farcti, cellulae inferiores 3 breves, sequentes 1—2 elongatae, terminalis subulata subcurvata. SPORAE tetraedrae, basi convexae, tuberculato-asperae, virescentes vix pellucidae.

Haec species a congeneribus facile distinguitur: substantia dense coriacea, segmentis sterilibus infimis aut ad basin trisectis, segmentis secundariis lanceolatis, intermedio triplo longiore; aut hastatis, basi cordatis, lacinulis lanceolatis.

Habitat in Guiana gallica. (Vidi specimina duo in Herbario Martii, tertium in Herb. Mus. Pal. Vindeb.)

6. LYGODIUM LUCENS KAULF. pinnulis inferioribus sterilibus, conjugatis, petiolo commune semi-lineari, pinnatisectis; segmentis permagnis, in quovis latere plerumque 4, petiolatis, elongato-oblongis, longe acuminatis aut apice rotundatis, interdum emarginatis, inferioribus basi rotundato-subcordatis auriculatis, superioribus oblique truncatis, margine inaequaliter argute incumbente serratis, utrinque glaberrimis; pinnulis superioribus fertilibus, pinnatisectis; segmentis supra basin ad medium, rarius toto margine inciso-serratis et in lacinulas fertiles productis, saepius apice longo, plus minusve acuminato, nudo, incumbenti-serratis.

Tabula nostra XIV. f. 7. 8. Segmenta.

Lygodium lucens Kaulf. Enum. Fil. 47.

Hydroglossum volubile Raddi Fil. Brasil. 68. tab. 81 (excl. synon.).

RHACHIS PRIMARIA usque ad decem ped. longa, diametrum $1\frac{1}{2}$ lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana, subtus convexa glabra. RHACHES SECUNDARIAE teretes supra planae marginatae, tomentosae, luteae. PINNULAE pedales, 6 poll. circiter latae. SEGMENTORUM PETIOLI 2—4 lin. (in segmentis fertilibus atque adeo 6 lin.) longi semiteretes marginati, ad basin tumidi, ad apicem nodoso-articulati, tomentosi. SEGMENTA STERILIA ad 5 poll. longa, in medio 1 poll. lata, interstitiis in eodem latere (non ex transverso) 18-linearibus remota, alterna, patula, tenuiter coriacea, pellucida, laete viridia, supra nitentia. NERVUS PRIMARIUS subflexuosus, luteus, supra hirtulus. NERVI SECUNDARIJ satis remoti, dichotomi, liberi, utrinque valde elevati. SEGMENTA FERILIA magnitudine valde diversa, interdum 1 poll., adulta non raro usque ad 7 poll. longa. LACINULAE FERILES pro ratione aetatis $1\frac{1}{2}$ —7 lin. longae, minus dense et saepe interrupte dispositae, subglabrae, subtus in quovis latere usque ad 20 sporangia gerentes, basi utrinque serratura sterili instructae. PILI gemmarum basi ramosi s. furcati, nodoso-articulati, e cellulis usque ad 9 compositi; cellulae inaequilongae, inferiores breviores, superiores duplo longiores, terminalis acicularis curvata; omnes flavescentes, valde pellucidae, farctae. SPORAE tetraedrae, basi convexae, tuberculato-asperae, flavescentes, valde pellucidae.

Habitat in Brasilia: Otto (ex Kaulfuss); prope Rio de Janeiro: Gaudichaud; in locis montosis, ubi plantis ipsi proximis adhaeret et saepe ad altitudinem decem pedum crescit: Raddi; in sylvis caeluis, ad arbores scandens: M. (Herb. Fl. Brasil. n. 368, partim); ad Mygy das Cruzes, prov. S. Pauli: M.; ad urbem S. Luiz, prov. Maranhannensis: M.; ad Oeiras, prov. Piahiensis: M.; ad Bahia: Lhotsky; ad Ponta de Trjoca, prov. Paraisensis: M.

OBSERVATIO. Formam monstrosam infra descriptam, in Herb. Zuccarinii assertam, pills ipsis gemmae structuram monstrosam demonstrare notabile est. Pili plerumque hyalini sunt, cellulae eorum nonnunquam abbreviatissimae, constrictae, curvatae, conformationem monstrosam perspicue significantes.

LYGODIUM LUCENS (?) forma monstrosa: segmentis sterilibus oblongo-lanceolatis, inferioribus basi profunde cordatis tripartitis, lacinulis lateralibus inaequalibus, triangularibus et lanceolatis, cuspidatis, margine repandis inaequaliter obtuse incumbenti-serrulatis; segmentis fertilibus utrinque 4, elongato-oblongis, apice aut acuminatis aut rotundatis aut fissis, inaequilongis, inferioribus basi profunde cordatis auriculatis vel inciso-lobatis, sequentibus basi subhorizontaliter abscissis, indistincte cordatis, omnibus margine aut a basi ad apicem inciso-serratis et in lacinulas fructiferas productis, aut apicem versus sterilibus et vario modo irregulariter incisus dentatisque, sicut sterilibus serratis; segmentis atrisque subtus dense puberulis; lacinulis fructiferis 1—2-linearibus utrinque pilosis.

7. LYGODIUM ACUMINATUM J. W. STURM pinnulis superioribus fertilibus, conjugatis, petiolo communi vix semilineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 5—6, petiolatis, triangulari-lanceolatis, longe acuminatis, inferioribus basi auriculata inciso-trilobis, profunde cordatis, superioribus cordato-truncatis, margine a basi apicem versus inciso-serratis et in lacinulas fertiles productis, apice ipso

usque ad pollicarem nudo, incumbenti-serrulatis, utrinque glabris.

Tabula nostra XIV. f. 12. Segmentum.

Lygodium venustum in Herb. Mus. Palat. Vindob.

RHACHIS PRIMARIA pluripedalis, diametrum $1\frac{1}{2}$ lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana submarginata, subtus convexa, glabra, testacea. RHACHES SECUNDARIAE semiteretes, subanguloso-flexuosae, supra indistincte marginatae, undique tomentosae. PINNULAE circiter 9 poll. longae, 7 poll. latae. SEGMENTA petiolo $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ -lineari tereti submarginato, ad basin tumido, ad apicem nodoso-articulato tomentoso instructa, circiter 4 poll. longa, 6—7 (sc. omissis lacinulis fertilibus et cum iis 11—13) lin. lata, interstitiis in eodem latere 10—12-linearibus remota, alterna, patula, membranacea, laete viridia supra nitentia. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, supra hirtulus, flavescens. NERVI SECUNDARIJ remoti, validi, dichotomi, liberi, elevati. LACINULAE FERTILES angustae, quadrilineares, subcurvatae, dense dispositae, utrinque hirsutae, subtus in quovis latere 8—10 sporangia gerentes, saepe basi utrinque serratura sterili instructa. PILI gemmarum nodoso-articulati, basi ramosi s. furcati, flavo-fusciduli pellucidi, farcti, e cellulis circiter 4—5 compositi; cellula terminalis subulata plerumque serpentina-curvata. SPORAE tetraedrae, basi convexae, minutissime tuberculato-asperae, flavescens pellucidae.

Pinnulas steriles hujus speciei — quam non nisi e tribus exemplaribus fertilibus, omnibus haud dubio a b. Pohl l. c. lectis, novi — non vidi, attamen crediderim speciem propriam esse. A proxima specie *L. hirtum* differt: segmentis glabris, omnibus basi plus minusve cordatis, apice plerumque longe acuminatis, lacinulis fertilibus longioribus, angustioribus.

Habitat inter virgulta prope Rio de Janeiro e. g. in monte Corcovado, ad Agua de Serra: Pohl n. 3559.

8. LYGODIUM HIRTUM KAULF. pinnulis superioribus fertilibus, conjugatis, petiolo communi $\frac{1}{2}$ -lineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 6—7, petiolatis, triangulari-lanceolatis vel triangulari-linearibus, acuminatis, acutis vel obtusis, inferioribus basi auriculata profunde cordatis, saepe pinnatisectis aut ternatis, superioribus basi cuneatis, margine a basi apicem versus inciso-serratis et in lacinulas fertiles productis, apice ipso ad pollicem et ultra nudo incumbenti-serrulatis, supra glabris, subtus dense puberulis.

Tabula nostra XIV. f. 15. 16. Segmenta.

Lygodium hirtum Kaulf. Enum. Fil. 47. Presl Suppl. Tent. Pterid. 104 (excl. var. β . lucens).

Lygodium hastatum Herb. Reg. gen. Berol. (partim).

RHACHIS PRIMARIA certissime pluripedalis, diametrum 2 lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana, subtus convexa, glabra, colore cinnamomea. RHACHES SECUNDARIAE semiteretes, subflexuosae, supra indistincte marginatae undique tomentosae. PINNULAE circiter pedales, ad 8 poll. latae. SEGMENTA petiolo 2—5-lineari semitereti, ad basin tumido, ad apicem nodoso-articulato densissime hirtulo instructa, $2\frac{1}{2}$ —5 poll. longa, 6—7 lin., cum lacinulis fertilibus circa 14 lin. lata, interstitiis in eodem latere 9—17-linearibus remota, alterna, patula, coriacea, saturate viridia, supra nitentia, glabra, subtus dense puberula. NERVUS PRIMARIUS gracilis, supra dense hirtulus flavescens. NERVI SECUNDARIJ approximati, graciles, dichotomi, liberi, subelevati. LACINULAE FERTILES trilineares subcurvatae, dense dispositae, utrinque hirsutae, subtus in quovis latere 9—15 sporangia gerentes, plerumque basi utrinque serratura sterili instructa. PILI gemmarum basi vix crassiores, 2—4-ramosi, indistincte nodoso-articulati, e cellulis 5—8 compositi, hyalini, farcti; cellulae 3—4 inferiores breves, vix longiores

quam latae, sequentes duplo longiores, terminalis subulata curvataque. SPORAE magnae, tetraedrae, basi convexae, tuberculatae-asperae, pallide virescentes subpellucidae. — Pinnulas steriles non vidi.

Habitat prope Rio de Janeiro: Otto (ex Kaulfuss); Beyrich, Sellow (Herb. Reg. Berol. n. L. 59. B. 644), M.

9. LYGODIUM PUBERULUM J. W. STURM pinnulis superioribus fertilibus, conjugatis, petiolo communi semilineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 6—8, petiolatis, infimis subdivaricatis, lineari-lanceolatis, apice rotundatis vel acuminatis, infimis inferne pinnatisectis, mediis basi profunde cordatis manifeste auriculatis, superioribus cordato-truncatis, margine a basi ima ad extremum inciso-serratis in lacinulas fructiferas productis, rarius apice nudo acute, serrulatis, subtus dense puberulis.

Lygodium hastatum in Herb. Reg. Brasil. Berol. (partim).

Lygodium a. in Herb. Reg. gen. Berol.

RHACHIS PRIMARIA ut in congeneribus pluripedalis, diametrum $1\frac{1}{4}$ lin. attingens, supra plana subglabra, subtus convexa glaberrima, testacea. RHACHES SECUNDARIAE semiteretes, subanguloso-flexuosae, dense tomentosae. PINNULAE circiter 6 poll. longae, 5 poll. latae, patentissimae. SEGMENTA petiolo sublineari tereti, ad apicem nodoso-articulato, densissime tomentoso instructa, 2— $2\frac{1}{2}$ longa, in medio circiter 4 lin. (cum lacinulis fertilibus 6 lin.) lata, interstitiis in eodem latere 7-linearibus remota, infima subdivaricata, summa patula, dense coriacea, obscure viridia, supra nitentia. NERVUS PRIMARIUS gracilis, utrinque dense hirtulus, supra brunnescens. NERVI SECUNDARIJ validi, minus remoti, dichotomi, liberi, elevati, supra sparse pilosi. LACINULAE FERTILES $\frac{1}{2}$ —1-lineares, rectae, utrinque hirsutae, subtus in quovis latere 4—7 sporangia gerentes, basi interdum serratura sterili instructa. PILI gemmarum basi 3—4-ramosi et supra basi uni-ramosi, nodoso-articulati, e cellulis 6—7 compositi, hyalini, farcti; cellulae 3—4 inferiores breves, vix longiores quam latae, sequens latior et longior, apice ramosa, cellulae tres superiores elongatae, aequilongae, terminalis subulata curvata. SPORAE magnae, tetraedrae, basi convexae, tuberculato-asperae, pallide virescentes, subpellucidae.

Species ob segmenta subtus puberula cum nulla alia praeter *L. hirtum* Kaulf. confundenda, a qua autem differt: segmentis subduplo minoribus, sublinearibus. — Pinnulas steriles non vidi.

Habitat in Brasilia meridionali: Sellow.

10. LYGODIUM HASTATUM Desv. pinnulis inferioribus sterilibus, conjugatis, petiolo communi semilineari, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 3—5, petiolatis, lineari-lanceolatis, acuminatis, inferioribus basi subaequalibus profunde cordatis subauriculatis, superioribus basi horizontaliter abscisis, margine inaequaliter incumbenti-serrulatis utrinque glabris vel subtus pilosiusculis; pinnulis superioribus fertilibus pinnatisectis, segmentis subtriangulari-lanceolatis, aut basi integris truncato-cordatis, aut auriculato-subhastatis, aut inferioribus pinnatisectis, margine inciso-serratis, a basi ad apicem in lacinulas fertiles productis, vel frequentius apice nudis; rhachibus secundariis supra anguste-marginatis, tomentoso-hirtulis.

Tabula nostra XIV. f. 13. 14. Segmenta.

Lygodium hastatum Desv. Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 204. — Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 118. tab. 57.

fig. 1 (excl. syn. Kaulf. et Willd.). Kunze Commentar. in Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora od. ally. bot. Zeit. 1839. I. Beibl. 46. n. 368. (excl. syn. Willd.). Presl Suppl. Tent. Pterid. 104. Link Fil. Sp. H. Berol. 28.

Lygodium varium Link Hort. b. Berol. II. 140.

Hydroglossum heptaphyllum Schrad. in Götting. gel. Anzeig. 1824. 863.

Ophioglossum scandens Vellozo Fl. Flum. XI. tab. 53. (pes-sima).

RHACHIS PRIMARIA saepe ad 20 pedes longa, diametrum 1 lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana marginata tomentosa, subtus convexa glabra, flavescens. RHACHES SECUNDARIAE teretes, supra planae anguste marginatae, tomentoso-hirtulae. PINNULAE 5—8 poll. longae, circiter 5 poll. latae. SEGMENTA petiolo 2—3-lineariter semitereti marginato, ad basin tumido, ad apicem subnodoso-articulato tomentoso instructa, 2—4 poll. longa, 6—10 lin. lata, interstitiis in eodem latere circiter 10-linearibus remota, alterna, patentissima, dense coriacea, supra saturate, subtus pallidius nitentia. NERVUS PRIMARIUS gracilis, luteus, supra hirtulus. NERVI SECUNDARIJ approximati, dichotomi liberi, utrinque elevati. LACINULAE FERTILES bilineares, dense dispositae, glabrae, subtus in quovis latere 6—10 sporangia gerentes, basi utrinque serratura sterili instructae. PILI gemmarum cylindrici, basi crassiores, ramosi s. furcati, nodoso-articulati, e cellulis usque ad 8 compositi, hyalini, quandoque flavescens, farcti, ad articulationes brunnescentes; cellulae 3—4 inferiores breves, sequentes angustiores, duplo longiores, terminalis subulata curvata, SPORAE tetraëdrae basi convexae, tuberculato-asperae, pallide flavescens, pellucidae.

Habitat in sylvis aboriginibus, ad arbores scandens in prov. Rio de Janeiro: M., Pohl n. 3860, Gardner n. 1838, Sellow; in prov. Minarum: Claussen n. 368, in Serro Frio: M.; in prov. Bahiensi: Princ. Max. Neovidensis, Luschnath n. 94, Blanchet.

11. *LYGODIUM VOLUBILE* SWARTZ pinnulis inferioribus sterilibus, conjugatis, petiolo communi brevissimo, pinnatisectis; segmentis in quovis latere 2—4, petiolo marginato, linearilanceolatis, acutis vel apice rotundatis, inferioribus interdum auriculatis, basi vix cordatis, superioribus cuneatis, omnibus margine incumbentis-serrulatis utrinque glabris; pinnulis superioribus fertilibus pinnatisectis; segmentis infimis interdum pinnatisectis margine plerumque a basi ad extremum inciso-serratis et in lacinulas fertiles productis; rhachibus secundariis supra apicem versus late marginatis subglabris.

Tabula nostra XIV. f. 17. 18. Segmenta.

Lygodium volubile Swartz Syn. Fil. 152. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 528. Presl Suppl. Tent. Pterid. 103. Presl Die Gefässbündel im Stipes der Farnn 21. tab. 4. fig. 13. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 114. ? Brackenr. U. H. Expl. Exped. XVI. 300 (excl. syn. Vellozo).

Lygodium scandens Schkuhr Krypt. Gewächse 138. tab. 138.

Lygodium polymorphum Weigelt Pl. Surinam. exsicc.

Hydroglossum volubile Willd. Sp. Pl. V. 78.

Osmunda scandens Aublet Hist. d. pl. de la Guiane. fr. II. 961 (ex Presl).

RHACHIS PRIMARIA pluripedalis, diametrum 1—1½ lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana marginata subtomentosa, subtus convexa glabra, pallide cinnamomea. RHACHES SECUNDARIAE teretes, supra planae et distincte apicem versus lato-marginatae, subglabrae. PINNULAE usque ad 6 poll. longae, 7 poll. latae. SEGMENTA petiolo circiter bilineari semitereti lato-marginato ad apicem nodoso-articulato subglabro instructa, circiter 4 poll. longa, medio 5—8 lin. lata, interstitiis in eodem latere 10—11-linearibus remota, alterna, patentissima, coriacea, supra saturate, subtus pallidius viridia, utrinque nitentia. NERVUS PRIMARIUS gracilis, supra hirtulus. NERVI SECUNDARIJ satis remoti, dichotomi, liberi, elevati. LACINULAE Schizaeac.

FERTILES 1-lineares, densissime dispositae, sparse pilosae, subtus in quovis latere 5—6 sporangia gerentes, basi rarius serratura sterili instructae. PILI gemmarum basi crassiores, ramosi s. furcati, nodoso-articulati, e cellulis 3—4 compositi, pallide flavescens, valde pellucidi, farcti; cellulae inferiores perbreves, terminalis subulata parum curvata. SPORAE tetraëdrae, basi convexae subtuberculato-asperae, flavescens, pellucidae.

Habitat in vicinia Para: Spruce n. 384; in Guiana anglica: Schomburgk n. 149 et 249; in Surinam: Weigelt, Coll. pl. Surinam.; in sylvaticis prope Paramaribo: Wulfschlaegel n. 665.

12. *LYGODIUM MICANS* J. W. STURM pinnulis superioribus fertilibus, conjugatis, petiolo communi brevissimo, pinnatisectis; segmentis in quovis latere circiter 3, petiolatis, oblongo-ellipticis, apice breviter acuminatis, inferioribus basi subhorizontaliter truncatis, non cordatis, superioribus rotundatis, subcuneatis, margine inciso-serratis et in lacinulas fertiles productis, apice raro basin versus semper nudis et crenulato-obtusis-serratis, utrinque glaberrimis, micantibus.

Lygodium volubile Herb. Reg. gen. Berol. Coll. Schomb. n. 399.

Lygodium hirtum β. lucens Presl Suppl. Tent. Pterid. (quoad plantam Schomburgkianam).

RHACHIS PRIMARIA diametrum 1½ lin. attingens, volubilis, scandens, supra plana, subtus convexa, glaberrima, dilute cinnamomea. RHACHES SECUNDARIAE teretes, non flexuosae, manifeste marginatae, apicem versus anguste alatae, parum tomentosae. PINNULAE circiter 1 ped. longae, 8 poll. latae. SEGMENTA petiolo circiter 2-lineariter, ad basin tumido ad apicem nodoso-articulato, late marginato subglabro instructa, usque ad 6 poll. longa, 1 poll. lata, interstitiis (ejusdem lateris) ad 17-linearibus remota alterna, patula, dense coriacea, utrinque glaberrima, (statu exsiccato) rufidula, micantia, subtus pallidiora. NERVUS PRIMARIUS supra pilosus, flavo-brunnescens. NERVI SECUNDARIJ remoti, dichotomi, liberi, elevati. LACINULAE FERTILES sesquilineares, densissime dispositae, subglabrae, subtus in quovis latere 5—7 sporangia gerentes, rarissime basi serratura sterili instructae. PILI gemmarum subulati, basi ramosi s. furcati, nodoso-articulati, e cellulis 3 compositi, flavo-brunnescentes; cellula terminalis acicularis, curvata, hyalina. SPORAE tetraëdrae, basi convexae, tuberculato-asperae, flavescens, subpellucidae.

Quamquam hanc speciem solummodo ex specimine unico fertili noverim, ab omnibus tamen speciebus hujus florum abunde diversam censeo: segmentis ad 6 poll. longis, 1 poll. latis, subellipticis, dense coriaceis, micantibus.

Habitat in Guiana anglica, loco natali non indicato: Schomburgk n. 399. Verisimiliter etiam in Brasilia septentrionali.

II. SCHIZAEA SMITH.

SCHIZAEA J. E. Smith in Act. Turin. V. 419. tab. 9. fig. 9. Endl. Gen. Plant. 65. n. 662. Hook. Gen. Fil. tab. 19. Meisner Gen. Plant. 435 (336). Presl Suppl. Tent. Pterid. 73. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 114. — ACTINOSTACHYS Wallich Catal. n. 1. Hook. l. c. tab. 111. Presl l. c. 72. — LOPIDIUM Rich. — RIBIDIUM Bernh. in Schrad. Journ. 1800. II. 127. tab. 2. fig. 3.

LACINIAE FERTILES digitatim vel pinnatim dispositae, subtus utrinque secus nervum medianum sporangia uni-

vel biserialia, parenchymati adnata gerentes. SPORANGIA subsessilia, ovata, recta, vertice annulo completo transverso praedita, longitudinaliter extrorsa (quum sporangia biserialiter disposita, series interna introrsa) dehiscentia, paleis stipata, margine laciniarum revoluto continuo vix velata. SPORAE oblongae vel reniformes, laeves vel tuberculatae.

RHIZOMA breve, erectum vel horizontale, repens, pilis articulatis dense obsitum. FRONDES aut stipitiformes, lineares, indivisae, divisae vel dichotomae, triangulares, semiteretes vel compressae, dense coriaceae; aut superne lamina flabelliformi terminatae. STIPES pedalis et ultra, quadrangularis, supra planus canaliculatus, subtus convexus, apicem versus complanatus, dilatatus marginatus, FASCICULUM VASORUM teretem crassum centram includens. LAMINA flabelliformis, aut indivisa, aut bi-multifida, aut flabelliformi-dichotoma, basi cuneata acuta, coriacea, nitida. LOBI (s. lacinae) nunc cuneato-flabelliformes, apice grosse dentati vel longe cuspidati, nunc anguste lineares. NERVUS MEDIANUS nunc indivisus nunc dichotomus; aut NERVI flabellato-dichotomi, utrinque elevati, ramis in dentes marginales excurrentibus et ad apicem in segmenta fertilia productis. LACINIAE segmentorum fertilium lineares, obtusae vel subulatae, rectae vel falcatae, NERVO PRIMARIO (varius utrinque nervo secundario) instructae, marginatae, supra margineque PALEIS taeniaeformibus angustis, sporangia involucribus vestitae.

Species hujus generis in regione extratropica et intratropica Asiae, Africae, Novae Hollandiae et Americae provenientes.

SECT. 1.

(Subgenus 1. ACTINOSTACHYS.)

Frondes lineares, indivisae, ad apicem in segmenta fertilia digitato-pinnatisecta productae. Sporangia quadriseriatim disposita.

1. SCHIZAEA SUBTRIJUGA Mart. fronde gracili, simplicissima, lineari, plana, flexuosa, subtriangulari, supra nervo semitereti elevato perducta, margine subincrassata plerumque inflexa, sectione transversali semilunata, subtus subcanaliculata; segmentis fertilibus digitato-pinnatisectis; laciniis in quovis latere 2—5, confertis, erectis, linearibus, subflexuosis, apice subulato-incurvis.

Schizaea subtrijuga Martius Icon. Pl. Crypt. Brasil. 117 (in indic. Schiz. subtriloba). Kunze Farnkräut. 1. 239. tab. 98. fig. 1. Ejusd. in Linnaea XXI (1848). 204.

Actinostachys subtrijuga Presl Suppl. Tent. Pterid. 73.

RHIZOMA tenue, horizontale, pilis dense obsitum. FRONDES plurimae ex eodem rhizomate, caespitosae, erectae, 4—6 poll. longae, 1/2 lin. latae, coriaceae, glaberrimae, olivaceo-virides, opacae, basi vix attenuatae fuscae; STERILES apice attenuato-subulatae, FERTILES apice curvatae, subtortuosae, vix attenuatae. LACINIAE segmentorum fertilium 5—10 lin. longae, 1/3 lin. latae, supra et in margine paleis taeniaeformibus angustis tortuosis subferugineis pellucidis obsessae, subtus convexiusculae glabrae. PILI rhizomatis cylindrici, constricto-articulati, flavo-brunnei, subpellucidi, e cellulis circiter 7 compositi; cellulae subaequilongae, terminalis praecedenti vix longior subulata. SPORANGIA subquadriseriata, breviter ovalia, annulo 13-radiato praedita. SPORAE oblongae, albidae, fovea rotunda signatae, laeves.

Habitat in subcampestribus prov. do Alto Amazonas, e.g. ad Arara-Coara et Cupati, montes in ditone Japurá: M.; in vicinia Barra: R. Spruce n. 869; — in Guiana anglica: Rob. Schomburgk n. 274.; in Surinam ad truncum putrescentem prope viam Oude Reidweg inter Quarta et Poelbantje: Kegel n. 379.

2. SCHIZAEA PENNULA Swartz fronde valida, simplicissima, lineari-triangulari, lateribus subaequalibus, concavis, angulis acutis, segmentis fertilibus digitato-pinnatisectis; laciniis in quovis latere 4—6, confertis, junioribus strictis, adultioribus subfalcato-secundis, flexuosis, lineari-sublanceolatis, basi attenuatis, apice obtusiusculis involutis.

Schizaea pennula Swartz Syn. Fil. 150 et 359. Kunze in Linnaea IX (1834). 19, XXI (1848). 204.

Schizaea penicillata Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Pl. V. 86. Humb. Bonpl. et Kunth Nov. Gen. I. 86.

Schizaea trilateralis Schkuhr Krypt. Gewächse 137. tab. 136. Hook. et Grex. Icon. Fil. I. tab. 54. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 528. Splitgerb. Enum. Fil. Surinam. in Hoev. et Vriese Tijdschrift 1840. 433.

Acrostichum pennula Poir. Enc. Suppl. I. 125.

Actinostachys pennula Hook. Gen. Fil. tab. 111, a. Presl Suppl. Pterid. 73.

Actinostachys trilateralis J. Smith in Hook. Lond. Journ. I. 202.

RHIZOMA validum, horizontale, pilis dense obsitum. FRONDES plurimae ex eodem rhizomate caespitosae, erectae, 9-poll. usque pedales et ultra, 1 lin. latae, coriaceae, glaberrimae, laete virides, nitidae, basin versus sensim attenuatae subrubiginosae; STERILES apice parum attenuatae, acutae; FERTILES apice breviter attenuatae, tortuosae, curvatae. LACINIAE segmentorum fertilium 9—13 lin. longae, supra et in margine paleaceae, subtus convexiusculae, glabrae. PALAEAE taeniaeformes, tortuosae, fuscidae, pellucidae. PILI rhizomatis cylindrici, valdi, constricto-articulati, fuscii, imPELLUCIDI, e cellulis circiter 7 compositi; cellulae inferiores breves, subaequilongae, terminalis praecedenti duplo longior curvata subulata. SPORANGIA quadriseriata, oblongo-ovata, annulo 13-radiato praedita. SPORAE oblongae, albae, laeves.

Habitat in turfosis prope Rio de Janeiro: Begrich, Schott, Sellow, Claussen, Pohl; in Porto d'Estrella: Sellow; in sylvicis prov. Sebastião-politanae, locis altis aridioribus: Langsdorff; in paludosis Serra da Broca: Mart. Herb. Fl. Brasil. n. 190; in campis ad Arara-Coara et in adscensu ejusdem montis, in locis apricis, siccis, saxosis: M.; in vicinia Barra, prov. do Alto Amazonas: R. Spruce n. 866; in arenosis madidis camporum ad Collares ad ostium fluminis Amazonum: Poeppig; — ad ripas fluminis Nigri (Rio Negro) inter San Carlos et Tomo: Humboldt et Bonpland; in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 143; in Guiana batava: Hostmann n. 566, Kappler n. 1745, Wulfschlaegel n. 1202, Kegel n. 452.

SECT. 2.

(Subgenus 2. EUSCHIZAEA.)

Frondes lineares divisae vel dichotomae, ad apicem in segmenta fertilia pectinato-pinnatisecta productae. Sporangia biserialiter disposita.

3. SCHIZAEA INCURVATA Schkuhr fronde gracili, lineari, supra profunde canaliculata, angulis obtusis, subtus convexa (statu siccio marginata), superne ad medium usque fere bifida; laciniis iterum infra medium usque bifidis, segmentis fertilibus rectis s. incurvatis, pectinato-pinnatisectis; laciniis in quovis latere 15—25, confertis, secundis, patentibus incurvatis, linearibus, apice rotundatis.

Schizaea incurvata Schkuhr Krypt. Gewächse 138. tab. 137. Desv. Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 202. Kunze in Linnaea XXI (1848). 204.

Schizaea bifida Meyer Primit. Flor. Essequibens. 292 (excl. syn.). Kunze in Linnaea IX (1834). 19 (excl. syn. Willd.). Spitzgerb. Enum. Fil. Surinam. in Hov. et Vriese Tydschrift 1840. 46 (excl. syn. Swartz, Willd.).

Schizaea bifida β . *incurvata* Presl Suppl. Tent. Pterid. 75.

RHIZOMA repens, pilis dense obsitum. FRONDES caespitosae 6—9 poll. longae, $\frac{1}{4}$ lin. latae, coriaceae, superne glaberrimae, laete virides, nitidae, basin versus nigro-brunneae et sparse pilosae; STERILES apice attenuatae subcurvatae vel subulatae; FERTILES apice non attenuatae subcurvatae, interdum tortuosae. SEGMENTA FERTILIA 6—9 lin. longa, eorum rhachis subtus prominens, plana sulcata glabra. LACINIAE 1— $1\frac{1}{2}$ lin. longae, supra et in margine paleis taeniaeformibus tortuosis pallide stramineis valde pellucidis obsessae, subtus subplanae glabrae. PILI rhizomatis et in basi frondis validi, constricto-articulati, dilute flavido-brunnei, pellucidi, e cellulis circiter 4 compositi; cellulae ellipticae, perlongae, terminalis longissima, apicem versus attenuata magis minusve subulata. SPORANGIA biserialia, oblongo-ovata, annulo 19-radiato praedita. SPORAE oblongae, subreniformes, verruculosae, flavescentes.

Habitat in vicinia Barra, prov. do Alto Amazonas: R. Spruce n. 868; in arenosis madidis camporum (Campinas) ad Collares et ad ostia fluvii Amazonum, prov. Paraënsis: Poeppig; — in arenosis Surinami prope Joden-Savanna: Weigelt, Spitzgerber, Hostmann et Käppler n. 623, Wulfschlaegel n. 1203. Kegel n. 1077; in Essequibo arenosis infra rivum Arouabiskreek: Rodschied; — in Guiana anglica: Schomburgk n. 274.

OBSERVATIO I. Beat. Schkuhr in suo opere merito „Krypt. Gewächse“ p. 138, per errorem dicit: „Das unterste Ende des Laubes ist mit bandartigen Franzen (a) bekleidet“, e contrario pars inferior frondis pilis perspicue articulatis instructa est. Fig. a paleam taeniaeformem segmenti fertiles demonstrat.

OBSERVATIO II. *Schizaea bifida* Swartz planta Australiensis cui b. Presl plantam nostram quasi varietatem addidit, species diversa est.

4. SCHIZAEA POEPPIGIANA J. W. STURM fronde superne flabelliformi-dichotoma; laciniis sterilibus erecto-patentibus, dense compositis, anguste linearibus compressis, supra canaliculatis late marginatis, marginibus acutis, apicem versus revolutis, subtus convexiusculis, medio nervo elevato perductis, utrinque inprimis subtus et apicem versus muriculatis, muricibus minutissimis acutis albidis; stipite quadrangulati, robusto, supra leviter canaliculato, ad apicem plano marginato, subtus convexo, basin versus flexuoso nigro-brunneo, piloso.

Schizaea dichotoma Kunze in Linnaea IX (1834). 19 (excl. syn.). Presl Suppl. Tent. Pterid. 75 (quoad plantam Poeppigianam et Schomburgkianam). Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 528.

RHIZOMA breve, erectum, pilis articulatis (oculo nudo) pallide ferrugineis densissime obsitum, radiculis perlongis subsimplicibus gracilibus longe pilosis. STIPES 6—9 poll. longus, diametrum $\frac{3}{4}$ —1 lin. attingens. LAMINA frondis (i. e. pars superior divisa) 2—5 poll. lata, circiter 3 poll. alta, coriacea, glabra, obscure viridis nitida; LACINIAE ultimae 9—14 lin. longae, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ latae. PILI rhizomatis cylindrici, validi, subconstricto-articulati, straminei, pellucidi, ad articulationes brunnescentes, e cellulis 4—6 compositi, cellulae infimae breves, reliquae perlongae subellipticae, terminalis apice acuta plerumque uncinata. PILI stipitis cylindrici, cellulae perlongae, terminalis, acicularis.

Habitat in montibus Canuku Guianae anglicae: Rich. Schomburgk (Herb. Reg. Berol. n. 1189); ad Ventanilla de Cassapillo Peruviae: Poeppig. Probabiliter in confinibus etiam Brasiliae provincis reperitur.

OBSERVATIO. Mihi persuasum est, plantam americanam, inprimis a Cel. Poeppigio in Peruvia, dein a Cel. Rich. Schomburgkio in Guiana anglica

lectam, pro *Schizaea dichotoma* Willd. habitam, ab ea segregandam esse. Non dubito, quin disquisitiones accuratiores demonstrant, *Sch. dichotomam* complures species comprehendere, nam certe planta novohollandica alia species quam planta mascarenensis est. Hujus speciei vidi solas tres frondes steriles, a V. C. Rich. Schomburgkio lectas, in Herb. Reg. Berol. sub Nr. 1189 asservatas, quae a frondibus speciminum novohollandicorum, africanorum asiaticorumque differunt: laciniis magis condensatis, densius distinctisque muriculatis, magis nitentibus, densius coriaceis; pilis rhizomatis densioribus, pallidius ferrugineis, minus robustis.

B. Kunze (cf. Linnaea IX [1834]. p. 19) de exemplaribus a V. C. Poeppigio in Peruvia lectis, quae — id quod doleo — non comparare, itaque frondem fertilem non describere potui, scripsit: „Planta, aucta, quantum quidem mihi innotuit, nondum in America lecta, ab australi differre non videtur, nisi minute. Frondes duae steriles 5-pollicariae nascuntur e caudice tuberoso pisi magnitudine, supra rufo-paleaceo, subtus in processum verticalem fusiformem elongato, ubi vis longe fibroso, fibris pilosis. Divisurae frondis steriles $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lineae latae. Frons fertili, a rhizomate soluta, 8-pollicaris, ad $6\frac{1}{2}$ pollices simplex, dein dichotoma, appendicibus 22, quaevis jugis 7—8, junioribus strictis, adultioribus curvatis. Spicae incurvatae, margine crinitae. Reliqua, qualla Grevillei icon optima exhibet.“

SECT. 3.

(Subgenus 3. LOPHIDIUM.)

Frondes lamina flabelliformi aut indivisa, aut bi-multifida, aut dichotomo-flabellata terminatae. Nervi dichotomi-flabellati, in dentes laminae excurrentes et ad apicem in segmenta fertilia pectinato-pinnatisecta producti. Sporangia biserialiter disposita.

5. SCHIZAEA SPECTABILIS MART. lamina frondis simplicissima, indivisa, flabelliformi-semiorbiculari, basi in stipitem decurrente breviter cuneata, praeterea rectilinea, margine repanda obtuse-inaequaliter-dentata, dentibus triangularibus, apice involutis.

Tabula nostra XIV.

Schizaea spectabilis Martius Icon. Pl. Crypt. Brasil. 117.

Lophidium spectabile Presl Suppl. Tent. Pterid. 76.

Rhizoma et basis stipitis ignota sunt. STIPES (incompletus) 1 ped. longus, diametrum 1 lin. superans. LAMINA frondis $5\frac{1}{2}$ poll. alta, 11 poll. lata, dense coriacea, pulchre viridis, in pagina inferiore nitida. NERVI satis remoti, flabellato-dichotomi, in dentes excurrentes, supra ubique, subtus basi solummodo elevati.

Hujus speciei, ut videtur rarissimae, frons sterili, in Herbario Reg. Monacensi asservata, solummodo nota est. Species inter omnes congeneres maxima et lamina indivisa insignis.

Habitat in syleis umbrosis regionum fluvio Japurá conterminarum: M.

6. SCHIZAEA PACIFICANS MART. lamina frondis semiorbiculari vel semilunari, medio ad basin usque bipartita in lobos duos aequales; lobis basi cuneatis, margine interiore subhorizontaliter abscisis superne imbricatis, exteriori semicordatis, apice repandis et in lobulis inaequalibus fissis dentatisque, dentibus triangularibus subulatis; segmentis fertilibus pinnatisectis glabris; laciniis in quovis latere 4—5 linearibus rectis erecto-patentibus.

Schizaea pacificans Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 116. tab. 56. fig. 1.

Lophidium pacificans Presl Suppl. Tent. Pterid. 77.

Et rhizoma et pars inferior stipitis in specimine unico adhuc noto desunt. STIPES incompletus circiter 1 ped. longus, diametrum 1 lin. attingens subquadrangulatis tortuosus, supra canaliculatus angulis acutis, apicem versus

planus vix dilatatus in laminam transiens, sparse pilosus. LAMINA frondis superne 7 poll. lata, 4 poll. longa, coriacea, pulchre viridis nitida. DENTES circiter $1\frac{1}{2}$ lin. longi, basi 1 lin. lati. NERVI satis remoti, flabellato-dichotomi in dentes excurrentes, basi utrinque elevati, pills nonnullis obsessi. SEGMENTA FERTILIA $1\frac{1}{2}$ -linearia subtus basi canaliculata; eorum LACINIAE 1 lin. longae subtus convexusculae glabrae, supra dense paleaceae. PALEAE laciniarum taeniaeformes angustae tortuosae stramineae pellucidae. SPORANGIA biserialia annulo 14-radiato praedita. SPORAE oblongae vix tuberculatae flavescences subhyalinae.

Inter omnes hujus generis species haec pulcherrima, a congeneribus fronde semilunari diversissima. Unicum specimen, quod Herb. Reg. Monacense ornat, Princeps Indorum Miranharum, quum e regione occidentali captos inimicos domum duceret, apportavit, et Vir. Cel. de Martio tamquam amicitiae signum dono dedit. — Conf. Mart. Reise nach Brasilien Vol. III. p. 1264.

Habitat in sylvis aeternis secundum fluvium Pureos, qui in Japurá incidit: M.

7. SCHIZAEA FLABELLUM MART. lamina frondis obdeltoideo-flabelliformi, bi- aut duplicato-bipartita, basi in stipitem decurrente, margine rectilineo-cuneata, apice leviter rotundata, nunc ultra medium, nunc ad basin usque bipartita; lobis iterum bifidis, aut aequalibus, aut altero minore, in parte superiore marginis et apice dentatis, dentibus 1 lineae et ultra longis, basi triangularibus, ad extremum subcuspidatis; segmentis fertilibus pinnatisectis; laciniis in quovis latere circiter 12, linearibus, recurvato-patentibus.

Schizaea flabellum Martius Icon. Pl. Crypt. Brasil. 115. tab. 55. fig. 2. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 528. Kunze ibid. XXI (1848). 205. in nota.

Lophidium flabellum Presl Suppl. Tent. Pterid. 77.

? Lophidium latifolium Rich. Act. Soc. hist. nat. Paris 112. Turpin in Dict. de sc. nat. Acotyl. tab. 95. Presl l. c. 77.

RHIZOMA erectum, dense pilosum. STIPES 6—15 poll. longus, diametrum 1 lin. attingens, quadrangularis, supra canaliculatus, angulis acutis, apicem versus planus dilatatus, inferne sparse ad basin autem dense pilosus. LAMINA frondis 4—6 poll. longa, 3—7 poll. lata, coriacea, glabruscula, laete viridis, nitida. LOBI ad 3 poll. lati. NERVI flabellato-dichotomi, in dentes excurrentes, ad basin utrinque elevati, praecipue in pagina superiore. SEGMENTA fertilia circiter 5 lin. longa, eorum LACINIAE 2 lin. longae, subtus canaliculatae. PALEAE laciniarum fertilium taeniaeformes, tortuosae, fuscidae, pellucidae. PILI rhizomatis cylindrici, validi, articulati, constricti, pallide straminei, pellucidi, e cellulis 7—8 subaequilongis compositi; cellula terminalis apicem versus attenuata, acuta. SPORANGIA biserialia, annulo 10—11-radiato praedita. SPORAE ut in *S. eleganti*.

Haec species *S. eleganti* proxima, a qua lobis obdeltoideis dentibusque triangularibus diversa. An forma simplicior ejusdem speciei?

Habitat in sylvis horrendis ad Pagos Miranharum, in ditone fluvii Japurá, prov. do Alto Amazonas: M.; — in Guiana batava, prope Jordan Savana: Wulfschlaegel n. 1201; in arenosis sylvaeum Surinami superioris: Kappler n. 1739; in Guiana anglica, ad ripas fluminis Essequibo: Rich. Schomburgk n. 257 et 443; ad fluvium Orinoco: Ayres (in Herb. Reg. gen. Berol. n. 443).

8. SCHIZAEA ELEGANS SWARTZ lamina frondis flabelliformi, dichotoma; laciniis cuneiformi-oblongis, ad medium et ultra bipartitis, apice leviter rotundatis, cuspidato-laciniatis, cuspidibus 6—12 lin. longis; segmentis fertilibus pinnatisectis, subtus asperis; laciniis in quovis latere 10—15, linearibus, recurvato-patentibus.

Schizaea elegans Swartz Syn. Fil. 151. Willd. Sp. V. 88. Splitgerb. Enum. Fil. Surinam. in Hoen. et Vriese Tijdschrift 1840. 433. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 528. Kunze ibid. XXI (1848). 205 et XXV (1852). 746.

Acrostichum elegans Vahl Symb. II. 104. tab. 50.

Lophidium elegans Presl Suppl. Tent. Pterid. 77.

RHIZOMA breve, erectum, dense pilosum. STIPES 6—12 poll. longus, diametrum $1-1\frac{1}{2}$ lin. attingens, quadrangularis, supra canaliculatus, angulis acutis, apicem versus planus dilatatus, inferne sparse ad basin imam dense pilosus. LAMINA frondis 4—6 poll. longa, 4—12 poll. lata; lacinia 3—8 lin. lata, coriacea, glaberrima, laete viridis, nitida. NERVI flabellato-dichotomi, in cuspidibus excurrentes, ad basin utrinque elevati. SEGMENTA FERTILIA ad 4 lin. longa, subtus canaliculata, eorum lacinae ad 2 lin. longae, supra dense paleaceae, subtus convexusculae, glabrae. PALEAE laciniarum fertilium $\frac{1}{2}$ lin. longae, taeniaeformes, angustae, tortuosae, stramineae, pellucidae. PILI rhizomatis, cylindrici, validi, articulati, constricti, pallide straminei, pellucidi, e cellulis 7—8 subaequilongis compositi; cellula terminalis apice attenuata, acuta. SPORANGIA biserialia, annulo 14—15-radiato praedita. SPORAE oblongae, tuberculatae, stria longitudinali signatae, flavescences subhyalinae.

Habitat in sylvis et fruticetis Brasiliae meridionalis: Sellow; in St. Catharina: D'Urville; in vicinia Barra, prov. do Alto Amazonas: R. Spruce n. 867; — in Surinam: Hostmanh n. 304; inter Paramaribo et plantat. Quarta: Kegel n. 163; prope Paramaribo: Wulfschlaegel n. 699 et 690; in Guiana anglica, ad ripas fluminis Essequibo et Pirara: Rich. Schomburgk n. 264 et 626; in umbrosis Cumbre de Valencia, Venezuela: Wagner; in insula Trinidad: Ryan (teste Presl).

9. SCHIZAEA ATTENUATA BEYRICH lamina frondis obdeltoidea ad basin usque bipartita; laciniis cuneato-linearibus planis, fere usque ad medium bifidis, apice parum angustatis rectis, aut integerrimis, aut in duas lacinas fissis; segmentis fertilibus erectis, parum recurvatis, pinnatisectis subasperis; rhachi lineari basi latiore, superne attenuata, apice acuminata; laciniis in quovis latere 5—7 inferne confertis, superne remotis, subexplanatis recurvatis linearibus superne attenuatis, apice acuminato sporangiis destitutis.

Schizaea attenuata Beyrich Herb.

Schizaea elegans var. attenuata Kunze Herb.

STIPES in specimine unico, quod vidi, $4\frac{1}{2}$ poll. longus, diametrum $\frac{1}{3}$ lin. attingens, gracilis, subquadrangularis, supra canaliculatus, subtus convexus, apicem versus planus dilatatus, inferne tortuosus, usque ad medium et ultra brunneus, basin versus pills articulatis sparse obsitus. LAMINA frondis 19 lin. longa, coriacea glabra viridis nitida. LACINIAE in medio ad 2 lin. latae ad extremum brunneae. NERVI laciniarum aut furcati, aut dichotomi, supra immersi, subtus elevati. SEGMENTA FERTILIA circiter 3 lin. longa, eorum LACINIAE $1\frac{1}{2}$ lin. longae supra paleis brevibus sparse obsitae, subtus convexae. PALEAE laciniarum fertilium $\frac{1}{2}$ lin. longae perangustae taeniaeformes, parum tortuosae, pallide stramineae pellucidae. PILI basi stipitis constricto-articulati, pallide straminei pellucidi, e cellulis circiter 3 compositi; cellulae longae, ellipticae, terminalis apice attenuata acuta. SPORANGIA biserialia subglobosa annulo 11-radiato praedita. SPORAE oblongae laeves hyalinae.

Unicum tantum hujus speciei vidi specimen, quod tamen a *S. eleganti* diversum esse existimo. Praeter minutum differt: rhachi lacinisque segmentorum fertilium superne attenuatis, apice acuminatis, sporangiis destitutis. In omnibus speciminibus *S. elegantis* lacinas segmentorum fertilium apice obtusas et ad extremum usque sporangiis dense obsitas inveni.

Habitat prope Rio de Janeiro in arenoso-turfosis inter frutes prope Botafogo: Beyrich a. 1824 (in Herb. Reg. gen. Berolin. et in Herb. Kunze).

10. SCHIZAEA FLUMINENSIS MIERS lamina frondis brevissima, bipartita in stipitem gracillimum linearem longissimum transeunte; laciniis linearibus, apice perangustis recurvatis, aut simplicibus aut iterum ad medium usque bi-raro trifidis; segmentis fertilibus subhorizontalibus, subfalcatis, pectinato-pinnatisectis, rhachi subtus plana canaliculata glabra; laciniis in quovis latere 9—12, confertis, secundis, subrectis, linearibus apice obtusis.

Tabula nostra XIV.

Schizaea fluminensis Miers Mss.

RHIZOMA tenue, repens, pilis ferrugineis dense obsitum. FRONDES, ut videtur, caespitosae. STIPES 5—8 poll. longus, $\frac{1}{4}$ lin. crassus, gracillimus, linearis, tortuosus, supra (statu sicco) sulcatus, medio nervo semitereti elevato perductus, subtus convexus marginatus, apice subdilatus, coriaceus, hinc inde pilosus, viridis, opacus, basin versus brunneus densiusque pilosus. LACINIAE laminae frondis 3—9 lin. longae, $\frac{1}{4}$ lin. latae, FERTILES fissuram versus dilatatae, ad apicem angustatae, tortuosae, asperae. SEGMENTA FERTILIA $2\frac{1}{2}$ —4 lin. longa, eorum laciniae $1\frac{1}{2}$ —2 lineares, supra et margine paleis taeniaeförmibus perlongis angustis tortuosis ferrugineis (sub microscopio stramineis pellucidis), apice subangustatis rotundatisque obsessae, subtus convexiusculis, asperis. PILI rhizomatis cylindrici, validi, constricto-articulati, fusciduli, ad articulationes brunnei, parum pellucidi, e cellulis 3—4 compositi; cellulae longae, ellipticae, subaequilongae, terminalis apice curvata subulata. SPORANGIA biserialia, ovato-globosa, annulo 11-radiato praedita. SPORAE reniformes, laeves, hyalinae, in medio flavescens.

Species inter omnes *Schizaeas* florum nostrae gracillima et cum alia non confundenda.

Habitat prope Panuré ad Rio Uaupés: R. Spruce, Oct. 1852 — Jan. 1853 (sine numero) in hb. Martii.

III. ANEIMIA SWARTZ.

ANEIMIA Swartz Syn. Fil. 155. Endl. Gen. Plant. 65. n. 661. Hook. Gen. Fil. tab. 90. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Suppl. Tent. Pterid. 77. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 114. Moore Index Fil. CXV. — ORNITHOPTERIS Bernh. in Schrad. Journ. 1806. I. 2. 50. tab. 3. — ANEMIDICTION J. Smith in Hook. Gen. Fil. tab. 103. Moore l. c. CXVI. — ANEMIDICTION Presl Suppl. Tent. Pterid. 91. — TROCHOPTERIS Gardner in Hook. Lond. Journ. of Bot. I. 74. tab. 4. Hook. Gen. Fil. tab. 104. A. Moore l. c. CXVII. — COPTOPHYLLUM Gardner l. c. I. 133.

PARTES frondis laterales FERTILES, ut plurimum contractae, paniculiformes, subtus ad nervos primarios rhachiolearum gerentes sporangia biserialiter disposita. SPORANGIA sessilia, ovalia, in vertice annulo completo transverso multiradiato instructa, rima longitudinali extorsora dehiscencia, parenchymati adnata. INDUSIUM nullum. SPORAE tetraëdrae, basi convexae, elevato-striatae, in plurimis speciebus aculeolatae.

RHIZOMA adscendens v. repens. STIPES semipollaris usque ultrapedalis, supra plus minusve distincte (in sicco) tricanaliculatus, subtus semiteretes, FASCICULUM VASORUM semiannularem vel hippocrepicum et tenuem includens. RHACHES PRIMARIAE et SECUNDARIAE partium sterilium supra aequae ac stipis canaliculatae. RHACHES SECUNDARIAE et TERTIARIAE (s. RHACHIOLAE) partium fertilium aut planae angustae evidenter tamen foliaceae, aut tenuissimae et semiteretes, nervis simplicibus vel pinnatim divisus instructae. LAMINA FRONDIS FERTILIS ternata (aut rarissime tripartita); pars terminalis sterilis laminae frondis sterilis similis, pinnatisecta vel bipinnatisecta, segmentis plerumque

Schizaeac.

coriaceis, opacis, rarius membranaceis, tenuibus, basi saepe inaequilateris, integris vel varie divisis. NERVATIO specierum hujus generis valde diversa. NERVUS PRIMARIUS modo medianus, modo diagonalis, excurrentis, aut in medio, aut supra basin segmentorum aut ex toto evanescens. NERVI SECUNDARIJ e nervo primario pinnati, dichotomi, ramis flabellatis nunc in areolas hexagonas anastomosantibus, nunc liberis, aut nervo primario evanescente, flabellato-dichotomi, liberi. PARTES LAMINAE LATERALES FERTILES aut PANICULAS plerumque longe pedunculatas et oppositas, raro alternas et distantes referentes, bi-tripinnatisectae, aut rarissime foliaceae abbreviatae. SPORANGIA hypophylla ad nervos uniseriata, marginalia vel margine rhachiolearum foliaceo intramarginalia.

Species permultae in ditione Florae nostrae sunt; omnes exceptis circiter duabus speciebus Africanis et una Indica Americana tropicam et extratropicam incolunt, sed ultra Mexicanos fines in Americam septentrionalem non adscendunt.

ADNOTATIO. Nervatio specierum hujus generis valde diversa est, ita ut species nervis secundariis anastomosantibus instructae a cel. J. Smith genus proprium ANEMIDICTION declaratae sint.

OBSERVATIO I. Frons in specie unica (*Aneimia elegante*) tripartita, lacinia terminali triloba, nervis flabellato-dichotomis; laciniiis lateralibus foliaceis, abbreviatis, bipinnatisectis, lacinulis secus nervum primarium sporangia intramarginalia gerentibus.

OBSERVATIO II. In sectione COPTOPHYLLI frons usque ad insertionem in rhizomate ternata, itaque partes duae laterales fertiles e rhizomate nascuntur, nec basi partis sterilis insertae. Pars sterilis (in speciebus Brasiliensibus) tripinnata, laciniiis angustissimis, linearibus, uninerviis.

CONSPECTUS SPECIERUM.

- Sect. 1. Frondes simplices, fere uniciales, confertissime stellatim et horizontaliter dispositae. Sp. 1.
- Sect. 2. Frondes stipitatae pedales et ultra; partes duae laterales fertiles paniculaeformes, basi partis sterilis insertae.
- §. 1. Nervus primarius medianus.
- A. Omnes nervi secundarii anastomosantes.
- α. Segmentum terminale cum proximis connatum, lobatum vel incisum. Sp. 2—5.
- β. Segmentum terminale liberum, indivisum. Sp. 6—9.
- B. Pauci nervi secundarii anastomosantes. Sp. 10—12.
- §. 2. Nervus primarius diagonalis.
- A. Nervus primarius percurrentis. Sp. 13—16.
- B. Nervus primarius sensim evanescens. Sp. 17—21.
- §. 3. Nervus primarius mox evanescens.
- A. Pars sterilis bipinnatisecta. Sp. 22—28.
- B. Pars sterilis pinnatisecto-pinnatifida.
- α. Segmentorum laciniae rotundatae. Sp. 29—32.
- β. Segmentorum laciniae lineares. Sp. 33—36.
- C. Pars sterilis pinnatisecta. Sp. 37—46.
- Sect. 3. Frondes stipitatae; partes duae laterales fertiles, paniculiformes, rhizomati, nec basi partis sterilis insertae. Sp. 47—49.

Sect. 1. (Subgenus 1. TROCHOPTERIS.)

Frondes simplices, fere unciales, confertissime stellatim et horizontaliter dispositae; lamina frondis tripartita; lacinia terminalis sterilis, triloba, nervis flabellato-dichotomis, liberis; laciniae laterales fertiles, foliaceae, abbreviatae, bipinnati-partitae.

1. ANEIMIA ELEGANS PRESL frondibus fere uncialibus, confertissime stellatim et horizontaliter dispositis; lamina tripartita, lacinia terminali sterili suborbiculari-cuneata triloba, margine subcrenolata ciliata; laciniiis lateralibus foliaceis, abbreviatis, bipinnati-partitis, in stipitem decurrentibus; lacinulis angustis, secus nervos primarios sporangia intramarginalia gerentibus, supra dense hirsutis, ciliatis; nervis secundariis flabellato-dichotomis liberis; stipite ad basin longe ferrugineopiloso.

Tabula nostra XVI. Fig. 1.

Aneimia elegans Presl Suppl. Tent. Pterid. 81.

Aneimia Riedeliana Kunze Mss.

Trochopteris elegans Gardner in Hook. Lond. Journ. of Botany I. (1842). 74. tab 4. J. Smith ibid. II. 388. Hook. Gen. Fil. tab. 104. A.

Euphoropteris Riedeli Roemer Mss.

Trichomanes ricciaeforme Bongard (ex Kunze Herb.).

RHIZOMA erectum, subunciale, per totam longitudinem frondes gerens. FRONS 6—9 lin. longa, 4—6 lin. lata; LACINIAE FRUCTIFERAE circiter 1-lineares, supra pilis longis subulatis biarticulatis hyalinis dense obsitae. PILI basi stipitis lati, constricto-articulati et linea excavata phragmigeri, apicem versus parum angustati curvati, e cellulis usque ad 20 compositi; hae inter se subaequilongae et fere eadem latitudine, stramineae, valde pellucidae. SPORANGIA sessilia medio tenus annulo verticali instructa. SPORAE subtetraedrae distincte striatae, striis non elevatis perangustis, angulis obtusis vix prominentes, brunnescenti-virides, impellucidae.

Fillicula insignis et ab omnibus speciebus sui generis, praeter notas indicatas, frondibus stellatim dispositis distinctissima.

Habitat in fissuris rupium, e. g. ad Cidade Cuyaba, Serra de Jeronimo, prov. do Mato Grosso: Beyrich; in summitate Serra de Natividade, prov. Goyazensis: Gardner n. 4035; Serra de Chapada: Riedel (Herb. Mus. Pal. Vindob.).

Sect. 2. (Subgenus 2. EUANEIMIA.)

Frondes stipitatae pedales et ultra. Frondis fertilis ternatae parte terminali sterili, foliacea (lamina); partibus lateralibus fertilibus paniculas pedunculatas referentibus.

(Spec. 2—9 Aneimidictyon Presl. J. Smith.

Spec. 10—45 Aneimia Auct.)

§. 1. Nervus primarius medianus.

A. Omnes nervi secundarii anastomosantes.

α. Segmentum terminale cum proximis connatum.

2. ANEIMIA OBLIQUA SCHRAD. lamina membranacea, subflaccida, ovato-oblonga, pinnatisecta; segmentis 4—6-jugis, parce hirtulis, inferioribus breviter petiolatis, lanceolatis, longe acuminatis, basi subaequali cuneatis; paniculis lamina longioribus, pedunculum gracilem aequantibus.

Aneimia obliqua Schrader in Götting. gelehrt. Anzeig. 1824. 864 (excl. syn. Langsd. et Fisch.). Kunze in Linnaea IX (1834). 20 (excl. omnib. synon.).

Aneimia hirta Willd. Herb. n. 19494.

Aneimidictyon obliquum Presl Suppl. Tent. Pterid. 93.

Aneimidictyon hirtum Moore Index Fil. 71 (partim).

RHIZOMA adscendens, pills ferrugineis obsitum. STIPES 6—11 poll. longus, diametrum vix 1/2 lin. attingens, subsemiteres, supra tricanaliculatus, villosus, medio glabrescens. LAMINA FRONDIS FERTILIS 5—7 poll. longa, 5 poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, villosa, flavo-brunnescens. SEGMENTA infima circiter 3 poll. longa, basin versus 4 lin. lata, interstitiis 6—8-linearibus remota, subopposita, patula; superiora paulo approximata, parum decrescentia, basi inaequali late adnata decurrentia, summa in apicem laminae subtriangularem longe acuminatum tripartitum confluentia, omnia margine eroso-denticulata. NERVUS PRIMARIUS excurrens, utrinque elevatus, hirtus. NERVI SECUNDARIJ omnes anastomosantes, supra elevati. PANICULAE perangustae circiter 4 poll. longae, PEDUNCULO subaequilongae suffulatae. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE filiformes, angustissimae, immarginatae. PILI rhizomatis cylindrici nodoso-articulati, basi subcrassiores, e cellulis circiter 13 compositi, straminei, valde pellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, dense longeque aculeolatae, pallide virescentes.

Species proxima *Aneimia incisa* Schrad., quae vero a nostra differt: segmentis pinnatifido-incisis, nervis secundariis liberis.

Descriptio secundum specimina a cel. Poeppig in Cuba lecta. Haec specimina cum stirpe Martinicensi Herb. Willdenow. sub n. 19494 asservata, ad amussim conveniunt.

Habitat in Serra do Mar, prov. Sebastianopolitanae: Princ. Maxim. Neovidenis; — in sylvis graminosis Cuba: Poeppig; in Martinica: Swartz.

OBSERVATIO. Exemplaribus originalibus pro fundamento usi, hujus sectionis octo species subgenus *Aneimidictyon* formantes statulimus. Cum autem e solis herbariorum speciminibus vis specierum nonnullarum recte iudicari non possit, eas ulterioribus observationibus vivarum plantarum commendamus.

3. ANEIMIA FRAXINIFOLIA RADDI lamina subcoriacea, e basi latissima oblonga acuminata, pinnatisecta; segmentis 4—7-jugis sessilibus, glabris, inferioribus ovatis acuminatis, basi superiore rotundatis, inferiore oblique truncatis leviter rotundatis mox latescentibus, margine inferiore valde curvatis interdum in dentem productis, superiore horizontaliter abscissis; paniculis lamina longioribus, laxis, pedunculo gracili flexuoso pilosiusculo subduplo brevioribus.

Aneimia fraxinifolia Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 21. Ejusd. Fil. Brasil. 69. tab. 8 bis. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. n. 4 (excl. syn. *A. sorbifolia* Schrad.). Kunze Commentar. in Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora od. allg. bot. Zeit. 1839. I. Beibl. 44. n. 360 (excl. syn.).

Aneimia Phyllitidis Kaulf. Enum. Fil. 51 (fide Presl et excl. omnib. syn. et habit. praeter Brasiliam).

Aneimidictyon Phyllitidis J. Smith in Hook. Gen. Fil. tab. 103 (excl. syn.).

Aneimidictyon fraxinifolium Presl Suppl. Tent. Pterid. 92 (excl. syn.: *A. sorbifolia* Schrad. et *A. densa* Link.). Presl Die Gefässbündel im Stipes der Farrn 21. tab. 4. fig. 5.

Anemidictyon fraxinifolium Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 307.

Anemidictyon Phyllitidis δ . *fraxinifolium* Moore Index Fil. 72 (partim).

RHIZOMA adscendens, pilis ferrugineis dense obsitum. STIPES usque ad 6 poll. longus, diametrum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ poll. attingens, gracilis, quadrangularis, tricannaliculatus, glaber, ima basi pilosus. LONGITUDO LAMINAE FRONDIS FERTILIS 4—7 poll., latitudo basi $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ poll. RHACHIS supra tricannaliculata, glaberrima. SEGMENTA inferiora $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 1 poll. lata, interstitiis 9—11-linearibus remota, opposita, patula; superiora decrescentia, basi utrinque cuneata, duo summa basi late adnata cum terminali interdum confluentia; segmentum terminale petiolatum triangulari-ovatum acuminatum basi acutissime cuneatum non raro lobatum; omnia margine inaequaliter eroso-denticulata. NERVUS PRIMARIUS medianus, excurrens, supra planus subelevatus hirtulus, subtus inferne tantum elevatus ad basin imam pilosus. NERVI SECUNDARIJ perquam remoti, dichotomi, supra elevati, omnes anastomosantes. PANICULAE 2—3 poll. longae, circiter 6 lin. crassae, pedunculo 3—5-pollicari suffultae. RHACHIOAE FRUCTIFERAE filiformes immarginatae. PILI stipitis cylindrici nodoso-articulati apicem versus parum attenuatae, e cellulis circiter 14 compositi, inferne flavo-brunnescentes, superne pallide straminei pellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae, virescentes.

In praeruptis viarum locis sylvaticis, solo argilloso, in prov. Sebastianopolitana: M.; circa Rio de Janeiro ad frutes in virgulis: Gardner n. 6, Schüch, Radde, Harrison, A. d'Orbigny; ad Villa de Principe, prov. Minarum: M.; S. Paulo: Helmreich.

4. ANEMIA MACROPHYLLA HORT. lamina membranacea, e basi latissima oblonga angustata acuminata, pinnatisecta; segmentis 11-jugis, utrinque laxe hirtulis, inferioribus breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, breviter acuminatis, obtusis, basi superiore rotundatis subcordatis, inferiore oblique rectilineo-abscessis, margine inferiore leniter curvatis, superiore subrectilineis; paniculis lamina longioribus, densis, pedunculo valido flexuoso piloso subaequilongis.

Anemia macrophylla Hort. fide Presl.

Anemidictyum hirtum Presl Suppl. Tent. Pterid. 92 (quoad specimina culta ex horto botanico Berolinensi, sed exclus. synon. omnib. et specimine spontaneo ex Herb. Gundelsheimeri).

Anemidictyon hirtum Moore Index Fil. 71 (partim).

STIPES ultrapedalis, diametrum 1 lin. attingens, semiteres, supra tricannaliculatus, laxe ferrugineo-villosus. LONGITUDO LAMINAE FRONDIS FERTILIS 11 poll. latitudo $5\frac{1}{2}$ poll. RHACHIS supra tricannaliculata, longe villosa. SEGMENTA inferiora $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 1 poll. lata, interstitiis 11-linearibus remota, opposita, patula, superiora decrescentia magis approximata sessilia, duo ultima basi lata adnata; segmentum terminale longe petiolatum triangulare trifidum basi acute cuneata decurrens; omnia margine eroso-denticulata. NERVUS PRIMARIUS medianus subexcurrens, supra planus vix elevatus, subtus manifeste elevatus, utrinque hirtulus. NERVI SECUNDARIJ dichotomi liberi vel ex parte anastomosantes vix elevati. PANICULAE 7 poll. longae, circiter 7 lin. crassae, PEDUNCULO 6-pollicari suffultae. RHACHIOAE FRUCTIFERAE lineares immarginatae. PILI stipitis cylindrici nodoso-articulati, apicem versus attenuati, e cellulis circiter 13 compositi, fusciduli, vix pellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, longe denseque aculeolatae, virescentes.

Hanc speciem secundum specimen in horto botanico Berolinensi cultam descripsimus et ne quid in serie desideretur addidimus. Conf. observationem nostram in *Anemiam hirtam* Sw.

E Brasilia fide schedulae in Herb. Reg. gen. Berolin.

5. ANEMIA SORBIFOLIA SCHRAD. lamina membranacea, e basi latissima oblonga acuminata, pinnatisecta; segmentis 6—7-jugis, glabris, inferioribus petiolatis, oblongo-lanceolatis acuminatis, basi utrinque oblique truncatis, leviter rotundatis, margine inferiore leniter curvatis superiore, apice acuminato excepto, horizontalibus; paniculis laminam excedentibus, laxis, pedunculo gracili flexuoso piloso parum brevioribus.

Anemia sorbifolia Schrad. in Götting. gelehrt. Anzeig. 1824. 564.

Anemidictyum fraxinifolium Presl Suppl. Tent. Pterid. 92 (exclus. omnib. syn. praeter Schrader. et Blanchet. pl. Bahiens. n. 74).

Anemidictyon Phyllitidis δ . *fraxinifolium* Moore Index Fil. 72 (partim).

RHIZOMA adscendens pilis ferrugineis dense obsitum. STIPES circiter 8 poll. longus, diametrum $\frac{3}{4}$ —1 lin. attingens, subquadrangularis, tricannaliculatus, longe ferrugineo-villosus, medio glabrescens. LONGITUDO LAMINAE FRONDIS FERTILIS 4—7 poll., latitudo 4— $5\frac{1}{2}$ poll. RHACHIS supra tricannaliculata, sparse pilosa. SEGMENTA inferiora 2— $2\frac{1}{2}$ poll. longa, in medio 7—10 lin. lata, interstitiis aequalibus 7—10-linearibus remota, omnia opposita, patula; superiora decrescentia sessilia, duo ultima late adnata cum terminali confluentia; segmentum terminale subpetiolatum subtriangulare acuminatum, basi acutissime cuneatum; omnia margine inaequaliter eroso-denticulata. NERVUS PRIMARIUS medianus percurrens, supra planus, non elevatus, hirtulus, subtus ad apicem usque manifeste elevatus, sparse pilosus. NERVI SECUNDARIJ dichotomi, omnes anastomosantes, supra elevati. PANICULAE ad 4 poll. longae, 6 lin. crassae, PEDUNCULO 3—5-pollicari suffultae. RHACHIOAE FRUCTIFERAE filiformes immarginatae. PILI basi stipitis cylindrici nodoso-articulati, basi crassiores, e cellulis usque ad 18 compositi, fusciduli pellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae aculeolatae, virescentes.

Habitat in Montideo: Sellow. In Brasiliae praeruptis viarum, locis sylvaticis, solo argilloso in prov. Sebastianopolitana: Schüch, C. Raben et in prov. Bahiensis: Princ. Max. Neovidenis; ad Bahia: Blanchet n. 74, Sellow.

β . Segmentum terminale liberum, indivisum.

6. ANEMIA PHYLLITIDIS SWARTZ lamina membranacea, oblonga, pinnatisecta; segmentis 2—4-jugis, ciliatis apicem versus sparse hirtulis, inferioribus breviter petiolatis, lanceolatis longe acuminatis acutissimis, basi superiore subrectilineo-oblique-truncatis inferiore leviter rotundatis, superioribus subdeccrescentibus; paniculis laminam superantibus, angustis laxis, pedunculum gracilem pilosum subaequantibus.

Anemia Phyllitidis Swartz Syn. Fil. 155. Willd. Sp. Pl. V. 89. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. n. 1 (excl. syn.). Schlechtend. et Cham. in Linnaea V (1830). 620. Klotzsch ibid. XVIII (1844). 525.

Anemia obliqua Pohl in Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 1575.

Anemia Haenkei Mart. et Gal. Syn. Fil. Mexican. 19. n. 23.

Anemidictyon Phyllitidis Presl Suppl. Tent. Pterid. 93. Ejusd. Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 21. tab. 4. fig. 6.

Osmunda Phyllitidis Linn. Sp. Pl. 1520.

Anemidictyon Phyllitidis Moore Index Fil. 71 (partim).

RHIZOMA adscendens, pilis ferrugineis dense obsitum. STIPES 7—8 poll. longus, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, subquadrangularis, supra trica-

naliculatus, villosus, medio glabrescens. Longitudo LAMINAE FRONDIS FERTILIS circiter 4 poll., latitudo 4—5 poll. RHACHIS supra tricanaliculata dense villosa. SEGMENTA inferiora 2—3 poll. longa, 6—10 lin. lata, interstitiis 6-linearibus remota, opposita, patentissima patulave; segmentum terminale longe petiolatum lanceolatum, basi leviter rotundatum, aut segmento impari nullo segmento duo ultima basi connexa; omnia margine inaequaliter crenulato-denticulata. NERVUS PRIMARIUS medianus excurrens, supra planus subimpressus sparse hirtulus, subtus elevatus sparse pilosus. NERVI SECUNDARIJ dichotomi, omnes anastomosantes elevati. PANICULAE circiter 5 poll. longae, 5 lin. crassae, PEDUNCULO 3—4-pollicari suffultae. RHACHIOLOE FRUCTIFERAE filiformes, angustae, immarginatae. PILI basi stiptis cylindrici, nodoso-articulati, basi crassiores, apicem versus satis attenuati tortuosique, e cellulis usque ad 18 compositi, ultima subulbiformis brevissima; omnes stramineae pellicidae. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae aculeolatae, aculeolis longis remotis.

Habitat in Serra dourada, prov. Goyazensis: Pohl (in Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 1575), Gardner n. 4082; ad Congonhas do Campo, prov. Minas: Stephan; in Brasilia sine indicatione loci natalis: Schlich; — in sylvis umbrosis ad Caracas: Bredemeyer (Herb. Willd. n. 19493), Otto n. 686, Moritz n. 3; ad Costa Rica et Veragua: Warscewicz n. 26; in Mexico prope Jalappa ad Hacienda de la Laguna: Schiede.

7. ANEIMIA LONGIFOLIA RADDI lamina membranacea, late ovato oblonga, pinnatisecta; segmentis 4—6-jugis, longe petiolatis, oblongo-lanceolatis longe acuminatis acutis, basi utrinque rotundatis, sparse ciliatis apicem versus sparse hirtulis, summis sessilibus vix decrescentibus, basi superiore oblique truncatis, inferiore longiore rotundatis; paniculis laminam superantibus, densis maximis, pedunculo flexuoso valido piloso multo longioribus.

Aneimia longifolia Raddi Fil. Brasil. 69. tab. 8.

Aneimia hirta Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 20.

Aneimia Haenkei Presl Reliq. Haenk. I. 74. Kunze in Linnaea IX (1834). 20.

Aneimia cordifolia Presl Rel. Haenk. I. 73. tab. 11. fig. 3.

Aneimia Phyllitidis Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. I. 26 (fide specim. in Herb. Willd. sub n. 19493, fol. 2, asservatae et a Cel. Humboldt lectae). Kunth Syn. I. 94. Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 19.

Anemidictyon Haenkei Presl Suppl. Tent. Pterid. 94.

Anemidictyon Phyllitidis Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 307.

Anemidictyon Phyllitides β. longifolium et γ. cordifolium Moore Index Fil. 71 (partim).

STIPES ut videtur pedalis, diametrum 1 lin. attingens, validus, subquadrangularis, supra tricanaliculatus, scaber, glabrescens. Longitudo LAMINAE FRONDIS FERTILIS 7—11 poll., latitudo 6—9 poll. RHACHIS supra tricanaliculata, laxa pilosa. SEGMENTA inferiora circiter 3 poll. longa, 1 poll. lata, interstitiis 1—1½-pollicaribus remota, subopposita, patula; segmentum terminale longe petiolatum, oblongo-lanceolatum, basi ovato-rotundatum inaequilaterum, aut basi inaequaliter cuneatum magis minusve acutum; omnia margine subrepanda inaequaliter crenulato-denticulata. NERVUS PRIMARIUS medianus excurrens, supra planus subimpressus dense hirtulus, subtus elevatus validus sparse pilosus. NERVI SECUNDARIJ dichotomi, omnes anastomosantes elevati. PANICULAE 6—9 poll. longae, 9 lin. crassae, PEDUNCULO circiter 5-pollicari suffultae. RHACHIOLOE FRUCTIFERAE filiformes, perangustae, immarginatae. PILI basi stiptis cylindrici nodoso-articulati, validi, basi crassi, e cellulis circiter 16 compositi, pallide straminei, pellicidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae, virescentes.

Habitat in sylvis montanis prope Rio de Janeiro, e. g. in monte Corcovado: M., Raddi, Schott; prope Iheos, prov. Bahiensis: Luschnath; —

in praeruptis vestitis ad Caripe, in prov. Cumanensi, Venezuelae: Humboldt et Bonpland; in sylvis densis ad Pampayaco Peruviae: Poeppig.

8. ANEIMIA DENSE LINK lamina membranacea, late ovata, pinnatisecta; segmentis 4-jugis, ciliatis utrinque sparse hirtulis, imis breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, medio latissimis, inde apicem versus sensim acuminatis acutis, basi superiore rotundatis inferiore breviter curvatis mox latescens et medio marginis in angulum obtusum vel in dentem magnum acutum productis, superioribus basin versus angustatis adnatisque; paniculis lamina longioribus, densis, pedunculo valido piloso longioribus.

Aneimia densa Link Hort. Reg. bot. Berolin. II. 142. Link Sp. Fil. hort. R. bot. Berolin. 24 (excl. syn.).

Aneimia laciniata Kaulf. Mss.

Anemidictyon hirtum Presl. Suppl. Tent. Pterid. 92 (partim).

Anemidictyon hirtum Moore Index Fil. 72 (partim).

Rhizoma mihi ignotum. STIPES usque ad 16 poll. longus, in medio diametrum 1 lin. attingens, validus, subquadrangularis, tricanaliculatus, scaber, laxe villosus. Longitudo LAMINAE FRONDIS FERTILIS circiter 8 poll., latitudo longitudinem aequans. RHACHIS supra tricanaliculata, scabra villosaque. SEGMENTA 4½—5 poll. longa, in medio circiter 15 lin. lata, interstitiis 1-pollicaribus remota, opposita, patula; infima breviter petiolata, sequentia sessilia adnataque, eadem forma ac infima, sed dens in margine inferiore nullus, basi superiore breviter oblique truncata inferiore rotundata adnataque; segmentum terminale petiolatum oblongo-lanceolatum, basi inaequilata cuneatum acutum (interdum segmentum impar nullum); omnia margine repando inaequaliter crenulato-denticulata. NERVUS PRIMARIUS medianus ad extremum excurrens, supra subimpressus dense hirtulus, subtus elevatus validus pilosus. NERVI SECUNDARIJ dichotomi, omnes anastomosantes, elevati. PANICULAE circiter 6 poll. longae, 9 lin. crassae, PEDUNCULO vix 4-pollicari suffultae. RHACHIOLOE FRUCTIFERAE filiformes, immarginatae. PILI basi stiptis cylindrici subnodoso-articulati, basi crassiores, e cellulis circiter 13 compositi, obscure fusciduli vix pellicidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, manifeste elevato-striatae, aculeolatae, colore pallide virescente.

Habitat in Brasilia orientali. Vidi in Herb. Martii.

9. ANEIMIA TWEEDIEANA HOOK. fronde glaberrima; lamina ovato-oblonga, pinnatisecta; segmentis plerumque 3-jugis, brevissime petiolatis subrotundo-ovalibus obtusis, basi subaequalibus subcuneatis, superioribus vix decrescentibus; paniculis lamina subbrevioribus, brevibus densis, pedunculo subaequilongis.

Anemia (Anemidictyon) Tweedieana Hook. Icon. Pl. X. tab. 906.

Anemidictyon Tweedieanum Moore Index Fil. 72.

Rhizoma ascendens. STIPES 2—4 poll. longus, erectus, basi pilosus RHACHIQUE decidue fuscovillosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS circiter 2 poll. longa, 15 lin. lata. SEGMENTA infima 6—9 lin. longa, 4—5 lin. lata, interstitiis circiter 5-linearibus remota; segmentum terminale inaequilaterum, longe petiolatum; omnia margine inaequaliter crenulato-denticulata. LAMINA FRONDIS STERILIS minor ovata, segmentis uni-jugis. NERVUS PRIMARIUS medianus infra medium evanescent. NERVI SECUNDARIJ dichotomi, omnes anastomosantes. PANICULAE circiter 9 lin. longae, PEDUNCULO subaequilongae suffultae.

Habitat in Tucuman, Uruguay, Brasilia australi: Tweedie.

Aneimiae laciniatae Link ut videtur proxima. — Non vidi.

B. Pauci nervi secundarii anastomosantes. (Spec. 10—12.)

10. ANEIMIA LACINIATA LINK lamina membranacea oblongo-lanceolata, pinnatisecta; segmentis plerumque 6-jugis, brevissime petiolatis oblongo-lanceolatis obtusatis, ciliatis utrinque hirtulis, inferioribus lobato-incisis basi superiore profunde auriculatis, superioribus subintegris decrescentibus, summis confluentibus; paniculis lamina longioribus, densis, pedunculo subtriplo brevioribus.

Aneimia laciniata Link Fil. Sp. hort. Reg. bot. Berol. 25.

Aneimidietyum laciniatum Presl Suppl. Tent. Pterid. 94 (excl. Syn. Vell.).

Aneimidietyum Phyllitidis s. *laciniatum* Moore Index Fil. 72 (partim).

RHIZOMA adscendens, pallide ferrugineo pilosum. STIPES vix 1 lin. crassus, fronds fertilis ad summum 12, sterilis 5 poll. longus, semiteres supra tricanaliculatus, medio glabrescens, basi villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 5 poll. longa, 3 poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, straminea, villosa. SEGMENTA inferiora circiter $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 9 lin. lata, alterna, interstitiis 7—9 linearum, patula, oblongo-lanceolata obtusata vel ovata, basi utrinque cuneata; inferiora (inprimis in parte frondis fertilis) interdum lobato-incisa, basi superiore profunde auriculata; superiora subintegra, basi lata subdecurrentia; summa 3—4 in apicem laminae lobato-incisum confluentia, omnia margine inaequaliter crenulato-denticulata, laete viridia. NERVUS PRIMARIUS medianus infra apicem evanescens. NERVI SECUNDARIJ dichotomi liberi vel interdum anastomosantes, supra elevati. PANICULAE $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, 6 lin. crassae; PEDUNCULO circiter 4-pollicari gracili, flexuoso, flavo, subglabro. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE semiteretes, immarginatae, perangustae, glabrae. PILI rhizomatis articulati, subaequales, tortuosi, pallide straminei, pellucidi, e cellulis ad 20 usque compositi. SPORAE tetraedro-subrotundae, virescentes, aculeolis hyalinis dense obsessae.

Habitat in Venezuelae locis subalpinis coloniae Tocay: Moritz n. 390. Forsan in montibus Guyanae brasiliensis detegenda.

ADNOTATIO. Beat. Link, qui hanc speciem proposuit, nec specimina spontanea, nec patriam novit. Item b. Presl mentionem fecit, se nunquam specimen spontaneum hujus speciei vidisse. Descriptio secundum specimen unicum Moritzianum in Herb. R. Berolin.

11. ANEIMIA NERVOSA POHL lamina membranacea ovato-oblonga, pinnatisecta; segmentis plerumque 1-raro 2-jugis, subsessilibus, ovatis, ciliatis, utrinque hirtulis, terminali duplo majore longe petiolato, ovato-oblongo, basi interdum pinnatifido vel lobato; paniculis lamina subbrevioribus, brevissimis densis, pedunculo aequilongis.

Aneimia nervosa Pohl (teste schedula Kunzeana in Herb. Reg. Monacensi).

RHIZOMA adscendens superne pilis obscure ferrugineis densissime vestitum. STIPES 5 poll. (fronds sterilis $1\frac{1}{2}$ —2 poll.) longus, vix $\frac{1}{2}$ lin. crassus, erectus, supra planus tricanaliculatus, flavo-brunnescens, cum rhachi densissime longeque ferrugineo-villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longa lataque. SEGMENTA lateralia minora $\frac{1}{2}$ —1 poll. longa, 3—6 lin. lata, remota, subopposita, patula, ovata, basi aequali cuneata, apice rotundata, margine repandulo inaequaliter crenulato-denticulata; terminale 1—2 poll. longum, 6—12 lin. latum, petiolo subquadrilineari, magnitudine formaeque varians, aut ovato-oblongum subintegrum, aut basi latius medio contractum subauriculatum, aut ad fundum alterius lateris pinnatisectum, alterius tantum lobatum. SUBSTANTIA membranacea vel subcoriacea, obscure viridis, subtus pallidior. NERVUS PRIMARIUS infra medium (in segmento terminali infra apicem) evanescens, supra planus, subtus convexus. NERVUS SECUNDARIJ dichotomi, liberi vel hinc inde anastomosantes, supra elevati. PANICULAE 8—9 lin. longae, 3 lin. crassae; PEDUNCULUS gracilis, villosus, eadem longitudine. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE filiformes, immarginatae. PILI rhizomatis cylindrici, subnodoso-articulati, flavescens, pellucidi, e cellulis circiter 16 compositi, in medio plerumque tortuosi, versus Schizaeae.

apicem attenuati, curvati; cellula terminalis perbrevis, hyalina. SPORANGIA regulariter biserialia, ovalia, flavescens, cellulis verticis elongatis citrinis. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae, flavo-virescentes. — Parvitate paniculae inter congeneres insignis.

Habitat in sylvis supra Serra do Mar, prov. Sebastianopolitanae: M., Pohl, v. in hb. Martii et Zuccarini; ad Bahiam: Blanchet (fide Herb. Kunzeani).

12. ANEIMIA SCHRADERIANA MART. lamina membranacea subquadrata, pinnatisecta; segmentis 1—3-jugis, petiolatis, oblongo-ovatis acuminatis, basi cuneatis, glabris, terminali majore longe petiolato cuneiformi-bilobo, lobis divergentibus acuminatis; paniculis lamina longioribus, laxis, pedunculo glabro subduplo brevioribus.

Aneimia Schraderiana Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 113. tab. 58. Presl Suppl. Tent. Pterid. 89. Moore Index Fil. 69.

Aneimia diversifolia et *A. Vespertilio* Schrad. in Goetting. gelehrt. Anzeig. 1824. 864 et 865.

RHIZOMA adscendens, dense et dilute ferrugineo pilosum. STIPES fronds sterilis 1—6, fertilis 9 poll. longus, diametro vix 1 lin., semiteres, stramineus, superne glabrescens, inferne villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 2—3 poll. longa, $3\frac{1}{2}$ —4 poll. lata, pinnatisecta, aut non raro simplex et segmento terminali similis. RHACHIS supra tricanaliculata, villosa. SEGMENTA $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 1 poll. lata, interstitiis 7—9 linear. subopposita, patentissima, repando margine crenulata; superiora vix decrescentia sessilia; terminale 1 poll. longum, circiter 2 poll. latum, e binis confluentibus ortum, itaque nervis primariis duobus divergentibus percursum. NERVUS PRIMARIUS excurrens, supra hirtulus. NERVUS SECUNDARIJ dichotomi liberi, rarissime anastomosantes, supra elevati. PANICULAE 1—2 poll. longae, 2—4 lin. crassae; PEDUNCULO gracili $1\frac{1}{2}$ —4 poll. longo. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE semiteretes perangustae, immarginatae, subglabrae. PILI rhizomatis cylindrici nodoso-articulati, pallide fusciduli, e cellulis circiter 13 compositi, quarum inferiores breviores crassioresque, superiores tenuiores, ultima parva obtusa hyalina. SPORAE tetraedrae basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae, virescentes. — Ob segmentum terminale cuneiforme bilobum, lobis divergentibus acuminatis, inter omnes species sui generis distinctissima.

Habitat in sylvis super montium tractum Serra do Mar in prov. Bahiensi, e. g. ad viam Felisbertian: Princ. Max. Neoridensis; prope Almada: M.

§. 2. Nervus primarius diagonalis.

A. Nervus primarius percurrens. (Spec. 13—16.)

13. ANEIMIA INCISA SCHRAD. lamina membranacea triangulari-oblonga acuta, pinnatisecta; segmentis 9—11-jugis valde remotis, glabris, inferioribus longe petiolatis lineari-lanceolatis acuminatissimis inciso-duplicato-serratis ad fundum saepe pinnatifido-incisis, superioribus decrescentibus integris serrulatis, summis confluentibus; paniculis laminae subaequilongis, laxis, pedunculo brevioribus.

Aneimia incisa Schrad. in Goetting. gelehrt. Anzeig. 1824. 865. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. n. 4. Moore Index Fil. 67 (excl. syn. *A. pallida* Field. et Gardn., Presl Die Gefässbündel et plant. Gardner. n. 3560 bis).

Aneimidietyum incisum Presl Suppl. Tent. Pterid. 95.

RHIZOMA adscendens, pilis ferrugineis. STIPES 10 poll. longus, diametro vix $\frac{1}{2}$ lin., subquadrangularis, supra tricanaliculatus, testaceus, glabrescens, basin versus villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 5—8 poll. longa, 4—6 poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, testacea, breviter pilosa. SEGMENTA infima circiter 3 poll. longa, 9 lin. et quod excedit lata, interstitiis pollicaribus, subalterna, patula; inferiora inciso-duplicato-serrata, serraturis remotis obtusis, apice crenulata, basi superiore oblique truncata inferiore subdimidiato-cuneata; superiora decrescentia magis approximata integra serrulata; summa lineari-lanceolata basi lata decurrentia, in apicem

laminae perlongum lanceolatum serratum confluentia. NERVUS PRIMARIUS diagonalis excurrens, elevatus, pills brevibus; SECUNDARIJ remoti, dichotomi, liberi, supra elevati. PANICULAE circiter 4 poll. longae, 6 lin. crassae; PEDUNCULO gracili, flexuoso, villosa 3—4-pollicari. RHACHIOAE FRUCTIFERAE filiformes, angustissimae, immarginatae, glandulosae. PILI rhizomatis subnodoso-articulati, basi crassiores, pellucido-fusciduli, corpore cylindrico angustiore pellucido farcti, e cellulis circiter 13 compositi. SPORAE tetraëdrae basi convexae, elevato-striatae, virescentes, aculeolis longis hyalinis.

Habitat in sylvis montanis prope Ilheos, in via Felisbertia versus prov. Minarum confinia aperta: Princ. Max. Neovidensis.

14. ANEIMIA POHLIANA J. W. STURM lamina coriacea triangulari, acuminata, pinnatisecta; segmentis 6—7-jugis, sessilibus, supra pills brevissimis adpersis, inferioribus linearilanceolatis acuminatis inciso-serratis, basi superiore oblique truncatis inferiore subhorizontaliter abscisis, superioribus decrescentibus linearibus serratis, summis confluentibus; paniculis lamina longioribus, densis, pedunculo gracili glabro subaequilongis.

Aneimia Pohliana J. W. Sturm in Herb. Martii.

Aneimia incisa Pohl et Kunze in Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 1456. Presl Die Gefäßbünd. im Stipes der Farn 20 (nec incisa Schrad. nec pallida Field et Gardn.).

STIPES fere pedalis, diametro vix $\frac{1}{2}$ lin., semiteres, supra tricanaliculatus, glaber, basi ima pallide ferrugineo-villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS $1\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ poll. longa, $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS supra basin versus tricanaliculata, a medio ad apicem lato-canaliculata glabra, colore segmentorum. SEGMENTA inferiora 1— $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 3—4 lin. lata, interstitiis plerumque 4-linearibus subopposita, patula, linearilanceolata acuminata remote inciso-serrata; superiora decrescentia linearia serrata; summa basi lata adnata decurrentia, in apicem perlongum linearem serratum confluentia. NERVUS PRIMARIUS diagonalis excurrens, elevatus; SECUNDARIJ crebri, dichotomi, liberi, supra elevati. PANICULAE 2 poll. longae, 4 lin. crassae; PEDUNCULO $2\frac{1}{2}$ -pollicari, glabro. RHACHIOAE FRUCTIFERAE filiformes immarginatae. PILI basi stipitis cylindrici, tortuosi, nodoso-articulati, basi crassiores, e cellulis circiter 13 compositi, fusciduli. SPORAE tetraëdrae basi convexae, remote elevato-striatae, pallide virescentes pellucidae, aculeolatae, aculeolis longis, distantibus hyalinis.

Ab *Aneimia incisa Schrad.*, speciei proxima, differt: lamina dimidio minore dense coriacea, segmentis magis approximatis, omnibus sessilibus, supra pills brevissimis adpersis; nervis secundariis crebris, rhachi a medio ad apicem late uni-canaliculata, aequae ac pedunculi glabra.

Habitat ad Aldea S. Maria, prov. Goyazensis: Pohl.

15. ANEIMIA HIRTA SWARTZ lamina subcoriacea triangulari-oblonga acuminata, pinnatisecta; segmentis 17-jugis, utrinque hirsutis, inferioribus petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi superiore truncatis subcordatis subauriculatis inferiore horizontaliter abscisis, inciso-serratis, superioribus decrescentibus sessilibus, summis obtusis confluentibus; paniculis lamina longioribus laxis, pedunculo subaequilongis.

Aneimia abscissa Schrad. in Goetting. gelehr. Anzeig. 1824. 864.

Aneimia Phyllitidis Kunze Commentar. in Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora od. allg. bot. Zeit. 1839. I. Beibl. 44. n. 361.

Aneimia cujabensis Bongard (fide Herb. Kunzei).

Aneimia Breuteliana Presl in Herb. Mus. Pal. Vindob. (non in Suppl. Tent. Pterid., excl. vera Breuteliana ex ins. Antillanis).

Aneimidyctyum hirtum Presl Suppl. Tent. Pterid. 92 (excl. Syn. A. densa Link A. macrophylla Hort. et planta culta in Hort. bot. Berol.). Moore Index Fil. 71 (partim).

Aneimia caudata γ. abscissa Moore Index Fil. 65 (partim).

Plumier Fil. Amer. tab. 357.

RHIZOMA adscendens, ferrugineo-pilosum. STIPES 8 poll., diametro vix $\frac{1}{2}$ lin., subquadrangularis, supra tricanaliculatus, villosus, medio glabrescens. LAMINA FRONDIS FERTILIS 4—6 poll. longa, 4—5 poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, brunnescens, dense villosa. SEGMENTA inferiora $2\frac{1}{4}$ poll. longa, 6 lin. lata, interstitiis 6-linearibus alterna, patentissima patulae, oblongo-lanceolata, magis minusve inciso-serrata, serraturis inaequalibus obtusiusculis; superiora sessilia magis approximata decrescentia; summa obtusa adnata in apicem laminae lanceolatum basi incisum confluentia; omnia margine inaequaliter obtuse serrulata. NERVUS PRIMARIUS diagonalis excurrens, elevatus; SECUNDARIJ approximati dichotomi, liberi, valde elevati. PANICULAE circiter $2\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ poll. longae, 4 lin. crassae; PEDUNCULO valido 3-pollicari flexuoso villosa. RHACHIOAE FRUCTIFERAE filiformes angustissimae, immarginatae. PILI in basi stipitis nodoso-articulati, basi crassiores, straminei, valde pellucidi, e cellulis circiter 13 compositi. SPORAE minutissimae tetraëdrae basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae, pallide virescentes.

Habitat in sylvis prov. Bahiensis, in via Felisbertia: Princ. Max. Neovidensis; prope urbem: Blanchet (Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 49 et 50); prope Cuiabá: Riedel; in sylvis locis udis per Brasiliam orientalem: M. Hb. Flor. Bras. n. 361; — in Insula Martinica: Plumier.

OBSERVATIO. In Herb. R. Berolinensi duae plantae reperiuntur, quas Presl (cf. Suppl. Tent. Pterid. 92.) *Aneimiam hirtam Sw.* declaravit atque *Aneimidyctyi hirti* nomine protulit. Alterum specimen e Herb. Gundersheimiano, quod pro vera *A. hirta Sw.* habeo, nullo modo *Aneimidyctyo* adnumerandum est, quia nervos secundarios liberos offert; alterum, cultum, ob nervos anastomosantes sub n. 4 *Aneimia macrophylla Hort.* descripsimus.

16. ANEIMIA BREUTELIANA PRESL lamina tenuiter membranacea triangulari-oblonga acuminata, pinnatisecta; segmentis plerumque 7—8, raro 11-jugis, utrinque hirsutis, inferioribus brevissime petiolatis integris oblongo-lanceolatis medio dilatatis breviter acuminatis obtusiusculis, superioribus decrescentibus sessilibus, summis confluentibus; paniculis lamina plerumque longioribus, laxis, pedunculo subaequilongis.

Aneimia Breuteliana Presl Suppl. Tent. Pterid. 90 (excl. patria Brasil. et plant. Blanchetian.). Moore Index Fil. 64 (partim).

Aneimia Mandiocana Hook. Gen. Fil. tab. 90 (optima! excl. syn. Raddi).

Aneimia Phyllitidis Breutel Fil. Antill. exsicc.

RHIZOMA adscendens, pills ferrugineis obsessum. STIPES 6—8 poll. longus, diametro $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin., subquadrangularis, supra tricanaliculatus, villosus, medio glabrescens. LAMINA FRONDIS FERTILIS $2\frac{1}{2}$ —4 poll. longa, 2—3 poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, brunnescens, breviter villosa. SEGMENTA inferiora raro $1\frac{1}{4}$ poll. longa (plerumque $\frac{3}{4}$ poll. et minor), 4—6 lin. lata, interstitiis 4-linearibus subopposita, patentissima, oblongo-lanceolata, basi superiore subcordata subauriculata inferiore horizontaliter abscisa; summa late adnata in apicem laminae lanceolatum basi incisum confluentia, omnia margine inaequaliter obtuse serrulata. NERVUS PRIMARIUS diagonalis excurrens, gracilis, elevatus; SECUNDARIJ remoti dichotomi, liberi, elevati. PANICULAE longitudine varia, 1— $2\frac{1}{2}$ -pollicares; PEDUNCULO gracili, flexuoso, villosa 2-pollicari. RHACHIOAE FRUCTIFERAE filiformes angustae, immarginatae. PILI in basi stipitis nodoso-articulati, validi, basi crassiores, straminei, valde pellucidi, e cellulis circiter 13 compositi. SPORAE tetraëdrae basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae, pallide virescentes. —

Ab *A. hirta* Sw. differt: parvitate laminae frondis fertillis, segmentis tenuiter membranaceis minus numerosis magis approximatis brevioribus integris versus apicem lateribus breviter acuminatis, nervis secundariis remotioribus.

Habitat in Antillis, e. g. in insula Trinidad; in insula St. Kitts: Breutel; in Antigua, in fruticetis montosis: Wulfschlaegel n. 742 bis. In Brasilia nondum detectam introduximus, quia Filicum patria late patet et expositio nostra ad diagnoscendas affines facit.

B. Nervus primarius sensim evanescentis.

17. ANEIMIA RADICANS RADDI lamina membranacea lineari-oblonga pinnatisecta, apice nudo prolifera; segmentis ad 40-jugis, subtus hirtulis, infimis reflexis, omnibus sessilibus lineari-oblongis subdimidiatis obtusis, superioribus valde decrescentibus, summis cuneatis non confluentibus; paniculis lamina duplo brevioribus, laxis, pedunculo subduplo brevioribus.

Aneimia radicans Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 22. Ejusd. Fil. Brasil. 70. tab. 10. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. n. 5. Presl Suppl. Tent. Pterid. 85.

Aneimia caudata Kaulf. Emm. Fil. 52 (teste Presl). Moore Index Fil. 64 (partim).

RHIZOMA adscendens, pilis brevibus ferrugineis. STIPES 6—12 poll. longus, diametro 1 lin., subcompressus, supra profunde tricanaliculatus, villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS ad 12 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. lata. RHACHIS supra inferne tricanaliculata, straminea, apicem versus nuda ad extremum dilatata villosa prolifera. SEGMENTA inferiora 9—12 lin. longa, basi 4 lin. lata, interstitiis 4-linearibus opposita, infimis reflexis, sequentia patentissima, lineari-oblonga, subdimidiata, obtusa, basi superiore perpendiculariter truncata subauriculata inferiore horizontaliter cuneata, margine superiore apiceque inaequaliter crenulato-denticulata; superiora valde decrescentia, magis approximata, alternantia; summa non confluentia patula cuneata, vix 4 lin. longa. NERVUS PRIMARIUS diagonalis ante medium evanescentis; SECUNDARIUS subflabellato-dichotomi, liberi, supra elevati. PANICULAE 3 poll. longae, 3—4 lin. crassae; PEDUNCULO 4—5-poll. gracili, flexuoso, laxo piloso. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE semiteretes angustae, immarginatae, glabrae. PILI rhizomatis curvati, nodoso-articulati, fusciduli subpellucidi, e cellulis subdenis; cellulae inferiores breviores crassiores. SPORAE tetraedrae, basi convexae, distincte remoteque elevato-striatae, aculeolatae, virentes. — Ab *Aneimia Mandioccana* facile dignoscenda: rhachi apice nudo prolifera, segmentis infimis reflexis, summis distantibus nunquam decurrentibus.

Habitat frequens in salibus montosis prope Rio de Janeiro, praesertim in monte Corcovado: Raddi, Sellow, Schott, Gaudichaud, Beyrich, Langsdorff; passim in altis petrosis sylvis omnis Serra do Mar: M.

18. ANEIMIA MANDIOCCANA RADDI lamina membranacea oblongo-lanceolata acuminata, pinnatisecta, apice non prolifera; segmentis sub-30-jugis, subsessilibus lineari-oblongis acutis subfalcatis, utrinque pilosiusculis, superioribus parum decrescentibus, summis confluentibus; paniculis lamina semper brevioribus, laxis, pedunculo brevioribus.

Aneimia Mandioccana Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 23. Ejusd. Fil. Brasil. 70. tab. 9. fig. 1. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. n. 7. Presl Suppl. Tent. Pterid. 90. Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 305.

Aneimia caudata γ. abscissa Moore Index Fil. 65 (excl. syn. A. abscissa Schrad.).

RHIZOMA adscendens, dense ferrugineo-pilosum. STIPES 5—10 poll. longus, diametro 1 lin., subquadrangularis, supra tricanaliculatus, villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 6—11 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS supra inferne tricanaliculata, straminea, villosa. SEGMENTA inferiora 9 lin. — $1\frac{1}{2}$ poll. longa, ad basin 3—4 lin. lata, interstitiis 5-linearibus remota, alterna,

patula, lineari-oblonga acuta, subfalcata, basi superiore truncata plus minusve rotundata subauriculata, inferiore subdimidiata horizontaliter cuneata, margine superiore apiceque inaequaliter crenulato-denticulata; superiora sensim magis approximata, summa valde decrescentia 3—4 lin. longa cuneata decurrentia postremo in apicem laminae confluentia. NERVUS PRIMARIUS diagonalis ante apicem evanescentis. NERVUS SECUNDARIUS subflabellato-dichotomi liberi, supra elevati. PANICULAE $1\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{2}$ poll. longae, 3—6 lin. crassae; PEDUNCULO 2—5-poll. gracili, flexuoso, sparse piloso. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE semiteretes angustae, immarginatae, glandulosae. PILI rhizomatis curvati, tortuosi, articulati, aequales vel constricti, pallide straminei, a basi ad apicem aequaliter, e cellulis 20 compositi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae, virentes.

Habitat frequens in sylvis montanis opacis et humidiusculis ad Mandiocca praedium et alibi in Serra d'Estrella et omni Serra do Mar ad S. Paulum usque: Langsdorff, Raddi, Pohl, Sellow, Pohl, M. et alii.

19. ANEIMIA COLLINA RADDI lamina subcoriacea oblonga obtusa, pinnatisecta; segmentis circiter 13-jugis, remotis, sessilibus, oblique-oblongis leviter falcatis apice rotundatis, utrinque hirtulis, supra glandulosis, inferioribus subincisis, superioribus parum decrescentibus adnatis, terminali majore obovato trifido; paniculis lamina longioribus, laxis, pedunculo aequantibus; stipite villosissimo.

VARIAT: segmentis omnibus magis minusve incisis, basi superiore ample auriculatis.

Aneimia collina Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 24. Ejusd. Fil. Brasil. 71. tab. 12. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. n. 11. Presl Suppl. Tent. Pterid. 86. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 115. Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 305. Moore Index Fil. 65 (partim). Hook. Fil. exot. tab. 1.

RHIZOMA adscendens, pilis longis ferrugineis dense obsessum. STIPES 3—6-poll., 1 lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, villosissimus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 9 poll. longa, 3 poll. lata. RHACHIS supra inferne tricanaliculata, testacea, longe denseque villosa. SEGMENTA inferiora 1—1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 4—6 lin. lata, interstitiis 6—8-linearibus subopposita, subdivariata, oblique-oblonga, leviter falcata apice rotundata, basi superiore oblique truncata vix auriculata inferiore subdimidiata horizontaliter cuneata, margine superiore apiceque inaequaliter crenulato-denticulata, interdum plus minusve incisa; superiora alterna, patula, magis magisque approximata, parum decrescentia, basi latiore adnata; segmentum terminale majus ovatum subtrifidum, basi cuneata praecedenti coallitum; omnia utrinque hirtula, supra glandulis minutissimis flavis adpersa, recentia (fide Raddi) viridi-lutescentia. NERVUS PRIMARIUS diagonalis, in medio evanescentis; SECUNDARIUS subflabellato-dichotomi liberi, supra elevati albescentes; PANICULAE 6—7 poll. longae, 4—5 lin. crassae; PEDUNCULO circiter 6-poll., valido flexuoso. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE filiformes angustissimae, glandulosae. PILI rhizomatis validi, nodoso-articulati, basi crassiores, fusciduli parum pellucidi, e cellulis circiter 20. SPORAE tetraedrae, basi convexae, distincte remoteque elevato-striatae, aculeolatae, virentes, aculeolis magnis distantibus.

Habitat in collibus prope Rio de Janeiro: Raddi, Sellow; in saxosis sylvarum ad Ouro Preto, prov. Minas: M.

ADNOTATIO. Specimen monstruosum, a Sellow prope Rio de Janeiro lectum (in hb. Berol.) Presl (Suppl. Tent. Pterid. l. c.) sub varietate β. evoluta sic bene descripsit: „paniculae in segmenta profunde pinnatifida reliquis majora transmutatae, laciniis oblongo-lanceolatis, lateralibus crenulatis, terminali maximo duplicato-crenulato.“

20. ANEIMIA PALLIDA FIELD. ET GARDN. lamina coriacea subtriangulari-oblonga acuminata, pinnatisecta; segmentis sub-11-jugis, sessilibus, ciliatis, supra subpilosus subtus glabris, inferioribus oblongo-lanceolatis breviter acuminatis inaequaliter incisis crenulatis, basi superiore auriculatis, superioribus decrescentibus minus incisis, summis confluentibus; pani-

culis lamina duplo longioribus, pedunculo brevioribus; stipite glabro.

Anemia pallida Field. et Gardn. *Sertum Plant. ad tab. 70. in nota.*

Anemia elegans et adiantoides Pohl in *schedula Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 2423 et 6182.*

Anemia incisa var. β . *obtusa* Presl *Die Gefässbündel im Stipes der Farra 20.*

Anemia incisa Moore *Index Fil. 67 (partim).*

RHIZOMA mihi ignotum. STIPES 10-poll., $\frac{3}{4}$ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, testaceus, glabrescens, ima basi tantum pallide ferrugineo-villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 3—6-poll. longa, $1\frac{1}{2}$ —3 poll. lata. RHACHIS supra usque ad medium tricanaliculata, subglabra. SEGMENTA inferiora 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 6 lin. lata, interstitiis 4—7-linearibus opposita, patentissima, oblongo-lanceolata breviter acuminata, incisa, sinibus obtusis, crenulata, basi superiore oblique truncata subcordata plerumque late profundeque auriculata inferiore cuneato-abcisa; superiora alterna, patula, minus profunde incisa; summa ovata, integra, crenulata, in apicem laminae lanceolatum vel obovatum lobatum obtusum confluentia. NERVUS PRIMARIUS diagonalis, in medio evanescent; SECUNDARIUS subflabellato-dichotomi liberi, supra elevati; PANICULAE 4 poll. longae, 4 lin. crassae; PEDUNCULO $4\frac{1}{2}$ -pollicari robusto, glabro. RHACHIOLE FRUCTIFERAE filiformes, angustae, immarginatae. PILI in basi stipitis curvati, tortuosi, articulati, aequales, lati, pallide straminei pellucidi, e cellulis 1—13. SPORAE magnae tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, virescentes, aculeolis densis hyalinis.

Anemiae collinae quoad formam segmentorum similis, sed ambitu triangulari, consistentia coriacea, segmentis angustioribus acuminatis, glabritate rhacheos stipitisque omnino ab ea diversa.

Habitat in prov. Goyazensi: Gardner n. 3560 bis., in Serra dowrada: Pohl.

21. ANEMIA VELLEAE SCHRAD. lamina (sicca) scarioso-membranacea subtriangulari-oblonga obtusa, pinnatisecta; segmentis 8—9-jugis, valde remotis, supra leviter hirtis, subtus rufo-pilosis, inferioribus breviter petiolatis oblique-oblongis interdum incisus apice latioribus rotundatis, superioribus parum decrescentibus sessilibus, terminali majore obovato trifido basi cuneato; paniculis lamina longioribus, laxissimis, pedunculo brevioribus; stipite villosissimo.

Anemia velleae Schrad. in *Goetting. gelehrt. Anzeig. 1824. 865.*

Anemia collina Presl *Suppl. Tent. Pterid. 86 (partim).* Moore *Index Fil. 65 (partim).*

RHIZOMA adscendens, pilis longis pallide ferrugineis dense obsessum. STIPES frondis sterilis dimidia laminae longitudine; frondis fertis longior, interdum 10 poll. et quod excedit longus, 1 lin. crassus, subquadrangularis, supra tricanaliculatus, villosissimus; indumento pallide ferrugineo. LAMINA FRONDIS FERTILIS 8—9 poll. longa, usque ad 5 poll. lata. RHACHIS supra basin versus tricanaliculata, testacea, longe villosa. SEGMENTA inferiora $2\frac{1}{2}$ poll. longa, apicem versus (ubi latissima) fere 1 poll. lata, interstitiis 1-pollicaribus, subalterna, patula, distincte petiolata, oblique-oblonga, rotundata, basi superiore oblique truncata inferiore subdimidiata subhorizontaliter cuneata, margine superiore apiceque inaequaliter crenulato-denticulata, interdum incisa; superiora parum decrescentia sessilia; segmentum terminale aliquantulum majus petiolatum vel cum praecedente connatum obovatum trifidum basi cuneatum; omnia statu sicco rubiginosa nitentia, subtus obscure viridia. NERVUS PRIMARIUS diagonalis in medio evanescent, subtus elevatus validus dense villosus; SECUNDARIUS subflabellato-dichotomi liberi, supra elevati non raro albo-lineati; PANICULAE 5 poll. longae, 6 lin. crassae; PEDUNCULO 8 poll. longo, gracili, flexuoso villosus. RHACHIOLE FRUCTIFERAE filiformes angustissimae, immarginatae, glandulosae. PILI rhizomatis subnodoso-articulati, basi minus crassi, valde attenuati, fusciduli parum pellucidi, e cellulis circiter 13 compositi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, aculeolatae pallide flavescens. — A proximis ambitu laminae frondis fertis subtriangulari-oblongo, stipite dense villosus, numero minore

segmentorum (in quovis latere circiter 9) et consistentia scarioso-membranacea, in sicco rubiginosa diversa.

Habitat in sylvis ad Villa nova de Almeida, prov. Spir. Sancti: Princ. Max. Neovidensis; inter Rio de Janeiro et urbem Campos: Settow.

§. 3. Nervus primarius evanescent.

A. Pars sterilis bipinnatisecta. (Spec. 22—28.)

22. ANEMIA ADIANTIFOLIA SWARTZ lamina submembranacea triangulari, bipinnatisecta; segmentis supra glabris, subtus sparse pilosis, primariis sub-13-jugis, remotis, subtriangulari-lanceolatis longe acuminatis; secundariis lanceolatis obtusis; laciniis ovatis cuneatis, apice rotundato acute denticulatis; paniculis laminam superantibus amplis interruptis, pedunculo longioribus.

Anemia adiantifolia Swartz *Syn. Fil. 157. Willd. Sp. Pl. V. 94. Turpin. in Dict. de sc. nat. Acotyl. tab. 100. Kunze in Linnaea IX (1834). 21 et XVIII (1844). 309. Klotzsch ibid. 527. Presl *Suppl. Tent. Pterid. 85. Ejusd. Die Gefässbündel im Stipes der Farn 20. tab. III. fig. 20. Moore Index Fil. 63.**

Anemirhiza adiantifolia J. Smith in *Botany Voyage Herald I. 243 (in observat.).*

Ornithopteris adiantifolia Bernhardi in *Schrad. Neues Journ. 1806. II. 50. tab. 3. fig. 15 b.*

Osmunda adiantifolia Linn. *Sp. Pl. 1520.*

Var. β . *asplenifolia* Willd. l. c. Hook. et Grex. *Icon. Fil. I. tab. 16.*

Anemia asplenifolia Swartz l. c.

Osmunda asplenifolia Lam. *Encycl. IV. 652.*

RHIZOMA repens, pilis densis setiformibus brevibus nigricantibus. STIPES 4—12 poll. longus, diametro vix 1 lin., semiteres, supra canaliculatus marginatus, testaceus, glabrescens, inferne rubiginosus, basi ima villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 6—10 poll. longa, 4—8 poll. lata, petiolo 7-linear. RHACHIS PRIMARIA uti SECUNDARIAE graciles, supra a basi ad apicem canaliculatae, laxae pilosae, stramineae. SEGMENTA PRIMARIA inferiora 6 poll. longa, 1—2 poll. lata, interstitiis 9-linearibus, alterna, patula, longe petiolata, subtriangulari-lanceolata longe acuminata pinnatisecta; superiora decrescentia inferne quoque pinnatisecta petiolataque; summa sessilia ad postremum in apicem laminae perangustum confluentia. SEGMENTA SECUNDARIA inferiora 18 lin. longa, 3 lin. lata, in segmentis primariis inferioribus inferne distincte petiolata, pinnatisecta; superiora sessilia pinnatisecta; summa decurrentia postremo confluentia. LACINIAE maximae 4 lin. longae, apice rotundato acute denticulatae incisae. NERVUS flabellato-dichotomi liberi, utrinque elevati. PANICULAE 6—9 poll. longae, 6 lin. crassae; PEDUNCULO gracili 3—4-poll. RHACHIOLE FRUCTIFERAE latae foliaceae marginatae, subglabrae. PILI rhizomatis subuliformes articulati, fusi impellucidi, e cellulis subseptenis, quarum inferiores breviores crassae, superiores attenuatae, ultima longa acicularis curvata. SPORAE (minores quam in *A. ferruginea*) tetraedrae, basi convexae, angulis valde obtusis, elevato-striatae, striis validis remotis subserpentinis. — Laciniis cuneiformibus apice acute denticulatis et pilis rhizomatis brevibus setiformibus ab omnibus sectionibus laminae bipinnatisectae speciebus facile dignoscitur.

Species a Mexici regionibus per Americam centratem, Columbian et Antillanas insulas vasto tractu diffusa, in Brasiliae aequatorialis montibus forsitan detegenda.

23. ANEMIA ANTHRISCIFOLIA SCHRAD. lamina submembranacea triangulari bipinnatisecta, utrinque breviter et rufulo-pilosa; segmentis primariis sub-12-jugis remotis, lanceolatis breviter acuminatis subfalcatis, secundariis lanceolatis acutis; laciniis subtriangularibus integerrimis; rhachibus secundariis a medio ad apicem elevatis flexuosis; paniculis laxis angustis lamina et pedunculo longioribus.

Anemia anthriscifolia Schrad. in Goetting. gelehrt. Anzeig. 1824. 865.

Anemia villosa β. Raddiana Presl Suppl. Tent. Pterid. 82 (partim).

Anemia tomentosa γ. fulva Moore Index Fil. 70 (partim).

RHIZOMA repens, pills pallide ferrugineis densissime obsessum. STRIPES 7—10 poll. longus, diametro 1 lin., semiteres, supra canaliculatus marginatus, stramineus vel rubicundus, basi apiceque pallide ferrugineo-villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 4—7 poll. longa, 3—4 poll. lata, PETIOLO vix bilineari. RHACHIS PRIMARIA supra canaliculata, straminea, villosa; SECUNDARIA supra basin versus canaliculatae, infra a medio ad apicem elevatae flexuosaeque. SEGMENTA PRIMARIA inferiora usque ad 2½ poll. longa, 1 poll. et quod excedit lata, interstitiis 9-linearibus remota, longe petiolata, alterna, erecto-patula, lanceolata breviter acuminata subfalcata pinnatisecta; media basin versus subangustiora in medio et apicem versus latissima; superiora decrescentia et magis magisque approximata, sessilia, pinnatipartita; summa basi lata adnata decurrentia serrata, postremo in laminae apicem serratum confluentia. SEGMENTA SECUNDARIA infima usque ad 1 poll. longa, 5 lin. lata, basi lata sessilia lanceolata acuta, pinnatisecta, sequentia decurrentia e basi latissima lanceolata subfalcata leviter incisa, summa integra confluentia. LAMINA FRONDIS STERILIS a parte sterili frondis fertili non diversa. NERVI flabellato-dichotomi liberi, supra elevati. PANICULAE usque ad 7 poll. longae, vix 4 lin. crassae; PEDUNCULUS circiter 2-pollicularis. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE latae, foliaceae, marginatae, pilosae. PILI rhizomatis cylindrici nodoso-articulati, tortuosi, flavescentes pellucidi, ad articulationes fusciscentes, e cellulis circiter 12 compositi, inferiores crassiores, superiores magis magisque attenuatae. SPORAE tetraedrae, basi convexae, dense elevato-striatae, virescentes, in angulis prominentes, hyalinae.

Cum *A. fulva* confundi potest, sed differt: segmentis primariis multo angustioribus, ita simul a se remotioribus, subfalcatis, mediis basi subangustioribus quam apicem versus; rhachibus secundariis supra inferne tantum canaliculatis, infra medium ad apicem usque elevatis, angustis. (In *A. fulva* rhachis secundaria usque ultra medium late canaliculata, apicem versus non elevata, sed immersa est.)

Habitat in Monte Corcovado prope Rio de Janeiro: Pohl (Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 6181); prope Barra da Vareda: Princ. Max. Neovindensis; ad Caxoeira do Campo: M.; prope Ilheos, prov. Bahiensis: Laschnath.

24. ANEMIA FULVA SWARTZ lamina subcoriacea, triangulari, bipinnatisecta; segmentis flavescenti-pilosis, primariis 12—18-jugis, approximatis, oblongo-lanceolatis breviter acuminatis; secundariis lanceolatis acutis; laciniis triangularibus integerrimis; rhachibus secundariis ad medium usque canaliculatis, apicem versus flexuosis non elevatis; paniculis laxis angustis lamina et pedunculo longioribus.

Anemia fulva Swartz Syn. Fil. 157. Willd. Sp. Pl. V. 93. Schkuhr Krypt. Gewächse 144. tab. 142. Presl Suppl. Tent. Pterid. 84 (excl. var. β. et γ.).

Anemia tomentosa γ. fulva Moore Index Fil. 70 (partim).

Osmunda fulva Cavan. Icon. VI. 70. tab. 593. fig. 2.

RHIZOMA repens, pills longis rubiginosis densissime obsessum. STRIPES usque ad 14 poll. longus, diametrum 1 lin. attingens, semiteres, supra canaliculatus, testaceus inferne nigro-purpurascens, laxo fulvo-villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 4—7 poll. longa, 2½—5 poll. lata, PETIOLO vix bilineari. RHACHIS PRIMARIA supra canaliculata, straminea, longe villosa; SECUNDARIA supra ad medium usque et ultra late canaliculatae, apicem versus flexuosae, non elevatae, sed subimpressae, longe villosae. SEGMENTA PRIMARIA inferiora 1½—2½ poll. longa, circiter 1 poll. lata, interstitiis 5-linearibus remota, longe petiolata, alterna, erecto-patentia, oblongo-lanceolata breviter acuminata, pinnatisecta; superiora decrescentia magis magisque approximata, breviter petiolata, profunde pinnatipartita; summa subintegra decurrentia postremo in laminae apicem incisum confluentia. SEGMENTA SECUNDARIA ima ½—1 poll. longa, 2—3 lin. lata, breviter petiolata, lanceolata acuta, pinnatipartita; superiora basi lata sessilia; summa decurrentia postremo confluentia. LACINIAE triangulares integerrimae. NERVI flabellato-Schizaeace.

dichotomi liberi, supra elevati. PANICULAE circiter 7 poll. longae, vix 3 lin. crassae; PEDUNCULUS 12—15-linearis. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE foliaceae, marginatae, dense pilosae. PILI rhizomatis cylindrici leviter nodoso-articulati, parum tortuosi, fusciscentes pellucidi, ad articulationes brunnei, e cellulis usque ad 30 compositi, inferiores crassiores, superiores valde attenuatae. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, pallide virescentes, in angulis prominentes, hyalinae.

Habitat in monte Pan de Açucar prope Montevideo: Née (teste Cavanilles); in Brasiliae monte Corcovado ad Rio de Janeiro: Pohl (Herb. Vindob. n. 3850 nomine: *A. triangularis*); in prov. Goyaz: Gardner n. 3539; prope Bahiam: Blanchet (teste Presl).

25. ANEMIA RUBROSTIPES POHL lamina coriacea triangulari-ovata, bipinnatisecta; segmentis utrinque laxo pilosis, primariis circiter 13-jugis, approximatis, lanceolatis obtusis; secundariis ovato-oblongis obtusis; laciniis rotundatis; rhachibus secundariis supra inferne tantum canaliculatis, apicem versus subelevatis; paniculis validis densis laminam excedentibus, pedunculo suo duplo—quaduplo longioribus.

Anemia rubrostipes Pohl in Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 1556.

Anemia tomentosa γ. fulva Moore Index Fil. 70 (partim).

RHIZOMA repens, pills rubiginosis densissime obsessum. STRIPES 7—8 poll. longus, in medio diametrum 1 lin. attingens, semiteres, superne subcanaliculatus, glaber, rubicundus, ima basi villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS circiter 5 poll. longa, 2½ poll. lata, PETIOLO trilineari. RHACHIS PRIMARIA supra canaliculata, straminea, perlonge flavescenti-villosa; SECUNDARIA segmentorum inferiorum supra versus basin tantum canaliculatae, a medio apicem versus subelevatae, flexuosae. SEGMENTA PRIMARIA inferiora usque ad 4½ poll. longa, 9 lin. lata, interstitiis 6-linearibus remota, alterna, patula, breviter petiolata, lanceolata obtusa, inferne pinnatisecta; superiora decrescentia magis magisque approximata, sessilia, pinnatipartita; summa integra decurrentia, postremo in apicem laminae serratum confluentia. SEGMENTA SECUNDARIA infima (maxima) usque ad 8 lin. longa, 4 lin. lata, basi lata sessilia, ovato-oblonga obtusa pinnatipartita, sequentia ovata decurrentia integra, cum postremo confluentia. (In lamina frondis sterili segmenta secundaria inferiora contingunt ovato-oblonga, inciso-lobata.) LACINIAE rotundatae. NERVI crebri dichotomi, liberi, utrinque elevati. PANICULAE 4—5 poll. longae, fere 6 lin. crassae; PEDUNCULUS 1—1½ poll. longus, robustus, rubicundus, villosus. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE foliaceae late-marginatae, dense glanduloso-pilosae. PILI rhizomatis taeniaeformes articulati, vix nodosi, tortuosi, fusciduli pellucidi, ad articulationes fuscis, e cellulis circiter 15 compositi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, pallide virescentes, in angulis prominentes, hyalinae.

Ab *A. fulva* Swartz, quacum beat. Presl conjunxit, differt: ambitu laminae partis sterili triangulari-ovato, textura robustiore coriacea, segmentis primariis angustioribus et praecipue segmentis secundariis ovato-oblongis, laciniis rotundatis.

Habitat in Serra douxada, prov. Goyazensis: Pohl; in Brasilia loco natali non indicato: Sellow (in Herb. Reg. gen. Berol. n. C. 16.).

26. ANEMIA RUTAEOFOLIA MART. lamina sesquipollicari, coriacea, triangulari, bipinnatisecta, utrinque parce pilosa; segmentis primariis 5—6-jugis, remotis, lanceolatis acuminatis; secundariis lanceolatis oblongisve inciso-lobatis s. integris; rhachibus secundariis non elevatis indistinctis; paniculis brevissimis lamina duplo brevioribus robustis subsessilibus.

Anemia rutaefolia Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 112. tab. 55. fig. 1. Presl Suppl. Tent. Pterid. 82. Moore Index Fil. 69.

RHIZOMA repens, pills ferrugineis densissime obsitum. STRIPES frondis fertili circiter 4 poll. longus, sterilis 6 lin., diametro vix ¼ lin., gracilis, semiteres, supra 3-canaliculatus, testaceus, glabrescens, basi ima tantum pilosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 1—1½ poll. longa, 9 lin. lata, PETIOLO

4-lineari. RHACHIS PRIMARIA supra canaliculata, parce pilosa; SECUNDARIAE ad basin canaliculatae, apicem versus non elevatae, indistinctae. SEGMENTA PRIMARIA inferiora circiter 5 lin. longa, 3—4 lin. lata, interstitiis 2-linearibus opposita, patula, subsessilia, lanceolata acuminata, inferne pinnatisecta; superiora vix decrecentia linearia pinnatipartita; summa minima in apicem serratum confluentia. SEGMENTA SECUNDARIA infima lanceolata inciso-lobata, lobis obtusis; superiora oblonga denticulata vel integerrima. Nervi supra parum distincti dichotomi elevati. PANICULAE 9 lin. longae, 3 lin. crassae, sessiles aut PEDUNCULO vix 2-lineari. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE foliaceae latissimae, marginatae, glandulosae, subpilosae. PILI rhizomatis articulati, tortuosi, pallide straminei valde pellucidi, cellulis circiter 11. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, virescentes, in angulis obtusis non prominentes. — Species rarissima, parvitate omnium partium, paniculis subsessilibus, vix pollicaribus et frondibus sterilibus breve stipitatis ab omnibus speciebus sui generis longe distat.

Habitat in asperis lapidosis Serra do Caraça, prov. Minarum: M. vidi in hb. Monac.

27. ANEMIA FERRUGINEA HUMB. BONPL. KUNTH lamina submembranacea, triangulari-ovata, bipinnatisecta; segmentis utrinque pilis longis flavescens obsessis, primariis 11—13-jugis remotis lineari-lanceolatis obtusiusculis; secundariis ovato-lanceolatis obtusis; lobis ovatis rotundatis integris margine revolutis; rhachibus secundariis ad medium usque canaliculatis, inde elevatis flexuosis; paniculis laminam duplo superantibus validis laxis, pedunculo quadruplo—sextuplo brevioribus.

Aneimia ferruginea Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. et Sp. I. 32. Kunth Syn. I. 94. Presl Reliq. Haenk. I. 75 (quoad var. β . major). Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 527.

Aneimia villosa γ . Humboldtiana Presl Suppl. Tent. Pterid. 83 (partim).

Anemia tomentosa Moore Index Fil. 70 (partim).

RHIZOMA repens, pilis laete ferrugineis dense obsessum. STIPES 6—11 poll. longus, vix 1 lin. crassus, semiteres, supra canaliculatus, rufescens, basi compressus villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 3—5 poll. longa, 4 poll. lata, PETIOLO vix bilineari, non raro sessilibus. RHACHIS PRIMARIA canaliculata, straminea, dense villosa. SEGMENTA PRIMARIA inferiora circiter 2 poll. longa, 6—12 lin. lata, interstitiis 7-linearibus subopposita, patula, breviter petiolata lineari-lanceolata obtusiuscula, pinnatisecta; superiora decrecentia magis approximata, sessilia, linearia; summa ovata in apicem lobatum confluentia. SEGMENTA SECUNDARIA infima 8 lin. longa, 3 lin. lata, ovato-lanceolata obtusa adnata lobato-incisa; superiora decurrentia e basi latissima ovato-oblonga obtusissima, leviter lobato-incisa. LOBI ovati rotundati integri margine revoluti. Nervi flabellato-dichotomi liberi, supra valde elevati. PANICULAE 6 poll. longae, 6 lin. crassae; PEDUNCULUS 4-pollicaris, robustus villosus. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE late foliaceae marginatae, villosae. PILI rhizomatis sursum attenuati subnodoso-articulati tortuosi, pallide straminei valde pellucidi, e cellulis 15 et pluribus. SPORAE tetraedrae basi convexae, elevato-striatae, pallide virescentes, striis tenuibus parum exsertis, in angulis obtusis vix prominentes.

Ab *A. fulva* et *A. anthriscifolia* segmentis secundariis lobisque rotundatis diversissima; cum *A. rubrostipite* ob texturam submembranaceam, segmenta remotiora nusquam contigua et lobos revolutos non confundenda est.

Habitat in prov. Bahiensi prope Ilheos: Luschnath, Blanchet n. 3270; in Guiana anglica ad Pirara: Rich. Schomburgk n. 624; in Venezuela super M. Silla de Caracas: Humboldt et Bonpland; ad Tumeremo: E. Otto n. 1049; in montibus scopulosis apricis ad Caracas et Cocollar: Moritz n. 72 et 157.

28. ANEMIA TOMENTOSA SWARTZ lamina subcoriacea ovali, bipinnatisecta; segmentis utrinque pilis dense obsessis aureo-glandulosis, primariis circiter 12-jugis remotis breviter petiolatis lanceolatis obtusis; secundariis lineari-oblongis; lobis

rotundatis revolutis; rhachibus secundariis ad medium usque canaliculatis, inde elevatis, villosis; paniculis laminam parum superantibus laxis pedunculo vix longioribus.

Aneimia tomentosa Swartz Syn. Fil. 157. Willd. Sp. Pl. V. 93. Moore Index Fil. 69 (partim).

Aneimia villosa, var. δ . tomentosa Presl Suppl. Tent. Pterid. 83.

Osmunda tomentosa Lam. Encycl. IV. 652.

Aneimia cheilanthoides Kaulf. Enum. Fil. 53.

Aneimia villosa, ϵ . cheilanthoides Presl l. c.

RHIZOMA repens, pilis longis ferrugineis densissime obsessum. STIPES 4—8 poll. longus, 1 $\frac{1}{2}$ lin. crassus, semiteres, canaliculatus, villosus, medio glabrescens, testaceus, basin versus nigro-purpurescens. LAMINA FRONDIS STERILIS 4—5 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ —2 poll. lata, PETIOLO 1-lineari. RHACHIS PRIMARIA supra canaliculata, testacea, dense longeque villosa. COLOR INDUMENTI omnium partium ferrugineus. SEGMENTA PRIMARIA inferiora 1—1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 5—7 lin. lata, interstitiis 7-linearibus opposita, patula, breviter petiolata lanceolata obtusa inferne pinnatisecta; superiora magis approximata, alterna, sessilia, lineari pinnatipartita; summa lobato-incisa in apicem laminae lobatum confluentia. SEGMENTA SECUNDARIA inferiora 4—6 lin. longa, 3 lin. lata, basi lata adnata oblonga pinnatifido-lobata, superiora confluentia. LOBI rotundati revoluti. Nervi flabellato-dichotomi, liberi, supra elevati saepe albid. PANICULAE 4 poll. longae, 6 lin. crassae; PEDUNCULO 1-pollicari. RHACHIOLAR FRUCTIFERAE foliaceae, late marginatae, glabrae. PILI rhizomatis subaequaliter articulati, parum nodosi, vix tortuosi, pallide straminei pellucidi, e cellulis sub-15nis. SPORAE tetraedrae, basi convexae, angulis obtusissimis, raro prominentibus, leviter elevato-striatae, virescentes, parum pellucidae.

Parvitate et ambitu laminae frondis fertillis, item indumento dense villosa primo intuitu dignoscitur.

Habitat in prov. Uruguay et prope Monte-Video: Commerson, Sellow, Gaudichaud; in Brasilia australi: Sellow.

B. Pars sterilis pinnatisecto-pinnatifida.

α . Segmentorum laciniae rotundatae. (Spec. 29—32.)

29. ANEMIA RADDIANA LINK lamina coriacea triangulari pinnatisecto-pinnatifida; segmentis sub-12-jugis, utrinque pilis brevibus glandulisque adpersis, inferioribus petiolatis oblongo-lanceolatis obtusis basi cuneatis inferne pinnatisectis, superioribus sessilibus pinnatipartitis, summis lineari-oblongis confluentibus; laciniiis oblongis apicem versus subangustatis acutiusculis, infimis segmentorum inferiorum serrato-incisus; paniculis laxis laminam parum superantibus pedunculo duplo longioribus.

Aneimia Raddiana Link Hort. Reg. bot. Berol. II. 147. Ejusd. Fil. Sp. Hort. Reg. bot. Berol. 26.

Aneimia flexuosa Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 27. Ejusd. Fil. Brasil. 71. tab. 13 (excl. syn.). Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114 et Herbar. Florae Brasil. n. 195. Brackenk. U. St. Expl. Exped. XVI. 306.

*Aneimia villosa β . Raddiana Presl Suppl. Tent. Pterid. 82. (excl. syn.: *A. anthriscifolia* Schrad.).*

Anemia tomentosa α . Moore Index Fil. 69. (partim).

RHIZOMA repens, dense longeque ferrugineo-pilosum. STIPES 5—10 poll. longus, 1—1 $\frac{1}{2}$ lin. crassus, semiteres, tricannaliculatus, villosus, testaceus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 6—7 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 4—5 poll. lata. RHACHIS PRIMARIA supra tricannaliculata, testacea, apicem versus flexuosa, dense villosa; SECUNDARIAE segmentorum inferiorum supra versus basin canaliculatae, ceterum elevatae flexuosae. INDUMENTUM fulvum. SEGMENTA inferiora 3 poll. longa, 9—12 lin. lata, interstitiis 10-linearibus subopposita,

patula, superiora magis approximata alterna. LACINIAE maxime 9 lin. longae, 4 lin. latae. NERVI flabellato-dichotomi, liberi, supra elevati albidii. PANICULAE 4—10 poll. longae, 9 lin. crassae; PEDUNCULUS (a segmento infimo 4—7 lin. remotus) $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ -pollicaris validus. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE foliaceae marginatae, pubescentes, glandulosae. PILI in basi stipitis tortuosi articulati valde attenuati, pallide straminei valde pellucidi, cellulis sub 13-nis. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, in angulis obtusis prominentes, virescentes.

Habitat in asperis et scopulis montibus prope urbem Rio de Janeiro, in Serra d'Estrella et prope Cabocapana: Raddi, Gaudichaud, Beyrich, Schott, C. Raben, Freireiss, Schüch, Langsdorff, Laschnath, M.; in sylvis prov. Mnarum ad Mariana, locis petrosis: M.; in Serra da Piedade: M.; prope Congonhas do Campo: Stephan.

30. ANEIMIA IMBRICATA J. W. STURM lamina dense coriacea triangulari pinnatisecto-pinnatifida; segmentis supra sparse pilosis, subtus in rhachi densius et glandulosis, circiter 12-jugis, approximatis, inferioribus breviter petiolatis oblongo-lanceolatis valde obtusis basi cordatis inferne pinnatisectis, superioribus sessilibus oblongis pinnatipartitis, summis ovato-rotundatis crenulatis confluentibus, plerumque marginibus se tegentibus; laciniis inferioribus segmentorum infimorum oblongis lobatis, superioribus ovato-rotundatis; paniculis laminam parum superantibus validis, pedunculo duplo longioribus.

RHIZOMA repens, pilis rubiginosis densissime obsessum. STIPES 6—11 poll. longus, diametrum $1-1\frac{1}{2}$ lin. attingens, semiteres, compressus, supra tricanaliculatus, villosus, in medio glabrescens; plerumque rubicundus. LAMINA FRONDIS FERTILIS $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ poll. longa, $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS PRIMARIA robusta, supra profunde canaliculata, testacea; SECUNDARIAE segmentorum inferiorum basin versus canaliculatae, ceterum immersae, vix flabellatae, cum rhachi primaria dense longeque villosae, INDUMENTO pallide ferrugineo. SEGMENTA inferiora $1\frac{1}{2}$ poll. longa, inferne 9 lin. lata, opposita, patula, interstitiis 5—6-linearibus, superiora magis approximata, alterna. LACINIAE infimae segmentorum inferiorum 6 lin. longae, lobato-incisae, segmentorum mediorum 3 lin. longae lataeque, integrae. NERVI flabellato-dichotomi, liberi, supra elevati pallidi. PANICULAE 4 poll. longae, 8 lin. crassae; PEDUNCULO (a basi laminae sterilis 3—5 lin. remoto) sub- $1\frac{1}{2}$ -pollicari, robusto. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE late foliaceae marginatae, pubescentes, glandulosae. PILI basi stipitis tortuosi articulati parum attenuati, pallide fusciduli, pellucidi, cellulis fere 20. SPORAE tetraedrae basi convexae, dense elevato-striatae, in angulis obtusis vix prominentes, pallide virescentes.

Species distinctissima, textura dense coriacea, brevitate laminae, segmentis basi profunde cordatis, apicem versus vix angustatis et valde obtusis, marginibus plerumque contiguis laciniisque subsemiorbicularibus ab *A. Raddiana* Link facile separanda.

Habitat in Brasilia orientali: Sellow (in Herb. Berol. B. n. 671. c. 18 et 3 b. 11); in Minas Geraes: Gardner n. 5341.

31. ANEIMIA VILLOSA HUMB. ET BONPL. lamina coriacea lineari-oblonga pinnatisecto-pinnatifida; segmentis utrinque dense pilosis et aureo-glandulosis, 9—12-jugis inferioribus subsessilibus, remotis, oblongis vel ovato-oblongis obtusis, pinnatipartitis, basi subcordata rotundatis, superioribus sessilibus lineari-oblongis lobato-incis, summis ovatis rotundatis confluentibus; laciniis oblongis rotundatis, infimis incisis, reliquis integerrimis; paniculis laminam superantibus validis laxis, pedunculo subtriplo longioribus.

Aneimia villosa Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Pl. V. 92. Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. et Sp. I. 26. Kunth Syn. I. 94. Kaulf. Enum. Fil. 53. Mett. Fil. hort. bot. Lipsiens. 115.

Aneimia villosa γ. Humboldtiana Presl Suppl. Tent. Pterid. 83 (excl. syn.: A. ferruginea Humb. Bonpl. Kunth).

Anemia tomentosa α. Moore Index Fil. 69 (partim).

RHIZOMA repens, pilis longis ferrugineis densissime vestitum. STIPES 5—11 poll. longus, $\frac{3}{4}$ —1 lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, testaceus vel rubicundus, longe denseque villosus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 4—7 poll. longa, 2— $2\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS PRIMARIA supra tricanaliculata, testacea, apicem versus stricta et SECUNDARIAE supra a basi ad medium elevatae, densissime ferrugineo-villosae. SEGMENTA inferiora $1-1\frac{1}{4}$ poll. longa, 6—7 lin. lata, interstitiis 4—6-linearibus opposita, patentissima, superiora magis approximata alterna. LACINIAE infimae segmentorum inferiorum 4 lin. longae, 3 lin. latae incisae, reliquae integrae. NERVI flabellato-dichotomi, liberi, supra parum elevati albidii. PANICULAE 2—4 poll. longae, 5—6 lin. crassae; PEDUNCULO $1-1\frac{1}{2}$ poll. longo, a basi laminae sterilis $1-4$ lin. remoto, robusto, villosa. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE foliaceo-marginatae, glandulosae, pubescentes. PILI basi stipitis tortuosi, articulati, subattenuati, pallide straminei, pellucidi, cellulis sub 13-nis. SPORAE magnae tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, angulis obtusis prominentibus, virescentes. — Ab *A. Raddiana* circumscriptione laminae sterilis oblonga, segmentis inferioribus subsessilibus, basi cordatis, brevioribus, multo magis approximatis, densius villosis diversa.

Habitat prope Rio de Janeiro: Beyrich, Schott; in Serra d'Estrella: Gardner n. 5956. — In Venezuela: Humboldt et Bonpland; prope Caracas: Otto n. 670, Moritz n. 4.

32. ANEIMIA OBLONGA J. W. STURM lamina coriacea lineari-oblonga pinnatisecto-pinnatifida; segmentis sub-19-jugis, utrinque pilosis subglandulosisque, omnibus sessilibus ovato-oblongis obtusis, inferioribus basi cordatis inferne pinnatipartitis, superioribus pinnatifidis, summis ovalibus integris confluentibus; laciniis linearibus obtusis; paniculis laminam longitudine superantibus validis laxis, pedunculo duplo longioribus.

RHIZOMA repens pilis ferrugineis dense obsessum. STIPES 6—10 poll. longus, diametrum 1 lin. attingens, semiteres, tricanaliculatus, sparse villosus, testaceus vel rubicundus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 5—12 poll. longa, 2—3 poll. lata. RHACHIS PRIMARIA supra tricanaliculata, testacea, apice recta, raro flexuosa, villosa; SECUNDARIAE supra elevatae, flexuosae. COLOR INDUMENTI ferrugineus. SEGMENTA inferiora $1-1\frac{1}{2}$ poll. longa, 6—9 lin. lata, interstitiis 6—9 linearibus a sequentibus remota, opposita, patentissima, media superioraque valde alterna, tandem magis approximata. LACINIAE infimae segmentorum inferiorum 5 lin. longae, 2 lin. latae, raro incisae. NERVI flabellato-dichotomi liberi, supra elevati albidii. PANICULAE 4—7 poll. longae, 6 lin. crassae; PEDUNCULUS $1\frac{1}{2}$ —4 poll. longus (ab jugo infimo segmentorum partis sterilis non remotus) validus, villosus. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE foliaceae marginatae pubescentes glandulosae. PILI basi stipitis tortuosi, nodoso-articulati, validi, basi crassiores, apice parum attenuati, pallide straminei valde pellucidi, e cellulis circiter 16 compositi. SPORAE magnae tetraedrae, basi convexae, dense elevato-striatae, pallide virescentes, in angulis obtusis prominentes, hyalinae.

Species cum *A. Raddiana* Link confusa differt: circumscriptione laminae lineari-oblonga; segmentis ovato-oblongis, inferioribus inferne pinnatipartitis (sed nunquam usque ad rhachim pinnatisectis, ut in *A. Raddiana*); laciniis lineari-oblongis integerrimis; pedunculis a basi partis sterilis non remotis.

Habitat in Brasilia orientali: Pohl, Schüch; prope Rio de Janeiro: Sellow (Herb. Reg. Berol. L. 61. B., nomine A. Raddianae).

β. Segmentorum laciniae lineares. (Spec. 33—36.)

33. ANEIMIA CILIATA Presl lamina membranacea lineari-oblonga pinnatisecto-pinnatifida; segmentis utrinque pilis laxe adpersis, 5—8-jugis, inferioribus sessilibus oblongis obtusis apice lato rotundatis, inferne profunde pinnatifidis superne leviter incis, basi superiore late profundeque auriculatis; lacinii linearibus ad extremum inaequaliter denticulatis ciliatis; paniculis lamina duplo longioribus parvis, pedunculo subtriplo brevioribus.

Aneimia ciliata Presl *Deliciae Pragenses*. 158. *Ejusd. Suppl. Tent. Pterid.* 87. Kunze in *Linnaea XXV* (1852). 746.

Aneimia repens b. *major* Raddi *Syn. Fil. n. 25. Ejusd. Fil. Brasil.* 71. tab. 9. fig. 2 b. Link *Hort. Reg. bot. Berol. II.* 144. Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844). 526.

Aneimia hirsuta Mart. *Icon. Pl. Crypt. Brasil.* 114. (non Swartz). Link *Fil. Sp. Hort. Reg. bot. Berol.* 26. Kunze in *Linnaea XVIII* (1844). 308. Moore *Index Fil. 66* (partim).

Aneimia adiantifolia Schlechtend. et Chamisso in *Linnaea V.* (1830). 621.

Aneimia hirsuta var. *achilleaeifolia* Martens et Galleoti *Syn. Fil. Mexican.* 20.

Aneimia glauca Hildenbrand (fide Herb. Kunzei).

RHIZOMA repens, pilis pallide ferrugineis dense obsessum. STIPES frondis fertilis 3—5 (sterilis vix 2) poll. longus, diametro vix $\frac{1}{3}$ lin., semiteres, supra tricanaliculatus, villosus, medio glabrescens, rubens. LAMINA FRONDIS FERTILIS 2—3 poll. longa, 1— $\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, sulco medio latissimo, laxe villosa. SEGMENTA inferiora 9 lin. longa, 5 lin. lata, interstitiis 4—5-linearibus opposita, subdeflexa, sessilia, oblonga, apice lato rotundata, inferne profunde pinnatifida, basi superiore auriculata subperpendiculariter truncata inferiore subhorizontaliter absca; superiora alterna, patula, magis magisque approximata decrescentia, inciso-denticulata decurrentia; terminale breviter petiolatum, obovatum trilobum basi cuneatum. LACINIAE maxinae circiter 3 lin. longae, 1 lin. latae. NERVI flabellato-dichotomi, supra elevati. PANICULAE circiter 2 poll. longae, valde interruptae, 3 lin. crassae; PEDUNCULO usque 5-poll., gracili, flexuoso. PILI rhizomatis latissimi, non attenuati, articulati, non constricti, pallide brunnescentes, cellulis circiter 11. SPORAE magnae tetraedrae, basi convexae, in angulos obtusos subprominentes, remote sed manifeste elevato-striatae, virescentes.

Habitat in prov. Rio de Janeiro, in muris vetustis aquaeductus Caryocae prope urbem: Raddi; in vicinia S. Christorão in umbris ad radices arborum: Pohl (Herb. Vindob. n. 3852), item in Serra dos Orgãos: M. et in prov. Minarum alptribus saxosis ad Mariana et Tejuco: M.; in campis arbusto consitiis prope Contendas: Duarte; in Piahy et Goyaz: Gardner n. 2388 et 3558. — In Venezuela: Hartweg n. 1482; ad Valencia: Moritz n. 5; ad Puerto-Cabello: Karsten n. 51; ad Caracas: Wagener; in Mexico: Schiede n. 818, Galeotti n. 6363, Leibold n. 30, Ehrenberg.

34. ANEIMIA HIRSUTA SWARTZ lamina dense membranacea subtriangulari-oblonga acuminata pinnatisecto-pinnatifida; segmentis vix ciliatis, supra solummodo laxe pilosis, circiter 8-jugis, inferioribus petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis longitudinaliter profunde pinnatifidis; lacinii linearibus vel obovato-linearibus, integris vel inciso-serratis apice inaequaliter denticulatis; paniculis laminam duplo superantibus, parvis densis, pedunculo subtriplo brevioribus.

Aneimia hirsuta Swartz *Syn. Fil. 156. Willd. Sp. Pl. V. 91. Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. et Sp. I. 26. Kunth Syn. I. 94. Klotzsch in Linnaea XVIII* (1844). 525. Presl *Suppl. Tent. Pterid.* 88. Moore *Index Fil. 66* (partim).

Osmunda hirsuta Linn. *Sp. Pl. 1520.*

STIPES 5—9 poll. longus, $\frac{1}{3}$ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, pilosus, medio glaberrimus, rubens. LAMINA FRONDIS FERTILIS $2\frac{1}{2}$ —4 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, laxe pilosa. SEGMENTA inferiora 9—15 lin. longa, 6—9 lin. lata, interstitiis 7-linearibus subopposita, patula, longe petiolata, oblongo-lanceolata, acuminata v. obtusa, longitudinaliter profunde pinnatifida, basi superiore truncata (lacinia infima latiore, subauriculata) inferiore oblique absca; superiora decrescentia lineari-oblonga inciso-denticulata adnata; summa alterna magis magisque approximata decrescentia linearia decurrentia, cum postremo in apicem laminae trilobum confluentia. LACINIAE maxinae usque ad 6 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae. NERVI dichotomi liberi, supra valde elevati. PANICULAE 2 poll. longae, circiter 3 lin. latae; PEDUNCULUS 3—5 poll. longus, gracilis, flexuosus. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE semiteretes, immarginatae, perangustae glabraeque. PILI in basi stipitis cylindrici, subaequabili-articulati, apicem versus parum attenuati, fusciduli subpellucidi, cellulis 11. SPORAE tetraedrae, basi convexae, angulis obtusis non prominentes, elevato-striatae, aculeolatae, virescentes.

Habitat in Venezuela, in montosis prope Caripe et Santa Cruz: Humboldt et Bonpland; ad Caracas: Bredemeyer; in graminosis apricis prov. Cumanae: Moritz n. 158; in Jamaica: Swartz. — Verisimiliter in Brasiliae septentrionalis confinibus haud deest.

35. ANEIMIA DISSECTA Presl lamina tenuiter membranacea ovali-oblonga obtusa pinnatisecto-pinnatifida; segmentis ciliatis utrinque pilis perbrevisibus laxe adpersis, circiter 12-jugis, inferioribus petiolatis ovali-oblongis acutis longitudinaliter profunde pinnatifidis, basi superiore subauriculatis; lacinii longis anguste linearibus exterius incis apice inciso-denticulatis; paniculis parvis angustis laminam duplo excedentibus, pedunculo quadruplo brevioribus.

Aneimia dissecta Presl *Reliq. Haenk. I. 74. tab. 11. fig. 4. Ejusd. Suppl. Tent. Pterid.* 88. J. Smith in *Herald, Voyage, Botany I.* 242.

Aneimia multifida Pohl in *Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 2472.*

Aneimia chaerophylla Bongard (fide Herb. Kunzei).

? *Aneimia tenella* Swartz *Syn. Fil. 156. Willd. Sp. Pl. V. 91. Schkuhr Krypt. Gewächse 143. tab. 141. Presl Suppl. Tent. Pterid.* 88. Moore *Index Fil. 69.*

? *Osmunda tenella* Cavan. *Icon. VI. 69. tab. 592. fig. 1.*

STIPES 4 poll. longus, $\frac{1}{4}$ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, glabrescens, basi apiceque solummodo villosus, inferne rubicundus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 2— $4\frac{1}{2}$ poll. longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS supra aequaliter tricanaliculata, pilosa. SEGMENTA inferiora 9—12 lin. longa, 3—6 lin. lata, interstitiis 4—6 linearum opposita, patentissima, longe petiolata, ovali-oblonga longitudinaliter profunde pinnatifida, basi superiore oblique truncata (et lacinia infima latiore trifida subauriculata) inferiore subhorizontaliter absca; superiora alterna, patula, magis magisque approximata, sensim decrescentia sessilia, item pinnatifida; summa linearia decurrentia, in apicem laminae trifidum confluentia. LACINIAE maxinae usque ad 4 lin. longae, 1 lin. latae. NERVI dichotomi, graciles, supra elevati. PANICULAE 1—2 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. crassae; PEDUNCULUS $2\frac{1}{2}$ —5 poll. longus, gracilis, glaber. RHACHIOLOAE FRUCTIFERAE semiteretes, immarginatae, glabrae. PILI in basi stipitis articulati, lati, apicem versus parum attenuati, straminei pellucidi, e cellulis circiter 8 compositi; cellulae nonnullae inferiores superne latiores. SPORAE tetraedrae, basi convexae, in angulis obtusis non prominentes, remote elevato-striatae, virescentes.

Habitat ad Bocaina, prov. Goyazensis: Pohl; in prov. Minarum: Regnell II. n. 340 (e Kunze); — prope Caracas Venezuelae: Bredemeyer (Herb. Vindob.); in Panama: Seemann; in parte occidentali Mexici: Haenke.

36. ANEIMIA TENERA Pohl lamina subcoriacea oblonga obtusa pinnatisecto-pinnatifida; segmentis glaberrimis, circiter 8-jugis, inferioribus petiolatis oblongis profundissime pinnatifidis; lacinii peranguste linearibus interdum subfiliformibus.

mibus, superne bifidis, apice incisus vel denticulatis; paniculis laminam fere duplo excedentibus parvis laxis, pedunculo duplo brevioribus.

Aneimia tenera Pohl (fide schedulae in Herbario Martii).

Aneimia polyphylla Presl Herb.

RHIZOMA repens, pilis laete ferrugineis densissime obsessum. STIPES $1\frac{1}{2}$ —4 poll. longus, diametrum $\frac{1}{5}$ lin. attingens, semiteres, supra tricanaliculatus, ima basi tantum pilosus, rubicundus. LAMINA FRONDIS FERTILIS $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 9—12 lin. lata. RHACHIS gracilis supra tricanaliculata, pilosa. SEGMENTA inferiora 4—6 lin. longa, 4 lin. lata, interstitiis 3-linearibus remota, opposita, patentissima, petiolata, oblonga, profundissime pinnatifida, basi superiore oblique truncata (lacinia infima trifida subauriculata) inferiore horizontaliter abscesa; superiora alterna et magis approximata, vix decrescentia; terminale plerumque trifidum a proximis quoad formam magnitudinemque non diversum. LACINIAE maximae usque ad 3 lin. longae, $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ lin. latae, subcuneatae, saepe curvatae. NERVI approximati dichotomi, liberi, supra elevati. PANICULAE 9—15 lin. longae, 2 lin. crassae; PEDUNCULUS $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longus, gracillimus, subfiliformis. RHACHIOLEAE FRUCTIFERAE semiteres, immarginatae, glabrae. PILI basi stipitis articulati, validi, curvati, pallide straminei, valde pellucidi, e cellulis 7—8 compositi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, in angulis obtusis vix prominentes, elevato-striatae, flavescens.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Mikán; in Goyaz ad Villa Boa, Carretão et in Serra de Macaco: Pohl; prope Congonhas de Campo, prov. Minas: Stephan.

OBSERVATIO. In hac specie partitio segmentorum lacinias specimenum nonnullorum angustatis, fere filiformibus ad summum pervenit, qua re ad *Coptophylli* sectionem accedit, distinguenda tamen jam primo aspectu fronde fertill tripartita.

Haud abnuerimus partitionem segmentorum non in omnibus exemplaribus neque hujus speciei neque trium specierum praecedentium absolute constantem esse, attamen non dubitavimus eam producere pro specie distincta, quia permultum interest inter *A. ciliatam* et *teneram*.

C. Pars sterilis pinnatisecta. (Spec. 37—47.)

37. ANEIMIA ROTUNDIFOLIA SCHRAD. lamina coriacea, lineari-oblonga pinnatisecta; segmentis utrinque glabris, 6—8-jugis, remotissimis, sessilibus, subrotundo-obovatis integris, apice lato rotundato margineque sublobato crenulato-denticulatis, superioribus valde decrescentibus; rhachi frondium sterillum apice nuda, elongata, ad extremitatem interdum radicante; paniculis validis interruptis laminam excedentibus, pedunculo parum brevioribus.

Aneimia rotundifolia Schrader in Goetting. gel. Anzeig. 1824. 865. n. 8. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. Presl Suppl. Tent. Pterid. 81. Moore Index Fil. 69.

Aneimia radicans β. Raddi Fil. Brasil. 70. tab. 11. Brackenh. U. St. Expl. Exped. XVI. 305.

RHIZOMA ascendens, pilis ferrugineis dense obsessum. STIPES 6—9 poll. longus, $\frac{1}{2}$ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, pilosus, mox glabrescens, testaceus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 4—5 poll. longa, 2 poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, testacea, sparse pilosa. IN FRONDIS STERILIBUS rhachis apice nuda (pars nuda saepe 2—6 poll. longa), ad extremitatem incrassata, interdum radicans. FRONDES NOVELLAE saepe simplices, aliae unico segmento terminali obovato cuneato constantes, aliae praeter terminale utrinque segmentum 1—2 praebentes. SEGMENTA inferiora 1 poll. longa, 9 lin. lata, interstitiis subpollicaribus subopposita, patentissima, brevissime petiolata, subrotundato-ovata integra, basi superiore oblique truncata inferiore subdimidiata, apice lato rotundato margineque sublobato crenulato-denticulata; superiora alterna, patula, magis approximata, valde decrescentia; terminale obovatum basi cuneatum. NERVI flabellato-dichotomi, liberi, supra elevati, albidii. PANICULAE 2 poll. longae, 6 lin. crassae, PEDUNCULO gracili, flexuoso, $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ -pollicari. PILI basi stipitis tortuosi

Schizaeac.

articulati, apicem versus non attenuati, e cellulis circiter 11 compositi, fusciduli, pellucidi. SPORAE parvae, tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, manifeste aculeolatae, flavescens, pellucidae. —

Hujus sectionis species maxima, et segmentis remotissimis, rhachide frondium sterillum apicem versus nuda, ad extremitatem incrassata distinctissima.

Habitat ad Rio de Janeiro in sylvis suburbii Mataravallos: Raddi, Sellow; in sylvis montanis ad Ilheos: M.; in Serra do Mar prov. Bahiensis: Princ. Max. Neovindensis.

38. ANEIMIA GARDNERI Hook. lamina ovato-oblonga obtusa, pinnatisecta; segmentis glabris, 4-jugis, approximatis, contingentibus, petiolatis, cordato-rotundatis crenulatis, superioribus subdecrescentibus; paniculis validis laxis lamina superatis, pedunculo subaequilongis.

Aneimia Gardneri Hook. Icon. Pl. II. tab. 190. Moore Index Fil. 66.

RHIZOMA pilis longis sericeo-aureis densissime vestitum. STIPES $3\frac{1}{2}$ poll. longus, supra tricanaliculatus. LAMINA frondis fertillis $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $2\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata. SEGMENTA inferiora 14 lin. longa et eadem latitudine, interstitiis 8-linearibus remota, subopposita, patentissima, breviter petiolata, cordato-rotundata, integra, margine apiceque crenulata, glabra; superiora subdecrescentia; terminale petiolatum, obovatum, basi cuneatum. NERVI flabellato-dichotomi, supra elevati, subtus subimpressi. PANICULAE usque ad 2 poll. longae; PEDUNCULUS $1\frac{1}{2}$ -pollicaris.

Habitat in Brasilia orientali: Gardner n. 4. — Non vidi.

39. ANEIMIA LANUGINOSA BONGARD lamina dense coriacea, oblonga obtusa, pinnatisecta; segmentis 5—7-jugis, alternis, sessilibus, rotundato-oblongis inciso-lobatis, lobis apiceque rotundatis crenulato-denticulatis, utrinque dense aureo-glandulosis, supra glabris, subtus dense villosis, superioribus parum decrescentibus; paniculis lamina subdimidio brevioribus validis laxis, pedunculo sublongioribus; stipite rhachique villosissimis.

Aneimia lanuginosa Bongard (fide Herb. Kunzei).

Aneimia rotundifolia Herb. gen. Berolín. (non Schrader).

RHIZOMA ascendens, pilis perlongis atropurpureis densissime obsessum. STIPES 1—3 poll. longus, diametro fere 1 lin., semiteres, supra tricanaliculatus, testaceus, densissime ferrugineo-brunnescenti-villosus. LAMINA partis sterilis 3— $4\frac{1}{2}$ poll. longa, $1\frac{1}{2}$ poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, canaliculo medio latissimo, densissime villosa. SEGMENTA inferiora 7—9 lin. longa, 5—6 lin. lata, interstitiis 6—8-linearibus, alterna, patentissima, sessilia, rotundato-oblonga inciso-lobata, basi rotundata subcordata, apice lobis-que rotundatis crenulato-denticulata; superiora parum decrescentia, magis approximata, basi cuneata adnata; terminale petiolatum, late obovatum bi-trilobum, basi cuneatum. NERVI flabellato-dichotomi, liberi, utrinque immersi. PANICULAE circiter $1\frac{1}{2}$ poll. longae, 3 lin. crassae. PEDUNCULI circiter 15 lin. longi, ab jugo infimo segmentorum partis sterilis 8 lin. remoti, robusti, villosi. RHACHIOLEAE FRUCTIFERAE marginatae, glandulosae pilosaeque. PILI rhizomatis longissimi, tortuosi, articulati, subaequabiles, adulti intus corpusculo nodoso-articulato brunnescente farcti, e cellulis brevibus subaequilongis usque ad 90 compositi, fusciduli. SPORAE tetraedrae, basi convexae, remotissime et indistincte elevato-striatae, flavescens. — Segmentis dense coriaceis, rhachi stipiteque densissime villosis, pilis rhizomatis longissimis atro-purpureis et brevitate panicularum facile dignoscitur.

Habitat in prov. Minas Serra de Ouro branco: Sellow (Herb. Berol. B. n. 672, c. 9); ad S. José (Herb. Kunzei).

40. ANEIMIA OBLONGIFOLIA SWARTZ lamina coriacea, lineari-oblonga obtusa, pinnatisecta; segmentis 7—9-jugis, suboppositis, sessilibus, oblongis obtusis subdimidiatis magis

minusve serrato-incisis, basi superiore subauriculatis, apice rotundato margineque repandis crenulatis ciliatis, utrinque pilis longis flavidis adpersis; paniculis laminam duplo excedentibus angustis laxis, pedunculo subtriplo brevioribus; stipite rhachique laxe villosis.

Aneimia oblongifolia Swartz Syn. Fil. 156. Willd. Sp. Pl. V. 90. Schkuhr Krypt. Gewächse 142. tab. 141. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. n. 10. Presl Suppl. Tent. Pterid. 81. Moore Index Fil. 68.

Aneimia aemula Pohl in Herb. Mus. Pal. Vindob. n. 1417, 1479 et 1152.

Osmunda oblongifolia Cavan. Icon. VI. 69. tab. 592. fig. 2.

RHIZOMA repens, pilis fusco-purpureis densissime vestitum. STIPES 4—7 (in fronde sterili 1—1½) poll. longus, diametro ½—¾ lin., subquadrangularis, canaliculatus, nunc pilosus nunc glabrescens, flavescens. LAMINA FRONDIS FERTILIS 1½—3 poll. longa, 6—15 lin. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, sparse pilosa. SEGMENTA inferiora circiter 6 lin. longa, 4 lin. lata, interstitiis 3—4-linearibus subopposita, patentissima patulave, sessilia, oblongo-obtusata, subdimidiata, magis minusve serrato-incisa, basi superiore oblique truncata subauriculata, inferiore subhorizontaliter abscisa, apice rotundata, margineque repando crenulata; superiora parum decrescentia, magis approximata; terminale majus, obovatum bi-trifidum, basi cuneatum decurrens. NERVI validi, flabellato-dichotomi, liberi, utrinque elevati. PANICULAE 1½—2½ poll. longae, 3 lin. crassae. PEDUNCULI 4—5 poll. longi, ab jugo infimo segmentorum partis sterilis non remoti, robusti, flavescens, glabrescentes. RHACHIOLE FRUCTIFERAE foliaceo-marginatae, glabrae. PILI rhizomatis tortuosi, subconstricto-articulati, validi, apicem versus vix attenuati, e cellulis circiter 13 longis compositi, fusciduli, subpellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, in angulis obtusis parum prominentes, dense elevato-striatae, virescentes. — Stipite pedunculisque longis robustis et consistentia coriacea segmentorum insignis. Cum *A. lanuginosa* aliquam, sed remotam ostendit similitudinem, praeter alias notas tamen stipite subglabrescente, pedunculo longo facile dignoscitur.

Habitat in syleis montosis ad Mandioca, praesertim in praeruptis viarum, prov. Sebastianopolitanae: Langsdorff; prope Rio de Janeiro: Schott, Mikan; circa Villa Boa, Serra dourada, Corymba Megaponte, prov. Goyazensis: Pohl; in prov. Goyazensi: Gardner n. 3561; in Serra da Chapada: Bongard (ex Herb. Kunzei); — in Isthmo Panama: Née (e Cavan.).

41. ANEIMIA GLAREOSA FIELD. ET GARDN. lamina coriacea, cordato-ovata, pinnatisecta; segmentis utrinque dense pubescentibus, 2—3-jugis, oppositis, adnatis, decurrentibus, rhombeo-oblongis obtusissimis subaequaliter crenulatis, infimis extus in lobum emarginatum dilatatis; paniculis laxis, pedunculo brevi triplo longioribus; rhachi dense pubescente.

Aneimia glareosa Field. et Gardn. Sertum Pl. tab. 70. Moore Index Fil. 66.

Aneimia Gardneriana Presl Suppl. Tent. Pterid. 82 (teste auctore ipso). Presl die Gefässbündel im Stipes der Farrn 20. tab. 3. fig. 18 (sectio transv. stipitis).

Aneimia includens Kunze Herb.

Aneimia obtusa Moricand Herb.

RHIZOMA repens, pilis rufis densissime vestitum. STIPES usque ad 6 (in fronde sterili tantum 2—3) poll. longus, tenuis, tricanaliculatus, pilosus, in adultis glabrescens, purpureus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 1 poll. longa, ½ poll. lata. RHACHIS supra canaliculata, dense pubescens. SEGMENTA opposita, patentissima, adnata, decurrentia, rhombeo-oblonga obtusissima, subaequaliter crenulata vel obtuse denticulata, infima extus in lobum deorsum vergentem obtusum emarginatum dilatata; terminale rhombeum obtusissimum, in lobos quinque parvos divisum. NERVI flabellato-dichotomi, immersi. PANICULAE 2 poll. longae; PEDUNCULUS semipollicaris. RHACHIOLE FRUCTIFERAE lineares, planae, foliaceo-marginatae, pubescentes.

Habitat in siccis glareosis prope Natividade, prov. Goyazensis: Gardner n. 4086. — Non vidi.

42. ANEIMIA PILOSA PRESL lamina submembranacea, lineari-ovata obtusissima, crescenti-pinnatisecta; segmentis 5—8-jugis, sessilibus, ovato-s. oblongo-rotundatis integris, margine apiceque crenulato-denticulatis dense ciliatis, utrinque puberulis, infimis reliquis subdimidio minoribus, mediis maximis, superioribus vix decrescentibus; paniculis laminam plus duplo superantibus angustis, pedunculo triplo brevioribus.

Aneimia pilosa Presl Suppl. Tent. Pterid. 86 (an *A. pilosa* Mart. et Gal. Syn. Fil. Mexican. 19. tab. 2. fig. 1.?).

Aneimia humilis Kunze in Herb. Vindob. Moore Index Fil. 67 (partim).

Aneimia Goyazana Pohl in Herb. Vindob. n. 3857.

Aneimia pumila Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 526.

RHIZOMA repens, pilis ferrugineis densissime obsessum. STIPES 1—3 poll. longus, diametro ½ lin., subquadrangularis, canaliculatus, villosus, raro glabrescens, testaceus. (In fronde sterili stipes tantum ½ poll. longus; segmentorum jugum infimum a reliquis magis remotum, segmenta vix 2 lin. longa.) LAMINA FRONDIS FERTILIS 2—3 poll. longa, circiter 1 poll. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, flavescens, longe pallide ferrugineo-villosa. SEGMENTA maxima 6—8 lin. longa, 4—5 lin. lata, infima solummodo 3—4 lin. longa, interstitiis circiter 4-linearibus alterna, patentissima, sessilia, ovato-s. oblongo-rotundata, integra, basi oblique truncata; infima reliquis subdimidio minoribus; media maxima; superiora vix decrescentia, basi lata adnata, terminale petiolatum, obovatum trilobum, basi cuneatum cum proximo non raro confluentibus. NERVI flabellato-dichotomi, liberi, supra vix elevati. PANICULAE 1—2 poll. longae, vix 3 lin. crassae, laxae. PEDUNCULI 6—7 poll. longi, ab jugo infimo segmentorum partis sterilis non remoti, flexuosi, debiles, gracillimi, flavescens, glabri. PILI rhizomatis validi subaequaliter-articulati, apice subincrassati, e cellulis circiter 20 subaequalibus compositi, pallide straminei, pellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, subaculeolatae, virescentes.

Habitat ad urbem Goyaz, olim Villa Boa: Pohl; in Goyaz et in Piahy: Gardner n. 4087 et 2389; — in pasuis prope Caripe Venezuelae: Moritz n. 159; — ? in Mexico teste Galeotti.

43. ANEIMIA HUMILIS SWARTZ lamina subcoriacea, lineari-obovata obtusissima, crescenti-pinnatisecta; segmentis plerumque 2-jugis, oppositis, sessilibus, ovato-rotundatis integris, margine subcrenulatis et manifeste ciliatis, utrinque dense longeque pilosis, infimis sequentibus subdimidio minoribus; paniculis laminam quinque superantibus angustis laxis, pedunculis suis quadruplo brevioribus.

Aneimia humilis Swartz Syn. Fil. 156. Willd. Sp. Pl. 90. Schkuhr Krypt. Gewächse 142. tab. 141. Presl Reliq. Haenk. I. 74. Presl Suppl. Tent. Pterid. 81. Moore Index Fil. 67 (partim).

Aneimia Seemannii Hook. Lond. Journ. of Botany VII. 564. tab. 16. J. Smith in Herald Voyage, Botany I. 243.

Osmunda humilis Cavan. Icon. VI. 69. tab. 592. fig. 3.

RHIZOMA repens, pilis ferrugineis densissime obsessum. STIPES 6—12 lin. longus, ⅓ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, villosus, testaceus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 6—10 lin. longa, 4—6 lin. lata. (Lamina frondis sterili major, 1 poll. longa, in quovis latere segmenta 3—4 gerens.) RHACHIS robusta, supra tricanaliculata, saturate ferrugineo-villosa. SEGMENTA maxima circiter 4 lin. longa, 3 lin. lata (infima tantum 2—2½ lin. longa, segmentum terminale 4—5 lin. longum), interstitiis 1½—2-linearibus opposita, patentissima, sessilia, ovato-rotundata, integra, basi superiore subhorizontaliter truncata inferiore oblique abscisa; infima sequentibus subdimidio minoribus; terminale petiolatum, obovatum, basi cuneatum, apice rotundato latissimum, indistincte lobatum vel incisum. NERVI flabellato-dicho-

tomi, liberi, supra subelevati, interdum albidii. PANICULAE 6—15 lin. longae, circiter 2 lin. crassae. PEDUNCULI $2\frac{1}{2}$ —6 poll. longi, ab jugo infimo segmentorum partis sterillis non remoti, gracillimi, debiles, glaberrimi, flavo-rubicundi. RHACHIOAE FRUCTIFERAE semiteretes, immarginatae, glabrae. PILI rhizomatis validi, constricto-articulati, e cellulis usque ad 20 subaequalibus, parum longioribus quam latioribus, irregulariter plicatis, fuscidulis, pellucidis compositi. SPORAE magnae, tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, striis approximatis valde prominentibus, itaque subaculeolatae, virescentes.

Cum *A. pilosa* lamina crescenti-pinnata convenit, sed parvitate, consistentia magis coriacea et numero segmentorum, in quovis latere solummodo 2—4, primo intuitu distinguitur.

Habitat ad Paracatu do Principe, prov. Minarum; Pohl; in vicinia Santarem, prov. Pará: R. Spruce n. 577; — in rupibus et muris insulae Tabago: Née, Seemann; in isthmo Panamensi: Haenke, Seemann.

44. ANEIMIA FILIFORMIS SWARTZ lamina submembranacea, oblongo-lanceolata, pinnatisecta; segmentis circiter 7-jugis, sessilibus, oblongis obtusis, basi cuneato-angustatis, apice rotundato margineque superiore inaequaliter serrato-crenatis, utrinque glabris, inferioribus incis; rhachi gracili sparse pilosa; paniculis laminam semper excedentibus, brevibus, laxis, a pedunculis suis ter superatis.

Aneimia filiformis Swartz Syn. Fil. 156. Willd. Sp. Pl. V. 90. Presl Suppl. Tent. Pterid. 87. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 526. Moore Index Fil. 66.

Aneimia pulchra Pohl in Herb. Vindob. n. 2468.

Aneimia dentata Field. et Gardn. Sertum Pl. tab. 70. in nota (fide Presl).

Osmunda filiformis Lam. Encycl. V. 652.

RHIZOMA adscendens, pilis pallide ferrugineis densissime obsessum. STIPES 2— $2\frac{1}{2}$ poll. longus, $\frac{1}{4}$ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, longe rufo-villosus, rubicundus. LAMINA FRONDIS FERTILIS $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 9—15 lin. lata. RHACHIS supra tricanaliculata, sparse pilosa. SEGMENTA inferiora 6—7 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ lin. lata, interstitiis 4-linearibus subopposita, patula, sessilia, oblongo-obtusata incisa, basi cuneata superiore oblique truncata auriculata inferiore subhorizontaliter absca, apice rotundato margineque superiore inaequaliter serrato-crenatis; superiora decrescentia, subintegra, decurrentia; terminale petiolatum, obovatum, tripartitum, basi cuneatum. Nervi validi flabellato-dichotomi, supra elevati. PANICULAE circiter 1 poll. longae, 2 lin. crassae; PEDUNCULUS plerumque $2\frac{1}{2}$ poll. longus, gracillimus, subglaber, flavescens. PILI rhizomatis nodoso-articulati, apicem versus attenuati, corpusculo pellucido farcti, e cellulis circiter 13 compositi, straminei, pellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, remote valdeque elevato-striatae, in angulis obtusis subprominentes, virescentes.

Cum *A. gracili* et *A. Schomburgkiana* multa similia habet, sed differt a priore: circumscriptione partis sterillis oblongo-lanceolata, segmentis basi inaequaliter cuneato-angustatis, glabris, rhachi gracili, tantum sparse pilosa; a posteriore segmentis numerosis, in utroque latere circiter 7. — *A. gracilis* circumscriptionem partis sterillis lineari-oblongam, segmenta basi breviter cuneata utrinque hirta et rhachim longe pilosam ostendit. — In *A. Schomburgkiana* segmenta in quovis latere tantum 3 adsunt.

Habitat prope fluvium Rio Claro, prov. Goyazensis: Pohl; in Piahy: Gardner n. 2387; — in Mexico ad Tacotala: C. Ehrenberg (e Presl).

45. ANEIMIA GRACILIS SCHRAD. lamina membranacea, lineari-oblonga, pinnatisecta; segmentis 7—8-jugis, sessilibus, oblongis obtusis, basi breviter cuneatis, apice rotundato margineque subserrato-crenatis, utrinque hirtis, inferioribus basi plerumque incis; rhachi robusta, longe pilosa; paniculis lamina subtriplo longioribus angustis interruptis, pedunculis fere quadruplo brevioribus.

Aneimia gracilis Schrad. in Goetting. gelehrt. Anzeig. 1824. 865. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 114. Presl Suppl. Tent. Pterid. 87.

Aneimia repens a. minor Raddi Fil. Brasil. 71. tab. 9. fig. 2. a (collatis speciminib. orig.). Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 306.

Aneimia humilis Hook. Exot. Fl. tab. 88 (teste Presl). Moore Index Fil. 67 (partim).

Aneimia microphylla Pohl in Herb. Vindob. n. 1153.

RHIZOMA repens, pilis ferrugineis densissime obsessum. STIPES 2—3 poll. longus, $\frac{1}{4}$ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, basi apiceque pilosus, flavescens. LAMINA FRONDIS FERTILIS 1—2 poll. longa, 6—9 lin. lata. RHACHIS robusta, supra tricanaliculata, longe pilosa. SEGMENTA 3—5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ —3 lin. lata, interstitiis circiter $2\frac{1}{2}$ -linearibus subopposita, patula, sessilia, oblonga obtusa, inferiora plerumque incisa, basi superiore oblique truncata auriculata, inferiore subhorizontaliter absca, apice rotundato margineque subserrato-crenata; superiora decrescentia lineari-oblonga, integra, basi aequalia subcuneata adnata; summa in segmentum terminale trifidum confluentia. Nervi flabellato-dichotomi, liberi, supra elevati, albidii. PANICULAE 6—15 lin. longae, 3 lin. crassae; PEDUNCULUS 2—4 poll. longus, gracillimus, debilis, flexuosus. RHACHIOAE FRUCTIFERAE semiteretes, immarginatae, perangustae, glabrae. PILI rhizomatis validi, subnodoso-articulati, apicem versus vix attenuati, e cellulis longis circiter 13 compositi, pallide fusciduli. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, dense longeque aculeolatae, virescentes.

Habitat ad muros veteres e.g. in aquaeductu Caryoca: Raddi, Gaudichaud; in argillaceis ad Lagoa de Freitas: Meyen; inter Tamburil et Vato ad terram, in finibus orientalibus prov. Minarum: Princ. Max. Neovindensis; ad S. Lucia et Ourafino, prov. Goyazensis: Pohl.

46. ANEIMIA SCHOMBURGKIANA PRESL lamina coriacea, ovali-oblonga obtusa, pinnatisecta; segmentis utrinque subglabris, 2—3-jugis, sessilibus, oblongis rotundato-obtusis, infimis subdimidiatis, basi angustato-cuneatis, margine superiore apiceque crenato-denticulatis; rhachi gracili, sparse pilosa; paniculis laminam duplo superantibus angustis laxis, pedunculo brevioribus.

Aneimia Schomburgkiana Presl Tent. Pterid. 86. Presl Die Gefässbündel im Stipes der Farrn 20. tab. 4. fig. 2 (sectio transv. stipit.).

Aneimia humilis Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 525 (excl. syn.). Moore Index Fil. (partim).

RHIZOMA repens, pilis pallide ferrugineis dense obsessum. STIPES circiter 2 poll. longus, vix $\frac{1}{4}$ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, sparse pilosus, pallide testaceus. LAMINA FRONDIS FERTILIS 1 poll. longa, 6—8 lin. lata. RHACHIS gracilis, supra tricanaliculata, sparse pilosa. SEGMENTA infima usque ad 5 lin. longa, 2 lin. lata, interstitiis circiter 2-linearibus remota, subopposita, patula, sessilia, oblonga, integra, apice rotundata, infima subdimidiata, basi superiore oblique truncata, inferiore subhorizontaliter absca; media basi angustata, subaequalia, cuneata; summa vix decrescentia; terminale cuneato-obovatum, apice rotundatum, basi angustata cum praecedentibus magis minusve confluentis, omnia margine superiore apiceque crenato-denticulata. Nervi validi flabellato-dichotomi, liberi, supra elevati, albidii. PANICULAE 6—9 lin. longae, vix 3 lin. crassae; PEDUNCULUS 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longus, gracillimus, subglaber. RHACHIOAE FRUCTIFERAE semiteretes, immarginatae, angustatae, glabrae. PILI rhizomatis debiles, valde tortuosi, angusti, subaequali-articulati, apicem versus attenuati, e cellulis longis circiter 9 compositi, fusciduli, pellucidi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, striis remotis crenulatis, virescentes.

Ab *Aneimia pilosa* et *gracili* segmentis subglabris angustisque, quorum in quovis latere solummodo 3 adsunt, facile distinguitur.

Habitat in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 1219. In Brasilia septentrionali inquirenda. — (Descriptio secundum specimina originalia duo in Herb. Reg. Berol. assertata.)

Sect. 3. (Subgenus 3. COPTOPHYLLUM.)

Frondes s. partes duae laterales fertiles, rhizomati, nec basi partis sterilis insertae, paniculas pedunculatas referentes. Frons s. pars sterilis (in speciebus florum nostrae) tripinnata; lacinae anguste lineares uninerviae.

(Spec. 47—49.)

47. ANEIMIA MILLEFOLIUM GARDN. lamina frondis sterilis coriacea, oblonga, obtusa, tripinnata; pinnis primariis utrinque circiter 12, breviter petiolatis, oblongis, inferioribus bipinnatis, superioribus decrescentibus pinnatis; secundariis profundissime pinnatifidis; laciniis anguste linearibus, brevibus, raro apice integris, sed plerumque bifidis, obtusiusculis, uninerviis, pilosis; rhachibus stipitibusque utriusque frondis dense longeque albido-villosis; fronde fertili simplici, e rhizomate orta, panicula contracta, densa, tripinnata, pilosa.

Tabula nostra XVI. Fig. III.

Aneimia millefolium Gardn. Herb. Brasil. n. 4083. Presl Suppl. Tent. Pterid. 80. Moore Index Fil. (partim).

Coptophyllum millefolium Gardn. in Hook. London Journ. of Botany I. 133. Hook. Icon. Pl. V. tab. 478.

Mohria Millefolium J. Smith in Hook. London Journ. of Botany II. 388.

RHIZOMA repens, pilis setiformibus, perlongis, robustis, nodoso-articulatis, purpureis vestitum. STIPES FRONDIS STERILIS 1—1½ poll. longus, ⅓ lin. crassus, semiteres, supra canaliculatus, villosus, postremo glabrescens. LAMINA 1—3 poll. longa, 6—8 lin. lata. RHACHIS PRIMARIA supra subeoncava, marginata s. leviter canaliculata, subtus plana, aequae ac SECUNDARIAE utrinque elevatae, marginatae, flexuosae, dense longeque albido-villosae. PINNAE PRIMARIAE inferiores 4—5 lin. longae, 3 lin. latae, interstitiis 4- (summa 1-) linearibus remotae, alternae, patulae. PINNAE SECUNDARIAE 1½—2 lin. longae. LACINIAE vix 1 lin. longae, ¼ lin. latae, supra planae, anguste marginatae, subtus convexae, uninerviae, glabrae. FRONDES FERILES 1½—2½ poll. longae, frondem sterilem superantes. STIPES supra planus, superne marginatus, villosus. LAMINA 1½—2½ poll. longa, 3 lin. lata. PINNAE maximae 6 lin. longae, superiores minores, omnes alternae, PANICULAM densam, parum interruptam formantes. Interdum evenit, ut pinnae superiores (ad apicem usque) in pinnas steriles transmutatae sint. RHACHIOLOE FRUCTIFERAE late foliaceo-marginatae, crenulatae, pilosae. PILI rhizomatis setiformes, nodoso-articulati, cylindrici, fistulosi, farcti, apicem versus attenuati, rubiginosi, vix pellucidi, e cellulis circiter 12 compositi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, subtuberculato-asperae, elevato-striatae, flavo-virescentes.

Habitat in collibus aridis prope Villa de Arrayas, partis septentrionalis prov. Goyazensis: Gardner.

48. ANEIMIA DICHOTOMA GARDN. lamina frondis sterilis coriacea, oblonga, tripinnata; pinnis primariis utrinque circiter 6, longe petiolatis, ovatis, inferioribus bipinnatis, summis pinnatis; secundariis profundissime pinnatifidis; laciniis longis, anguste linearibus, apice integris, obtusiusculis, uninerviis, glabris; rhachibus stipitibusque utriusque frondis glabris; fronde fertili simplici, e rhizomate orta, panicula laxa, tripinnata, glabra.

Tabula nostra XVI. Fig. IV.

Aneimia dichotoma Gardn. Herb. Brasil. n. 4084. Presl Tent. Pterid. 80.

Aneimia multifida Bongard in Herb. Acad. Petrop. (fide Presl Mss.)

Coptophyllum bunifolium Gardn. in Hook. Lond. Journ. of Botany I. 133. Hook. Icon. Plant. V. tab. 477.

Mohria bunifolia J. Smith in Hook. Lond. Journ. of Botany II. 338.

Aneimia bunifolia Moore Index Fil. 64.

RHIZOMA repens. STIPES FRONDIS STERILIS ad 2 poll. longus. LAMINA 2 poll. longa, 1 poll. lata. PINNAE PRIMARIAE inferiores ad 1 poll. longae, ad 10 lin. latae, interstitiis 5-linearibus remotae, alternae, patulae. PINNAE SECUNDARIAE 6 lin. longae. LACINIAE usque ad 3 lin. longae. FRONDES FERILES cum stipite circiter 4-pollicari ad 7 poll. longae. PINNAE inferiores ad 9 lin. longae, superiores minores, omnes alternae, PANICULAM laxam, interruptam formantes.

Habitat in glareosis schistosis summitatis montium Serra de Natividade, in parte boreali prov. Goyazensis: Gardner; in Serra de Chapada: Riedel. — Non vidi.

49. ANEIMIA TENUIFOLIA PRESL lamina frondis sterilis coriacea, ovata, obtusa, tripinnata; pinnis primariis utrinque circiter 6, longe petiolatis, ovatis, inferioribus bipinnatis, summis pinnatis; secundariis profundissime pinnatifidis; laciniis perbrevibus, anguste linearibus, ad medium usque bifidis, apice integris s. bidentatis, uninerviis, glabris; rhachibus stipitibusque utriusque frondis subglabris; fronde fertili simplici, e rhizomate orta, panicula perangusta, laxissima, tripinnata, glabra.

Tabula nostra XVI. Fig. II.

Aneimia tenuifolia Presl Gefässbündel 19. tab. III. fig. 17. (sectio transversal. stipitis). Presl Epimeliae bot. 10. tab. 4. Moore Index Fil. 69.

Aneimia delicatula Pohl in Herb. Vindob. n. 1554.

Aneimia petrophila Bongard in litt.

RHIZOMA horizontale, pilis longis ferrugineis obsessum. STIPES FRONDIS STERILIS 1—1½ poll. longus, ¼ lin. crassus, semiteres, supra tricanaliculatus, pilis longis hic illic obsessus, inferne rubicundus. LAMINA 1—1½ poll. longa, ½—1 poll. lata. RHACHIS PRIMARIA SECUNDARIAEQUE supra canaliculatae glabrescentes. PINNAE PRIMARIAE inferiores ad 6 lin. longae ad 5 lin. latae, interstitiis 4-linearibus (summae 1-linearibus) alternae, patulae. PINNAE SECUNDARIAE 3 lin. longae. LACINIAE longitudine 1 lineam aequantes, vix ⅓ lin. latae, omnes supra planae, anguste marginatae, subtus convexae, uninerviae, glabrae. FRONDES FERILES cum stipite 2-pollicari ad 3 poll. longae, frondes steriles superantes. PINNAE omnes remotae, suboppositae, parvae, PANICULAM angustam, interruptam exhibentes. Nonnunquam pinnae inferiores solummodo fructiferae sunt, reliquae steriles, foliaceae, id quod in *A. millefolio* quoque observatum est. RHACHIOLOE FRUCTIFERAE late foliaceo-marginatae, crenulatae, glabrae. PILI rhizomatis taeniaeformes, articulati, constricti, tortuosi, fusciduli, valde pellucidi, ad constrictiones fusci, e cellulis circiter 12 compositi. SPORAE tetraedrae, basi convexae, elevato-striatae, pallide flavo-virescentes.

Ab *Aneimia millefolio* Gardn. praeter glabritatem, frondibus fertilibus perangustis, laxissimis facile distinguenda.

Habitat in Serra dourada, prov. Goyazensis: Pohl.

GLEICHENIACEAE.

GLEICHENIACEAE *Blume Enum. Plant. Javae II. 248. Martius Icon. Plant. Crypt. Brasil. 105. Endl. Gen. Plant. 64. Suppl. I. 1351. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Tent. Pterid. 47. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 112. — GLEICHENEAE Rob. Brown Prodr. Flor. Nov. Holl. 160. Kaulf. Wesen d. Farrenkr. 34. — SCHISMATOPTERIDES Willd. Spec. Plant. V. XXXVI (partim). — FILICES SPURIE GYRATAE s. RIMATAE Swartz Syn. Fil. 6 (partim).*

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPORANGIOPHORAE, FRONDIBUS PINNATIS AUT REPETITO-DICHOTOMIS, VERNATIONE CIRCINATIS. SPORANGIA HYPOPHYLLA, ANNULO TRANSVERSO COMPLETO MULTIRADIATO INSTRUCTA, LIBERA, INTRORSUM LONGITUDINALITER DEHISCENTIA. INDUSIUM NULLUM. SPORAE OBLONGAE, STRIA SINGULA NOTATAE.

SORI superficiales vel subimmersi, e sporangiis 1—12, radiatim collocatis, compositi. SPORANGIA sessilia, globosa vel subpyriformia, annulo completo transverso vel subobliquo multiradiato praedita, introrsum longitudinaliter dehiscencia, hypophylla, dorso medio vel apice nervorum secundariorum inserta. INDUSIUM nullum. SPORAE oblongae, stria singula notatae.

RHIZOMA repens. STIPES erectus, plerumque innovatione repetita abiens in frondem dichotomam, axibus supra divisiones, dum evolvantur, gemmiformibus (in PLATYZOMATE simpliciter pinnato simpliciter prolifer), FASCICULO VASORUM unico tereti exstructus. LAMINA frondis rarissime simplex, saepe furcata vel dichotoma, pinnata bipinnataque, profunde pinnatisecta, LACINIIS suborbicularibus, ovalibus, lanceolatis linearibusve. NERVUS PRIMARIUS excurrentes. Nervi SECUNDARIi 1—4-furcati, liberi excurrentes.

Filices a SCHIZAEACEIS annulo sporangiorum transverso, non verticali et reliquis notis diversae, inter tropicos et in hemisphaerii australis regionibus extratropicis observatae sunt.

MERTENSIA WILLD.

MERTENSIA Willd. in Act. Holm. 1804. 165 et Spec. Plant. V. 71. Presl Tent. Pterid. 50. tab. 1. fig. 7. 12. Hook. Gen. Fil. tab. 39. Meisner Gen. Plant. 435. (336). — GLEICHENIA Endl. Gen. Plant. 64. n. 659. Suppl. I. 1351. (partim). Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 113. (partim). Moore Index Fil. CVII (§. 2. Mertensia). — MESOSORUS Hasskarl Fil. Javan. Pug. I. 2. — DICRANOPTERIS Bernhardt in Schrader Neues Journ. 1806. II. 38. tab. 3 fig. 13.

SORI secus laciniarum nervum primum uniseriati, dorso medio nervorum secundariorum inserti, globosi, superficiales, e sporangiis 3—12 radiatim collocatis compositi. SPORANGIA sessilia globosa subpyriformia, annulo completo transverso praedita, longitudinaliter introrsum dehiscencia, nuda vel tomento paleisve tecta. RECEPTACULUM punctiforme elevatum. INDUSIUM nullum. SPORAE oblongae seu oblongo-reniformes, stria singula notatae.

RHIZOMA repens. STIPES $\frac{1}{2}$ —16 ped. longus, erectus, aut in frondem furcatam aut in ramos dichotomos — vel apice centrali evolulo trichotomos — abeuntes. RAMI MEDII et LATERALES saepe repetito-dichotomi, tandem in PINNAS GEMINATAS terminantes; rami medii semper nudi, laterales inferiores modo tantum latere interiore, superiores utrinque laciniis obsessi, modo omnes nudi. GEMMAE aut abortivae aut proliferae, nunc paleis nunc pilis obsessae. PINNAE rarissime simplices, raro unifurcatae, sessiles, plerumque in apice ramorum geminatae vel bipinnatae, omnes pinnatisectae s. profunde pinnati-partitae. Praeter has pinnas terminales, quas PINNAS GEMINATAS vocavimus, adsunt in plurimis speciebus pinnae ad basin ramorum inferiorum vel ad basin pinnarum geminarum summorum, quas PINNAS ACCESSORIAS signavimus; denique gemmae non raro pinnulis duabus oppositis tectae sunt, quas sub nomine PINNARUM ALARIUM descripsimus. LACINIAE ovales lanceolatae vel lineares, aut planae aut margine revolutae, pagina inferiore saepe glaucae glabrae vel varie tomentosae. NERVUS PRIMARIUS utrinque elevatus medianus excurrentes. NERVI SECUNDARIJ uni-bi-trifurcati divergentes vel paralleli, supra plerumque elevati, subtus saepe immersi, in marginem lacinae excurrentes.

Filices in regionibus tropicis totius orbis et in regionibus temperatis hemisphaerii australis obviae.

OBSERVATIO I. Hoc genus in duas sectiones distinctissimas divisum est: in speciebus primae nervi secundarii unifurcati et gemmae paleis squamiformibus obsessae sunt, in iis secundae nervi secundarii 2—4-furcati, gemmae pilis articulatis obsessae.

OBSERVATIO II. Genus GLEICHENIA a MERTENSIA characteribus essentialibus diversum est. Nervi secundarii sunt simplices, sori in apice nervorum solitarii, e sporangiis 1—4 compositi, plerumque immersi. Stipites non semper dichotomo-ramosi ut in MERTENSIA. E rhizomate enascuntur frondes simplices, fructiferae, et aliae frondes dichotomo-ramosae gemmis instructae. E gemmis in dichotomiis non raro ramus novus iterum oritur, ex quo frons recens provenit. Frondes simplices

gemmis carent. Gemmae semper sunt paleis squamiformibus nunquam pilis, ut in omni sectione priore MERTENSIAE obsessae; paleae non in acumen productae, sed apice subtruncato in dentes fissae. Lacinae pinnarum ovales seu rotundatae non lanceolatae aut lineares, quibus laciniis ac plantarum parvitate species hujus generis a speciebus MERTENSIAE facile distinguuntur, formae transitoria desunt. Praeterea nulla species GLEICHENIAE in America invenitur.

CONSPECTUS SPECIERUM.

Quatuor species in seriem receptae sunt extrabasilenses, quas a Florae nostrae civibus distinguimus eorum numeros: 1, 2, 11, 21 unci () includendo.

Sect. 1. Nervi secundarii unifurcati. Gemmae paleis squamiformibus obsessae.

§. 1. Pinnae geminatae bipinnatisectae. Sp. (1.)

§. 2. Pinnae geminatae pinnati-partitae.

A. Rami ultimi utrinque pinnatifidi.

α. Pinnae late lanceolatae pedales et ultra.

a) Paleae gemmarum ferrugineae. Sp. (2) 3.

b) Paleae gemmarum nigrae. Sp. 4—5.

β. Pinnae lanceolatae semipedales. Sp. 6.

γ. Pinnae lineari-lanceolatae. Sp. 7—8.

δ. Pinnae anguste lineares. Sp. 9, 10 (11) 12.

B. Rami ultimi latere interiore pinnatifidi. Sp. 13—14.

Sect. 2. Nervi secundarii 2—4-furcati. Gemmae pilis articulatis obsessae.

§. 1. Pinnae accessoriae nullae. Sp. 15.

§. 2. Pinnae accessoriae late lanceolatae.

A. Pinnae geminatae subdeflexae. Sp. 16.

B. Pinnae geminatae erectae. Sp. 17—20.

§. 3. Pinnae accessoriae lineari-lanceolatae s. lineares.

A. Stipes apice prolifero pinnas geminatas ramosas (petiolatas) gerens. Sp. (21.)

B. Stipes apice pinnam geminatum sessilem gerens.

α. Pinnae pinnatisectae. Sp. 22—23.

β. Pinnae pinnati-partitae. Sp. 24—25.

Sect. 1. Nervi secundarii unifurcati. Gemmae paleis squamiformibus obsessae.

§. 1. Pinnae geminatae bipinnatisectae.

(1.) MERTENSIA BANCROFTII Hook. (sub Gleichenia) fronde bipinnata, rigida, glaberrima; pinnis oppositis erecto-patentibus, oblongis, acuminatis, pinnatis; pinnulis numerosis, sessilibus, lanceolatis, acuminatis, subfalcatis, profundissime pinnato-partitis; laciniis coriaceis, patentissimis, lineari-lanceolatis, basi inferiore decurrentibus, margine paululum revolutis, apice acutiuseculis; soris numerosis sporangiis 3—5, pilis pallide rufis involucratiss.

Gleichenia Bancroftii Hook. Spec. Fil. I. 5. tab. IV. a. Kunze in Linnaea XVIII (1844). 307. (var. vitellina Kze.). Klotsch ibidem 538. Presl Epimel. bot. 26.

STIPES lignosus (in specimenibus meis pars superior solummodo adest), ut videtur pluripedalis, diametrum 3 lin. attingens, apice compressus marginatus (teste Presl inferne crebre et obtuse muriculatus), aequae ac rhachis primariae cinnamomeo-flavescens, glaber. GEMMAE proliferae, paleis magis, stramineis obsessae. PINNAE GEMINATAE ultra 2-pedales, 6—10 poll. latae. PINNULAE ad 6 poll. longae, 1 poll. latae, patentes, alternae, interstitiis 6—7-lin. remotae, summae sensim decrecentes et apicem versus pinnae dimiutae oblongae dentatae. RHACHIS PRIMARIAE semiteretes, supra utrinque acute marginatae, muticae, glabrae, cinnamomeae; SECUNDARIAE supra planae, subtus convexae saepe cerinae (in axillis pinnularum interdum villosae), subtus aequae ac nervi primarii citrinae. LACINIAE maxime ad summum 6 lin. longae, 1 lin.

latae, supra flavo-virides, subtus pallidiores. NERVUS PRIMARIUS supra subelevatus, planus, canaliculatus, subtus convexus. NERVI SECUNDARIJ supra elevati, subtus impressi, flavescens, pellucidi. SPORANGIA magna pallide flavescens-fusca. PALEAE gemmarum ad 4 lin. longae, stramineae, lanceolatae, integerrimae, in acumen perlongum genitum obtuse dentatum protractae, e cellulis densis, longis, angustis, irregularibus, serpentinis, omnibus concoloribus constructae. FILII receptaculi filiformes, articulati, tortuosi, hyalini.

Species haec ab omnibus congeneribus florae nostrae fronde bipinnata diversissima. Specimina a cel. Leopold in Mexico lecta (var. vitellina Kunze l. c.) habitu graciliore, pinnis minoribus, pinnulis superioribus apicem versus pinnae linearibus, integris, revolutis, falcatis, laciniis pinnularum angustioribus, acutioribus, subfalcatis, et specimina e Jamaica colore pinnularum supra obscure-viride subtus glauca, porro sporangii flavis cum speciminibus Colombiae discrepare videntur.

Habitat in Venezuela prope Caracas: Moritz (Call. I. n. II. n. 105.); in regione temperata Mexicana Leopold (Coll. n. 108); in Jamaica: Swartz, Bancroft; in Guadeloupe: L'Herminier. Forsan in Brasilia detegenda.

§. 2. Pinnae geminatae pinnatipartitae.

A. Rami ultimi utrinque pinnatifidi.

α. Pinnae late lanceolatae, pedales et ultrapedales.

a. Paleae gemmarum ferrugineae.

(2.) MERTENSIA VELATA KUNZE fronde dichotoma, rigidiuscula; ramis ultimis longis, utrinque laciniis obsessis; pinnis geminatis longissimis, lineari-lanceolatis, acuminatis, falcato-incurvatis, firmis, profunde pinnatipartitis; laciniis coriaceis patentissimis, e basi latiore lineari-lanceolatis, apice obtusis mucronulatis, raro excisis, planis, marginatis, subtus tomento ochraceo ubique densissime obtectis; soris numerosis sporangiis 4, tomento immersis.

Mertensia velata Kunze in *Linnaea* IX (1834). 15.

Planta subscandens 8—12-pedalis: Pöpp. FRONDES dichotomae. Stipites non vidi. RAMI ultimi circiter 3 pollicares, diametrum $1\frac{1}{2}$ lin. attingentes, olivaceo-brunnescentes, nitentes. GEMMAE abortivae, paleis pallide rufis, albo-marginatis obsessae. PINNAE GEMINATAE ultrapedales in medio 2— $2\frac{1}{2}$ poll. latae. RHACHES utrinque convexae, inferne olivaceo-brunnescentes, superne ad luteum vergentes, supra albido-tomentosae, subtus paleis pallide rufescentibus dense obsessae. LACINIAE maximae ad 1 poll. longae, 2 lin. latae, superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae serratum confluentes, supra glabrae obscure subtus pallidius virides, pallide rufescenti-tomentosae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, perangustus, flavus, glaber, subtus convexus pallide rufescens, tomentosus. NERVI SECUNDARIJ subapproximati, paralleli, supra subimpressi, subtus elevati, brunnescentes, impellucidi. SPORANGIA magna rufescentia. PALEAE gemmarum lanceolatae, in acumen longum, dentatum et cellulis duabus summis in aristam flexuosam productae, e cellulis elongatis, angustis, flexuosis, pallide stramineis (paleae basin versus intense castaneis) constructae, ad marginem in dentes filiformes perlongos flexuosos vel recurvos fissae.

A *M. longipinnata* Hooker, proxima specie, differt: ramis ultimis 3-poll. caribus; laciniis latioribus, planis, margine non revolutis, subtus tomento pallide rufo ubique dense obtectis; nervis secundariis approximatis, parallelis et paleis gemmarum pallide rufis, albo-marginatis.

In sylvis densis ad Pampayaco Peruviae: Poeppig. Forsan in sylvis amazonicis detegenda.

3. MERTENSIA LONGIPINNATA Hook. fronde dichotoma, rigidiuscula; ramis ultimis perbrevibus, utrinque laciniis 3—4 obsessis; pinnis geminatis longissimis, oblongo-lanceolatis,

acuminatis, falcato-incurvatis, firmis, profunde pinnatipartitis; laciniis subcoriaceis, patentissimis, e basi vix latiore linearibus apice obtusis excisis, planis, margine vix revolutis, subtus pilis ferrugineo-rubiginosis laxissime adpersis; sporangiis in soro 3—4.

Gleichenia (*Mertensia*) *longipinnata* Hook. Spec. Fil. I. 9. Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844). 537.

Rhizoma et pars inferior in speciminibus Herb. Reg. Berol. desunt. PARS superior STIPITIS diametrum 1 lin. superans, apice compressiusculus, glaber, viride-cinnamomeus. RAMI ultimi perbreves, tantum 6—8 lin. longi, utrinque laciniis obsessi; lacinae exteriores interioribus duplo longiores. GEMMAE paleis ferrugineo-rubiginosis obsessae. PINNAE GEMINATAE $1\frac{1}{2}$ —2 ped. longae, in medio $1\frac{1}{2}$ —2 poll. latae. RHACHES utrinque convexae, cinnamomeae vel rufulae, subtus paleis ferrugineo-rubiginosis sparse obsessae. LACINIAE mediae ad 15 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae; inferiores in latere interiore pinnarum exteriorum et in utroque latere pinnarum interiorum decrescentes, infimae vix 2—3 lin. longae; superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae serratum confluentes; omnes supra glabrae, sordide virides subtus pallidiores, laxae pilosae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, subelevatus, subtus convexus, pilosus, brunnescens. NERVI SECUNDARIJ utrinque elevati, impellucidi. SORI numerosi, nudi. SPORANGIA magna, flava. PALEAE anguste lanceolatae, in acumen dentatum productae (cellulae, duae, ultimae filiformes, perlongae), e cellulis ovatis, irregularibus, incrassatis, fuscis constructae, ad marginem in dentes remotos, spiniformes, rigidos fissae.

Filix pinnis longissimis insignis. A *M. velata* Kunze, specie proxima, differt: ramis ultimis brevioribus (6—8 lin. long.), laciniis pinnarum angustioribus, subtus subglabris, nervis secundariis remotioribus, paleis gemmarum rhachiumque ferrugineo-rubiginosis.

Habitat in Guiana anglica: Rich. Schomburgk. n. 1126; Surinam: Hostmann n. 238. Versimiliter in Brasilia amazonica detegenda.

b. Paleae gemmarum nigrae.

4. MERTENSIA NIGROPALEACEA J. W. STURM fronde dichotoma, rigida; paleis intense nigro-brunneis; ramis utrinque pinnatipartitis; pinnis geminatis longis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, rectis subfalcatisve, profundissime pinnati-partitis; laciniis subcoriaceis, subpatentibus, linearibus, supra basin latiore contractis, revolutis (vel planis et tum marginatis), apice obtusis, raro emarginatis, subtus paleis minutissimis longe dentatis magis minusve dense adpersis; sori sporangiis 3—4 liberis.

Mertensia furcata et *Mertensia glaucescens* Herb. Reg. Berol. (nec Hb. Willd.).

Rhizoma et stipitis partem inferiorem non vidi. STIPES apice 1— $1\frac{1}{2}$ lin. crassus, cinnamomeus, superne aequae ac rami olivaceus. RAMI ultimi pinnas geminatas gerentes 1—2 poll. longi, compressi, utrinque pinnatipartiti. GEMMA primaria prolifera, paleis intense nigro-brunneis obsessa. PINNAE GEMINATAE 7—12 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. latae. RHACHES supra planiusculae, vix prominentes, olivaceae vel cinnamomeae, subtus valde elevatae convexaeque, olivaceae, utrinque glabrae. LACINIAE in medio pinnarum usque ad $1\frac{1}{2}$ poll. longae, ad imam basin decurrentes, 2 lin. latae, superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae serratum confluentes, inferiores decrescentes, colore eximie atrovirente et substantia fragilissima insignes, supra glabrae, subtus pallidiores, paleaceae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus, subtus convexus, paleaceus, utrinque rufescens. NERVI SECUNDARIJ

supra non elevati, obsoleti, subtus parum elevati, impellucidi. SORI numerosi. SPORANGIA magna rufescentia. PALEAE gemmarum lanceolatae, in acumen dentatum, ad extremitatem obtusam, furcatam productae, inferne e cellulis subrotundis, amplis, superne elongatis, angustis, irregularibus, nigro-brunneis, impellucidis constructae, ad marginem et basin profundo-cordatam in dentes rigidos, flexuosos recurvatosve fissae.

Species proxima est *Mertensia bifida* Willd., a qua differt: laciniis basi latioribus, linearibus, versus apicem non angustatis, paleis gemmarum nigro-brunneis etc.

Habitat in Brasilia orientali ad Rio de Janeiro: Sellow, Pohl, Gaudichaud; inter Vittoria et Bahia: Sellow; secundum flumen Amazonum: Poeppig.

OBSERVATIO. *M. furcata* Willd. e Jamaica a specie nostra primo intuitu: ramis rhachibusque subtus paleis magnis ferrugineis (ad margines longe dentatis), dense obsessis; paleis gemmarum laete ferrugineis (nec nigro-brunneis ut in *M. nigropaleacea*) distinguitur.

5. MERTENSIA REMOTA KAULF. fronde dichotoma rigida, subglabra; ramis supra planis, acutangulo-marginatis, subtus convexis, utrinque segmentis obsessis; pinnis geminatis longissimis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, erectis, vix curvatis, fragilissimis, pinnatisectis; segmentis coriaceis, remotissimis, linearibus, supra basin contractis, apice obtusis, margine revolutis, subtus laxissime paleaceis; sori sporangiiis quaternis.

Mertensia remota Kaulf. Enum. Fil. 39. Hook. Spec. Fil. I. 13. (sub speciebus dubiis).

Gleichenia remota Spreng. Syst. veg. IV. 27.

Rhizoma et pars inferior stipitis mihi ignota. STIPES diametrum sub 2 lin. attingens, una cum ramis rhachibusque obscure rubiginosus, nitidus. RAMI inferiores ultimique 2—3½ poll. longi. GEMMA primaria prolifera, paleis nigris obsessa, secundariae plerumque abortivae. PINNAE ALARES ad 1 poll. longae, ad basin 10 lin. latae, in laciniis longas fissae. PINNAE GEMINATAE pedales et ultra, ciciter 4 poll. latae. RHACHES graciles, supra planae, marginatae, subtus convexae, subglabrae. SEGMENTA maxima usque ad 2 poll. longa, 1½ lin. lata, interstitiis 2-linearibus a sequentibus remota, alterna, patentissima, flexuosa, superiora sensim decreescentia, summa in apicem serratum confluentia, (sicca) nigro-vidua, subtus pallidius, subferruginea, paleis minutissimis, ferrugineis laxissime adpersa; segmenta ramorum magnitudine et insertione ceteris simillima. NERVUS PRIMARIUS supra non elevatus, angustissimus, rufescens, subtus validus, elevatus, paleaceus. NERVI SECUNDARIUS supra impressi, obsoleti, subtus elevati, conspicui, impellucidi. SPORANGIA magna, brunnescentia. PALEAE gemmarum ovato-lanceolatae in acumen dentatum productae, e cellulis irregularibus, oblongis, flexuosis, fusciculis constructae, ad marginem in dentes filiformes, longos, curvatos geniculatosve fissae; paleae segmentorum ovatae vel subrotundae, margine in dentes longos fissae.

Ab omnibus speciebus hujus generis pinnis pinnatisectis, magnis, segmentis longis angustis, remotissimis facillime dignoscitur.

Late diffusa; in insula S. Catharinae: Chamisso; prope Rio de Janeiro: Riedel; ad latera montis Araracoara, prov. do Alto Amazonas in ditone fluv. Japurá, laetissimos caespites sex pedes altos struens: M.

β. Pinnae lanceolatae, semipedales.

6. MERTENSIA TOMENTOSA SWARTZ fronde dichotoma, rigidiuscula; ramis inferioribus ultimisque perlongis, utrinque profundissime-pinnatipartitis; pinnis geminatis lanceolatis,

acuminatis, erectis, vix curvatis, firmis, profundissime pinnatipartitis; laciniis coriaceis, patentissimis, linearibus, supra basin contractis, apice obtusis, interdum mucronulatis, margine paululum revolutis, subplanis, subtus tomento pallide rufescente sparse, in nervo primario dense obtectis; sori sporangiiis 3, plerumque 4.

Mertensia tomentosa Swartz Syn. Fil. 164 et 392. Willd. Spec. Plant. V. 75.

Rhizoma et partim inferiorem stipitis non vidi. STIPES ut videtur 2—3 ped. longus, ad 3 lin. crassus, teres vel subcompressus, glaber, sordide virescens. RAMI inferiores circiter 3, ultimi 5 poll. longi, utrinque laciniis circiter 1½ poll. longis, 1½ lin. latis, dense obsessi, supra glabri, cinnamomei, subtus, cinnamomeo-virescentes, tomentoso-paleacci. GEMMAE abortivae, paleis rubiginoso-brunneis obsessae. PINNAE GEMINATAE 4—7 poll. longae, 1—2 poll. latae. RHACHES supra glabrae, cerinae, subtus flavae, pallide rufescenti-paleaceae, utrinque convexae et non sulcatae, ut beatus Swartzius notavit. LACINIAE 10—15 lin. longae, ad basin 1—1½ lin. latae, inferiores parum, superiores sensim decreescentes, summae in apicem pinnae serratum confluentes, supra glabrae, saturate, subtus flavescens-virides, subtomentosae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, subtus elevatus cerinus. NERVI SECUNDARIUS utrinque parum elevati, vix pellucidi. SPORANGIA parva, flavescentia. PALEAE anguste lanceolatae, in acumen longum, dentatum productae (cellulae duae ultimae filiformes, flexuosae, perlongae), e cellulis irregularibus, angustis, elongatis, vix flexuosis, fusciculis constructae, ad marginem in dentes longos, curvatos vel refractos fissae.

Hanc nostram cum speciminibus genuinis Swartzii, nobis non visis, comparent autoptae. A congeneribus differt: ramis perlongis utrinque laciniis longis dense obsessis, ramis ultimis pinna geminata longioribus.

Habitat in Brasilia, loco natali non indicato: Sellow.

γ. Pinnae lineari-lanceolatae.

7. MERTENSIA PUBESCENS HUMB. BONPL. fronde dichotoma, rigida, albido-tomentosa; ramis lateralibus primariis secundariisque compressis, latere inferiore solummodo, ultimo utrinque profunde pinnatipartitis; pinnis geminatis, lineari-lanceolatis, raro lanceolatis, acuminatis, erectis, vix curvatis, firmis, profunde pinnatipartitis; laciniis subcoriaceis, subdiffusis, linearibus, supra basin dilatam contractis, apice obtusis, planis, marginatis, summis ovalibus, tomento ochraceo (imprimis in planta juniore) ubique dense obsessis; sporangiiis 3—4 in soro, ab initio tomento occultis.

Mertensia pubescens Humb. Bonpl. in Willd. Spec. Pl. V. 73. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 109. (excl. synonym. omnib.). Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844). 537 (excl. syn.: *Gl. Mathewsii* Hook.). Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 296.

Gleichenia pubescens Hook. Spec. Fil. I. 8. (excl. synonym. omnib.)

STIPES ultrapedalis, diametrum 2 lin. attingens, inferne angulosus, superne teres, apice incrassatus, supra planus, paleis tomento flavo-albido fugacibus vestitus, demum nudus, cinnamomeus. RAMULI inferiores ad 1 poll. longi, latere interiore laciniis brevibus 3—6 obsessi; ultimi circiter 2-poll. caeres, utrinque laciniis circiter 4—5 lin. longis instructi. GEMMAE proliferae, paleis ochraceis obsessae. PINNAE GEMINATAE 4-poll. longae, 6—10 lin. latae. RHACHES utrinque convexae, supra cerinae primum albido-tomentosae, in adultis fere nude, subtus cinnamomeae, paleis ochraceis vestitae. LACINIAE maximae 4 lin. longae, 1 lin. latae; inferiores latere interiore decreescentes, superiores sensim decreescentes, summae ovales, in apicem pinnae lobatum confluentes, supra glabrae, flavescens-virides, subtus pallidius, dense ochraceo-tomentosae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, flexuosus, canaliculatus, flavus, subtus elevatus, convexus, pallide cinnamomeus. NERVI SECUNDARIUS

supra indistincti, impressi, subtus elevati, pellucidi, flavi. SPORANGIA parva, brunnescentia. PALAEAE lanceolatae, in acumen longum, flexuosum, demum in dentes perlongos filiformes serpentinis fissum productae, e cellulis oblongis angustis crassis irregularibus flexuosis constructae, diaphanae, pallide stramineae, inferne brunnescentes, ad basin cordatam macula brunnea notatae, ad marginem in dentes filiformes longos recurvatos fissae.

Species (imprimis planta juvenilis) paleis magnis, flavo-albidis, tomento albedo insignis. A *M. bifida* Willd. proxima differt: pinnis ascendentibus, subrectis, parum curvatis, lineari-lanceolatis, laciniis brevioribus, obtusioribus, non raro planis, summis ovalibus, in apicem lobatum confluentibus, subtus tomento ochraceo seu pallide rufo primum densissime obtectis, postea glabrescentibus.

Habitat frequens per omnem fere Brasiliam tropicam, in sylvis caeduis, in praeruptis viarum, locis lapidosis apricis, in prov. Rio de Janeiro e. g. prope urbem et prope Nova Friburgo: Beyrich, in Serra d'Estrella, in prov. Minas prope Mariana et in Chapada do Paranae ad confin. Goyaz: M., Clauseu n. 2102. a., Sellow; in prov. Bahiensis: Princ. Mar. Neovindensis, Blanchet n. 3706; — in Andibus Peruvianis. Herb. Ruiz n. 29; in Columbia prope Caracas: E. Otto n. 677., C. Moritz n. 92; in Guiana anglica: Rich. Schomburgk.

8. **MERTENSIA PENNIGERA** MART. fronde dichotoma, rigida; ramis lateralibus supra planis, marginatis, omnibus utrinque laciniis obsessis; pinnis geminatis lineari-lanceolatis, longe acuminatis, curvatis, firmis, profundissime pinnatipartitis; laciniis coriaceis, patulis, subfalcatis, ovato-lanceolatis, margine revolutis, apice acutis, superioribus sensim decrescentibus apicem pinnae longum angustumque formantibus, subtus tomento fulvo ubique adpersis; sori sporangii 3—4; rhizomate repente, paleis rigidis, obscure ferrugineis laxè obsito.

Mertensia pennigera Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 106. tab. 59. fig. 1. (in descriptione sphalmate: gracilis).

STIPES erectus, 12 poll. longus, 1 lin. crassus, teres, apice incrassato e ramis decurrentibus marginatus, glaber, olivaceo-cinnamomeus. RAMI laterales inferiores 1 poll., superiores circiter 9 lin. longi. GEMMA centralis prolifera, paleis magnis rufis obsessa. PINNAE GEMINATAE 4—7 poll. longae, 6—8 lin. latae. RHACHES utrinque convexae, subtus cum ramis paleis pallide rufis obsessae. LACINIAE maximae 3 lin. longae, ad basin $1\frac{1}{2}$ lin. latae, superiores sensim decrescentes, apicem pinnae longum angustumque formantes et ad extremitatem confluentes, supra glabrae, obscure, subtus dilutius virides, fulvo-tomentosae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus, brunnescens, subtus convexus, rubiginosus. NERVI SECUNDARIJ remoti, utrinque distincte elevati, impellucidi. SPORANGIA parva, brunnescentia. PALAEAE gemmarum anguste lanceolatae, in acumen longe dentatum productae, e cellulis anguste-oblongis crassis flexuosis rufidulis constructae, ad basin cordatae, macula brunnea notatae, ad marginem in dentes perlongos serpentinis recurvatos fissae.

Habitu *M. gracili* assimilata, certo tamen diversa ab illa, ut mihi compluribus exemplaribus collatis persuasum est. De notis quibus utraque distinguitur, adeas observationem ad *M. gracilem*. Palcae quoque non minus inter se differunt. Hookerium (Spec. filicum) et hanc speciem et *Mertensiam gracilem* ignorasse mirum est.

Habitat in sylvis antiquissimis, e. g. super tractum montium Serra Geral e. g. prope Bacalháo, in Serra de S. Geraldo et alibi: M.

J. Pinnae anguste lineares.

9. **MERTENSIA ANGUSTA** KLOTZSCH fronde dichotoma, rigidiuscula; ramis lateralibus infimis subnudis, supra planis, Gleicheniac.

acute marginatis, sequentibus (2—4) utrinque pinnatipartitis; pinnis geminatis linearibus, breviter acuminatis, subcurvatis, firmis, profundissime pinnatipartitis; laciniis et pinnarum et ramorum subcoriaceis, patentissimis, ovali-oblongis, margine revolutis, apice obtusis, superioribus decrescentibus, summis minimis, triangularibus, subtus pallide viridibus, utrinque glabris; sori sporangii (secund. iconem Hook.) subternis.

Mertensia angusta Klotzsch in Herb. Reg. Berol.

Mertensia revoluta Hook. Spec. Fil. I. tab. VII. A. optima! (excl. descript. et patria).

Rhizoma non vidi. STIPES bipedalis, circiter 1 lin. crassus, semiteres, apice incrassato supra planus, marginatus, glaber, inferne flexuosus, rubicundus, superne flavo-brunnescens. RAMI laterales infimi 1 poll. longi, sequentes $1\frac{1}{2}$, ultimi ad 2 poll. longi, apice plani, teneri, utrinque aequae rhaches convexi, brunnei, subflavescentes, supra glabri, subtus sparse paleacei, utrinque (exceptis infimis) aequae ac pinnae geminatae profundissime pinnatipartiti, in medio ad 4 lin. lati, ad divisiones angustiores. GEMMA centralis prolifera, paleis ferrugineis obsessa. PINNAE GEMINATAE 2—4 poll. longae, latitudine ramorum. LACINIAE maximae ad $2\frac{1}{2}$ lin. longae, vix 2 lin. latae, supra saturate virides, subtus pallidus, utrinque glabrae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus, subtus convexus, brunnescens. NERVI SECUNDARIJ remoti utrinque elevati. PALAEAE gemmarum late lanceolatae, in acumen longum, dentatum productae, e cellulis amplis oblongis stramineis pellucidis constructae, basi cordata macula brunnea notatae, ad marginem in dentes minus longos, curvatos fissae.

Ramis 4—5-dichotomis, linearibus angustis, pinnis parvis, laciniis ovalibus, obtusis valde distincta. — A *Mertensia pruinosa* Mart. laciniis subtus pallide viridibus facile discernitur.

Habitat in Brasilia: Sellow. in herb. Berol.

10. **MERTENSIA PRUINOSA** MART. fronde dichotoma, rigida; ramis lateralibus dichotomis, supra convexiusculis, subtus planis, omnibus utrinque pinnatipartitis, lacinia una subtus in apicem stipitis decurrente; pinnis geminatis linearibus, parum acuminatis, erectis, subcurvatis, firmis, profundissime pinnatipartitis; laciniis omnibus et pinnarum et ramorum coriaceis, patentissimis, subtriangularibus, acutiusculis, subtus caesiis, utrinque glabris; nervis secundariis remotis, utrinque elevatis; sori sporangii 3—4.

Mertensia pruinosa Mart. Icon. Pl. Crypt. Bras. 109.

Rhizoma non vidi. STIPES semipedalis, $\frac{2}{3}$ lin. crassus, teres, apice incrassato supra planus, marginatus, erectus, glaber, rubescens, nitens. RAMI laterales primarii secundariique circiter 8 lin. longi, tertiarj vel ultimi ad $1\frac{1}{2}$ poll. longi, ad 4 lin. lati. GEMMAE plerumque abortivae, paleis ferrugineis obsessae. PINNAE GEMINATAE $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. longae, ad 3 lin. latae. RHACHES utrinque convexae, subtus aequae ac rami paleis ferrugineis sparse obsessae. LACINIAE maximae ramorum 2 lin. longae, 1 lin. latae, laciniae pinnarum vix $1\frac{1}{2}$ lin. longae, supra obscure virides, subtus caesiae, utrinque glabrae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus, flexuosus, uti NERVI SECUNDARIJ, rufo-brunnescens, subtus elevatus, cum secundariis impellucidis caesiis. SPORANGIA flava. PALAEAE gemmarum lanceolatae in acumen dentatum productae, e cellulis amplis oblongis irregularibus crassis fuscidulis subpellucidis constructae, basi cordata macula brunnea notatae, ad marginem in dentes breves curvatos fissae.

A *Mertensia angusta* Klotzsch, proxima, laciniis triangularibus subtus caesiis primo intuitu distinguitur. Cum aliis speciebus non confundenda.

Habitat in provincia Minarum, prope Sabará et Cidade de Ouro preto, in fossis, quibus aqua ad aurifodinas deducitur: M., Freireiss; ad Caltas: G. A. Lindberg.

(11.) *MERTENSIA REVOLUTA* Kunth frondere petio-dichotoma, rigida, ramis inferioribus teretibus, aphyllis, apice pinnam accessoriam brevissimam pinnatifidam gerentibus; summis utrinque laciniis obsessis arcuato-ascendentibus, aequae ac ramulis, dense paleaceis; pinnis geminatis, arcuatis, perangustelinearibus, parum acuminatis, profundissime pinnatipartitis; laciniis parvis, coriaceis, patentissimis, lineari-ovalibus, obtusis, margine valde revolutis, subtus glaucis, rufo-pilosis; sori sporangiis 2—4.

Gleichenia revoluta Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. Am. I. 29. Hook. Spec. Fil. I. 7. (quoad descriptionem, sed excl. iconē tab. 7. A. *Mertensiam angustam* Klotzsch exhibente).

Rhizoma non vidi. Pars superior STIPITIS $1\frac{1}{2}$ lin. in diametro, teres, subverruculosa, apice incrassata, paleacea, cinnamomea. RAMI primarii ad 15 lin., ultimi ad 10 lin. longi, pallide cinnamomei, subtus verruculosi, paleacei. GEMMAE proflerae, paleis ferrugineis obsessae. PINNAE ALARES et ACCESSORIAE brevissimae, 2—3 lin. longae, 3 lin. latae, pinnatifidae. PINNAE GEMINATAE 2— $3\frac{1}{2}$ poll. longae, circiter 3 lin. latae. RHACHES utrinque elevatae, supra albo-tomentosae, subtus paleis ferrugineis, patentissimis densissime obtectae. LACINIAE longitudine lineam vix superantes, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. latae, summae in apicem pinnae lobatum confluentes, supra glabrae fusco-virides, lepidibus minutis, flavis adpersis, subtus glaucae, rufo-pilosae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, flexuosus, flavescens, subtus convexus, rufescens. NERVI SECUNDARIJ utrinque subelevati, remoti, impellucidi. SPORANGIA magna in apicem pinnae lobatum confluentia. PALMAE perangusto-lanceolatae in acumen longum, subulatum, flexuosum, articulatum dentatumque productae, e cellulis elongatis amplis glabris fusciculis constructae, ad marginem in dentes spiniformes longos fissae.

Species distinctissima, forma pinnarum cum *M. pennigera* et *M. gracili* Mart. aliquam ostendit similitudinem, sed ab his habitu, ramis inferioribus aphyllis, apice pinnulis accessorii instructis, pinnis geminatis multo angustioribus, laciniis minimis etc. diversissima. E comparatione speciminis Humboldtiani edoctus sum, plantam ab auctoribus variis non recte cognitam esse. Ill. Hooker (Spec. Filic. I. p. 7) eam recte descripsit, attamen iconē tab. 7, A *Mertensiam angustam* Klotzsch insigniter prodit.

Habitat in Andibus Quitensibus: Humboldt.

12. *MERTENSIA SUBFLABELLATA* BRACKENRIDGE fronde ter-dichotoma, subflabelliformi; pinnis geminatis linearibus, acuminatis, profunde pinnatipartitis, apice integris; laciniis alternis, triangulari-ovatis, subtus glaucis, margine revolutis; nervo primario subtus paleis membranaceis elongatis fimbriato, supra pilis gracilibus crinito; sori sporangiis majusculis 2—4.

Mertensia subflabellata Brackenridge Unit. Stat. Explor. Exped. XVI. 294.

Planta tota 10—15 poll. longa. STIPES gracilis, teres, glaber, basi paleis rigidis ciliatis obsessus. FRONS tantum ter-dichotoma. PINNAE ascendentes, lineares, acuminatae, apice integro circiter semipollicari terminatae. LACINIAE breves, alternae, triangulari-ovatae, margine revolutae, subtus valde glaucae. NERVUS PRIMARIUS subtus paleis longis brunneis fimbriatis partitum occultatus, supra pilis longis gracilibus albidis fasciculatis obsessus. SPORANGIA magna.

Secundum Clar. Brackenridge haec species *Mertensia revoluta* Kunth proxima, a qua differt: ramo centrali nullo, fronde solummodo ter-dichotoma; pinnis geminatis apice integris. Non vidi.

Habitat in Serra d'Estrella.

B. Rami ultimi latere inferiore pinnatifidi.

13. *MERTENSIA BIFIDA* WILLD. fronde dichotoma, rigida, pallide ferrugineo-tomentosa; ramis lateralibus primariis

latere interiore solummodo, secundariis (si adsunt) utrinque laciniis obsessis; pinnis geminatis longis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, falcato-incurvis, firmis, profundissime pinnatipartitis; laciniis coriaceis, subpatentissimis, e basi latiore lineari-lanceolatis, angustatis, apice acutiusculis, margine revolutis, superioribus remotioribus, summis triangularibus, subtus tomento pallide ferrugineo persistente ubique densissime obsessis; sori sporangiis 3—4, primum tomento occultis.

Mertensia bifida Willd. in Acta Holm. 1804. 168. tab. 5. B. (collato specim. originali in Herb. Willd. n. 19468.). Willd. Spec. Pl. V. 73. Brackenr. U. St. Expl. Exp. XVI. 295.

Mertensia ferruginea Desv. in Berl. Magaz. V. (1811). 307. Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 17.

Mertensia immersa Kaulf. Enum. Fil. 38. Hook. et Grev. Icon. Fil. I. tab. 15.

Mertensia decurrens Raddi Fil. Brasil. 73. tab. 7.

STIPES pedalis et ultra, diametrum $1\frac{1}{2}$ —2 lin. attingens, teres, apice planus, marginatus, olivaceus cum rubente, tomentoso-paleaceus, aetate proventus subglaber. RAMI laterales primarii 15 lin. longi, latere interiore tantum laciniis obsessi, secundarii (qui non semper adsunt) inaequales, circiter 9 et 15 lin. longi, utrinque laciniis gerentes. GEMMA primaria proflera, paleis pallide ferrugineis obsessa. PINNAE GEMINATAE 6—fere 16 poll. longae, 15—25 lin. latae. RHACHES utrinque convexae, olivaceo-cinnamomeae, apicem versus flavescens, subtus pallide ferrugineo-paleaceae. LACINIAE maximae 9—15 lin. longae, ad basin 2 lin. latae, superiores decrescentes, remotiores, summae triangulares in apicem pinnae serratum confluentes, supra glabrae, saturate subtus pallidius virides, densissime pallide ferrugineo-tomentosae. NERVUS PRIMARIUS supra subelevatus, subcanaliculatus, flexuosus, brunnescens, subtus convexus, rubens, tomento subconditus. NERVI SECUNDARIJ supra indistincti, impressi, subtus elevati. SPORANGIA parva cerina. PALMAE anguste lanceolatae, angustatae, apice minus productae, in dentes perlongos serpentinos fissae, e cellulis amplis oblongis irregularibus subflexuosis stramineis diaphanis constructae, ad basin vix cordatis, macula brunnea parva notatae, ad marginem in dentes longos filiformes curvatos fissae.

A *Mertensia pubescente*, proxima, differt: pinnis geminatis majoribus, oblongo-lanceolatis; pinnis duabus interioribus pinnarum geminatarum oppositarum plerumque rectis, exterioribus saepissime falcato-incurvatis; laciniis duplo longioribus, lanceolatis, attenuatis, acutiusculis, revolutis, summis remotioribus, triangularibus, acutis, in apicem serratum, ad extremitatem tantum lobatum confluentibus, subtus tomento pallide ferrugineo densissime constanter obsessis; ramis lateralibus primariis apice planis, hic et in toto latere interiore longitudinaliter marginatis.

Habitat in insula St. Catharinae: Gaudichaud; in prov. Rio de Janeiro super M. Corcovado: M., Beyrich, Schott n. 4531., Raben, Pohl n. 3862 (et nomine M. revolutae (Prest) idem in Hb. Mus. Pal. Vindob.); in altis Serra d'Estrella: Langsdorff; in prov. S. Pauli et Minarum Serra do Mar: M., Freireiss. — In Caracas, Venezuela: Bredemeyer, Moritz n. 48, Otto n. 629; in Porto Bello: Billberg; in Antillis: e. g. in insula Martinica: Sieber (Flor. Martin. n. 234., specimina amplitudine insignia); in ins. Trinitatis: Guilding; ins. St. Domingo: Ritter; in Cuba orientali: C. Wright n. 921.

OBSERVATIO. Quum in nonnullis congeneribus, tum in hac specie interduum altera pinnarum geminatarum apice iterum in pinnam geminatam excrescit, quam ob rem beat. Willdenow, cujus herbarium exemplar hujus formae ostendit, nomen specificum delegisse videtur.

14. *MERTENSIA GRACILIS* MART. fronde dichotoma, rigida, glaberrima; ramis lateralibus subteretibus, inferioribus latere interiore solummodo, superioribus utrinque laciniis obsessis; pinnis geminatis lineari-lanceolatis, paululum acuminatis, erectis curvatisve, firmis, profundissime pinnatipartitis;

lacinii coriaceis, patulis, rectis, e basi latiore lineari-lanceolatis, apice acutiusculis plerumque mucronulatis, margine subrevolutis, subtus glaberrimis; sori sporangii 3—5; rhizomate repente, paleis flaccidulis dilute ferrugineis s. rufis dense obsito.

Mertensia gracilis Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 107. tab. 59. fig. 2.

STIPES erectus 4—7 poll. longus, $\frac{1}{2}$ lin. crassus, teres, apice vix incrassatus, glaber, olivaceus. RAMI laterales 8—10 lin. longi. GEMMAE abortivae, paleis fulvis obsessae. PINNAE GEMINATAE 3—6 poll. longae, ad 7 lin. latae. RHACHES utrinque convexae, aequae ac rami olivaceo-cinnamomeae, supra rufidulae, glaberrimae. LACINIAE maximae ad 4 lin. longae, ad basin $\frac{1}{2}$ lin. latae, superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae serratum confluentes, supra obscure, subtus pallidius virides, subglaucae, glaberrimae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus brunescens, subtus convexus rubiginosus. NERVI SECUNDARIJ remoti, supra impressi, subtus nigricantes, vix elevati. SPORANGIA parva, brunnescentia. PALAEAE gemmarum perangusto-lanceolatae, in acumen dentatum productae, e cellulis amplis crassis oblongis irregularibus flexuosis stramineis constructae, ad basin non cordatae, macula brunnea nulla, ad marginem in dentes erectos fissae.

Ad *M. pennigeram* Mart. proxime accedit, sed facile distinguitur: pinnis latere inferiore glabris, versus apicem minus acuminatis, ramis inferioribus solummodo latere inferiore lacinulis obsessis, stipite graciliore, apice non incrassato, non marginato, rhizomate paleis majoribus, flaccidulis, dilute ferrugineis densius obsito.

Habitat in praeruptis viarum et in crepidinibus montium, in prov. Minarum parte australi: M.

Sect. 2. Nervi secundarii 2—4-furcati. Gemmae pilis articulatis obsessae.

§. 1. Pinnae accessoriae nullae.

15. MERTENSIA PECTINATA Willd. fronde dichotoma, rigida, subglabra; ramis inaequilongis, in utroque latere linea prominente notatis, aphyllis; pinnis geminatis lanceolatis, acuminatis, faleatis, erectis, patentissimis reflexisque, profundissime pinnatipartitis; lacinii coriaceis, patentissimis, e basi latiore lineari-lanceolatis, margine revolutis, apice obtusis, omnibus excisis, subtus subcaesiis, tomento rufo laxo adpersis; nervis secundariis bi-trifurcatis; soris magnis, sporangiis 6—11.

Mertensia pectinata Willd. Act. Holm. 1804. 168. tab. 4. (collato specimine originali in Herb. Willd. n. 19465). Willd. Sp. Pl. V. 73. Langsd. et Fisch. Icon. Fil. 26. tab. 30.

Gleichenia pectinata Presl. Reliq. Haenk. I. 71.

Mertensia glaucescens Humb. Bonpl. in Willd. Sp. Pl. V. 72. Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 19. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 110. Kunze in Linnaea IX (1834). 17. Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 292.

Gleichenia glaucescens Hook. Spec. Fil. I. 11.

Mertensia Brasiliana Desv. in Berl. Magaz. V (1811). 329. et Journ. bot. 1813. 268. Kunze Commentar. ad Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora od. allg. bot. Zeit. 1839. I. Beibl. 43. Kunze in Linnaea IX (1834). 18.

Gleichenia Hermannii Hook. et Grev. Icon. Fil. tab. 14 (excl. synonymis). Schlechtend. in Linnaea V (1830). 620.

Mertensia canescens Kaulf. Enum. Fil. 38.

Mertensia emarginata Raddi Fil. Brasil. I. 72. tab. 6.

STIPES distans, erectus, sexpedalis (teste clar. Poeppigii usque ad 16 ped. altus), diametrum 2—3 lin. attingens, teres, tortuosus, apice incrassatus, utrinque linea prominente praeditus, durus, aequae ac rami flavescens-rubens, laevigatus, nitens, in dichotomiis ferrugineo-tomentosus. RAMI inae-

quilongi, alteri $\frac{1}{2}$, alteri $1\frac{1}{2}$ poll. et ultra longi (unde rami laterales geniflexi apparent), patentes, breviores ultimi saepe divaricati, omnes in utroque latere linea prominente notati, aphylli. GEMMAE pilis ferrugineis obsessae, centralis frequenter evoluta, ramus medius pluripedalis, dichotomis. PINNAE ALARAE triangulares, pinnatifidae, 3—6 lin. longae. PINNAE GEMINATAE 2—6 poll. longae, 9—12 lin. latae. RHACHES supra planae, apicem versus canaliculatae, subtus convexae, utrinque glabrae. LACINIAE maximae 4—9 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae, inferiores in latere pinnae interiore decrescentes, ima vix 1 lin. longa; segmenta ima in latere pinnae exteriori praecedentibus longiora; superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae obtusiusculum, lobatum confluentes, supra viride flavescens, glabrae, subtus subcaesia, laxo tomentosae. NERVUS PRIMARIUS supra elevatus, canaliculatus, flavescens, subtus convexus, pallide rubicundus. NERVI SECUNDARIJ graciles, utrinque parum elevati. SPORANGIA parva flavescencia. PILI gemmarum subulati, nodoso-articulati, e cellulis 6—11 compositi, basi 2—3 fidi. LACINIAE subtus pilis stellato-4-partitis fasciculis pellucidis laxo adpersae, atamen raro plane deficientibus.

Planta valde insignis et ab omnibus speciebus hujus sectionis ex nervis secundariis plurifurcatis, pinnis accessoris omnino carentibus facillime dignoscenda. Cum *M. dichotoma* magnam similitudinem habet, sed ab ea praeter defectum pinnarum accessoriarum ramis linea prominente utrinque instructis facile distinguitur.

Habitat in saxosis apricis et in solo argillaceo, praesertim locis montosis, per vastam Brasiliae plagam. In insula St. Catharinae: Chamisso et Langsdorff; in prov. Sebastianopolitana passim: M. (Herb. Fl. Brasil. n. 359), Raddi; in monte Corcovado: Pohl n. 3861, Princ. Max. Neovidenis; in Serra d'Estrella: Beyrich; — in prov. St. Pauli: M., Sellow; — in prov. Bahiensi: M., Princ. Max. Neovid., Blanchet n. 20. — in prov. Rio Negro, ad Ega: Poeppig, M.; prope oppidum Barra: Spruce n. 861. — In Guiana batava: Wulfschlägel n. 667, Hostmann n. 815; in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 263 et 378. — In Venezuela, ad Caracas: Bredemeyer; in umbrosis Camanae: Humboldt. — In isthmo Panamae prope Porto Bello: Billberg. — In Mexico, inter Metapulco et Cuapa, reg. calidae: Schiede n. 814.

OBSERVATIO. Secundum b. Willdenow in *M. glaucescenti* frondes (i. e. pinnae) superiores ad stipitem decurrunt, nota quam in permultis specimenibus a me investigatis nunquam observare potui. Raddi in opere suo Fil. Brasil. p. 73 itidem mentionem facit: „Frondes terminales sunt non raro decurrentes“.

§. 2. Pinnae accessoriae late lanceolatae.

A. Pinnae geminatae subdeflexae.

16. MERTENSIA FLEXUOSA Schrad. fronde dichotoma, rigida, glabra; ramis teretibus, aphyllis; pinnis accessoris linearilanceolatis, pinnatipartitis, inferioribus permagnis, apicem versus vix angustatis, obtusis, superioribus diminutis; pinnis geminatis lanceolato-linearibus, parum acuminatis, patentibus, horizontalibus aut deflexis, fragilibus, profundissime pinnatipartitis; lacinii coriaceis, patentissimis, rectis, linearibus, basi vix dilatatis, margine revolutis, apice obtusis, subtus subglaucescentibus; nervis secundariis 3—4-furcatis; sori sporangiis 4—10.

Mertensia flexuosa Schrad. in Gött. gelehr. Anzeig. 1824. 863. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 108. tab. 60. fig. 1. (excl. syn. *M. rigidae* Kunze).

RHIZOMA repens, flexuosum, pilis rigidis obscure ferrugineis obsessis. STIPES 5—9 poll. longus, teres, subflexuosus, glaber, inferne tumidus, verruculosus basi tantum pilosus, in medio 1— $1\frac{1}{2}$ lin. crassus, cum ramis olivaceo-cinnamomeis. RAMI teretes, apice incrassati, laterales inferiores ad 15 lin. longi, summi perbreves 4—5 lin. longi. GEMMAE proflerae, pilis atropurpureis obsessae, centralis frequenter evoluta, ramis mediis elongatis, dichotomis. PINNAE ALARAE oppositae, complicatae, lanceolatae, inferne pinnatipartitae. PINNAE ACCESSORIAE infimae ad 5 poll. longae, 6—7 lin. latae, superiores vix pollicares, linearilanceolatae, basi tantum lobatae. PINNAE GEMINATAE 3—5 poll. longae, ad 9 lin. latae. RHACHES utrinque

parum tamen convexae. LACINIAE maximae ad 4 lin. longae, ad basin $1\frac{1}{2}$ lin. latae, superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae serratum confluentes, supra flavo-virides, subtus pallidius, subglaucescentes, glaberrimae. NERVUS PRIMARIUS supra latus, planus, vix elevatus non canaliculatus, subtus subconvexus parum elevatus, subrubicundus. NERVI SECUNDARIUM approximati, supra elevati, subtus impressi. PILI gemmarum subulati, subnodoso-articulati, e cellulis 8—11 compositi, cellula ima crassiore, fissa.

A congeneribus hujus sectionis pinnis accessoriis imis perlongis, linearilanceolatis et pinnis geminatis horizontalibus deflexisque, et fragilitate facile distinguenda.

Habitat in locis aridis, calidis, lapidosis, in montium tractu Serra do Mar dicto, in provinciis Sebastianopolitana, Spiritus sancti, Bahiensis: M.; prope Belmonte in Oceani litore: Pr. Max. Neovindensis.

ADNOTATIO. *Mertensia pumila* Mart. Icon. pl. Crypt. Brasil. 111. tab. 60. f. 2. exhibet frondes juveniles alicujus *Mertensiae*, itaque tamquam species delenda est. (Conf. Al. Braun: Betrachtungen über die Erscheinung der Verjüngung in der Natur 123, in nota.)

B. Pinnae geminatae erectae.

17. *MERTENSIA RIGIDA* KUNZE fronde dichotoma, rigida, glabra; ramis teretibus, longis, aphyllis; stipite ramisque omnibus pinnis accessoriis deflexis, lanceolatis, pinnatifidus, inferioribus apicem versus longe acuminatis, summis minoribus tantum pinnatifidis instructis; pinnis geminatis lanceolatis, acuminatis, erectis, parum curvatis, firmis, profundissime pinnatifidus; laciniis coriaceis, patulis patentissimisve, rectis s. falcatis, linearibus, basi subdilatis, margine revolutis, apice obtusis, interdum excisis, subtus glabris; nervis secundariis 3—4 furcatis; sori sporangiis 4—9.

Tabula nostra XVII.

Mertensia rigida Kunze in *Linnaea IX* (1834). 16. et *ibidem XXII* (1849). 575.

Mertensia Hermannii Herb. Zuccarinii.

RHIZOMA repens, pilis ferrugineis dense obsitum. STIPES $\frac{1}{2}$ —2 ped. longus, diametrum $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. attingens, teres, flexuosus, apice incrassatus, basi vix crassiore tantum verruculosus, olivaceo-cinnamomeus, vernicosus, glaber. RAMI inferiores $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. longi, summi ad 1 poll. longi, apice incrassati, plani, colore stipitis. GEMMAE proliferae, pilis atropurpureis obsessae. Omnes gemmae PINNIS ALARIBUS duobus oppositis, lanceolatis, pinnatifidis tectae; centrales repetite evolutae. PINNAE ACCESSORIAE imae ad 4 poll. longae, 1 poll. latae, superiores medio minores et usque ad apicem pinnatifidus; summae anguste lanceolatae, lobatae. PINNAE GEMINATAE circiter 7 poll. longae, ad 15 lin. latae. RHACHES utrinque convexiusculae, supra apicem versus nonnunquam canaliculatae. LACINIAE maximae fere 9 lin. longae, ad basin 2 lin. latae, plerumque, summis exceptis, falcatae et non raro ad nervum primarium revolutae, superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae lobatum, ad extremum integrum confluentes, supra flavo-virides, subtus pallidius, subglaucescentes, pruinosae, glabrae. NERVUS PRIMARIUS supra subelevatus, planus, vix canaliculatus, subtus convexus, rubicundus. NERVI SECUNDARIUM supra parum elevati, subtus profunde impressi. SORI numerosi, globosi. SPORANGIA dilute brunnea. PILI gemmarum subulati, subconici, subnodoso-articulati, e cellulis 6—9 compositi; cellula ima basi in dentes grossos 2—3 divisa.

A reliquis speciebus hujus florum differt: ramis omnibus, summis non exceptis, apice pinnas accessorias gerentibus. Speciei praecedenti quamquam maxime affinis, sed longitudine majore, pinnis accessoriis inferioribus lanceolatis, longe acuminatis, summis ipsis eformatis, pinnis geminatis erectis, laciniis saepe falcatis, ad rhachin usque pinnatifidus, stipite inferne nec tumido, nec verruculoso distat.

Herbar. Zuccarinii specimen sterile monstruosum continet, quod omnes lacinas pinnarum superiorum in pinnulas pinnatifidas ferrugineo-tomentosas mutatas exhibet, dum lacinae normales omnino glabrae apparent.

Habitat in prov. Minarum: Sellow, Pohl, Claussen (sub n. 2102b distributa), Regnell (Coll. II. n. 326.); prope Ilheos, prov. Bahiensis: Luschnath; — in Peruvia in montibus aridioribus ad Chibangata: Poeppig; in Cuba orientali: C. Wright n. 922.

18. *MERTENSIA DISCOLOR* SCHRAD. fronde dichotoma, rigida; ramis aphyllis, supra planis; pinnis accessoriis permagnis, late lanceolatis, pinnatifidus; pinnis geminatis lanceolatis, acuminatis, erecto-patentibus, parum curvatis, firmis, profunde pinnatifidus; laciniis coriaceis, patentissimis, rectis, e basi latiore linearibus, margine revolutis, apice obtusis, interdum excisis, subtus in nervo primario ferrugineo-tomentosis; nervis secundariis 2—3 furcatis; sori sporangiis 6—12.

Mertensia discolor Schrad. in *Götting. gelehrt. Anzeig.* 1824. 863. Martius Icon. Pl. Crypt. Brasil. 111. (quoad plantam brasiliensem et excl. syn.: *M. dichotomae* Sieber.)

RHIZOMA non vidit. STIPES 1 — $1\frac{1}{2}$ lin. crassus, apice eximie incrassatus, supra planus, subcanaliculatus, cinnamomeus, glaber, solummodo in dichotomia tomentosus. RAMI inferiores circiter $2\frac{1}{2}$ poll., superiores 9—12 lin. longi, supra plani, canaliculati, inferiores marginati, omnes subtus convexi, aequae ac rhaches flavo-rubentes. GEMMAE abortivae, pilis atropurpureis obsessae. PINNAE ALARIBUS oppositae, triangulares, pinnatifidus, lacinia media lanceolata. PINNAE ACCESSORIAE infimae ad 5 poll. longae, fere 2 poll. latae, pinnatifidus, laciniis summis in apicem pinnae lanceolatum, integerrimum confluentibus; pinnae accessoriae superiores circiter 2 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae, lobatae. PINNAE GEMINATAE eadem longitudinae, sed angustiores vix $1\frac{1}{2}$ poll. latae. RHACHES supra planae, canaliculatae, subtus convexiusculae, utrinque basin versus ferrugineo-tomentosae. LACINIAE maximae pollicares, ad basin sub 2 lineares, superiores sensim decrescentes, summae in apicem pinnae lobatum confluentes, supra glabrae, saturate virides, subtus pallidius, glaucescentes et rubicundae. NERVUS PRIMARIUS supra subelevatus, canaliculatus, subtus convexus rubicundus, interdum ferrugineo-tomentosus. NERVI SECUNDARIUM utrinque sed supra magis elevati. PILI gemmarum subulati, subnodoso-articulati, e cellulis 8—11 compositi, cellula ima vix crassiore, basi 2—3-fida.

Inter species brasilienses *M. rigida* Kunze unica est, quae cum planta nostra confundi potest. Ab hac facile distinguenda: pinnis accessoriis multo majoribus, ultimis ramis pinnarum geminarum longioribus, laciniis rectis, parum revolutis, subtus discoloribus, in nervo primario dichotomisque ferrugineo-tomentosis, ramis supra planis marginatis, rhachibus supra planis a basi ad apicem sulcatis.

Habitat in sylvis; e. g. in Serra d'Estrella: Beyrich; et in omni tractu Serra do Mar: M., Princ. Max. Neovindensis.

19. *MERTENSIA RUFINERVIS* MART. fronde dichotoma, rigida; ramis longis, aphyllis; pinnis accessoriis magnis, lanceolatis, pinnatifidus, apice stipitis affixis; pinnis geminatis longis, lanceolatis, longe-acuminatis, subfalcatis, firmis, profundissime pinnatifidus; laciniis coriaceis, patentissimis, subcurvatis, e basi latissima lanceolatis, sinu acutangulo sejunctis, margine valde revolutis (usque ad nervum medium), apice acutiusculis, subtus in nervo primario tantum dense obscure ferrugineo-tomentosis; nervis secundariis bifurcatis; sori sporangiis 4—5.

Mertensia rufinervis Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 111.

Gleichenia rufinervis Hook. Spec. Fil. 1. 11.

Gleichenia Klotzschii Hook. l. c. 13. tab. V. B. Brackenk. U. St. Expl. Exped. XVI. 297.

STIPES ultrapedalis, diametrum 1 lin. attingens, teres, sicut rami subangulatus et cum rhachibus cinnamomeus, opacus, subglaber. RAMI laterales inaequales 2—3½ poll. longi. GEMMAE prolierae, pilis atropurpureis obsessae. PINNAE ALARES lato-ovatae, pinnatipartitae, 9 lin. longae, 8 lin. latae. PINNAE ACCESSORIAE circiter 4 poll. longae, 1½ poll. latae. PINNAE GEMINATAE subpedales, in medio circiter 3½ poll. latae. RHACHES supra planae, canaliculatae, glabrae, subtus convexae subglabrae. LACINIAE maximae usque ad 21 lin. longae, basi ima 3 lin. latae, inferiores 3—4 latere interiore decrescentes, infima plerumque ad 5 lin., raro 2 lin. longa; lacinae superiores decrescentes, summae in apicem pinnae lobato-serratum confluentes, supra obscure virides, subtus glaucescentes, utrinque glabrae. NERVUS PRIMARIUS supra perangustus, planus, canaliculatus, brunescens, subtus validus, convexus, rubicundus, tomento obscure ferrugineo densissime obsessus. NERVI SECUNDARIJ approximati, supra elevati, subtus impressi. SPORANGIA parva, brunnescentia. PILI gemmarum impellucidi, nodoso-articulati, basi crassiores, cellula terminalis subulata.

Mertensiae Schomburgkianae St. simillima; differt: gemma primaria pinnis alaribus pinnatipartitis tecta; pinnis accessoriis apice stipitis excrecentibus; pinnis geminatis sensim et longe acuminatis; laciniis majoribus, usque ad nervum primarium revolutis, subtus glabris, in nervo medio solummodo tomentosus, inferioribus 3—4 lateris interioris minus diminutis; sinibus lacinarum acutangulis.

Habitat in vicinia Rio de Janeiro: Brackenkridge; in prov. Mintrum: Freireiss, Sellow.

20. MERTENSIA SCHOMBURGKIANA J. W. STURM fronde dichotoma, rigida; ramis longis, aphyllis; pinnis accessoriis magnis, lanceolatis, pinnatifidis, supra basin ramorum affixis; pinnis geminatis longis, inaequalibus, lanceolatis, apicem versus breviter acuminatis, subfalcatis, firmis, profundissime pinnatipartitis; laciniis coriaceis, patentissimis vel paululum reflexis, rectis, e basi latissima linearibus, sinu rotundo sejunctis, subplanis, marginatis, apice obtusis, superioribus abrupte decrescentibus, subtus ubique densissime obscure ferrugineo-tomentosis; nervis secundariis bifurcatis; sori sporangii 4—5, tomento delitescens.

Mertensia rufinervis Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844). 538. et in *Herbario Reg. Berolinensi*.

Rhizoma non vidi. STIPES (adest tantum superior pars) apice incrassatus, diametrum 1½ lin. attingens, aequae ac rami ultimi cinnamomeus, opacus, evanescente ferrugineo-tomentosus. GEMMAE prolierae, pilis atro-purpureis obsessae. PINNAE ALARES 3 lin. longae. RAMI ultimi 2—3 poll. longi, aphylli, supra basin PINNAE ACCESSORIAE usque ad 3 poll. longas, ad 1 poll. latas, profundissime pinnatifidas (interdum perangustas, lobatas et apicem versus tantum pinnatifidas) gerentes. PINNAE GEMINATAE longitudine inaequali, interiores circiter 9 poll., exteriores 6 poll. longae, in medio fere 3 poll. latae. RHACHES supra planae, canaliculatae, glabrae, subtus convexae, evanescente tomentosae. LACINIAE maximae circiter 1 poll. longae, ad basin 2 lin. latae, infimae 3—4 (latere interiore) diminutae, ima vix 1 lin. longa, superiores abrupte decrescentes, summae in apicem pinnae lobatum confluentes, supra glabrae, obscure virides, subtus pallidius subglaucae, ubique tomento obscure ferrugineo dense obsessae. NERVUS PRIMARIUS supra planus, canaliculatus, brunescens, subtus convexus, sub-rubicundus, dense tomentosus. NERVI SECUNDARIJ approxima-

Gleicheniac.

tissimi, supra valde elevati, subtus impressi. PILI gemmarum subnodoso-articulati, basi crassiores, ramosi, apicem versus angustissimi, cellula ultima acicularis.

A *Mertensia rufinervi*, cum qua perperam conjungitur, differt: gemma primaria pinna parva, simplici tecta; pinnis accessoriis non ad apicem stipitis, sed supra basin ramorum excrecentibus; pinnis geminatis apice subabrupte acuminatis, non sensim angustatis; laciniis non revolutis, subtus ubique tomento obscuriore-ferrugineo densissime obsessis; inferioribus 3—4 pinnae latere interiore valde diminutis, infima vix 1 lin. longa; sinibus lacinarum rotundis.

In *Guyana anglica*, loco speciali non indicato: Rich. Schomburgk n. 1671. — Haec species in vicinis Brasiliae etiam provinciis repertum iri verisimile est.

§. 3. Pinnae accessoriae lineari-lanceolatae s. lineares.

A. Stipes apice proliero pinnas geminatas ramosas (petiolatas) gerens.

(21.) MERTENSIA SEMINUDA KLOTZSCH fronde dichotoma, rigida, lanuginosa; ramis ultimis aphyllis, basi pinnis accessoriis perangustis, lobato-dentatis instructis; pinnis geminatis lanceolatis, inferne paululum angustatis, apice angustato-cuspidatis, subflexuosis, firmis, profundissime pinnatifidis; laciniis dense coriaceis, inferioribus subflexis, infimis latere interiore subabortivis, superioribus erecto-falcatis, e basi parum dilatata lineari-lanceolata, obtusis, margine revolutis, subtus cum ramis rhachibusque tomento pallide rufo, fugace dense vestitis; nervis secundariis quadrifurcatis; sori sporangii 3—5, sub tomento occultis.

Mertensia seminuda Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844). 538.

STIPES circiter 6 poll. longus, 1½ lin. in diametro, teres, erectus subflexuosus, cinnamomeus, superne evanescente tomentosus, verruculosus. RAMI ultimi 13—15 lin. longi, quisque ad basin pinnam accessoriam pinnatifidam potiusve lobato-fissam, 2 poll. longam, 2—4 lin. latam gerens. GEMMA centralis proliera, pilis ferrugineis obsessa. PINNAE ALARES vix 2 lin. longae, lanceolatae. PINNAE GEMINATAE 6—7 poll. longae, 1½ poll. latae. RHACHES supra planae, subcanaliculatae, pallide cinnamomeae, subtus convexae, dense tomentosae. LACINIAE maximae ad 1 poll. longae, basi 1½ lin. latae; summae decrescentes, demum in pinnae apicem 6 lin. longum lobatum confluentes, supra glabrae, flavide virides, subtus pallidius, tota pagina inferior tomento pallide rufo fugaceque densissime obiecta. NERVUS PRIMARIUS supra late canaliculatus, cum secundariis indistinctus, subtus convexus. NERVI SECUNDARIJ subtus valde impressi. PILI gemmarum subulati, articulati, basi crassiores et in ramis 2—3 fissi, ferruginei. PILI tomentum formantes filiformes, articulati, flexuosi, tortuosi, hyalini.

M. *Schomburgkianae* affinis, sed tomento pallide rufo cum cinereo intermixto, pinnis minoribus, angustato-cuspidatis, laciniis magis approximatis, pinnis accessoriis perangustis facile distinguenda.

Nostra aetate in Caracas, Venezuela, a cel. Moritz lecta et sub n. 91 distributa. — In Brasilia septentrionali quaerenda.

B. Stipes apice pinnam geminatam sessilem gerens.

a. Pinnae pinnatisectae.

22. MERTENSIA CINNAMOMEA BEYRICH fronde simpliciter, rigidissima; pinnis accessoriis perangustis, linearibus, basi pinnatipartitis; pinnis geminatis oblongo-lanceolatis, obtusis, firmis, pinnatisectis; laciniis coriaceis, remotiusculis, alternis, erecto-incurvatis, e basi aequali inferiore auriculata, linearibus, margine revolutis, apice angustatis, acutiusculis, excisis, summis magis approximatis, decrescentibus, subtus tomento ferrugineo-rubiginoso ubique densissime obsessis;

nervis secundariis 3—4-furcatis; soris numerosis tomento omnino occultis.

Mertensia cinnamomea Beyrich (teste Herbario Kunzeano.)

Mertensia nervosa (Kaulf.) in Herb. reg. Monac.

RHIZOMA et partem inferiorem stipitis non vidi. GEMMAE proliferae pilis ferrugineo-rubiginosis obsessae. PINNAE ACCESSORIAE subpollicares, 2 lin. latae, apice stipitis excrecentes, basi pinnatipartitae, laciniis tribus, lanceolatis praeditae. PINNAE GEMINATAE 9—12 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. latae. RHACHES robustae, durae, basi diametrum 1 lin. attingens, cinnamomeae, supra planae, subcanaliculatae, cinereo tomentosae, subtus convexae, tomento ferrugineo-rubiginoso densissime obsessae. LACINIAE maximae ad 2 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae, interstitiis 1— $1\frac{1}{2}$ -linearibus a sequentibus remotae; lacinae summae vix 1 lin. longae, supra glabrae, obscure virides, subtus glaucae, tomento ferrugineo-rubiginoso densissime obsessae. NERVUS PRIMARIUS supra non elevatus, canaliculatus, rufescens, subtus validus, convexus, rubicundus. NERVI SECUNDARIJ supra elevati, robusti, subtus impressi. PILI gemmarum articulati, e cellulis 7—11 compositi; cellula terminalis longior, subulata, tortuosa.

Species insignis, ab omnibus congeneribus tomento densissimo ferrugineo-rubiginoso distincta. A *Mertensia neglecta* St. specie proxima differt: pinnis majoribus, robustioribus, oblongo-lanceolatis, apice obtusiusculis, parum angustatis, laciniis valde numerosis, magis approximatis, erecto incurvatis. A *M. nervosa* Klf. et *M. Beyrichiana* St. pinnis pinnatisectis non pinnatipartitis facile dignoscitur.

Habitat in Brasilia ad Rio Mucury prope Caravellas: Freireiss. — In Peruvia: Haenke.

23. *MERTENSIA NEGLECTA* J. W. STURM fronde simplici, rigida; pinnis accessoriis; pinnis geminatis oblongo-lanceolatis, acuminatis, erectis, firmis, pinnatisectis; laciniis coriaceis, remotis, alternis, patentissimis, e basi dilatata linearibus, margine revolutis, apice acutiusculis, summis sensim decrescentibus, subtus ubique dense laete rufescenti-tomentosis; nervis secundariis 2—4-furcatis; soris

Mertensia ferruginea Desv. in Herb. Reg. Berol.

RHIZOMA horizontale, repens ut in reliquis *Mertensiae* speciebus. STIPES 4—5 poll. longus, 1 lin. crassus, erectus, teres, glaber, aequae ac rhaches cinnamomeus. GEMMAE abortivae, pilis ferrugineis obsessae. PINNAE ALARES deltoideae, basi pinnatifidae. PINNAE ACCESSORIAE apice stipitis excrecentes, in specimine unico defractae sunt. PINNAE GEMINATAE 8—10 poll. longae, circiter 2 poll. latae. RHACHES supra planae, profunde canaliculatae, linea elevata in apicem stipitis in medio et utrinque decurrentes, subtus convexae, pruinosae et praecipue supra tomento rufescente densissime vestitae. LACINIAE 18 lin. longae, 3 lin. latae, infimae interstitiis 2-linearibus (mediae 1-lin.) a sequentibus remotae, e basi dilatata lineares, infimae 2—3 latere interiore diminutae, superiores magis magisque approximatae et decrescentes, supra glabrae, saturate virides, subtus glaucae, tomento, e pilis filiformibus articulatis fusciculis hyalinis composito, dense oblectae. NERVUS PRIMARIUS supra subelevatus canaliculatus, subtus convexus, glaucus. NERVI SECUNDARIJ supra valde elevati, subtus subimpressi. PILI gemmarum ferruginei, cylindrici, articulati; cellula ima crassior, ramosa, terminalis subulata, reliquis duplo longior.

Licet hujus plantae rarissimae specimen unicum solum viderim, tamen non dubito, quin speciem distinctam exhibeat. Proximae species sunt *M.*

cinnamomea Beyr. et *M. nervosa* Kaulf.; a priore differt: laciniis patentissimis, remotioribus, basi inferiore non auriculatis, tomento dilutiore (pallide rufescente); ab altera: pinnis lanceolatis, pinnatis, rhachibus supra profunde sulcatis, laciniis remotis, basi dilatatis.

Habitat in insula St. Catharinae: Gaudichaud.

β. Pinnae pinnatipartitae.

24. *MERTENSIA NERVOSA* KAULF. fronde simplici rigida; pinnis accessoriis linearibus, laciniis inferioribus similimibus; pinnis geminatis, late-ovatis, brevissime cuspidatis, firmis, erectis, subcurvatis, profundissime pinnatipartitis; laciniis coriaceis, longissimis, erecto-patentibus, linearibus, subfalcatis, margine revolutis, apice obtuso excisis, inferioribus distantibus, summis in pinnae apicem 3 lin. longum integrum confluentibus; subtus tomento pallide ferrugineo ubique dense obsessis; nervis secundariis 3—4-furcatis; soris numerosis, sporangiis 5—6 in tomento occultis.

Mertensia nervosa Kaulf. Enum. Fil. 37. Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 111 (excl. patria Peruviae).

Gleichenia nervosa Hook. Spec. Fil. I. 12. tab. V. A.

STIPES 4—6-pollicaris, erectus, diametrum vix 1 lin. attingens, teres, glaber, basi tantum incrassatus, rufo-pilosus, cinnamomeus. GEMMAE abortivae, pilis ferrugineis obsessae. PINNAE GEMINATAE circiter 6 poll. longae, in medio $3\frac{1}{2}$ poll. latae. RHACHES supra planae, canaliculatae, tomento fugacissimo obsessae, subtus convexae, ferrugineo-tomentosae. LACINIAE maximae usque ad 2 poll. longae, 2 lin. latae, versus apicem subito decrescentes et demum in apicem pinnae 3—4 linearem confluentes, supra glabrae, flavo-virescentes, subtus glaucae, dense pallide ferrugineo-tomentosae. NERVUS PRIMARIUS supra non elevatus, canaliculatus, subtus validus, convexus, rubicundus. NERVI SECUNDARIJ supra valde elevati, subtus impressi. PILI gemmarum articulati, e cellulis 9—11 compositi, cellula terminali subulata.

Pinnis late ovatis, abrupte acuminatis, apice perbrevis inter omnes species hujus generis distinctissima. — A *M. Beyrichiana* St., specie proxima, pinnis tomentosissimis statim recognoscitur.

Habitat in prov. S. Catharinae: Chamisso; in prov. S. Pauli: M.; in prov. Mnarum ad vicum Rio das Pedras: Sellow.

25. *MERTENSIA BEYRICHIANA* J. W. STURM fronde simplici, rigida, glaberrima; pinnis accessoriis perangustis, linearibus, integerrimis; pinnis geminatis lato-lanceolatis, longe cuspidatis, erectis, firmis, profundissime pinnatipartitis; laciniis coriaceis, patentissimis, rectiusculis, e basi vix latiore linearibus, margine revolutis, apice acutis, summis in acumen pinnae longum lobatum, in extremitate integrum confluentibus, subtus glaberrimis; nervis secundariis 2—4-furcatis; sori sporangiis 5.

Mertensia nervosa Klf. in Herbario Berolinensi.

RHIZOMA horizontale, repens, flexuosum, lignosum, $1\frac{1}{2}$ lin. crassum, verruculosum, radiculis ramosis raris instructum. STIPES distans, 6—7 poll. longus, 1 lin. crassus, teres, erectus, flexuosus, glaber, cinnamomeus, basi incrassata pilis rubiginosis subulatis articulatis sparse obsessus. GEMMAE abortivae, pilis rufescentibus obsessae. PINNAE ALARES ovatae, integrae, parvae. PINNAE ACCESSORIAE 13 lin. longae, 2 lin. latae, apice stipitis excrecentes, laciniis inferioribus simillimae. PINNAE GEMINATAE 7 poll. longae, in medio circiter 2 poll. latae. RHACHES supra planae, superne conspicue canaliculatae,

subtus convexae, aequae ac nervi primarii subtus cinnamomeae. LACINIAE in medio frondis 12—15 lin. longae, 2 lin. latae, infima latere exteriori longissima (19 lin.), distantes, interstitiis $1\frac{1}{2}$ -linearibus a proximis remotae; inferiores latere interiore decrescentes, prima s. infima et tertia minores, quam secunda et quarta; superiores sensim decrescentes, demum in acumen pinnae longum, lobatum, ad extremum integrum confluentes, supra saturate virides, subtus glaberrimae, glaucescentes. NERVUS PRIMARIUS supra subelevatus, canaliculatus, brunescens, subtus convexus, rubicundus. NERVI SECUNDARI

supra valde elevati, subtus impressi. SPORANGIA in specimine unico propter nimiam maturitatem imaginem claram non praebent. PILI gemmarum subulati, articulati, fusciduli, e cellulis 11—13 compositi, cellula terminalis acicularis.

Mertensiae nervosae Kaulf. affinis; sed glabritate omnium partium, pinnis lanceolatis, versus apicem sensim angustatis et in acumen perlongum productis diversissima.

Habitat prope Rio de Janeiro Brasiliae: Beyrich.

H Y M E N O P H Y L L E A E .

HYMENOPHYLLEAE *Bory in Dict. class. VI. Martius, Icon. Plant. Crypt. Brasil. 102. Endlicher Gen. Plant. 64. Suppl. I. 1351. Meisner Gen. Plant. 435. (335.) Mettenius Fil. hort. bot. Lipsiens. 112.* — HYMENO-
PHYLLACEAE *Presl Hymenophyll. 9. HELICOGYRATAE. SPORANGIIS SESSILIBUS Bernhardt in Schrader neues*
Journ. 1806. I. pars 2. 4. — FILICES GYRATAE Swartz Syn. Fil. 6. — POLYPODIACEARUM pars Rob.
Brown Prodr. Flor. Nov. Holl. 159. — FILICES DESCISCENTES Sprengel Syst. veg. IV. 7 et 128. —
CNEMIPTERIDES Wallroth Fl. crypt. Germ. XIV et 28. — CYATHEACEARUM pars secunda: TRICHOMANOIDEAE
Kunze in Linnaea IX (1831). 102. — THECASPERMAE Link Fil. Spec. Hort. b. Berol. 152. —
DICKSONIARUM sect. J. Smith in Hook. Journ. III. 417. — GLEICHENIACEARUM sect. Lindley Veg. Kingd.
ed. II. 401. — TRICHOMANINEAE Moore Index Fil. XII et CVIII.

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPORANGIOPHORAE, FRONDIBUS VERNATIONE
CIRCINATIS. SPORANGIA ANNULO COMPLETO OBLIQUO VEL TRANSVERSO INSTRUCTA, SESSILIA VEL BREVITER
PEDICELLATA, RIMA LONGITUDINALI DEHISCENTIA, RECEPTACULUM COLUMELLIFORME NERVUM TERMINANTEM OCCU-
PANTIA. SPORAE TETRAEDRAE, STRIIS TRIBUS NOTATAE.

SORI terminales vel alares, raro subintramarginales, nervum plerumque ultra laminam in recepta-
culum columelliforme productum occupantes. SPORANGIA aut breviter pedicellata aut sessilia, obovata vel
turbinata, annulo completo obliquo instructa, rima longitudinali dehiscencia, nuda, rarissime paraphysibus
circumdata, plerumque basin, raro tantum apicem receptaculi occupantia. INDUSIUM inferum, aut coriaceum
suburceolatum ore truncato integro (LOXOMA), aut membranaceum, nunc infundibuliforme, campanulatum vel
cylindraceum, ore truncato vel breviter bilobo (TRICHOMANES), nunc suborbiculare, ovatum vel conicum,
bifidum vel profunde bilobum (HYMENOPHYLLUM). SPORAE tetraëdrae, striis tribus notatae.

RHIZOMA ut plurimum repens, interdum obliquum erectumve, non raro in arborum cortice serpens,
RADICULIS filiformibus fibrillosis instructum. STIPES teres, rarissime triqueter, saepe supra uti rhachis
canaliculatus, FASCICULUM VASORUM unicum centram teretem crassum includens. FRONDES vernatione
circinatae stipitatae, in rhizomate obliquo erectove fasciculatae, in repente sparsae, adscendentes pen-
dulaeve. RHACHIS teres, saepissime alata. LAMINA saepissime pinnatifida, rarius integra, plerumque basi
in stipitem decurrens, membranacea vel coriacea, subpellucida, STOMATIBUS destituta, e CELLULIS hexa-
gono-parenchymatosis, nunc omnino, nunc ad parietes solummodo granulis chlorophyllosis impletis (in-
terdum ad parietes UTRICULO PRIMORDIALI instructis) composita. PARIETES cellularum hyalinae, strictae,
rarius serpentine flexuosae. In nonnullis speciebus (NEUROPHYLLUM Presl) series cellularum nervos
secundarios conjungentium e cellulis minoribus quadratis impellucidis constructae sunt. Quamquam om-
nibus cellulis forma eadem est, tamen cellulae marginales et quae circa nervos positae nonnunquam
longiores et minus coloratae sunt. NERVUS PRIMARIUS saepe utrinque teres, plerumque excurrentis. NERVI
SECUNDARIJ aut pinnatim aut flabellatim divisi, liberi vel rarissime anastomosantes.

HYMENOPHYLLEAE ab omnibus ordinibus POLYPODIACEARUM sporangiis annulo obliquo vel transverso completo instructis, receptaculo ultra laminam producto, porro parenchymate laminae tenero stomatibus destituto diversae.

Filices hujus ordinis regionum tropicarum temperatarumque totius orbis incolae.

ADNOTATIO. Partes omnium HYMENOPHYLLEARUM, quarum structuram cellularum sub microscopio observavi, aqua fervente emollitae sunt.

GENERA BRASILIENSIA.

- I. *Indusia* infundibuliformia vel cylindracea, per totam longitudinem connata, ore truncato vel bilobo TRICHOMANES.
 II. *Indusia* suborbicularia, ovata vel conica, bifida vel profunde biloba HYMENOPHYLLUM.

I. TRICHOMANES LINN.

TRICHOMANES Linn. Gen. Plant. 947. Endl. Gen. Plant. 64. n. 658 et Suppl. I. 1351. Hook. Gen. Fil. tab. 31. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Hymenophyll. 13. tab. 2. f. A, B. t. 3. f. A, B, C. t. 4. f. A. Taschner de duabus novis Trichomanum speciebus 5. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 112. Moore Index Fil. CLX. — ACHOMANES Neck. Elem. III. 313. — DIDYMOGLOSSUM Desv. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 330. Presl l. c. 22. tab. 8. f. A. — FEEA Bory in Dict. class. VI. 446. tab. 68. Presl l. c. 10. Moore l. c. CX. — HYMENOSTACHYS Bory l. c. VIII. 462. Presl l. c. 11. Moore l. c. CXI. — LECANIUM Presl l. c. 11. tab. 1. — CARDIOMANES Presl l. c. 12. — RAGATELUS Presl l. c. 16. — CEPHALOMANES Presl l. c. 17. tab. 5. — NEUROPHYLLUM Presl l. c. 18. tab. 4. f. C. — MICROGONIUM Presl l. c. 19. tab. 6. f. A et B. — ABRODICTYUM Presl l. c. 21. tab. 7. — MERINGIUM Presl l. c. 24. tab. 8. f. B. — HEMIPHLEBIUM Presl l. c. 25. tab. 9. — HOMOEOTES Presl die Gefässbündel im Stipes d. Farrn 23. — ODONTOMANES Presl Epim. bot. 20. — PLEUROMANES et CREPIDOMANES Presl ibid. 258 (in addendis).

SORI marginales, receptaculo inserti, in substantia ipsius laminae immersi vel prominentes. SPORANGIA sessilia, turbinata, annulo transverso lato completo multiradiato praedita, rima longitudinali laterali dehiscentia, paraphysibus carentia. RECEPTACULUM filiforme ultra laminam exsertum, nervo elongato lacinulae fructiferae compositum, inferne sporangiis obsitum, superne nudum, cavernulis spiraliter cinctum. INDUSIUM textura laminae, inferum, infundibuliforme, campanulatum vel cylindricum, per totam longitudinem connatum, ore truncato patente hypocraterimorpho integro, repando seu crenato, vel ore bicorni, vel ore breviter bilobo, lobis subreflexis. SPORAE tetraëdrae, striis tribus notatae, laeves.

RHIZOMA repens, scandens, adscendens erectumve, crassum vel ut plurimum filiforme, teres ramosumque, saepe pilosum, RADICULIS filiformibus fibrillosis instructum. STIPES variae longitudinis, teres aut semiteres, rarissime triquetra, saepe supra aequae ac rhachis canaliculatus, glaber vel pilosus praecipue in ima basi. RHACHIS forma stipitis, nonnunquam ad apicem longe producta, radicans,

Hymenophyll.

saepe alata, ala plana undulatae. FRONDES aut aggregatae aut distantes, rigidae vel flaccidae, nunc glaberrimae nunc pilosae, pilis simplicibus stellatisve. FRONDES FERTILES a STERILIBUS in nonnullis speciebus dissimiles, longius stipitatae et lamina plus minusve contractae. LAMINA FRONDIS STERILIS oblongo-lanceolata, oblonga, ovata, orbicularis palmatae, integra, inciso-dentata usque bitripinnatipartita pinnatisectaue. LACINIAE (v. SEGMENTA) oblongae, lineares vel lineari-capillaceae, planae vel crispatae, sessiles vel adnatae, glabrae vel ciliatae. LACINULAE obtusae, saepe bi-tridentatae. NERVUS PRIMARIUS plerumque excurrentis, rarius in nervos secundarios transiens, subtus prominens, glaber, pilosus vel hirsutus. NERVI SECUNDARIJ aut e nervo primario pinnatim exorientes patuli, alterni, stricti curvatiue, simplices uni-plurifurcative, aut interdum stabellati curvatiue, liberi vel rarissime anastomosantes.

FILICES in regionibus temperatis et tropicis utrinque orbis observatae.

CONSPECTUS SPECIERUM.

Sect. 1. Frondes steriles et fertiles difformes.

§. 1. Lamina fertilis contracta.

A. Rhachis aphylla.

- α. *Indusia* spicata, libera Sp. 1. 2.
 β. *Indusia* spicata, connata Sp. 3.

B. Rhachis non aphylla. Lamina fertilis pinnatipartita. *Indusia* in apice laciniarum immersa. Sp. 4. 5.

§. 2. Lamina fertilis non contracta.

A. Nervi secundarij utriusque frondis lineis transversalibus conjuncti.

- α. Lamina frondis fertilis lineari-lanceolata simplex. Sp. 6.
 β. Lamina frondis fertilis pinnatisecta. Sp. 7—9.

B. Nervi secundarij lineis transversalibus non conjuncti. Sp. 10.

Sect. 2. Frondes steriles et fertiles conformes.

§. 1. *Indusia* in apice vel infra apicem laciniarum omnino immersa, ore aut bicornia aut rarissime truncata aut reflexa.

- A. Lamina sinuato-emarginata. Sp. 11.
 B. Lamina profunde pinnatipartita. Sp. 12—21.
 C. Lamina pinnatipartito-pinnatifida. Sp. 22—24.

§. 2. *Indusia basilaria* vel in toto laminae vel laciniarum latere exserta (rarissime ala utroque latere angusta quasi immersa), ore truncata, hypocraterimorpha, rarissime brevissime biloba.

A. Rhizoma scandens. Frondes perbrevis stipitatae.

α. Lamina inciso-dentata vel pinnatipartita. Sp. 25—28.

β. Lamina bi-tripinnatipartita. Sp. 29—31.

B. Rhizoma robustum, repens vel adscendens, radiculis longis validis. Frons longe stipitata, stipite tereti non alato. Sp. 32—38.

C. Rhizoma tenue filiforme, repens, tomentosum, radiculis setaceis.

α. Stipes anceps. Sp. 39—41.

β. Stipes teres. Sp. 42—44.

§. 3. *Indusia* in apice laciniarum immersa vel exserta, ore manifeste bilobo.

A. Lamina simplex, apice squamulosa. Sp. 45.

B. Lamina non squamulosa.

α. Lamina aut linearis aut obovata aut cordato-orbicularis. Sp. 46—49.

β. Lamina palmata, crispato-lobata. Sp. 50. 51.

γ. Lamina ovata, profunde pinnatipartita. Sp. 52. 53.

Sect. 1. Frondes steriles et fertiles difformes.

§. 1. Lamina frondis fertis contracta.

A. Rhachis frondis fertis aphylla (nuda).

α. *Indusia spicata*, disticha, libera, secunda, pedicellata, infundibuliformia, ore truncata v. bicornia. Nervi secundarii frondis steriles simplices furcative, nunquam anastomosantes (*Feea Bory*). Sp. 1. 2.

1. **TRICHOMANES BOTRYOIDES** KAULF. fronde sterili breviter stipitata; lamina lineari-lanceolata, pinnatisecta; rhachi producta radicante; segmentis ovato-lanceolatis obtusis incisedentatis ad rhachin decurrentibus, inferioribus minoribus subtriangularibus; fronde fertili longius stipitata, lineari; rhachi aphylla; indusiis spicatis subdistichis liberis vix pedicellatis.

Trichomanes botryoides Kaulf. Enum. Fil. 236.

Feea nana Bory in Dict. class. 1. tab. 69. fig. 1 (e Presl). Presl Hymenophyll. 10.

Trichomanes nanum Hook. Sp. Fil. I. 115. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 277.

RHIZOMA adscendens, apice pilosum, deorsum emittens radículas filiformes fuscas fibrillosas puberulas. STIPES teres, gracilis, fuscus, basi parum pilosus, diametrum $\frac{1}{6}$ lin. aequans, in fronde sterili 3—6 lin., in fertili circiter 6 lin. longus. RHACHIS supra plana subcanaliculata, subtus convexa, non alata, ad apicem perlonge producta radicans, sparse pilosa. LAMINA FRONDIS STERILIS $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 4—6 lin. lata, membranacea, statu sicco olivaceo-brunnescentis, e cellulis hexagono-parenchymatosis subserialibus, interdum utriculo primordiali plus minusve contracto brunnescenti repletis, medio plerumque vacuis pellucidis, parietibus flexuosis composita. LACINIAE 2—3 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae sunt (infimas aliquando 1 lin. longas deprehendimus), interstitiis $1\frac{1}{2}$ -linearibus, suboppositae, patulae. NERVUS PRIMARIUS utrinque glaber, subtus convexus, apicem versus flexuosus. NERVUS SECUNDARIUS patuli, non curvati, simplices furcative, liberi. LAMINA FRONDIS FERTILIS linearis, aphylla vel apice lobulis foliaceis instructa, spiciformis, fere usque 2 poll. longa. INDUSIA subdisticha, $\frac{1}{2}$ lin. longa, inferiora pedicello brevi insidentia, infundibuliformia, ore interdum bicornia, dense coriacea, fusca, superiora sessilia. RECEPTACULUM robustum apice clavatum, pars prominens indusio duplo longius.

Habitat in Guiana gallica: Poiteau, Leprieur. — In Brasiliae septentrionalis confinibus inquirendum est.

2. **TRICHOMANES SPICATUM** R. HEDW. fronde sterili satis longe stipitata; lamina oblongo-lanceolata acuminata, profunde pinnatipartita; rhachi (ut videtur) non producta; laciniis e basi latiore lineari-lanceolatis v. linearibus acuminatis obtusisve, apicem versus interdum denticulatis; fronde fertili longissime stipitata, lineari; rhachi aphylla; indusiis spicatis distichis liberis secundis pedicellatisque.

Trichomanes spicatum R. Hedwig in Web. et Mohr Beitr. I. 116. Hook. Sp. Fil. I. 114 (partim). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 277 (partim).

Trichomanes elegans Rudge Icon. Pl. Guian. tab. 37 (frons fertis). Hook. Exot. Flor. tab. 52. Kaulf. Enum. Fil. 262 (excl. syn. phur.).

Feea polypodina Bory in Dict. class. d'hist. nat. VI. 447. tab. 68. Presl Hymenophyll. 10.

Feea spicata Presl Die Gefäßbündel im Stipes d. Farnn 22. tab. V. fig. 1 (sect. transv. stipitis).

Trichomanes osmundoides De Cand. in Poirer Encycl. bot. VIII. 65 (fide specim. origin. ab auctore ipso in Herb. Willd. n. 20192).

Hymenostachys osmundoides Presl Hymenophyll. 11.

Trichomanes spicisorum Desv. in Berl. Magaz. V. 329. tab. 7. fig. 7.

RHIZOMA adscendens, lignosum, apice pilis setiformibus nigricantibus obsessum, deorsum radiculis longis satis tenuibus nigrofuscis parum fibrillosis glabrisque instructum. STIPES utriusque frondis teres, fuscus, glaber, basi tantum pilosus, $\frac{1}{3}$ lin. crassus, sterili 9—15, fertili 3—4 poll. longus. RHACHIS supra plana subcanaliculata glabra, subtus semiteres pilosa viscida, longitudinaliter alata. LAMINA FRONDIS STERILIS 3—4 poll. longa, in medio 12—15 lin. lata, membranacea, in planta exsiccata nigricante viridis, haud raro *Muscis* et *Jungermannii* obducta, e cellulis hexagono-parenchymatosis subserialibus, aut omnino impletis viridibus impellucidis, aut medio vacuis, ad parietes flexuosos hyalinos utriculo primordiali brunnescente irregulariter rupto instructis composita. LACINIAE mediae 9—10 lin. longae (infimae circiter 3 lin. longae, basi inferiore auriculata productae), 2 lin. latae, interstitiis 2-linearibus, suboppositae, remotae, patulae, subfalcatae, sinibus acutangulis. NERVUS PRIMARIUS validus fuscus, utrinque glaber. NERVUS SECUNDARIUS patuli curvati, bi-trifurcati, elevati, non anastomosantes. LAMINA FRONDIS FERTILIS linearis, spicaeformis $2\frac{1}{2}$ —4 poll. longa. INDUSIA disticha, 1 lin. longa, pedicello 1-lineari insidentia, infundibuliformia, ore truncata, latere marginata, subcoriacea, olivacea, primum membrana pellucida connexa, tandem omnino libera, secunda curvataque. RECEPTACULUM exsertum, robustum, clavatum.

Habitat in locis saxosis sylvaticis humidis umbrosis Guianae (Hb. Martii); in insulis Antillarum, St. Vincent, Trinidad, Guadeloupe, Jamaica. — Probabiliter in Brasilia septentrionali quoque crescit.

β. *Indusia spicata*, disticha, connata, cylindracea, ore truncata integra. Nervi secundarii frondis sterili anastomosantes (*Hymenostachys Bory*).

Sp. 3.

3. **TRICHOMANES ELEGANS** RUDGE fronde sterili breviter stipitata; lamina oblongo-lanceolata acuminata, profunde pinnatipartita; rhachi interdum longe producta, prolifera; laciniis lineari-oblongis acutiusculis, margine repando-crenulatis; fronde fertili longissime stipitata, incurvata, contracta, anguste lineari acutiuscula, simplici, spicata, per totam suam longitudinem sorophora; indusiis omnino immersis, distiche connatis.

Trichomanes elegans Rudge Icon. Pl. Guian. 24. tab. 35 (excl. fronde fertili, quae ad *T. spicatum* pertinet). Willd. Sp. Pl. V. 503. Hook. Gen. Fil. tab. 108 (non Exot. Fil.). Hook. Sp. Fil. I. 114.

Hymenostachys diversifrons Bory in *Dict. Class. d'hist. nat.* VIII. 462. cum fig.

Hymenostachys elegans Presl *Hymenophyll.* 11. *EjUSD. Die Gefässbündel im Stipes der Farnn* 23. tab. 5. fig. 2 (sect. stipit.). Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844). 559.

RHIZOMA adscendens, lignosum, pilis setiformibus articulatis nigris impellucidis, profert radículas numerosas filiformes longissimas flexuosas. STRIPITES (frondium sterilium 1—1½ poll., fertiliū 2½—6 poll. longi) teretes, fuscí, basin versus hinc illinc pilis adpersi. LAMINA FRONDIS STERILIS 2½—5 poll. longa, 15 lin. lata, rigida, glaberrima, e cellulis subhexagono-parenchymatosis non serialibus, pallide virescentibus, valde pellucidis, ad parietes serpentino-flexuosos pallentes solummodo granulato-chlorophyllosis composita. COLOR plantae exsiccatae olivaceus. RHACHIS utrinque planiuscula, subtus pilosa, aliquando ad apicem longe producta radicans. LACINIAE mediae usque ad 10 lin. longae, 2 lin. latae, sinu rotundo disjunctae. NERVUS PRIMARIUS supra planiusculus, subtus subelevatus pilosusque. NERVI SECUNDARIJ utrinque elevati, dichotomi, anastomosantes. LAMINA FRONDIS FERTILIS spicaeformis, circiter 6 poll. longa, 3 lin. lata, basi inaequalis in stipitem decurrens. NERVUS PRIMARIUS utrinque parum elevatus, glaber; SECUNDARIJ plerumque simplices, rarius furcati. INDUSIA 1 lin. longa, cylindrica, ore truncato integra. RECEPTACULUM apice clavatum, longe exsertum, pars enim prominens indusio nonnunquam quadruplo longius.

Habitat prope Pamuré ad Rio Uaupés et prope San Gabriel da Cachoeira, ad Rio Negro Brasiliae borealis: R. Spruce n. 2182 et 2944. — In Guianae anglicae monte Camuku dicto: Rich. Schomburgk n. 1139 et n. 1657; in Guiana gallica: Leprieur; ad Gorgona, ad litus Panamae, et alibi in litore Americae centralis: Barclay, Cumíng n. 1127.

B. Rhachis non aphylla.

Lamina frondis fertillis pinnatipartita. Indusia in apice laciniarum immersa, cylindracea v. campanulata ore subbicornia. Nervi secundarij frondis sterillis furcati, liberi (*Homoetes* Presl). Sp. 4. 5.

4. TRICHOMANES HETEROPHYLLUM HUMB. BONPL.

lamina utriusque frondis profundissime pinnatipartitis; sterili satis longe stipitata, ovato-oblonga obtusa; laciniis ovato-oblongis obtusis; fertili longissime stipitata, contracta, lineari-oblonga obtusa; laciniis subimbricatis, e basi cuneata rotundatis, basi excepta sorophoris; indusiis campanulatis, subimmersis; rhachi stipiteque utriusque frondis tetragono.

Trichomanes heterophyllum Humb. Bonpl. in Willd. Sp. Pl. V. 503. Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. Pl. I. 25. Kunth Syn. I. 89. Presl *Hymenophyll.* 15. Hook. Sp. Fil. I. 133. Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844). 530. Kunze *Farnkräuter* II. 21. tab. 109.

Homocotes heterophylla Presl *Die Gefässbündel im Stipes der Farnn* 24 (in nota).

RHIZOMA repens, pilis densissime obsitum, proferens radículas numerosas longas flexuosasque. PILI rhizomatis quinquearticulati, cum cellula basili tumido brunnea impellucida; sequentes autem dilute brunnescentes pellucidae sunt; terminalis acicularis. STRIPES (frondium sterilium 1—1½ poll., fertiliū 5—7 poll. longus) tetragonus, fuscus, ferrugineo-pilosus. RHACHIS supra plana, subtus convexa, utrinque, subtus densius, pilosa. LAMINA FRONDIS STERILIS 2½—4 poll. longa, 1 poll. lata, rigida, profundissime pinnatipartita, inferne plerumque pinnatisecta, brunnescenti-viridis, e cellulis hexagono-parenchymatosis amplis, valde pellucidis fusciculis, parietibus pallentibus serpentino-flexuosis composita. LACINIAE fere 6 lin. longae, 3 lin. latae, ovato-oblongae obtusae, subauriculatae, sinuatae, undulatae, denticulatae, inferiores remotae, superiores sursum imbricatae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, infra apicem evanescentis. NERVI SECUNDARIJ flexuosi, bifurcati, liberi, cum primario subtus sparse pilosi. LAMINA FRONDIS FERTILIS 3—4 poll. longa, 4—6 lin. lata. LACINULAE abbreviatae, e basi cuneata rotundatae sublabelatae, sursum imbricatae. NERVUS PRIMARIUS rectus, brevis; SECUNDARIJ fere semper simplices. INDUSIA 1 lin.

longa, in quaque lacinula 3—7, campanulata, subimmersa. RECEPTACULUM apice cylindricum, obtusum, indusio duplo longius.

Habitat prope urbem Santarem, prov. Paruensis: R. Spruce n. 576; — in sylvis prope Jacita, ad Rio Negro, Venezuelae: Humboldt (Herb. Willd. n. 20210); in Guiana anglica ad ripas fluv. Essequibo: Rich. Schomburgk n. 269.

5. TRICHOMANES SPRUCEANUM HOOK. lamina utriusque frondis profunde pinnatipartito-pinnatifida; sterili breviter stipitata, late ovata obtusa; laciniis primariis oblongo-ovatis obtusis imbricatis, secundariis bi-trifidis; fertili longissime stipitata, magis minusve contracta, lineari-oblonga obtusa; laciniis primariis oblongis obtusis imbricatis, secundariis inferioribus bifidis, superioribus integris fertilibus; indusiis cylindraceis omnino immersis; stipite utriusque frondis alato; rhachi subtus longe hirsuta.

Trichomanes Spruceanum Hook. *Icon. Pl. X. tab. 981.*

RHIZOMA longum, repens, pilis atrofuscis dense obsitum, radiculis longis rigidis flexuosis fibrosis atrofuscis pilosis praeditum. STRIPES utriusque frondis teres, fuscus, pilosus, a basi alatus in rhachem transiens, circiter 6 lin. longus, in fronde sterili longius, interdum 5-pollicaris. RHACHIS late alata, margine sparse cillata. LAMINA FRONDIS STERILIS circiter 15 lin. longa, 12 lin. lata, rigide; ea frondis fertillis longior, saepe 2½ poll. longa et magis minusve contracta, utraque statu sicco olivaceo-brunnescentis, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosis, valde pellucidis, granulis brunnescentibus ad parietes solum serialim dispositis impletis, parietibus pallide virescentibus serpentino-flexuosis composita. LACINIAE PRIMARIAE 6—7 lin. longae, circiter 3 lin. latae (SECUNDARIAE 2 lin. longae), patulae, oppositae v. alternae, sinibus rotundis. NERVUS PRIMARIUS subflexuosus. NERVI SECUNDARIJ uni-bifurcati, liberi, brunnescentes. INDUSIA ¾ lin. longa, immersa, ore subbilobo, utrinque alata. RECEPTACULUM longe exsertum, curvatum, indusio triplo longius.

Habitat prope San Gabriel de Cachoeira, secundum Rio Negro Brasiliae borealis: R. Spruce n. 2334.*

§. 2. Lamina fertillis non contracta.

A. Nervi secundarij utriusque frondis uni-bifurcati simplices, rarissime anastomosantes, lineis transversalibus conjuncti. Indusia exserta, marginalia, cylindracea, ore breviter bilobo (*Neurophyllum* Presl).

a. Lamina frondis fertillis lineari-lanceolata simplex. Sp. 6.

6. TRICHOMANES VITTARIA DE CAND. frondibus aggregatis, rigidis, stipitatis; lamina frondis sterillis ovato-oblonga, pinnatisecta deflexaque; segmentis lineari-oblongis obtusis, basi inaequali superiore cuneatis inferiore adnatis, margine spinuloso-denticulatis, summis confluentibus; lamina frondis fertillis magna lineari-lanceolata simplici, basin versus angustata, apice acuminata, a medio ad apicem sorophora.

Trichomanes Vittaria De Cand. *Herb. Poirét in Enc. Méth. Bot. VIII. 65.* Hook. in *London Journ. of Botany* I. 137. tab. 5 (frondes fertiles solummodo exhibens). J. Smith *ibid.* 200. Kunze in *Linnaea XXI* (1848). 238.

Trichomanes floribundum var. β . *Vittaria Splitgerber* *Enum. Fil. Surinam.* 52. Hook. Sp. Fil. I. 129.

Trichomanes pennatum Kaulf. Var. ? β . *Vittaria* Kunze in *bot. Zeit.* V (1847). 351.

Neurophyllum Vittaria Presl *Hymenophyll.* 19.

RHIZOMA erectum, lignosum, pilis nodoso-articulatis badis subimpellucidis dense obsitum, deorsum emittens radículas longas flexuosas fibrillosas puberulas. STRIPITES utriusque frondis adscendentes, semiteretes, supra ca-

malculati, diametro $\frac{1}{2}$ lin. aequantes, 2—3 poll. longi, fuscii, opaci, pills brunnei obsessi. LAMINA FRONDIS STERILIS usque ad $4\frac{1}{2}$ poll. longa, $2\frac{1}{2}$ poll. lata, statu sicco olivaceo-nigricans, e cellulis amplis hexagonoidis pellucidis, statu emollito ad parietes tenues hyalinos chlorophyllos viridibus composita. RHACHIS supra sulcata, subtus semiteres, fusca, sparse pilosa. SEGMENTA in utroque latere circiter 15, approximata, inferiora opposita, superiora alterna, infima minima reflexa, summa patula; maxima 12—15 lin. longa, 4 lin. lata. NERVUS PRIMARIUS supra canaliculatus, subtus prominens scabriusculus, fuscus. NERVI SECUNDARIJ crebri, uni- vel rarissime bifurcati, liberi, in fronde fertili interdum anastomosantes, in dentes spinulosos excurrentes, lineis angustis transversalibus (e cellulis elongatis firmis formati) conjuncti. LAMINA FRONDIS FERTILIS 6—18 poll. longa, 1 poll. lata, basi angustata inaequalis, apice acuminata vel obtusa, margine undulato spinuloso-denticulata, dentibus inaequalibus nudis vel sorophoris. INDUSIA 1 lin. longa, disticha, exserta, cylindracea, ore breviter biloba, lobis rotundis. RECEPTACULUM flexuosum, filiforme, basi sporangiferum, exsertum, interdum indusio triplo longius.

Habitat in Guiana gallica (Herb. De Cand.); — in Guiana batava; in sylvis umbrosis ad Topibo districtus Para: Wulfschlaegel, Splitzerber, Hostmann n. 206, Kappler n. 1748; in sylvis ad Sornau-Kreek, Joden-Savana et prope plantationem vier Hendricke et in sylvis prope Nest ad Paramacca fluv.: Kegei n. 1071; prope Paramaribo: A. Ehrhard.

β. Lamina frondis fertili pinnatisecta. Sp. 7—9.

7. TRICHOMANES PINNATUM HEDW. lamina utriusque frondis pinnatisecta: sterili ovato-oblonga curvata, segmentis oblongo-linearibus obtusis, infimis brevissime petiolatis, basi manifeste cordatis: fertili oblongo-lanceolata, descrescenti-pinnatisecta, segmentis utrinque 6—10, alternis, oblongo-linearibus, superioribus basi inferiore productis longe decurrentibus, dense sorophoris et alam latissimam efficientibus; segmento ultimo recto.

Trichomanes pinnatum Hedwig Gen. et Spec. Fil. tab. 4. fig. 1. Swartz Syn. Fil. 142. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 352. Ejusd. in Linnaea XXI (1848). 238.

Trichomanes rhizophyllum Cavan. Praelect. 1801. n. 696. (forma rhachi nuda, radicante).

Trichomanes floribundum Humb. Bonpl. Willd. Sp. Pl. V. 505. Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. Am. I. 25. Kunth Syn. 89. Hook. Sp. Fil. I. 129 (excl. excludend. et var. β. Vittaria).

Neurophyllum pinnatum Presl Hymenophyll. 19. tab. 4. C.

RHIZOMA erectum, inferne subflexuosum, dense atrofusco-pilosum, deorsum agens radículas longas rigidas flexuosas parce fibrosas. STRIPES semiteres, supra canaliculatus, diametro $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin., fuscus, basi robustior, pilosus, 2—4 poll. longus, curvatus; ille frondis fertili erectus, usque ad 7 poll. longus, superne angustissime alatus. RHACHIS utriusque frondis alata, supra canaliculata, subtus convexa, pilosa, in fronde sterili saepe longissima nuda, radicans, apice prolifera. LAMINA FRONDIS STERILIS 4—5 poll. longa, 20—22 lin. lata (fertili 4—7 poll. longa, in medio $2\frac{1}{2}$ poll. lata), rigida, statu sicco brunnescenti-viridis, parum nitida, e cellulis hexagono-parenchymatosis, ubique granulis chlorophyllos pallide viridibus densissime impletis, pellucidis, parietibus pallentibus strictis composita. Series transversales cellularum nervos secundarios conjungentium item pallidae, valde pellucidae. SEGMENTA in quovis latere circiter 15, 9—15 lin. longa, 6 lin. lata, interstitiis 3-linearibus, e basi lata oblongo-linearibus obtusa, subimbricata; infima brevissime petiolata, cordata, non raro diminuta; reliqua basi superiore cuneata inferiore adnata, decurrentia, margine (sicut segmenta frondis fertili) inaequaliter spinuloso-denticulata. NERVUS PRIMARIUS utriusque frondis ante apicem evanescens, subtus convexus, hirtulus. NERVI SECUNDARIJ patuli, crebri, e basi vel e medio unifurcati, simplicibus intermixti, in dentes excurrentes. SEGMENTA FRONDIS STERILIS in quovis latere 6—10, $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 5—6 lin. lata (superiora sensim decrescentia, summa vix 1 poll. longa), patula, plerumque valde alterna (jugum infimum rarissime suboppositum), ima brevissime petiolata cordataque, interstitiis in eodem

latere interdum 8-linearibus remota, superiora basi inferiore cuneata longe decurrentia confluentia et alam eadem latitudine segmentorum efficientia; segmentum terminale rectum. INDUSIA exserta, cylindrica, basi attenuata, $\frac{1}{2}$ lin. longa, ore marginata sublobata. RECEPTACULUM teres, curvatum, apice subclavatum, interdum indusio quintuplo longius.

Saepe cum *T. pennato* Kaulf. confusum, a quo tamen segmentis frondis fertili magis numerosis (6—10), alternis, superioribus decrescentibus longe decurrentibus, basi decurrente in angulum peracutum terminalibus facile distingui potest.

Habitat in sylvis opacis usque ad radices arborum circa villam de Carretão, olim Ald. de Pedro Terceiro, prov. Goyazensis: Pohl n. 1622; in prov. Bahiensi: Blanchet n. 141; in prov. Piauiensi et Cearaensi: Gardner n. 1909; prope Coari et Ega, prov. do Alto Amazonas: M.; — in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 255; in Surinamo: Hostmann n. 1751; in Venezuela, ad ripam fluminis Rio Negro prope S. Carlos: Humboldt et Bonpland (Herb. Willd. n. 20195 et 20193); in Panama: Haenke; in Chile: Cuming n. 1098; in insula Dominica: Klauze; ins. Guadeloupe: Bory de St. Vincent; ins. St. Domingo: Sieber Syn. Fil. n. 145.

8. TRICHOMANES PENNATUM KAULF. lamina utriusque frondis pinnatisecta: sterili oblonga, apice parum angustata, curvata, segmentis oblongo-linearibus acutiusculis, infimis sessilibus, basi inaequalibus superiore late cordatis inferiore cuneatis: fertili rhomboidali latissima, segmentis utrinque 4—5, subopposita, e basi non angustata lineari-lanceolatis acuminatis, infimis breviter petiolatis, basi cordatis, sequentibus basi inferiore producta decurrentibus, ubique sorophoris, ultimis furcato-connatis.

Trichomanes pennatum Kaulf. Enum. Fil. 264. Hook. Sp. Fil. I. 129. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 351. n. 44 (cum syn., sed excl.: *Neurophyllum pinnatum* Klotzsch et var. ? *Vittaria*). Ejusd. in Linnaea XXI (1848). 238.

Trichomanes spectabile Klotzsch Fil. Luschnathianae Bahiens. n. 33. Kunze in Linnaea XIV (1840). 287.

Trichomanes floribundum Hook. et Grev. Icon. Fil. I. tab. 9 (non Humb. Bonpl. Willd. Hook.). Hook. Spec. Fil. I. 129 (partim).

Trichomanes pinnatum Kunze in Linnaea IX (1834). 106 (teste auctore ipso). Martius Herb. Fl. Brasil. n. 432.

Neurophyllum pennatum Presl Hymenophyll. 19.

RHIZOMA erectum, breve, dense atrofusco-pilosum, emittens radículas rigidas fuscas flexuosas multifibrasque. STRIPES semiteres, supra canaliculatus, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, inferne crassior, flexuosus, subrufus pilosus, superne fuscus et glabrescens, 3—4 poll. longus. (In fronde fertili stipes usque ad 9 poll. longus est, apice anguste alatus.) RHACHIS utriusque frondis alata, supra canaliculata, subtus convexa, saepe pilosa; ea frondis sterili non raro longissima nuda, fusca, pilosiuscula, apice saepe prolifera. LAMINA FRONDIS STERILIS $2\frac{1}{2}$ —4 poll. longa (frondis fertili 3—10 poll. longa, 4—12 lata), statu sicco saturate viridis, nitida, e cellulis hexagono-parenchymatosis, ubique granulis chlorophyllos laete viridibus densissime repletis, parum pellucidis, parietibus strictis pallentibus composita. Series transversales cellularum saturatus virides, e cellulis minoribus quadratis impellucidis constructae. SEGMENTA in quovis latere usque ad 13, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longa, 5—6 lin. lata, interstitiis 3-linearibus remota, subopposita, e basi lata oblongo-linearibus, acutiuscula, vix imbricata; infima patentissima, sessilia, maxima, basi superiore late cordata inferiore cuneata; media etiam patentissima, uti superiora patula, basi inferiore magis minusve decurrentia, superiore semper cuneata; omnia margine (sicut segmenta frondis fertili) inaequaliter spinuloso-denticulata. NERVUS PRIMARIUS utriusque frondis infra apicem evanescens, supra planus, subtus convexus, hirtulus. NERVI SECUNDARIJ patuli, creberrimi, e basi vel e medio unifurcati, aut simplices, rarissime anastomosantes, in dentes inaequales excurrentes lineisque transversalibus conjuncti. SEGMENTA FRONDIS FERTILIS in quovis latere 4—5,

2½–6 poll. longa, 6–7 lin. lata, interstitiis in eodem latere circiter 8-linearibus remota, infima subopposita, patentissima, breviter petiolata, basi subaequali cordata; sequentia patula sessilia, basi superiore cordata inferiore anguste adnata; superiora basi inferiore latissima decurrentia; summa plerumque furcato-connata, basi inferiore decurrentia confluentiaque, alam sorophoram efficientia. INDUSIA ¾ lin. longa, exserta, cylindrica, basi attenuata, subpedicellata, ore brevissime biloba. RECEPTACULUM teres, curvatum, indusio duplo-triplo longius.

Habitat in locis umbrosis ad Bahia: Luschnath n. 33; Martius Herb. Fl. Brasil. n. 432; in vicinia Para: R. Spruce n. 411. — In Guiana gallica: Chamisso; in Guiana batava: Wulfschlägel n. 1719, Kegel n. 1778, A. Ehrhard; in Peruvia: (e Kunze).

9. TRICHOMANES SCHOMBURGKIANUM J. W. STURM lamina utriusque frondis pinnatisecta: sterili deltoideo-elongata curvata; segmentis oblongo-linearibus acutis, infimis sessilibus subcordatis basi superiore subauriculatis: fertili rhomboidali latissima; segmentis in quovis latere 3–4, e basi angustata lineari-lanceolatis acuminatis, infimis sessilibus basi utrinque cuneatis, sequentibus decurrentibus, ultimis furcato-connatis in basibus decurrentibus nunquam sorophoris.

Trichomanes (Neurophyllum) pennatum Kaulf. Kappler Pfl. Surin. ed. Hohenacker n. 1751.

Neurophyllum pinnatum Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 532 (collato specimine originali).

RHIZOMA erectum, dense nigrofulco-pilosum, radiculis validis subflexuosis parce fibrosis. STIPES semiteres supra canaliculatus, diametro ½–⅔ lin., fuscus, basi vix robustior pilosusque; is frondis sterilis vix curvatus 3–7 poll. longus, superne pilosus; ille frondis fertilis 3½–8½-pollicaris, superne manifeste alatus. RHACHIS utrinque convexa, angustissime alata, supra non canaliculata, subtus pilosa, saepe longissima nuda, radicans, apice prolifera; in fronde fertili supra canaliculata latius alata, glabra. LAMINA FRONDIS STERILIS 5–6 poll. longa, 2–3 poll. lata (ea frondis fertilis 5–7 poll. longa, 7–10 poll. lata), statu sicco saturate viridis, nitida, e cellulis hexagono-parenchymatosis, ad parietes strictos pallentes granulis chlorophyllosis saturate viridibus repletis, in medio non raro inanis composita. Series transversales cellularum nervos secundarios conjungentium e cellulis majoribus, quam in *T. pennato Kaulf.* compositae. SEGMENTA in quovis latere usque ad 20, 18–21 lin. longa, 5 lin. lata, interstitiis circiter 5-linearibus, e basi lata oblongo-linearibus acuta, imbricata, infima sessilia, patentissima, subopposita, submaxima, subcordata, basi superiore subauriculata; media diffusa, basi superiore cuneata inferiore adnata, margine (uti segmenta frondis fertili) inaequaliter spinuloso-denticulata; superiora patula, alterna, decrescentia, basi inferiore decurrentia. NERVUS PRIMARIUS utrinque convexus, infra apicem evanescent, glaber. (Is segmentorum fertilius excurrentis, supra planus, basin versus sulcatus, subtus robustior, convexus, planiusculus.) NERVI SECUNDARIJ patuli, crebri, e basi vel e medio uni-bifurcati, simplicibus intermixti, rarissime anastomosantes, lineis transversalibus conjuncti, in dentes inaequales incurvatos excurrentes. SEGMENTA FRONDIS FERTILIS in quovis latere plerumque 4, rarius 3 vel 5, 3–5 poll. longa, 9 lin. lata, interstitiis in eodem latere 6-, raro 7-linearibus remota; infima subopposita, patentissima, sessilia; media patula; superiora parum minora, basi inferiore decurrentia, duo ultima in furcam connata, apice di-

vergentia. INDUSIA exserta, cylindrica, basi attenuata, ½ lin. longa, ore brevissime biloba. RECEPTACULUM teres, vix curvatum, apice subclavatum, indusio duplo longius.

Species haec antea indescrita differt a *T. pennato* segmentis frondis fertili basi utrinque cuneatis, infimis sessilibus vel brevissime petiolatis, sequentibus basi inferiore perangusta adnata decurrentibus. — In *T. pennato* segmenta frondis fertili basin versus nunquam angustata sunt, sed basis superior semper cordata, inferior late adnata et decurrens; segmenta infima breviter petiolata, utrinque manifeste cordata. — Cum *T. pinnato Hedw.* species nostra ob laminam frondis fertili rhomboidalem latissimam utrinque solummodo 3–4 segmenta gerentem non confundi potest.

Habitat in Guiana batava, in sylvis humidis prope Osemo: Kappler n. 1751; in Guiana anglica, ad ripas fluminis Essequibo et prope montes Canuku: Rich. Schomburgk (n. 299, 1155, n. 255 (eo parte). — Species pulchra probabiliter in confinis etiam Brasiliae prov. reperitur.

B. Nervi secundarii uni-bifurcati liberi, lineis transversalibus non conjuncti
Indusia exserta marginalia infundibuliformia, ore truncato subcontracta
(*Odontomanes Pr.*) Sp. 10.

10. TRICHOMANES HOSTMANNIANUM KUNZE lamina utriusque frondis ovato-oblonga pinnatisecta, rhachi saepius longe producta nuda interdum radicante: fronde sterili brevius stipitata curvata subdecumbente, segmentis oblongis subcurvatis obtusis basi angustatis: fertili longius stipitata, segmentis lanceolatis acutiusculis saepe inciso-laceris, infimis petiolatis auriculatis, superioribus basi inaequali decurrentibus.

Trichomanes Hostmannianum Kunze in bot. Zeit. V (1847). 352. Kunze Farnkräuter II. 24. tab. 110. Ejusd. in Linnaea XXI (1848). 239.

Trichomanes coarctatum Kunze in Herb. Martii et in litt.

Trichomanes floribundum Hook. Sp. Fil. I. 129 (quoad plantam Hostmann. n. 75).

Neurophyllum abruptum Fée Prem. Mem. 14. tab. 1. fig. 5?

Neurophyllum Hostmannianum Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 532.

Odontomanes Hostmannianum Presl Epim. bot. 21.

RHIZOMA erectum lignosum, pilis nodoso-articulatis (sub microscopio baedii impellucidis) dense obsitum, deorsum emittens radicales perlongas flexuosas pilosaque. STIPES semiteres supra canaliculatus, ½ lin. crassus, fuscus, opacus, basi pilis setiformibus brunneis plus minusve dense obsesus, ½–1 poll. longus, curvatus. (Stipes frondis fertili erectus, usque ad 6-pollicaris, superne anguste alatus.) RHACHIS utrinque frondis semiteres, manifeste alata, saepe supra laminam usque ad 5–12 poll. producta, setis adpersa, sparsim radicans apiceque interdum prolifera. LAMINA FRONDIS STERILIS 1–2½ poll. (fertili 5 poll.) longa, 2 poll. lata, rigida, statu sicco saturate viridis, saepe olivaceo-nigricans, glabra, e cellulis hexagono-parenchymatosis subpellucidis, granulis chlorophyllosis viridibus ubique dense impletis, parietibus strictis pallentibus composita. SEGMENTA in quovis latere usque ad 10, saepius 5–7, alterna, remota, patula, 1–1½ poll. longa, 4 lin. lata, oblonga subcurvata basi angustata, apice obtusa obtuse denticulata (in fronde fertili lanceolata acutiuscula acuminata acute serrata). NERVUS PRIMARIUS infra apicem evanescent, supra planus, subtus convexus, setulosus. NERVI SECUNDARIJ crebri e basi vel e medio furcati, rarius simplices; lineae transversales deficientes. INDUSIA serraturis marginis insidentia, ½ lin. longa, infundibuliformia, ore truncato subexcavata subcontracta. RECEPTACULUM teres, basi parum incrassatum, apice subclavatum, interdum pars prominens involuero quadruplo longius.

Habitat in prov. Para et do Alto Amazonas arboribus passim, e. g. in ditone Rio Japurá Amazonas: M.; — in Guiana gallica: Leprieur; in Surinam: Hostmann n. 75, Kegel n. 1059, Wulfschlägel.

Sect. 2. Frondes steriles et fertiles conformes.

§. 1. Indusia in apice vel infra apicem laciniarum omnino immersa, ore aut bicornia aut rarissime truncata aut reflexa.

A. Lamina sinuato-emarginata. Nervi secundarii uni-plurifurcati, striis e margine oriundis liberis, varia altitudine desinentibus interpositi. Indusia ore patente subreflexa (*Microgonium Pr.*). Sp. 11.

11. TRICHOMANES HOOKERI PRESL frondibus distantibus, stipitatis; lamina spathulato-oblonga basin versus angustata cuneata, margine statu juvenili integerrima statu senili sinuato-emarginata plana sublobata, lobis obtusis margine calvis; nervo primario valde flexuoso, secundariis furcatis plurifurcatisve, striis e margine oriundis et evanescentibus interpositis; indusiis infundibuliformibus, ore patente subreflexis; rhizomate repente.

Trichomanes Hookeri Presl *Hymenophyll.* 16. *Hook. Sp. Fil.* I. 145. *Kunze in bot. Zeit. V (1847).* 300 (partim). *Kunze in Linnaea XXI (1848).* 236. *C. Müller in bot. Zeit. XII (1854).* 737.

Trichomanes muscoides Hook. et Grev. *Icon. Fil. tab. 179 (excl. omnib. syn.). Hook. Sp. Fil. I. 118 (excl. syn. Swartz. et Willd. et planta Javanica).*

Microgonium Hookeri Presl *Gefässbündel* 27 (in nota).

RHIZOMA repens filiforme, ramosum, densissime fusco-tomentosum. FRONDES distantes, adsurgentes. STIPES teres, fusco pilosus, plerumque 2 lin. longus in laminam transiens. LAMINA 1—1½ poll. longa, 2—3 lin. lata, glabra, tenuiter membranacea, statu sicco sordide virescens, e cellulis hexagono-parenchymatosis amplis, ad parietes utriculo-primordiali contracta virescente instructis, medio vacuis pellucidis, parietibus strictis hyalinis composita. Ad marginem unica vel duae series cellularum quadratarum conspicitur, et post eas series unica cellularum prosenchymatosarum elongatarum densius coloratarum observatur, ex qua series similes evanescentes ad nervum primarium excurrunt. NERVUS PRIMARIUS supra non prominens, basin versus canaliculatus, subtus convexus, valde flexuosus, subexcurrentes. NERVUS SECUNDARIUS patuli, curvati, repetite furcati, brunnescentes, strias versus nervum primarium e margine orientes emittentes. INDUSIA in apice laminarum omnino immersa, 1 lin. longa, membranacea, virescentia, infundibuliformia, ore patente subreflexis, nec bilobis nec limbatis. RECEPTACULUM exsertum tenue.

Habitat in Guiana gallica: Leprieur (e Presl); in Guiana batava, in sylvis prope Oude-Ryweg: Kegel n. 655 (fide Kunze); in insulis S. Dominica et S. Vincent: Bertero, Guilding. In Brasilia aequinoctiali detegenda.

B. Lamina profunde pinnatipartita. Nervi secundarii crebri, patuli uni-plurifurcati, liberi. Indusia infundibuliformia, ore subbicornia (*Trichomanes* §. 1. *Achomanes Presl*). Sp. 12—21.

12. TRICHOMANES CRISPUM LINN. lamina oblongo-lanceolata acuminata profunde pinnatipartita; laciniis oblongis obtusis, basi superiore producta adnatis inferiore soluta rotundatis v. cordatis, margine repandis crispatis ciliatisque, utrinque sparse pilosis; inferioribus non remotioribus, saepe minoribus mediisque patentissimis, valde approximatis subimbricatis, superioribus confluentibus; nervis secundariis gracilibus valde remotis, plerumque unifurcatis; indusiis infundibuliformibus, ore patente repandis; stipite longo semitereti rhachique superne late alata sparse ferrugineo-hirsutis; rhizomate adscendente.

Trichomanes crispum Linn. *Spec. Pl.* 1560. *Hedwig Fil. Gen. et Sp. tab. 4. fig. 2. Swartz Syn. Fil.* 142. *Willd. Sp. Pl. V. 504. Presl Hymenophyll. 15. Hook. Spec. Fil. I. 130 (excl. syn. plur.). Kunze in bot. Zeit. V (1847).* 371. *Presl Epim. bot. 14.*

Polypodium crispum calyciferum Plum. *Fil. 67. tab. 86.*

Trichomanes fastigiatum Sieb. *Synops. Fil. n. 144. Presl Hymenophyll. 15. Presl Epim. bot. 14.*

RHIZOMA adscendens, pilis setiformibus atro-purpureis dense obsitum, radiculis nigris pilosis praeditum. FRONDES aggregatae. STIPES 1—3½ poll. longus, diametrum 1/3—2/3 lin. attingens, supra canaliculatus, fuscus, apice angustissime alatus s. marginatus, hirsutus, mox glabrescens. RHACHIS supra late canaliculata, subtus convexuscula, superne late alata, sinibus rotundis. LAMINA 2—6 poll. longa, 1½—2 poll. lata, rigidiuscula, dimidio superiori fertili, membranacea, statu sicco rufescenti-viridis, e cellulis irregularibus hexagonis rectangulis rotundatisve pallide virescentibus pellucidis, ad parietes valde crassos subflexuosos pallentes densissime granulato-chlorophyllosis fusciscomposita. LACINIAE mediae 8—12 lin. longae, 3—4 lin. latae, infimae vix 3 lineares, inferiores interstitiis aequidistantibus 3-linearibus remotae, oppositae, aut omnes aut superiores imbricatae, summae late confluentes. NERVUS PRIMARIUS subflexuosus, supra raro, subtus sparse hirsutus. NERVUS SECUNDARIUS patuli, valde remoti, non curvati, uni-bifurcati. INDUSIA in apice lacinae 1—3, 1 lin. longa, omnino immersa, subcoriacea, fusciscentia. RECEPTACULUM curvatum, indusio triplo longius.

Habitat in Brasilia orientali (ad Rio?): Gardner n. 209; in Serra do Carassa, prov. Minarum, saxis adpressa et in sylvis ad Obidas, prov. Paraensis: M.: in insulae Martinicae monte Morne de la Calebasse: Plumier, ibidem: Sieber n. 144; in Jamaica: Swartz, in Montserrat: Ryan.

13. TRICHOMANES PILOSUM RADDI lamina linearivel ovato-lanceolata acuta, basi plus minusve angustata, profunde pinnatipartita, inferne pinnatisecta; laciniis oblongis obtusis, margine sinuato-crenulato crispatis involutis ciliatis, utrinque ferrugineo-hirsutis; inferioribus remotis minoribus divaricatisque, mediis patulis imbricatis interdum falcatis, superioribus confluentibus; nervis secundariis bi-trifurcatis; indusiis infundibuliformibus, ore patentissimo hypocraterimorphis; stipite debili semitereti curvato rhachique ferrugineo-hirsutis; rhizomate adscendente.

Trichomanes pilosum Raddi Syn. *Fil. Brasil. n. 140. Ejusd. Fil. Brasil. 63. tab. 79. fig. 1. Kunze in bot. Zeit. V (1847).* 387, e. *Presl Epim. bot. 15.*

Trichomanes crispum Hook. *Sp. Fil. I. 130 (partim).*

RHIZOMA adscendens, pilis setiformibus atro-purpureis nitentibus obsitum, radiculis multis nigro-fuscis ramosis pilosis praeditum. FRONDES dense aggregatae, recte adscendentes curvatae. STIPES 1/2—1¼ poll. longus, fuscus, supra canaliculatus, superne compressus. RHACHIS quoque supra canaliculata, subtus convexa, utrinque hirsuta, plerumque superne tantum alata, sinibus rotundis. LAMINA 1½—4 poll. longa, 9—12 lin. lata, rigidiuscula, a medio ad apicem fertili, membranacea, pellucida, in planta sicca flavo-virescens, e cellulis magnis rectangulis s. rhomboidalibus pallide virescentibus pellucidissimis, ad parietes crassos subflexuosos pallentes parum granulato-chlorophyllosis. LACINIAE 4—8 lin. longae, 3—4 lin. latae, infimae interstitiis 3-, sequentes 2-linearibus remotae, suboppositae. NERVUS PRIMARIUS rectus, subtus hirtus. NERVUS SECUNDARIUS patuli, curvati, plerumque trifurcati, infimi usque ad octo-furcati, subtus elevati. INDUSIA in apice laciniarum 3—4, omnino immersa, 1 lin. longa, membranacea, pellucida, virescentia, basi attenuata hirsuta, ore ampliato hypocraterimorpho subbiloba. RECEPTACULUM indusio saepe triplo longius.

Habitat in Brasilia orientali: Sellow, Langsdorff; in Serra d'Estrella: Raddi; in rupibus ad S. João del Rey: Pohl (Hb. Mus. Vindobon. n. 524); — in Venezuela: Warzewicz; in prov. Cumana ad saxa circa rivulos regionis temperatae et subcalidae: Moritz n. 145.

14. *TRICHOMANES ACCEDENS* PRESL lamina lineari-lanceolata elongata acuminata, basin versus subangustata, profundissime pinnatifiditate; laciniis linearibus obtusis, basi superiore producta adnatis inferiore subsolutis, margine et apice manifeste inaequaliter denticulatis ciliatis, subtus sparse pilosis; inferioribus subminoribus divaricatis, mediis superioribusque satis remotis patentissimis, juxta nervos serie cellularum majorum pellucida; nervis secundariis remotis rectis unifurcatis; indusiis infundibuliformibus, ore bicornibus; stipite brevi semitereti rhachique superne anguste alata pilis ferrugineis sparse obsessis; rhizomate adscendente.

Trichomanes accedens Presl *Epim. bot.* 14.

Trichomanes pellucens Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844). 530.

Trichomanes crispum Hook. et Grev. *Icon. Fil. I. tab.* 12? *Spruce Coll. n.* 409 et 874.

RHIZOMA adscendens, pilis fuscis obsitum, radiculis debilibus fibrillosis pilosis nigrofuscis praeditum. FRONDES dense aggregatae. STIPES 1—2½ poll. longus, diametrum ½ lin. attingens, semiteres, supra canaliculatus, olivaceo-brunescens, sparse ferrugineo-hirtus. RHACHIS debilis, supra canaliculata, subtus convexa, nigro-fusca, sparse hirta, inferne angustissime, superne latius alata, sinibus rotundis. LAMINA 6—10 poll. longa, in medio circiter 15 lin. lata, rigida, duas trientes longitudinis fertillis, membranacea, pellucida, statu sicco olivaceo-brunescens, nitens, supra glabra, subtus sparse hirsuta, e cellulis magnis hexagono-elongatis angustis serialibus, pigmento virescenti plus minusve impletis, parietibus crassis flexuosis flavo-virentibus, cellulis nervos concomitantibus majoribus rectangulis vacuis maxime pellucidis composita. LACINIAE mediae 9 lin., infimae 4—6 lin. longae, ad 2½ lin. latae, inferiores interstitiis aequidistantibus 2½-linearibus remotae, alternae s. oppositae. NERVUS PRIMARIUS rectus, supra planus, subtus parum elevatus planiusculus. NERVI SECUNDARIJ patuli, remoti, non curvati, uni-, nunquam bifurcati. INDUSIA in apice lacinarum circiter 7, omnino immersa, ¾ lin. longa, membranacea, fusco-virentia, ore truncato bicornia. RECEPTACULUM exsertum, indusio duplo longius.

Habitat in vicinia oppidi Barra, prov. do Alto Amazonas: n. 874 et secundum fluvium Acará, haud longe ab urbe Para: *n.* 409 R. Spruce; — in Guiana anglica, ad ripas fluminis Essequibo: *Rich. Schomburgk n.* 271 (*Herb. Reg. Berol.*)

15. *TRICHOMANES SELLOWIANUM* PRESL lamina oblongo-lanceolata elongata longe acuminata, basi subangustata, profundissime pinnatifiditate; laciniis lineari-lanceolatis obtusiusculis utrinque auriculatis, margine undulato denticulatis saepe involutis, subtus sparse hirtis; inferioribus vix minoribus divaricatis, mediis patentissimis remotis, summis confluentibus; nervis secundariis uni-trifurcatis; indusiis infundibuliformibus, ore patente bicornibus; stipite longo semitereti glabrescente; rhachi supra canaliculata angustissime alata, pilis ferrugineis dense hirsuta; rhizomate adscendente.

Trichomanes sellowianum Presl *Hymenophyll. 15 et 37. Hook. Spec. Fil. I. 145 (in nota). Kunze in bot. Zeit. V* (1847). 388 (in adnot. ad *T. pilosum*). Presl *Epim. bot.* 15.

Trichomanes maximum Pohl in *Herb. Mus. Pal. Vindob. Kunze in Linnaea XXI* (1848). 240.

RHIZOMA adscendens, robustum, pilis atropurpureis dense obsitum, radiculis longis nigris dense fibrillosis pilosis praeditum. STIPES 2½—5½ poll. longus, diametrum ¾ lin. attingens, semiteres, supra canaliculatus, nigro-fuscus, pilis ferrugineis adpressis hirsutus, demum glabrescens. RHACHIS robusta, supra canaliculata, subtus planiuscula, dense ferrugineo-hirsuta, anguste alata, sinibus rotundis. LAMINA 10—24 poll. longa, 2 poll. lata, rigida, in medio superiore fertillis. LACINIAE mediae 9—15 lin., infimae 6—9 lin. longae, 2—4 lin. latae, inferiores interstitiis subaequidistantibus 4-linearibus remotae, plerumque oppositae divaricatae, mediae patentissimae

saepissime remotae. FORMA lacinarum inferiorum minus variabilis ut in *Trichomanes cristato*, omnes lineari-lanceolatae apicem versus minus angustatae et ala angustissima cohaerentes. SUBSTANTIA laminae e cellulis magnis hexagono-elongatis subprosenchymatosis subserialibus pallide virentibus, interdum utriculo primordiali contracto badlo instructis, sed plerumque valde pellucidis, ad parietes crassos subflexuosos pallentes tantum chlorophyllo granulatis, composita. NERVUS PRIMARIUS rectus, validus, hirtulus. NERVI SECUNDARIJ patuli, remoti, recti, plerumque uni-, rarissime 2—3 furcati, utrinque elevati. INDUSIA in apice lacinarum usque ad 11, omnino immersa, ¾ lin. longa, subcoriacea, fuscocentia. RECEPTACULUM curvatum, indusio quadruplo longius.

Habitat in sylvis Serra d'Estrella: Sellow, Gardner n. 207; ad *Petropolis: Langsdorff; inter Vittoria et Bahia: Sellow (T. marginatum Desv. Herb. Reg. Berol.), ad Barra de Jucú: Princ. Max. Neovindensis; ad Bocaina in prov. Goyaz: Pohl; — in Guiana batava in locis humidis ad terram prope Joden-Savanna: Kegel n.* 1055 (e *Kunze*).

16. *TRICHOMANES CRISTATUM* KAULF. lamina lineari-lanceolata elongata acuminata, basi longe angustata, profundissime pinnatifiditate, inferne pinnatisecta, flaccida; laciniis lineari-oblongis acuminatis, basi inferiore cordatis superiore auriculata, margine subcrispato repandis subdenticulatis ciliatis, utrinque flavescenti-pubescentibus; inferioribus remotioribus minoribus non decurrentibus, mediis imbricatis; nervis secundariis plerumque bifurcatis; indusiis infundibuliformi-cylindraceis, ore longe bicornibus; stipite semitereti rhachique angustissime alata pallide ferrugineo-hirsutis; rhizomate adscendente.

Trichomanes cristatum Kaulf. *Enum. Fil.* 265. Presl *Hymenophyll. 15. Kunze in bot. Zeit. V* (1847). 386. *Kunze in Linnaea XXI* (1848). 239. Presl *Epim. bot.* 14.

Trichomanes crispum Hook. *Spec. Fil. I.* 130 (partim).

Trichomanes pellucens Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844). 530 (quoad plantam Hostmann. n. 600).

Trichomanes laxum Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844). 530.

RHIZOMA adscendens, pilis nigro-fuscis obsitum, radiculis paululum fibrillosis pilosis nigricantibus praeditum. FRONDES aggregatae. STIPES debilis 2 poll. longus, diametrum ½—¾ lin. attingens, semiteres, supra canaliculatus, fuscus, hirsutus, mox glabrescens. RHACHIS supra canaliculata, subtus plana utrinque hirsuta, superne anguste alata, sinibus rotundis. LAMINA 9—15 poll. longa, 15—21 lin. lata, flaccida, duas trientes et ultra longitudinis fertillis, tenuiter membranacea, statu sicco brunescens-viridis, e cellulis hexagono-elongatis subserialibus, aut pigmento aut ad parietes granulis virentibus impletis, parietibus crassis subflexuosis pallide virentibus, cellulis juxta nervos saepe majoribus non raro maxime pellucidis composita. LACINIAE mediae 9—13 lin., infimae 2—9 lin. longae, 2—3 lin. latae, inferiores interstitiis 3½ lin. remotae, alternae vel oppositae, infimae et inferiores divaricatae seu patentissimae, mediae et superiores diffusae, plerumque imbricatae, summae late confluentes. FORMA LACINIAE inferiores variabilis, aut praecedentibus parum minores, apicem versus angustatae, longe acuminatae, aut inferiores 5—6 decrescentes, infimae deltoideo-lanceolatae s. ovatae. NERVUS PRIMARIUS gracilis, rectus, subtus hirsutus. NERVI SECUNDARIJ graciles, curvati, 2—4 furcati. INDUSIA in apice lacinarum usque ad 11, omnino immersa, 1 lin. longa, membranacea, pallide virescentia, ore patentissimo, subrepando longe bicornia, inferne hirsuta. RECEPTACULUM curvatum, indusio duplo-triplo longius.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Chamisso, Langsdorff; Bahiensis: Freireiss; in sylvis ad S. Pauli urbem, prov. S. Pauli locis editis: M.; in Serra da Piedade, prov. Minarum: Langsdorff; in prov. Ceará: Gardner n. 1908; in sylvis aeternis aeterno rore madidis ad Coari, prov. do Alto Amazonas: *M.*; ad Yuracares, in Chiquitos Boliviae: *d'Orbigny n.* 170;

in *Guiana batava*: Wulfschügel, Hostmann n. 600, Kegel s. n. (e Kunze); in *Guiana anglica*: Rob. Schomburgk n. 442 (Herb. Reg. Berol.).

17. *TRICHOMANES PELLUCENS* KUNZE lamina oblonga-linearis acuminata profunde pinnatipartita; laciniis linearibus obtusis, basi superiore producta adnatis inferiore solutis subauriculatis, margine irregulariter sinuato-denticulatis, glabris, omnibus remotis; inferioribus divaricatis vix minoribus, sequentibus patentissimis, summis confluentibus; serie unica cellularum majorum pellucida juxta nervos; nervis secundariis remotis, uni-bifurcatis, fructiferis simplicibus; indusiis cylindraceis, basi attenuatis, ore integro subbicornibus; stipite semitereti longo, apicem versus marginato rhachique gracillima, a basi ad apicem alata, subtus pilis ferrugineis adpressis hirtis; rhizomate adscendente.

Trichomanes pellucens Kunze in *Linnaea IX* (1834). 104. Mart. Icon. Plant. Cryptog. Brasil. 104 et 105 (in adnot. ad *T. pilosum*). Presl Hymenophyll. 15 (ex errore typogr. *T. pellucidum*). Hook. Spec. Fil. 1. 131. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 371 et 372. Kunze Farnkr. I. 158. tab. 68. Presl Epim. bot. 16.

RHIZOMA adscendens, robustum, flexuosum, pilis fuscis obsitum, radiculis perlongis validis nigro-fuscis pilosis praeditum. FRONDES aggregatae. STIPES $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{4}$ poll. longus, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, supra canaliculatus, fuscus, hirtus, mox glabrescens, superne angustissime alatus. RHACHIS utrinque semiteres, supra gracilis, subtus hirtula, a basi ima anguste, superne late alata, sinibus rotundis. LAMINA 4—6 poll. longa, 1 — $1\frac{1}{2}$ poll. lata, rigida, duas trientes longitudinis fertillis, coriacea, solida, statu siccio nigro-virescens, e cellulis hexagono-parenchymatosi subregularibus subserialibus brunnescenti-virentibus parum pellucidis, ubique granulis chlorophyllaceis repletis, parietibus crassis subflexuosis pallentibus, juxta nervos secundarios utrinque serie unica cellularum majorum inanum, itaque valde pellucidarum composita. LACINIAE mediae 10-, infimae circiter 6 lin. longae, 2 lin. latae, inferiores interstitiis aequidistantibus 3-linearibus remotae, plerumque oppositae, patentissimae, superiores nunquam imbricatae, patulae, summis confluentes. NERVUS PRIMARIUS rectus, validus, subtus hirtulus. NERVUS SECUNDARIUS patuli, remoti, non curvati, infimi bifurcati, sequentes furcati, subtus elevati. INDUSIA apicem laciniarum occupantia circiter 11, immersa, $\frac{3}{4}$ lin. longa, subcoriacea, nigro-virentia. RECEPTACULUM curvatum, indusio triplo longius.

Habitat prov. Rio de Janeiro: Gardner n. 208 (teste Presl); — in *Guiana gallica* (teste Kunze); in *Maynas* ad terram et arbores emortuas prope Tocache, missionem Huallagae superioris: Poeppig.

18. *TRICHOMANES HAENKEANUM* PRESL lamina oblongo-lanceolata elongata acuminata, basi non angustata, profunde pinnatipartita, inferne subpinnatisecta; laciniis latis oblongis acuminatis, margine sinuato inaequaliter denticulatis suberispatis ciliatis, utrinque pubescentibus, imbricatis; inferioribus non remotioribus neque minoribus, divaricatis mediisque basi utrinque cordatis, superioribus subito minoribus decurrentibus, demum confluentibus; nervis secundariis valde curvatis 3—6-furcatis, fructiferis simplicibus; indusiis infundibuliformibus, ore patente bicornibus; stipite triquetro rhachique supra subcanaliculatis, pilis ferrugineis adpressis hirsutis.

Trichomanes Haenkeanum Presl Hymenophyll. 15 et 36. tab. 3, A. Presl Epim. bot. 15.

Trichomanes crispum Presl Reliq. Haenk. I. 69. (excl. syn.).

Rhizoma et partem stipitis inferiorem non vidi. STIPES triquetrus, 1 lin. crassus, nigro-fuscus. RHACHIS valida, supra late canaliculata, subtus plana, eodem indumento stipitis praedita, superne alata, sinibus angustis

rotundis. LAMINA frondis in specimine nostro 11 poll. longa, in media $2\frac{1}{2}$ poll. lata, duas trientes sterillis, superne tantum fertillis, rigida, coriacea, in sicco viridi-brunnea, e cellulis hexagono-parenchymatosi serialibus magnis pallide virescentibus valde pellucidis, ad parietes crassos flexuosos pallentes plerumque solummodo granulato-chlorophyllosis composita. Cellulae juxta nervos secundarios majores magis pellucidae. LACINIAE mediae circiter 18 lin., superiores fertiles 6—9 lin. longae, 3—5 lin. latae, interstitiis subaequidistantibus 4-linearibus remotae, alternae, patentissimae, summis exceptis imbricatae. NERVUS PRIMARIUS rectus, validus. NERVUS SECUNDARIUS creberrimi utrinque elevati. INDUSIA in apice laciniarum 1—8, $\frac{3}{4}$ lin. longa, coriacea, subcinnamea, basi hirtula. RECEPTACULUM vix curvatum, indusio duplo longius.

Habitat ad Yuracares, in Chiquitos: d'Orbigny n. 318; in Chile: Poeppig; in Peruvia, in montanis ad Huano: Haenke. — Probabiliter in Brasilia occidentali non deest.

ADNOTATIO. *Trichomanes plumosum* Kunze (Linnaea IX. 1834. 104.) adhuc solummodo ex Peruvia notum, speciei nostrae quamquam peraffine differt: laciniis angustioribus, oblongo-linearibus, longius acuminatis, non imbricatis, basi superiore adnatis, inferiore solutis auriculatisque; inferioribus minoribus, remotioribus.

19. *TRICHOMANES KAULFUSSII* HOOK. ET GREV. lamina lanceolata longe acuminata, basi plus minusve angustata, profunde pinnatipartito-pinnatifida; laciniis remotis, e basi lata linear-oblongis longe acuminatis pinnatifidis, utrinque imprimis in nervis rhachique ferrugineo-hirsutis; lacinulis brevibus obtusis bi-tridentatis, margine pilis stellatis obsitis; nervis secundariis 6—7 furcatis; indusiis subsemiimmersis infundibuliformibus, basi hirtis, ore patente repando subbicornibus; rhachi supra semitereti flexuosa late-alata, sinibus latis rotundis; stipite tereti supra canaliculato superne marginato hirsuto; rhizomate repente.

Trichomanes Kaulfussii Hook. et Grev. Icon. Fil. II. Append. 9. Hook. Spec. Fil. 1. 122. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 320. Presl Hymenophyll. 15. Ejusd. Epimel. bot. 16.

Trichomanes lucens Hook. et Grev. Icon. Fil. 1. tab. 10 (excl. syn.).

Trichomanes astylum Kaulf. in Sieb. Fl. mixta n. 340.

RHIZOMA repens, robustum, glabrescens, radiculosum. STIPES 3—4 poll. longus, diametrum 1 lin. attingens, fuscus, ferrugineo-hirsutus, mox glabrescens, in medio superiore manifeste membranaceo-alatus. RHACHIS supra semiteres, flexuosa, gracilis, subtus lator, convexiuscula, utrinque hirsuta et a basi ad apicem alata, sinibus rotundis. LAMINA 1 pedem et ultra longa, usque ad 2 poll. lata, rigida, a medio ad apicem fertillis, membranacea, plus minusve pellucida, statu sicco sordide viridis, e cellulis magnis hexagono-parenchymatosi serialibus pallide brunnescenti-viridibus valde pellucidis, ad parietes minus crassos strictos pallentes granulato-chlorophyllosis composita. LACINIAE mediae 12—15 lin. longae, 4 lin. latae, interstitiis circiter 4-linearibus remotae, summis exceptis omnes patentissimae, remotae. NERVUS PRIMARIUS subflexuosus, utrinque hirtus. NERVUS SECUNDARIUS patuli, remoti, 6—7 furcati, curvati, fructiferi furcati v. simplices; nervi summi laciniarum fertillum non raro steriles. INDUSIA partem anticam laciniarum occupantia circiter 12, subsemi-immersa, 1 lin. longa, submembranacea, nigro-virentia, basi hirta, ore patentem repanda. RECEPTACULUM vix curvatum, indusio duplo longius.

Habitat in sylvis ad arborum vetustarum truncos in *Guiana anglica* ad Demerara: Parker (teste Hook. et Grev.) — In Brasilia aequatoriali haud deerit. Frequentius invenitur in insulis Antillarum, e. g. in Martinica, Jamaica, Guadeloupe, Mount Miseri insulae S. Kitts etc.

20. *TRICHOMANES MARTIUSII* PRESL lamina lanceolata s. lineari-lanceolata elongata, apice acuminata, basi longe angustata, profundissime pinnatifida; laciniis linearibus obtusis, angulo acutissimo disjunctis, approximatis, margine inaequaliter sinuato-lobulatis ciliatis, utrinque cum rhachi stipiteque densissime ferrugineo-tomentosis; nervis secundariis remotis uni-bifurcatis; indusiis subbicornibus; stipite robusto perumque brevi; rhizomate valido repente v. adscendente.

Trichomanes Martiusii Presl *Hymenophyll.* 15 et 36. Kunze in *bot. Zeit.* V (1847). 287. Kunze in *Linnaea* XXI (1848). 239. Presl *Epim. bot.* 15.

Trichomanes plumula Presl *Hymenophyll.* 15 et 36. Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844). 530. Presl *Epim. bot.* 15.

Trichomanes pilosum Mart. *Icon. Plant. Crypt. Brasil.* 104. tab. 68. Splügerb. *Enum. Fil. Swin.* 50 (excl. syn. teste Kunze).

Trichomanes plumula Kunze in *bot. Zeit.* V (1847). 388 (quoad syn. Mart. et Presl).

Trichomanes crispum Hook. *Spec. Fil.* I. 130 (partim).

RHIZOMA repens, raro adscendens, robustum, flexuosum, pilis fuscopurpurescentibus obsitum, radiculis atro-fuscis longis fibrillosis dense pilosis praeditum. FRONDES approximatae subaggregatae. STIPES 9 lin. usque ad 2 poll. longus, diametrum 1 lin. et ultra attingens, semiteres, supra canaliculatus aequae ac rhachis utrinque pilis longis laete ferrugineis densissime hirsutus v. tomentosus. RHACHIS robusta, supra plana canaliculata, subtus convexiuscula, superne alata, sinibus acutangulis. LAMINA 6—12 poll. longa, in medio 9—15 lin. lata, rigida, in medio superiore fertilis, membranacea pellucida, statu siccio viridi-nigricans, e cellulis magnis amplis hexagono-parenchymatosus subserialibus, rarissime granulis chlorophylli virescentibus impletis, plerumque vacuis pellucidissimis, parietibus crassis subflexuosis flavo-virentibus composita. LACINIAE mediae 6—9, infimae 2 lin. longae, circiter 2 lin. latae, inferiores interstitiis subaequidistantibus 3-linearibus remotae, alternae v. oppositae; infimae divaricatae, mediae patentissimae magis minusve approximatae, interdum subimbricatae, summae vix confluentes, utrinque subtus densissime ferrugineo-hirsutae; margine saepe laceratione disjunctae. NERVUS PRIMARIUS gracilis, utrinque convexus. NERVI SECUNDARIJ patuli, approximati, subcurvati, uni-bifurcati. INDUSIA in apice laciniarum circiter 6, immersa, 1 lin. longa, membranacea, fusca, dense hirsuta. RECEPTACULUM curvatum, indusio triplo longius.

Habitat in prov. Sebastianopolitana ad Patrem Correa versus flumen Paraíba: M.; in prov. Paraíbaensis sylvae aridioribus passim: M.; in montibus Arara-Coara et Cupati, fluvio Japurá imminetibus, prov. do Alto Amazonas: M.; — in Guiana batava: Hostmann n. 599, ad fructum radices et arborum truncos: Kegel n. 1054; in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 277, Rob. Schomburgk n. 442 (Herb. Reg. Berol.).

ADNOTATIO. Haec species in *Icon. Plant. Crypt. Brasil.* auctore Martio (tab. 68) depicta est in duabus formis, quarum una laminam late ovato-lanceolatam, altera lineari-lanceolatam basi angustatam ostendit. Presl (in ejus *Hymenophyll.*), qui exemplaria originalia non vidit, sed bene sensit, eam speciem a *T. piloso* Raddi diversam esse, secundum tabulam citatam duas species: *T. plumulam*, quod forma latior (fig. sinistra) est, et *T. Martiusii*, quod forma angustior (fig. dextra), descripsit, atque etiam quum Herbarii Reg. Berol. specimen a Rich. et Rob. Schomburgkio lecta vidisset, utramque formam pro specie peculiari designavit. Herbarii Monacensis, Berolienensis, Vindobonensis exemplaribus originalibus collatis hanc sententiam accipere non possum, sed duas formas ad unam eandemque speciem distinctissimam, facile distinguendam pertinere mihi persuasum est.

21. *TRICHOMANES ERIOPHORUM* PRESL (sub *RAGATELO*) lamina oblongo-lanceolata acuminata profunde pinnatifida, inferne pinnatisecta, hirsuta; laciniis oblongo-lanceolatis obtusis, basi cordatis utrinque subauriculatis, inaequaliter obtuse dentatis; nervis secundariis furcatis; Hymenophyll.

indusiis infundibuliformibus, ad latera marginemque hirsutis; receptaculo longe exserto, apice ovoideo-incrassato, horizontaliter piloso; rhachi superne alata; rhizomate repente.

Ragatelus eriophorus Presl *Epim. bot.* 18. tab. 9.

RHIZOMA oblique repens, pilis fuscis dense obsitum, radiculis nigricantibus pilosis praeditum. FRONDES aggregatae. STIPES 1—2 poll. longus, semiteres, fuscus, pilis septatis fuscis hirsutus. RHACHIS supra canaliculata, fusca, hirsuta, superne late alata, sinibus rotundis. LAMINA 5—6 poll. longa, 14—18 lin. lata, per duas trientes longitudinis fertilis, obscure viridis, e cellulis hexagono-orbicularibus composita. SEGMENTA V. LACINIAE mediae circiter 9 lin. longae, 3 lin. latae, infimae minores sed non remotiores, circiter 2 lineas inter se distantes, alternae oppositaeque, mediae subimbricatae, summae latae confluentes. NERVUS PRIMARIUS valde flexuosus, utrinque convexus, fusco-nigricans. NERVI SECUNDARIJ patuli, furcati, non curvati, dense pilosi. INDUSIA $\frac{3}{4}$ lin. longa, viridia, ore truncata. RECEPTACULUM usque semipollicare, setaceo-filiforme, fuscum, pilis fere lineam longis dense vestitum, rectum v. arcuatum, apice incrassatum obtuse clauseque bilobum. — Non vid.

Habitat in Guiana anglica: Rob. Schomburgk n. 442 (partim). — In Brasilia aequatoriali forsitan reperietur.

C. Lamina pinnatifida - pinnatifida. Nervi secundarii simplices furcative. Indusia cylindracea vel infundibuliformia, ore dilatata vel bicornia (*Trichomanes* §. 2. *Pseudachomanes* Pr.). Sp. 22—24.

22. *TRICHOMANES SINUOSUM* RICH. frondibus tenuibus curvatis; lamina lanceolata, apice angustata, basi in stipitem decurrente, pinnatifida-pinnatifida; laciniis ovatis oblongisve obtusis, aut repandis aut sinuato-lobatis aut pinnatifidis, in margine rhachi nervisque subtus pilis stellatis obsitis; nervis secundariis simplicibus; indusiis infundibuliformibus, ore dilatato-repandis; stipite filiformi; rhachi late alata; rhizomate gracili repente ferrugineo-stellato-piloso.

Tabula nostra XVIII. fig. 10. 11.

Trichomanes sinuosum Richard in Willd. *Sp. Pl.* V. 502. Lamark *Illustr. tab.* 871. fig. 1. Desv. *Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris* VI. 326 (et *T. quercifolium*). Hook. et Grev. *Icon. Fil.* I. tab. 13. Kunze in *Linnaea* IX (1834). 103. Hook. *Sp. Fil.* I. 120. Kunze in *bot. Zeit.* V (1847). 319. Ejusd. *Farrnkr.* I. 183. tab. 77. fig. 1. Presl *Epim. bot.* 17.

Trichomanes quercifolium Desv. in *Berl. Mag.* V (1811). 328. Turpin in *Dict. des sc. nat. Acotyl.* tab. 89.

Trichomanes Poeppigii Presl *Hymenophyll.* 16.

Planta junior:

Trichomanes incisum Kaulf. *Enum. Fil.* 261. Bory in *Du-Perrey voy. Botan.* p. 282. tab. 38. fig. 1. Hook. *Sp. Fil.* I. 121. *Trichomanes cognatum* Presl *Hymenophyll.* 16 et 41.

RHIZOMA filiforme, flexuosum, tenue, fuscum, pilis ferrugineis stellato-ramosis dense obsitum, radiculis sparsis flexuosis ramosis rigidis pilosis praeditum. FRONDES distantes. STIPES adscendens, teres, raro 1 poll. longus, basi nudus, mox lamina decurrente alatus. RHACHIS utrinque convexiuscula, flexuosa, latissime alata, sinibus rotundis. LAMINA plerumque 3—4 poll. longa, usque ad 11 lin. lata, aetate protracta elongato-lanceolata, apicem versus plus minusve angustata, ad basin cuneata integra, sordide olivaceo-brunnea, e cellulis distinctissimis magnis hexagonis elongatis olivaceo-brunneis chlorophyllosis, plerumque utriculo primordiali contracto instructis, medio vacuis, pellucidissimis, parietibus angustis strictis pallentibus composita. LACINIAE utrinque

circiter 15, patulae, alternae, magis minusve remotae, maximae 5 lin. longae, 3 lin. latae, apice nunc angustatae obtusae, nunc non angustatae subtruncatae v. rotundae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus. NERVI SECUNDARIJ patuli simplices, rarissime furcati, infra apicem lacinarum evanescentes. INDUSIA in apice lacinarum omnino immersa, 1 lin. longa, olivaceo-brunnea, subpellucida, ore late dilatato biloba. RECEPTACULUM filiforme, curvatum, indusio quadruplo longius. PILI rhizomatis longe pedicellati, ii marginis lacinarum breviter pedicellati, 2-4-stellati; pili stellarum non articulati, longe cylindracei (statu sicco taeniaeformes tortuosi) apice subulati, fusciduli.

Habitat in Brasiliae orientalis sylvis ad arbores in Serra dos Orgãos: Beyrich, Langsdorff, Chamisso, Sellow, Lesson (Herb. Reg. Berol.); in insula St. Catharinae: Gaudichaud; in prov. Minas: Gardner n. 5326; prope Ilheos: Luschnath et inter Almada et Ferradas, prov. Bahiensis: M.; — in Peruvia prope Pampajaco: Poeppig; etiam incolae insularum Antillarum.

23. TRICHOMANES BANCROFTII Hook. ET GREY. frondibus aggregatis rigidiusculis; lamina ovato-deltaidea bipinnatipartito-pinnatifida; laciniis primariis lineari-oblongis obtusissimis, secundariis oblongis; lacinulis linearibus, apice interdum excisis, margine glabris; nervis secundariis simplicibus furcatisve; indusiis cylindraceo-campanulatis, ore dilatato bilobis; stipite rhachique late alatis, subtus pilosis; rhizomate subrepente.

Tabula nostra XVIII. fig. 5.

Trichomanes Bancroftii Hook. et Grey. Icon. Fil. II. tab. 204. Hook. Sp. Fil. I. 123. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 328. Kunze in Linnæa XXI (1848). 237. Presl Hymenophyll. 16.

Trichomanes (§. II. Pseudachomanes) Bancroftii Presl Epim. bot. 17.

Trichomanes coriaceum Kunze in Linnæa IX (1834). 105. Ejusd. Analecta Pterid. 46. tab. 29. fig. 1.

Trichomanes Kaulfussii Coll. Spruce n. 871.

Trichomanes pinnatifidum Herb. Willd. n. 20209.

RHIZOMA subrepens vel erectum, pilis atro-fuscis obsitum, deorsum emittens radículas filiformes longas rigidas ramulosas nigricantes nigro-pilosas. STRIPES brevis $\frac{1}{2}$ -1 poll. longus, teres, basi ferrugineo-pilosus, mox supra basin alatus. RHACHIS supra canaliculata, subtus convexa, purpurascens, cum nervis subtus setoso-hirsuta, late alata, sinibus rotundis. LAMINA 1-3 poll. longa, 9-16 lin. lata, basi in stipitem decurrens, rigidula, statu sicco olivaceo-brunnescens, e cellulis rectangulis angustis distinctissimis hyalinis, utriculo primordiali contracto angustissimo brunneo repletis, parietibus latis hyalinis subflexuosis composita. LACINIAE PRIMARIAE in utroque latere usque ad 13, 6-9 lin. longae, fere 3 lin. latae, diffusae, suboppositae, superiores imbricatae; SECUNDARIAE 4 lin. longae, LACINULIS oblongis obtusis excisis bifidisve sinuatis vel integerimis non ciliatis. LACINULAE superiores lacinarum (in medio et apice laminae) fertiles, infimae steriles. NERVUS PRIMARIUS flexuosus. NERVI SECUNDARIJ simplices v. furcati. INDUSIA in apice lacinarum 2-4, omnino immersa, $\frac{3}{4}$ lin. longa, olivaceo-brunnea, subpellucida, ore biloba, lobis patulis erosorepandis. RECEPTACULUM setiforme, rigosum, longe exsertum, pars enim prominens indusio quadruplo longius.

Habitat in prov. Paraënsi, prope Collares, ad truncos emortuos delapsos: Poeppig n. 2981; in vicinia Barra do Rio Negro: R. Spruce

n. 871; — in Guiana gallica (Herb. Willd. n. 20209); in Guiana batava, in sylvis: Kegel n. 1079, Weigelt Coll. II. n. 9; in Guiana anglica: Schomburgk n. 439; in insula Jamaica: Bancroft; in Cuba orientali: C. Wright n. 916.

24. TRICHOMANES BICORNE Hook. frondibus aggregatis rigidiusculis; lamina ovata v. oblongo-ovata breviter acuminata bipinnatipartito-pinnatifida; laciniis primariis oblongis obtusis imbricatis, secundariis ovatis profunde pinnatifidis; lacinulis lineari-oblongis integris s. bifidis obtusiusculis; nervis secundariis simplicibus furcatisve, subtus longe sparse setosis; indusiis late alatis cylindraceis, ore insigniter bicornibus; stipite rhachique late alatis; rhizomate adscendente.

Trichomanes bicorne Hook. Icon. Pl. X. tab. 982.

RHIZOMA adscendens, crassiusculum, pilis atrofuscis obsitum, radículas multis longis rigidis flexuosis fibrillosis atrofuscis dense pilosis praeditum. STRIPES circiter $1\frac{1}{2}$ poll. longus, teres, nigro-rubecundus, sparse pilosus et late alatus. RHACHIS quoque late alata, sinibus rotundis, margine inprimis superne undulata. LAMINA fere 2 poll. longa, 1 poll. lata et ultra, basi in stipitem decurrens, statu sicco olivacea, e cellulis hexagono-parenchymatosis, granulis olivaceis adpersis ad parietes multo densius impletis, parietibus hyalinis serpentino-flexuosis composita. LACINIAE PRIMARIAE in utroque latere 8-10, infimae circiter 9 lin. longae, 6 lin. latae, alternae, patulae; SECUNDARIAE 2-3-lineares, LACINULIS 1-linearibus. NERVUS PRIMARIUS flexuosus. NERVI SECUNDARIJ patuli, plerumque simplices, rarius furcati, subtus pilis sparse obsiti. INDUSIA in apice lacinarum numerosa, omnino immersa, vix 1-linearia, olivacea. RECEPTACULUM curvatum, indusio quadruplo longius.

Habitat in sylvis densis, humidis, ad arborum truncos emortuos radicesque passim in ditone fluminis Amazonum: R. Spruce n. 1178; prope San Gabriel da Cachoeira do Rio Negro: R. Spruce n. 2334; — et prope oppidum Barra do Rio Negro: idem n. 870. (sub: T. alati forma?)

§. 2. Indusia basilaria vel in toto laminae s. lacinarum latere exserta (rarissime ala utroque latere angusta quasi immersa), ore truncata, hypocraterimorpha, rarissime brevissime biloba. Nervi secundarii distantes simplices vel furcati. (*Trichomanes* §. 3. *Eutrichomanes* Pr.)

A. Rhizoma scandens. Frondes perbreve stipitatae.

α. Lamina inciso-dentata vel pinnatipartita. Sp. 25-28.

25. TRICHOMANES TANAICUM Hook. frondibus longe distantibus assurgentibus brevissime stipitatis; lamina simplici lineari acuta, basi cordata subauriculata, margine inaequaliter inciso-dentatis, dentibus obtusis; nervis secundariis curvatis plerumque trifurcatis; indusiis a medio laminae ad apicem versus, exsertis cylindraceis strictis, ore hypocraterimorphis; rhizomate scandente.

Trichomanes Tanaicum Hooker in Spruce coll. n. 410.

RHIZOMA pluripedale, scandens, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, ramosum, fuscum, glabrum, subtus radícula adligantibus brevissimis instructum. FRONDES remotae, rigidae, assurgentes, 11 lin. inter se distantes. STRIPES circiter 1 lin. longus, teres, glaber. LAMINA usque ad 6 lin. longa, 4-5 lin. lata, simplex, glabra, membranacea, statu sicco obscure olivacea, statu emollito margine subcrispata, inaequaliter inciso-dentata, e cellulis distinctis rectangulis serialibus amplis, granulis brunnescentibus ad parietes densissime obsessis, medio vacuis pellucidissimis, parietibus strictis valde hyalinis composita. NERVUS PRIMARIUS strictus, excurrens, supra planus corpusculis ferrugineis adpersus, subtus convexus. NERVI SECUNDARIJ remoti, valde curvati, bi-, trifurcati, in apice laminae furcati, fuscii, vix prominentes, subexcurrentes. INDUSIA $1\frac{1}{4}$ lin. longa, coriacea, obscure olivacea, apice dentium insidentia, ore patentissimo hypocraterimorpha. RECEPTACULUM setaceum, strictum, parum exsertum.

Habitat prope Tanaii, secundum fluvium Acará in distr. urbis Para: Spruce n. 410.

26. TRICHOMANES ANKERSII PARKER frondibus distantibus assurgentibus brevissime stipitatis; lamina oblongo-lanceolata longe acuminata, basi non angustata, profunde pinnatifida; laciniis lineari-oblongis obtusis, margine repando-dentatis, infimis basi inferiore auriculatis s. subpinnatifidis, subtus sparse pilosis, sinibus angustis disjunctis; nervis secundariis remotis simplicibus; indusiis ad basin superiorem fere omnium laciniarum plerumque solitariis, rarius 2—3, exsertis pedicellatis cylindraceis strictis, ore hypocraterimorphis; rhizomate perlongo flexuoso scandente.

Trichomanes Ankersii Parker in Hook. et Grev. Icon. Fil. II. tab. 201. Presl Hymenophyll. 16. Hook. Sp. Fil. I. 121. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 320. Ejusd. in Linnæa XXI (1848). 237.?

RHIZOMA, ut videtur pedale, scandens, diametro $\frac{1}{3}$ lin., fuscum, glabrum, subtus radiculis adligantibus brevissimis praeditum. FRONDES distantes, rigidae, assurgentes, circiter 14 lin. inter se distantes. STIPES 2 lin. longus, teres, glaber. RHACHIS teres, fusca, subtus et in nervis pilis brevissimis ferrugineis adspersa, basin versus late alata, sinibus rotundis angustis. LAMINA 5—6 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ poll. lata, membranacea, statu sicco obscure olivacea, e cellulis hexagono-parenchymatosi serialibus amplis, granulis viridi-brunnescentibus nunc ubique impletis, nunc ad parietes strictos pallentes solummodo obsessis, itaque in medio vacuis pellucidis composita. LACINIAE inferiores circiter 1 poll. longae, 3 lin. latae, interstitiis 3-linearibus remotae, alternae, diffusae, planae. NERVUS PRIMARIUS gracilis, flexuosus, utrinque prominens. NERVI SECUNDARIJ patuli, remoti, stricti, simplices, ante marginem evanescentes. INDUSIA cum pedicello $\frac{1}{2}$ lin. longa, coriacea, nigra. RECEPTACULUM setaceum, curvatum, indusio triplo longius.

Habitat in arborum truncis Guianae anglicae, ad Demerara: D. J. Ankers; — et verisimiliter quoque in Brasilia aequatoriali.

27. TRICHOMANES COMMUTATUM J. W. STURM frondibus distantibus assurgentibus breviter stipitatis; lamina oblongo-lanceolata longe acuminata, basi non angustata, profundissime pinnatifida; laciniis glabris linearibus obtusis, margine profunde dentatis, sinibus latis disjunctis; infimis basi inferiore pinnatifidis; nervis secundariis remotis simplicibus; indusiis ad basin superiorem fere omnium laciniarum, plerumque solitariis, rarius 2—3, exsertis manifeste pedicellatis cylindraceis curvatis, ore hypocraterimorphis; rhizomate scandente perlongo flexuosoque.

Trichomanes Ankersii Klotzsch in Linnæa XVIII (1844). 531 (non Hook. et Grev.).

RHIZOMA pedale scandens, diametro $\frac{1}{3}$ lin., flexuosum, fuscum, glabrum, subtus radiculis adligantibus brevissimis ferrugineis instructum. FRONDES distantes, rigidae, assurgentes, 12 lin. inter se distantes. STIPES 3 lin. longus, teres, glaber. RHACHIS teres, rufo-fusca, robustior et magis prominens quam in *T. Ankersii*, subtus et in nervis pilis brevissimis ferrugineis adspersa, basin versus anguste alata, sinibus oblongis, latitudine laciniarum. LAMINA 4—6 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ poll. lata, apice plerumque curvata, membranacea, in planta sicca obscure olivacea subnitens, e cellulis hexagono-parenchymatosi amplis serialibus, granulis flavo-brunnescentibus nunc ubique impletis, nunc ad parietes strictos pallentes solummodo obsessis, itaque medio vacuis pellucidis composita.

LACINIAE inferiores circiter 1 poll. longae, 2 lin. latae et $2\frac{1}{2}$ lin. inter se distantes, alternae, patulae, strictae (statu sicco vario modo curvatae), lineares, apicem versus vix angustatae, profunde dentatae, dentibus inferioribus 1-linearibus obtusis; lacinae superiores sensim decrescentes et ut in congeneribus postremo in acumen longum dentatum confluentes. NERVUS PRIMARIUS subflexuosus, utrinque prominens, fuscus. NERVI SECUNDARIJ patuli, remoti, stricti, simplices, subexcurrentes. INDUSIA cum pedicello 2 lin. longa, coriacea, nigra, semper curvata, nervis secundariis anticis inferioribus 1—3 insidentia. RECEPTACULUM setaceum vix exsertum, sed in speciminibus nostris verisimiliter decurtatum.

Differt a *Trichomane Ankersii* laciniis remotioribus, angustioribus, linearibus, profunde dentatis, indusiis longioribus curvatisque.

Habitat prope Tanaii, ad Rio Acará, juxta Pará: R. Spruce n. 414 (nomine T. brachypus); — in Guiana anglica ad Demerara et prope montem Canuku: Rich. Schomburgk (Herb. Reg. Berol. n. 1215).

28. TRICHOMANES GUIANENSE J. W. STURM frondibus distantibus assurgentibus brevissime stipitatis; lamina oblongo-lanceolata acuminata, basi latissima, profundissime pinnatifida; laciniis e basi lata subauriculata lineari-acuminatis subtriangularibus, margine irregulariter inciso-dentatis, glabris, infimis basi inferiore auriculatis s. subpinnatifidis; nervis secundariis uni-trifurcatis; indusiis in margine superiore laciniarum 4—5, exsertis subpedicellatis cylindraceis, ore truncato non repandis; rhizomate longissimo scandente.

Trichomanes brachypus Klotzsch in Linnæa XVIII (1844). 531 et in Herb. Reg. Berol. specimina a Rich. Schomburgk sub n. 1215 lecta, partim (nec in Hb. Brasil. Berol.).

RHIZOMA scandens, pedale et ultra, diametro $\frac{1}{2}$ lin., nigrum, glabrum, subtus emittens radiculas adligantes brevissimas. FRONDES distantes, rigidae, assurgentes. STIPES $1\frac{1}{2}$ lin. longus, teres et glaber. RHACHIS quoque glabra, robusta, nigra, subtus pilis brevissimis ferrugineis adspersa, anguste alata, sinibus rotundis angustis. LAMINA $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ poll. longa, 9 — 12 lin. lata, membranacea, in sicco nigricans, e cellulis hexagonoideis vel subquadratis subserialibus, aut omnino impletis, aut ad parietes strictos hyalinos granulis brunnescentibus obsessis, medio vacuis, pellucidis composita. LACINIAE inferiores circiter 6 lin. longae, ad basin 3 lin. latae et 3 lin. inter se distantes, suboppositae, subpatentissimae planaeque. NERVUS PRIMARIUS basi curvatus, validus, utrinque prominens. NERVI SECUNDARIJ patuli, curvati, furcati, inferiores repetite furcati. INDUSIA cum pedicello $1\frac{1}{2}$ lin. longa, coriacea, nigra, dentibus marginis insidentia. RECEPTACULUM in speciminibus Schomburgkianis inclusum, verisimiliter ut in congeneribus aetate proveciore plus minusve exsertum.

A *Trichomane commutato*, specie proxima, laciniis latioribus brevioribusque subtriangularibus irregulariter inciso-dentatis, nervis secundariis uni-trifurcatis facile distinguendum est.

Habitat in Guiana anglica, ad Demerara: Rich. Schomburgk. n. 1215. — Verisimiliter etiam Brasiliae septentrionalis incolae.

β. Lamina bi-tripinnatifida. Sp. 29—31.

29. TRICHOMANES BRACHYPUS KUNZE frondibus copiosis distantibus assurgentibus subsessilibus; lamina ovato-oblonga, apice obtusa, basi latissima, bi-subtripinnatifida;

laciniiis primariis lineari-oblongis obtusis, secundariis oblongis, lacinulis linearibus glabris; nervis secundariis simplicibus furcatisve; indusiis in apice lacinularum exsertis pedicellatis cylindraceis, ore truncato paululum patente; rhachi late alata; rhizomate scandente longissimo flexuoso nigro-fusco.

Trichomanes brachypus Kunze in *Linnaea* IX (1834). 105. *Ejusd. Commentar. ad Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora XXII* (1839). I. Beibl. 53. *Presl Hymenophyll. 16. Hook. Spec. Fil. I. 121. Kunze in bot. Zeit. V* (1847). 320. *Ejusd. in Linnaea XXI* (1848). 237. *Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 255.*

Trichomanes volubile Vellozo *Fl. Flum. XI. tab. 108.*

Trichomanes radicans Hook. et Grev. *Icon. Fil. II. tab. 218* (excl. syn.).

Trichomanes subsessile Splitgerb. *Enum. Fil. Surinam. 49* (fide Kunze).

RHIZOMA scandens, pluripedale, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, nigro-fuscum, glabrescens, subtus radiculis adligantibus brevissimis instructum. FRONDES distantes, flaccidae. STRIPES 1 lin. longus, teres, alatus, aequae ac rhachis subtus radiculis adligantibus praeditus. RHACHIS flexuosa, supra plana, subtus convexa, fusca, a basi ad apicem late alata. LAMINA plerumque 2, interdum usque ad 7 poll. longa, 1—3 poll. lata, tenuiter membranacea, statu sicco olivaceo-nigricans, e cellulis hexagono-rotundatis subserialibus, rarissime pigmento viridi-brunnescente impletis, plerumque medio vacuis pellucidis, ad parietes pallentes non flexuosos granulis chlorophylli viridi-brunnescentibus densissime composita. LACINIAE PRIMARIAE inferiores 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longae, 3—4 lin. latae, interstitiis circiter 3-linearibus remotae, alternae, patentissimae, subcurvatae, subcrispatae, profunde pinnatifidae; LACINIAE SECUNDARIAE oblongae, alternae patulae, pinnatifidae, ad 3 lin. longae; LACINULAE lineares, 1 lin. longae, integrae vel apice patentis-bifidae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, supra planus, saepe radicibus adligantibus instructus, subtus convexus, glaber. NERVI SECUNDARIJ patuli, remotissimi, in totis ramulis fissi, quot lacinulae adsunt, subtus convexi, glabri. INDUSIA cum pedicello $1\frac{1}{2}$ lin. longa, coriacea, nigra, ramo infimo antice nervorum secundariorum insidentia, in quovis latere plerumque 3—4, rarius usque ad 9. RECEPTACULUM filiforme, exsertum.

Habitat in sylvis aboriginibus ad arbores vetustas et putridas, prov. Rio de Janeiro e. g. in Serra dos Orgãos: Brackenridge, Sellow, et in alveis torrentum: M. (Herb. Fl. Brasil. n. 388); in prov. Bahiensi: Luschnath; prope Tanaii, ad Rio Acara juxta Pará: R. Spruce n. 412; — in Guiana butava in sylvis antiquis: Koppeler n. 1765, A. Ehrhard; in Peruvia: Poeppig; in insula Trinitatis: Lockhard; in St. Vincentii: Guilding.

30. *TRICHOMANES LUSCHNATHIANUM* PRESL frondibus distantibus magnis flaccidis olivaceis brevissime stipitatis; lamina oblongo-lanceolata acuminata curvata pinnatisecto-pinnatifida; segmentis oblongo-lanceolatis longe acuminatis decurrentibus; laciniiis inferioribus ovatis obtusis; lacinulis brevibus latisque; nervis secundariis furcatis; indusiis omnino immersis; rhachi flexuosa late alata; stipite alato basi subglabro; rhizomate scandente olivaceo.

Trichomanes Luschnathianum Presl *Hymenophyll. 16 et 45. Hook. Sp. Fil. I. 146* (in nota).

Trichomanes radicans Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844), 531 et *XX* (1847). 437.

Hymenophyllum axillare Raddi *Syn. Fil. Brasil. n. 147.*

Hymenophyllum rupestre Raddi *Fil. Brasil. 67. tab. 80.*

Trichomanes pellucidum Goldmann in *Nova Act. Acad. L. C. XIX. Suppl. I. 466* (fide spec. origin. in *Herb. Reg. gen. Berol.*)

RHIZOMA scandens, ut videtur pluripedale, diametrum $\frac{1}{2}$ —1 lin. attingens, teres, plerumque olivaceum rarius fuscum, supra glabrum, subtus interrupte fusco-tomentosum. STRIPES rarissime 5 lin., ut plurimum $1\frac{1}{2}$ lin. longus, teres, anguste alatus, saepissime glaber. RHACHIS PRIMARIA teres, foliaceo-alata, SECUNDARIAEQUE prominulae, flexuosae, olivaceae. LAMINA 6—12 poll. et ultra longa, 2— $2\frac{1}{2}$ poll. lata, apice plus minusve angustata, glaberrima, membranacea, statu sicco pallide vel obscure olivacea, opaca, e cellulis amplis distinctis hexagonis, medio vacuis pellucidissimis, ad parietes strictos hyalinos utriculo primordiali contracto granulisque pallide virentibus instructis composita. SEGMENTA numerosa, maxima 1— $1\frac{1}{2}$ poll. (infima circiter 6 lin.) longa, 4—6 lin. lata, inferiora interstitiis in eodem latere 5-linearibus remota, alterna, patula; inferiora patentissima, sessilia, profunde pinnatifida, decurrentia. LACINIAE inferiores 3 lin. longae, 2 lin. latae, ovatae obtusae pinnatifido-incisae, superiores lanceolatae, apice lobatae, summae lineares integrae. LACINULAE s. LOBI $\frac{1}{2}$ —1 lin. longae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, utrinque convexus. NERVI SECUNDARIJ patuli, repetite furcati. INDUSIA in latere inferiore lacinularum solitaria, omnino immersa, $1\frac{1}{4}$ lin. longa, infundibuliformia, olivacea, membranacea, ore patente brevissime biloba. RECEPTACULUM setaceum, exsertum, indusio duplo—triplo longius.

Habitat in rupibus et in saxis umbris et humidis amoenissimi montis, quem nuncupant Gavia, non longe a celebri lapsu aquae Tjuca, ut etiam super M. Corcovado: Raddi; in monte Corcovado et in via de Monsuabe ad Praja alta, prov. Rio de Janeiro: Meyen, Pohl n. 4059, Gardner n. 203, Claussen n. 2103 (Tr. radicans); in prov. Sebastiano-politana ad arbores sylvarum in editis montis ad scaturigines: M.; prope Ilheos: Luschnath; in prov. Maragnanensi: M.; — in Venezuela in Colonia Tovar: Moritz n. 275; prope Caracas: Otto n. 645, Karsten n. 43.

31. *TRICHOMANES REPENS* SCHOTT frondibus distantibus magnis rigidis nigro-viridibus breviter stipitatis; lamina late oblongo-lanceolata acuminata stricta bipinnatisecto-pinnatifida; segmentis primariis breviter petiolatis ovato-vel oblongo-lanceolatis acuminatis, secundariis inferioribus rhomboidalibus subflabelliformibus, superioribus oblongis obtusis; laciniiis oblongo-linearibus incisissimis; lacinulis anguste linearibus; nervis secundariis simplicibus furcatisve; indusiis exsertis; rhachi primaria anguste plane alata; stipite marginato basi longe nigro piloso; rhizomate scandente nigro.

Trichomanes repens Schott in *Hb. Mus. Pal. Vindob. n. 4480.*

Trichomanes radicans Kaulf. *Enum. Fil. 267* (planta brasiliensis). *Hook. Sp. Fil. I. 125* (quoad plantam brasiliensis.). *Mart. Herb. Fl. Brasil. n. 389. Kunze Commentar. ad Martii Herb. Fl. Brasil. in Flora od. allg. bot. Zeit. 1839. I. Beibl. 53. Moritz Pl. exsicc. n. 275.*

Trichomanes scandens Raddi *Syn. Fil. Brasil. n. 143. Ejusd. Fil. Brasil. 65.*

VAR. β . *STIPITATUM* frondibus longe stipitatis, segmentis primariis distinctius petiolatis, remotioribus, inferioribus non minoribus.

Trichomanes scandens Klotzsch in *Linnaea XVIII* (1844). 531 (excl. syn.) et in *Herb. Berol. (planta Karsteniana e Columbia n. 31).*

Trichomanes radicans Spruce *Coll. n. 2181.*

RHIZOMA scandens, pluripedale, 1 lin. crassum, teres, subtus dense fusco-tomentosum, supra pilis longis nigris obsitum. STRIPES plerumque 6 lin., rarius 15 lin. (in variet. β . usque ad 5 poll.) longus, diametro $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin., teres, marginatus, olivaceus, basi pilis longis nigris vestitus. RHACHIS PRIMARIA teres, apicem versus gracilis, flexuosa, a basi ad apicem anguste — interdum etiam latius alata, ala plana, rarissime subundulata; SECUNDARIAE prominulae, alatae. LAMINA 6—12 poll. ultra longa, $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$

poll. lata, basi saepe angustata, glabra, membranacea, in planta sicca nigro-viridis, opaca, e cellulis hexagonis elongatis interdum indistinctis, nunc ubique granulis brunnescentibus densissime impletis, nunc medio vacuis pellucidis, parietibus saepe crassis brunneis apparentibus, re vera hyalinis strictis composita. SEGMENTA PRIMARIA numerosa, infima interdum 6 lin., media non raro 2—3 poll. longa, 9—15 lin. lata, interstitiis in eodem latere circiter 9-linearibus (in var. β . 15-linearib.), alterna, infima saepe reflexa, media superioraque patula, stricta curvatave. SEGMENTA SECUNDARIA inferiora circiter 9 lin. longa, 4—5 lin. lata, alterna, patula, profunde pinnatipartita, decurrentia, non raro imbricata. LACINIAE inferiores 2—3 lin. longae, apice divergentes. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, supra parum prominens. NERVI SECUNDARIJ patuli, repetite furcati. INDUSIA basi interiore laciniarum insidentia, exserta, 1 lin. longa, cylindracea vix curvata, membranacea, nigro-olivacea, ore patente saepe hypocraterimorpha. RECEPTACULUM capillaceum, indusio duplo longius.

Habitat in sylvis aboriginibus ad arbores vetustas et putridas Brasiliae meridionalis: Sellow, Schott, Langsdorff, Claussen n. 103, Pr. Neovidensis, Wickström, M. (Herb. Fl. Brasil. n. 389), in Serra do Registro: Beyrich; ad Mogy das Cruces, prov. S. Pauli: M.; prope Ilheos, prov. Bahiensis: Luschnath; in prov. Paraënsi et do Alto Amazonas ad Ega, secus fluvium Japurá, alte scandens in arboribus ad Indorum Juri pagum: M.; — in Bolivia ad Yuracares: d'Orbigny n. 287; in Venezuela: Moritz n. 275. — var. β . prope San Gabriel da Cachoira ad Rio Negro Brasilia borealis: R. Spruce n. 2181; — Venezuela: Karsten n. 31 (2); in Colonia Tovar: Moritz n. 90.

ADNOTATIO. Verum *Trichomanes radicans* Swartz ex Jamaica, quocum planta nostra ab auctoribus plurimis confusa est, differt: frondibus minoribus, obscure viridibus, subflaccidis; lamina lanceolata longe acuminata; segmentis secundariis manifeste imbricatis, inferioribus late ovatis obtusis; rhachi primaria gracili flexuosa anguste plane vel undulato-alata.

B. Rhizoma robustum, repens vel adscendens, radiculis validis longis instructum. Frons longe stipitata, stipite tereti non alato.
Sp. 32—38.

32. TRICHOMANES SCANDENS LINN. frondibus distantibus erectis flaccidis viridi-brunnescentibus longe stipitatis; lamina ovato-lanceolata acuminata bipinnatisecto-pinnatipartita pilosa; segmentis primariis petiolatis lanceolatis acuminatis falcatis, secundariis inferioribus subrhomboidalibus profunde pinnatipartitis decurrentibus; laciniis oblongo-linearibus obtusis, apice incisus, ciliatis; nervis secundariis uni-bifurcatis; indusiis immersis strictis infundibuliformibus, ore subbicornibus; rhachi primaria non alata stipiteque teretibus rubiginosis, pilis longis ferrugineis obsitis; rhizomate repente nigro.

Trichomanes scandens Linn. Sp. Pl. 1562. Swartz Syn. Fil. 144. Willd. Sp. Pl. V. 513. Presl Hymenophyll. 16 (excl. syn.). Hook. Sp. Fil. I. 140. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 437. Sloane Jam. I. 96. tab. 58.

Trichomanes radicans Herb. Willd. n. 20203. fol. 1. (specimen sterile).

RHIZOMA repens $\frac{3}{4}$ lin. crassum, teres, nigrum, pilis brevibus ferrugineis adpressis vestitum, deorsum agens hic illic RADICULAS validas nigras. STRIPES gracilis, 2—2 $\frac{1}{2}$ poll. longus, diametrum vix $\frac{1}{2}$ lin. attingens, teres, rubiginosus, pilis longis laete ferrugineis sparse obsessus. RHACHIS PRIMARIA forma colore indumentoque stipiti similima, apicem versus solummodo alata, flexuosa; SECUNDARIAE prominulae, ubique alatae. LAMINA 5—8 poll. longa, circiter 2 $\frac{1}{2}$ poll. lata, membranacea, statu sicco viridi-brunnescentis opaca, e cellulis amplis distinctissimis hexagonoideis subrectangulis flavo-virentibus, plerumque medio vacuis pellucidissimis, ad parietes strictos hyalinos circum circa utriculo primordiali contracto badio instructis (igitur parietes crassissimi apparent) composita. SEGMENTA PRIMARIA numerosa, usque ad 2 poll. longa, 6 lin. lata (infima vix minora), interstitiis in eodem latere 9-linearibus remota, alterna, erecto-patentia incurvata, flaccida, petiolata, utrinque sparse pilosa. SEGMENTA SECUNDARIA inferiora

Hymenophyll.

6—8 lin. longa, 2—3 lin. lata, subrhomboidalibus, obtusa v. acuminata pinnatipartita, superiora lineari-lanceolata incisa, summa subintegra. LACINIAE inferiores circiter 2 lin. longae, lineari-oblongae, incisae, superiores integrae, apice incisae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, brunnescentis. NERVI SECUNDARIJ patuli, repetite furcati. INDUSIA in latere interiore laciniarum 1 lin. longa, membranacea. RECEPTACULUM exsertum.

Habitat in Brasilia: Wickstroem, Langsdorff (Herb. Martii). — In insula Jamaica: Sloane, Swartz et alii.

33. TRICHOMANES PRIEURII KUNZE frondibus aggregatis grandissimis erectis; lamina triangulari-ovata acuminata tripinnatisecto-pinnatifida; segmentis primariis lanceolatis acuminatis, secundariis lineari-lanceolatis obtusis decurrentibus, tertiaris linearibus pinnatifido-incisus; laciniis anguste linearibus acutis brevibus; nervis secundariis simplicibus, supra immersis, indistinctis; indusiis exsertis deflexis aequaliter cylindraceis, ore patentissimo hypocraterimorphis; rhachi primaria supra canaliculata pilosa; stipite valido subquadrangulari sparse piloso; rhizomate robusto adscendente.

Trichomanes Prieurii Kunze Analecta Pterid. 48. Kunze Commentar. ad Martii Herb. Flor. Brasil. in Flora od. allg. bot. Zeit. XXII. (1839). 1. Beibl. 53. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 532. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 403. sub n. 59. Presl Epimel. bot. 17.

Trichomanes elegans Rich. in N. Act. Soc. H. n. Paris. I. 114. Swartz Syn. Fil. 145.

Trichomanes lastreoides Presl Hymenophyll. 15.

Trichomanes nigrescens Pohl in Hb. Vindob.

Trichomanes anceps Hook. Spec. Fil. I. 135. tab. 40, C. fig. 1. 2. (excl. exclud. et var. β . tab. laud. fig. 3.).

RHIZOMA adscendens, robustum, 2 lin. crassum, fuscum, pilis fusconigris dense vestitum, deorsum emittens radículas numerosas validas longasque glabrescentes parum fibrillosas. STRIPES usque pedalis et ultra, rigidus, basi diametrum 1 $\frac{1}{2}$ lin. attingens, erectus, supra planus et apicem versus canaliculatus, subtus convexus, ad basin dense pilosus, superne glabrescens, fusco-olivaceus, interdum nigricans. RHACHIS PRIMARIA supra profunde canaliculata, ferrugineo-pilosa, subtus lata, convexiuscula ac glabra, saepe apicem versus curvata. LAMINA 6—12 poll. longa, ad basin 4—8 poll. lata, dense coriacea, statu sicco nigricans, opaca, e cellulis hexagono-parenchymatosi plerumque minus distinctis impellucidis obscure brunneis granulis impletis, rarissime medio vacuis pellucidis, parietibus strictis hyalinis composita. SEGMENTA PRIMARIA numerosa, petiolata, infima 4—5 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ —2 poll. lata, interstitiis in eodem latere circiter 15-linearibus remota, alterna, patentissima, deorsum curvata; superiora magis magisque approximata et decrecentia, patula. SEGMENTA SECUNDARIA sessilia, infima 1—2 poll. longa, 6—10 lin. lata, alterna, patula, plerumque stricta; TERTIARIA circiter 3 lin. longa, 1 lin. lata, LACINIS 1 lin. longis fissa. NERVUS PRIMARIUS strictus, supra gracilis non prominens, subtus convexus. NERVI SECUNDARIJ patuli, simplices et indistincti. INDUSIA basi interiore segmentorum tertiorum insidentia, 1 lin. longa, coriacea, nigricantia. RECEPTACULUM setaceum, strictum, testaceum, indusio quintuplo longius.

Species insignis amplitudine, colore nigricante, segmentis primariis remotis plerumque deorsum curvatis, rhachibus supra canaliculatis ferrugineis pilosis a congeneribus facile distinguitur.

Habitat ad arbores sylvarum primaevarum, in insula S. Catharinae: Gaudichaud; in Brasilia meridionali ad Rio do San Antonio: Sellow (Hb. Berol. B. 706. c. 93); prope Rio de Janeiro: Pohl n. 4482; prope Ilheos, prov. Bahiensis: Luschnath, M. Hb. Fl. Bras. n. 387; ad amnem Jui et alibi in ditone fluminis Japurá, prov. do Alto Amazonas: M.; — in Guiana gallica: Leprieur; in Guiana anglica, ad montem Camuku: Rich. Schomburgk n. 1173 (partim); in insula St. Vincentii: Guidding; in insulis Guadeloupe et Trinitatis (e Kunze).

34. *TRICHOMANES MANDIOCCANUM* RADDI frondibus aggregatis erectis; lamina triangulari-ovata acuminata tripinnatifecto-pinnatifida glaberrima; segmentis primariis inferioribus triangulari-lanceolatis, secundariis suboppositis late lanceolatis, tertiariis linearibus pinnatifido-incisis; laciniis lanceolatis acutis obtusisve, statu sicco falcatis deflexis; cellulis distinctis ubique papillis multis minutis punctatis; nervis secundariis supra immersis; indusiis exsertis parum reflexis aequali-cylindraceis, ore minus aperto et minus crenato coriaceis; stipite tereti rhachibusque non alatis, secundariis supra immersis; rhizomate adscendente.

Tabula nostra XVIII. fig. 12.

Trichomanes Mandioccanum Raddi Fil. Brasil. 64. tab. 79. fig. 2. C. Müller in bot. Zeit. XII (1854). 747 et 750.

Trichomanes rigidum Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 142. Hook. Sp. Fil. I. 133 (quoad syn. Raddi et plant. Brasil., sed exclus. ceteris). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 402.

RHIZOMA adscendens, robustum, $1\frac{1}{2}$ lin. crassum, fuscum, pilis nigro-purpureis dense obsitum, deorsum emittens radículas perlongas validas parum fibrillosas subglabras. STIPES usque ad 6 poll. longus, rigidus, diametro 1 lin., erectus, teres, utrinque linea prominente notatus, sparse pilosus mox glabrescens, fusco-olivaceus. RHACHIS PRIMARIA inferne teres, stricta, superne tantum angustissime alata et supra immersa, colore indumentoque stipitis; SECUNDARIAE supra immersae anguste alatae, scabrae, subtus prominentes glabrae. LAMINA 4—5 poll. longa, basi ubi latissima 3—4 poll. lata, subcoriacea, statu sicco viridis, opaca, e cellulis simplicibus hexagonis irregularibus distinctis obscure viridibus dense impletis, rarius medio vacuis et tum parum pellucidis, ubique papillis multis minutis punctatis, parietibus satis crassis serpentino-flexuosis hyalinis composita. SEGMENTA PRIMARIA numerosa subsessilia, infima $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 9—12 lin. lata, interstitiis in eodem latere 5-linearibus; inferiora opposita, superiora alterna, infima patentissima, superiora sensim-minora, patula, subfalcata. SEGMENTA SECUNDARIA inferiora 6—9 lin. longa, circiter 3 lin. lata, alterna, patula; TERTIARIA circiter 2 lin. longa, 1 lin. lata, in LACINIIS $\frac{1}{2}$ lin. longas fissa. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, supra immersus, subtus parum prominens. NERVI SECUNDARIJ patuli, simplices vel furcati, supra immersi. INDUSIA basi interiore segmentorum tertiorum insidentia, 1 lin. longa, coriacea, obscure viridia. RECEPTACULUM robustum, curvatum, testaceum, indusio triplo longius.

Proxime affine *T. rigidum*, a quo vero rhachibus secundariis et nervis supra immersis, indusiis aequali-cylindricis et imprimis cellulis ubique papillis multis minutis punctatis differt.

Habitat in sylvis opacis Serra d'Estrella, praecipue prope torrentes ad arborum radices: Raddi, Schott (Hb. Vindob. n. 4483 et 4484), Langsdorff, d'Orbigny, M., Gardn. n. 63; ad arbores locis humidis prov. S. Pauli: M.; — in Venezuela prope Merida et in Colonia Tovar: Moritz n. 147.

35. *TRICHOMANES RIGIDUM* SWARTZ frondibus caespitosis erectis; lamina triangulari-ovata acuminata tripinnatifecto-pinnatifida glaberrima; segmentis primariis inferioribus triangulari-lanceolatis, secundariis alternis late lanceolatis, tertiariis linearibus pinnatifido-incisis; laciniis angustissime linearibus acutis, statu sicco falcatis deflexis; cellulis indistinctis glaberrimis; nervis secundariis supra prominentibus; indusiis

exsertis deflexis infundibuliformibus brevibus, ore patentissimo subhypoeraterimorphis membranaceis; stipite tereti rhachibusque non alatis, secundariis supra prominentibus; rhizomate adscendente.

Trichomanes rigidum Swartz Fl. Ind. Occid. III. 1738. Ejusd. Syn. Fil. 144. Hedw. Fil. Gen. et Sp. tab. 2. Willd. Sp. Pl. V. 512. Hook. Sp. Fil. I. 133 (quoad plantam Antillarum, sed excl. ceteris). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 402 (excl. exclud.). Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 532 (quoad plantam Schomburgkianam). C. Müller in bot. Zeit. XII (1854). 745 et 749.

RHIZOMA adscendens, minus robustum quam in *T. Mandioccano*, fuscum, pilis nigro-purpureis dense obsitum, radículas numerosis filiformibus longis multo-fibrillosis fuscis subglabris instructum. STIPES gracilis, 2—4 poll. longus, diametrum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. attingens, erectus, teres, utrinque linea prominente notatus, sparse pilosus mox glabrescens, olivaceo-fuscus rubicundus. RHACHIS PRIMARIA SECUNDARIAEQUE teretes (i. e. utrinque prominentes), flexuosae, ad extremum tantum angustissime alatae, supra asperae, subtus glabrae, rubicundo-brunnescentes. LAMINA $2\frac{1}{2}$ —5 poll. longa, ad basin $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. lata, statu sicco sordide viridis, opaca, e cellulis hexagonis irregularibus indistinctis subimpellucidis viridibus granulis impletis, rarissimo medio vacuis pellucidis, glaberrimis, parietibus satis crassis flexuosis hyalinis composita. SEGMENTA PRIMARIA numerosa, subsessilia, infima 1—2 poll. longa, 6—12 lin. lata, interstitiis 3—6-linearibus in eodem latere remota, inferiora opposita, superiora alterna, omnia patula, inferiora falcata. SEGMENTA SECUNDARIA inferiora 4—8 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ —3 lin. lata, alterna, patula, TERTIARIA circiter 3 lin. longa, 1 lin. lata, in LACINIIS 1 lin. longas fissa. NERVUS PRIMARIUS flexuosus utrinque prominens. NERVI SECUNDARIJ patuli, simplices vel furcati, etiam utrinque prominentes. INDUSIA basi interiore segmentorum tertiorum insidentia, 1 lin. longa, viridia, superne membranacea, non raro rubicunda. RECEPTACULUM robustum, curvatum, testaceum, indusio duplo longius.

Habitat ad arborum radices, prope Yuracares, in Chiquitos Boliviae: d'Orbigny; in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 1172 (partim); in Jamaica: Swartz; in Guadeloupe: L'Herminier, Richard. — Verisimiliter etiam Brasiliae incolae.

36. *TRICHOMANES FIRMULUM* PRESL frondibus aggregatis erectis parvis; lamina oblongo-lanceolata acuminata pinnatifecto-pinnatifida glabra; segmentis subpetiolatis ovatis s. ovato-lanceolatis profunde pinnatifiditatis; laciniis linearibus pinnatifido-incisis; laciniulis linearibus, statu sicco subfalcato-deflexis; nervis secundariis robustis simplicibus furcatisve elevatis; indusiis exsertis strictis infundibuliformibus, ore patente repandis; stipite rhachique non alatis teretibus sparse pilosis; rhizomate adscendente.

Trichomanes firmulum Presl Hymenophyll. 16 et 46. Ejusd. Epim. bot. 17.

RHIZOMA adscendens, superne pilis obsitum, deorsum radículas multis fascis pilosis parum fibrillosis. STIPES 6—9 lin. longus, diametro $\frac{1}{4}$ lin., aequae ac RHACHIS teres, sordide cinnamomeus, pilis brevibus adpersus. LAMINA circiter 2 poll. longa, 6—9 lin. lata, coriacea, in planta sicca viridi-brunnescens, e cellulis magnis subhexagonis v. saepius rectangulis pallide viridi-brunnescentibus, plerumque medio vacuis pellucidissimis, parietibus satis crassis strictis hyalinis, ubique papillis multis minutis punctatis composita. SEGMENTA 3—6 lin. longa, 2—4 lin. lata, interstitiis 2-linearibus remota, inferiora opposita patulae. LACINIAE maximae 2—3 lin. longae, 1 lin. latae, patulae, in quovis latere 3—4. NERVUS PRIMARIUS flexuosus (sicut NERVI SECUNDARIJ), utrinque elevatus, robustus. INDUSIA basi interiore laciniarum insidentia, solitaria, vix 1 lin. longa, sessilia, viridia v. cinnamomea. RECEPTACULUM crassiusculum, exsertum, subclavatum.

Habitat in Serra d'Estrella: Beyrich, Gardner n. 205, Gaudichaud.

37. *TRICHOMANES CELLULOSUM* Klotzsch frondibus subaggregatis longe stipitatis erectis rigidis; lamina ovali-oblonga tripinnatisecta, glaberrima; segmentis primariis secundariisque breviter petiolatis alternis ovatis obtusis, tertiariis dichotome-fissis; segmentulis linearibus planis obtusis apice integris; nervo oculo nudo conspicuo; indusiis brevissime pedicellatis, pedicello alato, infundibuliformi-campanulatis marginatis, ore paululum dilatatis; rhachibus omnibus stipiteque tereti manifeste alatis; rhizomate adscendente crasso fusco-piloso.

Tabula nostra XVIII. fig. 13.

Trichomanes cellulosum Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 531. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 418.

Trichomanes (Macroglena) cellulosum Prest die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 25 (in nota).

RHIZOMA adscendens, diametrum 1 lin. attingens, pilis fuscis subrubiginosis dense obsitum, radiculis robustis numerosis perlongis ramosis atro-fuscis glabris praeditum. FRONDES satis approximatae, subaggregatae, erectae. STIPES 1—3 poll. longus, teres, glaber, basi interdum pilosus, fusco-purpurascens, fere usque ad basin anguste alatus. ALAE e seriebus cellularum circiter tribus compositae. RHACHES omnes teretes, flexuosae alataeque. LAMINA 1—3 poll. longa, circiter 1 poll. lata, membranacea, obscure olivacea, e cellulis magnis hexagono-parenchymatosis, serie cellularum rectangularum unica limbatis, omnibus utriculo primordiali contracto, pallide badio et granulis flavescens impletis, medio minus pellucidis, parietibus strictis hyalinis composita. SEGMENTA PRIMARIA inferiora 6—12 lin. longa, circiter 6 lin. lata, interstitiis 4-linearibus inter se distantia, alterna, patula, petiolata, bipinnatisecta. SEGMENTA SECUNDARIA circiter 3—5 lin. longa, 3 lin. lata. SEGMENTULA 1—1½ lin. longa, ⅓ lin. lata. NERVUS oculo nudo conspicuus, compressus, fuscus, infra apicem segmentulorum evanescentis. INDUSIA ad basin segmentorum secundariorum solitaria, cum pedicello 1½ lin. longa, coriacea, fusca, interdum lateritia; pedicellus alatus, aetate senili subnudus. RECEPTACULUM robustum, indusio triplo longius.

Habitat in vicinia Barra, prov. do Alto Amazonas: R. Spruce n. 873 (T. anceps Hook. var.) et prope Panuré ad Rio Uaupés: R. Spruce n. 2533; — in Guiana anglica ad montes Canuku: Rich. Schomburgk n. 1186.

38. *TRICHOMANES FILIFORME* J. W. STURM frondibus distantibus longe stipitatis erectis rigidis; lamina oblongo-lanceolata tripinnatisecta glaberrima; segmentis primariis inferioribus decrescentibus cum secundariis brevissime petiolatis alternis ovatis, tertiariis dichotome fissis intricatis; nervo oculo armato solum conspicuo; indusiis longe pedicellatis infundibuliformibus, ore dilatatis, pedicello nudo; rhachibus stipiteque superne linea angustissima alatis; stipite tereti robusto scabro inferne piloso; rhizomate repente crasso ferrugineo piloso.

Tabula nostra XVIII. fig. 14.

RHIZOMA repens flexuosum, 1 lin. crassum, fuscum, pilis ferrugineis densissime obsitum, emittens radículas filiformes perlongas fibrillosas nigras sparse pilosas. FRONDES satis distantes, erectae. STIPES plerumque 1 poll. longus, diametro ⅓ lin., teres, ad basin dense, superne sparse pilosus, fusco-purpurascens, utrinque linea prominente notatus, sed nunquam

alatus. RHACHIS PRIMARIA teres, stricta, colore stipitis et angustissime alata; ALA e serie unica cellularum composita. LAMINA 1½—3 poll. longa, 9 lin. lata, membranacea, in planta sicca olivacea, e cellulis magnis hexagono-parenchymatosis, serie cellularum subrectangularum unica limbatis, omnibus ad parietes strictos hyalinos utriculo primordiali contracto pallide flavo-brunnescente impletis, medio vacuis pellucidissimis composita. SEGMENTA PRIMARIA inferiora plerumque decrescentia, media 5 lin. longa, 3 lin. lata, interstitiis 2-linearibus in eodem latere inter se remota, alterna, subpatentissima, brevissime petiolata, bipinnatisecta, valde intricata. SEGMENTA SECUNDARIA 4 lin. longa, 3 lin. lata. SEGMENTULA 1—2 lin. longa, ¼ lin. lata, capillacea, apice saepe curvata furcataeque. NERVUS statu sicco oculo nudo vix conspicuus, compressus, pallide fuscus, infra apicem segmentulorum evanescentis. INDUSIA in basi segmentorum secundariorum solitaria, cum pedicello 1 lin. longa, coriacea, fusca; PEDICELLUS nudus. RECEPTACULUM curvatum, minus robustum, pars exserta indusio triplo longior.

A *Trichomanes cellulosum* proximo atque simillimo differt: rhizomate non adscendente sed longe repente, stipite non alato, rhachi primaria stricta non flexuosa, segmentulis magis approximatis subpatentissimis valde intricatis angustioribus saepissime capillaceis.

Habitat prope San Gabriel da Cachoeira, ad Rio Negro: R. Spruce n. 2278 (T. trichoides).

C. Rhizoma tenue filiforme, repens, tomentosum, radiculis setaceis.

α. Stipes anceps. Sp. 39—41.

39. *TRICHOMANES PYXIDIFERUM* LINN. frondibus mediocribus stipitatis remotis rigidis brunnescentibus; lamina ovata v. ovato-lanceolata acuminata bipinnatipartito-pinnatifida glabra; laciniis primariis oblongis obtusis decurrentibus; secundariis lineari-oblongis, inferioribus profunde incis; laciniulis anguste linearibus apice excisis; indusiis strictis cylindraceo-infundibuliformibus subalatis, ore patentissimo bilobis hypocraterimorphis; rhachi plane alata; stipite ancipite manifeste alato, basi glabro; rhizomate repente parum fusco-tomentoso, fibrillis longis obsito.

Trichomanes pyxidiferum Linn. Sp. Pl. 1561. Swartz Syn. Fil. 143. Willd. Sp. Pl. V. 508. Hedwig Fil. Gen. et Sp. tab. 3. fig. 2.? Hook. et Grev. Icon. Fil. II. t. 206. Hook. Sp. Fil. 1. 124 (excl. variet.). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 329. C. Müller ibid. XII (1854). 751 et 753. Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 251.

Filicula pyxidifera Plum. 74. tab. 59. fig. E.

RHIZOMA longum, repens, filiforme, parum fusco-tomentosum, cum radiculis tenuibus numerosis subglabris. STIPES 6—12 lin. longus, tenuis, compressus, late et subundulato-alatus, ad basin glaber. RHACHIS semiteres, supra non prominens, cinnamomea, utrinque corpusculis brunneis brevibus adpersa, late planeque alata. LAMINA 1—2½ poll. longa, 6—12 lin. lata, plerumque e basi lata ovato-lanceolata, raro apicem versus angustata, glaberrima, membranacea, statu sicco viridi-brunnescentis, opaca, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosis elegantissimis, medio vacuis pellucidissimis, ad parietes strictos valde hyalinos granulis pallide viridibus dense impletis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere 7—9, maximae 6—9 lin. longae, circiter 3 lin. latae, alternae, diffusae, basi superiore sinu acutissimo perangusto disjunctae inferiore decurrentes. LACINIAE SECUNDARIAE 1½ lin. longae, 1 lin. latae, patulae. LACINULAE 1½ lin. longae, ½ lin. latae, apice obtuso subtruncatae, emarginatae, planae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus. NERVI SECUNDARIJ patuli, uni-bifurcati, omnes colore rhachis. INDUSIA in latere interiore lacinarum secundariorum infe-

riorum exserta vel immersa, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, brunnescentia. RECEPTACULUM setaceum, curvatum, exsertum, indusio duplo longius.

Quamquam *T. eximio* peraffine, tamen amplitudine dimidio minore, stipite ad basin usque alato ab eo distingui potest. Cum *T. emarginato* ob formam indusiorum non confundendum.

Habitat in sylvis ad rupes prope Rio de Janeiro: Beyrich; in Serra dos Orgãos (teste Brackenridge); et alibi in udibus sacis sylvarum super Serra do Mar: M.; in prov. Maranhão, Piauí et Pará: M.; — in insula St. Domingo: Plumier; in Jamaica: Swartz; St. Kitts in Mount Misery: Breutel.

40. TRICHOMANES EXIMIUM KUNZE frondibus remotis rigidis longe stipitatis olivaceis; lamina oblongo-lanceolata acuminata, basin versus saepe longe angustata, bipinnatipartito-pinnatifida glaberrima; laciniis primariis mediis ovato-oblongis acuminatis decurrentibus, inferioribus saepe valde diminutis, denique rudimentaribus; secundariis lineari-oblongis profunde incisus; lacinulis anguste linearibus, apice excisis; indusiis anguste cylindraceis alatis, ore patente breviter bilobis hypocraterimorphis; rhachi plane alata; stipite ancipite; rhizomate repente fusco-tomentoso longe fibrilloso.

Tabula nostra XVIII. fig. 2.

Trichomanes eximium Kunze in *bot. Zeit.* V (1847). 349 in adnotatione ad *Trichomanem* Kunzeanum (nomen). *Klotzsch in Linnaea* XX (1847). 437.

Trichomanes ambiguum Klotzsch in *Linnaea* XVIII. (1844). 531.

Trichomanes diaphanum Kunth in *Humb. et Bonpl. Nov. Gen. Amer.* I. 25 (fide specimenis originalis Hb. Berol.).

RHIZOMA repens, filiforme, cum radiculis multis fuscis tomentosis. STIPES $\frac{3}{4}$ —2 poll. longus diametro $\frac{1}{2}$ lin., anceps, superne solummodo angustissime alatus, fusco-olivaceus, sparsim verrucosus. RHACHIS semiteres, supra non prominens, fusca, verrucis brunneis punctatis, late plane alata. LAMINA 2—5 poll. longa, 12—18 lin. lata, olivacea, raro nigro-olivacea, opaca, membranacea, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosi, aut ubique granulis magnis viridibus aut ad parietes tantum impletis, tum medio vacuis pellucidissimis, parietibus strictis hyalinis composita. LACINIAE PRIMARIAE, quarum in quovis latere circiter 18 adsunt, maximae 9—12 lin. longae, 3—5 lin. latae (inferiores saepe diminutae vel rudimentares, infimae interdum semilineares) alternae, patulae, basi superiore angulo acutissimo disjunctae inferiore decurrentes. LACINIAE SECUNDARIAE in quovis latere 3—5, patulae, inferiores 2 lin. longae, 1 lin. latae, in latere interiore indusia exserta gerentes. LACINULAE $\frac{1}{2}$ lin. longae et latae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, supra non prominens; SECUNDARIUS patuli, uni-plurifurcati. INDUSIA 1 lin. longa, fusco-olivacea, laminam totam occupantia, in quovis lacinia primaria 1—3. RECEPTACULUM setaceum, exsertum, ob fragilitatem saepissime decurtatum.

Teste Cel. Dr. Moritzio planta odorem Harengi marini habere dicitur. Lamina oblongo-lanceolata a *T. pyxidifero*, et rhizomate radiculoso minus dense et fusco-tomentoso a *T. emarginato* certe distinguendum est.

Habitat in truncis emortuis prope Rio de Janeiro: Beyrich; — in Venezuela prope Merida et in Colonia Tovar: Moritz n. 148; in Cuba orientali: C. Wright n. 906.

41. TRICHOMANES EMARGINATUM PRESL frondibus stipitatis flaccidis pallide olivaceis; lamina oblongo-lanceolata acuminata bipinnatipartito-pinnatifida, glabra; laciniis primariis oblongis obtusis strictis ad marginem aliquando subundulatis decurrentibus; secundariis lineari-oblongis, inferioribus profunde incisus; lacinulis linearibus cavis, apice obtuso profunde emarginatis; indusiis brevibus infundibuliformibus alatis, ore dilatato brevissime bilobis; rhachi undulato-alata; stipite anguste alato ancipite, basi nigro-piloso; rhizomate repente densissime nigro-tomentoso.

Tabula nostra XVIII. fig. 1.

Trichomanes emarginatum Presl *Die Gefäßbündel im Stipes der Farn* 27 (in nota). *Ejusd. Epim. bot.* 11. tab. 5. fig. B. *C. Müller in bot. Zeit.* XII (1854). 754.

Trichomanes pyxidiferum Raddi *Syn. Fil. Brasil.* n. 141 et *Fil. Brasil.* 64 (excl. syn.).

Trichomanes pyxidiferum β . *elongatum* Hook. *Sp. Fil.* I. 124.

Trichomanes retusum Pohl in *Herb. Mus. Pal. Vindobon.* n. 4481.

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, densissime nigro-tomentosum, rarissime hinc inde radiculam proferens. STIPES 6—12 lin. longus, tenuis, angustissime alatus, anceps, ad basin pilis nigris, ad apicem verrucis brunneis punctatus. RHACHIS subsemiteres, pallide cinnamomea vel olivacea, anguste sed manifeste undulato-alata, sparsim verrucosa. LAMINA $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ poll. longa, 9—12 lin. lata, e basi latiore s. angustiore oblongo-lanceolata, apice plus minusve angustata, glaberrima, pallide olivaceo-viridis, opaca, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosi, granulis viridibus imprimis ad parietes tenues strictos hyalinos impletis, medio vacuis pellucidissimis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere usque ad 13, maximae circiter 8 lin. longae, 4 lin. latae, alternae, patulae, ovato-oblongae, basi superiore latissime (sinu rotundato) adnatae inferiore anguste decurrentes. LACINIAE SECUNDARIAE circiter 2 lin. longae, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. latae, patulae, integrae v. partitae. LACINULAE 1 lin. longae, $\frac{1}{2}$ lin. latae, lineares, apice obtuso rotundatae profunde emarginatae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, utrinque corpusculis brunneis brevibus clavatis sparse obtectus. NERVI SECUNDARIUS patuli, simplices uni-bifurcati. INDUSIA ad basin laciniarum secundariarum inferiorum solitaria, exserta, $\frac{3}{4}$ lin. longa, pallide viridia. RECEPTACULUM setaceum, exsertum, indusio subtriplo longius. — Rhachi undulato-alata, indusiis brevibus manifeste infundibuliformibus, tomento rhizomatis basi stipitis dense nigro cum speciebus duabus praecedentibus non confundendum est.

Habitat locis udinisculis in arboribus et in umbra rupium cavarum super montes prov. Rio de Janeiro: Raddi, Gaudichaud; e. g. prope Padre Correa et alibi in Serra d'Estrella: M, Beyrich, Pohl; — in Cuba orientali: C. Wright n. 906.

β . Stipes teres. Sp. 42—44.

42. TRICHOMANES FULVUM KLOTZSCH frondibus caespites densos formantibus remotis adsurgentibus flaccidis; lamina ovato-lanceolata v. lanceolata bipinnatisecta glaberrima; segmentis primariis inferioribus decrescentibus subsessilibus alternis lanceolatis, secundariis inferioribus obovato-cuneatis dichotome fissis; segmentulis linearibus planis obtusis nunquam furcatis, apice emarginatis; nervis secundariis sim-

plicibus furcatisve; indusiis immersis vel anguste marginatis, ore dilatatis; rhachi stipiteque teretibus; rhizomate repente filiformi, cum radiculis pilis longis patentibus fulvis villosis.

Tabula nostra XVIII. fig. 6.

Trichomanes fulvum Klotzsch in *Herb. Reg. gen. Berol.*

Trichomanes angustatum Hook. *Spec. Fil. 1. 141 (ad partem)*. Kunze in *bot. Zeit. V (1847). 437 (partim)*.

RHIZOMA repens, filiforme, fuscum, fulvo-tomentosum, radiculis numerosis pilis longis patentibus fulvis dense villosis praeditum, massam densissimam et implicatam formans. FRONDES distantes, adsurgentes. STIPES circiter 1 poll. longus, diametrum $\frac{1}{4}$ lin. attingens, omnino teres, glabrescens, viridis. RHACHIS primaria subteres, supra vix plana, nuda, viridis. LAMINA 2—3 poll. longa, 9—12 lin. lata, membranacea, olivaceo-brunnescens, e cellulis hexagono-parenchymatosi amplis pallide flavo-virentibus, medio plerumque vacuis pellucidis, ad margines saepe granulis impletis, parietibus strictis hyalinis composita; serie unica cellularum rectangularum eodem modo quo reliquae impletarum limbata. SEGMENTA PRIMARIA inferiora parum diminuta, media circiter 6 lin. longa, 4—6 lin. lata, interstitiis 3-linearibus in eodem latere inter se remota, alterna, patula, brevissime petiolata, bipinnatisecta. SEGMENTA SECUNDARIA 4 lin. longa, 2 lin. lata. SEGMENTULA $\frac{1}{2}$ —1 lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, plana, stricta. NERVI elevati olivaceo-brunnescentes, subexcurrentes. INDUSIA ad segmentorum secundariorum basin solitaria, 1 lin. longa, coriacea, olivacea. RECEPTACULUM exsertum, strictum.

Cum *Trichomane tenero* Spreng. multa similia quoad formam frondis segmentorumque habet, sed differt: rhizomate radiculis longe fulvo-villosis instructo, massam densissimam ac implicatam formante.

Planta ut videtur rarissima habitat in Brasilia meridionali, ubi sine indicatione loci natalis legit: Sellow (*Herb. Reg. gen. Berol. n. 3878*).

43. TRICHOMANES TENERUM SPRENG. frondibus distantibus longe stipitatis erectis flaccidis; lamina lanceolata bipinnatisecta glaberrima; segmentis primariis inferioribus decrescentibus brevissime petiolatis alternis lanceolatis, secundariis inferioribus obovato-cuneatis dichotome fissis; segmentulis linearibus planis obtusis nonnunquam furcatis, apice emarginatis; nervis secundariis simplicibus furcatisve; indusiis plerumque omnino immersis interdum solum marginatis, ore dilatatis; rhachi stipiteque supra canaliculatis; rhizomate repente filiformi radiculisque tenuibus fusco-pilosis.

Tabula nostra XVIII. fig. 7. 8.

Trichomanes tenerum Sprengel *Syst. veg. IV. 129. Presl Hymenophyll. 16.*

Trichomanes intermedium Kaulf. *Herb. Presl Hymenophyll. 16. Hook. Sp. Fil. I. 145.*

Trichomanes amabile Fée *Herb. (ex Kunze)*.

? *Trichomanes angustatum* Carmichael in *Linn. Transact. XII. 513. Hook. et Grev. Icon. Fil. II. tab. 166. Presl Hymenophyll. 16. Hook. Sp. Fil. I. 141. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 437.*

RHIZOMA repens, filiforme, fuscum, aequae ac radiculi numerosi tenues dense fusco-pilosum. FRONDES distantes, erectae. Hymenophyll.

STIPES circiter 2 poll. longus, diametrum $\frac{1}{4}$ lin. attingens, semiteres, superne canaliculatus, glaber, viridis. LAMINA 3—6 poll. longa, 6—9 lin. lata. RHACHIS PRIMARIA semiteres, supra canaliculata, nuda, viridis. LAMINA 3—6 poll. longa, 6—9 lin. lata, membranacea, olivacea, e cellulis hexagono-parenchymatosi amplis brunnescentibus subpellucidis, parietibus strictis hyalinis composita; serie unica cellularum rectangularum eodem modo quo reliquae impletarum limbata. SEGMENTA PRIMARIA inferiora plerumque valde diminuta, media 6—9 lin. longa, circiter 3 lin. lata, interstitiis 4-linearibus in eodem latere inter se remota, alterna, patula, petiolata, bipinnatisecta. SEGMENTA SECUNDARIA 3 lin. longa, 2 lin. lata. SEGMENTULA 1—2 lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, plana, stricta. NERVI elevati, olivaceo-brunnescentes, subexcurrentes. INDUSIA ad segmentorum secundariorum basin solitaria, 1 lin. longa, coriacea, olivacea. RECEPTACULUM exsertum, strictum.

Habitat in Serra da Montiqueira: Sellow; in Serra d'Estrella: Langsdorff, Gardner n. 5952; — in Bolivia, prope Yuracares, in Chiquitos: d'Orbigny.

44. TRICHOMANES TRICHOIDEUM SWARTZ frondibus stipitatis erectis; lamina oblongo-lanceolata v. lanceolata tripinnatisecta glaberrima; segmentis primariis inferioribus decrescentibus, mediis saepe dilatatis intricatis, secundariisque petiolatis alternis oblongis, tertiariis dichotome fissis; segmentulis lineari-capillaceis obtusis, apice emarginatis excisive; nervo oculo armato solum conspicuo; indusiis pedicellatis infundibuliformibus marginatis, ore subhypocraeterimorphis; rhachibus stipiteque teretibus; rhizomate repente fusco-tomentoso.

Tabula nostra XVIII. fig. 9.

Trichomanes trichoideum Swartz *Fl. Ind. occ. III. 1741. Ejusd. Syn. Fil. 144. Willd. Sp. Pl. V. 509. Hook. et Grev. Icon. Fil. II. tab. 199. Presl Hymenophyll. 16. Klotzsch in Linnæa XVIII (1844). 531. Hook. Sp. Fil. I. 141. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 438 (in duobus ultimis operibus excl. planta Mexic.). Kunze in Linnæa XXV (1852). 750. C. Müller in bot. Zeit. XII (1854). 713 et 715.*

Trichomanes cuneiforme Schkuhr *Krypt. Gew. 131. tab. 134 (T. pyxidiferum)*.

Trichomanes tenellum Hedwig *Fil. Gen. et Sp. tab. 3. fig. 1.*

Trichomanes (Macroglena) angustissimum Presl *die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 25 (in nota). Ejusd. Epim. bot. 18. tab. 8. fig. A.*

RHIZOMA repens, filiforme, fusco-tomentosum, radiculis mediocribus praeditum. FRONDES distantes, alternae, erectae. STIPES 6—12 lin. longus, diametrum $\frac{1}{5}$ lin. attingens, teres, superne compressus, nudus, viridis. RHACHIS PRIMARIA semiteres, supra subcanaliculata, flexuosa, gracillima, aequae ac RHACHES SECUNDARIAE TERTIARIAEQUE non alata, viridis. LAMINA 2—5 poll. longa, 1—1 $\frac{1}{2}$ poll. lata, membranacea, pallide viridis, e cellulis hexagono-parenchymatosi amplis brunnescentibus subpellucidis omnibus conformibus, parietibus strictis hyalinis composita. SEGMENTA PRIMARIA infima saepe decrescentia, sequentia 1 poll. et ultra longa, 6 lin. lata, interstitiis 4-linearibus in eodem latere inter se remota, alterna, patula, petiolata, bipinnatisecta, intricata. SEGMENTA SECUNDARIA circiter 3 lin. longa, 2 lin. lata. SEGMENTULA 1 lin. longa, $\frac{1}{5}$ lin. lata, capillacea, apice saepe furcata, interdum incurva. NERVUS

oculo nudo non conspicuus, compressus, pallide fuscus, infra apicem segmentulorum evanescens. INDUSIA ad basin segmentulorum secundariorum solitaria, cum pedicello nudo, 1 lin. longa, membranacea, olivacea. RECEPTACULUM tenue, exsertum.

Habitat in Venezuela, prov. Caracas altitudine 4500 ped.: Funck et Schlim in Coll. Linden n. 295, Karsten; in colonia Tovar in truncis emortuis Palmae: Moritz n. 151; in Jamaicae frigidioris umbrosis graminosis subhumidis: Swartz. — Forsan in montibus Guianae brasiliensis detegendum.

ADNOTATIO. In Herb. Willdenowiano n. 20200 tria exemplaria sunt deposita, ex quibus illa ad dextrum et sinistrum collato specimen originali Herb. Schreberiani (nunc Herb. Reg. Monacensis) ad *Trichomanes trichoidium Swartz* pertinent, medium tamen ad *Trichomanes Schiedeanum C. Müller*. — B. Presl medium specimen, ut schedula autographica in Herb. Willd. assertiva ostendit, habebat verum *Trichomanes trichoidium Swartz*, e dextro sinistroque autem novam fecit speciem, quam *Trichomanes angustissimum* descripsit atque depinxit.

OBSERVATIO. *Trichomanes Schiedeanum C. Müller* (bot. Zeit. XII [1854]. 716.) adhuc solummodo in Mexico observatum a *Trichomane trichoides* proximo atque simillimo differt: lamina angustiore; segmentis multo brevioribus; segmentulis duplo latioribus, planis, haud intricatis, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosi viridibus pellucidis, serie cellularum rectangularium unica saepe utriculo primordiali contracto brunneo-virente instructarum limbatis, parietibus hyalinis strictis compositis; nervo oculo nudo conspicuo; indusiis marginatis brevibus pedicellatis, pedicello plerumque alato.

§. 3. Indusia in apice lacinarum immersa vel exserta, ore manifeste biloba. Nervi secundarii aut flabellati furcati aut patuli, simplices, rarius strilis e margine oriundis et libere desinentibus.

A. Lamina simplex, apice squamulosa. Nervi secundarii in superiore laminae parte libere desinentes et squamulas duas oppositas patentes supramarginales gerentes (*Lecanium Pr.*). Sp. 45.

45. TRICHOMANES MEMBRANACEUM LINN. frondibus distantibus breviter stipitatis; lamina simplici obovato-oblonga vel flabellata, basi cuneata integerrima, apice rotundata, subincisa et dentato-lacera squamulosa, squamulis peltato-bilobis; nervis secundariis flabellatis furcatis; indusiis ad apicem laminae immersis lineari-cylindraceis, ore patente bilobis; rhizomate fusco-tomentoso.

Trichomanes membranaceum Linn. Sp. Pl. 1560. Swartz Syn. Fil. 141. Willd. Sp. Pl. V. 499. Hook. Sp. Fil. I. 115. Kunze Farrnkr. I. 212. tab. 88. fig. 1. C. Müller in bot. Zeit. III (1845). 11. tab. 1. Kunze ibid. V (1847). 278.

Lecanium membranaceum Presl Hymenophyll. 12. tab. 1. Ejusd. Gefäßbündel 23. tab. 5. fig. 3.

Adiantum muscosum lichenis petraei facie Plum. Fil. Amer. 83. tab. 101. fig. a.

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, pilis fuscis dense obsitum, radiculis praeditum. FRONDES longe distantes, adpressae (teste Swartzil). STIPES 1—2 lin. longus, subcompressus, pillosus. LAMINA $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ poll. (secundum Hooker usque ad 3 poll.) longa, $\frac{1}{2}$ —1 poll. lata, forma valde variabilis, plerumque e basi cuneata integra obovato-oblonga, saepe inaequilatera, interdum flabellato-orbicularis, nunc (imprimis statu juvenili) omnino integra, nunc plus minusve profunde incisa, lobis obtusis. MARGO aequae ac apex lacero-dentatus, squamis membranaceis brunneis obsitus. SQUAMAE peltato-adnatae, basi in lobos duos reniformes deflexos partitae (conf. tab. 1 in opere Presl supra laudato et C. Müller l. c. fig. 8—10). SUBSTANTIA laminae statu sicco sordide olivacea, membranacea, e cellulis amplis, interdum indistinctis, quadratis vel elongatis pallide brunnescentibus, saepe omnino impletis, rarius medio vacuis pellucidis, parietibus strictis vix hyalinis composita. NERVUS PRIMARIUS latus, mox evanescens. NERVI SECUNDARI

flabellati, subcurvati, repetite furcati excurrentes, raro strilis e margine oriundis evanescentibus interpositis. INDUSIA $1\frac{1}{2}$ lin. longa, subcoriacea, olivacea, lobis parum patentibus deflexisque. RECEPTACULUM setaceum strictum, vix exsertum. — Squamis marginis ab omnibus generis sui speciebus diversissimum.

Planta haec insignissima teste beati Kunzei in Guiana gallica a Leprieur lecta, in Brasiliae septentrionalis regione flumini Amazonum contermina inquirenda et in insulis Antillarum a Plumiero et aliis peregrinatoribus usque ad hoc tempus observata est.

B. Lamina non squamulosa. (*Didymoglossum Desv. et Hemiphtebium Pr.*)

α. Lamina aut linearis aut obovata aut cordato-orbicularis. Sp. 46—49.

46. TRICHOMANES PUNCTATUM POIR. frondibus parvulis adpressis brevissime stipitatis; lamina simplici cordato-orbiculari vel obovata crenato-lobata, lobis obtusatis, margine pilis stellatis sparsim obsita; nervo primario brevissimo in nervos secundarios flabellatos transeunte; indusiis subsolitariis marginalibus semiexsertis cylindraceis, ore patente bilobis, lobis deflexis rufo-limbatis; rhizomate repente fusco-tomentoso.

Trichomanes punctatum Poir. in Encycl. Method. Bot. VIII. 64. Kaulf. Enum. Fil. 261. Hook. et Grev. Icon. Fil. II. tab. 236. Hook. Sp. Fil. I. 116 (excl. var. β.). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 278. Ejusd. Farrnkr. I. 216 (diagnosis). Ejusd. in Linnaea XXI (1848). 236 (excl. planta Kappler. n. 1760).

Didymoglossum punctatum Presl Hymenophyll. 23.

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, fusco-tomentosum. FRONDES adpressae, subimbricatae. STIPES $\frac{1}{2}$ lin. longus, teres, glaber. LAMINA 3—4 lin. longa et lata, plerumque cordato-orbicularis, basi nunc subtruncata, plerumque sinu profundo bilobata, rarius obovata, basi cuneata, margine crenato-lobata, pilis nigris deflexis stellatis sparsim obsita, dense membranacea, statu sicco laete viridis, e cellulis distinctissimis subquadratis, medio saepissime vacuis pellucidissimis, ad parietes granulis pallide virescentibus dense impletis, parietibus strictis hyalinis. NERVUS PRIMARIUS mox in nervos secundarios transiens, viridis. NERVI SECUNDARI flabellati, curvati, repetite furcati, excurrentes, supra prominentes virides. INDUSIA 1 lin. longa, membranacea, viridia, lobis semiorbicularibus deflexis late rufo-limbatis. RECEPTACULUM vix exsertum, setaceum.

Habitat ad Caripi, juxta Pará: Spruce n. 434; — in Guiana batava ad arborum truncos: Weigelt (Herb. Reg. gen. Berol.), Kegel n. 1055 (e Kunze); in insula Martinicae: Poir. et in aliis insulis Antillarum.

47. TRICHOMANES KAPPLERIANUM J. W. STURM frondibus parvulis distantibus stipitatis; lamina simplici aut cordato-orbiculari aut obovata, nunc integra nunc crispato-lobata, lobis obtusatis, margine non pilosis; nervis secundariis remotissimis simplicibus unifurcatisve; indusiis in apice laminae immersis solitariis vel 3—4 cylindraceo-infundibuliformibus, ore patentissime bilobis, nec reflexis nec limbatis; rhizomate repente fusco-tomentoso.

Trichomanes punctatum Kunze (non Poir.) in Kappler Pl. Surinam n. 1760.

Trichomanes pusillum Spruce Coll. n. 435 (ad partem).

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, pilis fuscis dense obsitum, radiculis pilosis praeditum. FRONDES distantes, ad-surgentes. STIPES $\frac{1}{2}$ lin. longus, teres, dense fusco-pilosus. LAMINA 2—5 lin. longa, 2—3 lin. lata, statu juvenili cordato-orbicularis, basi cordata, margine repandula integra, statu senili obovata, basi cuneata in stipitem decurrente, margine

magis minusve crispato-lobata, non pilosa, inferne in latere superiore tantum, imprimis in nervis pilosa, dense membranacea, statu sicco sordide olivacea, e cellulis distinctissimis magnis hexagono-parenchymatosis subrotundatis, medio semper vacuis pellucidissimis, ad parietes strictos hyalinos utriculo primordiali contracto pallide flavo-brunnescente instructis composita. E margine oriuntur lineae paucae, in medio laminae evanescentes. NERVUS PRIMARIUS supra basin versus non prominens, subcanaliculatus, superne et subtus convexus, brunneus, apicem versus in nervos secundarios transiens. NERVI SECUNDARIJ remotissimi, patuli, simplices furcative, ante marginem evanescentes. INDUSIA 1 lin. longa, membranacea, olivacea, lobis parum rotundatis, non limbatis. RECEPTACULUM setaceum, curvatum, indusio duplo longius.

Differt a *Trichomane punctato* Poir. nervis non flabellatis, pilis marginis nullis, indusis immersis.

Habitat ad arborum truncos prope Tanaii, ad Rio Acara, juxta Parã: R. Spruce n. 435 (cum *Trichomane pusillo* Swartz. in eadem arbore intermixte crescens); — in Guiana batava in sylvis regionis interioris: Kappler (Pl. Surinam. ed. Hohenacker n. 1760).

48. TRICHOMANES SPHENOIDES KUNZE frondibus parvulis distantibus, interdum satis longe stipitatis; lamina nunc simplici anguste lineari, nunc subrotunda, plerumque spatulato-oblonga, sinuato-incisa, basi cuneata, margine integro sublobatove pilis stellatis obsita; nervo primario medio laminae evanescente; nervis secundariis flabellato-furcatis curvatisque creberrimis; indusiis in apice laminae 2—3 semiexsertis cylindraceis, ore bilobis, lobis late limbatis; rhizomate repente nigro-fusco tomentosum.

Trichomanes sphenoides Kunze in *Linnaea* IX (1834). 102. *Ejusd. Farrnkr. I. 215. tab. 88. fig. 2. Ejusd. in bot. Zeit. V (1847). 278.*

Hymenophyllum Guadalupeense Spreng. in lit. (fide specim. in Herb. Reg. gen. Berol.)

Trichomanes reptans Hook. et Grev. *Icon. Fil. I. tab. 32* (excl. syn.). Hook. *Sp. Fil. I. 116* (ad partem); Breutel *Coll. (ad partem, altera pars Trichomanes muscoides Sw.)*.

Trichomanes punctatum Hook. l. c. (ad partem).

Didymoglossum sphenoides et Hookeri Presl *Hymenophyll. 23.*

Hemipheblum Hookeri Presl *Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 28* (in nota).

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, densissime nigro-fusco-tomentosum. FRONDES distantes, adsurgentes. STIPES 1—3 lin. longus, teres, ad basin densissime tomentosus. LAMINA 2—5 lin. longa, 1—4 lin. lata, nunc linearis simplex, nunc obovata vel spatulata, basi cuneata in stiptem decurrens, interdum suborbicularis, semper profunde lobato-incisa, glabra, margine pilis sessilibus stellatis aculeiformibus reflexis fuscis obsita, dense membranacea viridis, e cellulis rectangulis distinctis, plerumque medio vacuis pellucidis, ad parietes hyalinos strictos granulis pallide virentibus instructis composita. NERVUS PRIMARIUS pallide brunnescentis, in nervos secundarios transiens. NERVI SECUNDARIJ flabellati, repetite furcati, curvati, excurrentes, valde approximati. INDUSIA 1 lin. longa, viridia; lobi magni, rotundati, saepe reflexi, margine seriebus pluribus cellularum incrassatarum oblongarum fuscarum limbati. RECEPTACULUM exsertum.

Habitat in Surinamo, ad arborum truncos, distr. Parã, ad praedium Berly n. 1206; in insula Jamaica ad Springfield: Wulfschlaegel n. 1258 (Herb. Reg. Monac.); in Sage Mountain: Schomburgk (Herb. Reg. gen. Berol.); Guadeloupe: Balbis (ibidem); in insula S. Kitts monte Miseri: Breutel; Peruvia in sylvis depressis: Poeppig. In Brasilia amazonica detegenda.

49. TRICHOMANES PUSILLUM SWARTZ frondibus parvulis distantibus breviter stipitatis; lamina nunc anguste lineari, nunc ovato-oblonga, nunc spatulato-oblonga, sinuato-incisa, interdum apice fissa, basi cuneata, margine integro sublobatove pilis stellatis obsita; nervo primario flexuoso excurrente; nervis secundariis curvatis simplicibus furcatisve, striis tenuibus a margine oriundis evanescentibusque interpositis; indusiis in apice laminae 1—3 semiexsertis cylindraceo-infundibuliformibus, ore bilobis, lobis manifeste limbatis; rhizomate repente fusco-tomentoso.

Trichomanes pusillum Swartz *Fl. Ind. occ. III. 1729. Hedvig Fil. Gen. et Sp. tab. 3. fig. 5. Swartz Syn. Fil. 142. Willd. Sp. Pl. V. 499. Hook. Sp. I. 117. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 301.*

Didymoglossum pusillum Desv. *Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 330.*

Hemipheblum pusillum Presl *Hymenophyll. 25. tab. 9. Ejusd. Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 28. tab. 5. fig. 14 et in nota.*

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, fusco-tomentosum. FRONDES distantes, adsurgentes. STIPES circiter 1 lin. longus, teres, tomentosus. LAMINA 4—5 lin. longa, 1—3 lin. lata, forma ut videtur pro aetate diversa; statu juvenili anguste linearis vel ovali-oblonga, integra in stiptem decurrens, statu proveciore late ovata, basi non angustata et profunde lobato-incisa, statu senili spatulato-oblonga, basi cuneata, glabra, ad marginem pilis sessilibus 3—6-stellatis aculeiformibus reflexis fuscis obsita. SUBSTANTIA laminae membranacea, olivaceo-viridis, e cellulis hexagonoideis vel rectangulis distinctis, plerumque medio vacuis pellucidissimis, ad parietes tantum utriculo primordiali contracto pallide virescente instructis, parietibus hyalinis strictis elegantissimis composita. E margine oriuntur lineae multae curvatae, quae ad nervos evanescent, e seriebus cellularum densiorum pallide viridium impletarum formantur et ab auctoribus nervi habebantur. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, plerumque excurrentis, brunnescentis. NERVI SECUNDARIJ patuli, curvati. INDUSIA 1 lin. longa, coriacea, olivacea; lobi rotundati, saepe reflexi, margine seriebus pluribus cellularum incrassatarum oblongarum fuscarum limbati. RECEPTACULUM setaceum, exsertum.

Habitat ad arborum truncos secundum flumen Japurã, prov. do Alto Amazonas: M.; prope San Gabriel da Cachoira, ad Rio Negro: R. Spruce n. 2161 et prope Tanaii, ad Rio Acara: R. Spruce n. 435 (cum *Trichomane Kappleriano* intermixte crescens); — in Venezuela: Karsten n. 54 (sub nomine *Didymoglossi* Hookeri); in Jamaica: Swartz et alii.

β. Lamina palmata crispato-lobata. Sp. 50. 51.

50. TRICHOMANES MUSCOIDES SWARTZ frondibus parvulis distantibus stipitatis; lamina obovata pinnatifida vel palmata crispato-lobata; laciniis lobisve obtusis obtuse dentatis, margine pilis furcatis stellatisque sparse obsita; nervis secundariis patulis robustis, tertiariis simplicibus; indusiis in apice laminae exsertis plerumque 4—6 cylindraceis marginatis, ore bilobis, lobis nigricanti-limbatis; rhizomate repente nigro-tomentoso.

Tabula nostra XVIII. fig. 4.

Trichomanes muscoides Swartz *Fl. Ind. occ. III. 1726. Ejusd. Syn. Fil. 141. Willd. Sp. Pl. V. 500. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 300. C. Müller ibid. XII (1854). 735* (sed exclusa descriptione, quae ad *Trichomanes apodum* Hook. et Grev. referenda est. Hanc speciem quam non vidi a *Trichomane muscoides* differre opinor).

Trichomanes hymenoides Hedvig *Fil. Gen. et Sp. tab. 3. fig. 3.*

Didymoglossum muscoides Presl *Hymenophyll. 23.*

Didymoglossum reptans Klotzsch in *Linnaea* XX (1847). 437.

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, pilis nigris densissime obsitum, radiculis ramosis pilosis praeditum. **FRONDES** nunc distantes, nunc approximatae, adsurgentes tenellae. **STIPES** 1—6 lin. longus, inferne teres, superne dilatatus in laminam transiens, densissime nigro-tomentosus. **LAMINA** 3—9 lin. longa et lata, nunc rotundata palmata lobata, basi obtusa breviter decurrens, nunc obovata pinnatifida, basi cuneata in stipitem longe decurrens, glabra, margine pilis distantibus, plerumque stellatis aculeiformibus reflexis nigris obsessa, membranacea, flavo-virens, e cellulis hexagono-parenchymatosis amplis, ad parietes granulis pallide virentibus impletis, medio vacuis pellucidis, parietibus strictis hyalinis composita; ad marginem serie unica cellularum quadratarum limbata. **NERVUS PRIMARIUS** percurrentes, robustus, rufescens. **NERVI SECUNDARIJ** patuli, stricti, **TERTIARIJ** remoti, simplices, pallide rufescentes. **INDUSIA** magna, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, membranacea, brunnescentia, lobi margine cellulis incrassatis oblongis fuscis limbati. **RECEPTACULUM** robustum, longe exsertum.

Habitat ad rupes in locis humidis opacis Merida Venezuelae: Moritz n. 342 (Herb. Reg. gen. Berol.); in insulae Jamaicae locis depressis ad arborum truncos; Swartz (Herb. Willd. n. 20188, Herb. Reg. Monac.). — Probabiliter in Brasiliae septentrionalis provinciis reperitur.

51. **TRICHOMANES PABSTIANUM** C. MUELLER frondibus parvulis distantibus stipitatis; lamina palmata crispato-lobata, lobis obtusatis, margine pilis plerumque bifidis sparse obsita; nervis secundariis repetite furcatis subcurvatis patulis; indusiis in apice laminae exsertis solitariis cylindraceo-infundibuliformibus marginatis, ore paululum patente bilobis; rhizomate repente fusco-tomentoso.

Trichomanes Pabstianum C. Müller in bot. Zeit. XII (1854). 738.

Trichomanes muscoides Kunze in Pabst. Fil. Brasil.

RHIZOMA repens, filiforme, pilis nigro-fuscis dense obsitum, radiculis ramosis pilosis praeditum. **FRONDES** nunc distantes, nunc approximatae, adsurgentes, tenellae. **STIPES** 2—3 lin. longus, inferne teres, dense nigro-tomentosus, superne dilatatus in laminam transiens. **LAMINA** 3—4 lin. longa, 5—7 lin. lata, glabra, margine pilis valde distantibus plerumque bifidis aculeiformibus reflexis nigris obsessa, membranacea, flavo-virens, e cellulis hexagono-parenchymatosis amplis, ad parietes granulis magnis pallide flavo-virentibus impletis, medio vacuis pellucidissimis, parietibus hyalinis strictis composita; ad marginem serie unica cellularum quadratarum limbata. **NERVUS PRIMARIUS** in medio lacinae in nervos secundarios transiens, gracilis, viridis. **NERVI SECUNDARIJ** patuli, subcurvati, **TERTIARIJ** furcati, pallide olivacei. **INDUSIA** magna, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, membranacea, olivacea; lobi margine cellulis incrassatis oblongis fuscis limbati. **RECEPTACULUM** setaceum, indusio longius.

Habitat in sylvis montanis ad pedes truncorum arborum vetustarum prope Desterro insulae St. Catharinae: Pabst n. 267.

γ. Lamina ovata profunde pinnatipartita. Sp. 52. 53.

52. **TRICHOMANES REPTANS** SWARTZ frondibus distantibus stipitatis; lamina obovato-oblonga, nunc basi obtusa, nunc angustata cuneata, sinuato-pinnatifida; laciniis oblongis obtusis repandis, interdum sublobatis, margine sparsim stellato-nigro-pilosis; nervis tertiaris simplicibus curvatis, lineis e margine oriundis interpositis; indusiis ad apicem lacinarum superiorum exsertis, raro semiexsertis, infundibuliformi-cylindraceis marginatis, ore patente bilobis, lobis semiorbicularibus rufo-limbatis; rhizomate repente nigro-tomentoso.

Tabula nostra XVIII. fig. 3.

Trichomanes reptans Swartz Fl. Ind. occ. III. 1727. Ejusd. Syn. Fil. 142. Willd. Sp. Pl. V. 501. Hedwig Fil. Gen. et Sp. tab. 3. fig. 4. Hook. Sp. Fil. I. 116 (ad partem). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 278.

Didymoglossum reptans Presl Hymenophyll. 23. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 533.

Hemiphlebiium reptans Presl Die Gefäßbündel im Stipes der Farrn 28 (in nota).

? *Trichomanes quercifolium Hook. et Grev. Icon. Fil. I. tab. 115. Hook. Sp. Fil. I. 120. Kunze in bot. Zeit. V. (1847). 319.*

Didymoglossum quercifolium Presl Hymenophyll. 23.

Trichomanes montanum Hook. Icon. Pl. tab. 187.

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, pilis nigris dense obsitum. **FRONDES** nunc distantes, nunc approximatae, adsurgentes. **STIPES** 1—4 lin. longus, inferne teres dense nigro-tomentosus, superne dilatatus in laminam transiens. **LAMINA** 6—15 lin. longa, 4—6 lin. lata, juvenilis linearis simplex, apice fissa, senilis obovato-oblonga sinuato-pinnatifida, glabra, margine pilis simplicibus furcatis stellatisque aculeiformibus nigris distantibus obsessa, dense membranacea, e cellulis hexagono-parenchymatosis amplis, ad parietes hyalinis strictis utriculo primordiali contracto pallide flavovirente instructis, medio raro vacuis pellucidis, composita; ad marginem serie unica cellularum rectangularum limbata. **NERVUS PRIMARIUS** (vel RHACHIS) excurrentes, pallide brunnescentes. **NERVI SECUNDARIJ** flexuosi; **TERTIARIJ** patuli simplices, lineis numerosis e margine oriundis mox evanescentibus interpositis. **INDUSIA** $1\frac{1}{2}$ lin. longa, membranacea, viridia, nunc semiimmersa, nunc exserta, sed manifeste marginata; lobi magni semiorbiculares, margine cellulis oblongis fuscis limbati. **RECEPTACULUM** exsertum.

Habitat ad rupes, locis opacis prope Merida et in summis montibus in truncis vetustis putridis Coloniae Tovar Venezuelae: Moritz n. 265, Karsten; in insula Jamaica et S. Domingo: Swartz (Herb. Willd. n. 20190 et Herb. Reg. Monac.). — Verisimiliter in Brasiliae septentrionalis confinibus haud deest.

53. **TRICHOMANES KRAUSII** HOOK. ET GREV. frondibus distantibus stipitatis; lamina obovata vel oblonga, nunc basi obtusa, nunc angustata cuneata, profunde pinnatipartita; laciniis linearibus obtusis sinuatis saepe pinnatifidis, in sinibus stellato-nigro-pilosis; nervis secundariis simplicibus; indusiis ad apicem lacinarum superiorum immersis vel semiimmersis infundibuliformi-cylindraceis, ore patente bilobis, lobis semiorbicularibus saepe rufo-limbatis; rhizomate fusco-tomentoso.

Trichomanes Krausii Hook. et Grev. Icon. Fil. II. tab. 149. Hook. Sp. Fil. I. 120. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 319. Ejusd. in Linnaea XXI (1848). 237.

Didymoglossum Kraussii Presl Hymenophyll. 23.

Trichomanes reptans Kunze in Linnaea IX (1834). 103 (excl. syn.). Balbis in Herb. Reg. gen. Berol.

Didymoglossum quercifolium Presl in Herb. Berol. Klotzsch in Linnaea XVIII (1834). 533 (non Hook. et Grev.).

RHIZOMA repens, filiforme, ramosum, pilis rufis dense obsitum. **FRONDES** distantes, adsurgentes. **STIPES** 1—4 lin. longus, inferne teres, superne dilatatus in laminam transiens, ubique fusco-tomentosus. **RHACHIS** rufescens, supra plana, inferne tomentosa, subtus convexa, alata. **LAMINA** 6—12 lin. longa, 5—6 lin. lata, semper eadem forma, nempe obovata profunde pinnatipartita, nunquam simplex, membranacea, olivacea, e cellulis hexagono-

parenchymatosi amplis, utriculo primordiali sordide viridi aut omnino impletis aut utriculo contracto ad parietes strictos hyalinos tantum instructis, tum medio vacuis pellucidis composita; in sinibus margineque pilis simplicibus furcatis plerumque stellatis aculeiformibus nigris obsessa. LACINIAE pinnatifidae 4—6 lin. longae. LACINULAE lineares obtusae, margine repandulae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, brunescens. NERVI SECUNDARIJ parvuli, simplices. E margine laciniarum lineae remotae, mox evanescentes, raro oriuntur. INDUSIA $1\frac{1}{2}$ lin. longa, membranacea, brunneo-olivacea, ad lobos usque plerumque immersa; LOBI magni semiorbiculares, margine cellulis oblongis fuscis limbat. RECEPTACULUM robustum, exsertum.

Habitat in arboribus montis Corcovado: M.; ad ripas fluminis Arapicury, prov. Pará: R. Spruce n. 575; ad Ega: Poeppig; — in Guiana anglica: Schomburgk n. 400; in Caracas: Moritz, Karsten; in insula S. Domingo: Balbis, Bertero; in arborum truncis, praesertim in rhizomate Oreodoxae, Cuba interioris ad Caobas: Poeppig.

ANOTATIO. *Trichomanes reptans Swartz.*, in Brasilia nondum observatum, quamvis speciei nostrae peraffine, distinguitur: lamina sinuato-pinnatifida, laciniis oblongis obtusis, nervis lineis multis e margine oriundis interruptis interpositis, indusiis saepissime omnino exsertis.

II. HYMENOPHYLLUM SMITH.

HYMENOPHYLLUM *J. E. Smith in Acta Turin. V. 418. tab. 9. fig. S. Endl. Gen. Plant. 64. n. 657 et Suppl. I. 1351. Hook. Gen. Fil. tab. 32. Meisner Gen. Plant. 435. (336.) Presl Hymenophyll. 29. tab. 11. fig. A, B, C. t. 12. fig. A, B. Metten. Fil. hort. bot. Lipsiens. 112. Moore Index Fil. CXI. — LEPTOCIONIUM Presl l. c. 26. tab. 11. fig. D. — MYRMECOSTYLUM Presl l. c. 27. tab. 10. fig. A. — PTYCHOPHYLLUM Presl l. c. 28. tab. 11. fig. E. — SPHAEROCIONIUM Presl l. c. 33. tab. 4. fig. B. tab. 10. fig. B, C. — HYMENOGLOSSUM Presl l. c. 35.*

SORI terminales vel subalares receptaculo inserti, in dentibus vel laciniis laminae immersi exsertive. SPORANGIA circa receptaculum sessilia vel subsessilia, obovata, annulo transverso angusto completo multiradiato instructa, rima longitudinali laterali dehiscentia, paraphysibus destituta. RECEPTACULUM ultra laminae marginem productum aut filiforme aut apice globoso-incrassatum aut clavatum, nunc undique nunc apice sporangiis tectum, indusio longius aequilongum vel brevius. INDUSIUM inferum sacculum formans suborbiculare, ovatum vel conicum, bifidum vel profunde bilobum, lobis apice aut integerrimis aut erosis aut inciso-laceris, glabris vel hirsutis, textura laminae. SPORAE Trichomanis.

RHIZOMA repens, filiforme, teres, saepe flexuosum ramosumque, glabrum vel pilosum, RADICULIS interdum longe pilosis, raro glabris obsitum. FRONDES stipitatae, saepissime tenerae, aut glaberrimae aut pilosae, raro dense tomentosae, pilis nunc simplicibus nunc furcatis nunc apice stellatim ramosis. STIPES variae longitudinis, aut omnino nudus aut alatus, inprimis apicem versus, glabrescens, inferne pilosus. RHACHIS teres, saepe capillaris, in plurimis una cum stipite margine foliaceo-alata, ala interdum undulata crispataque, glabra, pilosa ciliatave. LAMINA ovata, oblonga, lanceolata vel lineari-lanceolata, pinnatifida usque profunde bi-tripinnatifida. LACINIAE PRIMARIAE (v. SEGMENTA) ovatae, oblongae, lanceolatae,

Hymenophyll.

cuneatae vel substellatae, pinnatifidae vel pinnatifidae, decurrentes. LACINIAE SECUNDARIAE lineares, lineari-oblongae vel oblongo-cuneatae, bi-usque multifidae, nonnunquam dense aggregatae imbricataeque, planae vel undulatae. NERVUS PRIMARIUS teres, prominulus, flexuosus rarissime genuflexus, interdum mox in nervos secundarios transiens. NERVI SECUNDARIJ e nervo primario pinnatim exorientes distantes, simplices vel ut plurimum uni-bifurcati, saepissime apice libero obtuso desinentes, saepe non excurrentes.

FILICULAE zonae tropicae temperataeque totius orbis cives.

CONSPECTUS SPECIERUM.

Sect. 1. Indusia glabra. Frondes glabrae, rarissime sparse simpliciter pilosae.

§. 1. Lamina aut oblongo-lanceolata aut substellata pinnatifida. Indusia orbicularia v. semiorbicularia, lobis integerrimis v. repandulis. Sp. 1—2.

§. 2. Lamina pinnatifida - (vel bipinnatifida -) pinnatifida.

A. Indusia ovata v. oblonga, lobis aut integerrimis aut inciso-laceris v. serratis aut ciliato-denticulatis.

α. Lacinulae integerrimae. Sp. 3.

β. Lacinulae argute serratae. Sp. 4—6.

B. Indusia orbicularia, lobis subintegerrimis. Lacinulae integerrimae, non crispae.

α. Stipes aut omnino aut superne alatus. Sp. 7—11.

β. Stipes gracilis saepe filiformis, non alatus. Sp. 12—13.

C. Indusia magna suborbicularia, lobis erosis. Lacinulae omnes valde crispae. Sp. 14.

Sect. 2. Indusia aut ciliata aut omnino pilosa v. hirta. Frondes ciliatae, stellato-hirtae vel densissime tomentosae.

§. 1. Frondes in marginibus nervisque stellato-hirtae.

A. Lamina bipinnatifida - pinnatifida. Indusia ovata v. orbicularia, lobis erosis breviter v. longe ciliatis. Sp. 15—16.

B. Lamina aut inferne pinnatisecta aut bipinnatisecta. Indusia semiorbicularia v. ovalia, lobis erosis v. eroso-denticulatis longe ciliatis. Sp. 17—18.

§. 2. Frondes ubique stellato-hirtae vel tomentosae.

A. Lamina profunde pinnatifida v. pinnatifida - pinnatifida. Indusia suborbicularia, lobis integerrimis ciliatis hirtisque. Sp. 19—21.

B. Lamina pinnatisecta - pinnatifida. Indusia orbicularia, lobis longe ciliatis hirtisque vel dense tomentosis. Sp. 22—23.

Sect. 1. Indusia glabra. Frondes glabrae, rarissime sparse simpliciter pilosae.

§. 1. Lamina aut oblongo-lanceolata aut substellata pinnatifida. Indusia orbicularia v. semiorbicularia, lobis integerrimis v. repandulis. Sp. 1—2.

1. HYMENOPHYLLUM ASPLENIODES SWARTZ frondibus distantibus pendulis; lamina oblongo-lanceolata obtusa pinnatifida; laciniis oblongis obtusis, infimis subpalmatis sinuato-lobatis, superioribus bi-trilobis, lobis obtusis integerrimis; indusiis exsertis, basi cuneata tantum immersis, profunde bilobis, lobis suborbicularibus integerrimis glabris; stipite filiformi tereti nudo, cum rhizomate gracili repente glabro.

Tabula nostra XIX. fig. 6. 7.

Hymenophyllum asplenoides Swartz *Fl. Ind. occ.* III. 1743. *EjUSD. Syn. Fil.* 145. *Lanark Illustr. Gen. tab.* 8. fig. 1. *Hedw. Fil. Gen. et Sp. tab.* 7. *Willd. Sp. Pl. V.* 516. *Hook. Sp. Fil. I.* 87. *Klotzsch in Linnaea XVIII (1844).* 534. *Kunze in bot. Zeit. V (1847).* 185. *Hook. Icon. Pl. X. tab.* 956. *Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI.* 262. *Van den Bosch Syn. Hymenophyll. in Nederl. Kruidk. Archief m. Dec. (1858).* 387.

Hymenophyllum palmatum Klotzsch in *Herb. Reg. Berol. (olim).*

Hymenophyllum alterum Schott in *Herb. Mus. Pal. Vindob.*

RHIZOMA repens, filiforme, diametrum $\frac{1}{4}$ lin. attingens, pallide fuscum, pilis fulvis adpressis vestitum radiculisque multis tenuibus pilosiusculis instructum. STIPES 9—18 lin. longus, crassitie rhizomatis, teres, fuscus, flexuosus, glaber, basi ima solummodo pilosus. LAMINA $1\frac{1}{2}$ —3 poll. longa, 9—18 lin. lata, glaberrima, coriacea, statu sicco viridi-brunescens, e cellulis variae magnitudinis hexagono-parenchymatosis flavo-brunnescentibus, granulis impletis raro medio vacuis pellucidis, parietibus strictis flavescens composita. LACINIAE infimae 6—9 lin. longae, 3—5 lin. latae, alternae, patulae, LOBI $\frac{1}{2}$ —1 lin. longi. NERVUS PRIMARIUS teres, fuscus, superne valde flexuosus. NERVI SECUNDARIJ patuli, simplices uni-bifurcative, non excurrentes. INDUSIA partem superiorem apicemque laminae occupantia, in apice loborum solitaria exserta, 1 lin. longa, convexiuscula, colore loborum. RECEPTACULUM breve, omnino inclusum.

Habitat in prov. Rio de Janeiro arborum truncis: Brackenridge, Schott (Herb. Vindob. n. 4479); in monte Cubatão, prov. S. Pauli: Selow; — in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 1662; in Jamaica: Swartz et alii.

2. *HYMENOPHYLLUM BREVIFRONS* KUNZE frondibus pusillis distantibus; lamina subflabellata, basi cuneata in stipite decurrente, pinnatifida; laciniis linearibus integerrimis repandulis, apice obtuso submarginatis; indusiis semiimmersis, basi cuneatis, lobis semiorbicularibus subrepandulis glabris; stipite filiformi tereti; rhizomate gracili repente glabriusculo.

Hymenophyllum brevifrons Kunze in *bot. Zeit. V (1847).* 185. *EjUSD. Farrnk. I.* 236. *tab. 96. fig. 2. Van den Bosch Hymenophyll. 385.*

Hymenophyllum abruptum Coll. R. Spruce n. 383 (non Hook.).

RHIZOMA repens, filiforme, diametrum $\frac{1}{8}$ lin. attingens, fuscum, sparse rufo-pilosum, radiculis robustis longis pilosisque instructum. STIPES 1—3 lin. longus, rhizomate subtenuior, apicem versus lamina decurrente angusta alatus, glaber, basi solummodo pilosus, fuscus. LAMINA 3—4 lin. longa et fere eadem latitudine, e basi cuneata flabelliformis, trapeziformis vel oblongo-ovata, glaberrima, coriacea, statu sicco saturate brunnea, e cellulis distinctissimis amplis hexagono-parenchymatosis impellucidis, granulis cinerascens impletis, parietibus strictis valde hyalinis composita. LACINIAE in quovis latere 2—3, circiter 2 lin. longae, 1 lin. latae, alternae, patulae, plerumque furcatae, lineares, apice rotundato saepe excavatae, margine integerrimae vix repandulae. NERVUS PRIMARIUS fuscus, mox in NERVOS SECUNDARIOS plerumque furcatis subexcurrentes transiens. INDUSIA singula vel bina, in apice lacinarum subsolitaria, semimmersa, suborbicularia, basin versus cuneata, LOBIS semiorbicularibus subrepandulis longe apertis. RECEPTACULUM clavatum, subcurvatum, exsertum.

Haec species inter omnes florum nostrae minima est.

Habitat prope Tanaii, ad Rio de Acara, prov. Pará: Spruce n. 383; — in Guiana gallica: Leprieur n. 235.

§. 2. Lamina pinnatipartito- (vel bipinnatipartito-) pinnatifida.

A. Indusia ovata v. oblonga, lobis aut integerrimis aut inciso-laceris v. serratis v. cillato-denticulatis.

α. Lacinulae integerrimae. Sp. 3.

3. *HYMENOPHYLLUM PRIONEMA* KUNZE frondibus flaccidis; lamina lineari flexuosa profundissime pinnatipartito-pinnatifida; laciniis primariis remotis ovato-oblongis obtusis pinnatifidis decurrentibus; secundariis oblongis obtusis bi-trifidis; lacinulis linearibus integerrimis obtusiusculis ciliatis; indusiis apicalibus exsertis subgeminis ovatis profunde bilobis, lobis apice inciso-laceris; rhachi anguste alata ciliata; stipite capillari tereti nudo piloso, pilis omnibus partibus simplicibus; rhizomate repente capillari ferrugineo-piloso.

Hymenophyllum prionema Kunze in *Herb. Reg. Monacensi.*

RHIZOMA repens, capillare, diametrum $\frac{1}{6}$ lin. attingens, fuscum, pilis flaccidis patentissimis ferrugineis obsitum, radiculis brevibus non fibrillosis nigricantibus subpilosus instructum. STIPES 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longus, teres, crassitie coloreque rhizomatis, primum pilosus, postremo glabrescens, omnino nudus. RHACHIS gracilis, teres, valde flexuosa, peranguste alata, sparse ciliata. LAMINA $4\frac{1}{2}$ —6 poll. longa, 1 poll. circiter lata, subcoriacea, statu sicco sordide brunnescenti-viridis, e cellulis rectangulo- et hexagono-parenchymatosis distinctissimis, ad parietes pallide flavescens subflexuosus granulis brunnescentibus dense impletis, medio vacuis pellucidis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere 8—20, interstitiis in eodem latere circiter 5-linearibus remotae, inferiores oppositae minoresque, sequentes alternae, patulae, maxime usque ad 6 lin. longae, 3 lin. latae, basi superiore late adnatae inferiore anguste decurrentes. LACINIAE SECUNDARIAE inferiores 2 lin. longae, 1 lin. latae. LACINULAE 1 lin. longae, vix $\frac{1}{2}$ lin. latae. NERVUS PRIMARIUS geniflexus, utrinque aequaliter prominens, superne in nervos secundarios transiens. NERVI SECUNDARIJ patuli, furcati curvatique, fuscis, subexcurrentes, subtus parce pilosi. PILI cylindracei, plerumque 3-articulati, fusciduli, pellucidi; cellula terminalis longa subulataque. INDUSIA superiorem partem laminae ad apicem usque occupantia, 1 lin. longa, colore lacinarum, glabra, basi solummodo pilis nonnullis minutis adpersa. RECEPTACULUM inclusum breve, apice globoso-dilatatum truncatumque. SPORANGIA sessilia, turbinate, annulo horizontali 23-articulato instructa. SPORAE tetraedrae, basi convexae, pallide flavae.

Speciem raram pilis simplicibus, rhachi anguste alata, lobis indusii apice inciso-laceris distinctam, ut videtur adhuc indescriptam, ex specimenibus originalibus Herbarii Regii Monacensis solum nosco.

Habitat in arboribus insulae Marajo ad Breves, in prov. Paraënsi: M.

β. Lacinulae argute serratae. Sp. 4—6.

4. *HYMENOPHYLLUM FUCOIDES* SWARTZ frondibus glabris; lamina oblongo-lanceolata flexuosa inferne pinnatisecto-superne pinnatipartito-pinnatifida; segmentis v. laciniis ovatis v. oblongis obtusis pinnatifidis; lacinulis oblongo-linearibus obtusis simplicibus bipartitisve argute serratis; indusiis supra-axillaribus emersis ovatis glabris, lobis apice inciso-serratis; rhachi alata ciliata; stipite piloso; rhizomate repente.

Hymenophyllum fucoides Swartz *Fl. Ind. occ.* III. 1747. *EjUSD. Syn. Fil.* 146. *Willd. Sp. Pl. V.* 522. *Schlechtend. in Linnaea V (1830).* 619. *Kunze ibid. IX (1834).* 109. *Hook. Sp. Fil. I.* 100. *Kunze in bot. Zeit. V (1847).* 226. *Hook. Ic. Pl. X. tab.* 963. *Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI.* 268. *Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 404.*

Trichomanes fucoides Swartz *Prodr.* 136. *Hedw. Fil. Gen. et Sp. tab.* 9.

Hymenophyllum curvulum et fissilabre Kunze Herb.

Leptocionium fucoides Presl *Hymenophyll.* 27.

RHIZOMA repens, flexuosum, fuscum pilosumque, radiculis numerosis longis gracilibus dense longeque fusco-pilosum. STIPES circiter 1 poll. longus, $\frac{1}{2}$ lin. crassus, teres, fuscus, superne ala angustissima decurrente et linea prominente notatus, inferne pilosus. RHACHIS flexuosa, nigricans, glabrescens, ALA angusta sparse ciliata. LAMINA 3—4 poll. et ultra longa, 1 poll. lata, rufo-brunnescens, e cellulis hexagono-parenchymatosi amplis fuscidulis pellucidis, ad parietes strictos hyalinos granulis brunnescentibus obsessis composita. LACINIAE (v. SEGMENTA) 8—16-jugae, inferiores 6 lin. longae, 4 lin. latae, interstitiis 3-linearibus, alternae, patulae, subcurvatae, subpetiolatae, pinnatifidae, basi cuneatae; superiores sessiles, oblongo-lineares, bi-tripartitae. LACINULAE 2 lin. longae, 1 lin. latae, in segmentis inferioribus in quovis latere 4—5, patulae, subcurvatae, oblongo-lineares, sinibus angustis rotundatis. NERVUS PRIMARIUS flexuosus et SECUNDARIUS patuli, simplices furcative, sub apice lacinarum evanescentes, convexi, fuscii, in planta juvenali scabri. INDUSIA partem superiorem laminae occupantia, in quaque lacinia una raro duo, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, 1 lin. lata, brunnescentia, basi cuneata sessilia, integerrima, profunde biloba, glabra; LOBIS acutiusculis inciso-serratis. RECEPTACULUM inclusum.

Habitat in Serra dos Orgãos: Gardner n. 5951, Brackenridge. — In Venezuela prope Caracas: Karsten et alii; in Peruvia ad Pompayaco: Poeppig; in Mexico ad Cuesta grande de Jalacingo reg. temp.: Schiede n. 811; in insulis Antillanis e. g. in Jamaica: Swartz.

5. HYMENOPHYLLUM ATTENUATUM Hook. frondibus magnis longe stipitatis; lamina anguste ovata attenuata profunde bipinnatipartito-pinnatifida; laciniiis primariis oblongo-lanceolatis longe acuminatis subfalcatis profunde pinnatifidis; secundariis lineari-oblongis, inferioribus multi-, superioribus tri-bifidis, rigidiusculis planis neque undulatis nec ciliatis, summis cum lacinulis linearibus margine ciliato-denticulatis; indusiis in apice lacinarum oblongis subcylindricis contractis, apice breviter bilobis, lobis ciliato-denticulatis; rhachi stipiteque usque ad basin alatis, alis valde tortuosis dentato-spirulosis.

Hymenophyllum attenuatum Hook. Sp. Fil. 1. 99. tab. 36, B. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 226. Sturm in Abhandl. d. naturhist. Gesellsch. zu Nürnberg. II. Heft. 189.

Hymenophyllum stenocarpum Kunze olim.

Leptocionium attenuatum Van den Bosch Syn. *Hymenophyll.* 384.

RHIZOMA repens, radiculosum pilosumque. STIPES circiter 6 poll. longus, ad basin imam alatus. LAMINA flaccida, membranacea, tenuis, longitudine stipitis et circiter 3 poll. lata. LACINIAE PRIMARIAE 2 poll. longae, 1 poll. latae, alternae, patulae; SECUNDARIAE inferiores 9 lin. longae.

Habitat in cacuminibus m. Serra dos Orgãos: Gardner n. 5950. — Non ridi.

6. HYMENOPHYLLUM MEGACHILUM Presl frondibus parvis rigidis glaberrimis; lamina lineari-lanceolata acuta pinnatisecto-pinnatipartita; segmentis remotis subsessilibus cuneato-ovatis profunde pinnatipartitis decurrentibus; laciniiis anguste linearibus obtusis, margine remote acuteque serratis; indusiis axillaribus, pedicello brevi alato insidentibus, ovatis obtusis profunde bilobis, lobis integerrimis glabris; rhachi aequaliter angustissime alata; stipite tereti, nudo; rhizomate repente capillari.

Hymenophyllum megachilum Presl Die Gefässbündel im Stipes der Farnn 29. tab. 5. fig. 18. Ejusd. Epim. bot. 22. tab. 8. B. Van den Bosch Syn. *Hymenophyll.* 402.

Hymenophyllum macrostomum Kunze in Herb. Mus. Pal. Vindob.

Hymenophyllum tunbridgense β. Hook. Sp. Fil. 1. 95 (quoad plant. Gardnerianam et excl. synon.).

RHIZOMA repens, flexuosum, diametrum $\frac{1}{6}$ lin. attingens, rufo-fuscum, pilosiusculum, mox glabrescens, radiculis numerosis fibrillosis pilosisque instructum. STIPES circiter 6 lin. longus, teres, omnino nudus, fuscus, glaber. RHACHIS teres, flexuosa, fusca, ubique aequaliter angustissime alata, ala integerrima, glabra. LAMINA 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 3—4 lin. lata, coriacea, statu sicco viridi-brunnescens, e cellulis distinctissimis hexagono-parenchymatosi variae magnitudinis pellucidis, ad parietes strictos manifestissimos hyalinos granulis brunneis obsitis composita. SEGMENTA in quovis latere circiter 7, interstitiis 3-linearibus remota, 3—4 lin. longa, 2 lin. lata, alterna, patula, inferiora vix minora breviter petiolata, superiora sessilia. LACINIAE circiter 2 lin. longae, $\frac{1}{3}$ lin. latae, alternae, patulae, saepe curvatae, planae. NERVUS PRIMARIUS utrinque prominens, fuscus, glaber. NERVI SECUNDARIUS patuli, simplices, subexcurrentes, fuscii. INDUSIA superiorem partem laminae (apice excepto) occupantia, $\frac{3}{4}$ lin. longa, rufidula, glabra, ovata, obtusa, LOBIS margine integerrimo subrepandulis, receptaculo vix longioribus. RECEPTACULUM inclusum cylindraceum.

Habitat in Serra dos Orgãos: Gardner n. 212.

B. Indusia orbicularia, lobis subintegerrimis. Lacinulae integerrimae, non crispae.

α. Stipes aut omnino aut superne alatus. Sp. 7—11.

7. HYMENOPHYLLUM CAUDICULATUM Mart. frondibus distantibus subcurvatis; lamina ovato-oblonga vel lanceolata caudiculata bipinnatipartito-pinnatifida; laciniiis primariis oblongo-lanceolatis caudiculatis decurrentibus; secundariis oblongo-cuneatis obtusis, inferioribus pinnatifidis, summis simplicibus cum lacinulis brevibus linearibus obtusis integerrimis, apice truncato emarginatis; indusiis magnis supraaxillaribus exsertis subsessilibus orbicularibus ad basin usque bilobis, lobis margine subintegerrimis; rhachi late alata subundulata; stipite tereti fere usque ad basin alata; rhizomate repente fusco radiculoso glabro.

Hymenophyllum caudiculatum Mart. Icon. Pl. Crypt. Brasil. 102. tab. 67. Hook. Sp. Fil. 1. 102 et 149. Kunze Farrnkr. I. 210. tab. 87 et bot. Zeit. V (1847). 242. Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 271. Van den Bosch Syn. *Hymenophyll.* 394.

Sphaerocionium caudiculatum Presl *Hymenophyll.* 35.

Hymenophyllum dilatatum Spreng. Syst. reg. IV. 132 (quoad plantam e Brasilia).

Hymenophyllum Schottii Pohl in Herb. Mus. Pal. Vindob.

RHIZOMA repens, filiforme, diametrum $\frac{1}{3}$ lin. attingens, glabrum, fuscum, radiculis longis fibrillosis nigricantibus pilosisque instructum. STIPES $1\frac{1}{2}$ —5 poll. longus, crassitie coloreque rhizomatis, teres, fuscus, ima basi tantum nudus, subglaber, cetera parte alata; ALA nunc aequilata, nunc basin versus angustata, cum ala rhachis plana vel plus minusve undulata. RHACHIS gracilis teres, subflexuosa, late alata. LAMINA 3—7 poll. longa, 2—4 poll. lata, subcoriacea, statu sicco brunneo-virescens, e cellulis manifeste hexagono-parenchymatosi non serialibus, plerumque omnino granulis flavo-virescentibus impletis, rarius medio vacuis pellucidis, parietibus distinctissimis valde hyalinis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere circiter 9, infimae usque ad 2 poll. longae, 6—9 lin. latae, inferiores oppositae, interstitiis 6-linearibus remotae, superiores alternae magis approximatae, omnes patulae, subsessiles. LACINIAE SECUNDARIAE circiter 6 lin. longae, 3—4 lin. latae, alternae, patulae, decurrentes. LACINULAE 1—2

lin. longae, 1 lin. latae, margine statu emollito magis minusve undulatae. NERVUS PRIMARIUS teres, gracilis, utrinque aequaliter prominens, fuscus. NERVI SECUNDARIJ patuli, simplices vel furcati, non excurrentes. INDUSIA superiorem laciniarum partem, apice excepto, occupantia, in processu plus minusve longo substantiae lacinularum affixa, $1\frac{1}{3}$ lin. longa, aequae ac omnes partes frondis glabra. RECEPTACULUM inclusum, apice globoso-dilatatum, excavatum.

Habitat in prov. Rio de Janeiro ad arborum truncos; in Serra d'Estrella: Schott, Gardner n. 210, Brackenridge; ad Iriri: Sellow, prope Nova Friburgo: Beyrich; in montosis prov. S. Pauli: Sellow; in prov. Minarum: Lhotzky; prope Uruaú et Manacurá, pagos Indorum et tribu Juri, secundum fluv. Japurá: M.; prope San Gabriel da Cachoeira ad Rio Negro: Spruce n. 2244.

8. HYMENOPHYLLUM MARTII J. W. Sturm frondibus distantibus; lamina lanceolata bipinnatipartito-pinnatifida; lacinii primarij erecto-patentibus rhomboideo-oblongis decurrentibus; secundariis inferioribus oblongo-cuneatis pinnatifidis, superioribus indivisis cum lacinulis brevibus linearibus obtusis integerrimis, apice truncato emarginatis; indusiis minimis, in apice lacinularum exsertis late ovalibus, lobis integerrimis; rhachi late planeque alata; stipite longo tereti superne alato; rhizomate repente rufescente glabro, radice ferrugineo-villosa.

Hymenophyllum clavatum Kunze in Herb. Reg. Monacensi.

RHIZOMA repens, $\frac{1}{4}$ lin. crassum, flexuosum, glabrum, rufescens, introrsum emittens radice nigra ferrugineo-villosa. STIPES $2\frac{1}{2}$ poll. longus, teres, crassitie rhizomatis, flexuosus, fuscus, apicem versus anguste alatus, in medio et versus basin linea prominente notatus, in basi ima nudus paulisper pilosus, ceterum glaber. RHACHIS flexuosa imprimis apicem versus, fusca, teres laciniaeque decurrentes late planeque alatae, sed nunquam undulatae. LAMINA circiter 4 poll. longa, 1 poll. lata, subcoriacea, in planta exsiccata olivaceo-brunnescens, e cellulis hexagono-parenchymatosis variae magnitudinis non serialibus, granulis viridibus saepe omnino impletis, parum pellucidis, parietibus strictis distinctis pallidis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere circiter 12, inferiores 10 lin. longae, 5 lin. latae, interstitiis in eodem latere 7-linearibus inter se remotae, superiores magis approximatae, sed omnes erecto-patulae, strictae, valde alternae; rhomboideo-oblongae, inferiores obtusae, mediae superioresque in acumen angustum obtusum protractae, sed non caudatae. LACINIAE SECUNDARIAE utrinque 4-5, 3 lin. longae, 2 lin. latae; inferiores oblongo-cuneatae, obtusae, subtruncatae, 3-4-fidae; superiores 2-fidae; summae aequae ac LACINULAE lineares, $\frac{1}{2}$ lin. latae, obtusae, apice profunde emarginatae. NERVUS PRIMARIUS leniter flexuosus, utrinque prominens, fuscus. NERVI SECUNDARIJ patuli, uni-bifurcati, summi simplices subexcurrentes. INDUSIA in apice lacinularum omnino exserta, minima, vix $\frac{1}{2}$ lin. longa, ovalia, rarissime suborbicularia, profunde biloba. RECEPTACULUM inclusum.

Affine *Hymenophyllum caudiculato* Mart. sed fronde minore et multo angustiore, stipite longo superne solummodo anguste alato, lacinii nunquam caudiculatis, sporangii minoribus etc. ab eo facile distinguendum.

Habitat in arboribus prope Rio de Janeiro: M.

9. HYMENOPHYLLUM IMBRICATUM KUNZE frondibus rigidis lamina ovato-oblonga profunde pinnatipartito-pinnatifida; lacinii primariis approximatis ovato-oblongis pinnatifidis decurrentibus; secundariis oblongis obtusis dense aggregatis imbricatisque bi-trifidis; lacinulis late linearibus integerrimis,

apice obtusissime interdum excisis; indusiis apicalibus densis exsertis suborbicularibus bilobis, lobis convexis integerrimis glabris; rhachi stipiteque alatis; rhizomate repente capillari glabrescente.

Hymenophyllum imbricatum Kunze in Herb. Reg. Monacensi.

RHIZOMA repens, capillare, diametrum $\frac{1}{6}$ lin. attingens, fuscum, radice numerosis longis fibrillosis pilosisque instructum. STIPES 3-7 lin. longus, crassitie coloreque rhizomatis, teres, basi ima pilosa nudus, reliqua anguste alatus. RHACHIS teres, stricta, inferne anguste superne latissime alata. LAMINA 1-2 poll. longa, 6-9 lin. lata, dense coriacea, rigida, statu siccato rufo-brunnea, e cellulis hexagono-parenchymatosis distinctissimis fusciculis, ad parietes utriculo primordiali instructis, parietibus strictis manifestissimis hyalinis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere circiter 12, interstitiis 2-linearibus remotae, 5 lin. longae, 3 lin. latae, inferiores vix minores, alternae, patulae, basi superiore late adnatae inferiore anguste decurrentes, marginibus se tegentes. LACINIAE SECUNDARIAE 2 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae, dense aggregatae, imbricatae. LACINULAE 2 lin. longae, 1 lin. latae, quoque imbricatae. NERVUS PRIMARIUS genuflexus, utrinque prominens, superne in nervos secundarios transiens. NERVI SECUNDARIJ subcurvati furcati, subexcurrentes, fuscii. INDUSIA superiorem partem laminae occupantia, numerosa, $\frac{3}{4}$ lin. longa, colore lacinularum, glaberrima, ovato-orbicularia, convexa, profunde biloba, lobis integerrimis. RECEPTACULUM inclusum. SPORANGIA sessilia, turbinate, annulo 16-19-articulato instructa. SPORAE tetraedrae, basi convexae, viridulae.

Species nova indescripta ex affinitate *H. undulati* et *polyanthi*, lacinii imbricatis indusiisque apicem versus laminae copiosissimis facile distinguenda est.

Habitat in sylvis aboriginibus ad arbores in prov. Sebastianopolitana: M. et Langsdorff; in Serra de Cubatão, prov. S. Pauli in terra humida: G. A. Lindberg.

10. HYMENOPHYLLUM POLYANTHOS SWARTZ frondibus glaberrimis; lamina ovata acuminata bipinnatipartito-pinnatifida; lacinii primariis late ovato-lanceolatis obtusis, secundariis subrhombis obtusis pinnatipartitis, basi anguste decurrentibus; lacinulis anguste linearibus obtusis integerrimis, apice emarginatis; indusiis apicalibus profunde bilobis, lobis convexis acutis lacinulis fructiferis latioribus; receptaculo exserto; rhachi parum flexuosa alata; stipite longo tereti superne anguste alato glabroque; rhizomate repente filiformi.

Tabula nostra XIX. fig. 3.

Hymenophyllum polyanthos Swartz Syn. Fil. 149. Willd. Sp. Pl. V. 530. Presl Hymenophyll. 32. Hook. Sp. Fil. I. 106 (excl. excludend.). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 243. Ejusd. in Linnaea XXI (1848). 240 et XXV (1852). 750. Klotzsch ibidem XVIII (1844). 534 et XX (1847). 439. Brackew. U. St. Expl. Exped. XVI. 270 (excl. syn. H. abietino Hook. et Grev. Icon. Fil. tab. 127). Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 389.

Trichomanes polyanthos Swartz Fl. Ind. occ. III. 1757. Hedw. Fil. Gen. et Sp. tab. 12.

? *Hymenophyllum clavatum Kaulf. in coll. Weigelt.*

Hymenophyllum sanguinolentum Beyrich (non Swartz).

RHIZOMA repens, $\frac{1}{4}$ lin. crassum, sparse pilosum, radice tenuibus nigris pilosisque praeditum. STIPES circiter bipollicaris, crassitie rhizomatis, leniter curvatus, teres, glaber, fuscus, nitidulus, superne angustissime alatus. RHACHIS valde flexuosa, aequaliter late planeque alata, nigricans. LAMINA 2-3 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 12-18 lin. lata, glaberrima, dense mem-

branacea, statu sicco olivaceo-brunnescentis, e cellulis distinctissimis hexagono-parenchymatosi non serialibus impellucidis, ad parietes strictos valde hyalinos granulatis sordide brunnescentibus impletis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere 7—12, maximae fere 1 poll. longae, 6 lin. latae, interstitiis 4-linearibus remotae, alternae, diffusae, superiores erecto-patentes, breviter petiolatae (petiolo alato), decurrentes valdeque flexuosae. LACINIAE SECUNDARIAE alternae patulae, inferiores circiter 3 lin. longae et fere eadem latitudine, profunde pinnatipartito-pinnatifidae. LACINULAE lineares, vix 1 lin. longae, $\frac{1}{3}$ lin. latae, non conniventes, apice rotundato manifeste emarginatae, integerrimae planaeque. NERVUS PRIMARIUS flexuosus, prominens, fusco-rubescens. Nervi secundarii repetite furcati, excurrentes. INDUSIA in apice lacinarum numerosa, $\frac{3}{4}$ lin. longa, ultra medium bifida, pars inferior cuneata; LOBI obtusi, integerrimi. RECEPTACULUM inclusum.

Habitat in sylvis ad truncos arborum in vicinia Rio de Janeiro et in Serra d'Estrella: Beyrich, Brakenridge; ad Tanai, Rio Acará, juxta Pará: Spruce n. 380; — in Guiana batava: Weigelt?, Kegel n. 1385, 1386 (e Kunze); in Guiana anglica: Rich. Schomburgk; in Venezuela: Moritz et Wagener (e Kunze); in Jamaica: Swartz (Hb. Willd. n. 20235).

11. HYMENOPHYLLUM PUSILLUM Schott frondibus glaberrimis; lamina ovato-lanceolata vel lanceolata bipinnatipartito-pinnatifida; laciniis primariis sessilibus lanceolatis obtusis decurrentibus; secundariis oblongis obtusis subincurvatis bi-trifidis; lacinulis linearibus, integerrimis subrepandis, apice rotundato non emarginatis; indusiis magnis lacinulis latioribus suborbicularibus convexis, lobis integerrimis acutiusculis; rhachi subgenulata subalternatim repando-alata; stipite tereti saepe ad basin usque alato; rhizomate repente.

Hymenophyllum pusillum Schott in Herb. Mus. Palat. Vindob.

Hymenophyllum fumarioides Kauf. Enum. Fil. 269. (non Bory) quoad pl. Brasil. fide Kunze.

Hymenophyllum polyanthos Klotzsch (non Swartz) in Linnaea XVIII (1844). 534 (quoad pl. Schomburgkianam n. 1180).

RHIZOMA capillare, repens, glabrum, emittens radículas numerosas longas non fibrillosas, pilis longis brunnescentibus dense obsitas. STRIPES 1— $\frac{1}{2}$ poll. longus, rhizomate duplo crassior, leniter flexuosus, teres, fuscus ut tota lamina glaber, in speciminibus juvenilibus ad basin usque alatus, aetate profecta fere nudus, superne tantum anguste alatus vel marginatus. RHACHIS superne genulata, inaequaliter ut plurimum alternatim alata; ALA plana vel subundulata. LAMINA 1—2 poll. longa, 6—12 lin. lata, membranacea, in statu sicco aut olivaceo-brunnea aut nigricans, e cellulis distinctissimis parvis non serialibus hexagonis, utriculo primordiali flavo-virescenti omnino impletis, parietibus strictis hyalinis composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere 8—9, 5—6, raro 8 lin. longae, 2— $\frac{3}{2}$ lin. latae, inferiores vix minores, patulae, alternae, interstitiis 2—3-linearibus inter se remotae, summae parum approximatores. LACINIAE SECUNDARIAE utrinque 4—5, alternae, patulae, inferiores 2—3 lin. longae, 1—2 lin. latae, trifidae, superiores bifidae aequae ac LACINULAE, (quarum maximae 1 lin. longae) incurvatae, margine integerrimo interdum repandae. NERVUS PRIMARIUS valde flexuosus, utrinque prominens, fuscus, pariter ac rhachis laciniis decurrentibus alternatim alatus. Nervi secundarii uni-bifurcati, stricti vel curvati, excurrentes. INDUSIA 1 lin. longa lataque in apice lacinarum (plerumque solummodo interiorum et tum lacinula exterior sterilis fertilem superans) ad basin cuneatam usque bifida, lobis valde convexis acutiusculis subrepandis. LOBI statu juniore conniventes, sori majores itaque quasi alati, statu adulto aperti et sporangia non omnino tegentes. RECEPTACULUM semper inclusum. SPORANGIA ut in congeneribus.

Species nondum descripta ab *H. polyantho Swartz* differt: lacinulis saepe curvatis, apice non emarginatis; rhachi subgenulata anguste et fere alternatim alata, indusiis magnis convexis lacinulis latioribus.

Hymenophyllum.

Habitat in insula S. Catharinae: Chamisso: in monte Cubatão: Sellow; in sylva Mato Grosso et ad Anicuns, prov. Goyazensis: Pohl n. 1419; — in Guiana anglica in monte Kanuku: Rich. Schomburgk n. 1180.

β. Stipes gracilis saepe filiformis, non alatus.

12. HYMENOPHYLLUM PROTRUSUM Hook. frondibus glabris magnis; lamina oblongo-acuminata bipinnatipartito-pinnatifida; laciniis primariis inferioribus petiolatis oblongis obtusis ala angusta decurrentibus; secundariis ovato-rhombeis obtusis multifidis; lacinulis linearibus, apice rotundatis, margine integerrimis; indusiis lacinarum latitudine semiimmersis ovatis convexis, lobis obtusis; receptaculis exsertis; rhachi flexuosa anguste alata; stipite tereti longo superne marginato; rhizomate repente.

Hymenophyllum protrusum Hook. Sp. Fil. I. 104. tab. 37. fig. B. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 243. Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 392.

Hymenophyllum Poeppigianum Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 534 (planta Schomburgk. n. 1214).

RHIZOMA repens, $\frac{1}{4}$ lin. crassum, pilosum, fuscum, deorsum agens radículas numerosas longas capillares valde flexuosas, pilis brunnescentibus longis dense obsitas. STRIPES circiter 4 poll. longus, diametro $\frac{1}{3}$ lin., leniter curvatus, teres, glabrescens, fuscus, nitidulus, linea prominente notatus et superne angustissime alatus. RHACHIS superne plus minusve flexuosa anguste aequaliter planeque alata, nigricans. LAMINA 5 poll. et quod excedit longa, 12—15 lin. lata, dense membranacea, in planta sicca brunnescens, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosi subserialibus impellucidis flavo-brunnescentibus, ad parietes strictos raro hyalinos utriculo primordiali instructis composita. LACINIAE PRIMARIAE numerosae, mediae maximae 12—15 lin. longae (inferiores interdum solummodo 3-lineares), 4—6 lin. latae, interstitiis in eodem latere 9-linearibus, superiores magis approximatae, valde alternae, patulae, inferiores petiolatae (petiolo alato), superiores sessiles et decurrentes. LACINIAE SECUNDARIAE in quovis latere 4—7, alternae, patulae, inferiores 3—4 lin. longae, 2 lin. latae, profunde pinnatipartito-pinnatifidae. LACINULAE lineares, 1 lin. longae, $\frac{1}{2}$ lin. latae, apice rotundato parum emarginatae, saepe subconniventes, margine planae integerrimae. NERVUS PRIMARIUS flexuosus utrinque prominens, nigricans. Nervi secundarii repetite furcati, excurrentes, nonnunquam curvati. INDUSIA in apice lacinarum minus numerosa, $\frac{3}{4}$ lin. longa, ad medium bifida, pars inferior cuneata immersaque; LOBI obtusi subrepandi. RECEPTACULUM per aetatem exsertum, indusio duplo longius.

Triplo majus quam *H. pusillum* et ab eo facile distinguitur: indusiis minoribus ovatis, receptaculo exserto, cellulis majoribus etc.

Habitat in Guiana anglica prope montem Kanuku: Rich. Schomburgk n. 1214; in monte Campana, prope Tarapoto, Peruviae orientalis: Spruce n. 4696. — In Brasilia amazonica forsitan detegenda. Secundum Hook. etiam Americae centralis et Jamaicae incolata.

13. HYMENOPHYLLUM SCHOMBURGKII Presl frondibus stipitatis glaberrimis; lamina ovato-lanceolata v. lanceolata longe acuminata bipinnatipartito-pinnatifida; laciniis primariis sessilibus lanceolatis saepe acuminatis; secundariis sub-rhombeis obtusis; lacinulis linearibus brevibus integerrimis, apice obtuso emarginatis et plerumque bifidis; indusiis apicalibus minutissimis subexsertis profunde bilobis, lobis ovatis obtusis; rhachi flexuosa anguste alata; stipite tereti superne marginato; rhizomate repente longe fibrilloso.

Hymenophyllum Schomburgkii Presl Hymenophyll. 32. Hook. Sp. Fil. I. 148. Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 389.

RHIZOMA repens, $\frac{1}{4}$ lin. crassum, fuscum, pilosum deinde glabrum, radiculis capillaceis perlongis nigris glabrescentibus obsessum. STIPES 1—2 $\frac{1}{2}$ poll. longus, diametro rhizoma aequans, teres, glaber, fuscus, linea parum conspicua notatus. RHACHIS leniter flexuosa, plane et anguste alata, nigricans. LAMINA 4—6 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ —2 poll. lata, membranacea, sicca olivaceo-brunnescens, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosis distinctis impellucidis subserialibus sordide viridibus omnino impletis, ubique papillis multis minutis punctatis, parietibus strictis hyalinis composita. LACINIAE PRIMARIAE numerosae, mediae 9—15 lin. longae, 3—4 lin. latae (inferiores vix minores), interstitiis 3—5-linearibus in eodem latere remotae, alternae, diffusae. LACINIAE SECUNDARIAE in quovis latere 4—8, alternae patulae, 2 lin. longae, 1 $\frac{1}{2}$ lin. latae, pinnatipartito-pinnatifidae. LACINULAE lineares vix 1 lin. longae, $\frac{1}{3}$ lin. latae, aequae ac laciniis secundariae superiores simplices vel bifidae, plerumque apice emarginatae, margine integerrimo planae. NERVUS PRIMARIUS subflexuosus, utrinque prominens, fuscus. NERVI SECUNDARIJ plurimum bifurcati, excurrentes, stricti vel subcurvati. INDUSIA parvitate insignia, $\frac{1}{4}$ lin. longa, infra medium usque bifida, latitudine lacinarum (sub indusia interdum aliquantulum contractarum), basi immersa obtuse cuneata; LOBI obtusi integerrimi et parum convexi. RECEPTACULUM per aetatem exsertum.

Planta parvitate indusiorum distinctissima.

Habitat in Guiana anglica: Schomburgk; in Surinam: Hostmann n. 5. — Verisimiliter in confinibus Brasiliae septentrionalis quoque crescit.

C. *Indusia magna suborbicularia, lobis erosis. Lacinulae omnes valde crispae.*

14. *HYMENOPHYLLUM AMOENUM* Klotzsch frondibus longe stipitatis glabris; lamina lineari-lanceolata profunde bipinnatipartitis; laciniis primariis lineari-lanceolatis; secundariis linearibus valde crispis; indusiis magnis suborbicularibus, lobis glabris erosis; rhachi superne anguste alata crispa, inferne cum stipite nuda glabra; rhizomate capillari repente.

Sphaerocionium amoenum Klotzsch in lit.

Sphaerocionium crispum Klotzsch β . amoenum Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 537. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 258.

RHIZOMA repens, capillare, subglabrum, radiculis longis distantibus fusco-pilosis. STIPES 1—2 poll. longus, $\frac{1}{8}$ lin. crassus, teres, nigricans semper nudus et glaber. RHACHIS teres nigricans, glabra, inferne nuda, superne anguste alata crispataque. LAMINA interdum usque ad 8 poll. longa, 4 lin. lata, membranacea, in sicco et humido brunneo-rufescens, e cellulis hexagono-peranchymatosis crassis flavo-brunnescentibus subimpellucidis, ad parietes strictos vix hyalinos utriculo primordiali brunnescenti obsessis composita. LACINIAE PRIMARIAE numerosae, 3—6 lin. longae, 2 lin. latae, valde alternae, patulae, inferioribus 4 lin. in eodem latere a sequentibus remotae non raro petiolatae, superiores magis approximatae decurrentes. LACINIAE SECUNDARIAE circiter 1 lin. longae, $\frac{1}{3}$ lin. latae, lineares, obtusae, alternae, patulae, inferiores pinnatifidae, superiores simplices vel furcatae profunde crispae. NERVI PRIMARIJ (s. RHACHES SECUNDARIAE) et SECUNDARIJ simplices v. furcati, patuli, nigricantes, glabri. INDUSIA magna, suborbicularia, basi cuneata, rufescentia, latitudinem lacinarum duplo superantia, glaberrima, LOBIS crispis apice erosis. RECEPTACULUM inclusum.

Habitat in Guiana anglica: Rich. Schomburgk n. 1663; in monte Campana, prope Tarapoto, Peruviae orientalis: Spruce n. 4693. — In Brasilia Amazonica detegendum.

OBSERVATIO. *Hymenophyllum Fendlerianum miki* (A. Fendler n. 35 sine nomine; *H. crispum* H. B. K.? coll. Moritz n. 450) e colonia Tovar Venezuelae, species peraffinis est, differt: frondibus brevioribus (lamina circiter bipollicari, stipite vix $\frac{1}{2}$ poll. longo); rhachi primaria a basi ad apicem crispato-alata; laciniis primariis interstitiis 1 $\frac{1}{2}$ -linearibus, inferioribus non magis remotis sessilibusque; laciniis secundariis minus profunde crispis, substantia olivacea e cellulis distinctissimis pallide brunnescenti-viridibus, pellucidis; indusiis laciniis vix latioribus semper olivaceis.

H. crispum H. B. K. (Nov. Gen. et Sp. Pl. I. 22. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 537 α . pilosum) species a duabus praecedentibus diversissima et stipite brevi piloso, indusiorum lobis apice ciliatis facile recognoscenda est.

Sect. 2. *Indusia ciliata aut omnino pilosa v. hirta. Frondes ciliatae, stellato-hirtae v. densissimae tomentosae.*

§. 1. *Frondes in marginibus nervisque stellato-hirtae.*

A. *Lamina bipinnatipartito-pinnatifida. Indusia ovata v. orbicularia, lobis erosis breviter v. longe ciliatis. Sp. 15. 16.*

15. *HYMENOPHYLLUM CILIATUM* Swartz frondibus stipitatis distantibus rigidis pilosis; lamina ovato-lanceolata v. lanceolata profunde pinnatipartito-pinnatifida; laciniis primariis sessilibus oblongis obtusis; secundariis inferioribus saepe bifurcatis, superioribus cum laciniis linearibus obtusis integerrimis, apice rotundatis, ad marginem et in nervis pilis stellato-tri-quadrifidis rufescentibus dense obsitis; nervis nigricantibus subexcurrentibus; indusiis orbicularibus, lobis margine erosiusculis valde hirtis nunquam undulatis; rhachi ubique late alata; stipite anguste alato dense piloso; rhizomate repente rufo-piloso.

Tabula nostra XIX. fig. 4.

Hymenophyllum ciliatum Swartz Fl. Ind. occ. III. 1753 et Syn. Fil. 147. Willd. Sp. Pl. V. 519. Hook. et Grev. Icon. Fil. I. tab. 35 (excl. spec. Pennsylvanica). Hook. Sp. Fil. I. 88 (exclus. pl. Mexicana). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 186 et in Linnaea XXI (1848). 240. Klotzsch ibid. XX (1847). 438. C. Müller in bot. Zeit. XII (1854). 716—719. Brackenr. U. St. Expl. Exped. XVI. 263. Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 413.

Trichomanes ciliatum Hedw. Fil. Gen. et Sp. tab. 11.

Sphaerocionium ciliatum Presl Hymenophyll. 34. Klotzsch in Linnaea XVIII (1844). 536.

Sphaerocionium vestitum, Grevilleanum et commutatum Presl l. c. 34 et 58.

Hymenophyllum ornifolium Reichenb. in Weigelt pl. Surinam. exsicc.

Hymenophyllum Boryanum Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 145. Ejusd. Fil. Brasil. 66. tab. 79. fig. 4.

? *Hymenophyllum remotum, Surinamense et commutatum Van den Bosch l. c. 413 et 414.*

Filicula digitata Plumb. Fil. Am. tab. 50. fig. B.

RHIZOMA repens, filiforme, diametrum $\frac{1}{4}$ lin. attingens, pilis simplicibus pallide ferrugineis dense obsitum, radiculis numerosis longis fuscis pilosisque instructum. STIPES $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ poll. longus, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, teres, fuscus, basin versus nudus dense ferrugineo-pilosus, pilis simplicibus, in parte superiore alatus, uti rhachis pilis stellatis obsessus. RHACHIS teres, nigra, late alata. LAMINA 1 $\frac{1}{2}$ —5 poll. longa, 1—1 $\frac{1}{2}$ poll. lata, circumscriptione aut ovato-lanceolata aut lanceolata acuminata, saepe basin versus angustata. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere 5—12, maximae 5—9 lin. longae (infimae plerumque breviores), 3—4 lin. latae, alternae, patulae, interstitiis 3—4-linearibus remotae, sessiles decurrentes; mediae basi lata saepe inaequilatae; omnes profunde pinnatifidae. LACINIAE SECUNDARIAE circiter 3 lin. longae, 1 lin. latae, alternae, patulae, decurrentes; inferiores in latere superiore lacinarum primariorum infimarum interdum latiores bifurcae. SUBSTANTIA membranacea, statu sicco sordide olivaceo-brunnescens, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosis, fere

omnino granulis pallide viridi-brunnescentibus dense impletis raro in medio vacuis parum pellucidis, parietibus strictis minus hyalinis composita. NERVUS PRIMARIUS teres, gracilis, utrinque prominens, niger. NERVI SECUNDARIJ patuli, simplices, non excurrentes. INDUSIA partem superiorem laminae ad apicem usque occupantia, numerosa, in apice lacinularum semiimmersa, 1 lin. longa, convexa. RECEPTACULUM inclusum, apice globoso-incrassatum.

Habitat in truncis arborum montis Cubatão prov. S. Pauli: Sellow; in sylvis opacis M. dos Orgãos: Raddi, Brackenridge; prope Rio de Janeiro: M., Lungsdorff, Gaudichaud, Beyrich; in runcationibus montis Arara Coara prope fluvium Japurá, prov. do Alto Amazonas: M.; prope Tanaii, ad Rio Acara, juxta Pará: R. Spruce n. 382; ad cataractam fluvii Taruma, prope Barra do Rio Negro: Spruce (sine numero); — in Surinam: Weigelt, Hostmann n. 232 et 1232, Kegel n. 1069; in Venezuela prope Coloniã Tovar: Moritz n. 266 b., A. Fendler n. 37; prope Merida: Moritz n. 343; in Jamaica Swartz (Herb. Willd. n. 20222).

16. HYMENOPHYLLUM ORGANENSE Hook. frondibus curvatis longe stipitatis; lamina oblongo-lanceolata acuminata profunde bipinnatifidato-pinnatifida; laciniis primariis oblongo-lanceolatis acuminatis curvatis; secundariis oblongis, inferioribus multi-, superioribus tri-bifidis, summis cum lacinulis linearibus, apice rotundatis, margine indistincte denticulatis ciliatis; nervis fuscis non excurrentibus, subtus hirtis; indusiis magnis semixertis anguste ovatis, lobis convexis eroso-denticulatis ciliatisque; rhachi alata ciliata; stipite superne anguste alato hirta; rhizomate repente radiculoso pilosoque.

Tabula nostra XIX. fig. 8.

Hymenophyllum Organense Hook. Fil. Sp. I. 90. tab. 32. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 199. Klotzsch in Linnæa XX (1847). 438. Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 410.

Hymenophyllum Gardnerianum Kunze in Herb. Mus. Pal. Vindob.

Hymenophyllum dichotomum Beyrich in Herb. Reg. gen. Berol.

? *Hymenophyllum Beyrichianum* Kunze in Linnæa IX (1834). 108. Hook. l. c. 91. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 199.

? *Sphaerocionium Beyrichianum* Presl in Herb. Reg. gen. Berol.

? *Hymenophyllum valvatum* Hook. et Grev. Icon. Fil. II. tab. 219. Presl Hymenophyll. 32. Klotzsch in Linnæa XVIII (1844). 534.

RHIZOMA repens, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, fuscum, pilosum vel subglabrescens, radiculis numerosis longis parum fibrillosis ferrugineo-pilosis instructum. STIPES 3—5 poll. longus, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, teres, subflexuosus, pilis stellatis ferrugineis adpersus, basi ima crassior densiusque pilosus, fuscus, apicem versus anguste alatus. RHACHIS gracilis, teres, superne flexuosa, fusca, supra glabra, subtus ferrugineo-hirta, late alata; ALA plana, margine indistincte denticulata ciliataque. LAMINA 5—8 poll. longa, 2—3 poll. lata, plus minusve curvata, membranacea, statu sicco olivaceo-nigricans, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosis, ad parietes strictos hyalinos granulis flavo-virescentibus dense obsitum, medio vacuis pellucidis composita. LACINIAE PRIMARIAE inferiores 1—2 poll. longae, 6—9 lin. latae, interstitiis 6—8-linearibus remotae, alternae, patulae, sessiles, decurrentes, strictae vel falcatae, profunde pinnatifidae; superiores, sensim decrescentes; summae in apicem longum confluentes. LACINIAE SECUNDARIAE inferiores 5—9 lin. longae,

3—4 lin. latae, pinnatifidae, decurrentes. LACINIAE circiter 2 lin. longae, $\frac{2}{3}$ lin. latae, lineares, apice rotundae, interdum bifidae, margine integrae indistincte denticulatae, ciliatae, glabrae. NERVUS PRIMARIUS SECUNDARIQUE prominentes, fuscis subtus hirtuli. INDUSIA in apice lacinularum, numerosa, totam laminam, basi excepta, occupantia, fere 1 lin. longa, anguste ovata, basi rotundata, profundissime biloba. RECEPTACULUM inclusum.

Habitat in Serra d'Estrella ad arborum truncos: Beyrich, Gardner n. 211; — in Venezuela prope Coloniã Tovar: Moritz n. 269, A. Fendler n. 33; in reg. subalpin. ad Merida: Moritz n. 348; — ? in Peruvia ad Pampayaco: Poeppig (specimina Peruviana non vidi).

B. Lamina aut inferne pinnatisecta aut bipinnatisecta. Indusia semiorbicularia v. ovalia, lobis erosis v. eroso-denticulatis longo ciliatis.

Sp. 17. 18.

17. HYMENOPHYLLUM ELEGANS SPRENG. frondibus stipitatis distantibus pendulis pilosis; lamina lineari-lanceolata inferne pinnatisecta superne profunde bipinnatifidato-pinnatifida; segmentis v. laciniis decurrentibus ovato-cuneatis, superioribus brevioribus fertilibus 3—5-fidis; lacinulis linearibus itegerrimis, apice excavatis rotundatis ciliatis; nervis nigricantibus excurrentibus; pilis longis flaccidis simplicibus furcatis stellatisque; indusiis magnis suborbicularibus ad basin usque bilobis, lobis margine erosis longe ciliatis; rhachi capillari apicem versus solummodo alata; stipite tereti cum rhizomate repente fulvo-piloso.

Tabula nostra XIX. fig. 1. 2.

Hymenophyllum elegans Spreng. Syst. veg. IV. 133. Hook. Sp. Fil. I. 91. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 199 (partim).

? *Hymenophyllum trifidum* Hook. et Grev. Icon. Fil. II. tab. 196.

? *Sphaerocionium trifidum* Presl Hymenophyll. 34.

Hymenophyllum lineare Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 409 (partim).

RHIZOMA repens, filiforme, diametrum $\frac{1}{9}$ lin. attingens, flexuosum, fuscum, pilis longis ferrugineis flaccidis subulatis 3—5-articulatis obsitum, radiculis longis pilosis instructum. STIPES 3—4 lin. longus, crassitie rhizomatis, teres, nudus, sparse pilosus. RHACHIS teres, fusca, pilosa, superne laciniis decurrentibus alternatim anguste alata. LAMINA $\frac{1}{2}$ —3 poll. longa, 5—6 lin. lata, tenuiter membranacea, statu sicco sordide-brunnescens, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosis, ubique granulis sordide virescentibus dense impletis impellucidis, parietibus strictis hyalinis composita. SEGMENTA vel LACINIAE in quovis latere 8—12, 3—4 lin. longae, 2—3 lin. latae, interstitiis circiter 2-linearibus, alternae, patulae, profunde pinnatifidae, infimae interdum brevissime petiolatae, sequentes decurrentes, cum lacinulis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis, 1 lin. latis utrinque glabrae, margine subdenticulata ciliatae, pilis longis flaccidis simplicibus furcatis stellatisque longe stipitatis. INDUSIA in apice lacinularum, numerosa, partem superiorem apicemque laminae occupantia, profunde bilobis, $\frac{3}{4}$ lin. longa, convexa, longe ciliata. RECEPTACULUM inclusum, apice non incrassatum.

Habitat in prov. Rio de Janeiro ad rivum Iriri, prope Margaratiba: Sellow, Freireiss.

OBSERVATIO. *Hymenophyllum lineare* Swartz ex Jamaica speciei nostrae paraffine et verisimiliter intra fines Brasiliae detegendum, differt: lamina

lanceolata, laciniis non ovato-cuneatis sed lanceolatis profundis pinnatipartitis, laciniis longioribus angustioribus apice nunquam excavatis, indusis rotundato-ovatis, lobis margine integerrimis breviter ciliatis, in apice lacinarum inferiorum, sed neque lacinarum nec laminae apicem occupantibus.

18. **HYMENOPHYLLUM MORITZIANUM** J. W. STURM frondibus gracillimis longe stipitatis; lamina oblonga, basin versus angustata, bipinnatisecta; segmentis primariis valde remotis petiolatis oblongis obtusis; secundariis petiolatis, aut cuneatis apice profunde fissis, aut integris linearibus basi cuneatis apice obtuso excavatis, pilis furcatis stellatisque ciliatis; indusis semiimmersis semiorbicularibus basi cuneatis, lobis eroso-denticulatis densissime ciliatis; rhachibus stipiteque gracillimis capillaribus omnino nudis pilosiusculis; rhizomate repente.

Hymenophyllum lineare Klotzsch in *Linnaea* XX (1847). 438 (partim), non Swartz excl. omnib. Syn.

Rhizoma repens, filiforme, flexuosum, diametrum $\frac{1}{2}$ lin. attingens, fuscum, pilis sparse obsitum, radiculis longis instructum. STIPES circiter 4 lin. longus, capillaris, teres, fuscus sparse pilosus. RHACHIS PRIMARIA et SECUNDARIAE capillares, teretes, subgenuflexuosae, omnino nude, pilis flaccidis simplicibus stellatisque adspersae. LAMINA 2—3 poll. longa, 1 poll. lata, tenuiter membranacea, statu sicco olivaceo-nigrescens, e cellulis angustis hexagono-parenchymatosis, ad parietes granulis pallide viridi-brunnescentibus densissime obsitis, medio vacuis pellucidis, parietibus strictis hyalinis composita. SEGMENTA PRIMARIA in quovis latere 6—10, infima minora vix 3 lin. longa, superiora 9 lin. longa, 4 lin. lata, interstitiis 6-linearibus remota, valde alterna, patula, omnia distincte petiolata, oblonga obtusa, pinnatisecta. SEGMENTA SECUNDARIA 3—5 in quovis latere, 2—3 lin. longa, 1—2 lin. lata, alterna, patula, petiolata, aut simplicia linearia aut apice profunde fissa, basi cuneata, apice obtuso plerumque excavata utrinque glabra, margine subdenticulato-ciliata, pilis sparsis furcatis vel 5-stellatis. NERVI simplices furcative, fusci, non excurrentes. INDUSIA numerosa, $\frac{1}{2}$ lin. longa, in apice segmentorum semiimmersa, semiorbicularia, parum convexa, LOBIS eroso-denticulatis, dense longeque pallide ferrugineo-ciliata. RECEPTACULUM inclusum, apice non incrassatum.

Species gracillima, affinis *Hymenophyllo eleganti* Spreng., sed lamina bipinnatisecta, segmentis omnibus petiolatis abunde diversa.

Habitat in Venezuela prope Merida, ad rupes in locis humidis: Moritz n. 344 (cum *Hymenophyllo Raddiano* C. Müller intermixtum). Herb. Reg. gen. Berol. Verisimiliter etiam Brasiliae incola.

§. 2. Frondes ubique stellato-hirtae v. tomentosae.

A. Lamina profunde pinnatipartita v. pinnatipartito-pinnatifida. Indusia suborbicularia, lobis integerrimis ciliatis hirtisque. Sp. 19—21.

19. **HYMENOPHYLLUM HIRSUTUM** SWARTZ frondibus tenuibus distantibus stipitatis ubique dense stellato-hirsutis; lamina lineari-lanceolata profunde pinnatipartito-pinnatifida; laciniis remotis cuneatis v. sublabellatis obtusis bi-quadrifidis decurrentibus; laciniis linearibus integerrimis obtusis; nervis secundariis simplicibus; indusiis minutis semiorbicularibus, lobis integerrimis; rhachi late alata; stipite capillari; rhizomate repente.

Tabula nostra XIX. fig. 5.

Hymenophyllum hirsutum Swartz Fl. Ind. occ. III. 1746. Ejusd. Syn. Fil. 146. Hook. Sp. Fil. I. 88. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 185 (ad partem). C. Müller ibid. XII (1854). 721 (excl. syn. Hook. et Grev. Ic. Fil. tab. 84). Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 407.

Trichomanes hirsutum Linn. Sp. Pl. 1561. Hedw. Fil. Gen. et Spec. tab. 12.

Trichomanes rigidum Hedw. l. c. tab. 17 (in icone Tr. fragile).

Sphaerocionium hirsutum Presl Hymenoph. 34. Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844). 535.

Rhizoma repens, capillare, diametrum $\frac{1}{9}$ lin. attingens, flexuosum, pilis simplicibus subulatis articulatis flaccidis rufis obsitum, radiculis simplicibus gracilibus sparse instructum. STIPES 2—12 lin. longus, crassitie rhizomatis, teres, flexuosus, omnino nudus, stellato-pilosus. RHACHIS utrinque convexa, gracillima, curvata et subflexuosa, nigra, dense pilosa, laciniis decurrentibus aequilate planeque late alata. LAMINA $\frac{1}{2}$ —5 poll. longa, 6—8 lin. lata, tenuiter membranacea, statu sicco sordide olivaceo-brunnescens, e cellulis amplis hexagono-parenchymatosis, nunc medio vacuis pellucidis, nunc ubique granulis pallide virescentibus impletis, parietibus strictis plus minusve hyalinis composita. LACINIAE in quovis latere 8—17, 3—4 lin. longae, in apice 2—3 lin. latae, interstitiis 3-linearibus remotae, decurrentes, pariter ac lacinae circiter 2 lin. longae, 1 lin. latae, utrinque pilis brevissime stipitatis, apice in ramos 5—8 subulatos stellatim fissis dense obsitae. NERVI PRIMARIUS et SECUNDARIUS graciles, subexcurrentes, parum elevati, nigri. INDUSIA totam laminam basi excepta occupantia, numerosa, in apice lacinarum semiimmersa, $\frac{1}{3}$ lin. longa, convexa, dense longeque pilosa. RECEPTACULUM inclusum.

Habitat in arboribus montis Serra d'Estrella, prov. Sebastianopolitanae: Langsdorff; prope Panuré ad Rio Uaupés: R. Spruce n. 2942; prope San Gabriel de Cachoeira ad Rio Negro: R. Spruce; — in Venezuela, in locis umbrosis Coloniae Tovar, ad latera saxorum elevatorum, irriguorum: Moritz n. 266, Fendler n. 38; in monte Campana, prope Tarapoto, Peruviae orientalis: R. Spruce n. 4699; in Jamaica: Swartz.

20. **HYMENOPHYLLUM RADDIANUM** C. MUELLER frondibus distantibus brevissime stipitatis ubique dense stellato-hirsutis; lamina lineari-lanceolata profunde pinnatipartita; laciniis approximatis longis linearibus, plurimis simplicibus, nonnullis tantum apice bifidis, integerrimis obtusis decurrentibus; nervis simplicibus; indusiis minutis semiorbicularibus, lobis integerrimis; rhachi alata; stipite brevi capillari; rhizomate repente.

Hymenophyllum Raddianum C. Müller in bot. Zeit. XII (1854). 723.

Hymenophyllum hirsutum Raddi Syn. Fil. Brasil. n. 144. Ejusd. Fil. Brasil. 66. tab. 79. fig. 3 (excl. syn. Swartz). Hook. et Grev. Icon. Fil. I. tab. 84 (excl. syn.). Kunze in bot. Zeit. V (1847). 185 (ad partim).

Trichomanes hirsutum Herb. Schreb. communic. O. Swartz (nunc Herb. Reg. Monacense).

Hymenophyllum lineare Klotzsch in *Linnaea* XX (1847). 438, sed non Swartz et excl. omnib. syn. (partim).

Hymenophyllum venustum Desv. Prodr. Fil. in Ann. Soc. Linn. de Paris VI. 332 (fide Van den Bosch). Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 408.

*Rhizoma repens, capillare, diametrum 1/3 lin. attingens, flexuosum, fuscum, pilis simplicibus subulatis articulatis flaccidis rufis obsitum, radiculis longis gracilibus sparse instructum. STIPES 1—3 lin. longus, crassitie rhizomatis, teres, nudus, pilis stellatis adspersis, basi densius pilosus. RHACHIS utrinque convexa, gracillima, minus flexuosa quam in *H. hirsuto*, nigra, pilosa, laciniis decurrentibus inaequalitate alata, i. e. ALA lacinarum axillas versus angustata. LAMINA 1—2 poll. longa, 5 lin. lata, membranacea, statu sicco sordide brunnescens, e cellulis amplis distinctissimis hexagono-parenchymatosi, aut medio vacuis pellucidis, aut ubique granulis virescentibus dense impletis, parietibus strictis raro hyalinis. LACINIAE in quovis latere 10—12, 4—5 lin. longae, 1 lin. latae, interstitiis circiter 1 1/2-linearibus remotae, subalternae, erecto-patentes, decurrentes, plurimae simplices, raro bifidae, pariter ac LACINULAE lineares utrinque pilis longe stipitatis, apice in ramos 5—6 subulatos stellatim fissis dense obsitae. NERVI graciles, elevati, nigri, non excurrentes. INDUSIA parca, partem laminae superiorem occupantia, in apice lacinarum semilimmersa, 1/2 lin. longa, minus convexa, dense longeque pilosa. RECEPTACULUM inclusum.*

A b. Swartzio hanc speciem pro *Hymenophyllo hirsuto* habitam esse, specimen ab illo Schrebero communicatum docet. Sed ab eo differt: lamina minore, substantia minus tenui, laciniis stricte linearibus, indusiis minus numerosis, stipite brevior.

Habitat ad arborum truncos prov. Rio de Janeiro, in sylvis opacis prope Mandioca: Raddi, Gaudichaud (in Herb. gen. Berol. nomine: H. hirsutum); — in Venezuela prope Meridq, ad rupes in locis humidis, rarior: Moritz n. 344 (cum H. Moritziano intermixtum); in monte Yuayrayuma, prope Tarapoto, Peruviae orientalis: R. Spruce n. 4048; Jamaica: Swartz (in Herb. Schreberiano).

21. **HYMENOPHYLLUM GARDNERIANUM** J. W. STURM lamina anguste lanceolata profunde bipinnatipartito-pinnatifida, ubique dense pallide ferrugineo-stellato-hirta; laciniis primariis remotis rhomboideo-oblongis; secundariis oblongis, inferioribus bi-trifidis, superioribus simplicibus lacinulisque linearibus obtusis integerrimis; nervis secundariis furcatis simplicibusve non excurrentibus; indusiis orbicularibus, lobis integerrimis; rhachi late alata.

Hymenophyllum Plumieri Kunze in *Herb. Mus. Pal. Vindob. et in bot. Zeit. V (1847). 186 (quoad plantam Gardner. n. 213).*

Rhizoma et stipitem non vidi. RHACHIS convexa, nigra, opaca, flexuosa, parum pilosa, laciniis decurrentibus aequaliter lato-alata. LAMINA circiter 6 poll. longa, in medio 1 poll. lata, membranacea, in utroque latere pilis sparsis vestita, in planta sicca olivaceo-brunnescens, e cellulis distinctis hexagono-parenchymatosi plerumque omnino granulis flavo-virescentibus impletis, parietibus strictis pallentibus composita. LACINIAE PRIMARIAE in quovis latere usque ad 20, 6—9 lin. longae, 3 lin. latae, interstitiis 3 1/2-linearibus inter se remotae, inferiores patentissimae, superiores patentes, omnes alternae. LACINIAE SECUNDARIAE utrinque circiter 6, approximatae, sed non se tegentes, patentes alternaeque, 3 lin. longae, 1 lin. latae, sinu obtusiusculo disjunctae, infimae anticae (i. e. lateris superioris) trifidae, insequentes et infimae posticae bifidae, reliquae indivisae aequae ac LACINULAE lineares obtusae ciliatae et ubique pilosae. PILI omnium partium stipitati, apice in ramos 2—5 subulatos non articulatos stellatim fissi. NERVUS PRIMARIUS prominens, manifeste flexuosus cum SECUNDARIIS patulis strictis furcatis simplicibusve nigricantibus raro pilosis. INDUSIA in lacinulis apicalia, infra medium usque bifida; LOBIS semiorbicularibus densissime longeque ciliatis pilosis. RECEPTACULUM indusio duplo brevius cylindricum, apice globoso-incrassatum. SPORANGIA ut in congeneribus sessilia.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Gardner n. 213.

Hymenophyllum.

OBSERVATIO. Hanc plantam a cel. Gardner sine nomine distributam adhuc indescriptam puto. Beat. Kunzeus eam ad *H. Plumieri* Hook. et Grev. (Icon. Fil. II. tab. 123) retulit, sed ab eo secundum iconem laudatam (plantam ex Esmeraldas conferre nequeo) valde differt circumscriptione laminae anguste lanceolatae, laciniis primariis angustioribus multoque remotioribus. *Fibula digitata* Plum. Fil. Am. tab. 50. fig. B. sententia mea *H. ciliatum* Sw. exhibet.

B. Lamina pinnatisecto-pinnatifida. Indusia orbicularia, lobis longe ciliatis hirtisque v. dense tomentosis. Sp. 22. 23.

22. **HYMENOPHYLLUM CHRYSOTHRIX** J. W. STURM frondibus flaccidis stipitatis utrinque satis dense pilosis pellucidis; lamina late lanceolata pinnatisecto-subbipinnatifida; segmentis (superioribus exceptis) breviter petiolatis rhomboideo-elongatis sublanceolatis, inferioribus profunde pinnatifidis interdum pinnatisectis; laciniis inferioribus anticis maximis 3—5-fidis, mediis bifidis, superioribus simplicibus lacinulisque linearibus obtusis integerrimis; nervis nudis conspicuis fuscis; indusiis subimmersis, lobis orbicularibus; rhachi nuda stipiteque gracilibus teretibus.

Rhizoma in specimenibus Herb. Martii deest. STIPES teres, fuscus, circiter 1 1/2 poll. longus, 1/5 lin. crassus, mox glabrescens. RHACHIS subcurvata, leniter flexuosa, omnino nuda, nigra, inferne lanata, superne dense stellatim pilosa. LAMINA 6—7 poll. longa, 1—1 1/2 poll. lata, tenuiter membranacea, adversa luce adsperta pellucida, sicco olivaceo-brunnescens, indumento aureo-lucente, e cellulis elegantissimis pellucidissimis aequalibus hexagono-parenchymatosi, ad parietes strictos hyalinos granulis magnis pallide flavescenti-viridibus composita. SEGMENTA numerosa, in medio laminae circiter 1 poll. longa (inferiora plerumque minora), ad basin 5 lin. lata, omnia, superioribus tantum exceptis, pedicellata, infima interstitiis 7-linearibus in eodem latere remota, sequentia sensim magis magisque approximata (et summa 3-lineae inter se distantia), valde alterna, patula, stricta vel incurvata, e basi inaequali superiore subtruncata auriculata inferiore cuneata rhomboideo-elongata sublanceolata, profunde pinnatifida, infima pinnatisecta. LACINIAE in quovis latere circiter 12, interdum plures, alternae, patulae, sessiles, inferiores anticae 4—5 lin. longae, 1 1/2 lin. latae, 3—5-fidae, mediae 2-fidae, superiores indivisae aequae ac LACINULAE 1/2 lin. latae lineares obtusae, apice interdum excisae, ciliatae et utrinque sed imprimis in nervis pilosae. PILI stipitati, apice in ramos 3—6 stellatim fissi. NERVI PRIMARIJ leniter flexuosi, utrinque prominentes, fuscii, subtus aequae ac nervi secundarii nudi. NERVI SECUNDARIJ valde remoti, patuli, inferiores subpinnati paulisper curvati, sequentes furcati, superiores simplices stricti. INDUSIA in apice lacinarum minuta, infra medium usque bifida, LOBIS semiorbicularibus pilosis longeque ciliatis. RECEPTACULUM indusio brevius, cylindricum, apice incrassatum. SPORANGIA sessilia, subglobosa, flava.

Ex affinitate *H. pulchelli* Schlechtend. (sed non planta in Hook. Sp. Fil. I. tab. 33, A. depicta, speciem diversam exhibens), a quo differt: lamina late lanceolata, segmentis multo majoribus, mediis apicem versus angustatis, saepe introrsum curvatis, et cellulis pallide flavescenti-viridibus. In *H. pulchello* cellulae majores hexagono-elongatae saturate brunneae parum pellucidae sunt. Ab *H. plumoso* Kaulf. nervis nudis, tomento denso deficiente, itaque pellucidum, et circumscriptione segmentorum valde diversum est.

Habitat in arboribus montis Serra d'Estrella. (Herb. Martii.)

23. **HYMENOPHYLLUM PLUMOSUM** KAULF. frondibus maximis pendulis stipitatis utrinque densissime tomentosis; lamina oblongo-elongata, apice plerumque truncata, basin versus angustata, pinnatisecto-pinnatifida; segmentis sessilibus e basi inaequali superiore truncata subauriculata inferiore cuneata rhomboideo-caudatis inciso-pinnatifidis, superioribus imbricatis, inferioribus diminutis; laciniis linearibus obtusis, apice 2-3-fidis; nervis secundariis approximatis subtus quadrifariam alatis tomento occultatis; indusiis subimmersis, lobis orbicularibus; rhachi nuda; stipite tereti glabro; rhizomate filiformi repente.

Hymenophyllum plumosum Kaulf. Enum. Fil. 267. Kunze in bot. Zeit. V (1847). 200. c. (excl. plant. Columb. et syn. H. asterolurix (Kunze). Kunze Farrnkr. I. 161. Van den Bosch Syn. Hymenophyll. 406.

Sphaerocionium aureum Presl Hymenophyll. 34 et 57.

Hymenophyllum sericeum Hook. Sp. Fil. I. 92 (partim).

RHIZOMA repens, filiforme, diametrum $\frac{1}{3}$ lin. attingens, fuscum, pilis simplicibus patentissimis ferrugineis tomentosum, radiculis fibrillosis pilosis instructum. STRIPES 1-2 poll. longus, crassitie rhizomatis, teres, flexuosus, glaber, basi ima tantum pilosus, pilis his rhizomatis similibus. RHACHIS teres, nuda, pilis stellatis tomentoso-hirta. LAMINA 1- $\frac{1}{2}$ ped. et ultra longa, 1-2 poll. lata, subcoriacea, tomento aureo-lucente deraso brunneo-

viridis, e cellulis magnis (nervos versus majoribus) irregularibus hexagono-parenchymatosi pellucidis flavo-brunnescentibus, ad parietes utriculo primordiali brunneo instructis, parietibus ipsis indistinctis composita. SEGMENTA inferiora 5-9 lin., media 1- $\frac{3}{4}$ poll. longa, 3-6 lin. lata, interstitiis circiter 6-linearibus in eodem latere remota, infima excepta alterna, sessilia, patula, superiora non raro imbricata. LACINIARUM inferiores 3 lin. longae, $\frac{1}{2}$ lin. latae, apice 2-3-fidae, superiores indivisae breviores (LACINULARUM $\frac{1}{3}$ lin. latae, lineares, obtusae), utrinque pilis stipitatis apice in ramulos longos 3-5-stellatis fissis flavescens densissime obtectae. NERVUS PRIMARIUS teres, fuscus, utrinque aequaliter prominens, aequae ac nervi secundarii subtus alis perbrevis undulatis quadrifariam instructus. NERVI SECUNDARIUM tomento occultati, approximati, parum curvati, cum nervo primario angulum peracutum formantes; ramus anticus infimus repetite furcatus, rami sequentes bi-trifurcati, summi simplices. INDUSIA superiore segmentorum partem usque ad extremum occupantia, in laciniarum apice immersa vel semi-immersa, $\frac{1}{2}$ lin. longa, ad medium usque biloba, lobis orbicularibus integerrimis, ubique dense tomentosa. RECEPTACULUM inclusum breve, apice globoso-incrassatum.

Ab *Hymenophyllo sericeo* Swartz primo intuitu indusis multo minoribus, nervis subtus multifariam perbrevis alatis distinguendum est.

Habitat in montibus Serra d'Estrella, e truncis muscosis pendulum: Beyrich, Sellow, Gardner n. 215; in rupibus Serra do Caraca, prov. Minarum: M.; in Costa Rica et Veragua: Warszewicz; in Peruvia orientali, in monte Campana prope Tarapoto: Spruce n. 4695 (sed non n. 4694 ejusdem collectionis, qui plantam quamquam simillimam, diversam tamen exhibet).

TABULAE OPHIOGLOSSARUM, MARATTIACEARUM, OSMUNDACEARUM, SCHIZAEACEARUM, GLEICHENIACEARUM ET HYMENOPHYLLEARUM EXPLICATAE.

- Tab. IX. Ophioglossum palmatum pag. 145. (secundum specimem Sellowii).
 X. Marattia Verschaeltiana p. 153. (secundum specimem Gaudichaudii).
 XI. Danaea longifolia p. 157. (secundum specimem Martii).
 XII. Osmunda palustris, subspecies Osmundae regalis p. 165. (secundum specimem Langsdorffii).
 XIII. Lygodium expansum p. 173. (secundum specimem ex Hb. Mus. Parisiensis).
 XIV. (Ectypa) Fig. I-V. Lygodium venustum p. 174. Fig. VI. Lygodium palmatilobum p. 170. Fig. VII. VIII. Lygodium lucens p. 174. Fig. IX. Lygodium mucronulatum p. 174. Fig. X. XI. Lygodium Pohlianum p. 172. Fig. XII. Lygodium acuminatum p. 174. Fig. XIII. XIV. Lygodium hastatum p. 176. Fig. XV. XVI. Lygodium hirtum p. 175. Fig. XVII. XVIII. Lygodium volubile p. 177.
 XV. Fig. I. Schizaea spectabilis p. 182. (secundum specimem originale Martii). Fig. II. Schizaea fluminensis p. 184. (secundum specimem Sprucei).
 XVI. Fig. I. Aneimia elegans p. 187. Fig. II. Aneimia tenuifolia p. 216.

- Tab. XVI. Fig. III. Aneimia millefolium p. 215. Fig. IV. Aneimia dichotoma p. 215.
 XVII. Mertensia rigida p. 231. (secundum specimem brasiliense Lindbergii).
 XVIII. (Ectypa) Fig. I. Trichomanes emarginatum p. 272. Fig. II. Trichomanes eximium p. 271. Fig. III. Trichomanes reptans p. 279. Fig. IV. Trichomanes muscoides p. 278. Fig. V. Trichomanes Bancroftii p. 259. Fig. VI. Trichomanes fulvum p. 272. Fig. VII. VIII. Trichomanes tenerum p. 273. Fig. IX. Trichomanes trichoideum p. 274. Fig. X. XI. Trichomanes sinuosum p. 258. Fig. XII. Trichomanes Mandiocanum p. 267. Fig. XIII. Trichomanes cellulosum p. 269. Fig. XIV. Trichomanes filiforme p. 269.
 XIX. (Ectypa) Fig. I. II. Hymenophyllum elegans p. 294. Fig. III. Hymenophyllum polyanthos p. 288. Fig. IV. Hymenophyllum ciliatum p. 292. Fig. V. Hymenophyllum hirsutum p. 295. Fig. VI. VII. Hymenophyllum asplenioides p. 282. Fig. VIII. Hymenophyllum Organense p. 293.

Icones 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 a J. G. STURM, tabula 16 a pictoribus Monacensibus delineatae. Tabularum 14, 18 et 19 ectypa in typographia Caesarea Vindobonensi exprimenda curaverunt cl. ALOIS. AUER et Ed. FENZL.

S i g l a.

1. Rhizoma.
2. Pars superior frondis sterilis.
3. Pars superior frondis fertilis.
4. Pinna (v. segmentum) primaria.
5. Pinna (v. segmentum) secundaria.
6. Pinnula v. lacinula.
7. Pinnae v. segmenti apex.
8. Pinnae v. lacinulae segmentum.
9. Sorus, vel ejus pars.
10. Receptaculum.
11. Indusium.
12. Sporangium v. sporangia.
13. Spora vel sporae.
14. Palea.
15. Pilus.
16. Epidermis.

- || Sectio verticalis.
- = Sectio horizontalis.
- + Magnitudo aucta.
- * Pars vi expansa.
- l. A latere visum.
- d. Desuper visum.
- i. Inferne i. e. a basi vel a facie inferiore visum.
- s. Supra vel a facie superiore.
- a. Antice.
- p. Postice (ab axe) visum.
- st. Organon sterile.
- f. Organon fertile.
- j. Organon junius s. immaturum, s. nondum apertum.
- m. Maturum.
- () Pars abortiva.

DE PRAECEDENTIBUS FILICIBUS ADNOTATIO PHYTOGEOGRAPHICA.

Erunt forsitan, qui vituperent, quod species haud paucae (38) intra Brasiliae fines hucusque nondum detectae a cl. STURM in seriem earum quas descripsit receptae fuerint. Monemus ideo, filices quam plurimas per vastissimas orbis plagas disseminatas inveniri et quasi cosmopolitas, ita ut recte praesumeris haec vegetabilia non iisdem ac multa alia et vitae et patriae conditionibus contineri. Ancipiti ergo iudicio de harum plantarum certo et circumscripto limite, dum res accurata observatione indigeat, visum est, eas quoque introducere, quae in finitimis regionibus occurrentes a nostrae Florae regno non videntur abhorreere. Id praecipue de speciebus Guyanae extrabrasiliensis et Antillarum insularum valet, nam multae jam his terris communes esse apparent. Quod Venezuelae Floram attinet, haec in regionum depressarum stirpibus cum alvei Amazonici civibus (quas Najades dicere consuevimus) mirum in modum convenire constat, contra in locis editoribus et in montium tractibus diversa indole gaudet; non easdem sed analogas species gignit. Item Peruviae planities orientales, quae in magnum fluvium Amazonum imperium vergunt, plantarum s. d. Najadum copiam sibi vindicant, et filices quam plurimas trans utriusque regni limites distributas esse recenti cl. ROB. SPRUCE collectione probatur, qui perlustratis ripis fluvii Uaupes occidentem versus ignotas regiones Tarapoto visitavit. Denique Boliviae regiones orientales multas alunt stirpes brasilienses, in terris depressis et udis naturam Najadum, in editoribus et siccis Hamadryadum excolentes; unde rite conjicias filices quasdam a b. ALC. D'ORBIGNY apud Indos Yuracares et in provincia Chiquitos observatas in Brasilia quoque inventum iri, praesertim eas, quae ex aliis et remotioribus locis, uti e Venezuela et Peruvia (*Trichomanes Haenkeanum*, *repens*) aut e Guyana et ex Antillanis insulis (*Tr. rigidum*) jam innotuerint. Omnium vero, de quibus hic sermo est, ordinum proventus inter Tropicos est frequentissimus, trans illos rarior aut omnino deficiens. Intra horum vero

circulorum limites haud paucae species per vastissimam aream sunt diffusae, eae praecipue, quae antiquis arboribus adnascentes humido sylvarum calore fomentantur. Terrestres contra et praesertim, quae in tepidos vel frigidiusculos montium campos ascendunt angustiore limite contineri videntur, paucis exceptis (e. g. *Aneimia pilosa*, e Goyazana provincia ad Venezuelam et Mexicum usque diffusa). Ita quoque singularum specierum per quinque Florae nostrae provincias distributio, tamquam nimis incerta, omissa est.

Jam de singulis ordinibus pauca addimus.

OPHIOGLOSSEAE pleraeque sunt sporadicae. *O. reticulatum* et *rudicaule* in antiquo et in novo orbe tam insularum quam terrae continentis sunt incolae, mira sane distributione. *Ophioglossi* generi jam nunc aliud in Florae nostrae territorio accedit, *Botrychium*, cujus species, *B. Virginicum*, nuper in Minarum provincia inventa est.

MARATTIACEAE quasi pro *Ophioglosseis* compositis et mirifice excultis haberi possunt. Quas ego quidem ipse in Brasilia orientali vigentes vidi in sylvis umbrosis irriguis montium Serra do Mar laxae gregariae sese obtulerunt, rhizomate multilobo quasi *Jungermanniae epiphyllae* gigantesco caespites repetentes. De specierum in hoc opere designatarum dignitate specifica ulteriora expectamus. Pleraque nemora alta diligunt, ideo e regione Dryadum et Najadum vix migrant.

OSMUNDACEAE 4 species exhibent in Brasilia lectas, quintam e Venezuela notam. *O. cinnamomea* in prov. Minarum lecta inde trans circulum Capricorni in Mexicum extenditur. *O. palustris* pro europaeae *O. regalis* subspecie americana recte habetur, et locorum natalium indole (in sylvis udis) et vitae genere sociali conveniens.

SCHIZAEACEAE haud paucae extra Brasiliae terminos quoque proveniunt, praesertim in Guyana, Peruvia, insulis Antillanis; quaedam (*Aneimia ciliata*, *dissecta*, *pilosa*, *phylloides*, *adiantifolia*) in Mexicum usque disseminatae sunt. Quae in turfosis et humidis locis degunt ampliore tractu distributae sunt. In regione Dryadum, Najadum, Oreadum praevalent.

GLEICHENIACEARUM genus in Brasilia frequenter occurrit *Mertensia*. Hoc quam plurimorum stipitum e subterraneo rhizomate proventu in densissimos caespites excrecit et impenetrabiles fere struit sepes, praesertim super apricorum montium latera. Species singulae per vastam plagam extensae et soli et aëris vicissitudinem ferunt, unde et patriae extensione et formarum varietate excellunt.

HYMENOPHYLLEAE in genere sunt umbraticolae et complures species numerant latissime diffusae. In specierum characteribus hucusque datis doctrina nondum adquirescit, nam pro patriae diversa natura et formarum et dimensionum indoles videtur variare. In regione Dryadum et Najadum excellunt, aliae pseudoparasiticae in arboribus vegetis, aliae terrestres.

Ordines	Species omnes	Americae	Asiae	Africae	Australiae	Europae	Genera descripta	Species descriptae	Species in Brasilia non re- pertae		
									Species Brasiliae propriae s. endemicae	Species intra et extra Brasiliam	Species in Brasilia non re- pertae
Ophioglosseae	55	14	22	5	5	9	4				
							Ophioglossum	4	—	4	—
							Botrychium ³⁾	1	—	1	—
Marattiaceae	108	26	64	5	13	—	16				
							Marattia	7	7		
							Danea	9	3	2	4
Osmundaceae	23	10	10	3	2	1	5				
							Osmunda	5	2	2	1
Schizaeaceae	132	92	24	5	8	—	71				
							Lygodium	12	6	5	1
							Schizaea	10	4	5	1
							Aneimia	49	31	13	5
Gleicheniaceae	71	36	19	4	12	—	25				
							Mertensia	25	15	4	6
Hymenophylleae	352	184 ¹⁾	84	46	35	3 ²⁾	76				
							Trichomanes	53	6	31	16
							Hymenophyllum	23	9	10	4
							197	83	76	38	

1) Hymenophylleae 184 americanae per varias regiones distributae sunt modo sequenti: Brasilia 56, Guyana 45, Columbia 53, Antillae insulae 70, Peruvia 36, Chile 29, America centralis 5, Mexicum 24, America septentrionalis 1.

2) Numeri praecedentes ex computatione cl. STURM.

3) II. BOTRYCHIMUM SW. ENDL. Gen. n. 674.

Sporangia distincta, in spicam compositam disposita, unilocularia, semibivalvia. — *Filiculae frondibus pinnatis bipinnatisve,*

in temperatis hemisphaerii borealis (et australis) obviae, in regionibus antarcticis rarissimae.

1. BOTRYCHIMUM VIRGINICUM Sw. scapo medio frondoso, fronde subterna tripartito-bipinnatifida, foliis incispinnatifidis, laciniis obtusis subtridentatis. Willd. Sp. pl. V. 64. — *Crescit in campis ad Caldas oppidum prov. Minarum: G. A. Lindberg.*

CYATHEACEAE
ET
POLYPODIACEAE.

EXPOSUIT

JOANNES GILBERTUS BAKER,

HERBARIJ REGII KEWENSIS CUSTOS ADJUNCTUS.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

CYATHEACEAE.

POLYPODII species Linn. *Sp. Plant. edit. III.* 1554 (1764). — CYATHEA (genus) Smith, *Act. Taur.* V. 416. (1793). Swartz, *Synops. Fil.* 5. (1806). Willd. *Sp. Plant.* V. 490. (1810). — *Filicum* subordo GYRATAE VERAE, divisio HELICOGYRATAE ex parte, Bernh. in *Schrad. Journ.* 1806. — *Polypodiaceae* § CYATHEACEAE CYATHEOIDEAE Kaulf. *Farrenkr.* (1827). — *Filicum* trib. CYATHEACEAE Mart. *Pl. Crypt. Bras.* 62. (1828—34). — *Polypodiacearum* subordo CYATHEACEAE (excl. Matoniâ) Endl. *Gen. Plant.* 63. (1836). — *Filicum* subordo HELICOGYRATAE, trib. CYATHEACEAE (excl. Matoniâ) Presl, *Tent. Pter.* 53. (1836). — *Filicum* subordo POLYPODIACEAE, trib. CYATHEAE Hook. *Sp. Fil. I.* 14. (1846). — *Polypodiaceae* § HELICOGYRATAE Fée, *Gen. Fil.* 39. (1850). — *Filicum* ordo CYATHEACEAE Mett. *Fil. Hort. Lips.* 12. (1856). — *Filicum* subordo POLYPODIACEAE, divis. DESMOBRYA, trib. CYATHEAE J. Smith, *Ferns. Brit. et For.* 71. (1866).

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPORANGIOPHORAE, FRONDIBUS VERNATIONE CIRCINATIS. SPORANGIA ANNULO SUBCOMPLETO PLUS MINUSVE EXCENTRICO INSTRUCTA, SESSILIA VEL BREVITER PEDICELLATA, RIMA LONGITUDINALI DEHISCENTIA. RECEPTACULUM HEMISPHAERICUM VEL OVOIDEO-CLAVATUM. SPORAE TRILOBAE.

SORI globosi, infra laminam in basi furcaturae aut medio venarum inserti (*Cyathea*, *Hemitelia* et *Alsophila*), aut (*Thyrsopteris*, genus extrabrasiliense) extramarginales, pedicellati, segmentis specialibus inferioribus impositi. SPORANGIA subsessilia vel breviter pedicellata, conferta, turbinata, lateraliter compressa, ANNULO lato subcompleto obliquo vel subverticali instructa, rima transversali dehiscencia. INDUSIUM nullum (*Alsophila*), aut inferum, globosum, cupuliforme, membranaecum, ore truncato integro vel magis minusve profunde partito (*Cyathea*) vel dimidiato-squamiforme (*Hemitelia*). RECEPTACULUM globosum aut breviter clavatum, nudum vel praecipue basi pilis articulatis (paraphysibus) munitum.

CAUDEX lignosus, arborescens (de structurâ anatomicâ vide dissertationem et tabulas pulcherrimas cl. MOHLII in *Mart. Crypt. Bras.* 40), altitudine 1 ad 80 pedes attingens, erectus, frondium delapsarum cicatricibus ordine spirali dispositis notatus. STIPITES plerique muricati, aculeis saepe validis pungentibus instructi, interdum inermes, plus minusve paleacei, basi cum caudice continui. FRONDES herbaceae vel interdum subcoriaceae, nunquam difformes, caudicis apicem rosulatum coronantes, pleraeque tripinnatifidae vel tripinnatae, segmentis ultimis parvis; venae semper pinnatim (nunquam flabellatim) dispositae, fasciculis ultimis liberis vel rarius venulis inferioribus anastomosantibus. — Species 100—150 bene cognitae, extra tropicos vix degentes. Filices omnes, arborescentes et herbaceae, sine distinctione in linguâ Tupi Conambaia vel Samambaia dictae.

CLAVIS GENERUM BRASILIENSIIUM.

- Indusium inferum, globosum, cupuliforme I. CYATHEA.
 Indusium inferum, dimidiato-globosum vel explanatum, squamiforme . . . II. HEMITELIA.
 Indusium nullum III. ALSOPHILA.

I. CYATHEA SMITH.

CYATHEA Smith, *Act. Taur. V. 416. (1793). Swartz, Synops. Fil. 5. (1806). Willd. Sp. Plant. V. 490. (1810), et Auctt. — SPHAEROPTERIS Bernh. in Schrad. Journ. 1806, non Wallich. — DISPHENIA Presl, Tent. Pter. 55. tab. 1. Fig. 3. — SCHIZOCAENA J. Smith in Hook. et Bauer Gen. Fil. t. 2. Enum. Cult. Ferns 241. Flée, Gen. Fil. 353. tab. 27. ter B.*

INDUSIUM globosum, primum clausum, sporangia cum receptaculo omnino includens, evolutum ore truncato aut irregulariter dehiscente.

Tabula nostra XL. Fig. 1.

CAUDEX arboreus, 10—40-pedalis. STIPITES validi, pedales aut sesquipedales, plerique muricati, deorsum paleacei. FRONDES conformes, in omnibus speciebus Brasiliae amplae, tripinnatae, pinnis oblongo-lanceolatis, pinnulis contiguis linearibus, segmentis parvis contiguis lineari-oblongis subfalcatis crenulatis. Venae pinnatae, liberae. Venulae segmentorum, superioribus exceptis, furcatae. SORI alares, conferti, uniseriales. INDUSIUM coriaceum aut membranaceum. — Species 50—60, multae imperfecte cognitae et incertae, per regiones calidiores utriusque orbis late dispersae.

CLAVIS SPECIERUM.

1. Sori faciem totam inferiorem segmentorum saepe occupantes 1. C. GARDNERI.
2. Sori plerique in segmentorum dimidio inferiore prope costam congesti.
 - a. Raches glabrae; indusium durum, evolutum ore truncato 2. C. ARBOREA.
 - b. Raches tenuiter villosae; indusium modice durum, ore irregulariter dehiscente 3. C. SCHANSCHIN.
 - c. Raches dense villosae; indusium tenerum, membranaceum, ore irregulariter dehiscente 4. C. VESTITA.

1. CYATHEA GARDNERI Hook. stipitibus inermibus; frondibus herbaceis tripinnatis, supra et rachibus complanatis glabris, infra breviter paleaceo-tomentosis, pinnis oblongo-lanceolatis, pinnulis linearibus, segmentis lineari-oblongis subfalcatis crenulatis marginibus inflexis, infimis auriculis obtusis supra costam imbricatis, venis 6—8-jugis, omnibus medio soriferis; indusio griseo duro persistente, ore irregulariter dehiscente.

Tabula nostra XX. Fig. 1. 2. (pinnula et apex pinnae.)

Cyathea Gardneri Hook. Sp. Fil. I. 21. t. 10 A. Kunze, Bot. Zeitg. II. 281. Hook. et Baker Syn. Fil. 20.

Cyathea incurvata Kunze, Linnaea XXII. 579.

Cyathea superfusa Kunze in Herb. Mart. (forma segmentis elongatis magis dentatis). Ettingshausen, Farnkräuter der Jetztwelt 224. t. 160. Fig. 2. 3.

CAUDEX 10-pedalis (teste Gardneri). PALEAE lineari-subulatae, nitidae, stramineae. STIPITES pedales, et ut rachis glabri, pallidi, inermes; raches secundariae insigniter complanatae. LAMINA subdeltoidea, tripinnata, 4—5 ped. longa, 2—3 ped. lata, herbacea, viridis, supra glabra, infra in facie segmentorum paleaceo-tomentosa. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales aut sesquipedales, 6—8 poll. latae, deorsum subaequales. PINNULAE contiguae, lineares, 3—4 poll. longae, 7—9 lin. latae, sursum regulariter angustatae, costis anguste alatis aut deorsum liberis. SEGMENTA lineari-oblonga, subobtusa, subfalcata, 1½ lin. lata, subcrenulata, lateris inferioris paulo abbreviata, infima auriculis obtusis instructa supra costam imbricatis. SORI 6—8-jugi, faciem inferiorem segmentorum inter costam et marginem subrevolutum omnino occupantes. INDUSIUM nudum globosum, griseum, apice brunneo mamillatum, tarde discissum, evolutum ½ lin. latum, ore irregulariter dehiscente.

Habitat in silvis Brasiliae austro-orientalis. Prope Tijuca prov. Rio de Janeiro et in prov. S. Catharinae: Glaxiou n. 1701! 1707! (cum forma pinnulis angustioribus 4—5 lin. latis); in prov. Minas ad Caldas: Lindberg!, ad Ouro Preto, Barbacena et in prov. Goyaz: Pohl!, ad Mercês et in Morro Vermelho prov. Minas: Gardner n. 5328! et 5333! — Dryas, Oreas.

2. CYATHEA ARBOREA SMITH: stipitibus inermibus vel muricatis; frondibus firmo-herbaceis, tripinnatis, utrinque glabris, rachibus glabris, pinnis oblongo-lanceolatis, pinnulis sessilibus linearibus, segmentis lineari-oblongis subfalcatis denticulatis, venis conspicuis 9—10-jugis; soris plerisque in segmentorum dimidio inferiore prope costam congestis; indusio duro persistente, aperto ore truncato.

Tabula nostra XX. Fig. 3. 4. (pinnulae) et XL. Fig. 1A. (analysis).

Cyathea arborea Smith, *Act. Taur. V. 417. Swartz, Syn. Fil. 139. Willd. Fil. 491. Hook. Sp. Fil. I. 17. Hook. et Baker Syn. Fil. 16. Ettingshausen l. c. 125. t. 162. Fig. 3. 4. Polypodium arboreum* Linn. Sp. Plant. 1554. Poir. Encycl. V. 549.

Cyathea Sternbergii Pohl in Sternb. Fl. der Vorwelt 47. t. C. Hook. Sp. Fil. I. 22. Kunze in Bot. Zeitg. II. 281. Ettingsh. l. c. tab. 161. Fig. 1. 2.

Cyathea Grevilleana Mart. Pl. Crypt. Bras. 78.

Cyathea elegans Heward, Mag. Nat. Hist. 1838. p. 466.

Disphenia arborea Presl, Tent. Pterid. 56.

Hemitelia arborea Flée, Gen. Fil. 350.

Plumier Fil. tab. 1.

CAUDEX 8-pedalis (ad 20—30 ped. attingens in insulis Antillanis), spinulis inconspicuis vestitus, basibus stipitum subsistentibus (BURCHELL). STIPITES 2—2½ ped. longi, muricati. Paleas non vidi. RACHIS primaria ferruginea vel nigro-castanea nitida, nuda, inermis vel deorsum aculeis paucis validis armata. LAMINA oblongo-delloidea, tripinnata, 8—9 pedes longa, 3—4 pedes lata, firmo-herbacea, supra saturate viridis, infra pallidior, utrinque glabra. PINNAE oblongo-lanceolatae, 1½—2 ped. longae, 6—8 poll. latae. PINNULAE contiguae, lineares, 4—5 poll. longae, 8—9 lin. latae, acuminatae, costis anguste alatis vel deorsum liberis. SEGMENTA contigua, lineari-oblonga, subobtusa, leviter falcata, 1½ lin. lata, denticulata, inferiora reliquis subaequalia; venis 9—10-jugis, conspicuis, omnibus praeter superiores profunde furcatis. SORI alare plerique in segmentorum dimidio inferiore prope costam congesti. INDUSIUM durum, nudum, diuturnum, apertum saepissime ore truncato, ½ lin. latum. RECEPTACULUM doliolatum, hirsutum.

Habitat in prov. Rio de Janeiro, e. gr. in monte Corcovado: Meyen (teste Goldmann); in prov. Minarum: Langsdorff!, Pohl!, Burchell n. 5339!; et in Bahiensi: Claussen, Blanchet n. 2489! 2506! — Etiam in Guyana britannica et gallica: Anderson!, Leprieur!, et frequens in insulis Antillanis. — Vaga.

3. CYATHEA SCHANSCHIN MART. stipitibus muricatis; frondibus herbaceis tripinnatis, facie superiore glabra, facie inferiore et rachibus plus minus villosis, pinnis oblongo-lanceolatis, pinnulis linearibus, segmentis lineari-oblongis leviter falcatis crenulatis, venis conspicuis 6—8-jugis; soris plerisque in segmentorum dimidio inferiore prope costam congestis; indusio modice duro, ore irregulariter dehiscente.

Tabula nostra XL. Fig. I. B. (analysis) et LXVII. Fig. I. (truncus).

Cyathea Schanschin Mart. Pl. Crypt. Bras. 77. t. 29. fig. 3—4 (caudex) et tab. 54 (frons). Hook. Sp. Fil. I. 20. Hook. et Baker, Syn. Fil. 29.

Cyathea oligocarpa Kunze, Linnaea IX. 101.

Cyathea badia Klotzsch Mss.

Cyathea Lindeniana Presl, Epimel. Bot. 30.

Alsophila fulva Mart. et Gal. Fil. Mex. 28. t. 23.

? *An satis differunt Cyathea mexicana Schlechtend. Linnaea VIII. 616. et C. frondosa Karsten, Fl. Columb. I. 74.?*

CAUDEX 30—40-pedalis (teste Gardner). PALMÆ densae, lineari-acuminatae, castaneae, nitidae, 1 poll. longae. STIPITES pedales aut sesquipedales, nudi aut furfuracei, ferruginei, nitidi, aculeis numerosis validis armati, basi digiti crassitie. RACHIS ferruginea, tenuiter villosa aut glabra, deorsum saepe muricata. LAMINA oblongo-deltae tripinnata, 6—8 ped. longa, 3—4 ped. lata, herbacea, viridis, supra glabra, infra praecipue ad costas segmentorum griseo-pubescentis. PINNAE oblongo-lanceolatae, 1½—2 ped. longae, 6—8 poll. latae, deorsum subaequales. PINNULAE contiguae, lineares, acuminatae, 3—4 poll. longae, 7—8 lin. latae, costis anguste alatis aut deorsum liberis. SEGMENTA contigua, lineari-oblonga, leviter falcata, subobtusata, crenulata, 1½ lin. lata, inferiora reliquis subaequalia, venis conspicuis 6—8-jugis, omnibus praeter superiores furcatis. SORI alares, plerique in segmentorum dimidio inferiore prope costam congesti. INDUSIUM pallidum, nudum, modice durum, evolutum ½ lin. latum, ore irregulariter dehiscente. RECEPTACULUM deltoideum, hirsutum.

Totam Americam tropicam inhabitat. Intra Brasiliam praecipue in provinciis mediis et austro-orientalibus, Bahiae, Minarum, Rio etc. observata est: M!, Setto!, Lindberg!, Burchell n. 2059! 4703!, Gardner n. 2990! 5995!, Wawra et Maly n. 170. 445., Glaziou n. 1703! 2286! et al. — Vaga.

4. CYATHEA VESTITA MART. stipitibus muricatis; frondibus herbaceis tripinnatis, supra subvillosis, infra et rachibus dense villosis, pinnis oblongo-lanceolatis, pinnulis linearibus, segmentis lineari-oblongis subfalcatis-crenulatis, venis 9—10-jugis immersis inconspicuis; soris parvis, plerisque in segmentorum dimidio inferiore prope costam congestis; indusio tenero membranaceo, evanescente, ore irregulariter dehiscente.

Cyathea vestita Mart. Regensb. Denkschr. II. 146. (1822). Pl. Crypt. Bras. 75. tab. 30. fig. 3—4 (sectio caudicis), tab. 33. fig. 2 (sectiones) et tab. 52 (frons). Hook. Sp. Fil. I. 20. Hook. et Baker Syn. Fil. 19. (forma laciniis angustatis subfalcatis).

Cyathea Delgadii Pohl in Sternb. Flora der Vorwelt t. B. (1825). Metten. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 266.

Cyathea gigantea Pohl Mss.

Cyathea hirtula Mart. Pl. Crypt. Bras. 76. tab. 53. (forma laciniis latioribus subrectis).

Cyath.

CAUDEX 20—30-pedalis (teste Gardner). PALMÆ lineares castaneae. STIPITES pedales aut sesquipedales, aculeis brevibus validis armati. RACHIS primaria et secundariae ferrugineae, pilis mollibus densis griseo-ferrugineis et paleis subulatis sparsis vestitae. LAMINA oblongo-deltae, 5—6 ped. longa, 2—3 ped. lata, tripinnata, viridis, herbacea, facie inferiore dense, facie superiore tenuiter villosa. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales aut sesquipedales, deorsum subangustatae, medio 4—5 poll. latae. PINNULAE sessiles contiguae, lineares, acuminatae, 2½—3 poll. longae, 6—8 lin. latae, deorsum pinnatae, sursum costis anguste alatis. SEGMENTA lineari-oblonga, obtusa vel subacuta, subfalcata, crenulata, 1 lin. lata, inferiora reliquis subaequalia; venis 9—10-jugis, inconspicuis, immersis, omnibus praeter superiores profunde furcatis. SORI minuti, alares, plerique in segmentorum dimidio inferiore prope costam congesti. INDUSIUM pallidum, membranaceum, hispidum, evanescentis, ore irregulariter dehiscente, evolutum ¼ lin. latum. RECEPTACULUM breve, hispidum.

Frequens per Americam australem tropicam. In sylvis primaevis prov. S. Pauli et Rio de Janeiro: M! atique collectores; in prov. Minarum, e. gr. ad Congonhas do Campo: Stephan!; in monte Pitas prov. Mato Grosso et ad Caldas Novas prov. Goyaz: Pohl!; in sylvis Almadensibus prov. Bahiae: Princ. Max. Neovindensis!; in Serra de Araripé prov. das Alagoas: Gardner n. 1907! — In Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 1121 a!; et in Columbia: Lindig n. 61 et 653. — Vaga.

II. HEMITELIA R. Br.

HEMITELIA R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. 158. Kaulf. Enum. Fil. 253. Fée, Dict. Class. VIII. 120. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 42 A. Hook. Sp. Fil. I. 28. — CNEMIDARIA Presl, Tent. Pier. 56. Gefässbündel 41. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 4. — HEMISTEGIA Presl, Gefässb. 46. Fée, Gen. Fil. 350. — MICROSTEGNUS, ACTINOPHLEBIA et NOTOPHORIA Presl, loc. cit. — AMPHICOSMIA Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. I. 441. — ALSOPHILA §. HYMENOSTEGIA J. Smith, Gen. Ferns 112. ex parte.

INDUSIUM inferum, subdimidiato-cupuliforme, demum squamiforme, explanatum, integrum vel lobatum.

Tabula nostra XL. Fig. II. III.

CAUDEX erectus, trunco nullo vel arborescente. STIPITES validi, 1—2-pedales, plerique muricati, deorsum paleacei. FRONDES uniformes, pinnatae—tripinnatae. Venae in segmentis ultimis copiose pinnatae, venulis infimis liberis vel anastomosantibus. SORI alares vel mediales, uniseriales inter costam et marginem. INDUSIUM membranaceum. RECEPTACULUM conico-cylindricum, nudum vel hispidum. — Species circa 20, quoad habitum et distributionem valde variabiles, pleraeque inter Tropicos utriusque orbis crescentes.

CLAVIS SPECIERUM.

§ 1. EUHEMITELIA (Cnemidaria Presl). Venae infimae fasciculorum anastomosantes. — *Tabula nostra XL. Fig. II.*

1. Pinnae haud ultra quartam partem dissectae; sori in lacinia 8—12 1. H. SUBINCISA.
2. Pinnae ad medium vel ultra pinnatifidae; sori in lacinia 20—40 2. H. GRANDIFOLIA.

§ 2. AMPHICOSMIA. Fasciculi venarum omnino liberi. — *Tab. nostra XL. Fig. III.*

1. Lamina bipinnatifida; segmenta ultima oblongo-lanceolata, acuta, 3—4 lin. lata; sori in lacinia 30—40 3. H. APICULATA.

2. Lamina tripinnatifida, segmenta ultima 2—3 lin. lata; sori in lacinia 2—10.
- a. Stipites muricati, lamina deorsum decrescens, pinnae pleraeque ad costam anguste alatae pinnatifidae 4. *H. MULTIFLORA*.
- b. Stipites inermes, lamina deorsum accrescens, pinnae ad medium pinnatifidae 5. *H. MACROCARPA*.
3. Lamina subtripinnata, segmenta ultima lineari-oblonga, 1—1½ lin. lata; sori in lacinia 2—10.
- a. Stipites deorsum pinnis accessorii trichoideo-decompositis instructi; sori nunquam totam faciem segmentorum occupantes.
- α. Costae nude; venae furcatae, pleraeque soriferae 6. *H. SETOSA*.
- β. Costae bullato-paleaceae; venae simplices, paucae soriferae 7. *H. CAPENSIS*.
- b. Pinnae trichoideo-decompositae nullae; sori totam faciem segmentorum occupantes 8. *H. PLATYLEPIS*.

§ 1. EUHEMITELIA (*Cnemidaria* Presl).

Venae infimae fasciculorum anastomosantes. — Cf. tabulam nostram XL. Fig. II.

1. HEMITELIA SUBINCISA KUNZE: trunco nullo; stipitibus inermibus; frondibus chartaceo-herbaceis, utrinque glabris, oblongo-deltaeideis, simpliciter pinnatis, pinnis sessilibus lineari-lanceolatis paulo lobatis, laciniis latis subfalcatis obtusis, venulis simplicibus, utrinque secundum costam 4—6; soris mediis, 8—12 in lacinia.

Hemitelia subincisa Kunze in *Bot. Zeitg.* 1844. 296. *Hooker et Baker, Syn. Fil.* 27.

CAUDEX erectus. Paleae bene evolutas non vidi. STIPITES pedales vel sesquipedales, erecti, validi, inermes, stramineo-castanei, glabri aut leviter furfuracei. LAMINA oblongo-deltaeidea, simpliciter pinnata, 3—4 pedes longa, 1½—2 pedes lata, chartaceo-herbacea, supra prasina, infra pallidior, utrinque omnino glabra. PINNAE laterales lineari-lanceolatae, 10—12-jugae, sessiles, oppositae vel suboppositae, patentes, 6—10 poll. longae, 1—1½ poll. latae, apice serrulato longe acuminato, lateribus paullulum obtuse lobatis, costis et facie inferiore omnino glabris, basi truncata vel parum angustata. LACINIAE denticulatae, obtusae, leviter falcatae, 3—4 lin. latae, vix ultra quartam latitudinis pinnarum partem attingentes. RACHIS ut stipes. VENAE pinnatim fasciculatae, venulis simplicibus, secundum costam utrinque 4—6 (in speciminibus Guianensibus) vel 7—8 (in exemplaribus a Spruceo e Peruvia reportatis), infimae anastomosantes per venam brevem copulantes, areolam deltaeideam efformantes, supra liberae vel iterum subjunctae. SORI mediales in venulis omnibus, igitur in lacinia 8—12. INDUSIUM parvum, brunneum, membranaceum, nudum, depresso et unilateraliter cupuliforme, integrum vel lobatum. RECEPTACULUM cylindricum, nudum.

Habitat in Guyanae britannicae montibus Roraima: Appun n. 1127!, et in terris inde a Peruvia usque in Guatemalam. — In Brasilia aequatoriali forte invenienda.

Obs. *H. grandifoliae* valde affinis et forte ejus varietas; differt tamen pinnis paulo lobatis, venis et soris in lacinia multo paucioribus.

2. HEMITELIA GRANDIFOLIA SPRENG. trunco nullo; stipitibus inermibus vel muricatis; frondibus chartaceo-herbaceis, utrinque glabris, oblongo-deltaeideis, bipinnatifidis, pinnis sessilibus lineari-lanceolatis, ad medium vel deorsum ultra pinnatifidis, laciniis oblongo-subfalcatis, obtusis vel subacutis, venulis utrinque secundum costam 9—10, inferioribus furcatis; soris 20—40 in lacinia.

Tabula nostra XX. Fig. 22. (pinna), et tab. XL. Fig. II. (analysis).

Hemitelia grandifolia Spreng. *Syst. Veg.* IV. 125. *Desv. in Ann. Soc. Linn. Paris.* VI. 320. *Hook. Sp. Fil.* 30. t. 14 A. *Griseb. Fl. Brit. W.-Ind.* 706. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 28.

Cyathea grandifolia Willd. *Sp. Pl.* V. 490.

Cyathea horrida Sieber *Fl. Martin.* 375. *Fl. Mixta* 531, non Smith.

Hemitelia obtusa Kaulf. *Enum. Fil.* 252. *Hook. Sp. Fil.* 29. t. 14 B. *Griseb. l. c.*

Hemitelia speciosa Kaulf. *l. c., Mart. Pl. Crypt.* 78. t. 48. *fig. 2. Griseb. l. c. Ettingsh. l. c. tab. 159. fig. 1., non Willd. nec Hook.*

Cnemidaria speciosa Presl, *Tent. Pter.* 57. t. 1. *fig. 16—17.*

Cnemidaria Kohautiana Presl, *l. c.*

Hemitelia subincisa Mett. *Pl. Lechl. No. 2172, non Kunze.*

Hemistegia grandifolia Presl, *Gefässb.* 47. *Fée, Fil. Ant.* 99.

Hemistegia Willdenowii Fée *l. c.*

Hemitelia spectabilis Kunze, *Linnaea* XXI. 233.

TRUNCUS nullus. CAUDEX erectus. PALEAE ovatae, centro angusto castaneo, marginibus latis scariosis. STIPITES sesquipedales vel bipedales, erecti, validi, saepe plus minusve muricati, stramineo-castanei, glabri aut leviter furfuracei. LAMINA oblongo-deltaeidea, bipinnatifida, 4—5 pedes longa, 1½—2 pedes lata, chartaceo-herbacea, supra prasina, infra pallidior, utrinque omnino glabra vel infra ad costulas paleis paucis albidis bullatis deciduis instructa. PINNAE laterales lineari-lanceolatae, 10—15-jugae, sessiles, oppositae vel suboppositae, patentes, 8—12 poll. longae, 1½—2 poll. latae, ad medium vel deorsum ultra medium pinnatifidae, apice serrulato longe acuminato, basi truncata. LACINIAE oblongo-subfalcatae, obtusae vel subacutae, contiguae, 4—5 lin. latae, denticulatae. RACHIS ut stipes. VENULAE 9—10 utrinque secundum costam, superiores simplices, inferiores furcatae, infimae anastomosantes per venam brevem, areolam deltaeideam efformantes. SORI mediales, in cruribus et venulis omnibus, igitur 30—40 in lacinia inferiore. INDUSIUM et RECEPTACULUM praecedentis.

Habitat in prov. Paraënsi: M. — Praeterea in Guyana gallica: Leprieur!, e. gr. ad Karouany: Sagot n. 873!, et in Guyana batava: Kappler n. 1771. Porro in Peruvia et in terris confinibus usque in insulas Antillanas. — Najas et Extrabrazil.

Obs. *Hemistegia ameristoneuron* Fée *Mem. VIII. 110.* est species ad *H. grandifoliam* accedens mihi ignota. Cl. auctor dicit: „Frondules (pinnae) pinnées, glabres, cartilagineuses; pinnelles lanceolées, sessiles, obtusiuscules, à segments très-obtus peu profonds, à nervilles en saillie, simples, les basilaires très longues; sporothèques petits, écartés, toujours distincts, dix environ sur chaque moitié des lames. — Hab. in Guyana gallica: Poiteau. — Dimensions; longueur des frondules 14—17 centimètres, sur 3 cent. de largeur.“

§ 2. AMPHICOSMIA GARDN.

Fasciculi venarum omnino liberi. — Cf. tabulam nostram XL. Fig. III.

3. HEMITELIA APICULATA HOOK. trunco nullo; stipitibus inermibus; frondibus chartaceo-herbaceis, utrinque glabris, oblongo-deltaeideis bipinnatifidis, pinnis sessilibus lineari-lanceolatis, ultra medium pinnatifidis, laciniis oblongo-lanceolatis acutis subfalcatis, venulis utrinque secundum costam 10—12, omnibus praeter superiores furcatis; soris submarginalibus, 30—40 in lacinia.

Hemitelia apiculata Hook. in *Hook. et Baker Syn. Fil.* 29.

PALEAE lanceolatae, semipollicares, centro castaneo, marginibus late scariosis. STIPITES pedales, inermes, sursum nudi, basi paleacei. LAMINA oblongo-deltaeidea, 4—5 pedes longa, 1½—2 pedes lata, chartaceo-herbacea, utrinque viridis, omnino glabra. PINNAE laterales lineari-lanceolatae, sessiles, oppositae, 8—12 poll. longae, 1½—2 poll. latae, ultra medium pinnatifidae, apice acuminato serrulato, basi truncata. LACINIAE oblongo-lanceolatae, subfalcatae, contiguae, apice aristato-acuminato, 9—12 lin.

longae, 3—4 lin. latae, denticulatae. RACHIS inermis, nuda, stramineo-castanea. VENULAE utrinque secundum costam 10—12, omnes superioribus exceptis profunde furcatae; fasciculi omnium liberi. SORI subapicales (submarginales quoad laciniam) in cruribus et venulis omnibus impositi, igitur 30—40 in lacinia inferiore. INDUSIUM parvum, pallidum, nudum, unilaterally et irregulariter squamiforme. RECEPTACULUM cylindraceo-conicum, nudum.

Habitat in Serra dos Orgãos prov. Rio de Janeiro: Burchell n. 2527! Glaziou 2420! — Etiam in Mexico observata est: Jürgensen n. 273! — Dryas et Extrabrazil.

Obs. Habitus omnino *H. cruciatae* Desr., speciei *Cnemidariae* medium inter *horridam* et *grandifoliam* tenentis, sed fasciculis venarum omnino liberis. An varietas hujus speciei?

4. HEMITELIA MULTIFLORA R. BR. trunco arborescente; stipitibus plerisque muricatis; frondibus subdeltoideis tripinnatifidis, utrinque glabris vel plus minus pubescentibus, pinnis oblongo-lanceolatis, inferioribus reductis, pinnulis linearibus deorsum ultra medium pinnatifidis, segmentis oblongis obtusis, venulis 6—8-jugis, plerisque furcatis; soris alaribus, inter marginem et costam mediis.

Hemitelia multiflora R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. 158. Hook. Sp. Fil. I. 32. Kunze, Linnaea XXIII. 257.

Cyathea multiflora Smith Act. Taur. V. 416! (v. s. in herb. Banks.) Swartz Syn. Fil. 140. Willd. Sp. Plant. V. 496.

Alsophila multiflora Presl, Tent. Pter. 61. J. Smith, Lond. Journ. Bot. I. 666.

Amphicosmia multiflora Gardn. Lond. Journ. Bot. I. 441. Moore, Ind. Fil. 61.

Hemitelia guianensis Hook. Sp. Fil. I. 31. Ic. Plant. t. 648. Hook. et Baker Syn. Fil. 30.

Alsophila laevis J. Smith, Lond. Journ. Bot. I. 666 (nomen solum).

Amphicosmia laevis Moore, Ind. Fil. 60.

Alsophila subaculeata Splitgerber, Enum. Fil. Surinam. 42. *Cyathea aspera* Klotzsch in Linnaea XVIII. 539, non Swartz.

Hemitelia servitensis Karst. Fl. Columb. t. 95.

Hemitelia lingulata Presl, Epimel. 32.

Hemitelia Kegelii Kunze, Linnaea XXI. 235 (forma minus dissecta).

Var. α . GUIANENSIS Baker.

CAUDEX arborescens, 8—10 pedes attingens (teste Appun). PALEAE lineari-acuminatae, nitido-castaneae, semipollicares. STRIPITES sesqui-vel bipedales, erecti, deorsum crassitie digiti, griseo-castanei, deorsum muricati, paleacei et furfuracei. LAMINA subdeltoidea, tripinnatifida, 4—5 pedes longa, 2—3 pedes lata, herbacea vel subcoriacea, utrinque viridis, subglabra vel omnino glabra. RACHES griseae vel castaneae, nitidae, inermes, glabrae vel paulo pubescentes, saepe supra alatae et deorsum paleis paucis deciduis instructae. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales vel sesquipedales, 6—8 poll. latae, deorsum subaequales, inferiores insigniter reductae. PINNULAE contiguae, lineares, 3—4 poll. longae, deorsum 9—10 lin. latae, pinnatifidae ad tres quadrantes vel usque ad costam anguste alatum. SEGMENTA contigua, oblonga, 2—3 lin. lata, obtusa, recta vel leviter falcata, subintegra, inferiora reliquis subaequalia, venulis 7—8-jugis praeter omnes superiores profunde furcatis. SORI alares, medii inter costam et marginem, plerique in dimidio inferiore segmentorum impositi in lineâ laxâ. INDUSIUM parvum, pallidum, membranaceum, subdimidiato-cupuliforme, plus minus lobatum.

Var. β . SPRUCEI Baker.

Lamina herbacea, prasina, utrinque omnino glabra; pinnulae 4 poll. longae, 1 poll. latae, deorsum subpinnatae; segmenta deorsum 3 lin. lata, insigniter crenulata; venulae inferiores 3—4 cruribus instructae; sori 8—12 in segmento.

Var. γ . HOSTMANNI Baker.

Tabula nostra XX. Fig. 21 (apex pinnae).

Hemitelia Hostmanni Hook. Sp. Fil. I. 31. Ic. Plant. t. 646. Fée Gen. Fil. 349. Kunze, Linnaea XXIII. 257 et 310. Presl, Gefässb. 44. Ettingsh. l. c. tab. 156. fig. 8. 11. *Alsophila Hostmanni* J. Smith, Bot. Mag. 1846. Comp. 37. *Amphicosmia Hostmanni* Moore Ind. Fil. 60.

Hemitelia surinamensis Miq. Diar. Inst. Reg. Bat. 1843. p. 7. *Alsophila*? *Leprieuriana* Kunze, Linnaea XXI. 235.

Hemitelia urolepis Kunze l. c. XXIII. 311.

Rachis sursum breviter pubescentes; lamina subcoriacea, supra saturate viridis, in costis breviter pubescens, infra pallidior subglabra costis paullulum paleaceis; pinnulae ad tres quadrantes pinnatifidae; segmenta 2—2½ lin. lata, obtusa, subrecta, integra, venulis 5—6-jugis.

Var. δ . PARKERI Baker.

Hemitelia Parkeri Hook. Sp. Fil. I. 32. Ic. Plant. t. 643. Fée Gen. Fil. 349. Presl, Gefässb. 44.

Amphicosmia Parkeri Moore, Ind. Fil. 61.

Alsophila Weigeltii Roem. in Presl Tent. Pterid. 61. (nomen solum.)

Alsophila strigosa J. Smith, Lond. Journ. Bot. I. 666. (nomen solum.)

Amphicosmia strigosa Moore, Ind. Fil. 61.

Stipes et rachis muricati, obscure ferruginei, griseo-villosi; lamina herbacea obscure viridis, supra sparse, infra dense griseo-pubescentis; pinnulae ad medium vel ultra pinnatifidae, segmentis rectis, obtusis, integris, 2—2½ lin. latis; indusium ciliatum.

Obs. Stirps valde variabilis quoad habitum, vestimentum et indusium; sed limites certos inter formas definitas, speciminibus numerosis siccis et vivis originalibusque auctorum citatorum examinatis, invenire non potui. — *Polypodium pauciflorum* Hook. Sp. Fil. IV. 242 (Guiana batava, Hostmann 64!) est forma hujus speciei mere bipinnatifida.

Habitat frequens in America aequatoriali. Forma α . in prov. Para et do Alto Amazonas, e. gr. ad Tanaü juxta fluv. Acara, ad ripas fluv. Para et Rio Negro: Spruce!; in Guyana gallica: Poiteau!, Martin!, Leprieur!, Sagot n. 726!; in Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 1658!, Appun n. 174!, Rothery!; et in Guyana batava: Splitgerber, Kegel n. 1384. — Var. β . prope San Carlos ad Rio Negro prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 3145! — Var. γ . in tota Guyana: Fockel!, Hostmann n. 64! 814!, Leprieur n. 206, Rich. Schomburgk n. 280, Rob. Schomburgk n. 304!, Rothery! (multos per annos in horto Kewensi culta). — Var. δ . item in tota Guyana: Parker!, Rob. Schomburgk n. 10. 304!, Appun n. 192! 428! 429!, Martin!, Poiteau!, Kappler n. 1355., et in Columbia insulisque Antillanis. — *Najas* et *Extrabrazilensis*.

5. HEMITELIA MACROCARPA PRESL: trunco arborescente; stipitibus inermibus; frondibus subdeltoideis subcoriaceis tripinnatifidis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis, inferioribus maximis, pinnulis linearibus ad medium pinnatifidis, segmentis rectis oblongo-deltoideis, venulis utrinque secundum costam 6—8-plerisque furcatis et soriferis; soris alaribus, mediis inter costam et marginem.

Tabula nostra LII.

Hemitelia macrocarpa Presl, Gefässb. 44. Fée, Gen. Fil. 349.

Amphicosmia macrocarpa Moore, Ind. Fil. II. 69.

Hemitelia Moricandiana Kunze Mss. Hook. et Baker Syn. Fil. 30.

Metaxya argentea Leprieur Mss.

CAUDEX arborescens, 7—8 pedes attingens (fide Appun). PALEAE lineari-acuminatae, nitido-castaneae, semipollicares. STIPITES sesquipedales, validi, erecti, inermes, castanei. LAMINA subdeltoidea, tripinnatifida, 4—5 pedes longa, 2—3 pedes lata, subcoriacea, utrinque glabra. RACHES castaneae, nudae, superne alatae. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales aut sesquipedales, 8—9 poll. latae, deorsum subaequales, inferiores maximae. PINNULAE sessiles, lineares, 3—4 poll. longae, 9—12 lin. latae, pleraeque ad medium pinnatifidae. SEGMENTA contigua, oblonga vel subdeltoidea, 2—4 lin. longa, circa 3 lin. lata, recta, denticulata, venulis utrinque secundum costam 6—8, omnibus praeter superiores furcatis et soriferis. SORI alares, medii inter costam et marginem impositi in lineâ laxâ. INDUSIUM brunneum, coriaceum, glabrum, subdimidiato-cupuliforme, interdum subcompletum. RECEPTACULUM nudum.

Species ad praecedentem valde accedens.

Habitat in prov. Bahia: Blanchet n. 17. 3227! — Porro in Guyana britannica: Appun n. 1931, et in gallica, e. gr. in sylvis paludosis ad Karouany: Sagot n. 842! — Hamadryas et Extrabrisil.

6. HEMITELIA SETOSA METTEN. trunco arborescente; stipitibus muricatis; frondibus oblongo-deltoideis herbaceis tripinnatis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis, inferne pinnis accessoriis trichideo-decompositis instructis, pinnulis linearibus, segmentis lineari-oblongis paulo denticulatis, venulis utrinque secundum costam 7—8, plerisque soriferis, omnibus praeter superiores furcatis; soris alaribus prope costam dispositis; indusio dimidiato-globoso.

Tabula nostra LXVII. Fig. II. (truncus).

Hemitelia setosa Mett. Mscr. in plantis Burchellianis in herb. Hook. Hook. et Baker Syn. Fil. 449.

Alsophila setosa Kaulf. Enum 249. Hook. Sp. Fil. I. 46.

Cyathea Beyrichiana Presl Tent. 55. Hook. Sp. Fil. I. 21. Ic. Plant. t. 623.

Amphicosmia Beyrichiana Moore, Ind. Fil. II. 59.

Cyathea Bongardiana Kunze Mss.

Alsophila stipulacea Beyrich Mss.

Hemitelia Beyrichiana Presl, Gefässb. 45. Flé Gen. Fil. 349.

CAUDEX arborescens, teste Gardnero 30 pedes attingens, paleis linearibus pallide brunneis 6—9 lin. longis vestitus. PALEAE stipitis nitidae, castaneae, subulatae, semipollicares. STIPITES validi, deorsum crassitie digiti, muricati, fere ad basin pinnis accessoriis trichideo-decompositis instructi. LAMINA herbacea, oblongo-deltoidea, tripinnata, 6—8 pedes longa, 3—4 pedes lata, utrinque viridis subglabra. RACHES primariae et secundariae nudae, substramineae, subglabrae. PINNAE oblongo-lanceolatae, sesquipedales vel bipedales, 6—7 poll. latae, deorsum subaequales. PINNULAE contiguae, lineares, omnino sessiles, 3—4 poll. longae, deorsum 8—9 lin. latae, costis deorsum liberis, superne anguste alatis. SEGMENTA contigua, lineari-oblonga, subdenticulata vel leviter crenulata, 1½ lin. lata, marginibus fertiliū leviter inflexis, inferiora reliquis subaequalia, venis utrinque secundum costam 7—8, omnibus praeter superiores profunde furcatis. SORI plerique ultra medium segmentorum attingentes, 8—10 in lacinia maxima, alares, in lineâ prope costam dispositi. INDUSIUM membranaceum, brunneum, nudum, primum dimidiato-globosum, mox lacero-dehiscens. RECEPTACULUM conico-cylindricum hispidum.

Habitat in sylvis primaevae prov. Sebastianopolitanae, e. g. Serra dos Orgãos, Serra d'Estrella etc., et in prov. S. Catharinae: Chamisso, Beyrich! Sello! Burchell n. 2267! Gardner n. 135! Glaziou n. 980! 1700! 2287! et al. (per multos annos in Hort. Kewensi culta). — Dryas.

Obs. Indusium minus depressum quam in speciebus reliquis *Hemiteliae*, sed nunquam, ut crederim, perfecte cyathiforme. Habitus generalis omnino *Cyathearum* nostrarum.

7. HEMITELIA CAPENSIS R. BR. trunco arborescente; stipitibus inermibus, paleis linearibus; frondibus oblongo-deltoideis herbaceis subtripinnatis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis, accessoriis reductis trichideo-decompositis, pinnulis linearibus, infra ad costas paleis parvis bullatis instructis, segmentis lineari-oblongis inciso-dentatis, venis utrinque secundum costam 6—8, omnibus simplicibus; soris costalibus paucis v. saepe solitariis.

Hemitelia capensis R. Brown, Prodr. 158. Kaulf. Enum. Fil. 253. Hook. Sp. Fil. I. 36. Mett. Fil. Hort. Lips. 111. t. 29. fig. 6—7.

Polypodium capense Linn. fil. Suppl. 445.

Aspidium capense Swartz, Syn. Fil. 61., non Willd.

Amphicosmia riparia Gardn. Lond. Journ. Bot. I. 441. t. 12.

Cyathea capensis Smith, Act. Taur. V. 417.

Cyathea polypodioides Swartz, Vet. Acad. Stockh. Handl. 1817. p. 78.

Cyathea riparia Willd. Sp. Pl. V. 493.

Cyathea monosorata Willd. Mss.

Hemitelia Gardneriana Presl, Gefässb. 42.

CAUDEX arborescens, 6—8 pedes attingens (teste Gardnero). PALEAE lineares, nitide castaneae, marginibus pallidioribus, semipollicares. STIPITES validi, inermes, deorsum crassitie digiti, fere ad basin pinnis reductis accessoriis trichideo-decompositis instructi. LAMINA oblongo-deltoidea, 5—6 pedes longa, 2—2½ pedes lata, herbacea, utrinque viridis, glabra. RACHES stramineo-castaneae, nudae vel paulo furfuraceae. PINNAE oblongo-lanceolatae, sessiles, 9—15 poll. longae, 5—6 poll. latae, deorsum subaequales. PINNULAE sessiles, contiguae, lineares, 2½—3 poll. longae, 6—8 lin. latae, costis plerisque anguste alatis, basi truncata vel postice segmentis paulo reductis, infra ad costas paleis ovatis parvis bullatis plus minusve vestitae. SEGMENTA contigua, lineari-oblonga, 1½ lin. lata, subfalcata, inciso-dentata; venis utrinque secundum costam 6—8, omnibus penitus simplicibus, erecto-patentibus, ad apices dentium adentibus. SORI in segmentorum dimidio vel triente inferiore prope costam congesti, in specimenibus nostris Brasiliensibus semper solitarii. INDUSIUM parvum, membranaceum, nudum, brunneum, subdimidiato-cupuliforme. RECEPTACULUM conico-cylindricum, hispidum.

Habitat species rarissima in prov. Minarum prope Ouro Preto: Freyreiss!, et in Serra dos Orgãos prov. Rio de Janeiro: Gardner n. 5954! — Item incola Javae et Africae australis; distributione valde singulari.

Obs. Pinnae inferiores accessoriae hymenophylloideae saepe 6—12 poll. longae sunt, cf. *Trichomanes incisum* Thunb. Prodr. 173. et *Trichomanes? cormophyllum* Kaulf. Enum. 266.

8. HEMITELIA PLATYLEPIS HOOK. trunco..., stipitibus inermibus, paleis latis magnis lanceolatis; frondibus oblongo-deltoideis, tripinnatis, utrinque breviter villosis, pinnis oblongo-lanceolatis, inferioribus longe petiolatis nunquam trichideo-decompositis, pinnulis linearibus, segmentis lineari-oblongis profunde inciso-pinnatifidis, marginibus inflexis, venis utrinque secundum costam 4—5 plerisque furcatis; soris totam faciem inferiorem segmentorum occupantibus.

Tabula nostra XL. Fig. III. (anathysis).

Hemitelia platylepis Hook. II. Cent. Ferns. t. 100. Hook. et Baker Syn. Fil. 29.

Caudex ignotus. PALEAE magnae, nitido-castaneae, lanceolatae, 8—9 lin. longae, deorsum 3—4 lin. latae, firmo-membranaceae, marginibus tenuioribus paulo pallidioribus. STIPITES validi, nudi, castanei, inermes, deorsum crassitie digiti, paleis imbricatis in dimidio inferiore vestiti. LAMINA subdeltoidea, 4—6 pedes longa, 2—2½ pedes lata, tripinnata, subcoriacea, utrinque viridis, breviter griseo-villosa. RACHES secundariae et primariae superne graciles, tomento griseo denso adpresso vestitae, omnes

superne anguste alatae. PINNAE inferiores maximae, oblongo-lanceolatae, pedales vel ultra, 5—6 poll. latae, petiolo 2 poll. longo instructae, deorsum subaequales. PINNULAE lineares, contiguae, 2½—3 poll. longae, 6—7 lin. latae, basi truncata, petiolo brevi instructae, costis inferne liberis, supra alā angustā praeditis. SEGMENTA laxa, lineari-oblonga, 1½ lin. lata, profunde inciso-pinnatifida, marginibus inflexis. VENAE utrinque secundum costam 4—5, omnes superioribus exceptis furcatae. SORI magni, 8—10 in lacinia, totam faciem inferiorem segmentorum occupantes. INDUSIUM nudum membranaceum, dimidiato-globosum. RECEPTACULUM oblongo-conicum, hispidum.

Habitat prope San Carlos, ad ripas fluminis Rio Negro: Spruce 3127! — Najas.

III. ALSOPHILA R. BR.

ALSOPHILA R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. 158. Kaulf. Enum. Fil. 248. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 9 et 21. Presl, Tent. 60. tab. 1. fig. 6. 19. 20. Hook. Sp. Fil. I. 34. — TRICHOPTERIS Presl, Delic. Prag. I. 172. Tent. 58. tab. 1. fig. 10. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 34. Fée, Gen. Fil. 347. J. Smith, Ferns Brit. et For. 246. — CHNOOPHORA Kaulf. Enum. Fil. 250. — AMPHIDESMIUM Schott, Gen. Fil. t. 1. Fée, Gen. Fil. 348. Moore, Ind. Fil. p. CV. — GYMNOSPHERA Blume, Enum. Fil. Jac. 242. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 100. — METAXYA Presl, Tent. 59. tab. 1. fig. 5. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 42 B. — DICHOREXIA et LOPHOSORIA Presl, Gefässb. 36. — TRICHOSORUS Liebm. Mex. Breg. 129.

Indusium nullum.

Tabula nostra XL. Fig. IV.

CAUDEX arboreus, in speciebus quibusdam 50—80 pedes attingens. STIPITES validi, erecti, pedales ad bipedales, plerique muricati, plus minusve paleacei. FRONDES uniformes, pinnatae ad quadripinnatifidae, segmentis ultimis plerisque parvis contiguis lineari-oblongis. VENAE nunquam anastomosantes. Venulae ultimae simplices vel furcatae. SORI alares vel dorsales, plerique uniseriati. RECEPTACULUM globosum, plerumque pilis praesertim ad basin crinitum. — Species 60—70, multae valde consimiles, aliae imperfecte cognitae, per regiones calidiores utriusque orbis late dispersae.

CLAVIS SPECIERUM.

- § 1. CHNOOPHORA KAULF. Lamina pinnata vel bipinnata, divisionibus ultimis integris vel crenatis
- Lamina simpliciter pinnata 1. A. BLECHNOIDES.
 - Lamina bipinnata.
 - Sori uniseriati, mediales; pinnulae integrae, apice interdum excepto 2. A. TAENITIS.
 - Sori uni- vel biseriati prope costam; pinnulae crenatae 3. A. ELEGANS.
 - Sori marginales; pinnulae crenatae 4. A. MARGINALIS.
- § 2. HAPLOPHLEBIA MART. Lamina tripinnatifida vel subtripinnata. Venulae segmentorum omnes vel paene omnes simplices, soris dorsalibus.
- Pinnulae haud ultra quartam ad medium dissectae.
 - Pinnulae deorsum decrecentes.
 - Lamina utrinque subglabra.
 - Pinnulae 2—2½ poll. longae, acutae vel subobtusae 5. A. ATROVIRENS.
 - Pinnulae 5—6 poll. longae, insigniter acuminatae 6. A. MIERSII.
 - Lamina infra griseo-pubescentis 7. A. RADENS.

Cyath.

B. Pinnulae deorsum accrescentes.

- Pagina inferior subnuda, pinnae deorsum reductae.
 - A. PROCERA.
- Pagina inferior bullato-paleacea; pinnae deorsum subaequales 9. A. ARBUSCULA.

C. Pinnulae deorsum usque ad alam angustam dissectae. Lamina in omnibus subglabra.

- Lamina subcoriacea.
 - Venulae 3—4-jugae in lacinia 10. A. OBLONGA.
 - Venulae 6—8-jugae in lacinia 11. A. PUNGENS.
- Lamina herbacea.

- Sori medii inter costam et marginem 12. A. COMPTA.
- Sori submarginales 13. A. PRAECINCTA.

§ 3. DICRANOPHLEBIA MART. Lamina subtripinnata vel quadripinnatifida. Venulae segmentorum pleraeque furcatae, soris alaribus.

I. Lamina subtripinnata, utrinque concolor.

A. Segmenta ultima lineari-oblonga, 3—4-ies longiora quam lata, venulis 6—9-jugis.

a. Lamina subglabra.

- Lamina coriacea vel subcoriacea.
 - Pinnulae sessiles 14. A. ASPERA.
 - Pinnulae petiolatae 15. A. GIBBOSA.
- Lamina herbacea.

* Raches substramineae vel parum castaneae.

- Lamina infra paleis nullis vel paucis.
 - A. PHALERATA.
 - Lamina infra paleis albidis copiosis vestita.
 - A. LEUCOLEPIS.
- Raches ebeneae 18. A. NIGRA.

b. Lamina insigniter pubescens.

- Venulae circ. 6-jugae, stipites vix muricati.
 - A. VILLOSA.
- Venulae 7—9-jugae, stipites muricati.
 - Segmenta inferiora deflexa et super raches imbricata 20. A. PLAGIOPTERIS.
 - Segmenta inferiora patentia et nullo modo super raches imbricata 21. A. PALEOLATA.

B. Segmenta ultima linearia 4—6-ies longiora quam lata, venulis circiter 10-jugis.

- Raches et lamina infra subglabrae 22. A. FEROX.
- Raches et lamina infra molliter villosae, pilis patentibus 23. A. ARMATA.

II. Lamina quadripinnatifida, infra albo-pruinata. 24. A. PRUINATA.

§ 1. CHNOOPHORA KAULF.

1. ALSOPHILA BLECHNOIDES HOOK. stipitibus nudis nitidis inermibus; frondibus oblongo-deltoides simpliciter pinnatis coriaceis utrinque glabris, pinnis lineari-ligulatis subintegris petiolatis, basi subcuneata, venis densis elevatis simplicibus vel furcatis; soris per pinnarum dimidiam inferiorem sparsis in lineis 1—3 irregularibus.

Alsophila blechnoides Hook. Sp. Fil. I. 35. Kunze, Bot. Zeitg. II. 312. Hook. et Baker Syn. Fil. 32.

Polypodium blechnoides Richard in Act. Soc. Nat. Hist. Paris. (1792.) p. 114. Swartz, Syn. Fil. 73. (nomen solum) teste Kaulfussio.

Amphidesmium blechnoides Klotzsch, Linnæa XX. 372. Kunze, Linnæa XXI. 233. Moore, Ind. Fil. II. 61.

Alsophila rostrata Mart. Ic. Crypt. Bras. 64. t. 39. Mett. Fil. Hort. Lips. 108.

Polypodium rostratum Willd. Sp. Plant. V. 193.

Metaxya rostrata Presl, Tent. Pter. 60. t. 1. fig. 5. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 42 B.

Polypodium Parkeri Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 232.

CAUDEX depressus. STIPITES sesqui- vel bipedales, erecti, nitidi, straminei, nudl. PALEAE basales, parvae, filiformes, castaneae, cumulum lanosum efformantes. LAMINA oblongo-deltaeidea, 3—4 pedes longa, 1—1½ pedes lata, simpliciter pinnata, coriacea, utrinque glabra, nitida. PINNAE 6—12-jugae, alternae vel suboppositae, lineari-ligulatae, patentes, apice acuminato saepe subserrulato, basi subcuneata, petiolis brevibus basi articulatis instructae, imae reliquis subaequales. VENAE elevatae, firmae, crebrae, parallelae, furcatae vel simplices. SORI numerosissimi in pinna, irregulariter sparsi, 1—3 in venula, dimidiam anteriorem pinnarum fugientes, saepe prope costam in lineam undulatam congesti. RECEPTACULUM globoso- vel oblongo-depressum, pilis longis articulatis ferrugineis crinitum. SPORANGIA subcatheto-gyrata.

Frequens per totam Guyanam et Brasiliam amazonicam, item per terras inde a Peruvia usque ad insulas Antillanas. — Vaga et Extrabrsiliensis.

2. ALSOPHILA TAENITIS Hook. stipitibus nudis nitidis inferne muricatis; frondibus subdeltoideis bipinnatis coriaceis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis distincte petiolatis, pinnulis lineari-ligulatis integris, apice acuminato saepe serrulato, basi subcuneata, distincte petiolatis, venis bi- vel trifurcatis vel subpinnatis; soris uniseriatis, inter costam et marginem mediis.

Tabula nostra XL. Fig. IV. b. (analysis) et LXVII. Fig. III. (truncus).

Alsophila Taenitis Hook. Sp. Fil. I. 35. Kunze, *Linnaea* IX. 90. Moore, *Ind. Fil.* II. 57. Hook. et Baker Syn. Fil. 32.

Polypodium Taenitis Roth, Nov. Sp. Plant. 394. Kaulf. Enum. 119.

Alsophila excelsa Mart. Ic. Crypt. Bras. 63. tab. 27. (*planta tota*), t. 29. Fig. 1—2 (*caudex*) et t. 37. (*frons*). Mett. Fil. Hort. Lips. 108.

Trichopteris excelsa Presl, Del. Prag. I. 172. Tent. Pter. 59. t. I. fig. 10. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 34, et Auctt.

Trichopteris denticulata Presl, Tent. 59.

Polypodium corcovadense Raddi, Syn. Fil. 76.

CAUDEX arboreus, 5—20-pedalis, crassitie brachii. STIPITES nitidi, glaberrimi, stramineo-castanei, pedales vel sesquipedales, deorsum muricati. PALEAE nitidae, castaneae, densae, lineari-lanceolatae, 9—15 lin. longae, deorsum 2—3 lin. latae, apice longe acuminato. LAMINA subdeltoidea, bipinnata, 4—5 pedes longa, 2—3 pedes lata, coriacea, utrinque viridis glabra nitida. RACHES nuda, nitidae, inermes. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales aut sesquipedales, 8—9 poll. latae, deorsum subaequales, petiolo 1—1½ poll. longo basi articulo instructae. PINNULAE laxae, 12—20-jugae, saepe suboppositae, lineari-ligulatae, 3—4 poll. longae, 8—9 lin. latae, acumine saepe serrulato, basi subcuneata, inferiores petiolo basi articulo 3—4 lin. longo instructae. VENAE basi bi- vel trifurcatae, crebrae, graciles, interdum subpinnatae, venulis 5 in fasciculo. SORI medii inter costam et marginem in lineam undulatam congesti. RECEPTACULUM parvum, globosum, pilis longis articulatis ferrugineis crinitum.

Habitat in sylvis densis prov. Sebastianopolitanae, Minarum, S. Pauli et S. Catharinae: Raddi!, Setto!, Pohl!, Martius!, Burchell n. 2488! 2649! 3164!, Gardner n. 5335—6, aliique collectores. — Dryas, Oreas.

3. ALSOPHILA ELEGANS Mart. stipitibus nudis nitidis, inferne muricatis; frondibus subdeltoideis bipinnatis coriaceis, infra breviter pubentibus et parce paleaceis, pinnis oblongo-lanceolatis distincte petiolatis, pinnulis lineari-ligulatis crenulatis vel crenatis, basi rotundata, petiolatis, venis pinnatis, utrinque 2—4 in fasciculo; soris plerisque prope costam consitis uniseriatis.

Alsophila elegans Mart. Icon. Crypt. Bras. 63. tab. 38. Hook. Sp. Fil. I. 35. Kunze, Bot. Zeitg. II. 312. Moore, *Ind. Fil.* II. 49. Hook. et Baker Syn. Fil. 32.

Trichopteris elegans Presl, Tent. Pter. 59. Gefässb. 32. tab. 6. fig. 13. (*sectio stipitis*).

Var. β . CRENATA Baker: crenaturis usque quartam pinnularum partem saepe attingentibus.

Tabula nostra LIII.

Alsophila crenata Kunze, Bot. Zeitg. II. 312. *Linnaea* XXII. 580. Moore, *Ind. Fil.* II. 49.

Trichopteris crenata Pohl Mss.

CAUDEX depresso-arboreus. STIPITES validi, erecti, stramineo-castanei, deorsum muricati et paleacci. PALEAE castaneae, lanceolatae, semipollicares. LAMINA subdeltoidea, coriacea, bipinnata, 3—4 pedes longa, 2—3 pedes lata, utrinque viridis, supra subglabra, infra breviter pubescens et ad costas pinnarum paleis parvis lanceolatis instructa. RACHES inermes, substramineae, parce pilosae. PINNAE oblongo-lanceolatae, 9—15 poll. longae, 5—6 poll. latae, deorsum subaequales, petiolo 6—12 lin. longo basi articulo instructae. PINNULAE subcontiguae, 20—30-jugae, suboppositae vel alternae, lineari-ligulatae, 2—3 poll. longae, 3—4 lin. latae, apice acuto vel subobtusum, marginibus plus minusve crenulatis, basi subrotundata saepe inaequali, petiolo basi articulo circiter 2 lin. longo instructae. VENAE crebrae, graciles, pinnatae, 4—6 vel deorsum 8 in fasciculo. SORI alares, plerique in lineam rectam prope costam congesti, vel inferne conferte biseriati. RECEPTACULUM parvum, globosum, pilis longis articulatis ferrugineis crinitum.

Habitat forma normalis in sylvis prov. S. Pauli et Minarum: Martius, Setto!, Burchell n. 4872! — Var. β . in prov. Minarum: Regnell!, Pohl!; e. gr. ad Caidas: Lindberg! — Oreas.

4. ALSOPHILA MARGINALIS Klotzsch: stipitibus dense paleaceis, deorsum submuricatis; frondibus subdeltoideis bipinnatis subcoriaceis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis breviter petiolatis, pinnulis linearibus subsessilibus, basi late cordata, venis bifurcatis vel subpinnatis; soris uniseriatis submarginibus.

Alsophila marginalis Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 542. Moore, *Ind. Fil.* II. 53. Hook. et Baker Syn. Fil. 32.

Trichopteris marginalis J. Smith Mss.

Caudex ignotus. STIPITES pedales, sulcati, punctis duris paucis elevatis scabri, paleis densis lanceolatis acuminatis pallido-brunneis vestiti. LAMINA subdeltoidea, 4—5 pedes longa, 1½—2 pedes lata, bipinnata, subcoriacea, supra saturate viridis, infra pallidior, utrinque glabra. RACHIS primaria deorsum paleacea, supra sicut secundariae pilis furfuraceis plus minus vestita. PINNAE oblongo-lanceolatae, 9—15 poll. longae, 4—5 poll. latae, deorsum subaequales, breviter petiolatae, petiolo basi articulo. PINNULAE subsessiles, lineares, 2—2½ poll. longae, 5—6 lin. latae, apice acuto vel subobtusum, marginibus crenulatis, basi cordato-hastata. VENAE bifurcatae vel inferiores subpinnatae. SORI subapicales quoad venulas, uniseriati, lineam undulatam prope marginem efformantes. RECEPTACULUM parvum, globosum, pilis longis ferrugineis crinitum.

Habitat in Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 1129!, e. gr. in monte Roraima: Appun n. 1377! — Forte in Brasilia amazonica invenienda.

§ 2. HAPLOPHLEBIA Mart.

5. ALSOPHILA ATROVIRENS Presl: stipitibus et rachibus subglabris; frondibus tripinnatifidis subcoriaceis subglabris, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum reductis petiolatis, basi articulata, pinnulis lineari-ligulatis saepe subotusis, ad quartam vel deorsum ad medium pinnatifidis, basi inaequali sessili subtruncata, segmentis rectis obtusis, venulis plerumque simplicibus utrinque 4—5 in lacinia; soris mediis, 4—8 in lacinia.

Alsophila atrovirens Presl, Tent. Pter. 61. Hook. Sp. Fil. I. 46. Hook. et Baker Syn. Fil. 34. (*synonymis exclusis*).

Polypodium atrovirens Langsd. et Fischer, Icon. Fil. 12. t. 14. Willd. Sp. Plant. 188., et Auctt.

Alsophila Hookeriana Klotzsch in Hook. Sp. Fil. I. 39.

Alsophila radens Kaulf. Enum. Fil. 248. nec. Mett.

Alsophila pycnocarpa Kunze, Linnaea IX. 97. Schluhr, Suppl. I. 208. t. 86?

CAUDEX arboreus, 4—5 pedes attingens (teste BURCHELL). STIPITES validi, erecti, stramineo-castanei, sulcati, valde muricati, sesquipediales vel bipediales, deorsum dense paleacei. PALEAE nitidae, lanceolatae, omnino castaneae, semipollicares. RACHES glabrae, stramineo-castaneae, saepe deorsum aculeis pungentibus muricatae. LAMINA subcoriacea, subdeltoidea, tripinnatifida, 4—5 pedes longa, 2—2½ pedes lata, utrinque viridis, subglabra vel infra in costis pinnularum paulo pubescens. PINNAE oblongo-lanceolatae, 9—15 poll. longae, 4—5 poll. latae, deorsum reductae, breviter petiolatae, petiolo basi articulo. PINNULAE 15—25-jugae, contiguae, lineari-ligulatae, mediales 2—2½ poll. longae, 4—5 lin. latae, acutae vel subobtusae, nunquam acuminatae, marginibus ad quartam vel deorsum ad medium pinnatifidae, basi inaequali subtruncata sessili. SEGMENTA 1½ lin. lata, obtusa, subrecta, subintegra. VENAE utrinque 4—5 in lacinia, omnes vel pleraeque simplices, praesertim soriferae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM parvum, globosum, pilis deciduis crinitum.

Habitat in sylvis primaevis provinciarum Brasiliae meridionalium. In prov. Minarum: Lindberg n. 21!; in Sebastianopolitana, Serra da Cubatão etc.: Burchell n. 4176!; in prov. S. Pauli: Burchell n. 4626!; in prov. S. Catharinae: Langsdorff!, Fox!, Chamisso. Praeterea inde ab insula Juan Fernandez (Wood!) usque in Panamam (Seemann!). In hortis Europaeis jam ex longinquo colitur. — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

6. ALSOPHILA MIERSII Hook. stipitibus et rachibus glabris; frondibus tripinnatifidis subcoriaceis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum reductis, petiolatis, basi articulata, pinnulis linearibus longe acuminatis, in medio pinnae ad medium pinnatifidis, deorsum reductis, basi inaequali subrotundata, segmentis rectis obtusis, venulis plerumque simplicibus utrinque 4—5 in lacinia; soris mediis, 4—8 in lacinia.

Tabula nostra LXVIII. Fig. I. (truncus).

Alsophila Miersii Hook. Sp. Fil. I. 38. Hook. et Baker Syn. Fil. 32.

Alsophila acuminata J. Smith, Lond. Journ. of Bot. I. 667. (nomen solum).

Alsophila unita Kunze Mss.

CAUDEX arboreus. STIPITES validi, erecti, nitidi, straminei, glabri, aculeis validis patentibus 3—4 lin. longis muricati. PALEAE lanceolato-acuminatae, castaneae, 8—10 lin. longae. LAMINA subcoriacea, subdeltoidea, tripinnatifida, 5—6 pedes longa, 3—4 pedes lata, utrinque viridis, glabra, nitida. RACHES ut stipes. PINNAE oblongo-lanceolatae, 1½—2 pedes longae, in medio 10—11 poll. latae, deorsum paulo reductae, basi petiolo articulo 1 poll. longo instructae. PINNULAE 15—18-jugae, laxae, lineares, 5—6 poll. longae, in medio 6—8 lin. latae, ad medium pinnatifidae, apice longe acuminato passim inciso-dentato, deorsum reductae praesertim in latere inferiore, basi inaequaliter subrotundata, breviter petiolatae. SEGMENTA 1½ lin. lata, obtusa, subrecta, subintegra. VENAE utrinque 4—5 in lacinia, omnes vel pleraeque simplices, praesertim soriferae. RECEPTACULUM parvum, punctiforme, pilis densis crinitum.

Habitat in sylvis provinciarum Brasiliae meridionalium, rara. In prov. S. Catharina, et in Tejuca: Miers, Glaziou n. 1702!; in Serra dos Orgãos: Gardner n. 117! — Dryas.

7. ALSOPHILA RADENS METTEN. stipitibus et rachibus parce villosis; frondibus tripinnatifidis herbaceis, supra subglabris, infra pubescentibus, pinnis oblongo-lanceolatis, deorsum reductis, petiolatis, basi articulata, pinnulis lineari-ligulatis acutis, ad tertiam vel medium pinnatifidis, basi sessili subtruncata, segmentis rectis obtusis, venulis plerumque simplicibus utrinque 4—5 in lacinia, omnibus interdum soriferis; soris mediis.

Alsophila radens Metten. Fil. Hort. Lips. 109. Hook. et Baker Syn. Fil. 35, non Kaulf.

CAUDEX arboreus, 3 pedes attingens (teste METTENIO). STIPITES 2—3-pedales, recti, subglabri, muricati, straminei, supra subpilosi. PALEAE ovato-acuminatae, pallide fuscae. LAMINA herbacea, subdeltoidea, tripinnatifida, 4—5 pedes longa, 2—3 pedes lata, supra subglabra, infra insigniter griseo-pubescentis, praesertim in costis pinnularum et segmentorum. RACHES stramineae, subvillosae, parce muricatae. PINNAE oblongo-lanceolatae, 1—1½ pedes longae, 4—5 poll. latae, deorsum reductae, breviter petiolatae, petiolo basi articulo. PINNULAE 20—25-jugae, contiguae, ligulato-lanceolatae, 2—2½ poll. longae, 5—6 lin. latae, ad tertiam vel medium pinnatifidae, apice acuto nunquam acuminato, basi sessili subtruncata. SEGMENTA 1½ lin. lata, obtusa, subrecta, subintegra, inferiora paulo reducta, praesertim lateris postici. VENAE utrinque 4—5 in lacinia, omnes vel pleraeque simplices, praesertim soriferae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM globosum, dense crinitum.

Habitat in sylvis prov. S. Catharinae: Pabst! — Probabiliter est mera varietas A. atrovirentis. — Dryas.

8. ALSOPHILA PROCERA KAULF. stipitibus et rachibus glabris; frondibus tripinnatifidis papyraceo-herbaceis, utrinque subnudis, pinnis oblongo-lanceolatis petiolatis deorsum insigniter reductis, pinnulis linearibus acuminatis, ad tertiam vel medium pinnatifidis, deorsum accrescentibus, basi sessili subtruncata, segmentis rectis obtusis, venulis plerumque simplicibus utrinque 6—8 in lacinia, omnibus saepe soriferis; soris mediis.

Alsophila procera Kaulf. Mss., test. Roemer et Kunze. Mart. Ic. Crypt. Bras. 64. t. 40. ex parte. Hook. Sp. Fil. I. 38. ex parte. Hook. et Baker, Syn. Fil. 32. ex parte.

Polypodium procerum Willd. Sp. Plant. V. 206.

CAUDEX arboreus, 6—12 pedes attingens (teste SPRUCE). STIPITES 2—2½ pedes alti, erecti, validi, glabri, paleacei, stramineo-castanei, muricati. PALEAE lineares, acuminatae, pollicares, castaneae, nitidae, interdum marginibus subito griseis. LAMINA papyraceo-herbacea, subdeltoidea, tripinnatifida, 5—6 pedes longa, 2½—3 pedes lata, supra saturate viridis, infra pallidior, utrinque glabra vel infra paulum paleacea. RACHES nudeae vel deorsum muricatae et paleaceae. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales vel sesquipediales, 6—7 poll. latae, deorsum insigniter reductae, petiolo haud articulo 1 poll. longo instructae. PINNULAE 16—20-jugae, contiguae, lineares, 3—3½ poll. longae, deorsum 8—9 lin. latae, ad tertiam vel medium pinnatifidae, deorsum accrescentes, sessiles, basi aequaliter truncata, apice longe acuminato subintegro. SEGMENTA contigua, 2—2½ lin. lata, obtusa, subrecta, subintegra. VENAE utrinque 5—6 vel segmentorum inferiorum 6—8 in lacinia, omnes vel pleraeque simplices, praesertim soriferae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM parvum, doliolatum, breviter crinitum.

Obs. A. armigera Kunze (Ettingsh. l. c. tab. 156. fig. 10. 12. 13) probabiliter est varietas laminā magis coriacea, rachibus et paginā inferiore praesertim in costis paulo furfuraceo-pubescente.

Habitat in sylvis prov. Paraënsis: Siber, Com. Hoffmannsegg!, Spruce n. 22! 32!, et in prov. Rio de Janeiro: Sello!, e. gr. in Serra dos Orgãos: Glaziou n. 1786! — Item Peruvian incolit: Spruce n. 4715! 4724! 4323! — Vaga et Extrabrazil.

9. ALSOPHILA ARBUSCULA PRESL: stipitibus et rachibus glabris; frondibus tripinnatifidis herbaceis vel subcoriaceis utrinque glabris, infra paleis parvis bullatis subalbidis in costis segmentorum et pinnularum instructis, pinnis oblongo-lanceolatis subsessilibus deorsum subaequalibus, pinnulis linearibus e basi subtruncata in apicem acuminatum sensim angustatis, segmentis rectis obtusis, venulis plerumque simplicibus, utrinque 5—6 in lacinia, omnibus saepe soriferis; soris mediis.

Alsophila Arbuscula Presl, *Tent. Pter.* 61. Kunze, *Bot. Zeitg.* II. 313.

Polypodium Arbuscula Beyrich Mss.

Alsophila procera Mart. et Hook. loc. cit. ex parte.

CAUDEX arboreus, 14 pedes attingens (teste GARDNER). STIPITES validi, erecti, sesqui- vel bipedales, muricati, glabri, stramineo-castanei. PALEAE lanceolatae, 6-9 lin. longae, in medio castaneae, marginibus late scariosis. LAMINA herbacea vel paulo coriacea, subdeltoidea, tripinnatifida, 4-5 pedes longa, 2-3 pedes lata, utrinque viridis, glabra, infra ad pinnularum et segmentorum costas paleis parvis subalbidis bullatis dense obsita. RACHES glabrae, inermes. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales vel sesquipedales, 5-6 poll. latae, deorsum subaequales, petiolo 3-12 lin. instructae. PINNULAE 20-24-jugae, contiguae, lineares, 2½-3 poll. longae, deorsum 7-8 lin. latae, e basi subtruncata breviter petiolata ad apicem longe acuminatum sensim angustatae. SEGMENTA 2 lin. lata, obtusa, subrecta, subintegra. VENAE utrinque 5-6 in lacinia, omnes vel pleraeque simplices, praesertim soriferae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM elevato-globosum, pilis ferrugineis dense crinitum.

Habitat in sylvis primaevae provinciarum Brasiliae meridionalium. In prov. Rio de Janeiro, e. gr. Serra dos Orgãos, in Tejuca etc.: Gardner n. 114! 5673!, Setto!, Glaziou n. 981! 2155! 2300-1!; item in prov. S. Catharinae. — Dryas.

Obs. Probabiliter cum praecedente conjungenda, ut jam proposuerunt cll. MARTIUS et HOOKER.

10. ALSOPHILA OBLONGA KLOTZSCH: stipitibus et rachibus subglabris; frondibus coriaceis subtripinnatis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis subsessilibus deorsum reductis, pinnulis sessilibus lineari-ligulatis obtusis, usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, segmentis oblongis obtusis integris subrectis, venulis plerumque simplicibus, utrinque 3-4 in lacinia, plerisque soriferis; soris mediis.

Alsophila oblonga Klotzsch in *Linnaea* XVIII. 540.

CAUDEX ignotus. STIPITES obscure brunnei, subglabri, deorsum muricati. LAMINA coriacea, subdeltoidea, 4 pedes longa, 2-2½ pedes lata, supra nuda, infra subglabra. PALEAE 3-4 lin. longae, angustae, acuminatae. RACHIS semiteres, dorso convexa, glabra, inferne aculeata, supra plana subtomentosa. PINNAE oblongo-lanceolatae, 9-15 poll. longae, 3 poll. latae, subsessiles, deorsum sensim reductae. PINNULAE 20-24-jugae, contiguae, lineari-ligulatae, 1½ poll. longae, 5-6 lin. latae, apice obtuso, usque ad alam 1 lin. latam pinnatifidae, multae insigniter aequilongae, sessiles, deorsum aequales, basi truncata. SEGMENTA contigua, utrinque 6-8 in pinnula, 1½ lin. lata, obtusa, integra, subrecta, lateris inferioris paulo breviora. VENAE utrinque 3-4 per laciniam, elevatae, robustae, omnes vel plures simplices. SORI 4-6 in lacinia, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM doliolatum, crinitum.

Habitat in Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 1125!

Obs. Species mihi valde dubia, specimenibus paucis incompletis solum cognita. An varietas *Hemiteliae multiflorae*, indusio obsoleto, ut creditur beat. HOOKER?

11. ALSOPHILA PUNGENS KAULF. stipitibus et rachibus glabris; frondibus coriaceis subtripinnatis utrinque nitidis glabris, pinnis oblongo-lanceolatis petiolatis deorsum subaequalibus, pinnulis sessilibus linearibus, usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, e basi in apicem acuminatum angustatis, segmentis lineari-oblongis subfalcatis subintegris oblique acutis, venulis plerumque simplicibus, utrinque 6-8 in lacinia, plerisque soriferis; soris mediis.

Alsophila pungens Kaulf. Mss. Presl, *Tent. Pter.* 61. Kunze, *Linnaea* XIII. 150. Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 540. (solum nomen).

Polypodium pungens Willd. *Sp. Plant.* V. 206.

CAUDEX ignotus. STIPITES validi, nitidi, glabri, griseo-straminei, muricati. PALEAE ignoramus. LAMINA coriacea, ampla, subtripinnata, utrinque glabra, nitida. RACHES politae, omnino glabrae, sparse muricatae, aculeis pungentibus. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales vel sesquipedales, 6-7 poll. latae, deorsum subaequales vel paulo reductae, petiolo conspicuo instructae. PINNULAE lineares, subsessiles, 3-3½ poll. longae, 8-9 lin. latae, usque ad costam anguste alatum pinnatifidae, e basi subtruncata ad apicem acuminatum inciso-crenatum sensim angustatae. SEGMENTA inferiora 2 lin. lata, 3-3½ lin. longa, contigua, lineari-oblonga, subfalcata, apice oblique acuto, subintegra, lateris inferioris paulo breviora. VENAE utrinque 7-8 per laciniam, graciles, distinctae, omnes vel pleraeque simplices et soriferae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM parvum, doliolatum, glabrum.

Habitat in Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 1666!, et in gallica ad Acarouany: Sagot n. 726 ex parte.

Obs. Species mihi valde dubia, specimenibus paucis tantum cogita. An varietas *A. asperae* venis simplicioribus?

12. ALSOPHILA COMPTA MART. stipitibus et rachibus paulo pubescentibus; frondibus herbaceis subtripinnatis subglabris vel infra paulo pubescentibus vel bullato-paleaceis, pinnis oblongo-lanceolatis breviter petiolatis, deorsum subaequalibus, pinnulis linearibus sessilibus vel breviter petiolatis, usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, segmentis lineari-oblongis subfalcatis crenulatis, venulis utrinque 6-8 per laciniam, omnibus vel plerisque simplicibus; soris mediis 10-12 in lacinia.

Alsophila compta Mart. *Ic. Crypt. Bras.* 66. t. 44.

Cyathea compta Mart. *Regensb. Denkschr.* II. 546. tab. 2. fig. 1-2.

Alsophila fumata Klotzsch Mss.

CAUDEX arboreus, 15 pedes attingens (teste SPRUCE). STIPITES sesquipedales vel bipedales, erecti, validi, glabri, muricati. PALEAE basales bene evolutas non vidi. LAMINA herbacea, subtripinnata, 5-6 pedes longa, 2½-3 pedes lata, utrinque viridis, subglabra vel infra pilis et paleis paucis bullatis in costis pinnularum et segmentorum obsita. RACHES paulo pubescentes. PINNAE oblongo-lanceolatae, imae sesquipedales, 5-6 poll. latae, deorsum subaequales, breviter petiolatae. PINNULAE contiguae, 20-25-jugae, lineares, 2½-3 poll. longae, 8-10 lin. latae, ad costam anguste alatum pinnatifidae, apice acuto, deorsum subaequales, subsessiles, basi subtruncata. SEGMENTA lineari-oblonga, 1½ lin. lata, contigua, subfalcata, crenulata, apice oblique subacuto. SORI 10-12 in lacinia, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM globosum, crinitum.

Habitat prope San Gabriel da Cachoeira, ad ripas fluvii Rio Negro, prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 2115!; in depressis et valteculosis per sylvas in vicinia Ypanema et Sorocaba, alibi in provincia S. Pauli: M.; in Serra do Mar, prov. Sebastianopolitanae: Princeps Max. Neovidensis. — Item incolit Columbian: Fendler 55!, Linden n. 1515!, et Panamam: Seemann n. 1120! — Vaga et Extrabras.

Obs. Species mihi valde incerta. An varietas *A. infestae*, venis simplicioribus? *A. Schiedeana* Presl probabiliter eadem est planta. Praesertim differt segmentis latioribus et integris. Specimina Guianensia (Appun n. 174!) omnino cum Mexicanis Liebmannianis congruunt. *A. platyphylla* Presl, *Epim.* 26, teste Sagot in herb. Gayano (n. 726. e Guiana gallica) solum differt pinnulis vix ultra medium dissectis.

13. ALSOPHILA PRAECINCTA KUNZE: stipitibus et rachibus glabris inermibus ebeneo-castaneis; frondibus deltoideis subtripinnatis papyraceo-herbaceis, supra saturate viridibus, utrinque omnino glabris, pinnis oblongo-lanceolatis petiolatis deorsum subaequalibus, pinnulis linearibus, usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, sessilibus, e basi subtruncata articulata ad apicem acuminatum angustatis, segmentis lineari-oblongis subobtusis subrectis inciso-crenulatis, venulis plerumque simplicibus, utrinque 7-8 per laciniam, omnibus soriferis; soris submarginalibus.

Tabula nostra LIV.

Alsophila praecincta Kunze in *Bot. Zeitg.* II. 327. (nomen solum). Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 449.

Alsophila davalloides Kunze Mss., olim.

Caudex ignotus. STIPITES sesquipedales vel bipedales, validi, ebeneo-castanei, inermes, omnino glabri. Paleas non vidi. LAMINA subdeltoidea, 4—5 pedes longa, 2½—3 pedes lata, subtripinnata, papyraceo-herbacea, supra saturate viridis, infra pallidior, utrinque omnino glabra. PINNAE oblongo-lanceolatae, sesquipedales, 6—7 poll. latae, deorsum subaequales, inferiores petiolo 1 poll. longo instructae. PENNULAE sublaxae, lineares, 3—3½ poll. longae, deorsum 9—10 lin. latae, sessiles, e basi truncatâ articulata in apicem acuminatum sensim angustatae. SEGMENTA aegre contigua, 2 lin. lata, inferiora 4—4½ lin. longa, subrecta, subobtusata, sterilia inciso-crenulata. VENAE 7—8 per laciniam, distinctae, simplices vel paucae apice furcatae, omnes submarginaliter soriferae, soris igitur 14—16 in segmento. RECEPTACULUM globosum, glabrum, nigrum.

Habitat in sylvis provinciae Bahiae prope Itheos: Blanchet!, Luschath! — Hamadryas.

Obs. Species optime distincta. Habitus *Hemitetiae multiflorae*, formae typicae, sed longe distat indusio nullo, venis subsimplicibus, soris submarginalibus.

§ 3. DICRANOPHLEBIA MART.

(14.) ALSOPHILA ASPERA R. Br. stipitibus et rachibus glabris; frondibus coriaceis subtripinnatis, mox utrinque glabris nitidis, pinnis oblongo-lanceolatis petiolatis, deorsum subaequalibus vel paulo reductis, pinnulis linearibus sessilibus acuminatis ad costam anguste alatum pinnatifidis, segmentis lineari-oblongis obtusis vel subacutis, venulis utrinque 6—7 per laciniam, plerisque furcatis; soris 8—12 in lacinia, mediis alaribus, primum quasi-indusiatis, paleis albidis evanescentibus.

Tabula nostra XX. Fig. 5. 6. (Pinnulae).

Alsophila aspera R. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* 158. Hook. et Grev. *Icon. Fil.* t. 213—5 (tota planta cum caudice). Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 21. (planta junior paleis quasi-indusiata). Hook. *Sp. Fil.* I. 39. Hook. et Baker *Syn. Fil.* 33. *Ettingsh. l. c. tab. 157. fig. 9, tab. 158. fig. 2.*

Cyathea aspera Swartz, *Syn. Fil.* 139. Willd. *Sp. Plant.* V. 496. *Ettingsh. l. c. tab. 159. fig. 5. 6.*

Plumier Fil. tab. 3. (rachibus nimis muricatis).

Cyathea muricata Sieber, *Fl. mixta* 337., non Mart.

Alsophila nitida Kunze Mss. (forma venis simplicioribus ad *A. pungentem* accedens). *Ettingsh. tab. 154. fig. 4. 8., tab. 155. fig. 1. 7.*

Alsophila articulata J. Smith, *Moore et Houlst. Gardn. Mag. Bot.* III. 331. *tab. 81.*

Alsophila serrata J. Smith, *Lond. Journ. Bot.* I. 666. (nomen solum).

Alsophila Sprengeliana Mart. *Icon. Crypt. Bras.* 75.

Cyathea guadalupensis Spreng. *Nova Act. Acad. Nat. Cur.* X. 233.

Cyathea armata Spreng. Mss.

CAUDEX arboreus, 20—30 pedes attingens. STIPITES sesquipedales vel bipedales, validi, nitidi, glabri, substraminei, muricati. PALEAE lanceolatae, pollicares, medio pallide brunneae, marginibus latis albidis scariosis. LAMINA coriacea vel subcoriacea, subdeltoidea, subtripinnata, primum infra paleis albidis laceris teneris evanescentibus in costis et saepe subter soros instructa, denique omnino glabra, plus minusve nitida. RACHES glabrae vel antice paulo strigillosae. PINNAE oblongo-lanceolatae, 1½—2 pedes longae, 9—10 poll. latae, deorsum subaequales vel paulo reductae, petiolo

Cyath.

distincto instructae. PINNULAE lineares, subsessiles, 4½—5 poll. longae, 9—10 lin. latae, usque ad costam anguste alatum pinnatifidae, basi oblique truncata, acumine longo inciso-serrato. SEGMENTA contigua, 2½—3 lin. lata, subfalcata, apice obliquo acuto vel subobtusato, denticulata, saepe marginibus inflexis, ea lateris inferioris deorsum reliquis sensim breviora. VENULAE utrinque 6—7 per laciniam, distinctae, pleraeque furcatae. SORI 8—12 in lacinia, alares, mediis inter costam et marginem. RECEPTACULUM crinitum.

Var. β. NITENS Baker.

Alsophila nitens J. Smith, *Lond. Journ. Bot.* I. 667. (nomen solum). *Griseb. Fl. Brit. W.-Ind.* 705.

Paleae minores; pinnulae angustiores, 6—7 lin. latae; segmenta angustiora, obtusa, 1¼—1½ lin. lata, hinc linea sororum faciem inferiorem segmentorum inter costam et marginem omnino occupantium instructa.

Habitat forma normalis in sylvis Guyanae britannicae: Parker!, Schomburgk!, Anderson! Varietas β. ad montes Humirida Guyanae britannicae: Appun n. 1262!

Obs. Specimen Sieber Martin. n. 374 est vera *Cyathea muricata* Willdenowii et Kaulfussii, teste Kunzeo; eadem ac *Alsophila tenera* J. Smithii et Grisebachii.

(15.) ALSOPHILA GIBBOSA KLOTZSCH: stipitibus et rachibus subglabris; frondibus coriaceis subtripinnatis glabris, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum subaequalibus, petiolo longo articulo instructis, pinnulis linearibus acuminatis usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, basi truncatis, petiolo longo articulo, segmentis lineari-oblongis subfalcatis parum denticulatis, venulis utrinque 8—9 per laciniam, plerisque furcatis; soris mediis inter costam et marginem, alaribus, 8—10 in lacinia.

Alsophila gibbosa Klotzsch, *Linnaea XVIII.* 542. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 108.

CAUDEX 3 pedes attingens, teste METTENIO. „FRONDES 22 pedes attingentes, inter ramulos amplexae, stipitibus 7 pedes longis“ (SPRUCE). STIPITES castanei, glabri, nitidi, muricati, paleis ovato-acuminatis. LAMINA coriacea, subdeltoidea, 3—4 pedes lata, utrinque glabra, nitida. RACHES antice parum castaneo-hispidae. PINNAE oblongo-lanceolatae, 1½—2 ped. longae, 9—11 poll. latae, deorsum subaequales, petiolo articulo 1—3 poll. longo instructae. PINNULAE lineares, laxae, 4½—5½ poll. longae, 10—11 lin. latae, acuminatae, usque ad alam costularem 1 lin. latam pinnatifidae, deorsum subaequales, basi truncatâ, petiolo 2—3 lin. longo basi tumido articulo. SEGMENTA contigua, 2—3 lin. lata, subfalcata apice oblique subacuto, inconspicue denticulata. VENAE utrinque 8—9 per laciniam, pleraeque furcatae. SORI 8—10 in lacinia, parvi, mediis inter costam et marginem. RECEPTACULUM crinitum.

Habitat in Guyana anglica: Rich. Schomburgk n. 1124!, Appun n. 1052!; item in Peruvia: Spruce n. 4331! — In Brasilia contermina forte invenienda.

16. ALSOPHILA PHALERATA MART. stipitibus et rachibus glabris vel paulo pubescentibus, griseo-stramineis; frondibus herbaceis subtripinnatis glabris vel paulo pubescentibus, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum subaequalibus breviter petiolatis, pinnulis linearibus subsessilibus usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, basi truncata, segmentis lineari-oblongis obtusis dentatis, venulis utrinque 7—8 per laciniam, plerisque furcatis; soris mediis, alaribus, 6—10 in lacinia.

Tabula nostra XX. Fig. 9—11 (pinnulae), et LXVIII. Fig. III. (truncus).

Alsophila phalerata Mart. *Icon. Crypt. Bras.* 67. *tab. 30. Fig. 1—2 (stipes) et tab. 42. Hook. Sp. Fil. I. 42. Kunze, Bot. Zeitg. II. 327.*

Cyathea phalerata Mart. in *Regensb. Denkschr.* II. 146. *tab. 2. fig. 3.*

Alsophila Blanchetiana Presl, *Epim. Bot.* 38.

Alsophila caracasana Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 541. (forma *glabra*, lamina herbacea gramineo-viridi). *Etingsh. l. c. tab. 153. fig. 7., t. 154. fig. 1. 2. 9.*

Alsophila infesta Hook. et Baker *Syn. Fil.* 34. ex parte.

CAUDEX 6—8 pedes attingens, teste MARTIO. STIPITES validi, glabri, sesquipediales vel bipediales, dense muricati, aculeis validis rectis pungentibus. PALEAE castaneae, ovato-lanceolatae, acuminatae, marginibus pallidioribus scariosis serrulatis. LAMINA herbacea vel subcoriacea, 5—6 pedes longa, 2—3 pedes lata, supra in costis parum strigillosa, infra tota paulo pubescens. RACHES parum pubescentes. PINNAE oblongo-lanceolatae, sesquipediales, 6—8 poll. latae, deorsum subaequales vel paulo reductae, breviter petiolatae. PINNULAE lineares, acuminatae, 3—4 poll. longae, 7—8 lin. latae, ad costam anguste alatum pinnatifidae, subsessiles vel inferiores parum petiolatae, basi truncata. SEGMENTA contigua, obtusa, subrecta, subdenticulata, 2—2½ lin. lata. VENAE 7—8 per laciniam, pleraeque furcatae. SORI 6—8 in lacinia, praecipue vel omnino in dimidio inferiore segmentorum obvii, alares, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM crinitum.

Var. β . ALUTACEA Baker.

Alsophila alutacea Kunze, *Bot. Zeitg.* II. 327.

Lamina magis papyracea, utrinque omnino glabra, infra saepe paleis paucis in costis pinnularum instructa; pinnulae 1 poll. latae, deorsum ad costam pinnatae; segmenta magis discreta, insigniter dentata, inferiora 3—3½ lin. lata; venulae imae subpinnatae; sori 8—10 in lacinia.

Habitat forma normalis in sylvis primaevae montanis ad Almadam et alibi in provincia Bahiensi: Martius!, Blanchet n. 2295! 3940!, Luschnath!; in prov. Sebastianopolitana, prope S. Luiz-Beltrão: Glaziou n. 984! 1710! 1785!; et prope San Carlos prov. do Alto Amazonas, ad ripas fluv. Rio Negro: Spruce. — Var. β . in sylvis Bahiensibus: Moricand!, et in Guyana anglica: Parker!, Schomburgk! Item incolit Columbian et insulas Antillanas. — Vaga et Extrabras.

Obs. *Alsophila infesta* Kunze, tabula nostra XX. fig. 14. (Etingsh. l. c. tab. 156. fig. 7, tab. 157. fig. 1. 2.) probabiliter varietas est hujus speciei. Differt frondibus subcoriaceis utrinque glabris infra nitidis, segmentis angustioribus subfalcatis integris, venulis omnibus soriferis. Hic pertinent specimina a Kegello sub n. 609 e Guyana batava reportata (teste Kunze in *Linnaea* XXI. 236) et verisimiliter ea quoque a Spruceo prope Manaos ad fluv. Rio Negro sub n. 614! lecta.

17. ALSOPHILA LEUCOLEPIS Mart. stipitibus et rachibus substramineis subglabris; frondibus papyraceo-herbaceis tripinnatifidis utrinque subglabris, subtus paleis copiosis teneris albidis ad costas obsitis, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum subaequalibus vel paulo reductis, pinnulis linearibus acuminatis usque ad costam anguste alatum pinnatifidis subsessilibus, basi subtruncata, segmentis lineari-oblongis obtusis integris vel dentatis subrectis, venis utrinque 7—8 per laciniam, plerisque furcatis, omnibus soriferis; sori mediis.

Tabula nostra LXVIII. Fig. II. (truncus).

Alsophila leucolepis Mart. *Icon. Crypt. Bras.* 70. t. 46. *Presl, Tent. 62. Hook. Sp. Fil. I. 41. Hook. et Baker. Syn. Fil. 34.*

CAUDEX 16—20 pedes attingens, teste GARDNERO. STIPITES sesquipediales, glabri, substraminei, deorsum muricati. PALEAE lanceolatae, pollicares, 3 lin. latae. LAMINA papyraceo-herbacea, tripinnatifida, 4—5 pedes longa, 2—3 pedes lata, utrinque subglabra, subtus viridis, paulo nitida, paleis teneris ovato-acuminatis albidis ad costas instructa. RACHES substramineae, subglabrae. PINNAE oblongo-lanceolatae, sesquipediales, 6—7 poll. latae, deorsum subaequales vel paulo reductae, subsessiles vel breviter petiolatae. PINNULAE lineares, sublaxae, acuminatae, 3—3½ poll. longae, 8—12 lin. latae, usque ad alam costularem 1—2 lin. latam pinnatifidae, basi subsessili subtruncata. SEGMENTA laxa, lineari-oblonga,

1½—2 lin. lata, obtusa, subrecta, subintegra vel dentata, ima lateris inferioris pinnularum saepe reducta. VENAE 7—8 per laciniam, pleraeque furcatae, omnes soriferae. SORI medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM crinitum.

Species ad *A. infestam* valde accedens.

Habitat in sylvis umbris ad Marianna et alibi provinciae Marianarum: Martius, Gardner n. 5329! 5331!; prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 1704! 2289! 2290! — Dryas, Oreas.

18. ALSOPHILA NIGRA Mart. stipitibus ebenaceis muricatis; rachibus ebenaceis gracilibus strigillosis; frondibus papyraceis subtripinnatis, supra glabris saturate viridibus, subtus ad costas pubescentibus, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum aequalibus breviter petiolatis, pinnulis linearibus breviter petiolatis usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, basi truncata, segmentis lineari-oblongis obtusis subrectis crenulatis, venis 7—8 per laciniam, plerisque furcatis et soriferis; sori mediis.

Alsophila nigra Mart. *Icon. Crypt. Bras.* 71. tab. 30. fig. 5. 6. et tab. 47. *Presl, Tent. 62. Hook. Sp. Fil. I. 45. Hook. et Baker, Syn. Fil. 35.*

CAUDEX 6—8 pedes attingens, teste MARTIO. STIPITES sesquipediales, ebenae, subglabri, muricati. Paleas non vidi. LAMINA 5—6 pedes longa, 2—3 pedes lata, papyraceo-herbacea, subtripinnata, supra glabra saturate viridis, subtus obscurior, costis paulo pubescentibus. RACHES ebenae, graciles, paulo pubescentes. PINNAE oblongo-lanceolatae, pedales vel sesquipediales, 5—6 poll. latae, deorsum aequales, breviter petiolatae. PINNULAE lineares, 2½—3 poll. longae, 7—8 lin. latae, usque ad costam peranguste alatum pinnatifidae, inferiores breviter petiolatae, costis ebenaceis, basi truncata. SEGMENTA lineari-oblonga, 2 lin. lata, subrecta, obtusa, insigniter crenulata. VENAE 7—8 in lacinia, graciles, ebenaceae, pleraeque furcatae. SORI 8—10 in lacinia, parvi, medii inter costam et marginem. RECEPTACULUM crinitum.

Habitat in sylvis aboriginibus ad flumen Yapura, prov. do Alto Amazonas: Martius! — Najas.

Obs. Species dubia, ad *A. infestam* accedens.

19. ALSOPHILA VILLOSA Desv. stipitibus validis angulatis nitidis, punctis elevatis scabris; rachibus primum villosis; frondibus coriaceis rigidulis ovato-rhomboides tripinnatis, utrinque flocculoso-pilosis, mox supra glabris, pinnis imbricatis erecto-patentibus ovato-lanceolatis, deorsum subaequalibus, breviter petiolatis, pinnulis linearibus sessilibus usque ad costam deorsum pinnatifidis, basi cuneata, segmentis plerisque ovato-oblongis obtusis, venis furcatis utrinque 5—6 per laciniam; sori alaribus magnis, 4—6 in lacinia.

Alsophila villosa Desv. *Prodr.* 319. *Presl, Tent. 62. Hook. Sp. Fil. I. 44. Klotzsch, Linnaea* XX. 443. *Hook. et Baker Syn. Fil. 35.*

Cyathea villosa H.B.K. *Nov. Gen. I. 24. et 7. tab. 670. Willd. Sp. Plant. V. 495.*

Alsophila rigidula Mart. *Icon. Crypt. Bras.* 74. t. 51.

Alsophila Humboldtii Klotzsch *Mss. Mett. Fil. Lips.* 109.

Alsophila tomentosa Presl, *Tent. 62.*

Alsophila humilis J. Smith, *Lond. Journ. Bot. I. 667.* (nomen solum).

Alsophila mollissima Kunze, *Bot. Zeitg.* II. 328.

CAUDEX haud ultra 6—8 pedes attingens. STIPITES subpedales, validi, angulati, canaliculati, nitide stramineo-castanei, deorsum dense paleacei et punctis elevatis scabri, nunquam muricati. PALEAE lineari-subulatae, ferrugineae, 1—1½ poll. longae, 1½—2 lin. latae, nitidae, dense imbricatae. LAMINA coriacea, rigidula, ovato-rhomboida, circa 3

pedes longa, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes lata, utrinque plus minusve flocculoso-pilosa, mox supra subglabra. RACHES stramineo-castaneae, supra villosae, angulatae, rigidae. PINNAE oblongo-lanceolatae, imbricatae, breviter petiolatae, centrales 9—12 poll. longae, 4—5 poll. latae, imae reductae. PINNULAE lineares, rigidae, erecto-patentes, in formâ typicâ 2—2 $\frac{1}{2}$ poll. longae, 5—6 lin. latae, usque ad costam deorsum pinnatae, apice subobtusis, basi sessili cuneata. SEGMENTA ovato-oblonga, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. lata, obtusa, subintegra, marginibus saepe reflexis. VENAE 5—6 in lacinia, furcatae. SORI magni, 4—6 in lacinia, segmentorum totam faciem inferiorem inter costam et marginem occupantes. RECEPTACULUM crinitum.

Species cum nullâ aliâ confundenda.

Habitat in sylvis provinciae S. Pauli: Martius; et in prov. Minarum: Gardner n. 5332! 5334!, Lindberg n. 643!; ad Rio de Janeiro: Glaziou n. 2299!; item in Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 1199! Appun 1230!, et vaga per terras inde a Chile in Columbianam.

20. ALSOPHILA PLAGIOPTERIS MART. stipitibus et rachibus substramineis, paulo pubescentibus; frondibus herbaceis deltoideis tripinnatis, supra ad costas, subtus totis pubescentibus, pinnis ovato-lanceolatis subsessilibus deorsum aequalibus, pinnulis lineari-acuminatis sessilibus usque ad costam pinnatis, segmentis lineari-oblongis falcatis acutis denticulatis, imis supra raches imbricatis, venis 8—9 per laciniam, profunde furcatis; soris plerisque faciem totam inferiorem segmentorum occupantibus.

Alsophila plagiopteris Mart. Icon. Crypt. Bras. 73. tab. 50. Presl, Tent. 62. Hook. Sp. Fil. I. 44. Hook. et Baker Syn. Fil. 35.

CAUDEX 10 pedes altitudine attingens, teste MARTIO. STIPITES sesquipedales, substraminei, subglabri, muricati. PALEAE lanceolatae, castaneae; inferiores 12—15 lin. longae. LAMINA subdeltoidea, tripinnata, 5—6 pedes longa, 3—4 pedes lata, herbacea vel mox subcoriacea, utrinque pallide viridis, supra ad costas paulo pubescens, subtus in facie tota breviter villosa, paleis pallidis paucis parvis in costis instructa. RACHES substramineae, paulo pubescentes. PINNAE ovato-lanceolatae, sesqui- vel bipedales, 6—7 poll. latae, deorsum aequales, subsessiles. PINNULAE lineares, insigniter acuminatae, 3—3 $\frac{1}{2}$ poll. longae, 7—8 lin. latae, deorsum usque ad costam pinnatae, segmentis imis antice accrescentibus, postice reductis, saepe supra raches imbricatis. SEGMENTA lineari-oblonga, 1—1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, insigniter falcata, apice oblique acuto, fertilia marginibus saepe mox reflexis, sterilia denticulata. VENAE 8—9 in lacinia, pleraeque profunde furcatae et soriferae. SORI totam faciem inferiorem segmentorum plerumque occupantes. RECEPTACULUM crinitum.

Habitat frequens in sylvis provinciarum S. Pauli et Rio de Janeiro: Martius!, Glaziou! — Dryas, Oreas.

21. ALSOPHILA PALEOLATA MART. stipitibus et rachibus griseo-villosis; frondibus herbaceis tripinnatis, utrinque plus minusve pubescentibus, subtus paleis ovatis teneris albidis ad costas pinnularum et segmentorum instructis, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum aequalibus breviter petiolatis, pinnulis linearibus usque ad costam pinnatis, basi sessili truncata, segmentis lineari-oblongis subfalcatis obtusis denticulatis, venis 7—9 in lacinia, plerisque furcatis; soris magnis, 6—8 in lacinia, dimidiam inferiorem segmentorum omnino occupantibus.

Alsophila paleolata Mart. Icon. Crypt. Bras. 68. t. 43. Hook. Sp. Fil. I. 44. Presl, Gefässb. 34. tab. 7. fig. 2. (sectio stipitis). Kunze, Linnæa XXIII. 221. (non Mett. Fil. Lechl. no. 2190.)

Polypodium alsophilum Link, Hort. Berol. II. 106.

Alsophila munita Kaulf. Mss. Presl, Tent. 62.

Alsophila Gardneri Hook. Sp. Fil. I. 40.

Alsophila Sellowiana Klotzsch Mss.

Cyathea Sellowiana Presl, Tent. 55.

Alsophila senilis Klotzsch, Bot. Zeitg. IV. 101.

CAUDEX 12—16 pedes attingens (teste GARDNER). STIPITES sesquipedales, substraminei, muricati, supra villosi. PALEAE nitidae, castaneae, lineari-subulatae, 12—15 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae. LAMINA herbacea, tripinnata, subdeltoidea, 5—6 pedes longa, 3—4 pedes lata, utrinque viridis, praesertim subtus plus minusve griseo-pubescentis et paleis ovatis albidis teneris ad costas pinnularum et segmentorum instructa, mox supra glabra. RACHES substramineae, griseo-villosae. PINNAE oblongo-lanceolatae, sesquipedales vel bipedales, 6—8 poll. latae, deorsum aequales, breviter petiolatae. PINNULAE contiguae, lineares, 3—4 poll. longae, 7—8 lin. latae, usque ad costam deorsum pinnatae, basi sessili truncata. SEGMENTA lineari-oblonga, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, obtusa, subfalcata, denticulata. VENAE 7—9 in lacinia, pleraeque furcatae. SORI alares, 6—8 in lacinia, magni, plerique dimidiam tantum inferiorem segmentorum occupantes (ut in *Cyathea* nostris supra sub 2—4 enumeratis). RECEPTACULUM parvum, dense griseo-crinatum.

Var. β . NIGRESCENS Hook.

Lamina magis coriacea, raches laxius ferrugineo-pubescentes, pinnulae angustiores 6 lin. latae, segmenta 1 lin. lata obtusa, paleae in facie inferiore laminae subnullae. — An species distincta?

Habitat forma normalis in provinciis Brasiliae mediis et austro-orientalibus, e. gr. S. Pauli, Rio de Janeiro, Minarum, Bahiae, in sylvis primaevae frequens: Martius!, Schott!, Pohl!, Selto!, Gardner n. 5330!, Burchell n. 2418!, Glaziou n. 378! 957—8! 2288! 2293—7! — Var. β . in Brasilia australi: Selto!; ad Rio de Janeiro: Glaziou n. 2283! 2285! Item Columbianam incotit. — Vaga et Extrabras.

Obs. *A. paleolata* Mett. in Pl. Lechl. n. 2190 est species diversa (*A. pubescens* Baker, in Hook. et Baker Syn. Fil.), frondibus bipinnatifidis, pinnis 6—7 poll. longis, 1 poll. latis, utrinque molliter griseo-villosis, soris costalibus 18—20 in lacinia etc. insignis. *A. vestitam* Presl, Epim. Bot. 27, quam in Guianâ britannicâ PERROTTER legit, nondum vidi. Cl. auctor dicit: „Caudice ignoto, fronde bipinnatâ, pinnis breviter petiolatis oblongis, supra (exceptis rachibus) glabris, subtus hirsutis, pinnulis sessilibus linearibus breviter acuminatis ad tres quadrantes pinnatifidis, lacinias lineari-oblongis falcatis obtusis denticulatis ciliatis sinu obtuso distinctis, rachibus supra tomentosis, primaria subtus punctis elevatis nigris (basi pilorum delapsorum) scabriuscula, secundariâ tertiariâque costisque subtus pilis rigidis patentibus hirta, paleis bullatis ovato-subrotundis acuminatis in rachi tertiaria costaque subtus frequentibus, soris medio dorso venarum insidentibus, oligocarpis, receptaculo globoso hispido“. An varietatem sistit hujus speciei venis simplicioribus pinnulisque minus dissectis?

22. ALSOPHILA FEROX PRESL: stipitibus nitidis glabris prorsus muricatis, aculeis longis pungentibus; rachibus sursum paulo pubescentibus; frondibus herbaceis tripinnatis, supra ad costas paulo villosis, subtus totis breviter pubescentibus, pinnis ovato-lanceolatis breviter petiolatis, deorsum subaequalibus vel paulo reductis, pinnulis sessilibus linearibus acuminatis usque ad costam pinnatis, basi truncata, segmentis linearibus subacutis 4—6-ies longioribus quam latis, venis 10—12 in lacinia profunde furcatis, plerisque soriferis; soris alaribus prope costam dispositis.

Tabula nostra XX. Fig. 17—19 (pinnulae), et LXIX. Fig. III. (truncus).

Alsophila ferox Presl, Tent. 62. Gefässb. 33. t. 6. fig. 19—20 (sectio stipitis). Hook. Sp. Fil. I. 41. Kunze, Bot. Zeitg. II. 327. Hook. et Baker, Syn. Fil. 34. Ettingsh. l. c. tab. 157. fig. 4. 5. 8.

Cyathea ferox Presl, Del. Prag. I. 190.

Alsophila armata Mart. Icon. Crypt. Bras. 72. t. 28. (habitus) et t. 48., non Presl. Mett. Fil. Hort. Lips 109. Splitg. Enum. Fil. Surinam. 41.

Polypodium aculeatum Raddi, Syn. Fil. 78. Fil. Bras. 27. t. 42.

Alsophila Raddiana Gaud. Mss.

Chnoophora aculeata Kaulf. Mss.

Alsophila aculeata J. Smith, Lond. Journ. Bot. I. 667. Moore, Ind. Fil. II. 46.

CAUDEX 15—20 pedes attingens. STIPITES 2—3-pedales, stramineo-castanei, nitidi, glabri, prorsus muricati, aculeis rectis pungentibus 3—6 lin. longis instructi. Paleas bene evolutas nondum vidi. LAMINA deltoidea, 5—6 pedes longa, 3 pedes lata, tripinnata, herbacea, supra saturate viridis, costis exceptis subglabra, subtus pallidior tota breviter villosa. RACHES nitidae, sursum paulo pubescentes, deorsum magis muricatae quam in reliquis speciebus. PINNAE ovato-lanceolatae, 12—18 poll. longae, 7—8 poll. latae, deorsum subaequales vel reductae, breviter petiolatae. PINNULAE lineares, acuminatae, 3—4 poll. longae, 8—12 lin. latae, usque ad costam pinnatae, deorsum aequales, basi truncata. SEGMENTA linearia, $\frac{3}{4}$ —1 lin. lata, subobtusata vel oblique acuta, subfalcata, denticulata. VENAE graciles, vix conspicuae, 10—12-jugae, profunde furcatae, pleraeque soriferae. SORI parvi, alares, prope costam dispositi. RECEPTACULUM minimum, crinitum.

Habitat communis in provinciis Brasiliae australibus mediisque: Martius, *Princeps Neovidensis*, Pohl!, D'Orbigny!, Burchell n. 950! 2601!, Gardner n. 27!, Wawra et Maly n. 197 aliique. Item prope urbem Para et in Serra do Uromari prope Santarem: Spruce n. 614! — In Guyana anglica: Parker!, Rich. Schomburgk n. 245!, Apyun n. 172!; in batava: Splitgerber, Weigelt, Focke, Kappter n. 1773, Wulfschlaegel n. 677! et alii; in Guyana gallica: Leprieur!, Sagot n. 723! etc. Vagat omnino per totam Americam tropicam.

OBS. *Alsophila aculeata* nomen speciei antiquissimum sed dubium est inter hanc et sequentem.

23. ALSOPHILA ARMATA PRESL: stipitibus supra et rachibus dense patenter villosis; frondibus herbaceis tripinnatis, praesertim in facie inferiore copiose molliter villosis, pinnis ovato-lanceolatis deorsum subaequalibus breviter petiolatis, pinnulis linearibus acuminatis usque ad costam pinnatis sessilibus, deorsum aequalibus, basi truncata, segmentis linearibus 4—6-ies longioribus quam latis insigniter incisus, venis 10—11-jugis in lacinia profunde furcatis vel subpinnatis; soris alaribus, prope costam dispositis.

Tabula nostra XX. Fig. 12. 13. (pinnulae), et LXIX. Fig. I. (truncus).

Alsophila armata Presl, Tent. Pter. 62. Hook. Sp. Fil. I. 40. Hook. et Baker Syn. Fil. 33, non Mart.

Polypodium armatum Swartz, Syn. Fil. 41. Willd. Sp. Plant. V. 207.

Alsophila hirta Kaulf. Enum. 249. Mart. Icon. Crypt. Bras. 69. t. 44. Hook. et Baker Syn. Fil. 35.

Alsophila Swartziana Mart. l. c. 73. t. 49.

Alsophila axillaris Moore, Ind. Fil. II. 48.

Polypodium axillare Raddi, Syn. Fil. 77. Fil. Bras. 27. t. 41.

Alsophila hirsuta Kunze, Linnaea IX. 98. Hook. Sp. Fil. I. 45.

Alsophila Pohlii Presl, Tent. 62.

Alsophila aculeata Klotzsch, Linnaea XVIII. 540, non J. Smith. Ettingsh. l. c. tab. 155. fig. 12. 13.

Cyathea aculeata Willd. Herb.

Alsophila mollissima Moore, Ind. Fil. II. 54.

Cyathea hirsuta Presl, Del. Prag. I. 190.

Alsophila vestita J. Smith in Hook. Lond. Journ. Bot. I. 667. (nomen solum).

CAUDEX arboreus, 30—40 pedes attingens. STIPITES straminei, muricati, supra villosi, $1\frac{1}{2}$ —3-pedales, deorsum saepe crassitiem pollicis attingentes. PALEAE lanceolato-acuminatae, 12—15 lin. longae, ferrugineae, concolores vel scarioso-marginatae. LAMINA herbacea, subdeltoidea, tripinnata, 5—6 pedes longa, 3—4 pedes lata, supra praesertim in costis, infra tota molliter villosa. RACHES stramineae, insigniter villosae, pilis densis griseis patentibus. PINNAE ovato-lanceolatae, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes longae, 6—9 poll. latae, deorsum aequales vel paulo reductae, breviter petiolatae. PINNULAE lineares, acuminatae, 3— $4\frac{1}{2}$ poll. longae, 8—12 lin. latae, usque ad costam pinnatae, deorsum aequales, sessiles, basi truncata. SEGMENTA linearia, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. lata, acuta vel subobtusata,

paulo falcata, insigniter inciso-dentata. VENAE 10—11 in lacinia, profunde furcatae vel etiam in pinnis majoribus subpinnatae, pleraeque soriferae. SORI parvi, compacti, ad costam approximati. RECEPTACULUM parvum, crinitum.

Habitat in Brasiliae provinciis mediis et australibus frequens: Sello!, Riedel!, D'Orbigny!, Burchell n. 1138! 2565!, Bunbury n. 55!, Gardner n. 118!, Glaziou n. 381! 984! 1004! etc. — Praeterea per Peruviam etc. usque ad Mexicum et insulas Antillanas vagans, inter *Alsophilas* frequentissima.

24. ALSOPHILA PRUINATA KAULF. stipitibus glabris inermibus, deorsum lanosis; rachibus stramineis nitidis glabris vel sursum paulo pubescentibus; frondibus quadrripinnatifidis coriaceis, supra viridibus glabris, subtus plus minusve albo-pruinatis et saepe quidquam villosis, pinnis ovato-lanceolatis petiolatis, pinnulis linearilanceolatis deorsum aequalibus, segmentis linearilanceolatis anguste et profunde pinnatifidis, venis inferioribus segmentorum subpinnatis, superioribus furcatis; soris 10—12 in segmento, prope costam dispositis.

Tabula nostra LXIX. Fig. II. (truncus).

Alsophila pruinata Kaulf. Mss. Mart. Icon. Crypt. Bras. 75. Kunze, Linnaea IX. 99. Hook. Sp. Fil. I. 47. Presl, Tent. 62. Hook. et Baker Syn. Fil. 38. Ettingsh. l. c. tab. 154. fig. 6., t. 156. fig. 1—9., t. 157. fig. 11—12.

Plumier, Fil. Amer. t. 33.

Polypodium pruinatum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1682. Syn. Fil. 41. Willd. Sp. Pl. V. 207.

Polypodium griseum Schkuhr, Crypt. Gen. 25. t. 25 b.

Lophosoria pruinata, *discolor*, *affinis* et *polypodioides* Presl, Gefässb. 36. 37.

Lophosoria Warszewiczii Klotzsch.

Trichosorus glaucescens, *densus* et *frigidus* Liebm., Mex. Breg. 131—133.

Alsophila Millefolium Desv. Prodr. Fil. 320.

CAUDEX saepe depresso-subdecumbens, sed interdum 6—8 pedes attingens. STIPITES 1—3-pedales, nitidi, straminei, omnino inermes, deorsum in statu juniore pilis lanosis griseo-ferrugineis dense vestiti. LAMINA rigide coriacea, quadrripinnatifida, supra gramineo-viridis glabra, subtus plus minusve albo-pruinata, venis et costis plus minusve ferrugineo-villosis. RACHES stramineae, angulatae, deorsum glabrae, sursum paulo villosae. PINNAE imae $1\frac{1}{2}$ —2 pedes attingentes, 6—10 poll. latae, ovato-lanceolatae, deorsum subaequales, petiolo 1—3 poll. longo instructae. PINNULAE linearilanceolatae, imae 4—5 poll. longae, 12—15 lin. latae, usque ad costam, apice excepto, pinnatae, deorsum subaequales, sessiles vel petiolo instructae. SEGMENTA linearilanceolata, interdum breviter petiolata, inferiora 2—3 lin. lata, profunde et argute pinnatifida. VENAE in lobulis inferioribus segmentorum pinnatae, in superioribus furcatae. SORI plerumque 1, rarius inferne 2—3 in lobulo singulo, 10—12 in segmento, prope costam dispositi, sporangiis paucioribus et majoribus quam in speciebus ceteris. RECEPTACULUM depressum, pilis longis ferrugineis dense vestitum.

Var. β . CONCOLOR Baker: lamina infra epruinata subferruginea.

Alsophila monticola Mart. Icon. Crypt. Bras. 75. Hook. Sp. Fil. I. 45. Kunze, Bot. Zeitg. II. 329.

Cyathea monticola Presl, Gefässb. 39. tab. 7. fig. 12. (sectio stipitis). Moore, Ind. Fil. II. 271.

Habitat forma normalis in sylvis prov. Sebastianopolitanae: Karwinski!, Beyrich, Glaziou n. 377! 1705! 1232!; et Minarum: Pohl, Lindberg n. 342! — Var. β . in Serra dos Orgãos: Gardner n. 115!, et prope Ouro Preto prov. Minarum: Freyress! — Praeterea et Chili usque ad insulas Antillanas et montes altiorem Mexici vagans.

OBS. Valde variabilis quoad frondium dissectionem et vestimentum faciei eorum inferioris, attamen speciem tantum unam constituit!

Genus anomalum

post *Cyatheaceas* ponendum, olim collocatum in ordinem vel subordinem distinctum: PARKERIAEAE Hook. et Grev. *Ic. Fil.*, Lindl. *Veg. Kingd. edit. 1*, PARKERIAEAE Endl., PARKERIAEAE Lindl. *Veg. Kingd. edit. 2*, CERATOPTERIDINEAE Moore, *Ind. Fil. p. CXVII*.

CERATOPTERIS BRONGN.

CERATOPTERIS A. Brongn. in *Dict. Sc. Nat. III. 350*. Hook. et Bauer, *Gen. Fil. tab. 12*. Hook. *Sp. Fil. II. 234*. Mett. *Fil. Hort. Lips. 39*. — TELEZOMA R. Br. in *Frank. Journ. 54*. — ELLOBOCARPUS Kaulf. *Entz. der Farnkr. fig. 7—9*. *Enum. Fil. 148*. — PARKERIA Hook. *Exot. Fil. t. 147. 231*. Hook. et Grev. *Ic. Fil. t. 97*. — FURCARIA Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris. VI. 292*.

SORI continui, venas longitudinales frondis specialis occupantes. SPORANGIA laxè disposita, globosa, hyalina, sessilia, ANNULO verticali lato plus minus incompleto interdum brevissimo cincta. INDUSIUM lineare, marginale, continuum. SPORAE magnae, paucae, obtuse triangulares.

Tabula nostra LI. Fig. V.

FILIX aquatica, annua, succulenta, pellucido-membranacea, laxè cellulosa. FRONDES heteromorphae, steriles bipinnatifidae, segmentis latis ovatis costatis, areolis copiosis oblique hexagonis; fertiles altiores, magis dissectae, segmentis ultimis linearibus siliquiformibus, marginibus parum mutatis late revolutis indusia formantibus, venis paucis longitudinalibus costae et inter sese subparallelis laxè anastomosantibus. SPORANGIA secundum venas omnes longitudinales laxè disposita, subsessilia, hyalina, rotundata, faciebus compressa, ANNULO verticali lato explanato plus minus incompleto interdum brevissimo (Parkeria, Hook. et Grev. *Ic. Fil. t. 97*) cincta, rima transversali dehiscentia. SPORAE magnae, paucae, obtuse triangulares, seriebus tribus striarum concentricarum notatae. — Species unica multis sub nominibus descripta, per regiones calidiores utriusque hemisphaerii late vagans.

Genus inter ordines praecedentes et sequentem quodammodo medium tenens. Cum *Polypodiacearum* tribu *Pterideis* optime congruit quoad indusium et dissectionem frondis; cum *Hymenophyllaceis* quoad laminae texturam pellucido-membranaceam laxè cellulosa, insigniter tamen differt annulo, indusio, receptaculo etc. Ad *Cyatheaceas* maxime accedit quoad sporangia, sed omnino differt habitu, textura frondis, receptaculo et sporis.

Species unica.

CERATOPTERIS THALICTROIDES BRONGN.

Tabula nostra LI. Fig. V. (analysis).

Ceratopteris thalictroides Brongn. l. c. et in *Bull. Soc. Phil. 1821. p. 184*. Spreng. *Syst. Veg. 28*. Blume, *Enum. 240*. Hook. *Sp. Fil. II. 234*. Kunze, *Linnaea XXI. 206*. Moore et Houlst. *Gard. Mag. III. 94. t. 21*. Splitg. *Enum. 43*. Love, *Ferns. II. 66*. Ellingsh. *Farnkr. d. Jetztwelt tab. 20. fig. 20*.

Acrostichum thalictroides et siliquosum Linn. *Sp. Plant. 1527*.

Belvisia siliquosa Mirbel in *Poir. Enc. Suppl. I. 612*.

Ceratopteris cornuta, Gaudichaudii, Lockharti, Parkeri et Richardi Auct.

Furcaria cornuta et thalictroides Desv. l. c.

Parkeria pteridoides et Lockharti Hook. et Grev. l. c.

Pteris cornuta Beauv. *Fl. d'Oware 63. t. 38*. Willd. *Sp. Plant. V. 404*.

Pteris thalictroides Swartz, *Syn. Fil. 98*. Willd. *Sp. Plant. V. 378*. — et synonyma multa alia.

Fluitans vel ex aqua emersa. CAUDEX herbaceus subrectus, radiculis fibrillosis densis instructus. STIPITES succulenti, fistuloso-incrassati, interdum 6—8 lin. crassi, venis anastomosantibus copiosis instructi. FRONDES quoad magnitudinem valde variabiles; steriles juniores subsessiles vel breviter petiolatae, interdum simpliciter rhomboideae, marginibus repandis, adultiores 6—9 poll. longae, 4—6 poll. latae; pinnis inferioribus maximis, deorsum liberis vel confluentibus, plus minus pinnatifidis, segmentis late ovatis. Stipites FRONDIUM FERTILIUM 6—18 poll. longi; lamina fertillis 6—24 poll. longa, saepe ex axillis plantulas parvas foliosas prolificatione emittens, bi- vel tri- vel etiam quadripinnata, pinnis laxis adscendentibus longepetiolatis, inferioribus maximis deltoideis.

In prov. Rio de Janeiro pr. Capocabana: Gardner n. 5667!; in prov. Bahiensi: Satzmann!, in Paulensi et Goyazensi: Burchell n. 4397! 7857!; in prov. Maranhão: Gardner n. 6111! — Prope Assumptionem Paraguariae: Gibert n. 79!; in Guyana batava: Splitgerber, Hostmann n. 55!, Kegel n. 622; in anglica: Parker!; in Guyana gallica: Richard, Leprieur!, Sagot n. 738! etc. etc.

POLYPODIACEAE.

CRYPTOGAMIA FILICES (*ex parte majore*) Linn. *Sp. Plant. edit. III.* 1516. (1764). — FILICES GYRATAE (*excl. Cyatheâ et Trichomane*) Bernh. in *Schrad. Journ.* 1800. — FILICES ANNULATAE (*excl. Cyatheâ, Trichomane et Hymenophyllo*) Swartz in *Schrad. Journ.* 1800. *Syn. Fil.* 5. (1806). — Filicum subordo GYRATAE, *divisio CATHETOGYRATAE*, Bernh. in *Schrad. Journ.* 1806. — FILICES (*excl. Cyatheâ, Trichomane et Hymenophyllo*) Willd. *Sp. Plant.* V. (1810). — POLYPODIACEAE Kaulf. *Wesen der Farnkr.* (1827). — Filicum tribus POLYPODIACEAE Mart. *Pl. Crypt. Bras.* 83. (1828—34). — Polypodiacearum subordo POLYPODIEAE Endl. *Gen. Plant.* 59. (1836). — Filicum subordo CATHETOGYRATAE Presl, *Tent.* 64. (1836). — Filicum subordo POLYPODIACEAE *excl. Cyatheis et Dicksonieis (ex parte)* Hook. *Sp. Fil. I.* 14. (1846). — POLYPODIACEAE § CATHETOGYRATAE Fée, *Gen. Fil.* 35. (1850). — Filicum ordo POLYPODIACEAE Metten. *Fil. Hort. Lips.* 12. (1856). — FILICES *excl. Cyatheis* J. Smith, *Ferns. Brit. et For.* 70. (1866.)

PLANTAE ACOTYLEDONEAE, ACROBRYAE, PHYLLOPHORAE, SPORANGIOPHORAE, FRONDIBUS VERNATIONE CIRCINATIS. SPORANGIA ANNULO VERTICALI ANGUSTO INCOMPLETO INSTRUCTA, DISTINCTE PEDICELLATA, RIMA TRANSVERSALI RUM-
PENTIA. RECEPTACULUM DEPRESSUM VEL NULLUM. SPORAE GLOBOSAE VEL ANGULATAE.

SPORANGIA distincte pedicellata, unilocularia, turbinata, lateraliter compressa, reticulato-venosa, ANNULO angusto verticali incompleto cincta, rima transversali irregulariter dehiscentia, in acervos speciales (soros) nudos vel squamulis (indusiis) inferis vel superis instructos congesta vel totam faciem inferiorem foliorum occupantia. SORI globosi oblongi vel lineares, receptaculis homomorphis nudis vel paraphysibus vestitis in foliorum dorso vel margine impositi. INDUSIA squamiformia, membranacea vel coriacea, quoad soros supra vel infera.

CAUDEX perennis vel raro annuus, epigeus vel hypogaeus, erectus vel repens, interdum in arboribus scandens, plerumque plus minus lignosus, squamulis (PALEIS) membranaceis vestitus; raro arborescens. STIPITES fasciculati, caudicis apicem rosulatum coronantes vel segregati, cum caudice continui vel ad basin vel prope eam articulati, pariter ac caudices e fasciculis fibrovascularibus praecipue vasa scalariformia continentibus in telâ cellulosâ parenchymatosâ varie dispositis conflati. FRONDES uniformes vel difformes (frondes vegetativae, et soriferae peculiares reductae), pleraeque late foliaceae, herbaceae vel coriaceae, quoad magnitudinem et dissectionem valde variabiles, stomatophorae et venis longe cellulosis vel vascularibus praeditae. VENAE copiose ramosae, pinnatae vel raro flabellatae, post ramificationem liberae vel iterum conjunctae. Reproductio ope ANTHERIDIORUM fit et ARCHEGONIORUM, quae in paginâ inferiore prothallii e spora pronascentis hepaticiformis exoriuntur. — Species in universum bene cognitae circiter 2000, praecipue in regionibus tropicis humidioribus Americae et Asiae obtingentes, multae quoque per zonas austro- et boreali-temperatas dispersae.*)

*) De distributione ordinis cf. commentationem et tabulas nostras in *Transact. Soc. Linn. Lond.* XXVI. pars. I.

CLAVIS TRIBUUM.

A. Sporangia in acervos speciales (soros) congregata, receptaculis specialibus imposita.

I. Sori indusiis *inferis* praediti.

a. Sori globosi vel oblongi, dorsales vel marginales.

1. Indusium cupuliforme, demum erectum I. DICKSONIEAE.

2. Indusium dimidiatum, basi lata vel punctiformi infra sorum laminae adnexum II. DAVALLIEAE.

b. Sori lineares, marginales, indusiis bivalvatis homomorphis III. LINDSAYEAE.

II. Sori indusiis *superis* praediti.

1. Sori rotundati, oblongi vel lineares, perfecte marginales . IV. PTERIDEAE.

2. Sori oblongi vel lineares, distincte intramarginales, costis paralleli, quoad venas transversales V. BLECHNEAE.

3. Sori secundum venas decurrentes, lineares vel oblongi, indusiis homomorphis simplicibus vel geminatis extrorsum apertis praediti VI. ASPLENIEAE.

4. Sori secundum venas decurrentes, indusiis homomorphis geminatis introrsum apertis praediti VII. SCOLOPENDRIEAE.

5. Sori rotundati, quoad laminam dorsales, indusiis homomorphis superis, marginibus plerumque vel omnino liberis VIII. ASPIDIEAE.

III. Sori *exindusiati*.

1. Sori rotundati vel raro oblongi, quoad laminam dorsales . IX. POLYPODIEAE.

2. Sori lineares vel oblongo-lineares, marginales vel secundum venas decurrentes X. GYMNOGRAMMITIDEAE.

B. Sporangia totam faciem inferiorem foliorum occupantia, receptaculis specialibus nullis XI. ACROSTICHEAE.

TRIBUS I. DICKSONIEAE.

SORI globosi, quoad laminam marginales vel dorsales, quoad venas terminales vel dorsales, indusiis inferis cupuliformibus demum erectis inclusi.

CAUDEX repens vel erectus, herbaceus vel arborescens. STIPITES cum caudice continui vel raro (Woodsia) inferne articulati. FRONDES uniformes vel fertiles plus minusve contractae, quoad magnitudinem et circumscriptionem valde variabiles. VENAE pleraeque simplices, pinnatae, raro anastomosantes, areolis copiosis cum venis liberis intra areolas inclusis (Hypoderris) vel sine iis (Euonoclea). INDUSIUM plerumque conspicuum, coriaceum vel subcoriaceum, nudum vel ciliatum, raro sub sporangiis occultum (Euwoodsia), vel membranaceum fragile evanescens (Onoclea). SORI quoad laminam dorsales (Woodsia, Hypoderris), vel parum intramarginales (Sphaeropteris), vel marginales (Dicksonia), vel extramarginales (Deparia), vel in segmentis specialibus insigniter contractis conferti (Onoclea). — Species circiter 50, per totum fere orbem e regionibus tropicis usque ad zonam arcticam dispersae.

Genus unicum brasiliense: I. DICKSONIA

I. DICKSONIA L'HÉRIT.

DICKSONIA L'Hérit. *Sert. Angl.* 30. Aiton, *Hort. Kew.* III. 469. Swartz, *Syn. Fil.* 136. Willd. *Sp. Plant.* V. 481. — DENNSTAETIA Bernh. in Schrad. *Journ.* 1800. II. 124. tab. 1. fig. 3. Moore, *Ind. Fil.* 303. Metten. *Ann. Sc. Nat. V. ser. II.* 260. — CIBOTIUM Kaulf. *Enum. Fil.* 229. Presl, *Tent. Pter.* 67. tab. 11. fig. 8—10. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 25. — SETOLOBIUM Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris.* VI. 262. J. Smith, *Gen. Fil.* 102. — BALANTIUM Presl, *Tent.* 134. tab. 5. fig. 34. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 20. — CULCITA Presl, *Tent.* 135. tab. 5. fig. 5. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* tab. 60 A. — PATANIA Presl, *Tent.* 137. tab. 5. fig. 12—14. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* tab. 61 B. — LEPTOPLEURIA Presl, *Tent.* 136. tab. 5. fig. 9—11. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* tab. 60 B. — PINONIA Gaud. *Voy. Uran.* 369. — CYSTIDIUM J. Smith, *Gen. Fil.* 101.

SORI globosi, quoad laminam marginales vel parum intramarginales, quoad venas terminales. INDUSIUM cupuliforme, coriaceum vel scariosum, bivalvatum vel integrum, ore truncato.

Tabula nostra XL. Fig. V. VI.

CAUDEX repens, herbaceus vel erectus, lignosus, arborescens. STIPITES segregati vel fasciculati, caudicis apicem coronantes, inermes vel muricati, basi cum caudice contini. FRONDES uniformes vel fertiles parum contractae, coriaceae vel herbaceae, pleraeque amplae, tripinnatae vel quadripinnatifidae, segmentis ultimis medio-cribibus vel parvis. VENAE pinnatae, omnino liberae; venulae erecto-patentes. INDUSIUM scariosum, cupuliforme, ore truncato, vel coriaceum plus minusve bivalvatum. VALVULAE aequales vel saepius externae majores, rotundatae, saepius plus minusve cucullatae vel reniformes, primum superpositae, demum patentes vel erectae. RECEPTACULUM depressum punctiforme. — Species circa 30, per regiones calidiores utriusque orbis dispersae.

CLAVIS SPECIERUM.

§ 1. EUDICKSONIA. Indusium coriaceum bivalve, valva externa e margine frondis eformata. — Tabula nostra XL. Fig. V.

1. Caudex arboreus; lamina tripinnata, deorsum insigniter decrescens . . . 1. D. SELLOWIANA.
2. Caudex herbaceus; lamina 4—5-pinnata, deorsum accrescens . . . 2. D. CONIFOLIA.

§ 2. DENNSTAETIA. Indusium scariosum, calyciforme, ore truncato. — Tabula nostra XL. Fig. VI.

1. Lamina subglabra; segmenta obtusa . . . 3. D. CICTARIA.
2. Lamina villosa; segmenta subacuta . . . 4. D. RUBIGINOSA.

Obs. *D. montevidensis* Spreng. (*Syst. Veg.* IV. 122) est *Woodisia obtusa* Hook. (*Sp. Fil.* I. 63., *Gard. Ferns* t. 43. = *W. Perriniana* Hook. et Grev. *IC. Fil.* t. 68. = *Cystopteris vestita* Presl, *Tent.* 93.). Specimen adest in herb. Kewensi a SELLO ex America australi, loco natali accuratius non indicato, probabiliter tamen e Montevideo reportatum; possidemus praeterea Uruguayensia a GIBBERTIO et TWEEDIO communicata. *Woodisia* differt a *Dicksonia* indusio cupuliformi, margine ciliato, quoad laminam et venas perfecte dorsali. Cf. tabula nostra LI. Fig. VI.

§ 1. EUDICKSONIA.

1. DICKSONIA SELLOWIANA Hook. caudice erecto lignoso arborescente; stipitibus deorsum pilis fibrillosis nitidis dense vestitis; frondibus subglabris rigide coriaceis tripinnatis subrhomboidis inferne angustatis, pinnis ovato-lanceolatis subsessilibus deorsum subaequalibus, inferioribus insigniter reductis, pinnulis sessilibus linearibus acuminatis deorsum aequalibus usque ad costas apice excepto pinnatis, segmentis contiguis, lanceolatis falcatis pinnatifidis, fertilibus contractis; soris 4—8 in segmento, valvulis rotundatis.

Tabula nostra XX. Fig. 20 (pinnae pars), XL. Fig. V. (analysis) et LXX. Fig. I. (truncus).

Dicksonia Sellowiana Hook. *Sp. Fil.* I. 67. tab. 22 B. J. Smith, *Bot. Herald* I. 239. Brack. *Fil. Un. St. Amer. Expl. Expedit.* 277. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 50.

Balantium Sellowianum Presl, *Tent. Pter.* 134. (nomen solum). Kunze, *Linnaea* XXIII. 239. Ettingsh. l. c. tab. 154. Fig. 5.

Dicksonia Karsteniana Moore, *Ind. Fil.* 313.

Balantium Karstenianum Klotzsch, *Bot. Zeitg.* V. 693. *Linnaea* XX. 444. Fée, *Gen. Fil.* 341. Ettingsh. l. c. tab. 154. fig. 11.

Dicksonia organica Miers Mss.

Dicksonia riparia Beyrich Mss.

Balantium Beyrichii Roem. Mss.

Dicksonia arborea Karsten Mss.

CAUDEX erectus, arboreus, 15—30 pedes attingens, crassitie pedis. STIPITES apicem caudicis coronantes, 1—2-pedales, validi, erecti, stramineo-castanei, punctis exiguis subscabri, deorsum crassitiem 9—12 lin. attingentes, dense fibrilloso-lanosi. PALAEAE densae, capillares, nitidae, ferrugineae vel castaneae, 1 poll. aut ultra longae. LAMINA rigido-coriacea, tripinnata, subrhomboida, deorsum angustata, 6—8 pedes longa, 2—3 pedes lata, utrinque omnino vel paene glabra, supra saturate viridis, infra pallidior saepius subglauca. RACHES antice sulcatae, primum plus minusve lanoso-fibrillosae, demum glabratae. PINNAE ovato-lanceolatae, mediae 1½—2 pedes longae, 4—7 poll. latae, subsessiles, deorsum subaequales, inferiores sensim reductae, imae perparvae laxae deflexae. PINNULAE contiguae, lineares, acuminatae, 2—3 poll. longae, steriles 6—8 lin. latae, fertiles contractae 4—6 lin. latae, apicibus exceptis ad costas pinnatae, deorsum subaequales, omnino sessiles. SEGMENTA lanceolata, falcata, apice obliquo acuminato, inciso-dentata vel pinnatifida, sterilia contigua 2 lin. lata, fertilia angustiora marginibus reflexis. VENAE segmentorum liberae, 6—8 utrinque secus costam; VENULAE inferiores furcatae. SORI dentes segmentorum terminantes, 6—8 in segmentis maximis, ½ lin. diam. INDUSIUM rigide coriaceum, valvulis nudis subaequalibus rotundatis, exterioribus cucullatis.

Habitat in sylvis primaevae provinciarum austro-orientalium. In prov. Minarum prope Caldas: Lindberg n. 649!; in Serra da Mantiqueira: Riedel n. 317!, in Serra dos Orgãos: Miers!, Sello!, Beyrich, Glaziou 1787! etc., et in prov. S. Catharinae: Fritz Müller! — Praeterea in parte continentis occidentali inde a Peruvia usque in Guatemalam. — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

2. DICKSONIA CONIFOLIA Hook. caudice erecto herbaceo; stipitibus fasciculatis, deorsum pilis nitidis ferrugineis fibrillosis dense vestitis; frondibus glabris papyraceo-coriaceis fragilibus subdeltoideis 4—5-pinnatis, pinnis lanceolato-deltaideis petiolatis, inferioribus maximis, pinnulis et segmentis subdeltoideis petiolatis, inferioribus maximis, laciniis lanceolatis laxis petiolatis profunde pinnatifidis; soris 6—8 in laciniis ultimis, valvulis reniformibus.

Dicksonia conifolia Hook. *Sp. Fil. I. 70. tab. 24 A. Moore, Ind. Fil. 311. Hook. et Baker Syn. Fil. 51.*

Dicksonia Martiana Klotzsch *Mss. Hook. Sp. Fil. I. 70. tab. 24 B. (sphalmate D. Burkeana Moore, Ind. Fil. 311.)*

CAUDEX herbaceus, erectus. STIPITES fasciculati, erecti, 12—18 poll. longi, castanei, nitidi, nudi, deorsum paleis fibrillosis lanosis dense vestiti. PALAEAE densae, capillares, nitidae, ferrugineae, 1 poll. aut ultra longae. LAMINA parum coriacea sed fragilis, subdeltoidea, 4—5-pinnata, utrinque glabra, 3—4 pedes longa, 2—3 pedes lata. RACHES graciles, flexuosae, nudaе, fragiles, antice sulcatae. PINNAE inferiores maximae, lanceolato-deltoideae, 12—18 poll. longae, 8—12 poll. latae, insigniter petiolatae, superiores sensim reductae. PINNULAE contiguae, subdeltoideae, inferiores maximae, 4—5 poll. longae, 2—3 poll. latae. SEGMENTA inaequaliter subdeltoidea, petiolata, inferiora $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longa, circa 1 poll. lata, basi inferiore cuneato-truncata. LACINIAE laxae, profunde pinnatifidae vel deorsum subpinnatae, lanceolatae, basi cuneata. VENAE laciniarum pinnatae, venulis furcatis vel parce pinnatis. SORI dentes terminantes, 6—8 in laciniis inferioribus, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. latae. VALVULAE coriaceae, nudaе, subaequales, reniformes, duplo latiores quam profundae.

Habitat in Brasilia australi, loco accuratius non indicato: Sello! — Praeterea Columbian et insulas Antillanas incolit.

§ 2. DENNSTAETIDIA.

3. DICKSONIA, CICUTARIA SWARTZ: caudice herbaceo repente; frondibus segregatis deltoideis quadripinnatifidis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum aequalibus, pinnulis linearibus breviter petiolatis deorsum aequalibus, costis anguste alatis, segmentis inaequaliter oblongo-deltoideis obtusis, ad medium pinnatifidis; soris 4—8 in segmentis, sinus occupantibus; indusio scarioso calyciformi glabro, ore truncato.

Tabulae nostrae XX. Fig. 7. s., XXI. Fig. 1—3. (pinnae et pinnulae), et XL. Fig. VI. (analysis).

Dicksonia cicutaria Swartz, *Fl. Ind. Occ. III. 1965. Syn. Fil. 187. Willd. Sp. Plant. V. 487. Raddi, Fil. Bras. 62. Ettingsh. l. c. tab. 150. fig. 1. 2. 9. 151. fig. 7.*

Dennstaetdia cicutaria Moore, *Ind. Fil. 304.*

Dicksonia tenera Presl, *Del. Prag. I. 189. Tent. Pter. 136. tab. 5. Fig. 6—7. Mart. Ic. Crypt. Bras. 96. tab. 66 et 72. Fig. 1. Ettingsh. tab. 148. fig. 6—8. tab. 149. fig. 1. 8—12.*

Dicksonia ordinata Kaulf. *Enum. Fil. 226. Hook. Sp. Fil. I. 75. Kunze in Schkuhr Suppl. II. 14. tab. 106.*

Dicksonia cornuta Kaulf. *Enum. Fil. 227. Hook. Sp. Fil. I. 76.*

Dicksonia Hookeriana Klotzsch *Mss.*

Dicksonia siifolia Kunze *Mss. Ettingsh. tab. 152. fig. 3—5. 7. 8.*

Dicksonia dissecta Sieb., non Swartz.

Polypodium bacciferum Poir. *Enc. Bot. V. 554.*

Microlepia oedematosa Fée, *Gen. Fil. 328.*

Dicksonia exaltata Kunze, *Bot. Zeitg. VIII. 59.*

Dicksonia flaccida Raddi, *Fil. Bras. 62. (excl. syn.)*

CAUDEX herbaceus, repens, firmus, flexuosus, crassitie digiti, PALAIS parvis subulatis castaneis in partibus supra terram emergentibus vestitus. STIPITES segregati, $\frac{1}{2}$ —2 pedes attingentes, suberecti, validi, subnudi. LAMINA subdeltoidea, quadripinnatifida, 4—6 pedes longa, 2—3 pedes lata, herbacea vel subpapyracea, utrinque viridis, subglabra. PINNAE oblongo-lanceolatae, inferiores maximae, 1— $1\frac{1}{2}$ pedes longae, 6—8 poll. latae, contiguae vel imbricatae, breviter petiolatae, deorsum subaequales vel paulo reductae. PINNULAE lineares, acutae, contiguae, alternae,

Polypod.

3—5 poll. longae, 12—15 lin. latae, deorsum aequales, ad costam anguste alatae vel deorsum omnino liberam dissectae. SEGMENTA inaequaliter oblongo-deltoidea, inferiora 6—8 lin. longa, 3—4 lin. lata, obtusa vel subobtusata, ad tertiam vel dimidium pinnatifida, LACINIIS latis subfalcatis, dimidio inferiore reducto, basi inferiore cuneata truncata, superiore producta. VENAE segmentorum pinnatae, venulis utrinque secundum costam 5—6 erecto-patentibus furcatis. SORI 4—8 in segmentis maximis, sinibus segmentorum impositi. INDUSIUM $\frac{1}{3}$ lin. latum, scariosum, nudum, calyciforme, demum erectum.

Habitat in sylvis prov. Sebastianopolitanae: Martius!, Pohl!, Schott!, Burchell n. 2555!, Sello!, Riedel!, Gardner n. 201!; in prov. Minarum: Gardner n. 5327!; Bahia: Martius! et in prov. Goyaz ad Caretão: Pohl! — Item in Guyana gallica: Leprieur n. 123, et per Americam occidentalem inde a Peruvia usque in insulas Antillanas et Mexicum. — Vaga et Extrabrisil.

4. DICKSONIA RUBIGINOSA KAULF. caudice herbaceo repente; frondibus segregatis deltoideis quadripinnatifidis utrinque griseo-villosis, pinnis oblongo-lanceolatis deorsum reductis, pinnulis lineari-lanceolatis breviter petiolatis, costis superne anguste alatis, inferioribus deorsum reductis, segmentis inaequaliter ovato-deltoideis acutis profunde pinnatifidis; soris 8—12 in segmentis, sinus occupantibus; indusio parvo scarioso calyciformi parum hispido.

Tabula nostra XXI. Fig. 4, 5. (pinnulae).

Dicksonia rubiginosa Kaulf. *Enum. Fil. 226. Hook. Sp. Fil. I. 79. tab. 27 A. Presl, Tent. Pter. 136. Fée, Gen. Fil. 335. Mett. Fil. Hort. Lips. 106. Ettingsh. l. c. tab. 150. fig. 5. 8. tab. 148. fig. 1. Wawra, Maximil. Reise 191. t. 97!*

Dennstaetdia rubiginosa Moore, *Ind. Fil. 307. Mett. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 261.*

Sitobium rubiginosum J. Smith, *Lond. Journ. Bot. I. 434.*

Dicksonia umbrosa Liebm. *Mex. Bregm. 110.*

CAUDEX herbaceus, repens, firmus, flexuosus, crassitie digiti, PALAIS parvis subulatis castaneis in partibus supra terram emergentibus vestitus. STIPITES segregati, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes attingentes, validi, suberecti, subnudi vel superne villosi. LAMINA subdeltoidea, quadripinnatifida, 6—8 pedes longa, 2—3 pedes lata, herbacea, utrinque griseo-pubescentis, obscure viridis. RACHES stramineo-castaneae, complanatae, antice sulcatae, pills griseis firmis vestitae. PINNAE oblongo-lanceolatae, inferiores maximae, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes longae, 6—9 poll. latae, breviter petiolatae, deorsum reductae. PINNULAE lineari-lanceolatae, acutae, 3—5 poll. longae, 12—18 lin. latae, contiguae, alternatae, breviter petiolatae, costis complanatis hispida superne anguste alatis, inferiores deorsum reductae. SEGMENTA inaequaliter ovato-deltoidea, inferiora 8—9 lin. longa, 4—6 lin. lata, acuta, ultra medium pinnatifida, utrinque 6—8; LACINIIS contiguis, incis, erecto-patentibus, dimidio inferiore insigniter reducto, basi inferiore cuneato-truncata, superiore producta, cum rache parallela. VENAE segmentorum pinnatae, venulis erecto-patentibus, inferioribus pinnatis. SORI 10—12 in segmentis maximis, sinibus segmentorum impositi. INDUSIUM parvum, calyciforme, scariosum, paulo hispido.

Habitat in sylvis provinciarum austro-orientalium. In prov. S. Catharinae: Fritz Müller; in Sebastianopolitana: Martius!, Sello!, Schott!, Pohl!, Gardner n. 5672! etc.; in Bahiensi: Martius!, Blanchet n. 305. etc. — Dryas, Hamadryas, extra Brasiliam cum praecedente.

D. anthriscifolia Kaulf. ex insulis Mascarenis probabiliter varietatem hujus speciei sistit.

TRIBUS II. DAVALLIEAE.

SORI globosi vel oblongi, quoad laminam dorsales vel marginales, quoad venas dorsales vel terminales. INDUSIUM dimidiatum, basi lata vel punctiformi infra sorum affixum, lateribus liberis vel laminae adnatis.

CAUDEX herbaceus, plerumque repens, hypogaeus vel saepe epigaeus, late vagans, PALEIS densis vestitus. STIPITES saepissime segregati, cum caudice continui (Microlepia, Loxoscaphe, Stenoloma, Cystopteris), vel basi articulati (Eudavallia, Humata, Leucostegia). FRONDES uniformes vel diffformes, coriaceae, herbaceae vel pellucido-papyraceae, saepius parvae, segmentis ultimis dissectis. VENAE et VENULAE pinnatae vel raro flabellatae, semper liberae. SORI quoad laminam marginales vel submarginales, quoad venas terminales (Davallia), vel quoad laminam et venas perfecte dorsales (Cystopteris). INDUSIUM dimidiatum, ovatum, reniforme vel oblongum, coriaceum vel membranaceum, primum sporangia superans, his demum plus minusve emergentibus, basi solum vel lateribus quoque laminae adnatum. — Species 80—90, pleraeque tropicae vel subtropicae Asiaticae.

Genus unicum brasiliense II. DAVALLIA SMITH.

II. DAVALLIA SMITH.

DAVALLIA Smith, Mem. Acad. Taur. V. 414. t. 9. Swartz, Syn. Fil. 130. Willd. Sp. Plant. V. 464. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 28. — HUMATA Cav. Prael. 1801. No. 678—9. J. Smith, Gen. Fil. 93. Hook. et Bauer l. c. t. 114 A. — WIBELIA Bernh. in Schrad. Journ. 1801. p. 122. tab. 1. fig. 2. — SACCOLOMA Kaulf. Enum. Fil. 124. Presl, Tent. 125. tab. 4. fig. 19—20. Hook. et Bauer l. c. t. 58 B. Metten. Ann. Sc. Nat. IV. Ser. XV. 80. — LEUCOSTEGIA Presl, Tent. 93. tab. 4. Fig. 11. J. Smith, Gen. Fil. 94. — ACROPHORUS Presl, Tent. 93. tab. 3. fig. 2. Moore, Ind. Fil. 2. — PROSAPTIA Presl, Tent. 165. — MICROLEPIA Presl, Tent. 124. tab. 4. fig. 21—3. J. Smith, Gen. Fil. 93. Hook. et Bauer l. c. t. 58 A. — SCYPHULARIA Fée, Gen. Fil. 324. — ODONTOLOMA J. Smith, Gen. Fil. 92. Hook. et Bauer l. c. t. 114 B. — STENOLOMA Fée, Gen. Fil. 330. — ODONTOSORIA Fée, Gen. Fil. 325. — PTERONEURON Fée, Gen. Fil. 320. — STENOLOBUS Presl, Tent. 129. tab. 4. fig. 30. — PACHYPLEURIA Presl, Epim. 98. — PARESTIA Presl, Epim. 99. — LOXOSCAPHE Moore in Hook. Kew-Journ. V. 227.

SORI quoad venas terminales, quoad laminam marginales vel submarginales. INDUSIUM rotundatum, oblongum, vel reniforme.

Tabula nostra XLI. Fig. I—IV.

CAUDEX repens, stipitibus segregatis, in speciebus brasiliensibus semper hypogaeus, raro erectus (D. thecifer), stipitibus fasciculatis. STIPITES in speciebus nostris semper cum caudice continui. FRONDES uniformes, pinnatae, bi—tripinnatae vel pinnato-vel flabellato-decompositae, coriaceae herbaceae vel pellucido-papyraceae. INDUSIUM in speciebus nostris paucis plerumque rotundatum, membranaceum, lateribus laminae adnatum, in subgeneribus veteris orbis saepe lateribus liberum (coriaceum reniforme in Humatâ, membranaceum rotundatum in Leucostegiâ, in Eudavalliâ dimidiato-cystoideum, interdum cystoideum), quoad venas semper terminale, quoad segmenta terminale vel laterale, marginale vel paulo intramarginale. — Species circa 80, pleraeque incolae Indiae orientalis et Malaccae.

Odontoloma subgenus ad Lindsayam accedit lamina pellucido-papyracea, venatione, pinnis pinnulisque dimidiatis et soris saepe confluentibus; Loxoscaphe habitu ad Asplenium § Daream.

CLAVIS SPECIERUM.

- § 1. ODONTOLOMA. Indusium basi tantum ad laminam adnatum. Pinnae vel pinnulae dimidiatae. — Tabula nostra XLI. Fig. I. 1. D. PARKERI.
Indusium basi et lateribus ad laminam adnatum.
- § 2. LOXOSCAPHE. Indusium coriaceum cystoideum. — Tabula nostra XLI. Fig. II. 2. D. THECIFERA.
Indusium rotundatum vel subreniforme.
- § 3. STENOLOMA. Pinnulae flabellato-decompositae; sori quoad segmenta semper terminales. — Tabula nostra XLI. Fig. III.
1. Pinnulae 6—12 lin. longae, pellucido-membranaceae. 3. D. BIFIDA.
2. Pinnulae 1½ lin. longae, rigide coriaceae 4. D. SPRUCEI.
- § 4. MICROLEPIA. Lamina pinnatim dissecta; sori quoad segmenta laterales. — Tabula nostra XLI. Fig. IV.
a. Lamina simpliciter pinnata.
1. Indusium coriaceum, subreniforme 5. D. IMRAYANA.
2. Indusium membranaceum, rotundatum 6. D. SACCOLOMA.
b. Lamina tri—quadripinnatifida.
1. Raches et lamina utrinque glabrae 7. D. INAEQUALIS.
2. Raches et lamina utrinque pubescentes 8. D. SPELUNCAE.

§ 1. ODONTOLOMA.

(1.) DAVALLIA PARKERI Hook. caudice repente gracili; stipitibus nudis nitidis castaneis; frondibus pellucido-papyraceis utrinque glabris linearibus simpliciter pinnatis, vel irregulariter rhomboideis bipinnatis, pinnulis sessilibus dimidiatis, marginibus inferioribus rectis integris, superioribus rotundatis crenatis, venis flabellatis; soris parum intramarginalibus; indusiis membranaceis rotundatis, lateribus liberis.

Tabula nostra XLI. Fig. I. (analysis).

Davallia Parkeri Hook. Sp. Fil. I. 176. tab. 53 C. Hook. et Baker, Syn. Fil. 93.

Odontoloma Parkeri Presl, Epim. 97. Fée, Gen. Fil. 329. Acrophorus Parkeri Moore, Ind. Fil. 3.

CAUDEX firmus, gracilis, repens, flexuosus, PALEIS parvis linearibus castaneis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, 2—6 poll. longi, nudi, nitidi, graciles, castanei. LAMINA prasino-viridis, pellucido-papyracea, utrinque concolor, omnino glabra, linearis, simpliciter pinnata, 4—6 poll. longa, 7—8 lin. lata, vel saepe utrinque ramis 1—2 erecto-patentibus parti primariae omnino similibus instructa. SEGMENTA ultima (pinnae vel pinnulae) sessilia, contigua, 3—4 lin. lata, 2 lin. profunda, dimidiata, margine inferiore recto integro, superiore arcuato crenis 4—5 latis parvis instructo, interiore recto integro cum rache parallelo, colligatione basali. VENA primaria pinnulae cum margine inferiore parallela, venulis anticis 3—4 laxis immersis, exterioribus simplicibus, imis furcatis. SORI 3—5 in pinnula, quoad venas terminales, 1 rarius 2 pro crenatura, quoad laminam parum intramarginales. INDUSIUM parvum, rotundatum, membranaceum, nudum.

Habitat in sylvis Guyanae britannicae: Parker!, Appun! — In Brasilia contermina forsitan inveniatur.

Obs. Habitus et consistentia omnino *Eulindsayae*; differt solum soro et indusio rotundato.

§ 2. LOXOSCAPHE.

2. DAVALLIA THECIFERA H.B.K. caudice erecto; stipitibus fasciculatis; frondibus coriaceis utrinque glabris oblongo-lanceolatis bi—tripinnatifidis, pinnis laxis subrhomboideis longe petiolatis, divisuris laxis anguste linearibus simplicibus vel flabellatis bi- vel trifurcatis, venis solitariis in segmentis graduum omnium; soris marginalibus solitariis, infra apicem cornutum segmentorum consitis, indusiis rotundato-cystoideis.

Tabula nostra XXI. Fig. 13. 14. (frons perparva et ejus pars) et tab. XLI. Fig. II. (analysis).

Davallia thecifera H.B.K. Nov. Gen. I. 23. (1815). Poir. Encycl. V. 530. Presl, Tent. 129. Hook. Sp. Fil. I. 189.

Asplenium thecifera Mett. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 227. Kuhn, Fil. Afr. 117.

Davallia concinna Schrad. Fil. Cap. n. 92. (1818). Kunze, Linnaea XIII. 152. Schkuhr, Suppl. 75. Hook. Sp. Fil. I. 193. Hook. et Baker, Syn. Fil. 100.

Davallia campyloptera Kunze, Linnaea 544.

Davallia Schimperii Hook. Sp. Fil. I. 193. tab. 50 B.

Davallia Lindeni Hook. Sp. Fil. I. 193. tab. 56 B. Klotzsch, Linnaea XVIII. 544. Kunze, Bot. Zeitg. VII. 238.

Microlepia Lindeni Mett. Fil. Hort. Lips. 103.

Loxoscaphe concinna, *Lindeni* et *Schimperi* Moore, Kew Journ. V. 227. Ind. Fil. p. XCIV.

Microlepia Schimperii Mett., Ettingsh. l. c. tab. 142. fig. 1. 6.

CAUDEX erectus, herbaceus, superne paleis dense vestitus. PALEAE 1 lin. longae, ovato-lanceolatae, centro castaneo, margine distincto ferrugineo ciliato. STIPITES fasciculati, 1—3 poll. longi, firmo-herbacei, stramineo-virides, paleis paucis sparsis vestiti, antice sulcati. LAMINA coriacea, utrinque glabra, pallide virens, oblongo-lanceolata, 6—9 poll. longa, 2—3 poll. lata, bi—tripinnatifida. RACHES primariae et secundariae complanatae, alis angustis coriaceis. PINNAE compositae, utrinque secus rachem 5—6, inferiores centralibus aequales vel paulo minores, erecto-patentes, subrhomboideae, 9—15 lin. longae, 4—8 lin. latae, basi longe petiolata utrinque cuneato-truncata. PINNULAE utrinque secus rachem 2—4, laxae, erecto-patentes, simplices vel inferiores flabellatis bi- vel trifurcatae, segmentis ultimis linearibus, 2—4 lin. longis, 1/2 lin. latis, obtusis. VENAE in segmentis omnium graduum medianae solitariae. SORI 1 vel raro 2 pro segmento, infra apicem cornutum segmentorum laterales. INDUSIUM rotundato-cystoideum, nudum, coriaceum, lateribus semper clausum, 1/2—3/4 lin. latum.

Habitat in prov. Sebastianopolitana, e. gr. Serra dos Orgãos, super arbores vetustas; Gardner n. 200! — Item in occidente Americae australis et in centrati, in Capite Bonae Spei, et in Africa tropica. — Dryas et Extrabrazil.

§ 3. STENOLOMA.

3. DAVALLIA BIFIDA KAULF. caudice suberecto; stipitibus subfasciculatis nudis nitidis castaneis; frondibus pellucido-membranaceis utrinque glabris oblongo-lanceolatis decompositis, pinnis lanceolato-deltaeideis, inferioribus maximis, pinnulis lanceolato-deltaeideis pinnatifidis vel bipinnatifidis, dimidio inferiore basi cuneato-truncato, segmentis dichotomis, laciniis ultimis cuneato-linearibus apice dentatis, venis in segmentis omnium graduum solitariis; soris terminalibus quoad lacinias, indusiis membranaceis duplo latioribus quam profundis.

Tabula nostra XLI. Fig. III. (analysis).

Davallia bifida Kaulf. Enum. 222. Hook. et Grev. Icon. Fil. 238. Presl, Tent. 129. Hook. Sp. Fil. I. 188. Hook. et Baker, Syn. Fil. 101.

Odontoloma bifidum Mett. Fil. Hort. Lips. 104.

Acrophorus bifidus Moore, Ind. Fil. 5.

CAUDEX gracilis, breviter repens vel suberectus, PALEIS parvis paucis inconspicuis lanceolatis castaneis vestitus. STIPITES subfasciculati, graciles, 2—6 poll. longi, nudi, nitidi, flexuosi, castanei, antice sulcati. LAMINA oblongo-lanceolata vel oblongo-deltaeidea, 4—8 poll. longa, 2—4 poll. lata, decomposita, pellucido-membranacea, pallide viridis, utrinque concolor, glabra. RACHES praegraciles, nuda, subcastanea, primariae praeter apicem et saepe etiam secundariae deorsum exalatae. PINNAE inferiores maxime, lanceolato-deltaeidae, 1—4 poll. longae, 1/4—2 poll. latae, superiores sensim reductae, contiguae. PINNULAE lanceolato-deltaeidae, pinnatifidae vel bipinnatifidae, insigniter petiolatae, costis complanatis alatis, dimidio inferiore ad basin cuneato-truncato, segmentis dichotomis, laciniis ultimis 1—2 lin. longis, 1/4—1/3 lin. latis, ex apice deorsum angustatis, apice subtiliter inciso-dentato. VENAE medianae graciles, in segmentis omnium graduum solitariae. SORI semper quoad lacinias terminales. INDUSIUM parvum, membranaceum, nudum, duplo latius quam profundum.

Habitat ad flumina Casiquari, Vasiva et Pacimoni Brasiliae amazonicae: Spruce n. 3416!; in prov. Minarum: Langsdorff!; in Serra dos Orgãos, prov. Rio de Janeiro: Gardner n. 155!, Glaziou 2326!, et in prov. S. Catharina: Chamisso. — Vaga.

Obs. Ambigit inter *Odontolomam* et *Stenotomam* typicam (cf. *D. clavata*, *tenisotia* etc.).

4. DAVALLIA SPRUCEI BAKER: caudice breviter repente; stipitibus parum segregatis, strictis erectis nudis nitidis stramineis; frondibus rigide coriaceis oblongo-lanceolatis bipinnatis, pinnis lineari-ligulatis stricte patentibus parallelis, pinnulis obdeltaeideis usque ad basin flabellato-dissectis, segmentis linearibus acutis, venis solitariis; soris quoad lacinias terminalibus, paulo vel vix latioribus quam profundis.

Lindsaya Sprucei Hook. in Hook. et Baker Syn. Fil. 108.

CAUDEX firmus, breviter repens, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis castaneis lineari-subulatis sursum vestitus. STIPITES parum segregati, erecti, stricti, 6—15 poll. longi, deorsum castanei, sursum straminei, nudi, nitidi, pergraciles, antice canaliculati. LAMINA rigide coriacea, oblongo-lanceolata, 2—4 poll. longa, 15—18 lin. lata, omnino nuda, bipinnata, pinnulis flabellato-dissectis. PINNAE 6—12-jugae, oppositae vel alternae, subhorizontaliter patentes, 7—9 lin. longae, explanatae 3 lin. latae, saepe extrorsum decurvatae, parallelae, superiores decrescentes, mediae rachibus in eodem latere circa 3 lin. distantibus. PINNULAE 10—12-jugae, 1 1/2 lin. longae et latae, obdeltaeidae, contiguae, breviter petiolatae, quoad rachem pleraeque decurvatae (pendulae), usque ad basin flabellato-dissectae, inferiores et mediae bifurcatae, superiores unifurcatae. SEGMENTA linearia, acuta, 1/2—1 lin. longa, 1/6 lin. lata, erecto-patentia, fertilia apice dilatata. VENAE laciniarum medianae, solitariae. SORI quoad lacinias terminales, saepe paulo latiores quam profundi. INDUSIUM 1/6—1/4 lin. latum, valvulis coriaceis aequalibus.

Habitat prope S. Carlos ad ripas fluvii Rio Negro, prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 2988! — Najas.

Obs. Habitus omnino *Lindsayae pendulae*, sed longe recedit pinnulis flabellato-dissectis, segmentis perangustis, soris aegre vel paulo latioribus quam profundis.

§ 4. MICROLEPIA.

(5.) *DAVALLIA IMRAYANA* Hook. caudice repente; stipitibus segregatis nudis nitidis castaneis; frondibus subcoriaceis glabris oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 4—8-jugis lanceolatis crenatis basi subaequaliter cuneatis, inferioribus breviter petiolatis, venis inconspicuis laxis dichotomis; soris laxis, quoad laminam parum intramarginalibus, indusiis coriaceis reniformibus.

Davallia Imrayana Hook. Sp. Fil. I. 171. tab. 49 A. Klotzsch, Linnæa XVIII. 544. Hook. Gen. Fil. t. 58 B. fig. 5. 6. Hook. et Baker, Syn. Fil. 90.

Saccoloma Imrayana Kunze, Schkuhr Suppl. 86. Griseb. Flor. Brit. W. Ind. 662. Fée, Fil. Ant. 92.

Humata? *Imrayana* Moore, Ind. Fil. p. XCII.

Saccoloma adiantoides L'Herm. Mss.

CAUDEX longe repens, lignosus, flexuosus, crassitie sesquilineae, PALEIS parvis lanceolatis castaneis vestitus. STIPITES segregati, 4—10 poll. longi, erecti, nudi, graciles, castanei, postice rotundati, antice sulcati. LAMINA oblongo-lanceolata, simpliciter pinnata, 6—9 poll. longa, 3—4½ poll. lata, subcoriacea, utrinque glabra, supra viridis, infra paulo pallidior. PINNAE utrinque secundum rachem 4—8, alternæ vel suboppositæ, laxæ, lanceolatae, 2—3 poll. longæ, 8—9 lin. latae, acutæ, marginibus late inciso-crenatis, superiores subsessiles, inferiores breviter petiolatæ, mediis subaequales, basi integræ subaequaliter cuneata. VENAE pinnatæ, inconspicuae, immersæ; VENULAE laxæ, erecto-patentes, profunde furcatae, ramis saepe iterum furcatis. SORI quoad venulas terminales, parum intramarginales quoad pinnas, 1 pro crenatura, 30—40 pro pinna, uniseriati, laxi. INDUSIUM nudum, parvum, subcoriaceum, reniforme.

Habitat in Guyana britannica e. gr. in monte Roraima: Rich. Schomburgk n. 1646., Appun 1144. — Incolit etiam insulas Antillanas: Imray!, L'Hermier! — In Brasilia quaerenda.

Obs. Inter *Davalliae* subgenera habitu accedit ad *Microlepiam*, quoad indusii structuram autem ad *Humatam*.

6. *DAVALLIA SACCOLOMA* Spreng. caudice lignoso longe repente; stipitibus segregatis firmis nudis erectis castaneis interdum muricatis; frondibus papyraceis vel subcoriaceis utrinque glabris oblongo-deltaeideis simpliciter pinnatis, pinnis lineari-ligulatis sursum dentatis deorsum integris basi subaequaliter cuneatis, inferioribus breviter petiolatis, venis conspicuis subparallelis confertis plerumque unifurcatis; soris numerosis omnino marginalibus, indusiis rotundatis membranaceis.

Tabula nostra XXI. Fig. 15. (pinna) et tab. XLI. Fig. IV b. (analysis).

Davallia Saccoloma Spreng. Syst. Veg. IV. 119. Hook. Sp. Fil. I. 171. Hook. et Baker, Syn. Fil. 97.

Saccoloma elegans Kaulf. Enum. Fil. 224. t. 1. fig. 12. Presl, Tent. 126. tab. 4. fig. 19. Kunze in Schkuhr Suppl. t. 41. Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 662. Mett. in Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 261. Ettingsh. l. c. tab. 134. fig. 9.

Neuropteris elegans Desv. Prodr. 292. tab. 8. fig. 2.

CAUDEX longe repens, firmus, lignosus, saepe supra truncos arborum scandens, interdum 20 pedes attingens. Paleas non vidi. STIPITES segregati, 1—1½ pedes attingentes, validi, erecti, nudi, castanei, crassitie deorsum 3—4 linearum, antice sulcati, postice rotundati, inermes vel aculeis brevibus paucis muricatis. LAMINA oblongo-deltaeidea, simpliciter pinnata, 2—4 pedes longa, 1—2 pedes lata, papyracea vel rigide subcoriacea, utrinque viridis, glabra. PINNAE lineari-ligulatae, alternæ, 12—20-jugæ, 6—12 poll. longæ, 12—18 lin. latae, subpatentes, apice acuto vel acuminato, marginibus deorsum subintegris, sursum plerisque sterilius inciso-dentatis, basi subaequaliter cuneata vel parum rotundata, superiores subsessiles, in-

fiores breviter petiolatæ. Pinna terminalis reliquis consimilis. Sori marginales uniseriati parvi conferti, utrinque 50—80 pro pinna. INDUSIA rotundata, parva, nuda, membranacea.

Habitat in prov. do Alto Amazonas, ad S. Gabriel da Cachoeira: Spruce n. 2402!; ad ripas Tanau prov. Para, in terra: Spruce!; in prov. Bahia: Blanchet n. 3936!; in prov. Minarum ad Gongo Soco: Gardner n. 5325!; et in Sebastianopolitana, e. gr. Serra dos Orgãos: Gardner n. 159!, Burchell 2463!, Glaziou 2376! etc. — Item in Guyana gallica: Leprieu!, in Columbia, Guatemala, insulis Antillanis etc. — Vaga et Extrabrazil.

7. *DAVALLIA INAEQUALIS* Kunze: caudice lignoso, longe repente; stipitibus segregatis nudis flexuosis deorsum castaneis; frondibus viridibus herbaceis utrinque glabris subdeltaeideis tri-quadrupinnatifidis, pinnis lanceolato-deltaeideis, segmentis omnium gradum in dimidio inferiore reductis, basi cuneato-truncatis, laciniis ultimis oblongo-rhomboides subobtusis inciso-crenatis, venis pinnatis; soris parum intramarginalibus, 2—6 in lacinia, indusiis parvis rotundatis membranaceis.

Tabula nostra XXI. Fig. 6—9. (pinnae), et tab. XLI. Fig. IV a. (analysis).

Davallia inaequalis Kunze, Linnæa IX. 87. Hook. Sp. Fil. I. 180. t. 57 B. Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 661. Hook. et Baker, Syn. Fil. 99.

Microlepia inaequalis Presl, Tent. 125. Fée, Fil. Ant. 92. Ettingsh. l. c. tab. 143. fig. 6. 10. 11.

Saccoloma inaequale Mett. Ann. Sc. Nat. IV. Ser. XV. 80.

Davallia alata Heward, Mag. Nat. Hist. 1838. p. 465.

Microlepia brasiliensis Presl, Tent. 125. tab. 4. fig. 23.

Davallia brasiliensis Hook. Sp. Fil. I. 185.

Microlepia Galeottii Fée, Gen. Fil. 327. Fil. Ant. 92.

Davallia Pohliana Kunze Mss.

Davallia distans Kaulf. Enum. Fil. 223?

Microlepia Pohliana Ettingsh. l. c. tab. 142. fig. 11., tab. 141. fig. 2. 4.

CAUDEX longe repens, lignosus, saepe supra truncos arborum scandens. PALEAE lineari-subulatae, castaneae, nitidae, 3—4 lin. longae, omnino basalès. STIPITES segregati, 12—18 poll. longi, modice validi, flexuosi, nudi, nitidi, deorsum castanei, superne stramineo-virides. LAMINA herbacea, utrinque viridis, glabra, subdeltaeidea, tri- vel quadrupinnatifida, 3—4 pedes longa, ½—2 pedes lata. PINNAE lanceolato-deltaeideae, inferiores maximae, 9—12 poll. longae, 4—9 poll. latae, petiolo 6—9 lin. longo instructae, inferiores mediis aequales vel paulo reductae, pinnulis anticis quam posticæ aliquantum inferioribus. PINNULAE lanceolatae, 2—9 poll. longae, ¾—3 poll. latae, dimidio inferiore plus minusve reducto et basi cuneato-truncata. SEGMENTA in formis dissectis ut pinnulae formarum minus divisarum sese habentia, deorsum costis liberis vel anguste alatis instructa, laciniis oblongo-rhomboides, superne ad dimidium vel ultra pinnatifidis, subobtusis, inciso-crenatis, dimidio inferiore reductis, parum falcatis, 2—3 lin. latis. VENAE pinnatae, satis conspicuae, graciles, laxae, arcuatae, ad apicem dentis singuli lacinae singulatim excurrentes. SORI quoad laminam parum intramarginales, 2—6 pro laciniis ultimis. INDUSIUM membranaceum, parvum, rotundatum.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad São Gabriel da Cachoeira: Spruce n. 2120! 2121!; in paludosis sylvarum prope Ilheos prov. Bahia: Moricand, Blanchet 2507!; ad fluv. Xipoto prov. Minarum: Martius; in prov. Sebastianopolitana, e. gr. in Corcovado, Serra dos Orgãos etc.: Bowie et Cunningham!, Burchell 3579!, Gardner n. 60! 202!, Milne! etc. etc.; item in prov. S. Catharina: Fritz Müller! — Praeterea in Guyana britannica: Appun n. 1036!, et vagans inde e Peruvia usque ad insulas Antillanas et Mexicum. — Vaga et Extrabraziliensis.

Obs. *D. nigrescens* Kunze Mss. (= *Microlepia nigricans* Presl, Ettingsh. tab. 144. fig. 7.) est forma laminâ paulo crassiore, siccitate nigricante. Cf. *tabula nostra XXI. Fig. 9.*

8. *DAVALLIA SPELUNCAE* BAKER: caudice lignoso repente, juventute paleis fibrilloso-lanosis vestito; stipitibus flexuosis stramineis subnudis; frondibus subdeltoideis tri- vel quadripinnatifidis herbaceis utrinque pubescentibus, pinnis lanceolato-deltoideis, pinnulis lanceolatis, segmentis subdeltoideis pinnatifidis, dimidio inferiore reductis, basi cuneato-truncatis, imis anticis conspicue productis, venis pinnatis; soris parum intramarginalibus, 6—20 pro segmento, indusiis parvis rotundatis membranaceis.

Tabula nostra XX. Fig. 15. 16. et XXI. Fig. 10—12 (pinnulae).

Davallia Speluncae Baker in Hook. et Baker Syn. Fil. 100.

Polypodium Speluncae Linn. Sp. 7919. Vahl, Symb. III. 105. Schkuhr, Fil. 191. t. 26.

Microlepia Speluncae Moore, Ind. Fil. p. XCIII. Kuhn, Fil. Afr. 159.

Davallia polypodioides Don, Prodr. Fl. Nep. 10. Hook. Sp. Fil. I. 100. (α et β).

Dicksonia polypodioides Swartz, Syn. Fil. 137. Willd. Sp. Plant. V. 488.

Microlepia polypodioides Presl, Tent. 125. Ettingsh. l. c. tab. 142. fig. 8.

Davallia flaccida R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 157.

Davallia jamaicensis et trichosticha Hook. Sp. Fil. I. 183.

Davallia mollis, subvolubilis et madagascariensis Kunze, Bot. Zeitg. VIII. 158. 172. 173.

Microlepia aspidioides Presl, Epim. 96.

Dicksonia aurita Kunze, Mss.

Dicksonia chaerophylla Schrad. Mss., et nomina multa alia.

CAUDEX firmus, lignosus, supra terram repens, PALEIS parvis fibrillosis teneris pallide ferrugineis vestitus. STIPITES segregati, modice validi, flexuosi, straminei, juniores leviter fibrilloso-lanosi. LAMINA herbacea, subdeltoidea, 3—5 pedes longa, 1—2 pedes lata, tri- vel quadripinnatifida, supra obscure viridis, infra pallidior, utrinque et praesertim in rachibus pubescens. PINNAE deltoideo-lanceolatae, 6—15 poll. longae, 4—8 poll. latae, inferiores maxinae, omnes breviter petiolatae, deorsum aequales vel paulo reductae. PINNULAE formarum magis divisarum lanceolatae, 3—4 poll. longae, 1—1½ poll. latae, costis complanatis, superne anguste alatis, deorsum interdum liberis, segmentis imis anticis quam postica demissioribus conspicue productis. SEGMENTA inaequaliter lanceolato-deltoidea, in dimidio inferiore reducta et ad basin inferne cuneato-truncata, ad dimidium vel ultra pinnatifida, lacinis oblongis integris vel crenatis subobtusis parum falcatis. VENAE pinnatae, graciles, immersae, laxae. SORI parum intramarginales, 6—12 pro segmento vel in imis anticis 12—20. INDUSIUM parvum, rotundatum, membranaceum.

Habitat in sylvis provinciarum Brasiliae mediarum. Ad Almadam dittonis Ilheos prov. Bahia: Martius!; in sylvis ad viam Fetisbertiam prov. Minarum: Princeps Neovidensis; Rio de Janeiro in Serra dos Orgãos etc.: Burchell 1901! 2567! 3157!, Schott atique; in prov. S. Catharinae: Forbes!, Fritz Müller!; in sylvis montium prov. S. Pauli: Martius! — In reliquis regionibus tropicis orbis novae rara, sed per antiquum orbem in terris omnibus calidioribus dispersa. — Vaga et Extrabrasiliensis.

TRIBUS III. LINDSAYEAE.

SORI lineares vel oblongi, quoad laminam marginales, quoad venas terminales. INDUSIUM bivalvatum, valvulis rectis angustis, extrorsum apertis.

CAUDEX breviter repens, sublignosus, gracilis, flexuosus, superne paleis parvis paucis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, cum caudice continui, erecti, flexuosi, graciles, nudi, castaneo-ebenei. FRONDES uniformes, simplices, simpliciter pinnatae vel bipinnatae, raro magis compositae, pleraeque pellucido-membranaceae vel papyraceae vel rigide coriaceae segmentis dimidiatis (*Eulindsaya*, *Synaphlebium*), vel coriaceae vel subcoriaceae segmentis prorsus vel fere aequalateralibus (*Isoloma*, *Schizoloma*, *Dictyoxiphium*). VENAE pinnatae vel subflabellatae, liberae (*Eulindsaya*, *Isoloma*) vel plus minusve in areolis hexagonis irregularibus anastomosantes (*Schizoloma*, *Synaphlebium*, *Dictyoxiphium*). INDUSIUM bivalvatum, valvulis angustis, nunquam revolutis, extrorsum dehiscentibus. VALVULA externa e margine laminae parum mutato efformata; interna exteriore plerumque angustior, membranacea. — Species circiter 50, per totum fere orbem inter Tropicos dispersae, in Africa raras, extra tropicos vix provenientes.

Genus unicum brasiliense: III. LINDSAYA DRYAND.

III. LINDSAYA DRYANDER.

LINDSAYA Dryander in *Transact. Linn. Soc. Lond.* III. 40. t. 7—10. Smith, *Mem. Acad. Taur.* V. 413. Swartz, *Syn. Fil.* 118. Willd. *Sp. Plant.* V. 420. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 63 A. — SCHIZOLOMA Gaud. in *Freye. Voy.* 378. t. 16—18. Presl, *Tent.* 132. J. Smith, *Gen. Fil.* 89. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 63 B. — ISOLOMA J. Smith, *Gen. Fil.* 88. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 102. — SYNAPHEBIUM J. Smith, *Gen. Fil.* 91. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* 101. — LINDSAYNIUM Fée, *Gen. Fil.* 333. — DIELLIA Brack. *Fil. Un. Stat. Americ. Expl. Exped.* 218. tab. 31.

Valvulae ambae indusii productae.

Tabula nostra XLI. Fig. V. VI. et XLII. Fig. I.

Polypod.

CAUDEX FRONDES etc. ut in caractere tribus, venis liberis, rarissime anastomosantibus.

CLAVIS SPECIERUM.

§ 1. EULINDSAYA. Segmenta dimidiata, venulis liberis. — *Tabula nostra XLI. Fig. V.*

A. Lamina semper simpliciter pinnata.

a. Pinnae sessiles.

1. Pinnae decurvatae, duplo longiores quam latae.

1. L. FALCIFORMIS.

2. Pinnae subrectae, 5—8-ies longiores quam latae.

2. L. DUBIA.

b. Pinnae petiolatae, aequae longae ac latae.

3. L. BOTRYCHOIDES.

B. Lamina plerumque bipinnata, pinnulis integris.

a. Lamina rigide coriacea.

1. Pinnulae pendulae, 1—1½ lin. longae, obdeltoideae 4. L. PENDULA.
2. Pinnulae patentes, 2—5 lin. longae, omnino dimidiatae 5. L. STRICTA.

b. Lamina chartacea.

1. Raches flexuosae, pinnulae 1½—2 lin. longae. 6. L. TENUIS.
2. Raches strictae, pinnulae 4—6 lin. longae. 7. L. GUYANENSIS.
3. Raches strictae, pinnulae 6—18 lin. longae. 8. L. TRAPEZIFORMIS.

C. Lamina bipinnata, pinnulis profunde flabellato-dissectis.

9. L. VIRESCENS.

§ 2. ISOLOMA. Lamina simplex, symmetrica, venulis liberis. — *Tabula nostra XXI. Fig. VI.*

1. Lamina rotundato-reniformis 10. L. BENIFORMIS.
2. Lamina sagittata 11. L. SAGITTATA.

§ 3. SCHIZOLOMA. Segmenta symmetrica, venulis anastomosantibus. — *Tabula nostra XLII. Fig. I.* 12. L. MACROPHYLLA.

§ 1. EULINDSAYA.

(1.) LINDSAYA FALCIFORMIS Hook: frondibus simpliciter pinnatis papyraceis, pinnis dimidiatis contiguis sessilibus decurvatis duplo longioribus quam latis, marginibus integerrimis, margine interiore cum rache parallelo, venulis liberis 4—5 pro pinna; soris secundum marginem superiorem pinnarum prorsus continuis.

Lindsaya falciformis Hook. *Sp. Fil. I. 208. tab. 64 B. Hook. et Baker, Syn. Fil. 104.*

CAUDEX breviter repens, gracilis, lignosus, flexuosus, paleis lanceolatis parvis ferrugineis adpressis vestitus. STIPITES parum segregati, erecti, firmi, 6—9 lin. longi, quadrangulares, subcastanei, deorsum parum paleacei. LAMINA ligulata, papyracea, utrinque viridis, omnino nuda, simpliciter pinnata, 2—3 poll. longa, 6—8 lin. lata. PINNAE 12—20-jugae, alternae, contiguae, 3—4 lin. longae, 1½—2 lin. latae, dimidiatae, sessiles, marginibus anticis et posticis subparallelis integerrimis, extrorsum aliquantum decurvatis, margine interiore cum rache parallelo, inferiores decrescentes. VENAE immersae, inconspicuae, primaria cum margine postico contigua et cum eo parallela; venulis inferioribus omnino obsoletis, superioribus 4—5 laxis erecto-patentibus plerisque profunde furcatis. SORI secundum marginem anticum pinnarum prorsus continui, valvulis subaequalibus coriaceis griseo-brunneis.

Habitat in Guyana britannica: Schomburgk! — In Brasilia amazonica quaerenda.

Obs. Speciem valde dubiam hanc censemus; formam simpliciter pinnatam *L. guyanensis*, segmentis angustioribus, forsan sistit.

2. LINDSAYA DUBIA Spreng. frondibus simpliciter pinnatis pellucido-papyraceis, pinnis dimidiatis laxis subrectis sessilibus 5—8-ies longioribus quam latis, marginibus anticis et posticis extrorsum dentatis, margine interiore cuneato-truncato, venulis liberis 6—9 per pinnam; soris secundum marginem superiorem pinnarum plus minus interruptis vel subcontinuis.

Lindsaya dubia Spreng. *Syst. Veg. IV. 79. Kunze, Analecta Pteridogr. 38. t. 27. Hook. Sp. Fil. I. 209. t. 64 B. Hook. et Baker, Syn. Fil. 105. Klotzsch, Linnaea XVIII. 544.*

Lindsaya tenera Kaulf. *Enum. Fil. 219, nec Dryander.*

CAUDEX repens, lignosus, flexuosus, paleis parvis lanceolatis ferrugineis adpressis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, erecti, graciles, flexuosi, 3—6 poll. longi, castanei, nudi, nitidi, superne quadrangu-

lares, deorsum parum paleacei. LAMINA lanceolato-ligulata, simpliciter pinnata, pellucido-papyracea, utrinque viridis, omnino nuda, 4—8 poll. longa, 1½—2 poll. lata. PINNAE 15—30-jugae, oppositae vel alternae, patentes, 9—15 lin. longae, deorsum 1½—2 lin. latae, dimidiatae, sessiles, subrectae vel parum falcatae, margine superiore subintegro vel superne inciso-crenato, inferiore integro vel extrorsum parum dentato, basi superiore cuneato-truncata, inferiores reliquis subaequales. VENAE graciles, immersae, primaria cum margine postico subcontigua et parallela, venulis inferioribus brevibus paucis ad dentes extrorsum aduentibus. VENULAE 6—9, laxae, erecto-patentes, exteriores simplices, mediae furcatae, inferiores subpinnatae. SORI secundum marginem superiorem pinnarum continui vel extrorsum parum interrupti, VALVULIS coriaceis aequalibus.

Habitat in provinciis do Alto Amazonas praeruptis umbrosis ad fluv. Uaupés prope Panurê: Spruce n. 2599!; in Guyana batava: Kappler n. 1757; in anglica: Rich. Schomburgk n. 256! 1134!, Appun! alique; et in Guyana gallica: Poiteau! Richard, Sagot 949! — Najas et Extrabrisil.

3. LINDSAYA BOTRYCHIOIDES St. Hil. frondibus simpliciter pinnatis papyraceis, pinnis subdimidiatis laxis petiolatis aequae fere latis quam longis rotundatis vel rhomboideo-rotundatis, in triente vel quadrante inferiore arcuato-truncatis, margine exteriori parum crenato, venulis liberis flabellatis dichotomis; soris secundum marginem exterioriorem pinnarum continuis.

Lindsaya botrychioides St. Hilaire, *Voy. Distr. Diam. I. 379. Linnaea 1842. p. 183. Hook. et Baker Syn. Fil. 105.*

CAUDEX breviter repens, lignosus, flexuosus, paleis parvis lanceolatis ferrugineis adpressis vestitus. STIPITES parum segregati, erecti, firmi, quadrangulares, flexuosi, castanei, 3—4 poll. longi. LAMINA ligulata, 6—12 poll. longa, 8—15 lin. lata, simpliciter pinnata, papyracea, utrinque viridis, omnino nuda. PINNAE 15—25-jugae, laxae, alternae, petiolatae, subdimidiatae, 4—8 lin. longae et latae, rotundatae vel rhomboideo-rotundatae, in triente v. quadrante inferiore arcuato-truncatae, margine exteriori praesertim sterili parum crenato, margine interiore cum rache parallelo vel supra rachem imbricato, inferiores reliquis subaequales. PETIOLUS pinnarum imarum 1—1½ lin. longus. VENULAE graciles, immersae, omnino flabellatae, dichotome furcatae. SORI secundum marginem exterioriorem perfecte continui, indusi valvula exteriori papyracea producta, interiore angustiore membranacea.

Habitat in sylvis humidis montium Serra da Piedade et Serra da Caraca prov. Minarum: St. Hilaire; in Serra da Cubatão atibique in prov. S. Pauli: Burchell n. 3732! 4402! — Oreas.

(4.) LINDSAYA PENDULA Klotzsch: frondibus oblongo-lanceolatis bipinnatis rigide coriaceis, pinnis 10—15-jugis brevibus subaequalibus horizontalibus, pinnulis obdeltoideis sessilibus, margine interiore cuneato-truncato, exteriori integro rotundato, posteriore recto valde deflexo, venulis flabellato-furcatis extrorsum 4—6 pro pinnulis; soris brevibus secundum marginem exterioriorem pinnularum continuis.

Lindsaya pendula Klotzsch, *Linnaea XVIII. 548. Hook. Sp. Fil. I. 213. tab. 65 A. Hook. et Baker, Syn. Fil. 108.*

CAUDEX lignosus, repens, crassitie pennae corvinae, paleis parvis castaneis secundis lineari-subulatis vestitus. STIPITES segregati, erecti, 6—9 poll. longi, graciles, stricti, deorsum castanei, paulo paleacei. LAMINA oblongo-lanceolata, bipinnata, pallide viridis, rigide coriacea, omnino glabra, 9—12 poll. longa, 3—4 poll. lata. RACHIS primaria stramineo-viridis, nitida, glabra, stricta. PINNAE 10—15-jugae, alternae, sessiles, horizontaliter patentes vel extrorsum paulo decurvatae, 15—18 lin. longae, 3—4 lin. latae, parallelae et subaequales. PINNULAE 12—20-jugae, 1½—2 lin. longae, sessiles, contiguae, quoad rachem plerumque decurvatae (pendulae), margine interiore cuneato-truncato, exteriori rotundato integro,

posteriore introrsum recto valde deflexo sed extrorsum recurvato. VENAE graciles, immersae, occultae, omnino flabellatae, unifurcatae, extrorsum 4-6 per pinnulam. SORI secundum marginem anteriorem pinnularum continui, 1-1½ lin. longi, valvulis rigide coriaceis, aequalibus.

Habitat in Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 253 partim!, Appun 804! — In Brasilia quaerenda.

5. LINDSAYA STRICTA DRYAND. frondibus subrhomboideis bipinnatis, raro simplicibus linearibus vel ramis inferioribus furcatis, rigide coriaceis, pinnis 1-5-jugis longis valde ascendentibus, pinnulis patulis dimidiatis, margine interiore cum rache parallelo, exteriore arcuato integro, posteriore recto horizontali vel parum decurvato, venulis flabellato-furcatis; soris secundum marginem anteriorem pinnularum continuis.

Tabula nostra XXI. Fig. 22-25. (partes pinnarum).

Lindsaya stricta Dryand. *Trans. Linn. Soc. Lond.* III. 42. Swartz, *Syn. Fil.* 119. Willd. *Sp. Plant.* V. 425. Schkuhr, *Fil.* t. 114. Hook. *Sp. Fil.* I. 216. *Ettingsh. l. c. tab.* 145. fig. 5-8., tab. 146. fig. 8.

Lindsaya javitensis H.B.K. Willd. *Sp. Plant.* V. 424. Raddi, *Fil. Bras.* 56. t. 75. Fig. 1. Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 546.

Lindsaya pusilla Splitg. *Fil. Surinam.* 35.

Lindsaya gracilis et *Raddiana* Klotzsch l. c. 549. (formae frondibus simplicibus).

Lindsaya rigescens Willd. *Sp. Plant.* V. 424.

Lindsaya elegans Hook. *l. c. Plant.* t. 98.

Lindsaya microphylla Presl, *Rel. Haenk.* 59. t. 10. fig. 2.?

Lindsaya serrata Goldm. *Pl. Meyen.* 464.?

CAUDEX lignosus, breviter repens, flexuosus, crassitie pennae corvinae, PALIS parvis lanceolatis castaneis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, erecti, 6-9 poll. longi, rigidi, nudi, nitidi, castanei vel subebenei. LAMINA rigide coriacea, nuda, plerumque bipinnata, irregulariter rhomboidea, 6-12 poll. longa, 4-8 poll. lata, ramis 1-5-jugis ascendentibus, interdum omnino simplex ligulata 6-12 poll. longa 4-6 lin. lata, raro ramis primariis imis basi furcatis. PINNAE formae normalis 2-9 poll. longae, 4-6 lin. latae, erecto-patentes vel adscendentes, nunquam patentes, rachibus nitidis rigidis rectis vel extrorsum parum incurvatis vel decurvatis. PINNULAE alternae, contiguae, sessiles, 2-5 lin. longae, 1½-3 lin. latae, dimidiatae, margine posteriore integro recto vel parum decurvato, exteriore integro vel parum crenato, arcuato, interiore recto cum rache parallelo. VENAE graciles, immersae, occultae, flabellato-furcatae, extrorsum 8-10 per pinnulam. SORI secundum marginem anteriorem pinnularum continui, valvulis coriaceis subaequalibus.

Habitat per totam fere Brasiliam terrasque adjacentes. In prov. Rio de Janeiro, Corcovado, Serra dos Orgãos etc.: Mart. Hb. Fl. Bras. 193. Mac. Princ. Vidensis, Pohl, Langsdorff!, Burchell n. 947! 2663! 3243!, Mac Gillivray! etc.; in prov. Minarum, Serro Frio, ad S. João Baptista, Tapanhoacanga, Gongo Soco etc.: Pohl, Gardner 5324!, Bunbury!; in prov. Bahia, e. gr. ad Ilheos: Moricand!, Luschnath, Blanchet 3707! 3471!, Wawra et Maty n. 184; in prov. Maranhão: G. Don; in vicinia Santarem, ad fluv. Tapajoz, prope Para atisque locis prov. Paraënsis: Spruce n. 931!, et ad S. Carlos prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 3064! — Praeterea in Guyana gallica: Leprieur!; in batava: Splitgerber, Kappler n. 1737, Kegel 1052 etc.; et in anglica: Rich. Schomburgk 276. 1178, Parker!, Appun n. 1145! 1233! Item in Columbia, Mexico et in insulis Antillanis degit. — Vaga et Extrabrazil.

(6.) LINDSAYA TENUIS KLOTZSCH: frondibus oblongo-lanceolatis bipinnatis subprocumbentibus, rachibus omnibus pergracilibus valde flexuosis, pinnis laxis linearibus patulis, pinnulis dimidiatis parvis breviter petiolatis, margine interiore cuneato-truncato, superiore subrecto obliquo integro vel parum crenato, inferiore recto valde deflexo extrorsum incurvato, venis laxis liberis extrorsum 2-4 pro pinnulis; soris secundum marginem anteriorem pinnularum continuis.

Lindsaya tenuis Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 550. Hook. *Sp. Fil.* I. 218.

Lindsaya filiformis Hook. *Sp. Fil.* I. 212. tab. 63 D. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 106.

CAUDEX repens, tenuis, brevissime fusco-paleaceus. STIPITES pergraciles, decumbentes, flexuosi, nitidi, nudi, castaneo-ebenei. LAMINA bipinnata, irregulariter oblongo-lanceolata, 6-8 poll. longa, 2-3 poll. lata, papyracea, viridis, omnino nuda. RACHIS primaria flexuosa, subquadrangularis, nitida, tota castaneo-ebeneae. PINNA terminalis interdum reliquis major, 2-3 poll. longa, 4 lin. lata; laterales flexuosae, vage patentes, suboppositae, 4-8-jugae, 1-2 poll. longae, 3-4 lin. latae, centrales 6-15 lin. separatae, rache mediana infra pinnam primariam omnino nudā. PINNULAE contiguae, breviter petiolatae, 1½-2 lin. longae, 1 lin. latae, margine interiore cuneato-truncato, superiore obliquo subrecto integro vel parum crenato, posteriore valde deflexo extrorsum incurvato. VENAE graciles, laxae, immersae, occultae, e basi pinnularum unifurcatae, ramis simplicibus vel unifurcatis, extrorsum igitur venulae 2-4 per pinnulam. SORI secundum marginem anteriorem pinnularum continui lineares; valvulis subaequalibus, valvulā interiore griseo-brunneā, submembranacea.

Habitat in Guyana britannica: Rich. Schomburgk n. 1185!

7. LINDSAYA GUYANENSIS DRYAND. frondibus chartaceis subrhomboideis bipinnatis, raro simplicibus, lineari-ligulatis vel ramis inferioribus furcatis, pinnis ligulatis erecto-patentibus vel patulis, pinnulis dimidiatis mediocribus, margine interiore cum rache parallelo, exteriore integro introrsum recto extrorsum valde arcuato, inferiore plerumque subrecto, venulis liberis flabellatis; soris secundum marginem anteriorem pinnularum continuis, parum intramarginalibus, valvulā interiore angustiore.

Tabula nostra XXII. Fig. 3-4. (pinnae).

Lindsaya guyanensis Dryand. *Transact. Linn. Soc. Lond.* III. 42. Swartz, *Syn. Fil.* 119. Willd. *Sp. Plant.* V. 434. Hook. *Sp. Fil.* I. 216. tab. 62 A. *Ettingsh. l. c. tab.* 146. fig. 24-25.

Adiantum guianense Aublet, *Guian.* 963. t. 365.

Lindsaya Moritziana Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 548.

Lindsaya rubescens Kunze, *Linnaea* XXI. 228. (forma simpliciter pinnata).

Lindsaya pumila Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 545. Hook. *Sp. Fil.* I. 209.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALIS parvis ferrugineis linearibus subulatis vestitus. STIPITES subfasciculati vel parum segregati, 6-15 poll. longi, stricti, erecti, nitidi, nudi, castanei vel straminei vel parum rubelli, antice canaliculati. LAMINA irregulariter rhomboidea vel deltoidea, 12-18 poll. longa, 8-15 poll. lata, interdum simplex ligulata 6-9 poll. longa 8-10 lin. lata, chartacea, viridis, omnino glabra. PINNAE 1-8-jugae, oppositae vel alternae, patulae vel erecto-patentes, sessiles, ligulatae, 4-8 poll. longae, 8-10 lin. latae, deorsum sensim angustatae. PINNULAE sessiles, pleraeque omnino contiguae, 4-5 lin. longae, 2-3 lin. latae, margine interiore recto cum rache parallelo, exteriore integro, introrsum recto, extrorsum valde arcuato, posteriore plerumque subrecto. VENAE graciles, immersae, occultae, flabellatae, extrorsum 10-20 per pinnulam. SORI secundum marginem anteriorem pinnularum continui, parum intramarginales, valvulā interiore angustiore griseo-brunneā subcornea.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Burchell n. 1824!; in prov. Minarum: Gardner n. 5323! (forma ramis inferioribus frondis interdum furcatis); ad S. Gabriel da Cachoeira, prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 2326! — Porro in Guyana batava: Kappler 1738, Kegel 405-6, 1076; in gallica: Aublet!, Martin!, Leprieur!, Sagot 1850! 1336!; et in britannica: Rich. Schomburgk n. 272! 274! 346!, Appun 189! 853! 1259! Etiam in Columbia et insulis Antillanis. — Vaga et Extrabrazilensis.

OBS. Aliquatenus medium tenet inter *L. strictam* et *trapeziformem*. Pro varietate minore speciei insequentis eam censere propensus sum.

8. LINDSAYA TRAPEZIFORMIS Dryand. frondibus chartaceis subrhomboides bipinnatis vel simplicibus ligulatis, pinnis ligulatis erecto-patentibus, pinnulis dimidiatis pro genere magnis, margine inferiore cum rache parallelo, exteriori integro vel parum crenato introrsum recto extrorsum valde arcuato, inferiore subrecto vel obliquo ascendente vel extrorsum decurvato, venulis liberis flabellatis; soris secundum marginem exterioriorem pinnularum plerumque continuis, parum intramarginalibus, valvulâ interiore angustissimâ.

Tabula nostra XXI. Fig. 16. 17. (partes pinnarum) et XII. Fig. V. (analysis).

Lindsaya trapeziformis Dryand. *Transact. Soc. Linn. Lond.* III. 42. t. 9. Swartz, *Syn. Fil.* 119. Willd. *Sp. Plant.* V. 424. Langsd. et Fischer, *Fil.* 21. t. 24. Hook. *Syn. Fil.* I. 214. *Ettingsh.* l. c. tab. 145. fig. 13., tab. 146. fig. 1. 5. 26. etc.

Pteris adianthoides Vell. *Fl. Flum.* XI. t. 88.

Lindsaya quadrangularis Roddi, *Fil. Bras.* 55. t. 74. Hook. *Sp. Fil.* loc. cit. *Ettingsh.* l. c. tab. 146. fig. 1—3.

Lindsaya divaricata et *pallida* Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 547.

Lindsaya nitidissima et *decomposita* Willd. *Sp. Plant.* V. 423—5.

Lindsaya montana et *consanguinea* Fée, *Fil. Ant.* 15. tab. 6.

Lindsaya sectorifolia Goldm. *Pl. Meyen.* 464? — et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS parvis ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES subfasciculati vel parum segregati, 6—18 poll. longi, stricti, erecti, nitidi, nudi, castanei vel subbenei, antice canaliculati. LAMINA irregulariter rhomboidea vel deltoidea, 1—2 pedes longa, 8—15 poll. lata, chartacea, viridis, omnino glabra. PINNAE 1—6-jugae, oppositae vel alternae, erecto-patentes, sessiles, ligulatae, 6—12 poll. longae, 12—18 lin. latae. PINNULAE sessiles, contiguæ, 6—9 lin. longae, 3—4 lin. latae, margine inferiore recto cum rache parallelo, exteriori integro introrsum recto extrorsum valde arcuato, posteriore horizontali subrecto. VENAE flabellatae, robustiores et laxiores quam in praecedente, extrorsum 10—20 per pinnulam. SORI secundum marginem exterioriorem pinnularum continui, parum intramarginales, valvulâ interiore membranaceâ angustissimâ.

Species valde variabilis, insequentes offert intra Brasiliam varietates, specierum titulo ab auctoribus descriptas, inter quas tamen limites certos invenire nequeo:

Var. β . ARCUATA Baker.

Tabula nostra XXI. Fig. 20. 21. Tab. XXII. Fig. 2. (partes pinnarum).

Lindsaya arcuata Kunze, *Syn. Pl. Crypt. Poepp.* 86. *Schkuhr, Suppl.* t. 119. Hook. *Sp. Fil.* I. 215. *Ettingsh.* t. 146. fig. 23. t. 147. fig. 6.

Lindsaya horizontalis Hook. *Sp. Fil.* I. 214. t. 62 B.

Lindsaya Kunzei Moritz, *Ettingsh.* tab. 147. fig. 7.

Pinnulae margine posteriore obliquo ascendente, igitur in apicem angustum subobtusum sensim abeuntes.

Var. γ . LAXA Baker.

Tabula nostra XXII. Fig. 1. (pinna).

Lindsaya laxa Kunze Mss.

Lindsaya Klotzschiana Moritz, *Ettingsh.* tab. 145. fig. 12.

Pinnulae margine exteriori subcrenato; sororum linea hinc plus minus interrupta.

Var. δ . FALCATA Baker.

Tabula nostra XXI. Fig. 18. 19. (pinnae).

Lindsaya falcata Dryand. *Transact. Soc. Linn. Lond.* III. 41. tab. 7. fig. 2. Swartz, *Syn. Fil.* 118. Willd. *Sp. Plant.* V. 422.

Lindsaya Schomburgkii Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 545. *Ettingsh.* tab. 143. fig. 4. 5.

Lindsaya Leprieurii Hook. *Sp. Fil.* I. 208. tab. 62 D. *Ettingsh.* tab. 145. fig. 9. *Wawra, Maximil. Reise* 192.

Lamina simpliciter pinnata, oblongo-ligulata; pinnae saepe multo majores quam in formâ normali, 12—18 lin. longae, 6—9 lin. latae, margine inferiore subrecto vel obliquo ascendente vel plus minus decurvato, lineâ sororum saepe omnino marginali.

Habitat per omnes terras tropicas Americae, Asiae et Australiae. Indicamus solummodo principales stationes et collectores intra Brasiliam terrasque Guyanarum. Forma normalis in Brasiliâ prov. S. Catharina: Fritz Müller!, in Sebastianopolitana, Serra dos Orgãos etc.: Roddi!, Langsdorff, Gardner 158!, Milne! etc.; in prov. Minarum, ad Rio Preto: Gardner 2987!; in Bahia et Pernambuco: Blanchet 2511! 3707!, Gardner 1225!; in prov. Para, prope Santarem, in sylvis ad Obidos, ad Rio Acara, prope Para, et prope Manaus prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 50! 349! 1367! Porro in Guyana batava (Hostmann 96! 108!, Splitgerber, Kegel 679. 1051, Wulfschlaegel), in gallica (Leprieur!, Sagot 733!), et in anglica (Rich. Schomburgk!, Appun 132! 165! 183! 729! 853!). — Var. β . In Serra dos Orgãos: Gardner 157!, Burchett 2457!, Glaziou 2323!; ad Manaus (olim Villa da Barra), prov. do Alto Amazonas: Spruce 1709! — Var. γ . ad S. Gabriel da Cachoeira, prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 2277! — Var. δ . cum praecedente: Spruce 2338! 2356!; prope Para: Spruce 47!; circa Bahiam: Wawra et Maly n. 151; in Guyana batava (Kappler 1353, Kegel 1067), gallica (Leprieur!, Sagot 734! 841!) et in britannica (Rich. Schomburgk 1204!, Appun 730! 831! 962!).

9. LINDSAYA VIRESCENS Swartz. frondibus papyraceis rhomboideis vel deltoideis bipinnatis vel tripinnatis, pinnulis erecto-patentibus ligulatis vel saepe deorsum compositis, pinnulis (vel segmentis) mediocribus dimidiatis, margine inferiore integro cum rache parallelo, inferiore integro horizontaliter subrecto, exteriori arcuato versus basin flabellato-dissecto, laciniis obcuneato-linearibus, venulis liberis flabellatis; soris secundum marginem exterioriorem pinnularum, per incisuras interruptis.

Lindsaya virescens Swartz, *Vel. Acad. Handl. (Holm.)* 1817. p. 71. tab. 4. Fig. 4! (v. s. in *Herb. Martii*). Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 106.

Lindsaya genkoffolia St. Hil. *Voy. Diam.* I. 379. *Linnaea* l. c.

Lindsaya Gardneri Hook. *Sp. Fil.* I. 213. t. 65 B.

CAUDEX breviter repens, PALEIS parvis ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES subfasciculati, 6—9 poll. longi, castanei, nudi, erecti, parum flexuosi, antice canaliculati. LAMINA rhomboidea vel deltoidea, papyracea, viridis, omnino glabra, 6—9 poll. longa, 4—6 poll. lata, bivel tripinnata. PINNAE 4—6-jugae, erecto-patentes, oppositae vel alternae, breviter petiolatae, ligulatae, 6—8 lin. latae, passim deorsum compositae ramis paucis erecto-patentibus, inferiores maximae, superiores sensim decrescentes. PINNULAE dimidiatae, 3—4 lin. longae, $2\frac{1}{2}$ —3 lin. latae, subcontiguæ, breviter petiolatae, margine inferiore recto, cum rache parallelo, inferiore horizontaliter subrecto, exteriori arcuato versus basin profunde flabellato-dissecto, laciniis inaequalibus deorsum $\frac{1}{2}$ —1 lin. latis extrorsum latioribus. VENAE graciles, immersae, laxae, flabellatae, extrorsum 6—8 per pinnulam. SORI secundum marginem exterioriorem pinnularum per incisuras interrupti, parum intramarginales, valvulâ interiore membranaceâ angustiore.

Var. β . CATHARINAE Baker.

Lindsaya Catharinae Hook. *Sp. Fil.* I. 212. tab. 65 B. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 106.

Lamina pallidior, pellucidior. Pinnulae magis dissectae, laciniis profundioribus angustioribus.

Habitat in Serra da Piedade prov. Minarum: St. Hilaire; in Serra da Cubatão: Burchett 3551!; in Serra dos Orgãos: Gardner 156!, Mart. Hb. Fl. Bras. 192!, Glaziou 2324—5, et in monte Corcovado: Langsdorff! — Var. β . in prov. S. Catharinae: Beechey! — *Dryas, Oreas.*

§ 2. ISOLOMA.

10. LINDSAYA RENIFORMIS DRYAND. frondibus chartaceo-coriaceis simplicissimis rotundato-reniformibus integris, sinu basali plerumque profundo, venis liberis dichotomo-flabellatis; soris secundum marginem frondium sinu excepto continuis.

Lindsaya reniformis Dryand. *Transact. Linn. Soc. Lond.* III. 40. t. 7. fig. 1. Swartz, *Syn. Fil.* 118. Willd. *Sp. Plant.* V. 420. Kunze in *Schkuhr Suppl.* tab. 16. fig. 2. Hook. *Sp. Fil.* I. 203. *Ettingsh. l. c.* tab. 145. fig. 10., et *Auct.*

Isoloma reniformis J. Smùh l. c.

CAUDEX repens, lignosus, flexuosus, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES 4—6 poll. longi, segregati, erecti, stricti, ebenei, nitidi, nudi. LAMINA chartaceo-coriacea, obscure viridis, prorsus nuda, simplex, rotundato-reniformis, 2—3 poll. lata, 1½—2 poll. longa, lobis basalibus plerumque profundis, sinu angusto vel triangulariter aperto. VENAE graciles, occultae, mediocriter laxae, omnino liberae, dichotomo-flabellatae. SORUS secundum marginem exteriorem frondis continuus, sinu tantum interruptus, parum intramarginalis, valvulâ inferiore angustâ.

Habitat in sylvis Catingas prope Panurê ad Rio Uaupês, prov. do Alto Amazonas: Spruce 2916! — Praeterea in Guyana batava: Anderson!, in britannica: Rich. Schomburgk 367! 533!, et in gallica: Poiteau!, Martin! — Najas et Extrabrazil.

(11.) LINDSAYA SAGITTATA DRYAND. frondibus chartaceo-coriaceis simplicissimis ovato-sagittatis acutis integris, sinu basali profundo instructis, venulis liberis e vena mediana irregulariter flabellatis; soris secundum marginem frondium sinu excepto omnino continuis.

Tabula nostra XLI. Fig. VI. (analysis).

Lindsaya sagittata Dryand. *Transact. Linn. Soc. Lond.* III. 40. Swartz, *Syn. Fil.* 118. Willd. *Sp. Plant.* V. 420. Hook. et *Grev. Ic. Fil.* t. 87. Hook. *Sp. Fil.* I. 203. et mult. alior. *Adiantum sagittatum* Aublet, *Guian.* II. 964. t. 366.

CAUDEX repens, lignosus, flexuosus, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES 4—6 poll. longi, segregati, erecti, stricti, ebenei, nitidi, nudi. LAMINA chartaceo-coriacea,

obscure viridis, omnino nuda, simplex, ovato-sagittata, 3—5 poll. longa, 2—3 poll. lata, apice acuto, lobis basalibus usque tertiam vel quartam longitudinis frondis attingentibus deltoideis vel subrhomboides, sinu anguste rotundato vel triangulariter aperto. VENULAE graciles, occultae, mediocriter laxae, e venâ centrali irregulari flabellato-dichotomae. SORUS secundum marginem frondis continuus, sinu tantum interruptus, parum intramarginalis, valvulâ inferiore angustâ.

Habitat in Guyana britannica: Appun!; et in gallica: Aublet!, Poiteau! — In Brasilia amazonica quaerenda.

§ 3. SCHIZOLOMA.

12. LINDSAYA MACROPHYLLA KAULF. frondibus chartaceo-coriaceis oblongo-deltoideis simpliciter pinnatis, pinnis symmetrico-lanceolatis integris, deorsum parum inaequalibus, basi valde angustata, venulis e vena mediana arcuato-ascendentibus, in triente exteriori pinnularum anastomosantibus; soris secundum marginem pinnarum continuis.

Tabula nostra XLII. Fig. I. (analysis).

Lindsaya macrophylla Kaulf. *Enum. Fil.* 218. Hook. *Sp. Fil.* I. 220. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 112. (non Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* tab. 63 B. quae ad *Adiantum dolosum* spectat). *Schizoloma macrophyllum* Presl, *Tent.* l. c.

Caudicem non vidi. PALEAE lineari-subulatae, ferruginae, parvae. STIPITES 15—18 poll. longi, erecti, nudi, nitidi, griseo-straminei, antice canaliculati. LAMINA chartaceo-coriacea, obscure viridis, omnino nuda, oblongo-deltoidea, 12—15 poll. longa, 10—12 poll. lata, simpliciter pinnata. PINNAE 3—4-jugae, lanceolatae, oppositae, patentes, 6—7 poll. longae, deorsum 12—18 lin. latae, dimidio superiore sensim angustato in apicem acutum, marginibus integris, basi inaequaliter rotundata (postice parum reducta) in petiolum brevem alatum transcurrente. PINNA terminalis reliquis consimilis. Interstitia 1—2 poll. longa. VENULAE e venâ mediana irregulariter egredientes, immersae, occultae, laxiusculae, arcuatim ascendentes, furcatae, versus trientem exteriori pinnarum anastomosantes, maculas oblique subhexagonas efformantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI secundum margines pinnarum perfecte continui, parum intramarginales, valvulâ inferiore angustissima.

Habitat ad sinum Esperera prov. Paraënsis: Riedel!, et in Guyana (fide Kaulfuss). — Najas et Extrabrazil.

TRIBUS IV. PTERIDEAE.

SORI rotundati oblongi vel lineares, quoad laminam marginales vel parum intramarginales, quoad venas terminales vel faciem totam inferiorem frondis fertiles occupantes. INDUSIUM e margine frondis revolutum mutato formatum, univalvatum vel raro bivalvatum, superum, introrsum apertum.

CAUDEX erectus vel suberectus vel plus minus repens. STIPITES cum caudice continui, graciles vel robusti, straminei vel ebenei, raro paleati. FRONDES magnitudine dissectione et textura valde variabiles, segmentis ultimis parvis vel magnis, interdum dimidiatis. VENAE pleraeque liberae, pinnatae vel flabellatae, interdum plus minus anastomosantes in maculas costales vel hexagonas copiosas, venulis inclusis liberis nullis. SORI marginales vel raro parum intramarginales, rotundati vel oblongi saepe demum confluentes, vel lineares perfecte continui, e margine frondis vel e facie inferiore indusiorum (*Adiantum*) oriundi. INDUSTIA soris homomorpha vel magis continua, e margine revoluti frondis plus minus mutato formata, angusta, membranacea vel scariosa, quoad soros supera, raro valvulâ alterâ inconspicuâ membranaceâ instructa (*Ornithopteris*), e latere inferiore receptaculi orta. — Species ultra 300, pleraeque tropicae sed multae quoque per regiones temperatas utriusque orbis late dispersae.

CLAVIS GENERUM.

- I. Sori e facie inferiore indusiorum oriundi IV. ADIANTUM.
- II. Sori e margine frontis intra et infra indusia oriundi.
- a. Sori plus minus interrupti.
1. Sori sinibus segmentorum impositi, semper rotundati distincti. Venae liberae V. HYPOLEPIS.
 2. Sori ut in 1, nisi saepe deorsum confluentes. Venae anastomosantes VI. LONCHITIS.
 3. Sori marginales, primum rotundati distincti, demum saepe plus minus confluentes VII. CHEILANTHES.
 4. Sori rotundati vel oblongi, parum intramarginales VIII. CASSEBEERA.
 5. Sori et indusia marginalia, demum subcontinua IX. PELLAEA.
- b. Sori lineares, perfecte continui.
1. Sori marginales X. PTERIS.
 2. Sori faciem totam inferiorem frondis peculiaris occupantes XI. LOMARIA.

IV. ADIANTUM LINN.

ADIANTUM Linn. Gen. Plant. 782. Swartz, Syn. Fil. 120. Willd. Sp. Plant. V. 427. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 6 B. Hook. Sp. Fil. II. 1. — HEWARDIA J. Smith in Hook. Journ. Bot. III. 432. t. 16—17. Fée, Gen. Fil. 122. Moore, Ind. Fil. p. XXXVII. t. 25 A., non Hook. fil.

SORI marginales, rotundati, obverse reniformes vel lineares, e facie inferiore indusiorum homomorphorum pronascentes.

Tabula nostra XLII. Fig. II. III.

CAUDEX repens vel suberectus. STIPITES segregati vel subfasciculati, erecti, graciles, castaneo-ebenei, plerumque nudi. FRONDES uniformes, in speciebus Brasiliae simpliciter pinnatae vel bi- vel tripinnatae, vel pedatae ramis pinnatis, interdum apice deflexo radicantes, pelucido-membranaceae vel chartaceae, segmentis plerisque plus minus distincte dimidiatis, nunquam valde dissectis. VENAE plerumque perfecte liberae, raro anastomosantes, e basi segmentorum vel e vena medianâ irregulari flabellato-dichotomae. SORI omnino marginales, rotundati, saepe sinibus distinctis impositi, vel obverse reniformes vel lineares, numerosi et subaequales vel pauci et inaequales, e facie inferiore indusiorum homomorphorum pronascentes. — Species 60—70, per regiones calidiores utriusque hemisphaerii, praesertim tropicas novi orbis dispersae.

CLAVIS SPECIERUM.

- § 1. EUADIANTUM (*Adiantum* J. Smith, Fée et Moore l. c.). Venae omnino liberae. — Tabula nostra XLII. Fig. II.
- A. *Adianta Veneris* Mart. Crypt. Bras. 94. (*Apotomia* Fée, Gen. Fil. 113). Sori rotundati vel obverse reniformes, numerosi, subaequales.
- I. Lamina semper simpliciter pinnata, rache saepe apice radicante.
1. Pinnae longe petiolatae 1. A. LUNULATUM.
 2. Pinnae sessiles vel subsessiles 2. A. CAUDATUM.

II. Lamina 1—4-pinnata, rache nunquam apice radicante.

- a. Segmenta in lateribus oppositis plus minus fertilia, dimidio inferiore plus minus producto.
- α. Lamina 1—2-pinnata, pinnulis lanceolatis vel ovato-lanceolatis, basi inferiore valde truncata.
1. Frons 1- raro 2-pinnata, segmentis magnis. 3. A. PLATYPHYLLUM.
 2. Frons 2-pinnata, segmentis minoribus. 4. A. INTERMEDIUM.
- β. Lamina tripinnata, segmentis magnis subovatis.
5. A. SUBCORDATUM.
- γ. Lamina 2—4-pinnata, segmentis rotundato-cuneatis.
- * Planta 4—6 pedes magna, laxa, subscandens.
6. A. DIGITATUM.
- ** Planta 1—1½-pedalis.
1. Frons 1—2-pinnata, segmentis mediocribus, saepe usque ad medium dissectis. 7. A. CAPILLUS-VENERIS.
 2. Frons 3—4-pinnata, segmentis parvis, saepe ad medium dissectis, dimidio inferiore cuneato 8. A. CUNEATUM.
 3. Frons 3—4-pinnata, segmentis parvis, vix dissectis, basi horizontali vel triente inferiore cuneato 9. A. AETHIOPICUM.
- b. Segmenta rhomboidea, perfecte dimidiata, in marginibus exterioribus solum fertilia.
- α. Raches nuda vel subnuda nitidae.
- * Segmenta 6—9-juga, longe petiolata.
1. Segmenta duplo longiora quam lata. 10. A. TRAPEZIFORME.
 2. Segmenta aequae longa ac lata 11. A. SINUOSUM.
- ** Segmenta 12—30-juga, contigua, inferiora breviter petiolata.
1. Lamina glauca; segmenta 12—18-juga. 12. A. GLAUDESCENS.
 2. Lamina viridis; segmenta 20—30-juga. 13. A. POLYPHYLLUM.
- β. Raches pilis ferrugineis hispidis vestitae.
- * Segmenta parva, 4—8 lin. longa.
1. Pinnae laxae; segmenta triplo longiora quam lata; sori 5—6 pro pinnula 14. A. CRISTATUM.
 2. Pinnae laxae; segmenta duplo longiora quam lata; sori 6—9 pro pinnula 15. A. SERRATO-DENTATUM.
 3. Pinnae contiguae; segmenta triplo longiora quam lata; sori 12—18 pro pinnula 16. A. HIRTUM.

** Segmenta mediocria, 8—12 lin. longa.

1. Lamina 12—18 poll. longa, bipinnata.
 17. A. LANCEA.
2. Lamina 2—3 pedes longa, 3- v. 4-pinnata.
 18. A. PECTINATUM.

III. Lamina quoad divisiones primarias pedata.

1. Segmenta aequilateralia 19. A. TETRAGONUM.
2. Segmenta perfecte vel paene dimidiata.
 20. A. CURVATUM.

B. *Adianta Minervae* Mart. Crypt. Bras. 97. (*Synechia* Fée, Gen. Fil. 113). Sori lineares, continui vel parum interrupti.

I. Segmenta in utroque latere abunde fertilia (Venae interdum paulo anastomosantes).

- a. Raches pubescentes. Segmenta lanceolata.
 1. Segmenta 6—12-juga, 8—12 lin. lata.
 21. A. LUCIDUM.
 2. Segmenta 3—4-juga, 12—18 lin. lata.
 22. A. PHYLITIDIS.
- b. Raches castaneae, nudaе. Segmenta late ovata, magna.
 1. Pinnae 3—4-jugae, alternae, longe petiolatae, basi inferiore cordata 23. A. SEEMANNI.
 2. Pinnae 4—8-jugae, oppositae, sessiles, basi inferiore rotundata 24. A. MACROPHYLLUM.

II. Segmenta rhomboidea, in marginibus inferioribus sterilia.

1. Sori plerumque solum in parte inferiore marginis superioris segmentorum obvii 25. A. PULVERULENTUM.
2. Sori in toto margine superiore et exteriori segmentorum obvii 26. A. VILLOSUM.

§ 2. HEWARDIA J. Smith l. c. Venae anastomosantes. — *Tabula nostra XLII. Fig. III.*

I. Lamina simpliciter pinnata vel deorsum subbipinnata.

1. Frons chartaceo-coriacea, venis parce anastomosantibus 27. A. DOLOSUM.
2. Frons membranacea, venis copiose anastomosantibus 28. A. HEWARDIA.

II. Lamina ternato-pedata, divisionibus pinnatis.

1. Pinnulae lanceolatae, 4-plo longiores quam latae.
 29. A. OLIVACEUM.
2. Pinnulae ovato-rhomboidae, vix duplo longiores quam latae 30. A. LEPRIEURII.

§ 1. EUADIANTUM.

1. ADIANTUM LUNULATUM BURM. frondibus ligulatis simpliciter pinnatis saepe deflexis sursum elongatis apice radican- tibus, rachibus nudis, pinnis longe petiolatis, margine interiore recto integro introrsum obliquo, postico recto obliquo integro, exteriori arcuato plus minus versus basin dissecto, venulis confertis liberis flabellatis; soris solummodo secundum marginem exteriorem pinnarum obviis, rotundatis vel obverse reniformibus subaequalibus.

Tabula nostra XXII. Fig. 10. 11. (frons.) et LV. Fig. I.

Adiantum lunulatum Burm. Fl. Ind. 235. Swartz, Syn. Fil. 121. Willd. Sp. Plant. V. 430. Willd. Phyt. XIV. t. 9. Fig. 1. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 104. Hook. Sp. Fil. II. p. 11. et Auctt.

Adiantum philippense Linn. Sp. Plant. 1556. quoad figuram Petiveri (Gazoph. 8. t. 4. fig. 4), descriptione tamen Linnaeana erronea.

Pteris lunata Retz. Obs. II. 28. fig. 4.

Adiantum lunatum Cav. Praelect. 1801. No. 676.

Adiantum arcuatum Swartz; Syn. Fil. 122. Ettingsh. Farnker. d. Jetztwelt tab. 45. fig. 9—12. t. 46. fig. 3.

Adiantum dolabriforme Hook. Ic. Plant. II. t. 191. Sp. Fil. II. 12. Ettingsh. l. c. tab. 40. fig. 16—18.

Adiantum deflectens Mart. Ic. Crypt. Bras. t. 12. Hook. Sp. Fil. II. 12.

Adiantum dissimile Schrad. Mss.

Adiantum Ripidium Kunze Mss.

Adiantum persimile Presl, Ettingsh. tab. 46. fig. 4—5.

CAUDEX herbaceus, suberectus, sursum paleis parvis linearibus ebenis patentibus sparse vestitus. STIPITES fasciculati, pergraciles, fragiles, castaneo-ebenei, nudi, 3—6 poll. longi. LAMINA pellucido-papyracea, viridis, prorsus nuda, ligulata, 6—15 poll. longa, 1—1½ poll. lata, suberecta cum pinna terminali, vel arcuato-deflexa rache elongata radicante. PINNAE 6—10-jugae, alternae, 9—12 lin. aequantes, margine interiore recto integro introrsum obliquo, inferiore recto deflexo integro obliquo, exteriori rotundato versus basin plus minus flabellato-dissecto. PETIOLI pinnarum pergraciles, subpatentes, fragiles, 3—4 lin. longi, in eodem latere 6—9 lin. distantes, apice articulati. Crenae pinnarum parum ultra lineam sororum vel ad tertiam vel dimidiam latitudinis pinnarum ingredientes. VENAE graciles, confertae, immersae, omnino flabellatae. Sori secundum marginem exteriorem pinnarum obvii, 6—10, rotundati vel obverse reniformes, subaequales.

Var. β. DELICATULUM Baker.

Adiantum delicatulum Mart. Icon. Crypt. Bras. 93. t. 56. fig. 2. Hook. Sp. Fil. II. 16.

Adiantum tremulum Kunze Mss.

Adiantum lunulatum var. *tremulum* Hook. et Baker Syn. Fil. 114.

Adiantum filiforme Gardner in Hook. Ic. Plant. VI. t. 503. Hook. Sp. Fil. II. 15.

Adiantum flagellum Fée, Gen. Fil. 117.

Lamina minor (2—3 poll. longa, 6—8 lin. lata), suberecta, tenerior; pinnulae 3—4 lin. latae, magis cuneato-flabellatae, subintegrae.

Filix in regionibus calidioribus totius orbis occurrens. Intra Brasiliam lecta est forma normalis in prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Langsdorff!, Burchell n. 879!, Gardner!, Bowie et Cunningham! atque; in prov. Minas, e. gr. ad Salgado in montibus calcareis: Martius!, Claussen; prov. Goyaz ad Porto Imperial, in Serra da Natividade, ad Caretão etc.: Pohl!, Burchell 6462! 6372! 8436! 8383—9!, Gardner 3353!; in prov. Piauh, Serra de Araripe: Gardner 2019! 2392!; Maranhão ad fl. Itapicuru: Martius!; in praeruptis ripae flum. Tapajoz, prov. Para: Martius! — Var. β. locis calidis umbris sylvarum Yapurensium supra saza: Martius!; in vicinia Santarem prov. Para: Spruce n. 879!; in cavernis umbris montium prope Oeiras, prov. Piauh: Gardner 2391!; prope S. Luzia et Ouro fino, prov. Goyaz: Pohl!; in silvis ad Rio de Janeiro: Bunbury!. Etiam in Guyana gallica: Leprieur!, Sagot 1366! — Vaga et Extrabraziliensis.

2. ADIANTUM CAUDATUM LINN. frondibus ligulatis simpliciter pinnatis saepe deflexis apice radican- tibus, rachibus plus minus pubescentibus, pinnis sessilibus vel subsessilibus, margine postico recto integro horizontali vel deflexo, interiore recto integro extrorsum parum obliquo, exteriori arcuato subintegro vel versus basin plus minus dissecto, venulis confertis liberis flabellatis; soris secundum marginem exteriorem pinnarum solum obviis, rotundatis obverse reniformibus vel oblongis.

Adiantum caudatum Linn. Mant. 308. Swartz, Syn. Fil. 122. Willd. Sp. Plant. V. 433. Schkuhr, Fil. t. 117. Hook. Exot. Fil. t. 104. Hook. Sp. Fil. II. 14. Beddome, Fil. South-Ind. t. 2. et Auctt.

Adiantum rhizophorum Swartz, Syn. Fil. 320 et 433. Willd. Sp. Plant. V. 433. Hook. Sp. Fil. II. 12. t. 80 A.

Adiantum soboliferum, vestitum et flagelliferum Wallich.

Adiantum hirsutum Bory, Itin. I. 198.

Adiantum Capillus-Gorgonis Webb, Fl. Nigril. 192.

Adiantum ciliatum Blume, Enum. Fil. Jav. 215.

Var. β . RHIZOPHYTUM Baker.

Adiantum rhizophyllum Schrad. in *Gött. Gel. Anz.* 1824. p. 272. *Mart. Crypt. Bras.* 92. tab. 62. *Hook. Sp. Fil.* II. 16.

CAUDEX suberectus, sursum PALEIS paucis parvis ebeneis sparse vestitus. STIPITES fasciculati, pergraciles, fragiles, castaneo-ebenei, 1—2 poll. longi, pilis brevibus patentibus parumper villosi. LAMINA pelliculo-papyracea, viridis, subnuda, ligulata, 6—12 poll. longa, deorsum 9—12 lin. lata, simpliciter pinnata, saepe arcuato-deflexa, apice elongato radicante. PINNAE 12—20-jugae, alternae, sessiles, 6—7 lin. in transversum metientes, 3—4 lin. latae, eae ejusdem lateris basi 4—5 lin. distantes, margine interiore recto integro, extrorsum parum obliquo, posteriore integro, in pinnis superioribus horizontaliter porrecto, in pinnis inferioribus obliquo valde deflexo, exteriori arcuato parum inciso-crenato, lobulis in plantâ sterili denticulatis. PINNAE superiores laxiores et sensim decrescentes. VENAE graciles, confertae, immersae, omnino flabellatae. SORI secundum marginem exteriorem pinnarum obvii, lineari-oblongi.

A planta typica differt faciebus utrisque et rachibus subnudis, pinnis extrorsum aegre dissectis, soris propterea longioribus et parum interruptis. Ad var. *Edgeworthii* (*A. Edgeworthii* Hook. Sp. Fil. II. 14. tab. 81 B.) valde accedit quoad vestitum laminae et marginem exteriorem pinnarum, sed differt ista pinnis inferioribus breviter petiolatis, soris rotundatis numerosioribus.

Var. γ . CALCAREUM Baker.

Adiantum calcareum Gardn. in *Hook. Ic. t.* 467. *Hook. Sp. Fil.* II. 15. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 115.

Minor, tenerior, gracilior; raches et facies aegre villosae, pinnae in margine exteriori flabellato-dissectae, segmentis furcatis, principalibus ultra dimidium latitudinis pinnarum ingredientibus; sori subrotundati, 4—5 pro pinna.

Habitat forma typica per regiones calidiores veteris orbis late dispersa. Var. β . et γ . in Brasilia observatae sunt; var. β . in sylvis inter Almada et Ferrados prov. Bahiensis; Max. Princeps Neovidensis!; var. γ . in fissuris rupium calcarearum prope Natividade prov. Goyaz: Gardner n. 3551!

3. ADIANTUM PLATYPHYLLUM SWARTZ: frondibus lanceolatis simpliciter pinnatis vel raro inferne paulo furcatis, rachibus ferrugineo-villosis, pinnis inaequaliter ovato-lanceolatis, basi superiore producta vel subrecta, inferiore oblique truncata, in apicem acutum sensim angustatis, inferioribus distincte petiolatis, superioribus sessilibus, venulis liberis confertis e venâ mediana irregulari flabellatis; soris secundum margines superiores et inferiores pinnarum dispositis, numerosis, lineari-oblongis vel sursum rotundatis.

Tabula nostra XXII. Fig. 28. (pinna).

Adiantum platyphyllum Swartz, *Holm. Vet. Acad. Handl.* 1817. p. 74. tab. 3. fig. 6. *Kunze, Anal. Pier.* 31. tab. 20. *Hook. Sp. Fil.* II. 3. *Ettingsh. l. c. tab. 42. fig. 13. 14. 16.*

Adiantum denticulatum Swartz, *Syn. Fil.* 123. (quoad plantam Plumierii tab. 52., et specimen originale e Jamaica missum in *Herb. Mus. Brit. asservatum.*)

Var. α . KAULFUSSII Baker.

Adiantum Kaulfussii Kunze, *Linnaea* XXI. 221. *Hook. Sp. Fil.* II. 7. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 115.

CAUDEX firmus, crassitie pennae corvinae, longe vel breviter repens, flexuosus, PALEIS parvis castaneis lineari-subulatis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, 4—9 poll. longi, erecti, stricti, ebenei, nitidi, nudi vel sursum parum pubescentes. LAMINA lanceolata, pinnata, 6—12 poll. longa, deorsum 3—4 poll. lata, vel raro deorsum paulo composita, ramis 1—3 brevibus patentibus, chartaceo-papyracea, omnino nuda, supra

pallide vel obscure viridis, infra valde glaucescens. PINNAE formae simpliciter pinnatae 6—10-jugae alternae, inferiores maximae, inaequaliter lanceolatae vel ovato-lanceolatae, 1½—2½ poll. longae, 8—12 lin. latae, basi superiore subrecta vel cordata, interdum supra rachem imbricata, inferiore arcuato-vel cuneato-truncata, e basi ad apicem acutum sensim angustatae, marginibus sterilius inciso-denticulatis. Pinnae inferiores petiolis 1½—2 lin. longis in eodem latere 1—1½ poll. distantibus instructae, superiores sessiles sensim decrescentes. VENULAE confertae, immersae, flabellatae, deorsum e venâ mediana irregulari proficiscentes. SORI secundum margines superiores et inferiores pinnarum impositi, basi solum exceptâ, inferne lineari-oblongi, sursum subrotundi, 12—20 pro pinna.

Var. β . OBLIQUUM Baker.

Adiantum obliquum Willd. *Sp. Plant.* V. 429. *Klotzsch, Linnaea* XVIII. 550. *Hook. Sp. Fil.* II. 8. t. 79. *Karst. Fl. Columb.* 185. t. 92. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 115. *Ettingsh. l. c. tab. 42. fig. 11.*

Adiantum macropus et oblongatum Schrad. *Mss.*

Lamina crassior, infra nullo modo glaucescens.

Var. γ . AUBLETHI Baker.

Lamina subtus glaucescens, plerumque inferne ramis 1—2 patentibus instructa; pinnae 10—14-jugae; pinnulae majores 10—15 lin. longae, 6—7 lin. latae, subdimidiato-oblongae, margine interiore recto integro, cum rache prorsus contiguo, exteriori omnino rotundato; sori pro pinna 8—12.

Varietas insignis ad *Adiant. fructuosum* accedens.

Habitat late diffusa per Americam australem tropicam. Forma typica in prov. Minarun ad Ouro Preto: Freyreiss; in prov. Goyaz: Burchell n. 8897! 8963!; in prov. Para, e. gr. ad Para urbem: Burchell 10051!, ad cataractas fluv. Aripecuru: Spruce 548!, ad ripas fl. Amazonum: Poeppig! Item in Guyana batava: Wulfschlaegel!, Kegel 102, in gallica: Leprieur!, et in anglica: Rob. Schomburgk 379!, Appun 1683! — Var. β . in prov. S. Pauli et Goyaz: Burchell 3174! 8964!, in Sebastianopolitana: Bunbury; et in Bahiensi: Princeps Neovidensis!, Lockhart! — Var. γ . in Guyana gallica: Aublet et Martin! (fide specim. in Mus. Brit.), et in Surinamo: Wulfschlaegel! — Vaga et Extrabrasiliensis.

4. ADIANTUM INTERMEDIUM SWARTZ: frondibus deltoideis bipinnatis, rachibus ferrugineo-villosis, pinnis ligulato-lanceolatis 1—3-jugis horizontaliter patentibus petiolatis deorsum reductis, pinnulis lanceolato-rhomboides sessilibus vel subsessilibus, margine interiore recto integro cum rache parallelo, superiore subrecto, inferiore introrsum horizontaliter subrecto extrorsum obliquo, apice acuto vel subobtusato, venulis liberis confertis e venâ mediana irregulari flabellatis; soris secundum marginem superiorem et partem extrorsam marginis inferioris obvii, numerosis, lineari-oblongis vel sursum rotundatis.

Tabula nostra XXIII. Fig. 14. (pinna).

Adiantum intermedium Swartz, *Stockholm. Vet. Acad. Handl.* 1817. p. 76. *Presl, Tent.* 157. *Kunze, Linnaea* XXI. 221. *Hook. Sp. Fil.* II. 25. *Ettingsh. l. c. t. 45. fig. 7. 8., tab. 47. fig. 16., t. 84. fig. 34.*

Adiantum fovearum Raddi, *Syn. Fil.* 131. *Fil. Bras.* 58. t. 77. *Link, Fil. Hort. Berol.* 68.

Adiantum brasiliense Link, *Hort. Berol.* II. 13. non Raddi. *Adiantum triangulatum* Kaulf. *Enum. Fil.* 204. *Hook. Sp. Fil.* II. 26.

Adiantum argutum, *Splittg. Enum. Fil. Sur.* 39.

Adiantum macrodon Kaulf. *Mss. Kunze, Linnaea* XXI. 221. *Adiantum Haenkeanum* Presl, *Rel. Haenk. I.* 62. *Ettingsh. l. c. t. 45. fig. 6.*

CAUDEX firmus, crassitie pennae corvinae, longe vel breviter repens, flexuosus, PALEIS parvis castaneis lineari-subulatis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, 6—12 poll. longi, stricti, erecti, ebenei, nudi vel sursum parum pubescentes. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque omnino nuda, supra obscure viridis, infra pallidior vel parum glaucescens, deltoidea, bipinnata, 9—15 poll. longa et lata. PINNA terminalis lanceolato-ligulata, 4—8 poll. longa, 2—2½ poll. lata. PINNAE laterales 1—3-jugae, horizontaliter patentes, rectae vel parum flexuosae, terminali similes, omnes breviter petiolatae. RACHIS primaria parum flexuosa, ebenea, antice canaliculata, pilis validis ferrugineis patentibus villosa. PINNULAE 8—15-jugae, horizontaliter patentes, contiguae, lanceolato-rhomboidae, centrales maximae, 9—15 lin. longae, 4—6 lin. latae, sessiles vel inferiores breviter petiolatae, apice acuto vel subobtusos, margine interiore recto cum rache parallelo, superiore subrecto, inferiore introrsum subrecto truncato, extrorsum obliquo, inferiores reductae et plus minus deflexae. VENAE graciles, confertae, immersae, deorsum e venâ irregulari mediana egredientes. SORI secundum pinnularum margines superiores et partem extrorsam inferiorem dispositi, rotundati vel lineari-oblongi, 10—16 pro pinnula.

E frequentissimis Adiantorum nostrorum species habitat prope Para, ad cataractas fluv. Aripicuru, ad Obidos et fluv. Trombedas prov. Para, et in sylvis secundum fluv. Yapurá: Spruce 48!, 1578!, Graham!, Martius!; in prov. Goyaz: Burchell 9130!, Pohl!; in prov. Piauhy et in sylvis apertis prope Pernambuco: Gardner 2578! 1228!; in prov. Bahia: Princeps Max. Neovidensis, Blanchet 2428!, Wawra et Maly 369; in prov. Sebastianopolitana, Corcovado etc.: Pohl, Sello!, Raddi!, Burchell!, Milne!, Mac Gillivray! etc. et in prov. S. Catharina: Fritz Müller! — Etiam in Guyana anglica (Rob. et Rich. Schomburgk!, Appun!), in batava (Kegel 75. 128. 674., Spitzgerber, Hostmann 710!, Focke 190, Weigelt etc.) et per occidentalem continentis partem e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Vaga et Extrabrazil.

5. ADIANTUM SUBCORDATUM SWARTZ: frondibus deltoideis 3—4-pinnatis, rachibus nitidis nudis ebeneis, pinnis longe petiolatis, inferioribus deltoideis, superioribus simpliciter pinnatis, pinnulis ligulato-lanceolatis, segmentis longe petiolatis ovatis acutis laxis, marginibus parum inciso-crenatis, basi aequaliter cuneata vel rotundata vel in latere superiore parum producta, venis liberis e basi segmentorum flabellatis; soris numerosis rotundatis, secundum margines oppositos totos segmentorum dispositis.

Tabula nostra XXII. Fig. 12—14. (segmenta).

Adiantum subcordatum Swartz, *Stockh. Vet. Acad. Handl.* 1817. p. 75. *Spreng. Syst. Veg.* IV. 114. *Presl, Tent.* 118. *Hook. Sp. Fil.* II. 34. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 116. *Ettingsh. l. c. tab. 41. fig. 14. 15. 24—7.*

Adiantum truncatum Raddi, *Syn. Fil.* 133. *Fil. Bras.* 59. t. 78. *Fig. 1. Desv. Prodr.* 310. *Bracken, Fil. U. St. Americ. Explor. Exped.* 110.

Adiantum betulinum Kaulf. *Enum. Fil.* 207.

Adiantum Klotzschianum Presl, *Tent.* 158. *Ettingsh. l. c. tab. 41. fig. 7. 16., non Hook. (Sp. Fil. II. 21).*

Adiantum dilatatum Schrad. *Mss., non Nuttall.*

Adiantum conicum Vell. *Fl. Flum. XI. t. 97.*

CAUDEX firmus, flexuosus, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis lineari-subulatis vestitus. STIPITES segregati, 10—15 poll. longi, erecti, stricti, nitidi, nudi, ebenei. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque viridis, omnino nuda, deltoidea, 1—2 pedes longa et lata, tripinnata vel raro quadripinnata. PINNAE inferiores maximae, formarum compositarum deltoideae, tripinnatarum lanceolatae, plus minus ramosae praecipue e latere inferiore, superiores cito decrescentes, omnes subpatentes insigniter petiolatae. PINNULAE vel pinnae simplices superiores ligulato-lanceolatae, longe petiolatae, 4—6 poll. longae, 2—3 poll. latae. SEGMENTA 4—6-juga, laxa, alterna, aequaliter vel inaequaliter ovata, 12—18 lin. longa, 6—12 lin. lata, petiolo submediano, apice acuto, marginibus oppositis fer-

Polypod.

tibus subintegris vel parum inciso-crenatis, basi aequaliter rotundata vel subcuneata vel antice parum producta. RACHES omnium graduum strictae, graciles, ebeneae, politae; petioli segmentorum 3—4 lin. longi, stricti, pergraciles, erecto-patentes vel subpatentes, apice articulati. VENAE graciles, immersae, contiguae, liberae, e basi segmentorum flabellato-dichotomae. SORI praeter basin secundum margines omnes segmentorum obvii, rotundati, subaequales, 16—24 pro segmento.

Habitat in prov. S. Catharinae: Langsdorff!; in prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos, ad Rio Doce, in prov. Minarum et Bahiae: Gardner 197! 5299!, Princ. Max. Neovidensis!, Pohl!, Schott!, Sello!, Bunbury!, Bowie et Cunningham! Etiam in Guyana anglica: Appun! — Vaga et Extrabrazilensis.

6. ADIANTUM DIGITATUM PRESL: frondibus ovato-deltoidis tri- vel quadripinnatis laxis elongatis saepe scandentibus, rachibus nudis castaneis, pinnis lanceolatis vel deltoideis patentibus, pinnulis lanceolatis, segmentis laxis petiolatis rectangulariter patentibus mediocribus, margine exteriori rotundatis, versus basin profunde flabellato-dissectis, venis liberis flabellato-dichotomis; soris rotundatis vel oblongis, secundum totum segmentorum marginem basi excepta obviis.

Adiantum digitatum Presl, *Tent.* 159. *Hook. Sp. Fil.* II. 38. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 125.

Adiantum speciosum Hook. *Sp. Fil.* II. 45. t. 85 C.

CAUDEX flexuosus, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis lineari-subulatis vestitus. STIPITES segregati, debiles, 1½—2 pedes longi, castanei, nitidi, omnino nudi. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque viridis, irregulariter ovato-deltoidae, 3—4 pedes longa, 1—2 pedes lata, RACHIS castaneis nudis nitidis, saepe inter ramos vicinos scandentibus. PINNAE patentes, inferiores maximae, 6—12 poll. longae, lanceolato-deltoidae, praecipue e latere inferiore ramosae, petiolis in eodem latere 4—8 poll. distantibus. PINNULAE vel pinnae simplices lanceolatae, petiolatae. SEGMENTA laxa, petiolis distinctis, mediis rectangulariter patentibus, 8—24 lin. lata, basi integra subrecta vel utrinque parum cuneata vel deflexa, margine exteriori aequaliter rotundata, versus basin irregulariter flabellato-dissecta, divisionibus primariis ultra medium ingredientibus. VENAE numerosae, confertae, liberae, e basi omnino flabellato-dichotomae. SORI numerosi, subaequales, rotundati vel oblongi, secundum margines exteriores segmentorum dispositi.

Habitat in Brasilia, loco accuratius non indicato: Sello. Item Peruviam et Columbian incolit.

7. ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS LINN. frondibus deltoideis vel rhomboideis bi- vel tripinnatis, rachibus nitidis nudis castaneo-ebeneis, pinnis petiolatis erecto-patentibus, inferioribus deltoideis, pinnulis lanceolato-ligulatis, segmentis mediocribus vel parvis distincte petiolatis cuneato-rotundatis, lateribus aequalibus vel anticis parum productis, in margine exteriori versus basin plus minus flabellato-dissectis, venis liberis omnino flabellatis; soris numerosis rotundatis aequalibus, in sinibus marginis exterioris segmentorum obviis.

Adiantum Capillus-Veneris Linn. *Sp. Plant.* 1558. *Swartz, Syn. Fil.* 124. *Jacq. Misc.* II. 77. t. 7. *Willd. Sp. Pl.* V. 449. *Smith, Engl. Bot.* t. 1564. et *Auctt.*

Adiantum Moritzianum Link. *Fil. Sp.* 71. *Fée, Gen. Fil.* 114. *Kunze, Linnaea* XXIII. 216.

CAUDEX flexuosus, longe vel breviter repens, PALEIS parvis ferrugineis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, 2—9 poll. longi, erecti, graciles, nudi, ebenei. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque pallide lucido-viridis, omnino nuda, deltoidea vel subrhomboidae, 6—12 poll. longa, 3—6 poll. lata, bi- vel tripinnata. PINNAE distincte petiolatae, inferiores maximae deltoideae erecto-patentes, superiores sensim decrescentes.

PINNULAE et pinnae simplices superiores lanceolato-ligulatae. RACHES graciles, castaneo-ebeneae, omnino nude. SEGMENTA 3—6-juga, sublaxa, petiolis gracilibus erecto-patentibus 1—2 lin. longis instructa, 3—9 lin. lata, rotundato-cuneata, basi integra, lateribus aequalibus vel anticis parum productis, margine exteriori subrotundato versus basin inciso-dissecto, divisionibus saepe ultra medium attingentibus. VENAE liberae, immersae, confertae, e basi segmentorum flabellato-dichotomae. SORI numerosi, rotundati, in sinibus distinctis marginis exterioris segmentorum obvi.

Species in regionibus calidioribus humidis cosmopolita, in ditione nostra tamen rarissima. Observata est in fissuris rupium prope Santarem prov. Para: Spruce 1024!, et in prov. Sebastianopolitana prope aquaeductum: Bunbury!

8. ADIANTUM CUNEATUM LANGSD. et FISCHER: frondibus rhomboideis tri- vel quadripinnatis, rachibus castaneis nitidis nudis, pinnis petiolatis erecto-patentibus, inferioribus deltoideis, pinnulis inferioribus deltoideis, superioribus ligulatis, segmentis parvis distincte petiolatis, dimidio inferiore cuneato integro, superiore rotundato versus basin dissecto, venis liberis omnino flabellatis; soris numerosis rotundatis aequalibus, in sinibus marginis exterioris segmentorum obviis.

Tabula nostra XXII. Fig. 16—19. (pinnulae) et XLII. Fig. II b. (analysis).

Adiantum cuneatum Langsd. et Fischer, Ic. Fil. 23. t. 26. Willd. Sp. Plant. V. 450. Raddi, Fil. Bras. t. 78. fig. 2. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 30. Hook. Sp. Fil. II. 39. Ettingsh. t. 43. fig. 1. 2. 15. tab. 44. fig. 2.

Adiantum Raddianum Presl, Tent. 158.

Adiantum tenerum Hort. plur., non Swartz.

CAUDEX breviter repens, PALIS parvis ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES subfasciculati, 6—9 poll. longi, erecti, graciles, castaneo-ebenei, nitidi, nudi. LAMINA pellucido-papyracea, utrinque dilute viridis prorsus nuda, rhomboidea vel deltoidea, tri- vel quadripinnata, 8—15 poll. longa, 6—10 poll. lata. PINNAE distincte petiolatae, erecto-patentes, inferiores maxime deltoideae, superiores sensim decrescentes. PINNULAE distincte petiolatae, inferiores deltoideae, superiores simpliciter pinnatae, ligulatae. SEGMENTA 3—6-juga, petiolis erecto-patentibus pergracilibus 1—1½ lin. longis instructa, cuneato-rotundata, 4—6 lin. diam. transverso aequantia, dimidio inferiore cuneato integro, superiore rotundato versus basin inciso-crenato, divisionibus saepe dimidium segmentorum attingentibus. VENAE liberae, e basi segmentorum flabellatae. SORI numerosi, rotundati, aequales, sinibus distinctis marginis exterioris segmentorum impositi.

Habitat in prov. S. Catharina: Chamisso, Fox!, Langsdorff!; in Rio Grande do Sul: Padre João da Santa Barbara; in prov. Rio de Janeiro sylvis frequentissimum, e. gr. in monte Corcovado, Serra dos Orgãos etc.: Luschnath!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 353!, Raddi!, Schott!, Pohl, Bunbury, Gardner 196!, Burchell 1182! 2161!, Glaziou 439! 2054. etc.; in prov. Minarum, ad Caldas, S. Miguel etc.: Lindberg!, Freyreiss, Stephan aliique. Etiam in Uruguay: Baird!, Gibert!, et in Bolivia: D'Orbigny. — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

9. ADIANTUM AETHIOPICUM LINN. frondibus deltoideis vel rhomboideis tri- vel quadripinnatis, rachibus castaneis nitidis nudis, pinnis petiolatis patentibus vel erecto-patentibus, inferioribus deltoideis, pinnulis simplicibus ligulatis, segmentis parvis distincte petiolatis extrorsum rotundatis parum inciso-crenatis, lateribus aequalibus, basi subhorizontaliter vel in triente inferiore late cuneata, venis liberis omnino flabellatis; soris numerosis rotundatis aequalibus, sinibus marginis exterioris segmentorum impositis.

Adiantum aethiopicum Linn. Sp. Plant. 1560. Swartz, Syn. Fil. 125. Willd. Sp. Plant. V. 452. Hook. Sp. Fil. II. 37. tab. 77 A. Beddome, Fil. South-Ind. t. 5. et Auct.

Adiantum assimile Swartz, Syn. Fil. 322. tab. 3. fig. 4. Willd. Sp. Plant. V. 453. R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 155. Ettingsh. l. c. t. 41. fig. 18. 22—3.

Adiantum emarginatum Bory in Willd. Sp. Plant. V. 449. Hook. Sp. Fil. II. 39. tab. 75 A.

Adiantum thaliotroides Willd. Mss. Schlecht. Adumbr. 53. t. 33. Ettingsh. tab. 39. fig. 11.

Adiantum trigonum Labill. Nov. Holl. II. 99. t. 248. fig. 2. Willd. Sp. Plant. V. 453.

Adiantum pellucidum Mart. et Gal. Fil. Mex. 272. t. 19. Adiantum gratum Fée, Gen. Fil. 119.

CAUDEX flexuosus, longe vel breviter repens, PALIS parvis ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, 3—9 poll. longi, suberecti, castanei, graciles, nudi, nitidi. LAMINA pellucido-papyracea, utrinque pallide viridis, omnino nuda, tri- vel quadripinnata, deltoidea vel rhomboidea, 6—12 poll. longa, 4—8 poll. lata. PINNAE distincte petiolatae, patentes vel parum adscendentes, inferiores maxime deltoideae, superiores sensim decrescentes. PINNULAE vel pinnae superiores simplices breviter petiolatae, ligulatae, 2—3 poll. longae, 7—9 lin. latae. SEGMENTA 3—6-juga, petiolis castaneis gracilibus subpatentibus 1—2 lin. longis, 4—6 lin. in diam. transversali, extrorsum rotundata, parum inciso-crenata, basi subhorizontaliter recta vel in triente inferiore late cuneata. Crenae haud ultra quartam segmentorum attingentes. VENAE liberae, e basi segmentorum omnino flabellatae. SORI numerosi, rotundati, sinibus distinctis marginis exterioris segmentorum impositi.

Var. β. POHLII Baker.

Rachis ebeneae; petioli breviores (½—¾ lin. longi); segmenta firmiora, conferta, imbricata, saepe 6 lin. lata; dimidio inferiore cuneato, saepe inaequaliter cuneato-flabellata, latere externo producto.

Species cosmopolita, ut A. Capillus-Veneris in regionibus calidioribus humidis totius orbis divulgata, in Brasilia tamen rarissima. Observata est in Rio Grande do Sul: Padre João da Santa Barbara!, Setto!; et in Monteideo. — Var. β. ad Agua da Serra prov. Rio de Janeiro: Pohl!

10. ADIANTUM TRAPEZIFORME LINN. frondibus deltoideis bi- vel quadripinnatis, rachibus nitidis nudis ebeneis, ramificatione primaria interdum subpedata, pinnis longe petiolatis, inferioribus maximis deltoideis, superioribus cito decrescentibus, pinnulis ligulato-lanceolatis, segmentis magnis vel mediocribus petiolatis rhomboideis, margine interiore integro introrsum oblique, posteriore integro recto vel parum decurvato, exteriori et superiore plus minus inciso-crenatis, venis liberis flabellatis; soris numerosis subrotundatis, secundum margines superiores et exteriores segmentorum dispositis.

Tabula nostra XXII. Fig. 24—26. (pinnula et segmenta).

Adiantum trapeziforme Linn. Sp. Plant. 1559. Aublet, Guian. 965. Swartz, Syn. Fil. 29. Willd. Sp. Plant. V. 447. Hook. Sp. Fil. II. 33. Ettingsh. l. c. t. 44. fig. 12—15.

Adiantum pentadactylon Langsd. et Fischer, Ic. Fil. 22. t. 25. (forma segmentis magnis inciso-crenatis, apice extrorso acuminato, margine posteriore decurvato). Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 98.

Adiantum rhomboideum Schkuhr, Crypt. 114. t. 122.

Adiantum formosissimum Klotzsch, Linnaea XVIII. 556.

Adiantum eminens Presl, Tent. Pter. 155.

CAUDEX firmus, flexuosus, repens, crassitie pennae corvinae, PALIS paucis ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES segregati, nitidi, nudi, ebenei, erecti, 12—18 poll. longi, antice complanati vel capaliculati. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque viridis, prorsus nuda, 1—2 pedes longa et lata, tri- vel quadripinnata, ramificatione primaria saepe parum

pedata. PINNAE inferiores maximae, deltoideae, praecipue e latere inferiore ramosae, superiores cito decrescentes, omnes subpatentes, petiolatae. PINNULAE vel pinnae superiores simplices lanceolato-ligulatae, 3—8 poll. longae, 2—4 poll. latae, petiolis 6—9 lin. longis. SEGMENTA subrhomboidea, margine interiore integro recto introrsum obliquo, inferiore integro recto vel parum decurvato, superiore et exteriori subrectis inciso-crenatis, crenis rotundatis saepe bifidis, quartam latitudinis segmentorum interdum attingentibus, sterilibus denticulatis, apice exteriori parum producto acuto vel subacuto. PETIOLI segmentorum inferiorum 3—6 lin. longi, graciles, eburnei, erecto-patentes, superiorum sensim breviores. VENAE immersae, graciles, confertae, e basi segmentorum vel dimidio inferiori marginis posterioris flabellatae. SORI secundum margines superiores et exteriores (nec inferiores) segmentorum dispositi, rotundati vel oblongi, 12—20 pro segmento.

Var. β . TRAPEZOIDES Baker.

Plumier, *Fil. tab.* 95.

Adiantum trapezoides Fée, *Gen. Fil.* 117. *Fil. Ant.* 22.

Adiantum cultratum J. Smith, *Moore in Gard. Chron.* 1855. p. 660. *Hook. Sp. Fil.* II. 34. *Lowe, Ferns* 3. t. 21. *Adiantum trapeziforme*, γ . *cultratum* Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 118.

Segmenta minora, 8—12 lin. longa, 4—6 lin. lata, subquadrangularia, sine acumine extrorso apicali.

Habitat forma normalis in prov. Rio de Janeiro, ad Porto d'Estrella, in valle Catumbi etc.: Langsdorff, Burchell 1817!, Glaziou 438! 1754., et in insula S. Catharina: Langsdorff, Chamisso, Hinds! Praeterea vagat e Peruvia usque ad Mexicum et Cubam, etiam in Guyana gallica ab Aubletio observata. — Var. β . in valle Catumbi prov. Rio et in insula S. Catharinae: Burchell 1824!, Fritz Müller!; etiam in Mexico. — Napaeo-Dryas et Extrabras.

11. ADIANTUM SINUOSUM GARDN. frondibus deltoideis bipinnatis, pinna terminali longa et deorsum pinnis lateralibus patentibus consimilibus vel brevioribus 1—2-jugis aucta, rachibus nudis eburneis, pinnulis distincte petiolatis mediocribus subaeque longis ac latis, margine interiore subrecto integro introrsum obliquo, inferiore integro decurvato, exteriori rotundato versus basin dissecto, venis liberis flabellatis; soris numerosis rotundatis aequalibus, sinibus distinctis marginis exterioris pinnularum impositis.

Tabula nostra XXII. Fig. 5. 6. (pinnula et apex pinnae).

Adiantum sinuosum Gardn. in *Hook. Ic. Plant.* t. 504. *Hook. Sp. Fil.* II. 35. *Fée, Gen. Fil.* 113. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 117.

Adiantum pensile Kunze Mss. *Fée, Gen. Fil.* p. 114. *Ettingsh. l. c. tab.* 40. *fig.* 6—9.

Adiantum horizontale Mart. Mss.

CAUDEX firmus, breviter repens, crassitie pennae corvinae, PALEIS lineari-subulatis parvis ferrugineis vestitus. STIPITES 6—9 poll. longi, erecti, subfasciculati, eburnei, nudi, nitidi. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque viridis, prorsus nuda, pinna longa terminali ligulata et deorsum pinnis lateralibus horizontaliter patentibus 1—2-jugis aucta. RACHES eburneae, nitidae, omnino nuda. PINNA terminalis ligulata, 6—9 poll. longa, 2—2½ poll. lata, distincte petiolata, pinnulis 4—9-jugis; laterales terminali consimiles vel breviores. PINNULAE laxae, petiolis strictis erecto-patentibus eburneis nudis 1—3 lin. longis instructae, 12—18 lin. in diam. transversali, margine interiore integro subrecto introrsum obliquo, saepe supra rachem imbricato, inferiore integro plus minus decurvato, exteriori rotundato versus basin dissecto, divisionibus bifidis vel trifidis, saepe ultra dimidium segmenti attingentibus. VENAE immersae, confertae, e basi pinnularum omnino flabellatae. SORI rotundati, aequales, sinibus distinctis marginis exterioris pinnularum impositi, 8—12 pro pinnula.

Habitat in prov. Goyaz, Serra da Natividade: Gardner 3552!, Burchell 6752! 7007—2!; in Serra Dourada et prope Jaraguá ejusdem prov.: Pohl!; in sylvis ad Mandioccam prov. Rio de Janeiro: Langsdorff! Item incolit Andes Ecuadorenses ditionis Guayaquil (Jamesson 534!). — Dryadi-Oreas et Extrabrasil.

12. ADIANTUM GLAUDESCENS KLOTZSCH: frondibus subdeltoideis bipinnatis subtus glaucescentibus, rachibus eburneis nitidis nudis, pinnis ligulatis breviter petiolatis horizontaliter patentibus, pinnulis rhomboideis sessilibus vel subsessilibus contiguis patentibus 9—18-jugis, margine interiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore recto integro horizontali vel parum adscendente, superiore subrecto cum exteriori parum inciso-crenato, venis liberis flabellatis; soris numerosis oblongis, secundum margines superiores et exteriores pinnularum dispositis.

Adiantum glaucescens Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 552. *Hook. Sp. Fil.* II. 26. *Kunze, Linnaea* XXI. 222. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 118.

Adiantum hypoleucum Kunze Mss.

CAUDEX firmus, vix repens, PALEIS parvis castaneis lineari-subulatis vestitus. STIPITES fasciculati, erecti, nitidi, nudi, 8—12 poll. longi. LAMINA chartaceo-papyracea, deltoidea, bipinnata, 9—12 poll. longa et lata, utrinque nuda, supra subviridis, subtus distincte glaucescens. RACHES strictae, eburneae, nitidae, nuda. PINNAE laterales 2—4-jugae, alternae, horizontaliter patentibus, breviter petiolatae, inferiores medianae consimiles, ligulatae, 4—6 poll. longae, 15—21 lin. latae, in eodem latere 1—2 poll. distantes; terminalis breviter petiolata. PINNULAE 9—18-jugae, contiguae, horizontaliter patentibus, superiores sessiles, inferiores breviter petiolatae, imae reductae, omnes subrhomboideae, mediae 8—9 lin. longae, 4—5 lin. latae, margine interiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore integro horizontaliter porrecto vel parum adscendente, superiore recto parum inciso-crenato, apice extrorso haud producto. VENAE graciles, immersae, confertae, e basi segmentorum et triente inferiore marginis inferioris flabellatae. SORI rotundati vel oblongi, subaequales, secundum margines superiores et exteriores ad apices dentium obvii, 8—12 pro pinnula.

Habitat in prov. Para, ad Rio Acara, Tanaü, Para etc.: Spruce n. 46!; prope Rio de Janeiro: Sello. Porro in Guyana britannica: Rich. Schomburgk 1156, Rob. Schomburgk!, Appun!; in Guyana batava: Kegel n. 1383, et in gallica: Aublet! (Herb. Mus. Brit). — Vaga et Extrabrasil.

13. ADIANTUM POLYPHYLLUM WILLD. frondibus maximis subdeltoideis tri- vel bipinnatis utrinque viridibus, rachibus eburneis nudis vel parum ferrugineo-pubescentibus, pinnis breviter petiolatis horizontaliter patentibus, inferioribus deltoideis compositis, superioribus ligulatis simpliciter pinnatis, segmentis rhomboideis sessilibus vel subsessilibus contiguis patentibus 20—30-jugis, margine interiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore recto integro horizontali vel parum adscendente, superiore subrecto cum exteriori paulo inciso-crenato, venis liberis flabellatis; soris numerosis rotundatis, secundum margines superiores et exteriores segmentorum dispositis.

Tabula nostra XXIII. Fig. 5. 6. (pinnulae).

Adiantum polyphyllum Willd. *Sp. Pl.* V. 454. *H.B.K. Nov. Gen.* I. 21. *Kunze, Linnaea* IX. 82. *Klotzsch, Linnaea* XVIII. 554. *Hook. Sp. Fil.* II. 35. *Gard. Ferns* t. 12. *Ettingsh. l. c. t.* 45. *fig.* 18.

Adiantum cardiochlaena Kunze, *Linnaea* XVII. 569. *Hook. Sp. Fil.* II. 50. t. 83 A.

Adiantum macrocladum Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 554. *Hook. Sp. Fil.* II. 49. t. 83 B.

Adiantum Matthewsianum Hook. *Sp. Fil.* II. 35. t. 84 A.

Adiantum urophyllum Hook. Sp. Fil. II. 24. t. 84 B. Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 553.

Adiantum tomentosum Kunze, *Linnaea* XXI. 224.

Adiantum Klotzschianum Hook. Sp. Fil. II. 21. t. 82 C.

Adiantum canonicum Kunze, Fil. Kappl. n. 1733 C.

Adiantum politum J. Smith, Lond. Journ. Bot. 1. 198.

Adiantum grande Fée, Gen. Fil. 116.

Adiantum myriophyllum Presl, Tent. 158. Ettingsh. t. 47. fig. 10.

CAUDEX firmus, breviter repens, PALEIS parvis lineari-subulatis vestitus. STIPITES subfasciculati, erecti, 12—18 poll. longi, eburnei, stricti, nudi. LAMINA chartaceo-papyracea, bi-vel tripinnata, subdeltoidea vel oblongo-deltaeidea, 2—3 pedes longa, $\frac{1}{2}$ —2 pedes lata, utrinque viridis, omnino nuda. RACHES eburneae, strictae, nuda vel interdum breviter ferrugineo-pubescentes. PINNAE 4—6-jugae, breviter petiolatae, horizontaliter patentes, inferiores deltoideae compositae, vel ligulatae simpliciter pinnatae. Pinnae simplices et PINNULAE ligulatae, maximae 9—13 poll. longae, $\frac{1}{2}$ —2 poll. latae. SEGMENTA 20—30-juga, contigua, horizontaliter patentia, superiora sessilia, inferiora breviter petiolata, ima reducta, omnia subrhomboidae, media 9—12 lin. longa, 4—5 lin. lata, margine inferiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore integro horizontaliter porrecto vel paulum ascendente, superiore recto subintegro vel paulum inciso-crenato, apice extrorso nullo modo producto. VENAE graciles, immersae, e basi segmentorum et triente inferiore marginis posterioris flabellatae. SORI rotundati, contigui, aequales, secundum margines exteriores et superiores segmentorum dispositi, 12—20 pro segmento.

Habitat Filix speciosa circa Rio de Janeiro: Glaziou 437!; ad Ilheos Bahiae: Martius!; in prov. Para juata fluv. Acara: Spruce 51! — Porro in Guyana britannica: Rob. Schomburgk 349!, Rich. Schomburgk 1202!, in batava: Kegel 1074, Kappler 1733 C., et in gallica: Sagot 1140! Etiam in Peruvia et Columbia. — Vaga et Extrabrsil.

14. ADIANTUM CRISTATUM LINN. frondibus rigide coriaceis oblongo-deltaeideis bipinnatis vel raro tripinnatis, rachibus breviter ferrugineo-hispidis, pinnis 2—6-jugis ligulatis breviter petiolatis subpatentibus, pinnulis parvis rigidis subsessilibus rhomboideis duplo longioribus quam latis, marginibus omnibus subrectis, exterioribus sterilibus dentatis, fertilibus crenatis, venis liberis flabellatis; soris lineari-oblongis, crenis marginum exteriorum pinnularum impositis, 5—6 pro pinnula.

Adiantum cristatum Linn. Sp. Plant. 1558. Swartz, Syn. Fil. 123. Willd. Sp. Plant. V. 443. Hook. Sp. Fil. II. 46. Ettingsh. Farnkr. t. 43. fig. 6. 12.

Adiantum striatum Swartz, Syn. Fil. 124. Jacq. Ic. Rar. t. 646. Willd. Sp. Fil. 441. Ettingsh. l. c. t. 48. fig. 1.

Adiantum melanoleucum Willd. Sp. Fil. V. 443. Spreng. Syst. 112.

Adiantum Kunzeanum Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 555. Hook. Sp. Fil. II. 47.

Adiantum laetum Presl, Tent. Pter. 158.

Plumier Fil. t. 96.

CAUDEX lignosus, repens, PALEIS parvis ferrugineis fibrillosis vestitus. STIPITES segregati, 12—18 poll. longi, firmi, stricti, castaneo-eburnei, sursum breviter ferruginei. LAMINA rigide coriacea, utrinque concolor, subnuda, obscure viridis, oblongo-deltaeidea, bipinnata vel raro deorsum tripinnata, 8—15 poll. longa, 6—12 poll. lata. RACHES strictae, castaneo-eburneae, pilis hispidis ferrugineis brevibus vestitae. PINNAE ligulatae, 2—6-jugae, laxae, patentes vel erecto-patentes, breviter petiolatae, 4—8 poll. longae, 12—18 lin. latae. PINNULAE contiguae, 12—20-jugae, horizontaliter patentes, subrhomboidae, 6—9 lin. longae, 2—3 $\frac{1}{2}$ lin. latae, margine inferiore integro recto cum rache prorsus contiguo, inferiore integro recto vel parum decurvato, superiore et exteriori subrectis, in pinnula sterili inciso-dentatis. VENAE immersae, inconspicuae, e dimidio in-

teriore lateris inferioris pinnularum flabellatae. SORI secundum margines superiores et exteriores pinnularum in crenis distinctis obvil, lineari-oblongi, 5—6 pro pinnula.

Habitat in prov. Bahia: Princeps Maximil. Neovindensis! — Item in Venezuela et insulis Antillanis.

15. ADIANTUM SERRATO-DENTATUM WILLD. frondibus oblongo-deltaeideis bipinnatis, rachibus ferrugineo-hispidis, pinnis 2—10-jugis laxis ligulatis breviter petiolatis erecto-patentibus, pinnulis rigidis parvis rhomboideis subsessilibus duplo longioribus quam latis, margine inferiore integro recto cum rache prorsus contiguo, inferiore et superiore rectis subhorizontalibus, exteriori plerumque obtuso rotundato, venis liberis flabellatis; soris numerosis oblongis, secundum margines superiores et exteriores pinnularum dispositis.

Tabula nostra XXIII. Fig. 8. (pinna).

Adiantum serrato-dentatum Willd. Sp. Plant. V. 445.

Adiantum rhomboideum H.B.K. Nov. Gen. I. 16. Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 551. Hook. Sp. Fil. II. 23.

Adiantum Bonplandi Desv. Prodr. 309.

Adiantum obtusum Desv. in Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 309. Spreng. Syst. Veg. IV. 113. Presl, Tent. Pter. 118. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 188. Hook. Sp. Fil. II. 18. Ettingsh. l. c. p. 82. fig. 30. 31., tab. 45. fig. 13., tab. 46. fig. 2. 15.

Adiantum cassioides Desv. in Ann. Linn. Soc. Paris. l. c. *Adiantum Kunzei* Miquel, Diar. Inst. Reg. Batav. 1843. p. 5. t. 1.

Adiantum proximatum Gaud. in Freyc. Voy. 403. Hook. Sp. Fil. II. 27.

CAUDEX longe repens, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis lineari-subulatis castaneis vestitus. STIPITES segregati, 6—18 poll. longi, erecti, stricti, eburnei, nudi, vel sursum paulo ferrugineo-hispidi. LAMINA rigide papyraceo-coriacea, supra obscure viridis, infra pallidior vel subglauca, utrinque nuda, oblongo-deltaeidea, bipinnata, 6—15 poll. longa, 6—10 poll. lata. RACHES strictae, castaneae, pilis hispidis ferrugineis brevibus dense vestitae. PINNAE ligulatae, 2—10-jugae, breviter petiolatae, erecto-patentes, laxae, in eodem latere 1— $\frac{1}{2}$ poll. distantes vel raro subcontiguae, 4—6 poll. longae, 8—12 lin. latae. PINNULAE 12—20-jugae, contiguae vel sublaxae, horizontaliter patentes, subsessiles, imae reductae, mediae rhomboidae, 4—6 lin. longae, 2—3 lin. latae, margine inferiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore integro subhorizontaliter porrecto vel parum ascendente, superiore subrecto, in pinnula sterili denticulato, exteriori obtuse rotundato. VENAE graciles, immersae, inconspicuae, flabellatae. SORI secundum margines superiores et exteriores pinnularum dispositi, rotundati vel oblongi, contigui, 6—9 pro pinnula.

Var. β . FULIGINOSUM Baker.

Adiantum fuliginosum Fée, Gen. Fil. 116.

Adiantum fructuosum Kunze in Schkuhr Suppl. tab. 15 A. (non B. quod ad Ad. Lanceam spectat).

Pinnulae paulo longiores, apice producto subacuto, margine inferiore ascendente curvato.

Species per totam fere Americam tropicam et Africam tropicam occidentalem late disseminata, cum Ad. Lancea, hirta et cristato formis intermediis arcte juncta. Forma normalis intra Brasiliae fines lecta est in prov. Rio de Janeiro, Corcovado, Serra dos Orgãos etc.: Pohl, Sello!, Glaziou 943! 1653.1756., Burchell 947! 1617! 2603!, Bumbury, Gardner n. 71!, Wavra et Maly 517 etc.; Bahia ad Ilheos: Martius, Luschnath; prov. Goyaz, in Serra da Natividade, Rio dos Indios etc.: Pohl!, Gardner 3550!; prov. Para in vicinia Santarem: Graham!, Spruce 746!; ad Manaus prov. do Alto Amazonas: Spruce 1323! In Guyana anglica praeterea, batava et gallica eam legerunt: Rich. Schomburgk 266, Parker!, Appun 1322! 1436!, Menzel!, Wullschlaegel!, Kappler, Sagot 1365!, Poiteau! — Var. β . in Guyana gallica (Leprieur 256!) et anglica (Appun 1322! ex parte) observata est. — Vaga et Extrabrsil.

16. ADIANTUM HIRTUM KLOTZSCH: frondibus rotundato-deltaideis bipinnatis subtus paulum hispidis, rachibus ferrugineo-hispidis, pinnis 2—5-jugis contiguis ligulatis breviter petiolatis, pinnulis parvis rhomboideis sessilibus triplo longioribus quam latis, margine interiore recto cum rache prorsus contiguo, inferiore et superiore rectis subhorizontalibus, exteriori obtuse rotundato, venis liberis flabellatis; soris numerosis rotundatis, secundum margines superiorem et exterioriorem pinnularum dispositis.

Adiantum hirtum Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 563. Hook. *Sp. Fil.* II. 20. t. 72 A. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 119., non *Splüg.*

Adiantum terminatum Kunze, *Linnaea* XXI. 222. Miquel, *Diar. Inst. Reg. Batav.* 1843. p. 3.

CAUDEX plus minus repens, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis lineari-subulatis ferrugineis vestitus. STIPITES segregati, erecti, ebenei, 6—12 poll. longi, nudi vel sursum paulo ferrugineo-hispidi. LAMINA coriaceo-papyracea, supra viridis nuda, subtus glaucescens et pilis hispidis ferrugineis sparsis vestita, rotundato-deltaidea, bipinnata, 6—9 poll. longa et lata. RACHES pilis ferrugineis brevibus plus minus vestitae. PINNAE ligulatae, 2—5-jugae, breviter petiolatae, patentes vel paulum adscendentes, contiguae, 3—4 poll. longae, 10—14 lin. latae. PINNULAE 12—20-jugae, contiguae, subpatentes, subsessiles, imae reductae, mediae rhomboideae, 6—7 lin. longae, 2—2½ lin. latae, margine interiore recto integro, cum rache prorsus contiguo, inferiore integro horizontaliter recto vel paulum adscendente, superiore subrecto, in pinnulis sterilibus graciliter denticulato, exteriori obtuse rotundato. VENAE graciles, immersae, flabellatae. SORI secundum margines superiores et exteriores pinnularum dispositi, parvi, contigui, rotundati, 12—18 pro pinnula.

Habitat in prov. Para ad Rio Acara: Spruce 14!; ad Ilheos Bahia: Moricand!; in Guyana britannica: Rich. Schomburgk 1144, Appun 130!; in batava: Hostmann 93, 843!, Menze, Kegel 1060, Kappler 1477 d., Focke!, et in gallica: Sagot 735!. Item incolit Panamam (Seemann 379!). — Hamadryadi-Najas et Extrabrsil.

17. ADIANTUM LANCEA LINN. frondibus rhomboideis bivel raro tripinnatis, rachibus ferrugineo-hispidis, pinnis 1—8-jugis laxis breviter petiolatis simplicibus ligulatis, pinnulis mediocribus 2—4-plo longioribus quam latis, margine interiore recto cum rache prorsus contiguo, inferiore recto horizontali vel parum adscendente vel subcurvato, superiore subrecto denticulato, exteriori denticulato obliquo vel rotundato, apice extrorso obtuso vel acuto, venis liberis flabellatis; soris numerosis rotundatis vel obverse reniformibus, secundum margines superiorem et exterioriorem pinnularum dispositis.

Tabula nostra XXIII. Fig. 7. 13. (lapsu sub nomine Willdenowiano A. tetraphylli, partes pinnae).

Adiantum lancea Linn. *Sp. Plant.* 1557. (*Seba Thesaurus* II. tab. 64. fig. 7—8). Swartz, *Syn. Fil.* 123. Willd. *Sp. Plant.* V. 440. Hook. *Sp. Fil.* II. 27. et *Auctt.*

Adiantum falcatum Vell. *Fl. Flum.* XI. t. 96., non Swartz.

Adiantum tetraphyllum Willd. *Sp. Plant.* V. 441. Klotzsch, *Linnaea* XVIII. 551. Kunze, *Linnaea* XXI. 221. Mett. *Fil. Hort. Lips.* 47. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 120. Ettingsh. l. c. t. 47. fig. 4. 15.

Adiantum prionophyllum H.B.K. *Nov. Gen.* I. 20. Presl, *Tent. Pter.* 157. Hook. *Sp. Fil.* II. 120.

Adiantum cayennense Willd. *Mss. Klotzsch, Linnaea* XVIII. 552. Kunze, *Linnaea* XXI. 223. Hook. *Sp. Fil.* II. 20. t. 61 A.

Adiantum ternatum Willd. *Sp. Plant.* V. 436. (forma minor pinnis unijugis).

Adiantum lacum Kunze, *Linnaea* IX. 79. Hook. *Sp. Fil.* II. 23.

Polypod.

Adiantum elatum Desv. *Berl. Mag.* V. 327.

Adiantum Kohautianum Presl, *Tent. Pter.* 158.

Adiantum pachysorum Reich. *Mss. Kunze, Linnaea* XXI. 224.

Adiantum hirtum, *Splüg. Enum. Fil. Sur.* 40., non Klotzsch.

CAUDEX plus minus repens, validus, lignosus, PALEIS lineari-subulatis ferrugineis vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, firmi, stricti, erecti, 12—18 poll. longi, sursum ferrugineo-hispidi. LAMINA deltaidea vel rhomboidea, plerumque bipinnata, raro deorsum tripinnata, papyraceo-coriacea, utrinque subnuda, supra obscure viridis, infra pallidior vel parum glaucescens, 1—2 pedes longa et lata. RACHES strictae, pilis ferrugineis hispido-lanosis plus minus vestitae. PINNAE 2—8-jugae, laxae, breviter petiolatae, patentes vel parum adscendentes, in formâ typicâ bipinnatâ omnes ligulatae, 6—12 poll. longae, 1—2 poll. latae, deorsum reductae, apice acuto vel acuminato. PINNULAE rhomboideae, contiguae, 12—20-jugae, subsessiles, imae reductae, mediae 9—12 lin. longae, 3—4 lin. latae, margine interiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore integro horizontaliter recto vel parum adscendente vel curvato, superiore subrecto vel extrorsum incurvato, in sterilibus parum inciso-crenato, exteriori rotundato vel recte obliquo inciso-crenato, apice extrorso obtuse rotundato vel producto acuto. VENAE graciles flabellatae. SORI secundum margines superiores et exteriores pinnularum dispositi, aequales, rotundati vel obverse reniformes, 8—12 pro pinnula.

Var. β. FRUCTUOSUM Baker.

Adiantum fructuosum Kunze in *Schkuhr Suppl. tab. 15 B.* (non A.). Hook. *Sp. Fil.* II. 24.

Adiantum macrocarpum Presl, *Tent. Pter.* 158.

Rachis parum vestitae. Pinnulae rigidiores et magis coriaceae, breviores (mediae 6—7 lin. longae) patentes, margine exteriori rotundato vel apice parum producto; sori 6—8 pro pinnula.

Varietas ad *A. serrato-dentatum* accedens.

Var. γ. GRACILE Baker.

Adiantum gracile Fée *Gen. Fil.* 116. *Icon. tab. 11. fig. 1.*

Lamina novella pilis ferrugineis dense vestita; raches pilis ferrugineis subulatis patentibus inaequalibus dense vestitae; pinnulae angustiores numerosiores, 30—40-jugae, 8—9 lin. longae, 2 lin. latae, apice extrorso acuminato, marginibus exterioribus et superioribus insigniter inciso-serratis.

Habitat forma typica in prov. Rio de Janeiro, Corcovado etc.: Bunbury!, Glaziou 436!; in Bahiensi, e. gr. ad Ilheos, S. Pedro d'Alcantara, in sylvarum aboriginum asperis etc.: Mart. Herb. Fl. Bras. 351, Blanchet 2508!; in prov. Ceara, Serra de Araripe etc.: Gardner 1906!; in prov. Goyaz: Burchell 5361! 6721! 7415!; in ditone Para, ad Rio Acara etc.: Spruce 49!; in sylvis ad lacum Canoma prov. do Alto Amazonas: Martius. In Guyana batava (Splitgerber, Hostmann 843., Kappler 1732., Kegel 1061. aliique), in Guyana gallica (Leprieur, Sagot 731!) et in anglica (Appun 185! 417! 430! 1500!, Rich. Schomburgk 1201!). — Var. β. in Brasiliæ provincia Parana: Tweedie 1133!; ad ripas umbrasas prope Natividade prov. Goyaz: Gardner 3549!, et in Guyana anglica: Rob. Schomburgk!, Parker!, Appun 415. — Var. γ. ad Manaos, olim Barra do Rio Negro: Spruce 1288!, et in Guyana gallica: Aublet! (v. s. in Mus. Brit.). — Vagat praeterea per totam Americam tropicam et regiones occidentales Africae tropicae.

18. ADIANTUM PECTINATUM KUNZE: frondibus magnis deltaideis 3—4-pinnatis, rachibus breviter ferrugineo-hispidis, pinnis patentibus, inferioribus deltaideis longe petiolatis, pinnulis inferioribus compositis deltaideis, superioribus ligulatis patentibus simpliciter pinnatis, segmentis rhomboideis breviter petiolatis, margine interiore recto integro cum rache parallelo, inferiore integro horizontali, superiore subrecto parum inciso-crenato, apice non producto, venis liberis flabellatis; soris laxis rotundatis numerosis, secundum margines superiorem et exterioriorem segmentorum dispositis.

Tabula nostra XXIII. Fig. 1. 2. (pinnulae).

Adiantum pectinatum Kunze Mss. Hook. et Baker, Syn. Fil. 120. Ettingsh. l. c. tab. 45. fig. 14—16.

Caudicem non vidi. STIPITES firmi, erecti, 1½—2 pedes longi, validi, stricti, ebenei, nitidi, sursum parum ferrugineo-pubescentes. LAMINA rigide coriacea, utrinque nuda, viridis, subdeltoidea, quadripinnata, 3—4 pedes longa et lata. RACHES strictae, castaneo-ebeneae, pilis castaneis brevibus adpressis vestitae. PINNAE patentes, inferiores maximae, ima cc. 20 poll. longa, 14 poll. lata, petiolo 2½ poll. longo, pinnulis inferioribus compositis bijugis, superioribus ligulatis simpliciter pinnatis 6-jugis, in eodem latere 1—2 poll. distantibus. PINNULAE (vel pinnae simplices) ligulatae, breviter petiolatae, 5—6 poll. longae, 1 poll. latae, rectangulariter patentes, deorsum paulo reductae. SEGMENTA 20—25-juga, rhomboidea, contigua, breviter petiolata, 6—7 lin. longa, 2—2½ lin. lata, margine inferiore recto integro cum rache parallelo, inferiore integro horizontaliter porrecto, superiore subrecto parum inciso-crenato, apice subrotundato. VENAE inconspicuae, flabellatae. SORI laxi, rotundati, secundum margines superiorem et exteriorem segmentorum impositi, 6—8 pro segmento.

Maxima totius generis species.

Habitat prope Aldea S. Maria et Mato d'El Rê prov. Goyaz: Pohl!, et in sylvis densis umbrosis inter Goyaz et Cavalcante: Burchell 7416! — Oreas.

19. ADIANTUM TETRAGONUM SCHRAD. frondibus pedato-tripinnatis, latioribus quam longis, rachibus paulo ferrugineo-pubescentibus, segmentis laxis petiolatis subsymmetricis lanceolatis, apice acuminato, basi subrotundata, venis liberis et venâ mediana flabellatis; soris lineari-oblongis numerosis subaequalibus, secundum omnes segmentorum margines dispositis.

Adiantum tetragonum Schrad. in Goetting. Gel. Anz. 1824. p. 872. Mart. Icon. Crypt. Bras. 93. t. 63. Presl, Tent. Pter. 157. Hook. Sp. Fil. II. 28. et Auctt.

CAUDEX longe repens. STIPITES erecti, tetragoni, 12—15 poll. longi, castanei, segregati, sursum paulo pubescentes. LAMINA papyracea, utrinque nuda, supra saturate viridis, infra pallidior, pedalis, 15—18 poll. lata, ramificatione primaria perfecte pedata. RACHES castaneae, flexuosae, graciles, breviter pubescentes; rami primarii terni, laterales e basi unifurcati, terminalis pinnulis tribus subaequalibus instructus. PINNULAE distincte petiolatae, lanceolatae, 6—9 poll. longae, deorsum 4—5 poll. latae. SEGMENTA 8—9-juga, laxa, alterna, subaequaliter lanceolata, distincte petiolata, apice longe acuminato, lateribus paulo inciso-crenatis, basi subrotundata, inferiora maxima, 2—3 poll. longa, 9—12 lin. lata. Petioli segmentorum inferiorum 2—3 lin. longi. VENULAE e venâ mediana irregulari erecto-patentes flabellatae. SORI secundum margines omnes segmentorum, basi excepta, dispositi, lineari-oblongi, subaequales, 12—20 pro segmento.

Habitat in sylvis inter Almada et Ferradas prov. Bahiae: Princ. Maximilianus Neovidensis; et in prov. Minarum ad Aldeam Indianorum Machacarís: Pohl! — Oreas, Hamadryas.

20. ADIANTUM CURVATUM KAULF. frondibus pedato-3—4-pinnatis, subaeque longis ac latis, divisionibus primariis deltoideis pinnatis vel pinnulis deorsum parum compositis, segmentis contiguis subsessilibus rhomboideis, margine inferiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore integro subhorizontali, superiore recto subhorizontali parum inciso-crenato, exteriore rotundato inciso-crenato, venis liberis flabellatis; soris numerosis rotundatis vel oblongis, secundum margines superiorem et exteriorem segmentorum dispositis.

Var. *α*. ORNITHOPODUM Baker.

Adiantum ornithopodum Presl, Tent. Pter. 158.

Adiantum curvatum Hook. Sp. Fil. II. 29. ex parte.

CAUDEX longe repens, paleis paucis vestitus. STIPITES graciles, angulati, suberecti, 12—18 poll. longi, ebenei, nitidi, nudi vel parum furfuracei. LAMINA papyracea, utrinque nuda, viridis, 1—1½ pedes longa, 1½—2 pedes lata, ramificatione primaria pedata. RACHES graciles, ebeneae, angulatae, nuda vel parum furfuraceae; rami primarii terni; divisiones deltoideae, petiolis 1—1½ poll. longis; pinnulae terminales ligulatae, laterales consimiles 2—3-jugae, inferioribus magis compositis. PINNULAE ligulatae 4—6 poll. longae, 15—18 lin. latae, breviter petiolatae, deorsum paulo reductae. SEGMENTA 16—24-juga, contigua, inferiora reducta breviter petiolata, media rhomboidea, 8—10 lin. longa, 3—4 lin. lata, margine inferiore recto integro cum rache parallelo, inferiore integro horizontaliter porrecto, superiore subrecto parum inciso-crenato, exteriore inciso-crenato subrotundato. VENAE liberae, e basi et triente inferiore marginis posterioris segmentorum flabellatim exeuntes. SORI rotundi vel oblongi, secundum margines superiores et exteriores segmentorum laxè dispositi, 6—8 pro segmento.

Var. *β*. BRASILIENSE Baker.

Tabula nostra XXIII. Fig. 3. 4. (lapsu sub nomine Raddiano specifico A. brasiliensis, pinnulae).

Adiantum brasiliense Raddi, Fil. Bras. 56. t. 76. Hook. Sp. Fil. II. 50. Ettingsh. l. c. tab. 46. fig. 1. 12.

Adiantum pubescens Raddi, Syn. Fil. n. 129., non Schkuhr, nec Presl.

Adiantum pedatum Raddi, Syn. Fil. n. 128., non Linn.

Lamina obscurius viridis, raches magis pubescentes, divisiones minus compositae, juga solummodo ima pinnarum composita, superiora 1—2 simpliciter pinnata, pinnulis 6—8 poll. longis, 18—24 lin. latis, segmentis contiguis subrhomboidis, margine inferiore dimidiato-truncato horizontaliter subporrecto, superiore cum inferiore parallelo, simul cum exteriore introrso obliquo dentato.

Var. *γ*. GENUINUM Baker.

Adiantum curvatum Kaulf. Enum. Fil. 202. Kunze, Linnaea XXIII. 215. Hook. Sp. Fil. II. 28. (ex parte) tab. 84 C. Mett. Fil. Hort. Lips. 47. Lowe, Ferns 3. t. 6.

Adiantum tetragonum Hook. et Baker, Syn. Fil. 126. ex parte, non Schrad.

Adiantum angustatum Kaulf. Enum. Fil. 202. Hook. Sp. Fil. II. 30.?

Divisiones minus compositae, pinnulae 3—4 poll. latae (in specimenibus nostris cultis), segmenta contigua, 1½—2 poll. longa, 4 lin. lata, margine inferiore introrso integro decurvato, in triente extrorso paulum producto denticulato.

Differt a var. *β*. praecipue segmentis dilatatis, margine inferiore decurvato extrorso producto.

Habitat var. *α*. in prov. Goyazensis sylvis apertis Serra da Santa Bida: Gardner 4074!, et in Bahía, e. gr. Ilheos: Blanchet!, Luschath. — Var. *β*. in prov. Rio Grande do Sul: Tweedie 1132!; in prov. S. Catharina: Fritz Müller!; in insula S. Sebastião prov. S. Pauli: Fox!; Rio de Janeiro, in sylvis frequens: Raddi!, Pohl!, Bowie et Cunningham!, Burchell 1816!, Gardner 59!, Glaziou 1758. etc.; in sylvis ad Rio Duce et in via Felisbertia: Princ. Vidensis. — Var. *γ*. in sylvis Tapebassu prov. Bahiensis: Max. Princ. Vidensis. — Vaga.

21. ADIANTUM LUCIDUM SWARTZ. frondibus chartaceo-papyraceis lanceolatis simpliciter pinnatis vel raro deorsum bipinnatis, rachibus ferrugineo-villosis, pinnis 6—12-jugis laxis breviter petiolatis lanceolatis sursum symmetricis, apice acuto vel acuminato, deorsum inaequaliter libris, basi superiore producta rotundata vel angulata, inferiore truncata, venis e venâ mediana irregulari flabellatis liberis vel extrorsum subanastomosantibus; soris linearibus continuis, secundum oppositos pinnarum margines basi inferiore excepta dispositis.

Tabula nostra XXII. Fig. 15. (pinna).

Adiantum varium H.B.K. Nov. Gen. I. 19. VII. t. 667. Willd. Sp. Plant. V. 435. Hook. Sp. Fil. II. 18. et Auctt.
Adiantum macrodus Kaulf. in Mart. Herb. Flor. Bras. n. 355?
Adiantum lucidum Swartz, Syn. Fil. 121. Presl, Rel. Haenk. I. 60. Kunze, Linnaea IX. 78. Hook. Sp. Fil. II. 4. tab. 79C. Ettingsh. l. c. tab. 42. fig. 12. et Auctt.
Pteris aspera Poir. Encycl. V. 713. Swartz, Syn. Fil. 372. Willd. Sp. Plant. V. 372.
Adiantum asperum Desv. Berl. Mag. V. 327.
Adiantum Poeppigianum Presl, Tent. 157.

CAUDEX firmus, lignosus, plus minus repens, PALEIS castaneis linearisubulatis vestitus. STIPITES erecti, segregati, angulati, 12—18 poll. longi, eburnei, sursum ferrugineo-furfuracei. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque nuda, viridis, lanceolata, simpliciter pinnata, 6—12 poll. longa, 4—6 poll. lata, vel raro deorsum paulo composita, pinnis brevibus deltoideis uni- vel bijugis. RACHES strictae, castaneo-eburneae, angulatae, pilis ferrugineis lanosis breviter vestitae. PINNAE 6—12-jugae, laxae, breviter petiolatae, parum adscendentes, inferiores reliquis subaequales, lanceolatae, 2—3 poll. longae, 8—12 lin. latae, apice acuto vel acuminato, marginibus sterilibus vix denticulatis, lateribus deorsum inaequalibus, basi superiore rotundata vel angulata, margine inferiore cum rache parallelo, basi inferiore horizontaliter truncata. PETIOLI 1—2 lin. longi. VENAE confertae, immersae, e venâ mediana irregulari oblique flabellatae, liberae vel extrorsum paullulum anastomosantes. SORI secundum margines oppositos pinnarum, basi inferiore excepta, dispositi, lineares, continui.

Cum *A. platyphylo* nostro, quâcum cl. GRISEBACH speciem conjunxit, quoad habitum omnino congruit sed differt soris linearibus continuis et venulis confertis interdum anastomosantibus.

Crescit ad Ilheos: Luschnath (?); in prov. Para, e. gr. ad ripas arenosas prope Caripe: Spruce 39! In Guyana gallica (Le-prieur!, Sagot!), et per terras continentis occidentales inde e Peruvia in Panamam et insulas Antillanas. — Dryadi-Najas et Extrabrazil.

(22.) ADIANTUM PHYLLITIDIS J. SMITH: frondibus chartaceo-coriaceis lanceolato-deltoideis simpliciter pinnatis vel raro deorsum bipinnatis, rachibus ferrugineo-villosis, pinnis 3—4-jugis contiguis breviter petiolatis ovato-lanceolatis deorsum paulo inaequilateralibus, basi superiore rotundata, inferiore arcuato-truncata, venis obscuris e venâ mediana irregulari flabellatis liberis vel extrorsum subanastomosantibus; soris secundum oppositos pinnarum margines basi inferiore excepta dispositis, linearibus continuis.

Adiantum Phyllitidis J. Smith in Hook. Lond. Journ. Bot. I. 197. Kunze, Linnaea XXIII. 216. Hook. Sp. Fil. II. 5. tab. 72B. Hook. et Baker, Syn. Fil. 121.

CAUDEX firmus, lignosus, plus minus repens, PALEIS castaneis linearisubulatis vestitus. STIPITES erecti, segregati, angulati, 12—18 poll. longi, eburnei, sursum ferrugineo-furfuracei. LAMINA chartaceo-coriacea, utrinque nuda, obscure viridis, lanceolata vel deltoidea, simpliciter pinnata, 6—10 poll. longa, 6—8 poll. lata, vel raro deorsum paulo composita, pinnis patentibus deltoideis uni- vel bijugis. RACHES strictae, breviter ferrugineo-hispidae. PINNAE 3—4-jugae, contiguae vel sublaxae, breviter petiolatae, patentibus vel parum adscendentes, inferiores reliquis paulo majores, ovato-lanceolatae, 3—4 poll. longae, 12—18 poll. latae, apice acuto vel acuminato, marginibus sterilibus denticulatis, lateribus deorsum paulo inaequalibus, basi superiore rotundata, inferiore leviter arcuato-truncata sed in dimidio inferiore interdum paulo producta. PETIOLI pinnarum 1—2 lin. longi. VENAE confertae, immersae, inconspicuae, e venâ mediana irregulari oblique flabellatae, liberae vel extrorsum paulo anastomosantes. SORI secundum oppositos pinnarum margines, basi inferiore excepta, dispositi, lineares, continui.

Habitat in Guyana britannica: Rob. Schomburgk 300!, Appun! — Item incolit Peruviam: Spruce 3967! — In Brasilia amazonica quaerendum.

23. ADIANTUM SEEMANNI HOOK. frondibus chartaceis, supra obscure viridibus, infra glaucescentibus, oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis vel deorsum bipinnatis, rachibus eburneis nudis nitidis, pinnis alternis magnis longe petiolatis ovatis acuminatis, basi interiore cordata, exteriori rotundata vel paullulum cuneato-truncata, venis conspicuis liberis e venâ mediana irregulari flabellatis; soris secundum oppositos pinnarum margines dispositis, linearibus interruptis.

Adiantum Seemannii Hook. Sp. Fil. II. 5. t. 81A. Fée, Gen. Fil. 113. Moore, Ind. Fil. 37. Hook. et Baker, Syn. Fil. 121.

Adiantum populifolium Mart. Mss.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS fibrillosis parvis ferrugineis vestitus. STIPITES subfasciculati, erecti, graciles, stricti, angulati, eburnei, nudi, antice canaliculati, 10—12 poll. longi. LAMINA chartacea, utrinque nuda, supra obscure viridis, infra glaucescens, oblongo-lanceolata, 6—9 poll. longa, 4—5 poll. lata, simpliciter pinnata vel pinnis imis paullulum compositis. PINNAE 3—4-jugae, contiguae, alternae, inaequilateraliter cordato-ovatae, simplices, 3—4 poll. longae, 2—3 poll. latae, basi interiore late cordata, exteriori rotundata vel paullulum cuneato-truncata, marginibus sterilibus denticulatis, dimidio superiore in apicem acuminatum sensim angustato. PETIOLI pinnarum inferiorum 1 poll. longi, in eodem latere 1½—2 poll. distantes. RACHIS gracilis, castaneo-eburnea. PINNULAE pinnarum compositarum pinnis consimiles sed multo minores. VENAE conspicuae, graciles, liberae, e venâ mediana irregulari flabellatae. SORI secundum latera opposita pinnarum dispositi, lineares sed valde interrupti, sursum breviores.

Habitat prope Caretão ad rivum Indios Grandes prov. Goyaz: Pohl! — Item in Veragua (Seemann 1124!) et Guatemala (Salvin et Godman!). — Oreas et Extrabrazil.

24. ADIANTUM MACROPHYLLUM SWARTZ: frondibus laete-viridibus chartaceo-papyraceis oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis vel raro deorsum bipinnatis, rachibus eburneis nudis nitidis, pinnis sessilibus constanter oppositis 4—8-jugis ovatis, basi superiore late rotundata, inferiore paullulum reducta, fertilibus parumper contractis magis angulatis, venis e basi pinnarum flabellatis; soris secundum oppositos pinnarum margines dispositis, linearibus continuis.

Tabula nostra XXII. Fig. 22. 23. 27. (pinnae) et XLII. Fig. 11a. (analysis).

Adiantum macrophyllum Swartz, Syn. Fil. 122. Willd. Sp. Plant. V. 429. H.B.K. Nov. Gen. I. 16. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 132. Hook. Fil. Exot. t. 132. Ettingsh. l. c. tab. 43. fig. 3—5. et Auctt.

CAUDEX firmus, breviter repens, PALEIS parvis vestitus. STIPITES suberecti, 12—18 poll. longi, stricti, angulati, eburnei, nudi, nitidi. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque nuda, laete et lucide viridis, in statu juniore plus minus rubro-tincta, oblongo-lanceolata, 8—15 poll. longa, 5—7 poll. lata, simpliciter pinnata vel raro deorsum paulo composita, pinnis deltoideis brevibus. PINNAE 4—8-jugae, contiguae vel sublaxae, semper oppositae, inferiores reliquis paulo majores; steriles ovatae, 3—4 poll. longae, 1½—2 poll. latae, apice acuto, marginibus inciso-crenatis, basi utrinque late rotundata, superiorum antice magis producta; fertiles parum contractae, lateribus rectoribus, basibus magis angulatis, inferiore oblique truncata. Pinna terminalis ovato-rhomboida, interdum utrinque acute auriculata. VENAE immersae, inconspicuae, e basi pinnarum flabellatae, liberae vel extrorsum paulo anastomosantes. SORI secundum opposita pinnarum latera, apice excepto, dispositi, continui, lineares.

Habitat in sylvis umbris provinciarum meridionalium Brasiliae, ita in prov. Rio de Janeiro, Minarum et Bahiae: Freyreiss, Blanchet 2482!, Princeps Maximil. Neovidensis, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 354, Schott!, Gardner! etc. etc. — Item incolit Columbianam et Americanam centratem usque in Mexicum et insulas quoque Antillanas. — Vaga et Extrabrazil.

25. *ADIANTUM PULVERULENTUM* LINN. frondibus oblongo-rhomboides bipinnatis, rachibus ferrugineo-hispidis, pinnis 4—8-jugis ligulatis patentibus, segmentis sessilibus dimidiatis rhomboides, margine interiore integro recto cum rache prorsus contiguo, inferiore recto integro horizontali vel parum adscendente, superiore subrecto in triente extrorso sterili subfalcato denticulato, exteriori oblique rotundato denticulato, venis liberis flabellatis; soris linearibus continuis, ad marginem superiorem segmentorum semper restrictis.

Tabula nostra XXIII. Fig. 10—12 (apex pinnae).

Plumier Fil. tab. 55.

Adiantum pulverulentum Linn. *Sp. Plant.* 1559. *Aublet, Guian. I.* 965. *Swartz, Syn. Fil.* 124. *Willd. Sp. Plant. V.* 446. *Schkuhr, Crypt.* 110 t. 119. *Hook. Sp. Fil. II.* 17. *Ettingsh. l. c. t.* 46. *fig. 14. t.* 47. *fig. 8.*

Adiantum monosoratum Willd. *Sp. Plant. V.* 445. *Presl, Tent. Pter.* 157.

Adiantum umbrosum Willd. *Sp. Plant. V.* 447. *Desv. Prodr.* 309.

Adiantum Kunzeanum Presl, *Tent.* 157.

Adiantum apiculatum Schrad. in *Goett. Gel. Anz.* 1824. p. 872.

Adiantum serrulatum Linn. *Sp. Plant.* 1557 (Sloane, *Jam. tab. 35. fig. 2., forma simpliciter pinnata*). *Sw. Syn. Fil.* 122.

Adiantum Claussenii Fée, *Gen. Fil.* 115.

Adiantum propinquum Fée, *Gen. Fil.* 114.?

CAUDEX firmus, lignosus, plus minus repens, PALEIS lineari-subulatis castaneis vestitus. STIPITES segregati, stricti, erecti, 12—18 poll. longi, quadrangulati, breviter ferrugineo-hispidi. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque viridis, nuda, oblongo-rhomboides, bipinnata, 12—18 poll. longa, 8—12 poll. lata. RACHES strictae, pilis ferrugineis brevibus hispidae. PINNAE 4—8-jugae, laxae vel subcontiguae, patentis vel parum adscendentes, petiolo 1—3 lin. longo instructae, ligulatae, 4—6 poll. longae, 9—15 lin. latae, deorsum paulo reductae. SEGMENTA 15—30-juga, sessilia, contigua vel interdum paulo imbricata, perfecte dimidiata, rhomboides, 5—8 lin. longa, 3—4 lin. lata, margine interiore recto integro cum rache prorsus contiguo, inferiore recto integro horizontali vel parum adscendente, superiore recto ultra soros producto subfalcato denticulato, exteriori itidem denticulato oblique rotundato, apice extrorso obtuso vel paullulum producto. VENAE confertae, immersae, e basi segmentorum et triente inferiore marginis posterioris flabellatae, omnino liberae. SORI lineares, continui, solummodo margini superiori segmentorum impositi, raro in quadrante v. triente exterum progredientes.

Crescit per totam fere Brasiliam terrasque adjacentes. In prov. Rio Grande do Sul: Tweedie 1134!; S. Paulo: Fox!; Rio de Janeiro, Corcovado etc.: Langsdorff, Pohl, Gardner 56!, Bowie et Cunningham!, Burchell 938! 1819!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 350 etc., Glaziou 1755.; in prov. Bahia: Max. Princ. Neovidensis; in Pernambuco: Gardner 1226!; in prov. Goyaz: Burchell 9095! 9197! — In Guyana gallica (Aublet), britannica (Rob. Schomburgk 90!), Appun 1502!), in Columbia ad Mexicum et in Cuba. — Vaga et Extrabrazil.

26. *ADIANTUM VILLOSUM* LINN. frondibus oblongo-rhomboides bipinnatis, rachibus ferrugineo-hispidis, pinnis 6—9-jugis patentibus ligulatis, segmentis sessilibus dimidiatis rhomboides, margine interiore integro recto cum rache prorsus contiguo, superiore et inferiore horizontaliter porrectis parallelis, exteriori recto obliquo, venis liberis flabellatis; soris linearibus continuis, secundum margines superiorem et anteriorem dispositis.

Tabula nostra XXIII. Fig. 9. (pinna).

Adiantum villosum Linn. *Sp. Plant.* 1558. *Swartz, Syn. Fil.* 124. *Willd. Sp. Plant. V.* 444. *Schkuhr, Crypt.* 111. t. 120. *Hook. Sp. Fil. II.* 18. *Ettingsh. l. c. t.* 46. *fig. 13.*

Adiantum acuminatum Desv. *Berl. Mag. V.* 327.

Adiantum falcatum Swartz, *Syn. Fil.* 123. *Willd. Sp. Plant. V.* 435. *Hook. Sp. Fil. II.* 19.

Adiantum fruticosum Poepp. *Enum. pl. Cub. Mss.*

Adiantum Jacobinae Fée, *Gen. Fil.* 115.

Adiantum oblique-truncatum Fée, *Fil. Ant.* 17. t. 7. *fig. 2.*

Adiantum lanceolatum Fée, *Gen. Fil.* 115.?

Adiantum apiculatum Schrad. *Mss.*

CAUDEX firmus, lignosus, plus minus repens, PALEIS lineari-subulatis castaneis vestitus. STIPITES segregati, stricti, erecti, 12—18 poll. longi, quadrangulati, breviter ferrugineo-hispidi. LAMINA chartaceo-papyracea, utrinque viridis, nuda, oblongo-rhomboides, bipinnata, 1½—2 pedes longa, 12—18 poll. lata. RACHES strictae, pilis ferrugineis brevibus hispidae. PINNAE 6—9-jugae, patentis, ligulatae, 6—9 poll. longae, 15—18 lin. latae, deorsum paulo reductae, breviter petiolatae. SEGMENTA 30—40-juga, sessilia, contigua, rhomboides, 7—8 lin. longa, 4 lin. lata, margine interiore integro recto cum rache prorsus contiguo, superiore et inferiore horizontaliter porrectis, exteriori subrecto parum obliquo. VENAE confertae, immersae, e basi segmentorum et triente inferiore marginis posterioris flabellatae, omnino liberae. SORI secundum margines superiorem et anteriorem segmentorum dispositi, lineares, continui.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Gaudichaud; in Bahiensi ad viam Fetisbertiam: Max. Princ. Neovidensis!; in Serra da Jacobina: Blanchet; in Guyana batava (Kegel) et in gallica (Leprieur). Praeterea e Columbia ad Mexicum et insulas Antillanas vagat.

Obs. Planta Leprieuri a typica differt segmentis minoribus, apice extrorso obtuse angulato, margine exteriori minus obliquo, quibus notis versus *A. pulverulentum* recedit. *A. tetraphyllum* Sieb. *Syn. Fil. n.* 158. (non H.B.K.) est forma quoad segmenta omnino similis.

§ 2. HEWARDIA.

27. *ADIANTUM DOLOSUM* KUNZE: frondibus chartaceo-coriaceis ovato-deltoides simpliciter pinnatis vel raro deorsum bipinnatis, rachibus subnudis vel breviter ferrugineo-hispidis, pinnis 3—5-jugis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis subaequilateralibus, basi superiore rotundata, inferiore paulo arcuato-truncata, venis inconspicuis confertis e venâ mediana flabellatis extrorsum anastomosantibus; soris continuis linearibus, secundum utrumque pinnarum marginem dispositis.

Adiantum dolosum Kunze, *Linnaea XXI.* 219. *Hook. Sp. Fil. II.* 6. *tab. 79 B.* *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 127.

Lindsaya macrophylla Mart. *Hb. Bras. n.* 407., nec Kaulf. *Hewardia dolosa*, serrata et *Wilsoni* Fée, *Gen. Fil.* 122. 123. *Moore, Ind. Fil. l. c.*

Adiantum Wilsoni Hook. *Sp. Fil. II.* 6. *tab. 72 A.* (var. *pinnulis latioribus, rachibus nudis, costis deorsum ebeneis*). *Lowe, Ferns III. t.* 16. *Moore, Ind. Fil.* 42.

CAUDEX firmus, lignosus, breviter repens, PALEIS ferrugineis lineari-subulatis vestitus. STIPITES paulo segregati, erecti, stricti, ebenei, 9—15 poll. longi, nudi vel sorsum ferrugineo-hispidi. LAMINA chartaceo-coriacea, utrinque nuda, viridis, lanceolato-deltoides, 6—9 poll. longa, 4—6 poll. lata, simpliciter pinnata vel raro deorsum paulo composita. PINNAE 3—5-jugae, alternae, laxae, patentis vel parum adscendentes, lanceolatae vel oblongo-lanceolatae, inferiores maximae, breviter petiolatae, 3—4 poll. longae, 6—12 lin. latae, apice acuminato, lateribus subaequalibus, sterilibus denticulatis, basi superiore late rotundata, inferiore parum arcuato-truncata. RACHES castaneo-ebeneae, strictae, subnudae vel breviter ferrugineo-hispidae. VENULAE inconspicuae, immersae, confertae, e venâ mediana distincta oblique flabellatae, extrorsum anastomosantes. SORI secundum utrumque pinnarum marginem dispositi, lineares, continui.

Obs. Habitu, texturâ et magnitudine omnino cum *A. lucido* congruit, differt praecipue venis anastomosantibus.

Habitat in prov. Bahiensi ad Ilheos etc.: Martius!, Blanchet 2429!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 407!; in Guyana batava (Kegel 1382, Hostmann 62!, Kappler 1766), in Columbia et insulis Antillanis. — Hamadryas et Extrabrazil.

(28.) ADIANTUM HEWARDIA KUNZE: frondibus membranaceis ovato-deltoidis simpliciter pinnatis vel plerisque deorsum breviter bipinnatis, rachibus subnudis ebeneis, pinnis 4—5-jugis, pinnulis petiolatis oblongo-lanceolatis subaequalateralibus, basi superiore rotundata, inferiore paulo arcuato-truncata, venis distinctis e venâ mediana distincta flabellatis copiose anastomosantibus; soris continuis linearibus, secundum utrumque pinnularum marginem impositis.

Adiantum Hewardia Kunze in *Schkuhr Suppl.* 104. t. 49. *Hook. Sp. Fil.* II. 7. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 127.

Hewardia adiantoides J. Smith in *Hook. Journ. Bot.* III. 432. t. 16. 17. et IV. 161. *Hook. et Bauer, Gen. Fil.* 689.

Pteris melanopus Leprieur Mss.

Caudicem non vidi. STIPITES 9—12 poll. longi, erecti, stricti, omnino ebenei. LAMINA papyracea, utrinque viridis, prorsus nuda, ovato-deltoida, 6—12 poll. longa et lata, simpliciter pinnata vel plerumque deorsum bipinnata. RACHES ebeneae, omnino nuda. PINNAE 4—5-jugae, alternae, inferiores maximae, compositae, petiolo 6—15 lin. longo instructae, pinnulis subtribus, interstitiis 1½—2 poll. longis. PINNULAE (vel pinnae simplices) subcontiguae, petiolo 1—3 lin. longo instructae, oblongo-lanceolatae, 3—5 poll. longae, 1—2 poll. latae, apice acuto, lateribus subaequalibus, basi superiore late rotundata vel angulata, inferiore paululum arcuato-truncata. VENULAE laxiores quam in speciebus reliquis, e venâ mediana distincta deorsum incrassata et ebenea oblique flabellatae, copiose anastomosantes in maculas subhexagonas, 1—1½ lin. latas, 2—4 lin. longas, venulis inclusis liberis nullis. SORI continui lineares, secundum margines superiorem et inferiorem pinnularum impositi.

Habitat in Guyana gallica: Martin (v. s. in Herb. J. Smith!); e. gr. in rupestribus montosis viae Nan, secus torrentes, et in Guyana centrali, ad fontes amnis Sai: Leprieur! — In Brasilia amazonica forte detegenda.

(29.) ADIANTUM OLIVACEUM BAKER: frondibus membranaceis, latioribus quam longis, ternato-pedatis, rachibus ebeneis prorsus nudis, divisionibus subaequalibus simpliciter pinnatis, pinnulis 5—6-jugis contiguis breviter petiolatis lanceolatis, marginibus aequalibus distanter inciso-dentatis, basi superiore rotundata, inferiore cuneato-truncata, venis distinctis e venâ mediana flabellatis copiose anastomosantibus; soris secundum utrumque pinnularum marginem dispositis, linearibus, interruptis.

Tabula nostra XLII. Fig. III. (analysis).

Adiantum olivaceum Baker in *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 127.

Caudicem nondum vidi. STIPITES graciles, stricti, erecti, ebenei, nudi, nitidi. LAMINA membranacea, olivaceo-viridis, utrinque nuda, ternato-pedata, 12—15 poll. lata, 8—9 poll. longa, divisionibus primariis simpliciter pinnatis. RACHES strictae, ebeneae, graciles, omnino nuda. PINNAE subaequales, terminalis erecta, laterales ascendentes, omnes breviter petiolatae, 8—9 poll. longae, 5—6 poll. latae. PINNULAE 4—5-jugae, contiguae, erecto-patentes, petiolis ebeneis 1—3 lin. longis, lanceolatae, 4—4½ poll. longae, deorsum 9—10 lin. latae, apice acuminato, lateribus aequalibus distanter sed distincte inciso-dentatis, basi superiore late rotundata, inferiore cuneato-truncata. VENA mediana distincta, percurrens, ebenea; VENULAE laxae, distinctae, copiose anastomosantes in maculas obliquas subhexagonas, venulis inclusis nullis. SORI secundum utrumque pinnularum marginem dispositi, lineares, extremum marginem inter dentes occupantes.

Habitat in Guyana britannica: Appun 646! — In Brasilia amazonica quaerenda.

(30.) ADIANTUM LEPRIEURII HOOK. frondibus membranaceis, latioribus quam longis, ternato-pedatis, rachibus ebeneis prorsus nudis, divisionibus simpliciter pinnatis vel furcatis vel Polypod.

deorsum repetito-pinnatis, pinnulis oblongo-ligulatis, segmentis 6—8-jugis contiguis breviter petiolatis ovato-rhomboidis, margine inferiore recto integro cum rache prorsus contiguo, superiore arcuato dentato, inferiore in dimidio introrso decurvato-truncato, apice extrorso producto, venis flabellatis extrorsum anastomosantibus; soris lineari-oblongis, secundum marginem superiorem et dimidium exterum marginis posterioris segmentorum impositis.

Adiantum Leprieurii Hook. *Sp. Fil.* II. 31. tab. 82 B. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 127.

Hewardia Leprieurii Fée, *Gen. Fil.* 122. *Moore, Ind. Fil.* p. XXXVII.

Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES erecti, ebenei, nudi, fragiles, 12—15 poll. longi. LAMINA membranacea, olivaceo-viridis, utrinque nuda, ternato-pedata, 9—12 poll. longa, 15—18 poll. lata, divisionibus tribus, petiolis 9—18 lin. longis instructis, simpliciter pinnatis vel e basi furcatis vel paulo pinnatim compositis. PINNULAE mediae divisionum ligulato-oblongae, 5—6 poll. longae, 2½—3 poll. latae, distincte petiolatae. SEGMENTA 6—8-juga, contigua, inferiora breviter petiolata, superiore sessilia, omnia ovato-rhomboida, 15—21 lin. longa, 6—8 lin. lata, margine inferiore recto integro cum rache prorsus contiguo, superiore parum rotundato distincte et distanter inciso-dentato, apice extrorso producto acuto vel subobtusato, margine inferiore in dimidio interiore arcuato-dimidiato, exteriori ut in margine opposito. VENAE immersae, modice laxae, flabellatae, extrorsum anastomosantes, venula mediana subnulla. SORI lineari-oblongi, apices dentium marginis superioris et partis externae marginis inferioris occupantes.

Habitat in Guyana gallica ad Notaille, Oyapok et in declivibus humidis montis Matouri: Leprieur!; in Guiana britannica ad fl. Berbice: Rob. Schomburgk; et ad fl. Demerara superiorem: Appun 410! — In Brasilia amazonica quaerenda.

Obs. I. ADIANTUM TENERUM SWARTZ.

Tabula nostra XXII. Fig. 7—9 (pinnae).

Species a Mexico in Peruviam disseminata ab auctoribus nonnullis in Brasilia quoque occurrere dicitur, unde tamen specimina nondum vidi. Differt ab *A. cuneato* segmentis majoribus, distincte trapezoidis, longius petiolulatis, haud cuneatis.

Obs. II. ADIANTUM CONCINNUM H.B.K.

Tabula nostra XXII. Fig. 20. 21. (pinnae).

Felix per ditones cum Brasilia conterminas divulgata verisimiliter etiam in ipsa Brasilia crescit, quamobrem iconem ejus addidimus. Ab omnibus sectionis speciebus distinguitur segmentis ramorum infimis perfecte sessilibus, super rachem suam imbricatis.

V. HYPOLEPIS BERNH.

HYPOLEPIS Bernh. in *Schrad. Journ.* 1806. p. 34. *Presl, Tent. Pter.* 161. *Hook. et Bauer, Gen. Fil.* tab. 67 B. et 67 A. (*Cheilanthes*). *Hook. Sp. Fil.* II. 59. *Fée, Gen. Fil.* 146. tab. 12. fig. 3. et *Auctt., nec tamen Pers. Syn.* II. 598. (*quae genus est Cytinacearum*). — *Lonchitidis spec. Linn.* — *Dicksoniae spec. Spreng.* — *Cheilanthes spec. Swartz.* — *Adianti sp. Bory.*

SORI marginales, rotundati, distincti, aequales, ex apice venularum singularum oriundi, sinubus solummodo segmentorum impositi, INDUSIUS homomorphis superis.

Tabula nostra XLII. Fig. IV.

CAUDEX validus, hypogaeus, longe repens. *STIPITES* cum caudice continui, pedales vel ultra, segregati, uniseriales. *FRONDES* homomorphae, amplae, herbaceae vel subcoriaceae, decompositae, habitu omnino aspidioideae, segmentis ultimis parvis. *VENAE* regulariter pinnatae, omnino liberae, extremitatibus simplicibus vel furcatis. *SORI* parvi, copiosi, perfecte marginales, apices venularum singularum occupantes, constanter sinibus segmentorum impositi, globosi, nunquam confluentes. *INDUSIUM* e margine recurvato frondis formatum, parvum, scariosum, parum conspicuum, rotundatum. — *Species paucae, valde confusae et quoad affinitatem cum Polypodio punctato Thunbergii dubiae, per regiones calidiores utriusque hemisphaerii late distributae.*

1. *HYPOLEPIS REPENS* Presl: frondibus herbaceis vel subcoriaceis amplis deltoideis quadripinnatifidis vel quadripinnatis, supra subglabris, subtus viscosis et breviter pubescentibus, rachibus viscosis muricatis vel inermibus, pinnis patentibus lanceolato-deltoideis, pinnulis lanceolatis, segmentis lineari-lanceolatis, laciniis plerisque ligulato-oblongis, venis pinnatis liberis, venulis inferioribus furcatis; soris pro lacinia maxima 4—6.

Tabula nostra XXIV. Fig. 1. 2. (apices pinnae), et XLII. Fig. IV. (analysis).

Hypolepis repens Presl, Tent. 162. Hook. Sp. Fil. II. 64. t. 90 B. Fée, Gen. Fil. 146. Ettingsh. Farnkr. tab. 101. fig. 7. tab. 103. fig. 8. Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 666. Fée, Fil. Ant. 28. Mett. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 238.

Lonchitis repens Linn. Sp. Pl. 1536. Swartz, Syn. Fil. 93. Willd. Sp. Plant. V. 264. Raddi, Fil. Bras. 61.

Cheilanthes repens Kaulf. Enum. Fil. 215.

Dicksonia aculeata Spr. Link, Hort. Berol. II. 11. Sieb. Fl. Martii. Exs. n. 373.

Cheilanthes aculeata Kaulf. in Flora (Ratisbon.) 1823. p. 367. Kunze, Linnaea 1850. p. 245.

CAUDEX validus, longe repens, hypogaeus. *STIPITES* validi, segregati, erecti, stricti, griseo-straminei vel castanei, 1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ pedes longi, epaleati, aculeis patentibus inaequalibus parvis plus minus muricatis. *LAMINA* deltoidea, 3—4 pedes longa et lata, herbacea vel subcoriacea, supra saturate viridis, subglabra, sed costis paulo pubescentibus, infra viscosa et breviter griseo-pubescentibus, quadripinnatifida vel quadripinnata. *RACHES* strictae, stramineae vel castaneae, muricatae, plus minus viscosae. *PINNAE* patentibus vel parum ascendentes, lanceolato-deltoideae, inferiores maximae, 1 $\frac{1}{2}$ —2 pedes longae, 8—12 poll. latae, petiolis 6—18 lin. longis. *PINNULAE* lanceolatae, patentibus, breviter petiolatae, maximae 4—6 poll. longae, 1 $\frac{1}{2}$ —3 poll. latae. *SEGMENTA* lineari-lanceolata, pinnularum inferiorum 12—15-juga, breviter petiolata, contigua, 9—18 lin. longa, 3—6 lin. lata, pinnatifida vel deorsum subpinnata, laciniis ligulato-oblongis subintegrifidis obtusis paululum crenatis, 1—1 $\frac{1}{2}$ lin. latis. *VENAE* pinnatae, 4—5-jugae in laciniis maximis, venulis furcatis erecto-patentibus. *SORI* in crenas laciniarum positi, 4—6 pro laciniis maximis.

Var. β . *HOSTILIS* Baker.

Hypolepis hostilis Presl, Tent. Pter. 162. Hook. Sp. Fil. II. 69. Hook. et Baker, Syn. Fil. 130. Ettingsh. tab. 101. fig. 2. tab. 102. fig. 3.

Cheilanthes hostilis Kunze, Linnaea VI. 86.

Lamina herbacea, tenerior, ampla, quadripinnata. Rachis stramineae vel castaneae, graciliores, paullulum muricatae. Segmenta laxiora, minor, 6—8 lin. longa, 1 $\frac{1}{4}$ —2 lin. lata, deorsum pinnata, laciniis ultimis oblongis, haud ultra semilineam latis.

H. anthriscifoliae Africanae habitu valde similis. An eadem?

Var. γ . *SELLOANA* Baker.

Hypolepis Sellowiana Klotzsch Mss. Fée, Gen. Fil. 147. *Cheilanthes Sellowiana* Presl, Tent. 160. Moore, Ind. Fil. 253.

Herbacea, tenerior; lamina multo minor sed quadripinnatifida; rachis inermes, castaneae, insigniter viscosae; pinnae inferiores lanceolatae, 3—4 poll. longae, 1 $\frac{1}{2}$ poll. latae; pinnulae contiguae, lanceolatae, acutae, 9—10 lin. longae, segmentis inferioribus oblongis, haud ultra lineam latis, inciso-pinnatifidis.

H. guianensis Klotzsch Linn. 1847. p. 339. (Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1166) ex descriptione probabiliter est forma ad var. γ . nostram accedens.

Habitat forma typica frequens in prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc., locis apricis, ad praeruptas vias, in marginibus sylvarum etc.: Raddi, Langsdorff, Burchell 1118! 1914! 1916! 2360!, Gardner 199!; in prov. Bahia, Ilheus etc.: Luschnath, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 382!, Blanchet 2460!; prov. Para in sylvis ad fl. Mojú: Martius. — Var. β . in Serra de S. Gabriel prov. do Alto Amazonas: Spruce 2119!, et in Guyana britannica: Appun 1379! — Var. γ . in Brasilia austrati, loco accuratius non indicato: Sello!, et in prov. Bahiensi: Luschnath (ex Fée). — Vagat praeterea species e Peruvia usque in insulas Antillanas.

Obs. *Hypolepis nigrescens* Hook. (tabula nostra XXIII. fig. 19.) et *H. parallelogramma* Hook. (tabula nostra XXIII. fig. 20.) probabiliter nil nisi varietates speciei antecedentis sunt. *H. nigrescens* varietatem sistit firmam glabram 4-pinnatam, laciniis ultimis parvis oblongo-lanceolatis; *parallelogramma* contra varietatem laciniis ultimis multo majoribus ligulatis obtusis, ceterum magnam firmam subglabram quadripinnatam. Utraque crescit in America tropica, e Guatemala versus Peruviam inque insulis Antillanis; in ditone quidem nostra nondum visae, verisimiliter tamen ibidem provenientes.

VI. LONCHITIS LINN.

Lonchitis Linn. Gen. Plant. 781. Swartz, Syn. Fil. 93. Willd. Sp. Plant. V. 463. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 68. Hook. Sp. Fil. II. 56. — *Pteridis pars* Mett. Fil. Hort. Lips. 59.

SORI basin sinuum occupantes, primum rotundato-reniformes, demum saepe confluentes, *INDUSIIS* homomorphis.

CAUDEX lignosus, suberectus, *PALEIS* lanosis apice vestitus. *STIPITES* elongati, straminei, basi cum caudice continui. *LAMINA* mediocris, herbacea vel subchartacea, bi- vel tripinnatifida, segmentis ultimis rotundatis modice latis. *VENAE* plus minus anastomosantes; areolae exappendiculatae. *SORI* basin sinuum ultimorum occupantes, rotundato-vel lunato-reniformes, primum distincti, demum praecipue ad basin segmentorum paenultimorum confluentes, *INDUSIIS* angustis membranaceis homomorphis. — *Species 2, altera incola Africae occidentalis, altera per regiones calidiores Africae continentalis et insularis dispersa, etiam in Novo Orbe obvia, sed rara. Genus a Pteride, quicum cl. METTENIUS junxit, segmentis ultimis apice sterilibus dignoscendum.*

1. LONCHITIS HIRSUTA BORY: frondibus herbaceis vel subchartaceis utrinque griseo-hispido-pubescentibus, deltoideis vel lanceolatis, bi- vel tripinnatifidis, segmentis rotundatis obtusis, areolis inter costam et marginem segmentorum 3—4-seriatis.

Lonchitis hirsuta Bory, *Itin.* I. 321. Swartz, *Syn. Fil.* 93.

Lonchitis pubescens Willd. *Mss. Kaulf. Enum.* 195. Presl, *Tent.* 163. Hook. *Sp. Fil.* II. 56. Ettingsh. l. c. t. 65. fig. 1. 2. 7.

Pteris pubescens Kuhn, *Fil. Afr.* 88.

Lonchitis tomentosa Fée, *Gen. Fil.* 143.

Lonchitis Lindeniana Hook. *Sp. Fil.* II. 56. t. 89 A.

Lonchitis macrochlamys Fée, *Gen. Fil.* 142.

CAUDEX erectus, PALEIS lanosis brunneis erectis densis 4—6 lin. longis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, griseo-straminei, 12—18 poll. longi, pills patentibus lanosis ferrugineis 1—1½ lin. longis sparse vestiti. LAMINA herbacea vel subcoriacea, saturate viridis, utrinque dense griseo-hispido-pubescentibus, oblongo-lanceolata, 1½—2 pedes longa, 10—15 poll. lata, apice pinnatifida, deorsum bipinnatifida. PINNAE solutae 10—12-jugae, superiores approximatae, inferiores laxae, patentes, anguste lanceolatae, 6—9 poll. longae, 1½—2 poll. latae, sessiles, obtusae vel subacutae, profunde pinnatifidae, PINNULIS oblongis obtusis subintegris, inferioribus 5—6 lin. latis. AREOLAE inter costam et marginem segmentorum pleraeque triseriatae; costales depressae, elongatae; exteriores subhexagonae, subaeque longae ac latae, omnes exappendiculatae.

Habitat in prov. Bahiae: Blanchet; et in Sebastianopolitana: Glaziou 2313:—Praeterea incolit Columbianam (Linden 543!) et regiones subtropicas Africae continentalis et insularis.

VII. CHEILANTHES SWARTZ.

CHEILANTHES Swartz, *Syn. Fil.* 126. Willd. *Sp. Plant.* V. 455. Presl, *Tent.* 160. Hook. et Bauer, *Gen. Fil. tab.* 106 B. Hook. *Sp. Fil.* II. 75. Metten. *Farnsgattungen* 5. tab. 3. (Notochlaena exclusâ) et Aucutt. — PHYSAPTERIS Presl, *Tent.* 160. — MYRIOPTERIS Fée, *Gen. Fil.* 148. tab. 12. 28. 29. ex parte. — ALEURITOPTERIS Fée, *Gen. Fil.* 153. tab. 12 B. — PLECOSORUS Fée, *Gen. Fil.* 150. tab. 13 A. Moore, *Ind. Fil. p.* XL. tab. 28. — ADIANTOPSIS Fée, *Gen. Fil.* 145. Moore, *Ind. Fil. p.* XXVII. et 17. tab. 25 B.

SORI marginales vel parum intramarginales, primum rotundati distincti, apicem venularum singularum occupantes, demum saepe plus minus confluentes. INDUSIA rotundata vel plus minus confluentia.

Tabula nostra XLII. Fig. V. VI. et XLIII. Fig. I.

CAUDEX erectus vel breviter repens. STIPITES cum caudice continui, fasciculati vel subfasciculati, castanei, nitidi, in speciebus nostris nudi. PALEAE parvae. FRONDES pleraeque parvae, deltoideae, tri- vel quadripinnatifidae, segmentis ultimis parvis, inter species nostras in unica simpliciter pinnatae, in reliquis bipinnatae vel in una digitato-radiatae, divisionibus simpliciter pinnatis. LAMINA plerumque coriacea, interdum (Aleuritopteris) infra pulverem ceraceo albo vel flavo obiecta. VENAE pinnatae, semper liberae. SORI marginales ex apice singularum venularum, vel parum intramarginales infra earum apicem (Plecisorus) pronascentes, rotundati, semper distincti vel demum plus minus confluentes. INDUSIA e margine

frondis recurvato mutato formata, angusta, supera, distincta rotundata (Adiantopsis), vel plus minus confluentia. — Species 50—60 per regiones tropicas et extra-tropicas utriusque hemisphaerii late dispersae, multae americanae sed paucae brasilienses.

CLAVIS SPECIERUM.

§. 1. ADIANTOPSIS. Sori (sicut indusia) semper rotundati, distincti, segregati. — *Tabula nostra XLII. Fig. V.*

- a. Lamina simpliciter pinnata 1. CH. MONTICOLA.
- b. Lamina bipinnata 2. CH. REGULARIS.
- c. Lamina digitato-radiata, divisionibus simpliciter pinnatis. 3. CH. RADIATA.
- d. Lamina ovato-delloidea, tri- vel quadripinnatifida.
 1. Lamina 1½—2 poll. longa 4. CH. INCISA.
 2. Lamina pedalis vel bipedalis, erecta, rachibus strictis prorsus rectis 5. CH. CHLOROPHYLLA.
 3. Lamina subpedalis, debilis, rachibus pergracilibus angulatum flexuosis.
 - * Raches nuda 6. CH. DICHOTOMA.
 - ** Raches glanduloso-pubescentes. 7. CH. GLANDULOSA.

§. 2. EUCHEILANTHES. Sori (ut indusia) contigui, plus minus confluentes; segmenta plana. — *Tabula nostra XLII. Fig. VI.*

1. Lamina simpliciter pinnata, anguste ligulata, glanduloso-pubescentibus 8. CH. MICROPTERIS.
2. Lamina glabra, oblongo-lanceolata, bipinnata. 9. CH. MICROPHYLLA.
3. Lamina glanduloso-pubescentibus, ovato-delloidea, tri-pinnata 10. CH. FLEXUOSA.

§. 3. PHYSAPTERIS. Sori (ut indusia) contigui, confluentes; segmenta parva, rotundato-bullata. — *Tabula nostra XLIII. Fig. I.* 11. CH. REGNELLIANA.

§. 4. ALEURITOPTERIS. Sori (sicut indusia) plus minus confluentes. Frondes subtus albo- v. flavo-pulverea. 12. CH. FARINOSA.

§ 1. ADIANTOPSIS.

1. CHEILANTHES MONTICOLA GARDN. frondibus glabris lineari-lanceolatis simpliciter pinnatis, rachibus ebeneis nudis, pinnis sessilibus contiguis subdimidiato-oblongis, basi superiore producta auriculata, inferiore cuneato-truncata, margine exteriori rotundato, venis sublabellatis; soris contiguis rotundatis, nunquam confluentibus.

Cheilanthes monticola Gardn. in Hook. *Ic. Plant.* t. 487.

Metten. Cheil. n. 57. p. 41. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 131.

Adiantopsis monticola Moore, *Ind. Fil.* 18.

Hypolepis Gardneri Hook. *Sp. Fil.* II. 74. t. 92 B.

CAUDEX herbaceus, erectus, PALEIS parvis castaneis lineari-subulatis coronatus. STIPITES dense fasciculati, 6—9 lin. longi, erecti, pergraciles, castanei, glabri, parvae paleae. LAMINA lineari-lanceolata, 2½—3 poll. longa, 8—9 lin. lata, papyraceo-herbacea, utrinque nuda, modice viridis, simpliciter pinnata, apice pinnatifida, pinnis deciduis basi articulatis. RACHIS ebenea, nuda, nitida, stricta. PINNAE infra apicem pinnatifidum 12—16-jugae, contiguae, inferiores laxiores paulo reductae, mediae 3½—4 lin. longae, 2 lin. latae, omnes sessiles, horizontaliter patentes, subdimidiato-oblongae, margine interiore recto integro cum rache prorsus contiguo, superiore subrecto parum crenato, angulo interiore plus minus auriculato, exteriori obtuse rotundato, inferiore subrecto, basi cuneato-truncata. VENAE inconspicuae, immersae, e venâ mediana irregulari flabellatae, pleraeque unifurcatae. SORI rotundati, contigui sed non confluentes, secundum margines oppositos pinnarum basi inferiore excepta impositi, venulas singulas terminantes, 8—12 pro pinna maxima. INDUSIA obverse reniformia, scariosa, nuda.

Habitat in prov. Goyaz, Serra da Natividade: Gardner n. 3537! — Hamdryas.

2. CHEILANTHES REGULARIS METTEN. frondibus glabris lanceolatis bipinnatis, rachibus ferrugineo-pubescentibus, pinnis ligulatis laxis horizontaliter patentibus, pinnulis 7—8-jugis contiguis breviter petiolatis integris inaequilateraliter oblongis, basi superiore producta angulata, inferiore cuneato-truncata, venis pinnatis, soris contiguis rotundatis, nunquam confluentibus.

Tabula nostra LVI. (habitus et analysis).

Cheilanthes regularis Metten. Cheil. n. 56. p. 41. Hook. et Baker, Syn. Fil. 134.

Adiantum regulare Kunze, Fil. II. 66.

Adiantopsis regularis Moore, Ind. Fil. p. XXXVI.

Cheilanthes crenulata Beyrich Mss.

CAUDEX erectus. Paleae nullae. STIPITES 7—9 poll. longi, dense fasciculati, erecti, stricti, teretes, ebenei, pilis mollibus ferrugineis brevibus vestiti. LAMINA subcoriacea, utrinque opacoviridis, lanceolata, bipinnata, 9—12 poll. longa, $3\frac{1}{2}$ —4 poll. lata. RACHES strictae, ebeneae, ferrugineo-pubescentes. PINNAE 9—10-jugae, horizontaliter patentes, laxae, ligulatae, inferiores mediis subaequales, 1 $\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, 5—6 lin. latae, brevissime petiolatae; pinna terminalis reliquis similis, breviter petiolata. PINNULAE 7—8-jugae, contiguae, $3\frac{1}{2}$ —4 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae, alternae, breviter petiolatae, inaequilateraliter oblongae, marginibus integris, apice subobtusis, dimidio superiore producto basi angulato, dimidio inferiore reducto basi cuneato-truncato. VENAE e venâ mediana distincta pinnatae; venulae simplices, erecto-patentes, 5—6-jugae. SORI rotundati, subcontigui sed distincti, secundum utrumque marginem pinnarum, basi inferiore excepta, dispositi, venulas singulas terminantes, 6—9 pro pinnula maxima. INDUSIUM membranaceum, pallidum, margine tenuiter ciliatum.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Bongard n. 253, Glaziou 2321!; e. gr. prope Nova Friburgo: Beyrich. — Dryas.

3. CHEILANTHES RADIATA R. BR. frondibus glabris chartaceo-herbaceis rotundatis, divisionibus 6—9 digitato-radiatis simpliciter pinnatis, rachibus strictis castaneo-ebeneis nudis nitidis, pinnis ligulatis, pinnulis parvis sessilibus contiguis, 30—60-jugis subdimidiato-oblongis integris, basi superiore producta auriculata, inferiore cuneato-truncata, venis pinnatis inconspicuis immersis; soris subcontiguis v. distinctis rotundatis nunquam confluentibus.

Tabula nostra XLII. Fig. V. (analysis) et XXIII. Fig. 17. 18. (pinna et frons sterilis parva).

Plumier Fil. tab. 100.

Cheilanthes radiata R. Brown in Herb. Banks. J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 159. Bot. Mag. 1846. Comp. 20. Metten. Fil. Hort. Lips. 52. Cheil. n. 58. p. 42. t. 27. Brack. Fil. Un. St. Expl. 92. Lowe, Ferns IV. t. 14. Hook. et Baker, Syn. Fil. 132. Eitingsh. Farnkr. t. 48. fig. 3—4.

Adiantum radiatum Linn. Sp. Pl. 1556. Swartz, Syn. Fil. 121. Willd. Sp. Pl. V. 437. Vell. Fl. Flum. XI. t. 95. et Auctt.

Hypolepis radiata Hook. Sp. Fil. II. 72. t. 91 A.

Adiantopsis radiata Fée, Gen. Fil. 145. Moore, Ind. Fil. 18.

CAUDEX erectus, lignosus, PALEIS parvis castaneis lineari-subulatis dense coronatus. STIPITES fasciculati, 12—18 poll. longi, erecti, stricti, castaneo-ebenei, nudi, nitidi. LAMINA chartaceo-herbacea, utrinque nuda, opaco-viridis, rotundata, 12—18 poll. longa et lata, divisionibus (pinnis) 6—9 digitato-radiatis, basi involuero cinctis. Segmenta involucentia inter petiolos pinnarum disposita, ovato-deltaeidea, congesta, sessilia, 1—2 lin. longa. RACHES pinnarum strictae, nuda, ebeneae. PINNAE breviter petiolatae, 6—12 poll. longae, 6—9 lin. latae, e medio sursum et deorsum

sensim angustatae, inferiores deflexae reliquis minores. PINNULAE contiguae, 30—60-jugae, sessiles, subdimidiato-oblongae, mediae 3—5 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae, margine interiore recto cum rache prorsus contiguo, superiore subrecto basi auriculâ deltoideâ donato, exteriore rotundato obtuso vel subacuto, inferiore subrecto basi cuneato-truncato. VENAE immersae, inconspicuae, e venâ mediana pinnatae, obliquae, 6—9-jugae, superiores simplices, inferiores furcatae. SORI 12—18 pro pinnula, rotundati, parvi, semper distincti licet saepe contigui, secundum utrumque marginem, basi inferiore excepta, dispositi. INDUSIUM rotundatum, pallidum, chartaceum, nudum.

Obs. Variat, teste METTENIO, stipitibus et rachibus anguste membranaceo-alatis.

Habitat per totam Americam tropicam in praeruptis viarum, margine sylvarum, in saxis etc. Intra Brasiliam lecta est in prov. S. Catharinae: Chamisso, Fritz Müller!; in prov. Rio de Janeiro, e. gr. Serra dos Orgãos, Corcovado etc.: Langsdorff!, Raddi!, D'Orbigny, Pohl, Schott, Riedel, Gardner 57!, Bunbury, Burchell 1821!, Glaziou 942!, Mart. Herb. Fl. Bras. 356!; in prov. Minas Geraes: Serra do Chumbo: Pohl; in Bahiensi, e. gr. ad Almada: Blanchet 2457! 2246!, Princ. Newwied; in prov. Goyaz: Burchell 4530! — Vaga et Extrabrazil.

4. CHEILANTHES INCISA KUNZE: frondibus glabris parvis deltoideis tripinnatifidis, rachibus castaneis glabris, pinnis contiguis 5—6-jugis distincte petiolatis, inferioribus deltoideis, superioribus sensim decrescentibus, pinnulis distincte petiolatis oblongo-deltaeideis, segmentis paucis remotis linearibus, venis solitariis in segmentis omnium graduum; soris sparsis rotundatis.

Cheilanthes incisa Kunze Mss. Metten. Cheil. n. 65. p. 44. tab. 28—31. Hook. et Baker, Syn. Fil. 133.

CAUDEX herbaceus, breviter repens, PALEIS subulatis castaneis rigidis vestitus. STIPITES subfasciculati, stricti, erecti, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longi, castanei, nudi, nitidi. LAMINA chartacea, viridis, utrinque glabra, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longa, deorsum 12—15 lin. lata, deltoidea, tripinnatifida. PINNAE 5—6-jugae, contiguae, erecto-patentes, distincte petiolatae, inferiores maximae, deltoeidae, 8—9 lin. longae, 4—5 lin. latae, superiores sensim decrescentes. PINNULAE oblongo-deltaeidae, distincte petiolatae, SEGMENTIS paucis laxis linearibus acutis erecto-patentibus. VENAE medianae, solitariae in segmentis omnium graduum. SORI sparsi, rotundati, 3—4 in pinnulis infimis. INDUSIUM pallidum, nudum.

Habitat in Serra d'Estrella prov. Rio de Janeiro: Bongard, Glaziou 2336! — Dryas.

5. CHEILANTHES CHLOROPHYLLA SWARTZ: frondibus glabris chartaceo-herbaceis ovato-lanceolatis tripinnatifidis vel tripinnatis, rachibus strictis castaneis nudis, pinnis breviter petiolatis lanceolato-deltaeideis, pinnulis numerosis sessilibus contiguis lanceolatis pinnatis vel pinnatifidis, segmentis integris ligulato-oblongis, venis subpinnatis; soris numerosis rotundatis contiguis, nunquam confluentibus.

Tabula nostra XXIII. Fig. 15. 16. (apex frondis et pinnula).

Cheilanthes chlorophylla Swartz in Vet.-Acad. Handl. (Stockholm.) 1817. p. 76. Spreng. Syst. Veg. IV. 116. Kunze, Linnaea XXIII. 243. Mett. Cheil. n. 60. p. 42. Moore, Ind. Fil. 237. Hook. et Baker, Syn. Fil. 133. Eitingsh. Farnkr. t. 48. fig. 13—15.

Cheilanthes brasiliensis Raddi, Fil. Bras. 60. t. 75. fig. 2.

Cheilanthes spectabilis Kauf. Enum. Fil. 214. J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 159. Brack. Fil. U. St. Expl. 92. Mett. Fil. Hort. Lips. 52. Lowe, Ferns 4. t. 15.

Hypolepis spectabilis Link, Sp. Fil. 67. Hook. Sp. Fil. II. 73. t. 88 B.

Adiantopsis chlorophylla et spectabilis Fée, Gen. Fil. 145.

Aspidium conifolium Presl, Del. Prag. I. 175.

Hypolepis conifolia Presl, Tent. 162.

CAUDEX lignosus, breviter repens, crassitie digituli, PALEIS castaneis parvis lineari-subulatis dense vestitus. STIPITES subfasciculati vel parum segregati, 12—18 poll. longi, erecti, stricti, castanei, glabri, nitidi, deorsum paulo palaeaci. LAMINA ovato-lanceolata, chartaceo-herbacea, utrinque opaco-viridis, 1—2 pedes longa, 4—8 poll. lata, tripinnatifida vel tripinnata. RACHES strictae, nudae, nitidae, castaneae. PINNAE solutae 12—18-jugae, contiguae, parum adscendentes, alternae vel suboppositae, inferiores mediis aequales vel paulo majores, lanceolato-deltaeidae, breviter petiolatae, 2—5 poll. longae, deorsum 1—2½ poll. latae, sursum sensim decrescentes. PINNULAE contiguae, sessiles, lanceolatae, pinnarum imarum 12—20-jugae, pinnatae vel raro pinnatifidae, segmentis integris ligulato-oblongis ½—1½ lin. latis. VENAE inconspicuae, immersae, subpinnatae, centralis vix apicem segmentorum attingens, venulis lateralibus 3—5-jugis, laxis, furcatis. SORI rotundati, numerosi, contigui sed nunquam confluentes, 6—12 pro segmentis maximis. INDUSIUM pallidum nudum.

Habitat in prov. S. Catharina: Chamisso, Fritz Müller!; in prov. Rio Grande do Sul: Fox!, Tweedie!; in prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Sello!, Pohl, Gardner 198!, Burchell 1973! 2201!; et in prov. Minarum: Freyreiss, Langsdorff!, Gardner 5296!, Lindberg 588! — Praeterea in ditone Montevidensi: Capit. King!, Gibert!, et in Andibus Quitensibus: Schlim 620! — Vaga et Extrabrazil.

6. CHEILANTHES DICHOTOMA SWARTZ: frondibus glabris chartaceis intricatis irregulariter oblongis quadripinnatifidis, rachibus omnium graduum pergracilibus castaneis nitidis nudis insigniter angulatis flexuosis, pinnis laxis deltoideis patentibus longe petiolatis, pinnulis paucis laxis patentibus petiolatis, inferioribus lanceolatis, segmentis parvis deltoideis obtusis tri-vel quinquepartitis, venis obscuris pinnatis; soris sparsis rotundatis.

Cheilanthes dichotoma Swartz, Syn. Fil. 129. 335. tab. 3. fig. 7. Willd. Sp. Plant. V. 460. Presl, Tent. Pter. 160. Hook. Sp. Fil. II. 104. tab. 102 B. et Auctt.

Pteris dichotoma Cav. Mss. Swartz, Syn. Fil. 335.

Adiantum dichotomum Poir. Enc. Suppl. I. 143.

Adiantopsis dichotoma Moore, Ind. Fil. 17.

Hypolepis trifida Klotzsch Mss.

Cheilanthes microphylla Bongard Mss., non Swartz.

CAUDEX herbaceus, erectus vel oblique adscendens, PALEIS parvis rigidis castaneis subulatis vestitus. STIPITES fasciculati, 4—8 poll. longi, castanei, nitidi, nudi, pergraciles, debiles, adscendentes. LAMINA chartaceo-herbacea, utrinque viridis, omnino nuda, irregulariter oblonga, tri-vel quadripinnatifida, 8—12 poll. longa, 4—5 poll. lata. RACHES omnium graduum pergraciles, castaneae, nudae, insigniter angulatis flexuosae. PINNAE horizontaliter patentibus, laxae, alternae, deltoideae, distincte petiolatae, 1½—2 poll. longae, 12—15 lin. latae, inferiores reliquis subaequales. PINNULAE 3—5-jugae, horizontaliter patentibus, laxae, inferiores lanceolatae, 6—8 lin. longae, superiores sensim decrescentes. SEGMENTA laxa, inferiora breviter petiolata, ovato-deltaeidea, obtusa, 3—5-nata, 1½—2 lin. longa et lata, inferiora minora sessilia. VENAE immersae, obscurae, pinnatae. SORI parvi, sparsi, rotundati, distincti.

Habitat ad Megaponte prov. Goyaz: Pohl!, et loco non indicato Brasiliae australis; Sello! — Etiam in Uruguay: Baird! — Oreas? et Extrabrazil.

Obs. Item Andes Quitenses inhabitare dicitur, nec tamen teste SWARTZ, an recte?

§ 2. EUCHEILANTHES.

7. CHEILANTHES GLANDULOSA SWARTZ: frondibus glanduloso-pubescentibus chartaceis irregulariter oblongis quadripinnatifidis, rachibus filiformibus flexuosis glanduloso-pubescentibus, pinnis laxis lanceolato-deltaeideis petiolatis, pinnulis inaequaliter ovato-lanceolatis sessilibus pinnatifidis vel pinnatis, basi inferiore cuneata, segmentis cuneato-ovatis pinnatifidis vel crenatis, venis distinctis; soris sparsis rotundatis.

Polypod.

Cheilanthes glandulosa Swartz, Stockholm. Vet. Acad. Handl. 1817. p. 77. Metten. Cheil. p. 43. tab. 3. fig. 32.

Nondum vidi, igitur descriptionem SWARTZII repeto. „FRONS elongata, bipedalis et forsitan ultra, laxa, tripinnata. PINNAE primariae alternatim et remote e rachi filiformi tereti flexuosa scabriuscula pubescente exeuntes, longitudine fere aequales, petiolatae, triangulato-lanceolatae, triunciales, sursum curvatae; inferiores steriles, superiores soriferi. Secundariae alternae, ovatae, pollicares. PINNULAE (inferiores) ovatae, incisae, laciniis linearibus obtusis, et, si attente observantur, apice emarginatis; superiores (fertiles) tantum crenolatae, margine inflexae, consistentia omnium rigidiuscula, utrinque pubescentia glandulifera obsita. Color laete viridis. SORI solitarii in margine superiore pinnularum terminalium, minutissimi. INDUSIA membranacea, albida. — Species etiam obscura, habitu valde singulari, a rachi longissima flexuosa scandentis naturae apparet; in completioribus examinanda.“

Habitat in prov. Minas Geraes, juxta urbem Ouro Preto, olim Villa Rica: Freyreiss. — Oreas.

8. CHEILANTHES MICROPTERIS SWARTZ: frondibus coriaceis anguste ligulatis simpliciter pinnatis rachibusque dense glanduloso-pubescentibus, pinnis parvis sessilibus 30—40-jugis rotundatis vel oblongis subpinnatifidis, marginibus (siccitate) revolutis, venis occultis; soris rotundatis, plus minus confluentibus.

Cheilanthes micropteris Swartz, Syn. Fil. 126. et 324. tab. 3. fig. 5. Willd. Sp. Plant. V. 455. Presl, Tent. 160. Hook. Sp. Fil. II. 76. et Auctt.

Adiantum micropteris Poir. Enc. Suppl. I. 141.

Pteris microphylla Cavan. Mss. Swartz, Syn. Fil. 324.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS ferrugineis lineari-subulatis membranaceis 2—3 lin. longis dense vestitus. STIPITES fasciculati, graciles, stricti, erecti, castanei, 1—3 poll. longi, glandulosi, paullulum palaeaci. LAMINA coriacea, obscure viridis, ligulata, 3—6 poll. longa, 3—4 lin. lata, simpliciter pinnata, dense breviter griseo-pubescentibus et glandulosa. RACHES strictae, castaneae, glandulosae. PINNAE sessiles, horizontaliter patentibus, contiguae, 30—40-jugae, rotundatae vel oblongae, 1½—2 lin. longae, pinnatifidae, marginibus siccitate valde revolutis, superiores sensim decrescentes, inferiores laxiores paulo reductae. VENAE omnino obscurae. SORI et INDUSIA rotundata plus minus confluentia.

Habitat in Brasilia australi loco proprio non indicato: Sello! — Item in ditone Argentina: Tweedie!, in Peruvia, Meyen!, et in Andibus Quitensibus, teste Swartz.

Obs. *C. Matthewsii* Kunze probabiliter lusus est amplior, magis expansus, statione humida exortus.

9. CHEILANTHES MICROPHYLLA SWARTZ: frondibus chartaceis glabris oblongo-lanceolatis bipinnatis, rachibus strictis castaneis nudis, pinnis patentibus laxis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis, pinnulis sessilibus oblongo-ligulatis inciso-crenatis, venis immersis inconspicuis; soris subtrotundatis, plus minus confluentibus.

Tabula nostra XLII. Fig. VI. (analysis).

Cheilanthes microphylla Swartz, Syn. Fil. 127. Willd. Sp. Plant. V. 458. Hook. Sp. Fil. II. 84. t. 98 A. Metten. Cheil. 32. n. 36. et Auctt.

Cheilanthes Tweediana Hook. Sp. Fil. II. 84. t. 96 B.

Cheilanthes pygmaea Klotzsch, Linnaea XX. 338. Hook. Sp. Fil. II. 88.

Cheilanthes elongata Willd. Mss. Kaulf. Enum. Fil. 213. Hook. Sp. Fil. II. 86. Mett. Cheil. p. 33. n. 38.

Planta valde variabilis. Descriptionem ejus e speciminibus Tweedianis comparatam trado. CAUDEX plus minus repens, lignosus, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis subulatis ferrugineis dense vestitus. STIPITES segregati, stricti, castanei, nitidi, nudi, 2—4 poll. longi. LAMINA

chartacea, utrinque perfecte glabra, supra opaco-viridis, infra pallidior, oblongo-lanceolata, 4—9 poll. longa, 15—18 lin. lata, bipinnata. RACHES castaneae, nitidae, strictae, nuda. PINNAE 15—25-jugae, horizontaliter patentes, breviter petiolatae, mediae laxae oblongo-lanceolatae 6—9 lin. longae 4—5 lin. latae, inferiores paulo reductae. PINNULAE infra apicem pinnarum 4—6-jugae, laxae, horizontaliter patentes, sessiles, ligulato-oblongae, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. latae, explanatae, paullulum inciso-crenatae. VENAE obscurae, immersae, pinnatae, venulis obliquis furcatis. SORI et INDUSIA rotundata, plus minus confluentia.

Habitat ad ripas fluvii Parana Brasilia australis: Tweedie!, in prov. Corrientes: D'Orbigny, et in occidentali continentis parte inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Napaea et Extrabrazil.

10. CHEILANTHES FLEXUOSA KUNZE: frondibus chartaceis glanduloso-pubescentibus ovato-deltaeideis tripinnatis, rachibus strictis castaneo-ebeneis subpubescentibus, pinnis subpatentibus breviter petiolatis contiguus lanceolato-deltaeideis, pinnulis lanceolatis laxis breviter petiolatis, segmentis explanatis inaequaliter oblongis obtusis inciso-crenatis vel pinnatifidis, venis immersis inconspicuis pinnatis; soris subrotundatis, parum confluentibus.

Tabula nostra LVII. (Habitus et analysis).

Cheilanthes flexuosa Kunze, Linnaea XXII. 578. Hook. Sp. Fil. II. 104. Mett. Cheil. n. 61. p. 42. (excl. β . minor), non Hook. et Baker, Syn. Fil. 138. quae potius C. Regnelliana. Cheilanthes microphylla Bong. Mss., non Swartz.

CAUDEX lignosus, crassitie pennae corvinae, breviter repens, PALEIS lineari-subulatis parvis castaneis vestitus. STIPITES parum segregati, erecti, stricti, castaneo-ebenei, nitidi, nudi, 2—4 poll. longi. LAMINA chartacea, opaco-viridis, utrinque praecipue infra glandulosa et breviter pubescens, ovato-deltaeidea, 5—8 poll. longa, 3—4 poll. lata, tripinnata. RACHES strictae, castaneo-ebeneae, subpubescentes. PINNAE contiguae, 10—12-jugae, breviter petiolatae, parum adscendentes, inferiores lanceolato-deltaeideae, 2 poll. longae, 1 poll. latae, superiores sensim decrescentes. PINNULAE subpatentes, 6—8-jugae, laxae, inferiores lanceolatae, pinnatae, breviter petiolatae. SEGMENTA inaequaliter oblonga, explanata, 1 lin. vel ultra lata, inciso-crenata vel subpinnatifida, margine superiore deorsum producta, inferiore cuneato-truncata, inferiora subpetiolata. VENAE inconspicuae, immersae, pinnatae; venulis laxis 4—5-jugis, inferioribus furcatis. SORI rotundati, 6—8 pro segmentis maximis; INDUSIA scariosa, subrotundatis, distinctis vel subconfluentibus.

Habitat ad Megaponte prov. Goyaz: Poht, Riedel. — Oreas.

§ 3. PHYSAPTERIS.

11. CHEILANTHES REGNELLIANA METT. frondibus coriaceis inconspicue glanduloso-pubescentibus oblongo-lanceolatis bipinnatis, rachibus strictis castaneis subpubescentibus, pinnis numerosis anguste-linearibus sessilibus horizontalibus parallelis, inferioribus reductis, pinnulis laxis sessilibus perparvis rotundato-bullatis, marginibus valde incurvatis, venis occultis; soris prorsus confluentibus.

Tabula nostra XLIII. Fig. I. (analysis).

Cheilanthes Regnelliana Mett. Mss., teste Kuhn. Cheilanthes flexuosa var. minor Kunze, Linnaea XXII. 578. Hook. Sp. Fil. 104. Mett. Cheil. 43. Cheilanthes flexuosa Hook. et Baker, Syn. Fil. 138. quoad descriptionem (nec Kunze).

CAUDEX lignosus, crassitie pennae corvinae, repens, flexuosus, PALEIS parvis rigidis subulatis castaneis adpressis vestitus. STIPITES segregati, 1—2 poll. longi, pergraciles, flexuosi, nudi, nitidi, castanei. LAMINA co-

riacea, opaco-viridis, utrinque delicate glandulosa et griseo-pubescentibus, oblongo-lanceolata, 2—3 poll. longa, 15—24 lin. lata, bipinnata. RACHES strictae, castaneae, paulo pubescenti-glandulosae. PINNAE omnino horizontaliter patentes, 15—20-jugae, alternae, rigidae, subsessiles, anguste lineares, parallelae, 8—12 lin. longae, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. latae, paucae imarum reductae. PINNULAE 8—12-jugae, sessiles, laxae, primum ovato-oblongae, deorsum inciso-crenatae, demum perfecte rotundato-bullatae, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ lin. latae, marginibus valde incurvatis. VENAE omnino occultae. SORI et INDUSIA prorsus confluentia.

Habitat locis sterilibus prov. Minarum: Regnell; e. gr. in fissuris rupium humo tectis ad Caldas: Lindberg n. 586! — Oreas.

Obs. Planta singularis, genuina *Physapteris*, a *Cheil. flexuosa* optime differt, ut. beat. Mettenius jam crederat, nobis nunc specimenibus Lindbergianis probatur.

§ 4. ALEURITOPTERIS.

11. CHEILANTHES FARINOSA KAULF. frondibus papyraceo-herbaceis, supra nudis, infra albo-pruinatis, lanceolato-deltaeideis tripinnatifidis, rachibus strictis castaneis nudis, pinnis sessilibus, superioribus lanceolatis pinnulis oblongo-ligulatis integris, inferioribus majoribus pinnulis pinnatifidis, imis maximis deltaeideis pinnulis posticis productis profunde pinnatifidis; soris rotundatis crebro confluentibus.

Cheilanthes farinosa Kaulf. Enum. 212. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 134. Hook. Sp. Fil. II. 77. Ettingsh. l. c. t. 48. fig. 2. 5. 6. Beddome, Fil. South-Ind. t. 191.

Pteris farinosa Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 187. Lam. Encycl. V. 178. Swartz, Syn. Fil. 105. Willd. Spec. V. 397.

Pteris argyrophylla Swartz, Syn. Fil. 105.

Cheilanthes dealbata Don, Prodr. Fl. Nep. 16.

Allosorus argyrophyllus, farinosus, dealbatus et pulveraceus Presl, Tent. 153.

Aleuritopteris argyrophylla, dealbata, indica et mexicana Fée, Gen. Fil. 154.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS linearibus castaneis membranaceis 1—2 lin. longis sparse vestitus. STIPITES caespitosi, 3—6 poll. longi, castanei, glabri, nitidi, deorsum paleis iis caudicis similibus vestiti. LAMINA lanceolato-deltaeidea, 3—12 poll. longa, 3—6 poll. lata, tripinnatifida, papyraceo-herbacea, supra nuda saturate viridis, infra pulvere albo plus minusve dense vestita. PINNAE pinnatifidae 6—15-jugae, sessiles, contiguae, paullulum adscendentes; superiores lanceolatae, pinnulis oblongo-ligulatis obtusis integris vel leviter crenulatis, inferiores sensim majores; imae maximae, inaequaliter deltaeideae, $1\frac{1}{2}$ —3 poll. longae, 12—21 lin. latae, pinnulis posticis productis, imis quam reliquae multo majoribus profunde pinnatifidis. RACHIS stricta, castanea, nuda. VENAE occultae, in segmentis pinnatae, omnino liberae. SORI marginales rotundati conferti, sicut INDUSIA glabra griseo-brunnea copiose confluentes.

Species inter tropicos utriusque hemisphaerii disseminata, in Brasilia autem rarissima. Lecta est a Pohliu, loco quidem accuratius non indicato.

Obs. *Cheil. glandulosa Fée* (Gen. Fil. p. 158.) Filix est nobis omnino ignota. Cl. auctor haec tradit: „frondibus lanceolatis tripinnatis, pilis glandulosis septatis pellucidis obsitis, stipite flaccido rufo, rache hirsutissima, pinnis lanceolatis assurgentibus, segmentis hirtis pinnatifidis, lobulis fissis, sterilibus planis, fertilibus bullato-crispis; sporangiis ovatis, indusio obsoleto, annulo 16—18-articulato, sporis trigonis“.

Habitat in Brasilia: Claussen.

Filix elata, hirsuto-viscosa, pinnis numerosis contractis.

Longueur totale 54—60 cent., dont le stipe fait un peu moins de la moitié; les pinnules, redressées contre le rachis, ont de 6—7 cent. sur 2 environ d'envergure.

C'est l'une des plus grandes espèces du genre. Les poils sont de même nature que ceux du *C. viscosa*, à fronde triangulaire ayant un port tout différent“.

VIII. CASSEBEERA KAULF.

CASSEBEERA Kaulf. Enum. Fil. 216. tab. 1. fig. 11. Presl, Tent. Pter. 155. tab. 6. fig. 6-7. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 66 A. Fée, Gen. Fil. 119. Hook. Sp. Fil. 117. et Auctt. — Adianti species Lam., Smith, Swartz, Willd. — Pteridis sp. Mett. Fil. Hort. Lips.

SORI rotundati vel oblongi, parum intra marginem incrassatum frondis pronascentes, quoad venulas tamen perfecte terminales, INDUSIIS homomorphis.

Tabula nostra XLIII. Fig. II.

CAUDEX lignosus, plus minus repens, PALEIS dense vestitus. STIPITES cum caudice continui, segregati vel subfasciculati, erecti, stricti, nitidi, castanei. FRONDES coriaceae, glabrae, parvae vel mediocres, ternato-pedatae vel pinnatis compositae. VENAE pinnatae, obscurae, liberae. SEGMENTA linearia, marginibus (siccitate) plerumque revolutis. SORI parum intra margines crenarum vel segmentorum impositi, rotundati vel deorsum oblongi vel sublineares, INDUSIIS homomorphis angustis superis membranaceis vel coriaceis. Margo frondis extra soros indusio angustior, incrassatus. — Species 3 brasilienses, raras.

CLAVIS SPECIERUM.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Lamina ternato-pedata | 1. C. TRIPHYLLA. |
| 2. Lamina simpliciter pinnata vel deorsum bipinnata, pinnulis inciso-crenatis | 2. C. PINNATA. |
| 3. Lamina bipinnata vel deorsum tripinnata, segmentis quadrangularibus 10—20-jugis | 3. C. GLEICHENIOIDES. |

1. CASSEBEERA TRIPHYLLA KAULF. frondibus parvis coriaceis utrinque glabris ternato-pedatis, divisionibus sessilibus linearibus inciso-crenatis simplicibus vel lateralibus e basi inferiore furcatis, costis deorsum ebeneis, venulis occultis obliquis furcatis; soris rotundatis vel lineari-oblongis.

Cassebeera triphylla Kaulf. Enum. Fil. 216. Spreng. Syst. IV. 118. Presl, Tent. Pter. 155. tab. 6. fig. 6. Fée, Gen. Fil. 119. Icon. Nouv. tab. 12. fig. 5. Hook. Sp. Fil. II. 118. et Auctt.

Adiantum triphyllum Lam. Enc. 1. 41. Smith, Icon. Pl. Inedit. t. 74. Swartz, Syn. Fil. 120. Willd. Sp. Plant. V. 428.

Pteris triphylla Metten. Fil. Hort. Lips. 56. t. 15. fig. 11—12.

CAUDEX lignosus, crassitie $1\frac{1}{2}$ —2 lin. attingens, breviter repens, PALEIS rigidis subulatis 1 lin. longis dense vestitus. STIPITES subfasciculati, erecti, 2—3 poll. longi, castaneo-ebeni, rigide flexuosi, nudi, nitidi. LAMINA coriacea, utrinque nuda, opaco-viridis, siccitate pallide brunnea, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longa et lata, ternato-pedata, ad basin in divisiones tres secta. PINNA intermedia erecta, anguste linearis, 6—18 lin. longa, deorsum $\frac{1}{2}$ —2 lin. lata, constanter simplex, apice acuto, marginibus inciso-crenatis, siccitate plus minus revolutis, basi cuneata; laterales erecto-patentes, simplices, terminali similes sed minores, vel e basi inferiore furcatae, segmento reliquis consimili obliquo minore. VENAE immersae, pinnatae; costa pinnarum deorsum conspicua ebenea, sursum brunnea, venulis obliquis

furcatis omnino occultis. SORI apices dentium parum intra marginem occupantes, $\frac{1}{3}$ —1 lin. longi, indusiis homomorphis rotundatis vel lineari-oblongis scariosis.

Habitat in Brasilia australi, loco proprio non indicato: Sello!, Tweedie 548!; ad Porto Alegre: Fox! — Item Bonariam et Montevideum incolit. — Napaea et Extrabrazil.

2. CASSEBEERA PINNATA KAULF. frondibus mediocribus coriaceis utrinque glabris ovato-deltaeideis simpliciter pinnatis vel deorsum bipinnatis, pinnis laxis patentibus 1—5-jugis, superioribus simplicibus linearibus inciso-crenatis, inferioribus distincte petiolatis saepe plus minusve compositis, pinnulis consimilibus, venulis occultis obliquis plerumque bifurcatis; soris rotundatis vel lineari-oblongis.

Cassebeera pinnata Kaulf. Enum. Fil. 217. tab. 1. fig. 11. Mart. Icon. Crypt. Bras. 91. t. 61. Presl, Tent. 155. Kunze, Anal. Pter. 37. t. 24. J. Smith in Hook. Journ. of Bot. IV. 159. Hook. Sp. Fil. II. 119. et Auctt.

Pteris pinnata Metten. Fil. Hort. Lips. 55.

Cassebeera petiolata Fée, Icon. Nouv. 30. t. 12. fig. 4. Moore, Ind. Fil. 224. (forma parva pinnis unijugis).

CAUDEX lignosus, crassitie $\frac{1}{2}$ —2 lin., plus minus repens, PALEIS subulatis ferrugineis dense vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, erecti, stricti, nitidi, castanei, 3—15 poll. longi. LAMINA coriacea, utrinque nuda, opaco-viridis, siccitate pallide brunnea, ovato-deltaeidea, 3—6 poll. longa et lata, simpliciter pinnata vel deorsum paulo composita. PINNAE laterales 1—5-jugae, subpatentes vel adscendentes, oppositae vel suboppositae, superiores sessiles, simplices, lineares, 1—2 poll. longae, 3—4 lin. latae, apice acuto vel subobtusum, marginibus inciso-crenatis siccitate revolutis, basi rotundata vel subcuneata; inferiores petiolo 1—4 lin. longo instructae, 6—15 lin. ab invicem distantes, simplices vel compositae, pinnulis simplicibus consimilibus sed minoribus 1—2-jugis. VENA mediana distincta, elevata, ebenea; venulae laterales obliquae, omnino occultae, pleraeque bifurcatae. SORI apices dentium parum intra marginem occupantes, sursum rotundati, deorsum sublineares, INDUSIIS angustis homomorphis scariosis.

Habitat locis saxosis umbrosis, rara. In Serra da Natividade prov. Goyaz: Gardner 3556!; in Serra d'Estrella: Langsdorff!, in prov. S. Pauli: Martius; et in prov. S. Catharina: Sello!, Chamisso. — Dryas, Oreas.

3. CASSEBEERA GLEICHENIOIDES GARDN. frondibus mediocribus coriaceis utrinque glabris irregulariter oblongis tri- vel quadripinnatis, pinnis laxis adscendentibus linearibus, superioribus simplicibus sessilibus, inferioribus petiolatis simplicibus vel subcompositis, pinnulis paucis consimilibus, segmentis 10—20-jugis subquadrangularibus aequae longis ac latis parum distantibus, venis occultis; soris apices segmentorum prorsus occupantibus.

Tabula nostra XLIII. Fig. II. (Analysis).

Cassebeera gleichenioides Gardn. in Hook. Ic. Plant. t. 507. Hook. Sp. Fil. II. 229. Moore, Ind. Fil. 229. Hook. et Baker, Syn. Fil. 143.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS rubro-ferrugineis, linearibus, erectis, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis dense vestitus. STIPITES subfasciculati, erecti, antice canaliculati, stricti, nitidi, castanei, 2—8 poll. longi. LAMINA coriacea, utrinque nuda, opaco-viridis, irregulariter oblonga, 4—6 poll. longa, 2—3 poll. lata, tri- vel quadripinnata. PINNAE laterales 6—8-jugae, adscendentes, superiores sessiles, lineares, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, explanatae 3 lin. latae, marginibus insigniter revolutis; inferiores distincte petiolatae, in eodem latere 6—15 lin. distantes, lineares, simpliciter pinnatae vel subcompositae, pinnulis paucis consimilibus. PINNULAE vel pinnae superiores

lineares, usque ad costam pinnatae, segmentis subquadrangularibus, 10—20-jugis, horizontaliter patentibus, 1—1½ lin. latis, parum distantibus, marginibus inferioribus et superioribus rectis integris, exterioribus paulo rotundatis. VENAE omnino occultae. SORI margines exteriores segmentorum prorsus occupantes, INDUSIO coriaceo, margine frondis extra soros incrassato.

Habitat locis rupestribus dumosis ad Cidade Diamantina prov. Minarum: Gardner 5295! — Oreas.

IX. PELLAEA LINK.

PELLAEA Link, *Sp. Fil.* 59. *Fée, Gen. Fil.* 128. *Hook. Sp. Fil.* II. 130. *J. Smith, Ferns. Brit. et For.* 179. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 144. — PLATYLOMA *J. Smith, Hook. Journ. Bot.* IV. 160. *Hook. et Bauer, Gen. Fil.* t. 115 A. *Moore, Ind. Fil.* p. LXVI. *J. Smith, Ferns. Brit. et For.* 181. — ALLOSORUS *Presl, Tent. Pter.* 151. *ex parte, non Bernh. Hook. et Bauer, Gen. Fil.* t. 5. — CHEILOPLECTON *Fée, Icon. Nouv.* 33. *tab. 20. fig. 3.* — *Pteridis et Cheilanthis sp. Auctt.*

FRONDES subconformes. SORI marginales, primum rotundati plus minus interrupti, demum in lineam continuam confluentes. INDUSIUM continuum, secundum soros inciso-crenatum.

Tabula nostra XLIII. Fig. III.

CAUDEX erectus vel breviter repens, herbaceus. STIPITES cum caudice continui, stricti, erecti, nitidi, ebenei. FRONDES inter sese conformes vel subconformes, plus minus compositae, plerumque parvae, coriaceae, segmentis angustis. VENAE pinnatae, plerumque perfecte liberae. SORI omnino marginales, plerumque primum rotundati punctiformes, sed cito in lineam continuam confluentes. INDUSIUM continuum, lineare, sed secundum soros inciso-crenatum, in subgenere *Platylomâ perangustum, statim evanescens vel occultum.* — *Species ultra 40, late distributae, multae in regionibus extratropicis, perpaucae intra Brasiliam obviae. Genus inter Pteridem et Cheilanthem medium, quoad habitum posterius genus simulans, a Pteride soris incomplete continuis saepe primum rotundato-punctiformibus diversum.*

CLAVIS SPECIERUM.

- § 1. EUPELLAEA. Lamina chartaceo-herbacea, segmentis planis, venis liberis, indusio modice lato persistente. — *Tabula nostra XLIII. Fig. III.*
1. Chartaceo-herbacea, segmentis lateris superioris pinnarum imarum 6—9, subduplo longioribus quam latis . . . 1. P. CONCOLOR.
 2. Chartaceo-coriacea, segmentis lateris superioris pinnarum imarum 3—5, quatuor vel ultra longioribus quam latis 2. P. COLUMBINA.
- § 2. ALLOSORUS *Presl Tent. ex parte, non Bernh.* — Lamina coriacea, segmentis angustis margine revolutis, venis liberis, indusio lato et persistente . . . 3. P. BONGARDIANA.
- § 3. HOLCOCHLAENA *Baker in Hook et Baker, Syn. Fil.* 153. — Venae anastomosantes 4. P. LONCHOPHORA.

§ 1. EUPELLAEA.

1. PELLAEA CONCOLOR *Baker*: frondibus chartaceo-herbaceis utrinque nudis cordato-deltaideis pedato-tripinnatifidis, pinnis inferioribus liberis longe maximis sursum pinnulas numerosas lanceolatas ad costam vel alam angustam ingredientibus deorsum pinnulas inferiores valde productas pinnatifidas gerentibus, pinnis mediis lanceolatis pinnatifidis deorsum confluentibus, superioribus integris, segmentis ultimis lanceolatis planis, venis liberis pinnatis; soris primum punctiformibus, cito confluentibus.

Tabula nostra XLIII. Fig. III. (analysis).

Pteris concolor Langsd. et Fisch. Ic. Fil. (1810) 19. t. 2! (v. s. in Herb. Mus. Brit.). Desv. Ann. Soc. Linn. Par. VI. 294.

Pteris Pohlana Presl, Del. Prag. (1822) I. 181. Tent. Pter. 145. Kuhn, Fil. Afr. 88.

Pteris geraniaefolia Raddi, Fil. Bras. (1825) 46. t. 67. Hook. Ic. Plant. t. 915. Kunze, Linnæa XXIV. 271. Mett. Fil. Hort. Lips. 55. Beddome, Fil. South-Ind. t. 37. Ettingsh. Farnler. t. 56. fig. 2. 8.

Pellaea geraniaefolia Fée, Gen. Fil. 130. Hook. Sp. Fil. II. 132. Hook. et Baker, Syn. Fil. 146.

Pellaea pedata Kunze, Linnæa X. 522. Pappe et Raws. Fil. Cap. 25., non Linn.

Pteris laciniata Vell. Fl. Flum. XI. t. 89., non Swartz.

CAUDEX erectus, herbaceus. PALEAE parvae, castaneae, lanceolatae, acuminatae. STIPITES fasciculati, erecti, graciles, herbacei, deorsum paulo paleacei, antice canaliculati, castaneo-ebenei, nitidi, 3—8 poll. longi. FRONDES subconformes. LAMINA chartaceo-herbacea, utrinque glabra, obscure viridis, siccitate pallide brunnea, cordato-deltaidea, 3—5 poll. longa et lata, pedato-tripinnatifida. PINNAE inferiores longe maximae, perfecte liberae, patentes, 1½—2¼ poll. longae, sursum subpinnatae, segmentis 6—9 lanceolatis paulo falcatis 2—4 lin. longis ½—2 lin. latis, deorsum pinnulis imis multo longioribus (1—½ poll. longis) ligulato-lanceolatis profunde pinnatifidis instructae. PINNAE mediae pinnatifidae, decurrenti-auriculatae, confluentes, superiores contiguae adscendentes integrae, deorsum valde confluentes. SEGMENTA nunquam revoluta, frondis sterilis paulo latiora breviora et obtusiora. COSTAE pinnarum nitidae, castaneo-ebeneae; VENULAE immersae, occultae, pinnatae, omnino liberae, ultimae pleraeque unifurcatae. SORI primum rotundati, punctiformes, plerumque cito in lineam continuam vel subcontinuum confluentes. INDUSIUM membranaceum, angustum, plerumque perfecte continuum, sed secundum soros inciso-crenatum.

Species cosmopolita intra tropicos utriusque hemisphaerii obvia intra Brasiliam observata est locis humidis umbrosis provinciarum austro-orientalium frequens, e. gr. ad Ouro Preto, prov. Minarum: Martius (Obs. n. 866.); in Monte Corcovado atisque locis prov. Rio de Janeiro: Langsdorff!, Raddi!, Burchett!, Sello!, Gardner 39!, Pohl etc.; in prov. S. Catharina: Fritz Müller!, etiam in Uruguay: Gibert!

Obs. *Cheilanthes Kirkii* *Hook.* (II. Cent. of Ferns. t. 81. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 132.) probabiliter ut *ell. WELWITSCH* et *KURN* affirmant, varietas est *adiantopsoides* hujus speciei.

2. PELLAEA COLUMBINA *Hook.* frondibus chartaceo-coriaceis utrinque nudis cordato-deltaideis pedato-tripinnatifidis, pinnis deorsum confluentibus valde imbricatis, inferioribus longe maximis sursum pinnulas 3—5 laxas lineares ad alam angustam ingredientibus deorsum pinnulas imas valde productas gerentibus pinnatifidis, pinnis mediis pinnatifidis, superioribus integris, segmentis ultimis linearibus planis, venis liberis pinnatis; soris primum punctiformibus, cito confluentibus.

Pellaea columbina Hook. et Baker, Syn. Fil. 146.

Pellaea lomariacea β. *columbina* *Hook. Sp. Fil. II. 133. tab. 112.*

CAUDEX lignosus, breviter repens. PALAEAE parvae, parvae, lanceolatae, acuminatae, castaneae. STIPITES subfasciculati, erecti, stricti, castanei, nitidi, nudi vel paullulum paleacei, frondis fertili subpedales, sterilibus breviores. FRONDES paullulum difformes, steriles minores segmentisque paucioribus latioribus et obtusioribus. LAMINA (fertili) chartaceo-coriacea, utrinque nuda, obscure viridis, siccitate pallide brunnea, cordato-deltoidem, pedato-tripinnatifida, 3—4 poll. longa et lata. PINNAE valde imbricatae, etiam inferiores basi confluentes, inferiores longe maximae, late deltoideae, patentes, circiter 2 poll. longae, sursum subpinnatae, segmentis 2—5 laxis linearibus integris 9—18 lin. longis 2 lin. latis, deorsum pinnulis imis valde productis profunde pinnatifidis, segmentis similibus. PINNAE mediae lanceolatae, profunde pinnatifidae, superiores lineares integrae falcato-adscendentes. COSTAE elevatae, ebeneae; venulae pinnatae, liberae, omnino occultae. SORI primum rotundati punctiformes, cito confluentes, INDUSIO subcontinuo scarioso.

Habitat in Serra dos Orgãos: Gardner 5930! — Dryas.

§ 2. ALLOSORUS.

3. PELLAEAE BONGARDIANA BAKER: frondibus coriaceis utrinque nudis lanceolatis bipinnatis, pinnis adscendentibus vel patentibus, inferioribus maximis contiguis distincte petiolatis deltoideis vel lanceolatis, pinnulis anguste linearibus laxis aegre petiolatis, marginibus integris valde revolutis, venis immersis occultis; indusiis secundum margines pinnularum perfecte continuis.

Tabula nostra LV. Fig. II. (habitus et analysis).

Allosorus Bongardianus Kunze Mss.

Cassebeera Bongardiana Mett. Mss.

Onychium brasiliense Kunze Herb. olim.

CAUDEX crassus, suberectus, PALEIS castaneis fibrillosis ½ poll. longis dense vestitus. STIPITES fasciculati, stricti, erecti, nitidi, castanei, nudi, 2—8 poll. longi. LAMINA coriacea, utrinque glabra, lanceolata, bipinnata, 4—8 poll. longa, 1—2 poll. lata. RACHES strictae, graciles, nuda. PINNAE contiguae, adscendentes, inferiores maximae, deltoideae vel lanceolatae, petiolis 2—3 lin. longis instructae, superiores simplices. PINNULAE pinnarum imarum 3—6-jugae, adscendentes vel subpatentes, lineares vel oblongo-lanceolatae, 4—6 lin. longae, ½—1½ lin. latae, apice obtusiusculo, marginibus integerrimis valde revolutis, sessiles vel breviter petiolatae. VENAE obscurae, immersae, laxae, furcatae. INDUSIUM secundum margines pinnularum prorsus continuum, rigidum, scariosum, nudum, planum, integerrimum.

Habitat in Serra de Capa: Bongard; ad Rio de Janeiro: Glaziou 2473! — Dryas.

§ 3. HOLCOCHLAENA.

4. PELLAEAE LONCHOPHORA BAKER: frondibus parvis membranaceis utrinque nudis, simplicibus ligulato-linearibus vel oblongis acutis integris basi late cordatis, vel ternato-pedatis divisionibus rotundatis vel lanceolatis, venis anastomosantibus in maculas 3- v. 4-seriatis hexagonas, venulis liberis inclusis nullis; soris primum rotundatis vel oblongis, demum confluentibus, indusio perangusto membranaceo.

Pteris lonchophora Metten. Cheil. 4. tab. 3. fig. 1—3. Hook. et Baker, Syn. Fil. 166.

Cheilanthes lonchophora Roem. Mss.

Lonchitis heterophylla Beyrich Mss.

Lonchitis hastata Bongard Mss.

Polypod.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, PALEIS parvis castaneis linearibus vestitus. STIPITES fasciculati vel subsegregati, castanei, stricti, pergraciles, nitidi, 2—5 poll. longi. LAMINA membranacea, utrinque nuda, supra prasino-viridis, infra pallidior, nunc simplex, oblongo-ligulata vel subpanduriformis, 2—5 poll. longa, 6—12 lin. lata, apice acuto, marginibus integris parum crispatis, basi late et aequabiliter rotundato-cordata; nunc ternato-pedata, divisionibus singulis rotundatis vel lanceolatis, interdum 1½—2 poll. longis, patentibus vel adscendentibus, basi interdum auriculatis. COSTA deorsum castanea, conspicua; venulae obliquae, 3—4 series macularum hexagonarum inter costam et marginem formantes, quarum interiores maximae 1—1½ lin. latae duplo longiores, venulis liberis inclusis nullis. SORI marginem frondis totum, basi excepta, occupantes, rotundati vel oblongi, demum subconfluentes. INDUSIUM nudum, perangustum, fere obsoletum, cito evanescens.

Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou 939! — Dryas.

Obs. Specimina a cl. GLAZIOU lecta multo majora sunt quam originaria Metteniana.

X. PTERIS LINN.

PTERIS Linn. Gen. Plant. 780. Swartz, Syn. Fil. 94. Willd. Sp. Plant. V. 355. Hook. et Bauer, Gen. Fil. tab. 64 A. Hook. Sp. Fil. II. 154. et Auctt. — PAESIA St. Hil. Voy. Diam. I. 381. Linnaea XVI. (II.) 184. — CAMPTERIA Presl, Tent. Pter. 146. tab. 5. fig. 19. 26. Hook. et Bauer, Gen. Fil. tab. 65 A. — LITOBROCHIA Presl, Tent. 148. tab. 5. fig. 20. 24. 25. Hook. et Bauer, Gen. Fil. tab. 65 B. fig. 6. Fée, Gen. Fil. 134. tab. 11 A. fig. 6—8. — HETEROPHLEBIUM Fée, Gen. Fil. 139. tab. 11 A. fig. 9—12. — DORYOPTERIS J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 162. Fée, Gen. Fil. 133. Klotzsch, Linnaea XX. 342. ex parte. — AMPHIBLESTRA Presl, Tent. 150. tab. 6. fig. 1. Hook. et Bauer, Gen. Fil. tab. 120 C. — PYCNODORIA Presl, Epim. 100. — MONOGONIA Presl, Tent. 146. tab. 5. fig. 15. — Allosori aquilini Presl, Tent. 153.

FRONDES steriles et fertiles conformes vel subconformes, plerumque magnae, herbaceae. SORI lineares, perfecte marginales, in lineâ continuâ dispositi, INDUSIO homomorpha continuo.

Tabula nostra XLIII. Fig. IV—VI. et XLIV. Fig. I. II.

CAUDEX plerumque erectus, in sectione Ornithopteride longe repens. STIPITES erecti, fasciculati vel segregati, basi cum caudice continui. FRONDES conformes, plerumque amplae, herbaceae, simpliciter pinnatae vel 2—3—4-pinnatifidae vel -pinnatae, interdum tripartitae, segmentis ultimis latis vel angustis, in sectione Doryopteride parvae coriaceae. VENAE simpliciter pinnatae (Eupteris, Ornithopteris), vel extrorsum subanastomosantes (Heterophlebium), vel pinnatae fasciculis ultimis basi connexis (Campteria), vel in areolas hexagonas anastomosantes, venulis liberis nullis (Litobrochia, Doryopteris) vel obvis (Amphiblestra). RECEPTACULUM marginale, perfecte continuum. INDUSIUM superum, angustum, membranaceum, e margine mutato frondis formatum, plerumque simplex, quoad receptaculum exterum, interdum duplex (in sectione Ornithopteride), membranulâ angustâ intra receptaculum productâ. — Genus cosmopolitum, speciebus cc. 90 per regiones praesertim calidiores utrusque hemisphaerii distributis.

CLAVIS SPECIERUM.

- § 1. EUPTERIS. Caudex erectus; stipes fasciculati; venae liberae; indusium prorsus simplex. — *Tabula nostra XLIII. Fig. IV.*
- Lamina simpliciter pinnata, pinnis inferioribus passim furcatis 1. PT. CRETICA.
 - Lamina 2-pinnatifida, pinnis inferioribus simplicibus. 2. PT. LITOBROCHIOIDES.
 - Lamina 2-pinnatifida, pinnis inferioribus furcatis. 3. PT. QUADRILABRATA.
 - Lamina 3-pinnata, segmentis ultimis sterilibus 3—4 lin. latis profunde dentatis 4. PT. HETEROPHYLLA.
 - Lamina 3-partita, divisionibus amplis bipinnatifidis. 5. PT. DEFLEXA.
- Cf. etiam *Pt. lomariaceam, incisam et leptophyllae var. gracilem.*
- § 2. OBNITHOPTERIS AGARDH. (Paesia *St. Hil.*, Allosori aquilini *Prest.*) Caudex longe repens; stipes segregati, uniseriati; indusium interdum vel semper duplex. — *Tabula nostra XLIII. Fig. V.*
- Raches strictae, nuda 6. PT. AQUILINA.
 - Raches flexuosae, glanduloso-viscosae 7. PT. VISCOSA.
- § 3. CAMPTERIA. Caudex erectus; stipes fasciculati; frondes amplae; venae pinnatae, fasciculis ultimis basi arcuatim connexis. — *Tabula nostra XLIII. Fig. VI.*
- PT. BIAURITA.
- § 4. DORYOPTERIS. Caudex erectus; stipes eburni; frondes parvae, papyraceae vel coriaceae, venis plus minus anastomosantibus. — *Tabula nostra XLIV. Fig. I.*
- Lamina simplex, sagittata vel hastata 9. PT. SAGITTIFOLIA.
 - Lamina cordato-rotundata, palmato-digitata. 10. PT. ORNITHOPUS.
 - Lamina cordato-rotundata, pedato- bi- vel tripinnatifida. * Venulae extrorsum subanastomosantes vel interdum prorsus liberae 11. PT. LOMARIACEA. ** Venulae in maculas hexagonas copiosas anastomosantes 12. PT. PEDATA.
- § 5. LITOBROCHIA. Stipes straminei vel raro rufescentes; frondes amplae, herbaceae vel subcoriaceae, venis in maculas hexagonas anastomosantibus, venulis liberis inclusis nullis. — *Tabula nostra XLIV. Fig. II.*
- Caudex longe repens; stipes plerumque rufescentes. 13. PT. INCISA.
 - Caudex erectus vel suberectus; stipes straminei vel substraminei.
 - Lamina simpliciter pinnata, pinnis imis passim furcatis. 14. PT. SPLENDENS.
 - Lamina deorsum bipinnatifida.
 - Pinnae solummodo inferiores praecipue infra pinnatifidae 15. PT. DENTICULATA.
 - Pinnae inferiores utrinque aequaliter pinnatifidae, pinnulis multijugis 16. PT. MACROPTERA.
 - Lamina tota bipinnatifida, pinnis inferioribus in latere inferiore prope basin furcatis 17. PT. DECURRENS.
 - Lamina ampla tripartita tripinnatifida, marginibus sterilibus denticulatis 18. PT. ACULEATA.
 - Lamina medio-cris 3—4-pinnatifida, marginibus sterilibus aristato-serratis 19. PT. LEPTOPHYLLA.

§ 1. EUPTERIS.

1. PTERIS CRETICA LINN. frondibus deltoideis simpliciter pinnatis, pinnis laxis 1—8-jugis anguste lineari-ligulatis, frondis fertilibus integris, frondis sterilis serratis, superioribus simplicibus, inferioribus prope basin furcatis, venis parallelis simplicibus vel unifurcatis.

Pteris cretica, Linn. *Mant.* 130. Swartz, *Syn. Fil.* 96. Schleichr., *Crypt.* 85. t. 90. Willd. *Sp. Plant.* V. 374. Hook. *Sp. Fil.* II. 160. et *Auctt.*

Pteris Serraria Swartz, *Syn. Fil.* 96. Willd. *Sp. Plant.* V. 374.

Pteris pentaphylla Willd. l. c. 362.

Pteris triphylla Mart. et Gal. *Foug. Mex.* 51. t. 31., non Agardh.

Pteris multiaurita Agardh, *Pter.* 12.

Pteris nervosa Thunb. *Fl. Jap.* 332. et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, suberectus vel breviter repens, PALEIS paucis ferrugineis linearibus 2—3 lin. longis apice vestitus. STIPITES fasciculati, graciles, omnino nudi, 6—12 poll. longi, straminei vel pallide rufescentes, basi brunnei. FRONDES paullulum difformes, fertiles pinnis angustioribus integris, steriles pinnis latioribus distincte serratis. LAMINA deltoidea, chartaceo-papyracea, utrinque nitide viridis, omnino nuda, 6—12 poll. longa et lata, pinnis lateralibus laxis 1—4- rarius 8-jugis. PINNA fertilibus terminalis anguste lineari-ligulata, 4—6 poll. longa, 3—4 lin. lata, basi cuneata soluta vel cum lateralibus superioribus confluentibus; laterales oppositae, superiores terminali minores ceterum ei consimiles, basi cuneatim decurrente; inferiores basi angustatae, saepe 1—2 poll. distantes, imae prope basin furcatae, divisionibus parti primariae consimilibus. VENAE immersae, liberae, graciles, leviter adscendentes, simplices vel unifurcatae. SORI secundum margines pinnarum perfecte continui. INDUSIUM angustum, glabrum.

Habitat, quantum novimus, intra Brasiliam solummodo circa Rio de Janeiro: Glaziou 2308! — Praeterea incolit Guatemalam, Mexicum et Floridam, item per regiones calidiores veteris orbis latissime dispersa.

2. PTERIS LITOBROCHIOIDES KLOTZSCH: stipitibus fasciculatis castaneis submuricatis, frondibus amplis papyraceo-herbaceis glabris ovato-deltoideis bipinnatifidis, pinnis 3—6-jugis omnibus simplicibus usque ad costam anguste alata pinnatifidis, inferioribus basi auriculato-petiolaris, pinnulis contiguas 20—30-jugis leviter falcatis, sterilibus denticulatis, venis pinnatis omnino liberis, venulis 20—30-jugis profunde furcatis.

Tabula nostra XLIII. Fig. IV. (analysis).

Pteris litobrochioides Klotzsch, *Linnaea* XX. 341. Hook. *Sp. Fil.* II. 178. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 157.

Pteris pungens Kunze, *Linnaea* XXI. 217?

Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES erecti, 1½—2 pedes longi, crassitie 2 lin., antice canaliculati, castanei, nudi, paullulum muricati, aculeis sparsis firmis brevibus patentibus instructi. LAMINA papyraceo-herbacea, utrinque concolor, viridis, nuda, 2—2½ pedes longa, 1½—2 pedes lata, ovato-deltoidea, bipinnatifida. RACHES nitidae, nuda, castaneae vel stramineae. PINNAE laterales oppositae, 3—6-jugae, patentibus vel adscendentibus, oblongo-ligulatae; inferiores maximae, 3 poll. vel ultra basi distantes, 9—12 poll. longae, in medio 2½—3 poll. latae, sursum et deorsum angustatae, apice distincto lineari serrulato, basi auriculato-petiolaris; superiores minores, sessiles, basi interdum decurrenti-auriculatae; terminalis reliquis consimilis, major vel aequalis. PINNULAE contiguae, lineares, 12—18 lin. longae, 3 lin. latae, 20—30-jugae, leviter falcatae, steriles extrorsum serrulatae, imae ad auriculas reductae. VENAE conspicuae, regulariter pinnatae; venulae pinnularum 20—30-jugae, obliquae, exceptis superioribus profunde furcatae, inferiores basi ½—¾ lin. distantes. SORI continui, lineares, e basi usque fere ad apices pinnularum currentes. INDUSIUM angustum, brunneum, membranaceum.

Habitat ad cataractas fluv. Aripicuru prov. Para: Spruce 561!, et in Guyana britannica: Rich. Schomburgk 1137!, Appun 1721! — Najas et Extrabras.

Obs. Habitus in universum sequentis et *Pt. pungentis* Willd. An varietas posterioris? Planta a KEGELIO e Guyana batava sub n. 1432 reportata (vide Linnaeam loc. cit.) probabiliter eadem est species.

3. *PTERIS QUADRIAURITA* RETZ. stipitibus fasciculatis castaneis vel stramineis nudis inermibus, frondibus amplis herbaceis glabris oblongo-deltaideis bipinnatifidis vel bipinnatis, pinnis 6—12-jugis, inferioribus maximis e latere inferiore prope basin furcatis, pinnulis consimilibus minoribus, segmentis linearibus contiguis 20—30-jugis, sterilibus integris vel denticulatis, venis pinnatis omnino liberis, venulis 12—20-jugis profunde furcatis.

Tabula nostra XXIV. Fig. 4. 8. 14. (partes pinnarum).

Pteris quadriaurita Retz. Obs. VI. 38. Willd. Sp. Plant. V. 385. Agardh, Rec. Pterid. 24. Hook. Sp. Fil. II. 179. tab. 134B. Beddome, Fil. S. Ind. t. 31. et Auctt.

Pteris biaurita Swartz, Willd. et Auctt. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 142., non Linn. nec Ag.

Pteris nemoralis Hook. Gen. Fil. t. 54 A. Ettingsh. Farnkr. t. 60. fig. 1. 10.

Pteris repandula Link, Sp. Fil. Hort. Berol. 56. Mett. Fil. Hort. Lips. 57.

Pteris calcarata Bory in Belang. Voy. Afr. 42.

Pteris Swartziana Agardh, Rec. Pter. 34. Hook. Sp. Fil. II. 187.

Pteris felosma J. Smith, Comp. Bot. Mag. LXXII. 24.

Pteris sulcata Meyen. Kunze in Linnaea XXIII. 290. Mett. Fil. Hort. Lips. 57. Lowe, Ferns IV. 5.

Pteris pyrophylla Blume, Enum. Fil. Jav. 212. Agardh, Rec. Pter. 30. Kuhn, Fil. Afr. 89.

Pteris catoptera Kunze, Linnaea XVIII. 119.

CAUDEX lignosus, erectus, PALEIS parvis linearibus vestitus. STIPITES subfasciculati, inermes, stricti, 12—24 poll. longi, nudi, nitidi, straminei vel castanei, antice canaliculati. LAMINA herbacea, utrinque concolor, viridis, glabra, 1½—2 pedes longa, 12—18 poll. lata, oblongo-deltaidea, bipinnatifida, pinnis inferioribus furcatis. RACHES nitidae, stramineae vel castaneae. PINNAE 6—12-jugae, contiguae vel sublaevae, adscendentes vel subpatentes; inferiores maximae, 6—9 poll. longae, 15—21 lin. latae, usque ad alam angustam vel interdum ad costam pinnatipartitae, e latere inferiore prope basin furcatae, pinnulis similibus minoribus; superiores sensim decrescentes, simpliciter pinnatifidae, subsessiles, deorsum subaequales vel paullulum accrescentes. SEGMENTA 20—30-juga, linearia, contigua, 9—12 lin. longa, 2—3 lin. lata, recta vel leviter falcata, sterilia integra vel subserrulata. VENAE segmentorum 12—24-jugae, conspicuae, regulariter pinnatae, liberae, omnes exceptis superioribus profunde furcatae. SORI continui, lineares, saepe e basi ad apicem segmentorum currentes. INDUSIUM angustum, nudum, griseo-brunneum.

Species in regionibus calidioribus utriusque orbis vagans, in Brasilia tamen hucusque solummodo in prov. Minarum observata est: Gardner 5302!, Warming.

Obs. A *Pt. biaurita* L. solum differt venis liberis et rachibus pinnarum semper distincte alatis. *Pt. nemoralis* Willd. et Agardh est forma inter eas media.

4. *PTERIS HETEROPHYLLA* LINN. stipitibus fasciculatis stramineis nudis, frondibus parvis herbaceis glabris ovato-deltaideis deorsum tripinnatis, pinnis 6—8-jugis erecto-patentibus distincte petiolatis, inferioribus maximis rhomboideis, mediis simpliciter pinnatis, superioribus simplicibus, segmentis lineari-oblongis distincte petiolatis basi cuneatis, sterilibus latioribus profunde serratis, venis pinnatis liberis 8—12-jugis erecto-patentibus simplicibus.

Pteris heterophylla Linn. Sp. Plant. 1534. Swartz, Syn. Fil. 101. Willd. Sp. Plant. V. 394. Agardh, Recens. Pter. 15. Hook. Bot. Mag. t. 4925. et Auctt.

CAUDEX erectus, PALEIS paucis parvis linearibus castaneis vestitus. STIPITES fasciculati, erecti, nudi, nitidi, graciles, 3—6 poll. longi, antice canaliculati, straminei vel basi subcastanei. LAMINA herbacea, utrinque nuda, nitide viridis, ovato-deltaidea, 4—5 poll. longa, 2—3 poll. lata, deorsum tripinnata. RACHES nuda, graciles, omnino stramineae. PINNAE 6—8-jugae, oppositae, erecto-patentes; inferiores maximae, rhomboideae, 2—2½ poll. longae, 12—18 lin. latae, distincte petiolatae, 12—15 lin. distantes; mediae simpliciter pinnatae; superiores omnino simplices. PINNULAE inferiores lanceolatae, segmentis 2—4-jugis. SEGMENTA ultima omnium graduum distincte petiolata, lineari-oblonga, 6—12 lin. longa, basi longe cuneata integra, sterilia 3—4 lin. lata profunde inciso-serrata, fertilia integra 2—2½ lin. lata. VENAE segmentorum immersae, liberae, erecto-patentes, 8—12-jugae, pleraeque simplices, singulae ad apicem dentium adentes. SORI ex apice bases cuneatae usque ad apicem segmentorum currentes. INDUSIUM firmum, nudum, pallidum.

Habitat prope Rio de Janeiro: Lady Callcott! — Frequens praeterea in insulis Antillanis. — Dryas et Extrabrasil.

5. *PTERIS DEFLEXA* LINK: stipitibus segregatis castaneis vel stramineis inermibus, frondibus amplis chartaceo-herbaceis nudis tripartitis, divisionibus bipinnatifidis vel bipinnatis, lateribus centrali aequalibus vel eâ minoribus, pinnulis ligulatis subsessilibus usque ad costam vel alam angustam pinnatipartitis, segmentis linearibus aristatis contiguis 12—20-jugis, sterilibus serratis, venis pinnatis omnino liberis 6—12-jugis profunde furcatis.

Tabula nostra XXIV. Fig. 5—7. (partes pinnularum).

Pteris deflexa Link, Hort. Berol. II. 30. Agardh, Rec. Pter. 41. Mett. Fil. Hort. Lips. 58. Hook. Sp. Fil. II. 190. Ettingsh. Farnkr. t. 58. fig. 6. t. 60. fig. 2.

Pteris lata Kaulf. Mss. Agardh, Rec. Pter. 38. Mett. Fil. Hort. Lips. 58. Wawra, Maximil. Reise 194. (forma magis herbacea, saturatius viridis). Lowe, Ferns IV. t. 6.

Pteris laeta Kaulf. Presl, Tent. Pter. 145., non Walllich.

Pteris stridens Agardh, Rec. Pter. 45. Hook. Sp. Fil. II. 192. (forma minor, rachibus stramineis).

Pteris Gaudichaudii Ag. l. c. 42. Hook. Sp. Fil. II. 191.

Pteris palustris Gaud. in Freyc. Voy. 39. (synonymis exclusis), nec Poirel.

CAUDEX crassus, lignosus, breviter repens, PALEIS fibrillosis, lanosis, ferrugineis et rigidis linearibus erectis castaneis dense vestitus. STIPITES segregati, erecti, stricti, 1½—2 poll. longi, inermes, castanei vel straminei, antice canaliculati, interdum deorsum paleacei, in speciminibus magnis 4—5 lin. crassi. LAMINA deltaidea, 2—3 pedes longa et lata, chartaceo-herbacea, utrinque nuda, subconcolor, pallide vel saturate viridis, divisionibus 3 deltaideis vel oblongo-deltaideis, bipinnatifidis vel bipinnatis. RACHES strictae, nuda, stramineae vel castaneae; centralis longe petiolata, erecta, pinnulis 6—15-jugis adscendentibus, inferioribus breviter petiolatis, superioribus sessilibus; laterales patentes vel paullulum adscendentes, breviter petiolatae, quoad magnitudinem valde variabiles, 6—18 poll. longae, pinnulis 2—12-jugis, imis in latere inferiore interdum compositis. PINNULAE ligulatae, sessiles vel breviter petiolatae, 3—6 poll. longae, 9—18 lin. latae, deorsum subaequales vel parumper accrescentes, usque ad costam vel alam angustam pinnatipartitae, sursum angustatae, apice lineari acuminato serrulato. SEGMENTA 12—20-juga, linearia, contigua, 6—10 lin. longa, 1½—2½ lin. lata, falcata, aristata, sterilia extrorsum spinososerata. VENAE 6—12-jugae, conspicuae, pinnatae, omnino liberae, omnes praeter superiores profunde furcatae. SORI e basi segmentorum usque fere ad apicem currentes, nunquam tamen eum attingentes. INDUSIUM firmum, membranaceum, nudum, demum brunneum.

Frequens in prov. Rio de Janeiro, v. g. Serra dos Orgãos etc.: Pohl, Burchell 2198!, Gardner 152!, Sello!, Miers!, Wawra et Malp 358., Glaziou 435! etc.; ad Gongo Soco prov. Minarum: Bunbury!; in prov. S. Pauli: Burchell 4538!; in sylvis Yapuren-sibus prov. do Alto Amazonas: Martius. — Etiam in Guyana anglica (Rich. Schomburgk 1164!), in Surinamo: Menzel!, et e Peruvia per terras Columbianas in insulas Antillanas vagans.

§ 2. ORNITHOPTERIS.

6. PTERIS AQUILINA LINN. stipitibus segregatis validis nudis stramineis inermibus, frondibus amplis coriaceis deltoideis tri- vel quadripinnatis utrinque nudis vel infra lanuginosis, pinnis patentibus longe petiolatis oblongo-deltoideis, pinnulis lanceolatis patentibus petiolatis, segmentis linearibus simplicibus vel plerisque lanceolatis subpinnatis, lacinii ligulatis obtusis, venulis liberis conspicuis; indusiis angustis membranaceis, saepe duplicitibus.

Insequuntur varietates brasilienses, quae quidem formis intermediis confluent.

Var. β. ARACHNOIDEA Baker.

Tabula nostra XXIV. Fig. 11-13. (sub nomine specifico Kaulfussii Pt. arachnoidea, apices pinnarum).

Pteris arachnoidea Kaulf. Enum. Fil. 190. Agardh, Rec. Pter. 46. Kunze, Syn. Pl. Poepp. 76. Splitg. Enum. Fil. Sur. 33. Mett. Fil. Hort. Lips. 60. Ettingsh. Farnkr. t. 53. fig. 1. 4. t. 54. fig. 5.

Pteris campestris Schrad. Mss.

CAUDEX validus, rectus, hypogaeus, longe repens. STIPITES uniseriati, erecti, segregati, validi, nitidi, nudi, straminei, 1-4 pedes longi, paleis nullis. LAMINA coriacea, subdeltoidea, 2-6 pedes longa, 2-4 pedes lata, quadripinnatifida vel quadripinnata, supra obscure viridis, siccitate grisea, infra plus minus pilis ferrugineis adpressis arachnoideis vestita. PINNAE oblongo-lanceolatae vel subdeltoideae, horizontaliter patentem, inferiores longe maximae, longe petiolatae, 12-24 poll. longae, 6-12 poll. latae. RACHES strictae, straminae, nudeae vel sursum leviter pubescentes. PINNULAE lanceolatae, patentes, contiguae, inferiores maximae petiolatae, superiores sessiles. SEGMENTA sessilia, inferiora plerumque lanceolata subpinnata, divisionibus multijugis patentibus laxis ligulato-linearibus obtusiusculis 2-6 lin. longis 1-1½ lin. latis, basi auriculis parvis rotundatis decurrentibus. VENULAE laciniarum graciles, elevatae, contiguae, plerumque furcatae, omnino liberae. SORI secundum margines omnium frondis segmentorum continui. INDUSIUM angustum, membranaceum, ciliatum, crispatum, duplex vel simplex, valvula interiore tenera obsoleta.

Varietas ad *Pt. esculentam* Forsteri et Swartzii arte accedens.

Var. γ. PSITTACINA Baker.

Pteris psittacina Presl, Delic. Prag. 185. Agardh, Rec. Pter. 47. Hook., Sp. Fil. II. 200.

Lamina multo minor, infra arachnoidea, rachibus superne pubescentibus, segmentis parvis margine revolutis, inferioribus 4-5 lin. longis 2 lin. latis, dimidio superiore integro, inferiore pinnatifido, lobulis parvis oblongis vel rotundatis.

Var. δ. CAUDATA Hooker.

Pteris caudata Linn. Sp. Plant. 1533. Jacq. Coll. II. 273. Ic. Rar. t. 645. Swartz, Syn. Fil. 101. Willd. Sp. Plant. V. 401. Vell. Fl. Flum. XI. t. 80.

Lamina plerumque tripinnata, infra subglabra, pinnulis apice longo ligulato caudato instructis, segmentis plerumque simplicibus lineari-ligulatis 8-12 lin. longis 2 lin. latis.

Species cosmopolita regiones temperatas calidasque totius orbis inhabitat, formis numerosis obvia. In Brasilia varietates supra descriptae observatae sunt in prov. S. Pauli: Burchell 3951!; Rio de Janeiro: Sello, Pohl!, Schott!, Burchell 1375!, Glaziou 431!; in prov. Minas: Martius, Bunbury!, Stephan!, Raben, Freyress, Gardner 5303!; in Bahiensi: Princ. Newied!, Blanchet 2214!, Wavra et Maly 422!; in Pernambucana: Gardner 1224! 2988!; Maranhão: G. Don. 140., et in prov. Paraënsi: Martius, Spruce 32! 381! — In Guyana gallica eam legerunt: Leprieur! et Sagot!, in batava: Splitgerber, Kegel 1049, et in anglica: Parker!, Appun 2024!

7. PTERIS VISCOSA MOORE: stipitibus segregatis erectis firmis gracilibus rufescentibus superne glandulosis, frondibus amplis coriaceis rhomboideis tri- vel quadripinnatis utrinque plus minus glanduloso-viscosis, rachibus flexuosis glanduloso-viscosis, pinnis oblongo-lanceolatis breviter petiolatis, inferioribus laxis reductis, pinnulis lanceolatis patentibus, segmentis simplicibus vel subpinnatis, divisionibus ultimis parvis linearibus vel inaequaliter oblongis, venis laxis liberis subflabellatis; indusiis latiusculis duplicitibus.

Tabula nostra XXIII. Fig. 21, 22. (partes pinnae) et XLIII. Fig. V. (analysis).

Pteris viscosa Moore, Gard. Chron. 1860. p. 878. Hook. et Baker, Syn. Fil. 163.

Paesia viscosa St. Hil. Voy. Diam. l. c. Linnaea 1842. p. 184.

Pteris scalaris Moritz Mss. Metten. Farngh. 9. t. 16. fig. 1-6. Hook. Sp. Fil. II. 200. t. 121 B. III. t. 141 C. Ettingsh. Farnkr. t. 53. fig. 5-7.

Allosorus resistens Kunze Mss.

Pteris resistens Metten. Fil. Hort. Lips. 59.

Pteris glutinosa J. Smith Mss.

CAUDEX longe repens, lignosus, ramosus, crassitie pennae corvinae, PALEIS parvis linearibus castaneis divaricatis dense vestitus. STIPITES uniseriati, segregati, firmi, erecti, graciles, rufescentes, 6-9 poll. longi, sursum glandulosi. LAMINA subcoriacea, obscure viridis, siccitate brunnea, utrinque praesertim infra plus minus glanduloso-viscosa, irregulariter rhomboidea, 2-3 poll. longa, 1-2 poll. lata, tri- vel quadripinnata. RACHES firmae, flexuosae, rufescentes, dense glanduloso-viscosae. PINNAE curvatae vel flexuosae, ascendentes vel subpatentes, breviter petiolatae, inferiores reductae laxae, mediae contiguae oblongo-lanceolatae, maximae 9-15 poll. longae 3-6 poll. latae. PINNULAE lanceolatae, rectangulariter patentes, pleraque curvatae, laxae vel subcontiguae, breviter petiolatae, 1-3 poll. longae, 8-12 lin. latae. SEGMENTA oblonga, lanceolata, integra vel subpinnata, lacinii sterilibus inaequaliter oblongis, basi superiore producta, inferiore cuneato-truncata, margine inciso-crenato, fertilibus linearibus integris. VENULAE laciniarum laxae, modice conspicuae, subflabellatae. INDUSIUM latiusculum, integrum, plerumque vel semper duplex valvula exteriori recurvata, interiore tenera occulta.

Habitat sub rupibus montium Serra da Piedade prov. Minas: St. Hilaire (non vidi). — Item Peruviam orientalem (Spruce 4666!), Columbian et insulas Antillanas incolit.

§ 3. CAMPTERIA.

8. PTERIS BIAURITA LINN. stipitibus fasciculatis stramineis nudis inermibus, frondibus amplis herbaceis glabris oblongo-deltoideis bipinnatifidis, pinnis 8-12-jugis, inferioribus maximis e latere inferiore prope basin furcatis, pinnulis consimilibus minoribus, segmentis linearibus obtusis contiguis 20-30-jugis deorsum confluentibus, venis secundum raches pinnarum in arcibus depressis anastomosantibus, venulis segmentorum 12-20-jugis profunde furcatis omnino liberis.

Tabula nostra XLIII. Fig. VI. (analysis).

Pteris biaurita Linn. Sp. Plant. 1534. (v. s. in Hb. orig.) Swartz et Willd. ex parte. Agardh, Rec. Pter. 26. Hook. Sp. Fil. II. 203.

Campteria biaurita Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 75 A. Moore, Ind. Fil. 43.

Pteris geminata Agardh, Rec. Pter. 31.

Campteria Rotleriana Presl, Tent. 26. t. 5.

Pteris Kleiniana Presl, Tent. t. 5. fig. 19.

CAUDEX erectus, PALEIS parvis linearibus ferrugineis vestitus. STIPITES erecti, fasciculati, inermes, stricti, straminei, 12—18 poll. longi, antice canaliculati. LAMINA herbacea, utrinque concolor, viridis, glabra, 1½—2 pedes longa, 12—18 poll. lata, oblongo-deltaeidea, bipinnatifida, pinnis inferioribus furcatis. RACHIS strictae, nudae, griseo-stramineae. PINNAE 8—12-jugae, sessiles, subpatentes vel erecto-patentes, 6—9 poll. longae, 12—18 lin. latae, ad alam 1—1½ lin. latam pinnatifidae, inferiores maximae e latere inferiore prope basin furcatae, pinnulis primariae consimilibus sed eâ multo minoribus, superiores sensim decrescentes. SEGMENTA 20—30-juga, subcontigua, 6—9 lin. longa, 2 lin. lata, subfalcata, obtusa, integerrima, inferiora reliquis aequalia, superiora sensim decrescentia. VENAE pinnarum in arcubus depressis rotundatis vel subdeltoideis inter costas segmentorum anastomosantes; venulae segmentorum 12—24-jugae, graciles, conspicuae, profunde furcatae, omnino liberae, venulisque 4—5 simplicibus ex arcubus ad sinus segmentorum radiantibus. SORI secundum margines segmentorum, summo apice excepto, continui. INDUSIUM nudum, angustum, griseo-brunneum.

Cf. obs. ad *Pt. quadriaurita* supra sub n. 3.

Per regiones calidiores totius orbis sparsa e Brasilia hucusque solummodo e prov. Goyaz innotuit, ubi ad Arrayas cl. Gardner eam detexit (n. 4076!).

§ 4. DORYOPTERIS.

9. PTERIS SAGITTIFOLIA RADDI: stipitibus fasciculatis strictis nudis ebeneis, frondibus chartaceo-herbaceis glabris sagittato-lanceolatis acutis integerrimis, lobis baseos lanceolatis rectis vel subpatulis hastatisve, venis immersis in maculas hexagonas copiosas anastomosantibus, venulis inclusis nullis; indusio angusto.

Tabula nostra XXV. Fig. 3. (frons).

Pteris sagittifolia Raddi, *Fil. Bras. t. 63. fig. 1.* Hook. *Fil. Exot. t. 39. Sp. Fil. II. 207.* Hook. et Baker, *Syn. Fil. 166.* *Ettngsh. Farnkr. t. 71. fig. 3.* *Litobrochia sagittifolia* Presl, *Tent. 148.* Moore, *Ind. Fil. p. XLIV.*

Doryopteris sagittifolia J. Smith et Fée l. c.

CAUDEX crassus, lignosus, suberectus, PALEIS parvis linearibus rigidis castaneis vestitus. STIPITES stricti, erecti, nitidi, nudi, ebenei, 5—9 poll. longi. LAMINA chartaceo-herbacea, utrinque glabra et pallide viridis, sagittato-lanceolata, 6—12 poll. longa, deorsum 1—4 poll. lata, acuta, marginibus integerrimis, lobis basalibus ¾—2 poll. longis lanceolatis acutis integerrimis rectis vel patulis. COSTA subtus ebenea nitida distincta, supra immersa; venulae immersae, in maculas copiosas hexagonas duplo longiores quam latas anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis; lobi basales insuper costa arcuato-decurrente immersa praediti. SORI secundum totum frondis marginem continui. INDUSIUM nudum, angustum, cito evanescens.

Var. β. HASTATA Hook.

Pteris hastata Raddi, *Fil. Bras. 43. t. 3. fig. 2.*

Lamina basi pinnis unijugis lanceolatis plus minus productis, interdum 4—5 poll. longis, deorsum 1 poll. latis, horizontaliter patentibus praedita.

Forma typica frequens in viis cavis prov. Rio de Janeiro, e. gr. ad Mandioccam etc.: Raddi, Martius, Karwinski, Riedel, Pohl, Sello!, Burchell 1947! 2051! 2553!, Gardner 36! 151!, Glaziou 940!; in prov. S. Pauli: Martius; et prope coloniam Tovar Venezuelae: Fendler 366! — Var. β. cum forma typica in prov. Sebastianopolitana: Raddi, Gardner 150! — Dryadi-Oreas? et Extrabras.

10. PTERIS ORNITHOPUS METT. stipitibus subfasciculatis nitidis nudis strictis ebeneis, frondibus coriaceis cordato-rotundatis palmato-digitatis, divisionibus 7—9 integris, fertilibus linearibus partem frondis integram 3—4plo excedentibus, sterilibus deltoideis parti integrae subaequalibus, venis immersis occultis copiose anastomosantibus; indusio rigido persistente.

Polypod.

Tabula nostra LVIII. (habitus et analysis).

Pteris ornithopus Metten. Mss. Hook. et Baker, *Syn. Fil. 166.*

Pteris alcicornu et cheirophylla Kunze Mss.

Pellaea lomariacea γ. *digitato-palmata* Hook. *Sp. Fil. II. 133.*

CAUDEX crassus, lignosus, breviter repens, PALEIS parvis fibrillosis ferrugineis dense vestitus. STIPITES stricti, erecti, nudi, nitidi, ebenei, frondis fertilis 6—15 poll. longi, frondis sterilis breviores. LAMINA fertilis coriacea, crassa, utrinque nuda, pallide viridis, siccitate brunnea, cordato-rotundata, 4—6 poll. lata, parte integra 6—8 lin. diametente, divisionibus 7—9 digitato-radiatis, linearibus, acutis, integerrimis, mediis 2—3 poll. longis 2—3 lin. latis, lateralibus gradatim brevioribus, imis patentibus vel decurvatis. Lamina sterilis minor, parte integra 9—15 lin. diam. aequante, divisionibus deltoideis subaequali. COSTAE segmentorum conspicuae, crassae, brunneae; venulae immersae, obscurae, anastomosantes. SORI secundum totum frondis marginem continui. INDUSIUM brunneum, latum, scariosum, nudum.

Habitat in Serra dos Orgãos: Martius, Burchell 2276!; ad urbem S. João d'El Rey, ad Caldas, in districtu Adamantium aliisque locis prov. Minarum: Pohl!, Lindberg 603!, Gardner 5298! — Dryas, Oreas.

11. PTERIS LOMARIACEA KUNZE: stipitibus fasciculatis strictis nudis nitidis ebeneis, frondibus coriaceis cordato-deltaeideis pedato-2—3-pinnatifidis, pinnis inferioribus maximis deltoideis utrinque vel deorsum pinnatifidis, pinnulis linearibus, imis valde productis simplicibus vel pinnatifidis, sterilibus obtusis, venis immersis occultis extrorsum paulo anastomosantibus; indusio rigido persistente.

Tabula nostra LIX. (habitus et analysis).

Pteris lomariacea Kunze Mss. Hook. et Baker, *Syn. Fil. 164.*

Doryopteris (Lytoneuron) lomariacea Klotzsch, *Linnaea XX. 343.*

Pellaea lomariacea α. *septemloba* Hook. *Sp. Fil. II. 133.*

Pteris septemloba Klotzsch Mss.

CAUDEX crassus, lignosus, suberectus, PALEIS rigidis linearibus castaneis vestitus. STIPITES fasciculati, stricti, nitidi, nudi, ebenei, frondis fertilis 1½—2 pedes longi, frondis sterilis breviores. LAMINA fertilis coriacea, crassa, utrinque omnino nuda, pallide viridis, siccitate subbrunnea, 5—6 poll. longa et lata, cordato-deltaeidea, bipinnatifida. PINNAE 3—4-jugae, basi in alam 1 lin. latam confluentes; inferiores multo majores, 4—6 poll. longae, in parte integra 1½—2 lin. latae, sursum integrae vel subpinnatifidae, deorsum pinnulis 2—3 linearibus incurvatis integris imis 2—3 poll. longis instructae; superiores lineares, laxae, simplices, falcatae, 1—4 poll. longae. LAMINA sterilis segmentis paucioribus, integris, 3—4 lin. latis. COSTAE conspicuae, ebeneae; venulae immersae, obscurae, extrorsum paulo anastomosantes. SORI secundum totum frondis marginem continui. INDUSIUM rigidum, nudum, griseum, durum.

Var. β. ACTINOPHYLLA Baker.

Tabula nostra LX. (habitus et analysis).

Pteris actinophylla Kunze Mss.

Frons magis composita; rachis primaria frondis fertilis interdum inter pinnae inferiores haud alata; pinnae intermediae paulo pinnatifidae, inferiores longe maximae deltoideae valde imbricatae utrinque pinnatifidae, deorsum pinnulis 3—4 subpatentibus inferioribus plus minus pinnatifidis instructae.

Forma typica in ripis siccis prope rivulos ad S. Paulo urbem, in uliginosis prope Morumbi et in Serra da Cubatão prov. S. Pauli: Burchell 4205! 4432! 3769!; ad Inficionado et S. João Baptista prov. Minarum: Pohl, Raben, Gardner 5297!; et in Guyana britannica: Rich. Schomburgk 1197!, Appun 1164! — Var. β. in umbrosis ad rivulum Varge prov. S. Paul: Burchell 4731-5!; ad Caldas prov. Minarum: Lindberg 600! — Oreas et Extrabrazil.

12. PTERIS PEDATA LINN. stipitibus subfasciculatis gracilibus nitidis nudis ebeneis, frondibus papyraceis vel chartaceo-coriaceis cordato-deltaeideis pedato-2-3-pinnatifidis, pinnis inferioribus maximis deltoideis utrinque vel deorsum pinnatifidis, pinnulis lineari-lanceolatis, imis valde productis interdum pinnatifidis, venis immersis in maculas parvas hexagonas copiosas anastomosantibus, venulis inclusis nullis; indusio angusto.

Tabula nostra XXV. Fig. 4. (frons parva) et XLIV. Fig. 1. (analysis).

Plumier Fil. 130. t. 132.

Pteris pedata Linn. Sp. Plant. 1532. Swartz, Syn. Fil. 105. Langsd. et Fisch. Ic. Fil. 17. t. 20. Willd. Sp. Plant. V. 358. Schkuhr, Fil. 91. t. 100. Raddi, Fil. Bras. t. 65. fig. 3. 66. et 66 bis. Hook. Bot. Mag. t. 3247. Fil. Exot. t. 34. Ettingsh. Farnkr. t. 70. fig. 1. 2.

Litobrochia pedata et Raddiana Presl, Tent. 149.

Cassebeera pedatu J. Smith, Gen. Ferns 47.

Doryopteris pedata J. Smith et Fée l. c.

Doryopteris pedata et palmata Lowe, Ferns 3. t. 35. et 37.

Pteris chamaedryfolia Goldm. Pl. Meyen. 458.

CAUDEX lignosus, breviter repens, 3-4 lin. crassus, paleis parvis linearibus castaneis vestitus. STIPITES subfasciculati, stricti, 5-8 poll. longi, pergraciles, ebenei, nudi, nitidi. LAMINA fertilis papyraceo-herbacea, utrinque nuda, pallide viridis, siccitate plus minus brunnea, sterili paulo major, 5-6 poll. longa et lata, cordato-deltaeidea, pedato-tripinnatifida. PINNAE 4-6-jugae, usque ad alam angustam (deorsum 1-2 lin. latam) ingredienti; inferiores longe maximae, patentes, inaequilateraliter deltoeidae, 2½-3 poll. longae et latae, basi cuneata, apice acuminato, utrinque pinnatifidae, pinnulis 4-6-jugis, superioribus brevibus integris, inferioribus productis, imis 2-2½ poll. longis plus minus pinnatifidis; mediae adscendentes, paulo pinnatifidae, 1½-2½ poll. longae, basi decurrenti-cuneatae; superiores integrae. SEGMENTA ultima integra fertilia 3-4 lin. lata. LAMINA sterilis minus dissecta, divisionibus brevioribus et latioribus, marginibus denticulatis, ceterum fertili similis. Frondes juniores ejusdem stirpis interdum simplicissimae cordato-ovatae. COSTAE deorsum castaneo-ebeneae, nitidae; venulae immersae, obscurae, in 2-3 series macularum hexagonarum oblique anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI secundum totum frondis marginem continui. INDUSIUM nudum, angustum, cito evanescent.

Obs. *Cassebeera paradoxa* Fée (Icon. Nouv. 31. t. 20. fig. 2., in Serra dos Orgãos crescens, Gardner 5930.) plantam aequaliter dissectam sed crassiorem magisque coriaceam sistit.

Var. β. COLLINA Baker.

Pteris collina Raddi, Fil. Bras. t. 65. fig. 1. Ettingsh. Farnkr. tab. 70. fig. 2. 6.

Doryopteris collina J. Smith, Gen. Fil. 51. Lowe, Ferns 3. t. 38.

Doryopteris euchlora Klotzsch, Linn. XX. 342.

Pteris pedatoides Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. tab. 3. fig. 2. Kuhn, Fil. Afr. 87.

Pteris digitato-partita et chenopoda Willd. Mss.

Lamina chartaceo-papyracea, minor (fertilis 3-4 poll. longa et lata); pinnae 2-3-jugae usque ad alam 2-3 lin. latam ingredienti, inferiores superne subintegrae deorsum pinnatifidae, pinnulis 3-4-jugis, imis interdum in latere inferiore subcompositis.

Var. γ. HEDERACEA Baker.

Pteris varians Raddi, Fil. Bras. t. 64. fig. 1.

Litobrochia hederacea et varians Presl, Tent. 149.

Pteris hederacea Ettingsh. Farnkr. t. 69. fig. 6.

Lamina chartaceo-papyracea, 3-4 poll. longa et lata; pinnae 1-3-jugae, lineares, usque ad alam 2-3 lin. latam ingredienti, inferiores basi unifurcatae, pinnulis integris.

Var. δ. PALMATA Baker.

Tabula nostra XXV. Fig. 1. 2. (sub nomine Willdenowiano specifico Pteridis palmatae, frondes).

Pteris palmata Willd. Sp. Plant. V. 357. Mett. Fil. Hort. Lips. 55. Hook. Gard. Ferns t. 22. Hook. et Baker, Syn. Fil. 166.

Doryopteris palmata J. Smith l. c.

Lamina crassior, magis coriacea, fertili 5-6 poll. longa et lata; pinnae 2-3-jugae, usque ad alam 6-12 lin. latam ingredienti, inferiores in latere inferiore pinnatifidae pinnulis lanceolatis integris, intermediae integrae basi haud cuneatae; segmenta integra, 6-8 lin. lata.

Obs. Subvar. *lata* (Hook. Gard. Ferns t. 22.) est forma parte integra 2½-3 poll. lata, divisionibus lanceolato-deltaeideis digitatim patentibus, ad formam sterilem varietatis valde accedens. — Subvar. *elegans* (*Pteris elegans* Yell. Fl. Flum. XI. t. 81. non Swartz, *Doryopteris nobilis* Hort. Angl., Gardner n. 37.) est forma magna, lamina coriacea 9-10 poll. longa et lata, pinnis integris, inferioribus deorsum 9-15 lin. latis.

Filia per totam Americam tropicam, Indiam orientalem et insulas Mascarenas dispersa. Enumeramus solum stationes principes collectoresque intra Brasiliam. Forma typica in prov. Rio Grande do Sul: Padre João da S. Barbara!; S. Catharina: Chamisso; Rio de Janeiro: Langsdorff, Raddi etc.; prov. Minarum: Pohl, Martius, Stephan, Lindberg! — Var. β. in prov. S. Catharinae: Fritz Müller!; Rio de Janeiro, Mandioca, Serra d'Estrella etc.: Raddi!, Martius! atque; ad Caldas prov. Minarum: Lindberg 602!; prope Bahiam: Princ. Neovidensis. — Var. γ. ad Ouro Preto: Pohl; circa Rio de Janeiro, sed rara: Miers!, Raddi, Pohl. — Var. δ. Rio Grande do Sul: Fox!; S. Catharina: Barclay!; Rio de Jan.: Pohl!, Burchell 1938!, Bunbury!, Glaziou 250! 941! atque; ad Caldas prov. Minarum: Lindberg 601!

§ 5. LITOBROCHIA.

13. PTERIS INCISA THUNB. stipitibus segregatis validis nitidis nudis rufescentibus vel stramineis, frondibus amplis membranaceo-herbaceis ovato-deltaeideis tripinnatifidis vel tripinnatis utrinque nudis infra glaucescentibus, pinnis sessilibus horizontalibus oblongo-lanceolatis, inferioribus maximis, pinnulis sessilibus patentibus lanceolatis laxis profunde pinnatifidis vel deorsum usque ad costam pinnatis, segmentis ovato-lanceolatis planis subintegris, venulis laxis plerumque plus minus praecipue in arcus costales anastomosantibus; indusiis teneris nudis.

Tabula nostra XXIV. Fig. 15. et XXV. Fig. 5. 6. (partes pinnae).

Pteris incisa Thunb. Fl. Cap. 733. Swartz, Syn. Fil. 99. Willd. Sp. Plant. V. 396. Agardh, Rec. Pter. 78. Ettingsh. Farnkr. t. 68. fig. 7.

Pteris elegans Swartz in Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 70. Agardh l. c. 76.

Pteris Vespertilionis Labill. Nov. Holl. 96. t. 245. Willd. Sp. Plant. V. 400. et Auctt.

Pteris pallida Raddi, *Fil. Bras.* 49. t. 71. *Ettingsh.* l. c. t. 63. fig. 6.

Pteris cruciata Kaulf. in *Sieb. Syn. Fil.* n. 79. *Agardh* l. c. 79.

Pteris glaucescens Bory in *Willd. Sp. Plant.* V. 396.

Pteris australasica Desv. *Prodr.* 302. et *synonyma multa alia.*

CAUDEX validus, lignosus, longe repens, PALIS parvis castaneis linearibus divaricatis vestitus. STIPITES segregati, erecti, nitidi, nudi, basi castanei, sursum rufescentes vel substraminei, 1—2 pedes vel ultra longi, profunde canaliculati. LAMINA oblongo-deltoida, tripinnatifida vel tripinnata, membranaceo-herbacea, utrinque nuda, supra pallide viridis, infra glaucescens, quoad magnitudinem valde variabilis, longitudine 6—12 pedes attingens, 1½—2 pedes vel ultra lata, interdum inter ramos stirpium vicinarum subscondens. RACHES strictae, nuda, rufescentes vel stramineae. PINNAE inferiores maximae, sessiles, horizontaliter patentes, oppositae, oblongo-lanceolatae. PINNULAE lanceolatae, rectangulariter patentes, sessiles, laxae, pinnarum imarum 3—4 poll. longae, 12—18 lin. latae, inferiores interdum ad auriculas ovatas repandas 1 poll. longas redactae, maximae superne pinnatifidae, deorsum plerumque usque ad costam pinnatae; SEGMENTIS oblongis, obtusis, integris vel paullulum sinuato-repandis, 6—12 lin. longis, 2—4 lin. latis, vena centrali distincta praeditis, venulis distinctis laxis raro liberis plerisque in arcus costales vel extrorsum iterum anastomosantibus. SORI secundum oppositos segmentorum margines subcontinui. INDUSIUM membranaceum, nudum, tenerum.

Intra Brasiliam in monte Corcovado aliisque locis prope Rio de Janeiro: *Burchell 1404!*, *Glaziou 2316!*; in Serra da Piedade et ad Ouro Preto prov. Minas: *Warming!*, *Freyreiss*, *Langsdorff*. — *Practerea per regiones calidiores et praecipue austro-temperatas veteris orbis late vagans, rarior in America, in Chile tamen, ins. Juan Fernandez, Peruvia, Columbia (Fendler 93) et insulis Antillanis obvia.*

14. PTERIS SPLENDENS KAULF. stipitibus fasciculatis nudis nitidis stramineis, frondibus chartaceis utrinque nudis subnitidis oblongo-rhomboidis simpliciter pinnatis vel raro pinnis inferioribus furcatis, pinnis 4—9-jugis erecto-patentibus lineari-ligulatis integris, marginibus sterilibus denticulatis, venulis conspicuis in series 4—5 macularum anastomosantibus; indusiis nudis angustis.

Pteris splendens Kaulf. *Enum. Fil.* 186. *Agardh, Rec. Pter.* 54. *Hook. Sp. Fil.* II. 211. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 168.

Litobrochia splendens Presl, *Tent.* 149. *Moore, Ind. Fil.* p. XLIV.

Litobrochia chrysodioides Fée, *Gen. Fil.* 136.

Pteris chrysodioides Hook. *Sp. Fil.* II. 211.

CAUDEX lignosus, suberectus. STIPITES fasciculati, stricti, erecti, nitidi, nudi, straminei vel subrufescentes, 6—18 poll. longi. LAMINA chartacea, utrinque concolor, nuda, nitide viridis, oblongo-rhomboida, 1½—2 pedes longa et lata, simpliciter pinnata vel raro pinnis imis prope basin furcatis. PINNAE erecto-patentes, oppositae vel alternae, 4—9-jugae, lineari-ligulatae, inferiores maximae, 6—12 poll. longae, 6—12 lin. latae, breviter petiolatae, basi in eodem latere 1—2½ poll. distantes, marginibus sterilibus aristato-denticulatis, basi subaequaliter cuneata vel subrotundata, sursum ad apicem acuminatum sensim angustatae, superiores sessiles; pinna terminalis reliquis consimilis. COSTAE pinnarum distinctae, elevatae, stramineae vel raro rufescentes; venae distinctae, primariae subrectangulariter patentes, inter costam et marginem in series 4—5 macularum hexagonarum anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI secundum oppositos pinnarum margines, apice denticulato excepto, continui. INDUSIUM nudum, angustum, griseum, demum occultum.

Habitat in prov. S. Catharinae: *Chamisso*; in Sebastianopolitana, e. gr. Serra dos Orgãos: *Sello!*, *Gardner 149!*, *Glaziou 2304—5!*; in prov. S. Pauli: *Burchell 4659!*; in sylvis umbris ad Arraial-Velho prov. Minas: *Gardner 5300!*; prope Itheos Bahiae: *Martius*, *Blanchet 3941!*. *Practerea Columbian* incolit. — *Vaga et Extrabras.*

15. PTERIS DENTICULATA SWARTZ: stipitibus fasciculatis nudis nitidis stramineis, frondibus papyraceo-herbaceis concoloribus nudis deltoideis, sursum 1-, deorsum 2-pinnatifidis, pinnis 3—6-jugis, inferioribus maximis deorsum vel utrinque pinnatifidis, pinnulis pinnisque simplicibus lineari-ligulatis, fertilibus angustioribus, sterilibus aristato-denticulatis, venulis in series 3—4 macularum anastomosantibus; indusiis nudis, angustis.

Tabula nostra XXIV. Fig. 9. (apex frondis).

Pteris denticulata Swartz, *Prodr.* 129. *Syn. Fil.* 97. *Willd. Sp. Plant.* V. 272. *Hook. et Grev. Ic. Fil.* t. 28. *Ettingsh. Farnkr.* t. 67. fig. 4.

Litobrochia denticulata Presl, *Tent.* l. c.

Pteris tristicula Raddi, *Syn. Fil.* n. 112. *Fil. Bras.* 46. t. 69.

Pteris serrata et palmata Vell. *Fl. Flum.* XI. t. 82. 87.

Litobrochia papyracea Fée, *Gen. Fil.* 136.

Pteris papyracea Hook. *Sp. Fil.* II. 212.

Pteris stenophylla Link, non Hook. et Grev.

Pteris salicifolia Schrad. *Mss.*

Pteris cretica Hook. *Sp. Fil.* II. 160. quoad plantam *Tweedianam* citatam.

Litobrochia tristicula et denticulata Presl, *Tent.* 149.

CAUDEX erectus, lignosus, PALIS fibrillosis, parvis, castaneo-ebeneis vestitus. STIPITES fasciculati, 6—9 poll. longi, straminei, graciles, erecti, nudi, angulati, antice profunde canaliculati. LAMINA papyraceo-herbacea, utrinque glabra, concolor, viridis, rhomboida vel deltoidea, 6—12 poll. longa, 6—9 poll. lata, deorsum bipinnatifida. RACHES strictae, stramineae, graciles, nuda. PINNAE distinctae infra apicem pinnatifidum 3—6-jugae, semper oppositae; inferiores subpatentes, deltoideae, sessiles vel breviter petiolatae, segmento intermedio lineari-ligulato 3—6 lin. lato basi angustato apice acuminato, latere superiore integro, inferiore prope basin furcato vel pinnatifido, pinnulis 2—4 similibus, imis longioribus 1—3 poll. longis; mediae sessiles, inferiores plerumque deorsum paullulum pinnatifidae, superiores simplices; apex frondis pinnatifidus, segmentis linearibus 3—4-jugis basi decurrenti-confluentibus. Segmenta sterilia fertilibus subduplo latiora, margine aristato-denticulata. COSTAE segmentorum distinctae, stramineae; venae graciles, distinctae, primariae subpatentes, inter costam et marginem in series 3—4 macularum hexagonarum anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI secundum margines oppositos segmentorum, apice excepto, continui. INDUSIUM nudum, angustum, griseum, membranaceum.

VAR. β. BRASILIENSIS Baker.

Tabula nostra XXVI. Fig. 3. (titulo specifico Raddiano Pteridis brasiliensis).

Pteris brasiliensis Raddi, *Syn. Fil.* n. 111. *Fil. Bras.* 47. t. 68. *Agardh, Rec. Pter.* 55. *Hook. Sp. Fil.* II. 214. *Ettingsh. Farnkr.* t. 69. fig. 4.

Pteris reticulata Desv. *Mag. Nat. Berl.* 1811. p. 324. *Ann. Soc. Linn. Par.* VI. 296.

Litobrochia brasiliensis Presl, *Tent.* 149.

Major, 12—24 poll. longa, 8—12 poll. lata, segmentis latioribus, fertilibus 6—12 lin. latis, magis dissecta, pinnis inferioribus interdum utrinque pinnatifidis, pinnulis 4—6-jugis.

Frequens per totam Brasiliam. In prov. Rio Grande do Sul, e. gr. ad Porto Alegre, magisque versus Austrum in provinciis Corrientes et Entre Rios: *D'Orbigny*, *Fox!*, *Tweedie!*; in prov. S. Catharinae: *Chamisso*; Rio de Janeiro: *Raddi!*, *Gardner 34!*, *Gaudichaud*, *Bunbury!*, *Glaziou 255!*, *432!*, *433!* omnesque fere collectores; prov. Minas ad Caetano, Rio Abaite etc.: *Gardner 5301!* *Pohl!*; S. Paul ad Campinas: *Burchell 5061!*; prov. Bahiae, e. gr. Itheos in sylvis umbrosissimis: *Martius*, *Princ. Neuwied!*, *Luschnath (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 332! 333!)*, *Blanchet 2479!*, *2637!*, *3930!*, *3941!*; in sylvis ad fl. Yapurá prov. do Alto Amazonas: *Martius*. — *Practerea Cubam et Hispaniolam incolit (Wright 870!, Swartz).* — *Vaga et Extrabras.*

16. *PTERIS MACROPTERA* LINK: stipitibus subsegregatis validis nudis nitidis stramineis, frondibus papyraceis utrinque nudis deltoideis deorsum bipinnatifidis, pinnis magnis infra apicem pinnatifidum 2—3-jugis patentibus, inferioribus maximis symmetrice oblongo-lanceolatis, pinnulis laxis multijugis lineari-ligulatis integris acuminatis basi cuneato-decurrentibus usque ad costam anguste alatum ingredientibus, venulis in series 3—4 macularum anastomosantibus; indusiis nudis angustis.

Pteris macroptera Link, *Sp. Fil.* 58. *Agardh, Rec. Pter.* 64. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 58. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 169.

Litobrochia macroptera J. Smith, *Ferns Brit. et For.* 193.

Pteris intermedia Kaulf. teste Presl, *Ettingsh. Farnkr. t. 66. fig. 7.*

Litobrochia intermedia Presl, *Tent.* 149.

CAUDEX lignosus, breviter repens. STIPITES subsegregati, validi, nudi, nitidi, straminei, 12—18 poll. longi, antice canaliculati. LAMINA papyraceo-herbacea, utrinque glabra, concolor, viridis, siccitate nigrescens, deltoidea, 1½—2 pedes longa et lata, deorsum bipinnatifida. PINNA terminalis oblongo-lanceolata, petiolata, 12—15 poll. longa, 8—12 poll. lata, usque ad costam anguste alatum pinnatifida, segmentis lineari-ligulatis 8—12-jugis ascendentibus integris acuminatis, 6—8 lin. latis, basi cuneato-decurrentibus; pinnae laterales oppositae, 2—3-jugae, subpatentes, terminali similes, sed minores; superiores sessiles; infimae maximae, pinnulis laxis 6—8-jugis, petiolo longe cuneatim alato. COSTAE distinctae; venae distinctae vel subobscurae, inter costam et marginem in series 3—4 macularum hexagonarum anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI secundum margines frondis continui. INDUSIUM angustum, nudum, membranaceum.

Habitat in sylvis ad ripas fluv. Yapurá: Martius; in sylvis prope Tijuca, Corcovado atibique prov. Rio de Janeiro: Gardner 5670!; Martius, Glaziou 2310! 2149!; in prov. S. Pauli, Serra de Cubatão: Burckell 3629!; in prov. S. Catharinae: Fritz Müller! — Vaga.

17. *PTERIS DECURRENS* PRESL: stipitibus fasciculatis stramineis inermibus sursum pilosulis, frondibus herbaceis oblongo-deltaeideis perfecte bipinnatifidis concoloribus obscure viridibus pilosulis, pinnis 2—8-jugis oppositis subpatentibus lanceolato-ligulatis, inferioribus sessilibus, imis prope basin furcatis, superioribus secundum rachem anguste decurrentibus, omnibus usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, pinnulis linearibus patentibus integris 20—30-jugis, venulis in 2—3 series macularum anastomosantibus; indusiis angustis, ciliatis.

Tabula nostra XXV. Fig. 7—9. et XXVI. Fig. 4. (partes pinnarum).

Pteris decurrens Presl, *Del. Prag.* 183. *Raddi, Fil. Bras.* 48. t. 69 bis. *Agardh, Rec. Pter.* 61. *Hook. Sp. Fil.* II. 221. *Ettingsh. l. c. 60. fig. 3. t. 63. fig. 9. 11.*

Pteris appendiculata Kaulf. *Enum. Fil.* 187.

Litobrochia decurrens Presl, *Tent. Pter.* 149.

CAUDEX lignosus, erectus. STIPITES 12—18 poll. longi, graciles, straminei, stricti, sursum pilosuli. LAMINA herbacea, concolor, obscure viridis, praesertim subtus pilosula, oblongo-deltaeidea, 1—3 pedes longa, 9—15 poll. lata, perfecte bipinnatifida, pinnis imis prope basin furcatis. RACHES strictae, stramineae, pilosulae. PINNAE 2—8-jugae, subpatentes, oppositae vel suboppositae; inferiores subsessiles, basi 2—3 poll. distantes, mediis subaequales vel paulo majores; omnes lanceolato-ligulatae, 6—9 poll. longae, 1½—2 poll. latae, usque ad costam anguste alatum pinnatifidae, PINNULIS linearibus laxis subpatentibus 20—30-jugis, sterilibus leviter denticulatis; pinnae superiores similes sed breviores, basi secundum rachem alá perangustá decurrentes; terminalis reliquis consimilis. VENULAE immersae, obscurae; maculae inter costam et marginem bi-triseriatae, venulis liberis inclusis nullis. SORI secundum oppositos pinnularum margines, summo apice excepto, continui. INDUSIUM angustum, membranaceum, ciliatum.

Habitat ad fl. Solimões in ditone Indianorum Juri: Martius (Spix); in sylvis prope Salgado prov. Minarum: Martius; in monte Corcovado aliisque locis prov. Rio de Janeiro; Raddi, Langsdorff, Pohl, Gardner 33! 153!, Glaziou 434!, Bunbury! etc. — Etiam in Chile: Cuming. — Vaga et Extrabrisil.

18. *PTERIS ACULEATA* SWARTZ: stipitibus fasciculatis longis nitidis stramineis nudis vel deorsum muricatis, frondibus magnis herbaceis utrinque glabris concoloribus deltoideis tripartito-pinnatifidis, divisionibus longe petiolatis oblongo-deltaeideis, pinnulis lanceolato-ligulatis oppositis 6—9-jugis, inferioribus maximis breviter petiolatis, superioribus sessilibus, omnibus usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, segmentis 15—20-jugis linearibus contiguis vel laxis, sterilibus denticulatis, venulis in series 2—3 macularum anastomosantibus; indusiis nudis angustis.

Tabula nostra XLIV. Fig. II. (analysis).

Pteris aculeata Swartz, *Prodr. Fl. Ind. occ.* 129. *Syn. Fil.* 100. *Willd. Sp. Plant. V.* 398. *Agardh, Rec. Pter.* 68. *et Auctt.*

Polypodium spinosum Linn. *Sp. Plant.* 1554. *fide Agardh.*

Pteris Beecheyana Agardh, *Rec. Pter.* 68.

Pteris Protea Liebm. *Mex. Breg.* 76.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALMIS rigidis linearibus parvis vestitus. STIPITES fasciculati, 1½—2 ped. vel ultra longi, validi, straminei, nitidi, nudi vel interdum sursum punctis elevatis scabri, basi aculeis ramentisque dense obsiti (SPRUCK). LAMINA herbacea, utrinque viridis, concolor, glabra, rhomboidea vel deltoidea, tripartito-tripinnatifida, 3—4 pedes vel ultra longa et lata. RACHES strictae, nudeae, stramineae. Divisio media frondis oblongo-deltaeidea, petiolo 3—6 poll. longo instructa; pinnis oppositis, 6—9-jugis, lanceolato-ligulatis, suberecto-patentibus, inferioribus maximis, breviter petiolatis, 9—18 poll. longis, 1½—3 poll. latis, usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, pinnulis linearibus acutis laxis subfalcatis 15—20-jugis deorsum 3 lin. latis, sinibus rotundatis, segmentis aequilatis; pinnae superiores sessiles, sensim breviores; terminalis reliquis consimilis. Segmenta sterilia denticulata. Divisiones laterales frondis subpatentes vel erecto-patentes, terminali consimiles sed plerumque minores petiolisque brevioribus donatae. VENAE graciles, distinctae; maculae inter costam et marginem bi-triseriatae. SORI secundum margines segmentorum, apice excepto, continui. INDUSIUM nudum, angustum.

Var. β . PROPINQUA Baker.

Tabula nostra XXV. Fig. 10. et XXVI. Fig. 1. 2. (titulo Agardhiano specifico, frons parva steritis et pinnula fertitis).

Pteris propinqua Agardh, *Rec. Pter.* 65. *Hook. Sp. Fil.* II. 223. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 59.

Pteris polita Link, *Hort. Berol.* 30. *Klotzsch, Linnæa* XX. 342.

Campteria Luschnathiana Klotzsch Mss.

Pteris Luschnathiana Baker in *Hook. et Baker Syn. Fil.* 172.

Litobrochia polita J. Smith, *Ferns Brit. et For.* 193.

Pteris bififormis Splüg. *Enum. Fil. Sur.* 34. *Kunze, Linnæa* XXI. 217.

Pteris elongata Schrad. Mss.

Pteris podophylla var. *breviloba* Kunze Mss.

Pteris Hostmanniana Presl, *Ettingsh. Farnkr. t. 64. fig. 3.*

Pteris Orizabae Mart. et Gal. *Fil. Mex.* 53. t. 13. *Ettingsh. t. 66. fig. 2. 3.*

Pteris apicalis Liebm. *Mex. Breg.* 78.

Pteris Blanchetiana Presl, *Ettingsh. l. c. t. 63. fig. 7.*

Stipites straminei, inermes; lamina minor interdum subcoriacea, pinnulis brevioribus et angustioribus 6—12 poll. longis 12—15 lin. latis, segmentis contiguis, sterilibus argute denticulatis.

Species a Bolivia et Peruvia in Mexicum insulasque Antillanas disseminata nec non in insulis Oceanicis obvia. In Brasilia lecta est forma typica in parte austro-orientali, loco accuratius non indicato: Sello; ad Rio de Janeiro: Glaziou 2309! 2314! 2472! 2806!; in prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming!. Varietas ad Bahiam: Luschnath!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 334., Princ. Newwied!, Blanchet! — Etiam in Guyana batava: Splitgerber, Hostmann 730!, Kegeel 86., et in anglica: Appun 586!

19. *PTERIS LEPTOPHYLLA* SWARTZ: stipitibus fasciculatis gracilibus nitidis nudis stramineis, frondibus mediocribus papyraceo-herbaceis concoloribus glabris deltoideis 3—4-pinnatifidis, pinnis inferioribus deltoideis longe maximis petiolatis, pinnulis lateris inferioris productis lanceolatis pinnatis vel bipinnatis, segmentis ultimis anguste linearibus, sterilibus argute aristato-denticulatis, venulis in maculas 1- v. 2-seriatis anastomosantibus vel interdum perfecte liberis; indusiis nudis angustis.

Pteris leptophylla Swartz in *Stockholm. Vet. Akad. Handl.* 1817, p. 70. *Agardh, Rec. Pter.* 57. *Hook. Sp. Fil. II.* 216. *Gard. Ferns.* t. 23. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 58. et *Auctt.*

Litobrochia leptophylla Presl, *Tent. Pter.* 145.

Pteris spinulosa Raddi, *Fil. Bras.* t. 70.

Pteris peucedanifolia Schrad. *Mss.*

Pteris decurrens Vell. *Fl. Flum. XI.* t. 85., non Presl.

CAUDEX erectus. STIPITES 6—12 poll. longi, dense fasciculati, graciles, erecti, nitidi, nudi, straminei. LAMINA papyraceo-herbacea, utrinque concolor, laete-viridis, glabra, 6—12 poll. longa, 6—9 poll. lata, deltoidea, 3- v. 4-pinnatifida. PINNAE compositae 5-6-jugae, oppositae, patentae, imbricatae; inferiores maximae, inaequaliter deltoideae, distincte petiolatae, pinnulis lateris inferioris productis lanceolatis vel imis deltoideis 2—3 poll. longis, segmentis linearibus simplicibus vel inferioribus lanceolatis ad costam anguste alatum pinnatifidis. Apex frondis segmentis contiguus 4—6-jugis linearibus simplicibus adscendentibus instructus. SEGMENTA ultima simplicia, linearia, acuminata, subcontigua, erecto-patentia, 1/2—2 poll. longa, 1—2 lin. lata, sterilia argute aristato-denticulata. VENAE graciles, immersae, distinctae, obliquae, maculas uni- vel biseriatis inter costam et marginem pleraque efformantes. SORI secundum margines segmentorum, apice excepto, continui. INDUSIUM nudum, angustum, pallidum, membranaceum.

Var. β . GRACILIS Baker.

Tabula nostra XXIII. Fig. 3. 10. (pinnae inferiores).

Pteris spinulosa Raddi, *Fil. Bras.* t. 70 bis.

Pteris gracilis Fée, *Gen. Fil.* 128. *Hook. Sp. Fil. II.* 172. t. 128 A. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 160.

Pteris semidentata Fée, *Mem. VI.* 32. t. 18. fig. 3. *Hook. Sp. Fil. II.* 172. t. 128 B.

Pteris leptophylla Ettiingsh. *Farnkr.* t. 61. fig. 7. 9.

Segmenta angustiora, interdum ad dimidium latitudinis dissecta, dentibus longe aristatis, venulis ultimis obliquis liberis furcatis vel omnino simplicibus ad apices dentium egredientibus.

Habitat per provincias Brasiliae medias et austro-orientales itemque in Columbia et Cuba. Rio Grande do Sul: Tweedie 1122!; Rio de Janeiro, Serra d'Estrella, Corcovado, Cabo Frio etc.: Raddi, Pohl, Princ. Neuwied!, Gardner 32!, Bunbury, Burchell!, Gaudichaud, Glaziou 261! 424! 430! etc. etc.; Minas Geraes, e. gr. ad Ouro Preto: Langsdorff, Claussen, Raben!; Bahia, ad viam Fetisbertiam etc.: Princ. Neuwied. — Vaga et Extrabrazil.

XI. LOMARIA WILLD.

LOMARIA Willd. *Mag. Naturf. Freunde zu Berlin* 1809. p. 160. *Kaulf. Enum. Fil.* 149. *Presl, Tent. Pter.* 141. *Hook. et Bauer, Gen. Fil.* t. 64 B. *Hook. Sp. Fil. III.* 2. — STEGANIA R. Br. *Prodr. Fl. Nov. Holl.* 152. — LOMARIDIUM, ORTHOGRAMMA, SPICANTA et PARABLECHNUM Presl, *Epim.* 109. etc. — PLAGIOGYRIA Metten. *Farnplantungen* t. 25. — Blechni pars Metten. *Fil. Hort. Lips.* t. 60. ex parte. — Onoclea sp. Linn., Swartz.

FRONDES constanter diffformes. SORI lineares, continui, totam faciem inferiorem pinnarum angustarum frondis fertilis occupantes.

Polypod.

Tabula nostra XLIV. Fig. III.

CAUDEX lignosus, repens vel suberectus, interdum emersus, 3—4 pedes attingens, PALEIS dense vestitus. STIPITES cum caudice continui, validi, stricti. FRONDES diffformes, plerumque magnae vel mediocres, coraceae vel subcoriaceae, glabrae, RACHIBUS validis strictis, in speciebus nostris semper simpliciter pinnatae; PINNIS contiguus vel subcontiguus, linearibus, patentibus, multijugis, in fronde sterili latioribus planis, in fertili contractis. VENAE conspicuae, subpatentes, confertae, parallelae, simplices vel unifurcatae, semper liberae. RECEPTACULUM latum, lineare, totam faciem inferiorem pinnarum frondis fertilis occupans. INDUSIUM latum, scariosum, e margine frondis mutato formatum, persistens, superum. — Genus habitu Blechno omnino consimile, sed differt indusio more Pteridis omnino confluenti et frondibus difformibus. Species circiter 40, per regiones calidiores et praecipue austro-temperatas utriusque orbis late dispersae.

CLAVIS SPECIERUM.

A. Pinnae frondis sterilis basi contiguae, dilatatae.

a. Pinnae inferiores sensim reductae.

* Lamina sterilis anguste ligulata, 6—12 lin. lata.

1. L. PENNA-MARINA.

** Lamina sterilis lanceolata.

1. Pinnae acutae, mediae 6—12-plo longiores quam latae 2. L. ATTENUATA.

2. Pinnae obtusiusculae, mediae 3—4-plo longiores quam latae 3. L. LANCEOLATA.

b. Pinnae inferiores mediis subaequales 4. L. PLUMIERI.

B. Pinnae frondis sterilis basi disjunctae et rotundato-angustatae.

a. Paleae lineares, membranaceae, pallide brunneae.

5. L. CAPENSIS.

b. Paleae fibrilloso-subulatae, castaneo-ebeneae.

6. L. TABULARIS.

1. LOMARIA PENNA-MARINA METT. frondibus chartaceis anguste ligulatis, pinnis 20—50-jugis confertis, mediis 4—6-plo longioribus quam latis, inferioribus sensim reductis; frondibus fertilibus longius petiolatis.

Lomaria Penna-marina Metten. *Mss.*

Polypodium Penna-marina Poir. *Encycl.* V. 320.

Blechnum Penna-marina Kuhn, *Fil. Afr.* 92.

Stegania alpina R. Br. *Prodr. Fl. Nov. Holl.* 152.

Lomaria alpina Spreng. *Syst. Veg.* IV. 62. *Hook. fil. Fl. Antarct. II.* 393. t. 150. *Hook. Fil. Exot.* t. 32. *Sp. Fil. III.* 16.

Lomaria polypodioides Gaudich. *Frey. Voy.* 374.

Lomaria australis Kunze, *Pl. Poepp.* 57. *Cl. Gay, Fl. Chil.* IV. 481.

Lomaria microphylla Goldm. *Pl. Mey.* 460.

Lomaria Sellowiana Presl, *Tent.* 142.

Lomaria Gayana Fée, *Mem.* VII. 25. t. 10. fig. 1.

CAUDEX firmus, crassitie pennae corvinae, plus minus repens, PALEIS lanceolatis membranaceis pallide brunneis 1—2 poll. longis primum vestitus. STIPITES fasciculati, castaneo-ebenei, basi solum paleacei, frondis sterilis 2—4 poll., fertilis 4—9 poll. longi. LAMINA sterilis chartacea,

utrinque nuda, pallide viridis, anguste ligulata, 4—12 poll. longa, 6—12 lin. lata, usque ad costam pinnata; PINNIS confertis, horizontaliter patentibus, lineari-oblongis, obtusis, mediis 3—6 lin. longis $1\frac{1}{2}$ —3 lin. latis, inferioribus sensim ad aurículas reductis, imis saepe laxioribus. VENAE immersae vel distinctae, adscendentes, confertae, unifurcatae. LAMINA fertilis pinnis paucioribus, paullulum laxioribus et angustioribus. INDUSIUM latum, membranaceum, margine crispato-dentato.

Habitat in Brasilia australi, loco accuratius haud indicato: Sello! — Praeterea per regiones austro-temperatas Americae late dispersa itemque in Australia, Nova-Zealandia et insula Tristan d'Acunha obvia.

2. LOMARIA ATTENUATA WILLD. paleis linearibus, frondibus sterilibus nudis oblongo-lanceolatis utrinque angustatis, pinnis linearibus 20—40-jugis 6—12-plo longioribus quam latis, apice acutis vel acuminatis, basi contiguas aequalibus vel parum dilatatis, inferioribus ad aurículas rotundatas sensim reductis.

Lomaria attenuata, Willd. Sp. Plant. V. 290. Presl, Tent. Pter. 143. Hook. Sp. Fil. III. 6. et Auctt.

Onoclea attenuata Swartz, Syn. Fil. 112 et 308.

Blechnum attenuatum Metten. Fil. Hort. Lips. 64. tab. 3. fig. 1—6.

Lomaria gigantea Kaulf. Enum. Fil. 150. Hook. Sp. Fil. III. 10.

Blechnum giganteum Schlecht. Fil. Cap. 36. t. 20 et 22. fig. 1.

Lomaria hamata Kaulf. Enum. Fil. 150.

Lomaria acuminata et heterophylla Desv. Berl. Mag. V. 326 et 330.

Lomaria circinata Bojer, Hort. Maur. 406.

Lomaria decrescens Fée, Mem. VIII. 24. t. 9. fig. 1.

Lomaria meridensis Klotzsch, Linnaea XX. 345.

CAUDEX lignosus, horizontalis, crassitie digiti, longe repens, PALEIS membranaceis crispis castaneis linearibus 6 lin. vel ultra longis erecto-patentibus dense vestitus. STIPITES 3—12 poll. longi, erecti, stricti, straminei vel raro ebenei, nudi vel parum paleacei. LAMINA sterilis coriacea vel subcoriacea, utrinque glabra, oblongo-lanceolata, 1—3 pedes longa, 6—12 poll. lata, utrinque angustata, usque ad rachem simpliciter pinnata. RACHES strictae, stramineae, antice profunde canaliculatae. PINNAE 20—40-jugae, lineares, 2—6 poll. longae, 4—6 lin. latae, subpatentes vel paullulum adscendentes et falcatae, marginibus integris, basi contiguae aequales vel paullulum dilatatae, supra medium in apicem acutum vel acuminatum sensim angustatae, inferiores laxiores et ad aurículas rotundatas sensim reductae. VENAE subpatentes, immersae, contiguae, parallelae, simplices vel unifurcatae. LAMINA fertilis minor, pinnis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis, laxis, patentibus, basi angustatis, mediis in eodem latere 3—6 lin. distantibus. INDUSIUM nudum, scariosum, crispum, pallide brunneum, persistens.

Var. β . PTEROPUS Baker.

Lomaria pteropus Kunze in Schkuhr Fil. Suppl. 97. t. 46. Hook. Sp. Fil. II. 7.

Acrostichum heterophyllum Raddi, Fil. Bras. 5. t. 17.

Lamina sterilis minor, pinnis paucioribus, inferioribus in alam costularem continuam confluentibus.

Habitat super truncos vetustos scandens in sylvis provinciarum Brasiliae mediarum et austro-orientalium, ceterum inter tropicos Novi Orbis inque austro-temperatis utriusque hemisphaerii, in insulis Mascarenis et Fernando Po divulgata. Intra Brasiliae limites lecta est in prov. S. Catharinae: Fritz Müller!; in Serra dos Orgãos, Corcovado, aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Burchell 2468!, Raddi!, Sello!, Glaziou 1762! 2060!; ad Caldas, S. João d'El Rei atibique in prov. Minarum: Martius, Lindberg 615! etc.; et ad Almada prov. Bahiensis: Martius.

3. LOMARIA LANCEOLATA SPRENG. paleis lanceolatis, frondibus sterilibus nudis oblongo-lanceolatis utrinque angustatis, pinnis 15—20-jugis 3—4-plo longioribus quam latis apice subobtusis basi contiguas et paullulum dilatatis, inferioribus ad aurículas rotundatas sensim reductis.

Lomaria lanceolata Spreng. Syst. Veg. IV. 62. A. Cunningham. Comp. Bot. Mag. II. 263. Hook. Ic. Plant. t. 429. Hook. fil. Fl. Nov. Zeal. II. 31. Fl. Antarct. I. 110. Hook. Sp. Fil. III. 11.

Stegania lanceolata R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 152.

Lomaria obtusata Labill. Sert. Nov. Cal. 4. t. 6.

Lomaria L'Herminieri Bory Mss. Kunze in Schkuhr Fil. Suppl. 173. t. 73. Hook. Sp. Fil. III. 9. Hook. et Baker, Syn. Fil. 176.

Blechnum L'Herminieri Metten. Fil. Hort. Lips. 64. t. 4. fig. 13—14.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS membranaceis lanceolatis castaneo-ebeneis dense vestitus. STIPITES erecti, segregati vel subfasciculati, graciles, stricti, glabri, epaleati, frondis sterilis 1—2 poll., fertilis 6—8 poll. longi. LAMINA sterilis subcoriacea, utrinque nuda, supra obscure viridis, infra pallidior, siccitate subgrisea, oblongo-lanceolata, 9—15 poll. longa, 3—4 poll. lata, utrinque angustata, usque ad rachem simpliciter pinnata. RACHES strictae, stramineae, epaleatae, antice profunde canaliculatae. PINNAE 15—20-jugae, lineari-ligulatae, mediae $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, 6—8 lin. latae, subpatentes vel paullulum adscendentes et falcatae, marginibus integris, basi contiguae et paullulum dilatatae, apice subobtusae, inferiores contiguae sensim vel infra citius ad aurículas rotundatas reductae. VENAE obliquae, immersae, sublaxae, pleraeque furcatae. LAMINA fertilis minor, pinnis laxis acutis patentibus vel adscendentibus, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. latis. INDUSIUM nudum, angustum, scariosum, brunneum, denique explanatum.

In Brasilia hucusque solummodo in Serra dos Orgãos observata est: Gardner 5935!, Glaziou 2423! Ceterum in America inde e Chile usque in Antillanas, in Antiquo Orbe per Australiam, Tasmaniam, Novam Zeelandiam insulasque Oceanicas late dispersa.

4. LOMARIA PLUMIERI DESV. paleis linearibus, frondibus sterilibus nudis oblongo-lanceolatis basi truncatis, pinnis lineari-ligulatis 20—30-jugis 9—12-plo longioribus quam latis apice acutis basi contiguas et plus minus dilatatis, inferioribus reliquis subaequalibus.

Plumier, Fil. t. 90.

Lomaria Plumieri Desv. in Mag. Nat. Hist. Berl. 1811. p. 315. Ann. Soc. Lin. Par. VI. 288. Presl, Tent. Pter. 142. Klotzsch, Linnaea XX. 344. Hook. Sp. Fil. II. 8.

Lomaridium Plumieri Presl, Epim. 155.

Lomaria martinicensis Spreng. Neue Entd. III. 5.

Lomaria divergens Kunze, Linnaea IX. 57. Hook. et Baker, Sp. Fil. 176.

Acrostichum confluens Pohl Mss.

CAUDEX lignosus, apice crassitie digiti, repens vel suberectus, PALEIS lineari-subulatis castaneis firmis dense vestitus. STIPITES segregati vel subfasciculati, erecti, stricti, ebenei vel brunnei, epaleati, frondis sterilis 6—8 poll., fertilis 12—15 poll. longi. LAMINA sterilis subcoriacea, utrinque nuda, siccitate fuscens, oblongo-lanceolata, 2—3 pedes longa, 9—15 poll. lata, basi truncata, usque ad rachem simpliciter pinnata. RACHES strictae, epaleatae, ebeneae vel brunneae. PINNAE 20—30-jugae, lineari-ligulatae, 5—8 poll. longae, 8—9 lin. latae, subpatentes vel paullulum adscendentes et falcatae, basi contiguae et plus minus dilatatae, apice acutae, inferiores reliquis subaequales. VENAE laxae, immersae, apice clavato-glandulosae, pleraeque profunde furcatae. LAMINA fertilis minor, pinnis 4—6 poll. longis, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. latis, patentibus vel adscendentibus, basi dilatatis, in eodem latere 9—12 lin. distantibus. INDUSIUM nudum, latum, membranaceum, revolutum.

Var. β . DOUGLASSII Baker.

Pinnæ laxae, mediae marginibus deorsum 6—8 lin. sejunctae, basi utrinque auriculis angustis secundum rachem 3—4 lin. decurrentibus instructae.

Divulgata e Peruvia usque in insulas Antillanas, intra Brasiliam observata est cum varietate in Serra dos Orgãos: Gardner 142!, Douglas; et forma typica etiam in prov. Minarum: Pohl. Haec etiam in Guyana anglica crescit: Rob. Schomburgk 1190!

5. LOMARIA CAPENSIS Willd. paleis membranaceis lanceolato-acuminatis, frondibus sterilibus nudis vel infra ad costas paulo paleaceis oblongo-lanceolatis basi truncatis, pinnis lineari-ligulatis 6—20-jugis 4—6plo longioribus quam latis acutis vel subacutis basi rotundato-angustatis distincte sejunctis, inferioribus reliquis subaequalibus.

Tabula nostra XXVII. Fig. 6. 7. (sub titulo Sprengeliano L. procera) et XLIV. Fig. III. (analysis).

Lomaria capensis Willd. Sp. Plant. V. 291. Poirét, Encycl. Suppl. IV. 146. Spreng. Syst. IV. 64. Kunze, Linnaea X. 505. Ettingsh. Farnkr. t. 77. fig. 3. 9. 10.

Osmunda capensis Linn. Sp. Plant. 7760. Lam. Encycl. IV. 656.

Onoclea capensis Thunb. Prodr. 171. Swartz, Syn. Fil. 111.

Lomaria procera Spreng. Syst. IV. 65. Hook. Ic. Plant. t. 127—8. Gard. Ferns t. 53. Sp. Fil. III. 22.

Stegania procera et minor R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 153.

Lomaria chilensis Kaulf. Enum. Fil. 154.

Osmunda procera Forst. Prodr. n. 414.

Lomaria lineata et striata Willd. Sp. Plant. V. 290. 291.

Lomaria brasiliensis Raddi, Willd. Bras. 50. t. 72.

Lomaria Gilliesii Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 207.

Lomaria ornifolia Presl, Rel. Haenk. I. 51. Ettingsh. Farnkr. t. 77. fig. 7.

Lomaria Regnelliana et danaeacea Kunze, Linnaea XXII. 576. XVIII. 326.

Lomaria palustris Schrad. Mss.

Lomaria Schiediana et Sellowiana Presl Tent., et synonyma multa alia.

CAUDEX crassus, lignosus, suberectus, saepe emersus. PALEAE lanceolato-acuminatae, membranaceae, pallide brunneae, 6—9 lin. longae, deorsum $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae. STIPITES fasciculati, erecti, stricti, castaneo-ebenei vel straminei, deorsum vel toti plus minus paleacei, frondis sterilis 6—8 poll., fertilis 12—18 poll. longi. LAMINA sterilis coriacea, utrinque nuda, subnitida, vel infra ad costas paleis pallide brunneis perparvis furfuraceae, siccitate griseo-fuscens, oblongo-lanceolata, 1—3 pedes longa, 6—12 poll. lata, simpliciter pinnata, basi truncata. RACHES strictae, stramineae vel ebeneae, nudaе vel praesertim in statu juniore paleaceae. PINNAE 6—20-jugae, subpatentes vel paullulum adscendentes, lineari-ligulatae, 3—6 poll. longae, 6—15 lin. latae, contiguae vel sublaxae, apice acutae vel subacutae, marginibus crispulis et praesertim extrorsum argute denticulatis, basi rotundato-angustatae, omnes sessiles vel inferiores

petiolis perbrevis interdem glandulis punctiformibus magnis nigris instructae. VENAE graciles, confertae, immersae, pleraeque profunde furcatae. LAMINA fertilis minor, pinnis linearibus $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis, in eodem latere 6—12 lin. distantibus. INDUSIUM latum, membranaceum, revolutum, nudum, persistens, demum valde dilaceratum, subexplanatum.

Species valde variabilis per terras tropicas et austro-temperatas utriusque orbis dispersa. In Brasiliae prov. Rio Grande do Sul: Fox!; Rio de Janeiro: Raddi!, Sello!, Burchell!, Gardner!, Glaziou 368! 1642! 2424—5!; Minas Geraës: Gardner 5305!, Lindberg 613—14!, Regnell, Bunbury etc.; prov. Bahia: Princ. Neuwied!

6. LOMARIA TABULARIS Metten. paleis rigidis longis fibrilloso-subulatis, frondibus sterilibus nudis vel infra ad costas furfuraceis oblongo-lanceolatis deorsum angustatis, pinnis lineari-ligulatis 20—30-jugis 6—8-plo longioribus quam latis acutis basi angustatis distincte sejunctis, superioribus vel omnibus ad rachem plus minus adnatis, inferioribus reductis.

Lomaria tabularis Metten. Mss. teste Kuhn Fil. African. 94.

Pteris tabularis Thunb. Prodr. 171. Fl. Cap. 732. Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 70. Willd. Sp. Plant. V. 366.

Lomaria Boryana Willd. Sp. Plant. V. 292. Hook. et Baker, Syn. Fil. 180.

Osmunda Boryana Swartz, Syn. Fil. 111.

Lomaria magellanica Desv. Mag. Nat. Hist. Berl. 1811. p. 330. Ann. Soc. Linn. Paris. VI. 289. Hook. fil. Fl. Antarct. II. 393. Hook. Sp. Fil. III. 27. Gard. Ferns t. 52.

Lomaria cinnamomea et Ryani Kaulf. Enum. Fil. 153. 155.

Lomaria rufa Spreng. Syst. Veg. IV. 63.

Lomaria obtusifolia Presl, Tent. 143.

Lomaria Schomburgkii et Moritziana Klotzsch, Linnaea XX. 327. XXII. 346., et synonyma multa alia.

CAUDEX erectus, lignosus, subarborescens, 3—4 pedes attingens. PALEAE fibrilloso-subulatae, rigidae, curvatae, castaneo-ebeneae, densae, inferiores 12—15 lin. longae. STIPITES erecti, stricti, validi, stramineo-brunnei, basi dense paleacei, supra nudi vel paullulum furfuracei, frondis sterilis 1—6 poll., fertilis 12—18 poll. longi. LAMINA sterilis coriacea, oblongo-lanceolata, 1—2 pedes longa, 6—10 poll. lata, simpliciter pinnata, utrinque nuda vel infra ad costas paulo furfuracea, siccitate rigida, fuscens. RACHES strictae, ferrugineae, nudaе vel furfuraceae, paleis linearibus membranaceis pallide brunneis patulis tectae. PINNAE 20—30-jugae, contiguae, lineari-ligulatae, subpatentes vel erecto-patentes, 3—5 poll. longae, 6—9 lin. latae, acutae, integerrimae, marginibus saepe revolutae, basi angustatae saepiusque plus minus ad rachem primariam adnatae, inferiores plus minus decrescentes. VENAE graciles, confertae, immersae. LAMINA fertilis minor, pinnis subcontiguis adscendentibus 2 lin. latis. INDUSIUM latum, membranaceum, revolutum, persistens, demum ruptum et plus minus explanatum.

Novi Orbis zonas tropicam et austro-temperatam, itemque regiones austro-temperatas Africae et insulas Mascarenas inhabitat. In Brasiliae prov. Rio Grande do Sul: Fox!; in Serra da Cubatão prov. S. Pauli: Burchell 3792!; Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Gardner 5396!; Minas Geraës: Freyreiss; e. gr. ad Lagoa Santa: Warning!; prov. Goyaz variis locis: Pohl, Gardner 4396!

TRIBUS V. BLECHNEAE.

SORI oblongi vel lineares, distincte intramarginales, cum rache et margine paralleli, quoad venas transversales, INDUSIIS superis homomorphis introrsum aperiundis.

CAUDEX plerumque erectus, interdum subarborescens, raro repens. STIPITES cum caudice continui, graciles vel validi, raro ebenei vel paleacei. FRONDES conformes, quoad magnitudinem valde variabiles, pleraeque coriaceae vel subcoriaceae, simpliciter pinnatae, PINNIS lineari-ligulatis. VENAE pinnatae, nunquam flabellatae, liberae vel

paullulum anostomosantes in arcus costales vel extrorsum in maculas hexagonas, venulis liberis inclusis nullis. SORI lineares, continui vel subcontinui, cum costa prorsus contigui (Blechnum, Sadleria), vel oblongi, vel subreniformes, dimidio interiori segmentorum impositi, uniseriati vel interdum biseriati (Doodia). INDUSIA soris homomorpha, superiora, introrsum aperta, univalvata, primum soros occultantia, demum laxa. — Species 30—35, per regiones tropicas et temperatas utriusque orbis, praesertim zonae australis, late dispersae.

Genus unicum brasiliense XII. BLECHNUM.

XII. BLECHNUM LINN.

BLECHNUM Linn. Gen. 1175. Swartz, Syn. Fil. 113. Willd. Sp. Plant. V. 407. Fée, Gen. Fil. 72. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 54 B. Hook. Sp. Fil. III. 42. — SALPICHLAENA J. Smith, Gen. Ferns 56. Fée, Gen. Fil. 78. ex parte. — BLECHNUM, DISTAXIA, MESOTHEMA et BLECHNOPHYS Presl, Epim. 103—120. — BLECHNIDIUM Moore, Ferns Gr. Brit. 8. edit. II. 210. in obs.

SORI lineares, mediales vel costales, uniseriati, continui vel subcontinui, INDUSIIS homomorphis superis.

Tabula nostra XLIV. Fig. IV. V.

CAUDEX erectus vel suberectus, interdum lignosus subarborescens, 4—6 pedes attingens. STIPITES subfasciculati, breves vel longi, graciles vel validi, plerique nudi, straminei, interdum late scandentes (Salpichlaena). FRONDES conformes vel subconformes, chartaceae vel coriaceae, pleraeque simpliciter pinnatae, PINNIS lineariligulatis integris vel minute denticulatis, raro simplices vel bipinnatae. VENAE pinnatae, subpatentes vel obliquae, parallelae, simplices vel unifurcatae, apice plus minus incrassatae (saepè intra marginem), liberae vel raro paulo anastomosantes. RECEPTACULUM angustum lineare, quoad venas transversum, cum costa contiguum vel inter illam et marginem mediale, omnino continuum vel in specie prima plus minus interruptum. SORI $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ latitudinis pinnarum occupantes. INDUSIUM membranaeum vel scariosum, margine interiore libero, primum soros occultans, demum plus minus explanatum. — Species 17 per regiones tropicas et austro-temperatas utriusque orbis late dispersae.

CLAVIS SPECIERUM.

§ 1. EUBLECHNUM. Stipites recti, haud scandentes; frondes simplices vel simpliciter pinnatae. — Tabula nostra XLIV. Fig. IV.

A. Sori medii inter costam et marginem 1. BL. AUSTRALE.

B. Sori cum costa contigui, a margine remoti.

I. Lamina simplex vel auriculis parvis duabus ad basin partis primariae instructa 2. BL. LANCEOLA.

II. Lamina simpliciter pinnata, pinnis basi contiguis.

a. Pinnae inferiores ad auriculas rotundatas sensim reductae.

1. Lamina parva; paleae parvae, lineares, pallide brunneae.

* Lamina 4—8 lin. lata 3. BL. ASPLENIODES.

** Lamina 1—2 poll. lata 4. BL. UNILATERALE.

2. Lamina magna; paleae conspicuae, fibrillosae, ebeneae 5. BL. BRASILIENSE.

b. Pinnae inferiores reliquis subaequales 6. BL. NITIDUM.

III. Lamina simpliciter pinnata, pinnis basi sejunctis.

a. Lamina chartacea; pinnae integrae vel extrorsum inconspicue denticulatae.

1. Pinnae 2—8-jugae 7. BL. LONGIFOLIUM.

2. Pinnae 12—20-jugae 8. BL. OCCIDENTALE.

b. Lamina rigide coriacea, pinnae conspicue denticulatae.

9. BL. SERRULATUM.

§ 2. SALPICHLAENA. Stipites late scandentes; frondes bipinnatae. — Tabula nostra XLIV. Fig. V. 10. BL. VOLUBILE.

§ 1. EUBLECHNUM.

1. BLECHNUM AUSTRALE LINN. frondibus lanceolatis, pinnis 20—40-jugis anguste ligulatis basi dilatatis vel auriculatis, superioribus contiguis, inferioribus laxis sensim reductis; soris medialibus saepe interruptis.

Blechnum australe Linn. Mant. 130. Thunb. Prodr. 172. Swartz, Syn. Fil. 114. Schkuhr, Fil. 110b. Willd. Sp. Plant. V. 410. Hook. Sp. Fil. III. 56.

Mesothema australe Presl, Epim. 112.

Blechnum hastatum Kaulf. Enum. Fil. 161. Kunze, Linnaea IX. 60. Hook. Sp. Fil. III. 57.

Blechnum auriculatum Cavan. Praelect. 1801. p. 262. Swartz, Syn. Fil. 114.

Mesothema auriculatum, rigidum, hastatum, trilobum et remotum Presl, Epim. 111—2.

Blechnum rigidum Swartz, Syn. Fil. 114. et synonyma multa alia.

CAUDEX erectus, PALEIS linearibus membranaceis saturate brunneis 2—3 lin. longis paucis sursum vestitus. STIPITES caespitiosi, straminei, nudi, 2—6 poll. longi. LAMINA chartacea, utrinque pallide viridis, glabra vel praecipue infra inconspicue breviter griseo-pubescentis, lanceolata, 9—18 poll. longa, 2—4 vel raro 6 poll. lata, apice excepto pinnata; PINNAE anguste ligulatae acutae 20—40-jugae, superiores contiguae, mediae 1—2 vel raro 3 poll. longae in medio 2—4 lin. latae basi dilatatae vel saepe utrinque plus minus distincte auriculatae, inferiores laxae sensim reductae, imis vix longioribus quam latis. VENAE graciles, adscendentes, confertae, mediae saepe bifurcatae. SORI inter costam et marginem mediales, saepe plus minus interrupti. INDUSIUM griseum, membranaceum, glabrum, quidquam persistens.

Species per regiones austro-temperatas Novi Orbis itemque Africae late dispersa, quum in ditone Bonariensi (Gibert 624!, Tweedie 597!, Gillies!) et in Uruguayensi (Gibert 106! 615! 618!, Fox 343!, King) observata sit, verisimillime etiam in Brasilia australi provenit, ubi revera a cl. Moore indicatur (Ind. Fil. 197). Equidem tamen specimina Brasiliensia non vidi.

2. BLECHNUM LANCEOLA SWARTZ: paleis parvis membranaceis, stipitibus gracilibus substramineis subfasciculatis, frondibus ligulato-lanceolatis vel linearibus, simplicissimis vel auriculis rotundatis duabus ad basin laminae instructis; soris costalis linearibus continuis.

Tabula nostra XXV. Fig. 14. 15. (frondes parvulae).

Blechnum Lanceola Swartz, *Stockholm. Vet. Akad. Handl.* 1817. p. 72. t. 3. fig. 2. Spreng. *Syst. Veg.* IV. 92. Hook. *Bot. Mag.* t. 3240. Ic. *Plant.* t. 970. *Sp. Fil.* III. 47. Kunze in *Schluhr Fil. Suppl.* 126. t. 57. fig. 1. Ettingsh. *Farnkr.* t. 71. fig. 10. t. 74. fig. 4. 5.

Blechnum lanceolatum Raddi, *Syn. Fil.* 118. *Fil. Bras.* 52. t. 69. fig. 3.

CAUDEX gracilis, suberectus vel breviter repens, PALEIS perparvis membranaceis pallide brunneis linearibus vestitus. STIPITES graciles, stricti, straminei, subfasciculati, nudi vel deorsum paulo paleacei, frondis sterilis 1 poll., fertilis 2—3 poll. longi. LAMINA sterilis chartacea, utrinque nuda viridis subconcolor, ligulato-lanceolata, simplicissima, 2—3½ poll. longa, 6—12 lin. lata, a dimidio superiore in apicem acutum sensim angustata, integerrima, marginibus paulo crispatis, basi cuneato-angustata vel subrotundata. LAMINA fertilis longior et angustior, 5—6 poll. longa, 3—6 lin. lata. VENAE graciles, immersae, modice laxae, subpatentes, pleraeque profunde et interdum repetito-furcatae. SORI lineares, cum costa utrinque contigui, praeter basin et apicem continui, ¼—½ latitudinis laminae occupantes. INDUSIUM membranaceum, tenerum, nudum, demum explanatum et occultum.

Var. β. TRIFOLIATUM Kunze (*Linnaea* XXIII. 240).

Blechnum trifoliatum Kaulf. *Enum. Fil.* 157. Presl, *Tent. Pter.* 103.

Lamina auriculis duabus suboppositis basilibus instructa.

In prov. Rio de Janeiro frequens: Raddi!, Gardner 50!, Glaziou 427! aliique collectores; in prov. Minarum: Freyreiss, Martius, Pohl, Warming!; et in Bahiensi: Princ. Newied! Peruviam praeterea et Columbianam usque in Panamam inhabitat. — Vaga et Extrabrasit.

Obs. *Blechnum plantagineum* Hook. (*Sp. Fil.* III. 47., *Mesothema plantagineum* Presl, *Epim.* 111) praecedenti affine, frondibus lineari-lanceolatis simplicibus longioribus, marginibus subdenticulatis, venis laxioribus, soris inter costam et marginem in lineam continuam mediis distinctum, Brasiliae ab „Hortulanis“ teste Preslio adscriptum, nondum vidi.

3. BLECHNUM ASPLENOIDES SWARTZ: paleis parvis membranaceis lanceolato-acuminatis, stipitibus fasciculatis gracilibus brevibus, frondibus ligulatis simpliciter pinnatis utrinque sensim angustatis, pinnis 20—30-jugis subpatentibus confertis, mediis oblongo-deltaeideis obtusis vel subacutis basi latioribus contiguis, inferioribus sensim reductis rotundatis vel subdeltaeideis; soris costalibus continuus.

Tabula nostra XXVII. Fig. 1—3 (lapsu sub nomine *B. poly-podioidis*, frons et frondium partes).

Blechnum asplenioides Swartz, *Stockholm. Vet. Akad. Handl.* 1817. p. 72. t. 3. fig. 3. Spreng. *Syst. Veg.* IV. 92. Klotzsch, *Linnaea* XX. 340. Presl, *Tent. Pter.* 103. Hook. *Sp. Fil.* III. 45.

Blechnum ceteracinum Raddi, *Syn. Fil.* 119. *Fil. Bras.* 52. t. 60. fig. 1. Klotzsch, *Linnaea* l. c. 348.

Blechnum angustifrons Fée, *Icon. Nouv.* 25. t. 9. fig. 2.

Blechnum polypodioides Ettingsh. l. c. t. 79. fig. 12. 13. 15., nec Raddi.

CAUDEX suberectus, lignosus, crassitie digiti, PALEIS parvis ferrugineis lanceolatis acuminatis sursum dense vestitus. STIPITES fasciculati, graciles, erecti, straminei vel brunnei, 1—3 poll. longi, deorsum paulo paleacei. LAMINA chartacea, utrinque nuda, subconcolor, viridis, 4—8 poll. longa, 4—8 lin. lata, ligulata, utrinque sensim angustata, usque ad costam pinnata. PINNAE 20—30-jugae, patentes vel subadscendentes, mediae oblongo-deltaeidae, 2—4 lin. longae, basi 1½—2 lin. latae, obtusae vel subacutae, marginibus leviter crispatis, basi latiores et perfecte contiguae, inferiores sensim reductae, imae rotundatae vel deltaeidae passim basi confluentes. VENAE laxae, inconspicuae, obliquae, pleraeque furcatae. SORI secundum costas pinnarum e basi ad ¼ longitudinis continui. INDUSIUM nudum, brunneum, scariosum, durum.

Polypod.

In prov. S. Pauli, e. gr. ad Santos: Lindberg 608!; Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Raddi, Mikan, Bunbury etc.; Minas Geraes, v. gr. Gongo Soco, Caldas, Ouro Preto, Morro Velho etc.: Martius, Bunbury!, Freyreiss!, Gardner 5304!, Lindberg 612a!; ad Caretão prov. Goyaz: Pohl. — E Peruvia praeterea vagans in Panamam et Mexicum, etiam in Guyana anglica obvium: Rich. Schomburgk 1142!, Appun 1270—2!

4. BLECHNUM UNILATERALE WILLD. paleis parvis membranaceis lanceolato-acuminatis, stipitibus fasciculatis gracilibus stramineis, frondibus lanceolatis simpliciter pinnatis utrinque attenuatis, pinnis 20—30-jugis subpatentibus confertis, mediis oblongo-ligulatis subacutis 4—6-plo longioribus quam latis basi dilatatis, inferioribus sensim reductis, imis interdum sejunctis; soris costalibus continuus.

Tabula nostra XXVI. Fig. 8. 9. (frondes) et XLIV. Fig. IV. (analysis).

Blechnum unilaterale Willd. *Berl. Mag.* IV. 79. t. 3. fig. 1. *Sp. Plant.* V. 407. Presl, *Tent. Pter.* 103. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 184. Ettingsh. l. c. t. 67. fig. 3. t. 75. fig. 9. 10.

Asplenium blechnoides Swartz, *Syn. Fil.* 76.

Blechnum polypodioides Raddi, *Syn. Fil.* 120. *Fil. Bras.* 53. t. 60. fig. 2. Hook. *Sp. Fil.* III. 45. Metten. *Fil. Hort. Lips.* 63.

Blechnum scabrum Liebm. *Mex. Bregn.* 84.

Blechnum heterocarpum Fée, *Gen. Fil.* 74.

Blechnum suburbicum Vell. *Fl. Flum.* XI. t. 107.

Blechnum triangulare Link, *Sp. Fil.* 78. Metten. *Fil. Hort. Lips.* 63. Hook. *Sp. Fil.* III. 46.

Blechnum triangulatum J. Smith, *Cat. Ferns* 38. Lowe, *Ferns* 4. t. 35.

Blechnum Pohlianum Presl, *Tent.* 103.

CAUDEX suberectus, lignosus, crassitie digiti, PALEIS parvis lanceolatis acuminatis ferrugineis membranaceis dense vestitus. STIPITES subfasciculati, graciles, erecti, straminei, 1—6 poll. longi, nudi, deorsum paulo paleacei. LAMINA chartacea, utrinque nuda, viridis, subconcolor, 6—12 poll. longa, 1—2 poll. lata, lanceolata, utrinque angustata, usque ad rachem simpliciter pinnata. PINNAE 20—30-jugae, patentes vel subpatentes, mediae ligulato-oblongae, 6—12 lin. longae, 2—3 lin. latae, acutae vel subacutae, marginibus integris, basi dilatatae et contiguae, inferiores sensim reductae basique valde dilatatae, imae aequae longae ac latae interdum sejunctae. VENAE immersae, inconspicuae, graciles, obliquae, modice laxae, pleraeque profunde furcatae. SORI secundum costas pinnarum continui, apice et interdum basi exceptis, ⅓—½ latitudinis pinnae occupantes. INDUSIUM membranaceum, nudum, demum explanatum occultum.

Crescit cum praecedente. Ad Santos prov. S. Pauli: Lindberg 609a!; circa Rio de Janeiro, Bahia etc. in marginibus sylvarum frequens: Raddi!, Gardner!, Burchell!, Schott! etc. etc.; ad Cidada Diamantina, S. João d'El Rei aliisque locis prov. Minarum: Martius! — E Peruvia ad Mexicum insulasque Antillanas vagans, et in Guyana anglica: Rich. Schomburgk!

Obs. Cl. WARMING e Lagoa Santa prov. Minarum specimina reportavit venulis inferioribus in maculas costales irregulariter anastomosantibus praedita (ut in *B. longifolii* var. *Fendleri*).

5. BLECHNUM BRASILIENSE DESV. paleis ebeneis lineari-fibrillosis conspicuis densis, stipitibus fasciculatis brevibus validis, frondibus magnis oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis utrinque sensim angustatis, pinnis 30—50-jugis contiguis, mediis erecto-patentibus lineari-ligulatis acuminatis denticulatis basi paullulum dilatatis, inferioribus sensim reductis, imis rotundatis contiguis vel laxis; soris costalibus continuus.

Tabula nostra XXVI. Fig. 5—7 (pinnae).

Blechnum brasiliense Desv. Berl. Mag. V. 330. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. t. 283. Kaulf. Enum. Fil. 159. Kunze in Flora (Ratisbon.) 1824. I. 344. et 1837. I. 332. Metten. Fil. Hort. Lips. 63. Hook. Sp. Fil. III. 43. tab. 157. Ettingsh. l. c. t. 78. fig. 1. 5. 10.

Blechnopsis brasiliensis Presl, Epim. 115.

Blechnum corcovadense Raddi, Fil. Bras. 54. t. 61. et 61 bis.

Blechnum fluminense Vell. Fl. Flum. XI. t. 106.

Blechnum nitidum Presl, Del. Prag. I. 187. (non Rel. Haenk. I. 49.)

Blechnum campestre et *Rileyianum* Hort.

CAUDEX crassus, lignosus, erectus, subarborescens, 3—5 pedes attingens, sursum PALEIS ebenis fibrillosis 8—12 lin. longis dense vestitus. STIPITES fasciculati, validi, stricti, erecti, 1—4 poll. longi, dense paleacei, paleis iis caudicis similibus erecto-patentibus vel curvatis. LAMINA coriacea, nuda, subconcolor, obscure viridis, siccitate fuscescens, 2—4 pedes longa, 9—15 poll. lata, usque ad rachem simpliciter pinnata. RACHES validae, nuda, stramineo-fusciscentes. PINNAE 30—50-jugae, mediae erecto-patentes, lineari-ligulatae, 6—9 poll. longae, 6—8 lin. latae, in apicem acuminatum sensim angustatae, marginibus crispatis argute denticulatis, basi contiguae et paullulum dilatatae, inferiores inde e medio frondis sensim decrescentes, imae subpatentes aequae latae ac longae contiguae vel laxae. VENAE graciles, conspicuae, subpatentes, modice laxae, pleraeque simplices. SORI secundum costas pinnarum, apice excepto, utrinque continui. INDUSIUM angustum, nudum, brunneum, persistens.

In sylvis udis montosisque provinciarum Brasiliae Goyaz, Minas, Bahia, Espiritu Santo, Rio de Janeiro et S. Catharina, in quibus eam legerunt: Barclay!, Blanchet 2129!, Bowie et Cumingham!, Burchell!, Chamisso, Fox!, Gardner!, Glaziou 428!, Langsdorff, Lusch-nath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 372!), Martius!, Princ. Neuwied!, Pohl!, Raben, Sello!, Stephan!, Velloso alique. Etiam in prov. Chiquitos Boliviae (D'Orbigny) et in monte Campana Peruviae orientalis occurrit (Spruce 4673!). — Vaga et Extrabrazil.

6. BLECHNUM NITIDUM PRESL: paleis stipitibus nudis rufo-stramineis strictis, frondibus mediocribus oblongo-rhomboides simpliciter pinnatis, pinnis 25—30-jugis contiguis erecto-patentibus lineari-ligulatis acutis denticulatis basi paullulum dilatatis, inferioribus mediis subaequalibus; soris costalibus continuis.

Blechnum nitidum Presl, Rel. Haenk. I. 49. (non Del. Prag. I. 87.) J. Smith, Hook. Journ. Bot. III. 406. Hook. Sp. Fil. III. 44. t. 156. Moore, Ind. Fil. II. 200. Hook. et Baker, Syn. Fil. 184.

Blechnopsis nitida Presl, Epim. 116.

Blechnum elongatum Gaud. Freyc. Voy. 395.

Habitus praecedentis. Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES erecti, validi, nudi, rufo-straminei, 5—6 poll. longi. LAMINA coriacea, utrinque nuda, subconcolor, obscure viridis, siccitate fuscescens, 15—18 poll. longa, 6—8 poll. lata, oblongo-rhomboides, usque ad rachem simpliciter pinnata. RACHES strictae, nuda, rufo-stramineae. PINNAE 25—30-jugae, lineari-ligulatae, erecto-patentes, rectae vel paulo decurvatae, mediae 4—5 poll. longae, 4—5 lin. latae, in apicem acuminatum sensim angustatae, marginibus crispatis argute minuteque denticulatis, basi contiguae et paullulum dilatatae, inferiores mediis subaequales. VENAE modice conspicuae, confertae, subpatentes, pleraeque simplices. SORI omnino praecedentis sed indusium paulo latius.

Obs. A praecedente, cui habitu simillimum, statura minore, stipitibus longioribus nudis et pinnulis inferioribus haud reductis differt.

Habitat in prov. Rio Grande do Sul: Tweedie 1122! Item incolit Himalayam occidentalem et insulas asiaticas occidentales.

7. BLECHNUM LONGIFOLIUM H.B.K. paleis parvis membranaceis linearibus brunneis, stipitibus fasciculatis gracilibus stramineis nudis, frondibus oblongo-deltaideis vel oblongo-rhomboides simpliciter pinnatis, pinnis 2—9-jugis lineari-ligulatis acutis basi distantibus, inferioribus cordatis a rache solutis, superioribus plus minus rachi adnatis, imis vix reductis, terminali integerrima lineari; soris costalibus continuis.

Blechnum longifolium H.B.K. Nov. Gen. I. 13. Willd. Sp. V. 413. Spreng. Syst. Veg. IV. 93. Hook. Bot. Mag. t. 2818. Mett. Fil. Hort. Lips. 62. Hook. Sp. Fil. III. 50. t. 154. Lowe, Ferns 4. t. 37.

Blechnum meridense Klotzsch, Linnaea XX. 349.

Blechnum fraxineum Willd. Sp. Plant. V. 413. (forma robustior).

Blechnum fraxinifolium Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 284.

Blechnum latifolium Moritz, Bot. Zeitg. XII. 855.

Blechnum Schlimense Fée, Mem. VIII. 71.

Lomaria Bredemeyeri Klotzsch l. c. 346.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, PALEIS linearibus membranaceis brunneis 2—3 lin. longis sursum vestitus. STIPITES subfasciculati, modice graciles, erecti, stricti, straminei, glabri, deorsum paulo paleacei. LAMINA chartacea, utrinque nuda, subconcolor, obscure viridis, oblongo-deltaidea vel rhomboides, 6—9 poll. longa, 5—6 poll. lata, simpliciter pinnata. PINNAE laterales 3—6-jugae, subpatentes vel erecto-patentes, oppositae vel suboppositae, lineari-ligulatae; inferiores 3—4 poll. longae, 6—12 lin. latae, in apicem acutum sensim angustatae, marginibus leviter crispatis integerrimis vel extrorsum minute denticulatis; imae mediis subaequales, deorsum angustatae, ipsa tamen basi rotundatae vel cordatae, a rache perfecte liberae, 6—12 lin. distantes; superiores basi subaequales vel paullulum dilatatae rachi adnatae; terminalis reliquis consimilis vel longior, sessilis vel breviter petiolata, basi angustata. VENAE immersae, aegre conspicuae, modice laxae, subpatentes, simplices vel unifurcatae. SORI secundum costas pinnarum, apice et interdum basi exceptis, continui, $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ latitudinis pinnarum occupantes. INDUSIUM nudum, brunneum, membranaceum.

Var. β . GRACILE Baker.

Tabula nostra XXVII. Fig. 4. 5. (titulo Blechni gracilis, pinna fertilis et frons parva steritis).

Blechnum gracile Kaulf. Enum. Fil. 158. Lodd. Bot. Cab. 1905. Kunze, Linnaea IX. 61. Klotzsch, Linnaea XX. 349. Presl, Tent. 103. Hook. Sp. Fil. III. 48. Ettingsh. l. c. t. 73. fig. 1. t. 74. fig. 6. 7.

Minor, stipitibus 8—12 poll. longis, pinnis 6—9-jugis 2—3 poll. longis 3—4 lin. latis.

Var. γ . INTERMEDIUM Baker.

Blechnum intermedium Link, Hort. Berol. II. 71. Kunze in Schkuhr Fil. Suppl. I. 128. t. 57. fig. 2. Mett. Fil. Hort. Lips. 62. Hook. Sp. Fil. III. 48.

Multo minor, stipitibus 3—6 poll. longis, pinnis lateralibus 1—2 jugis, terminali 4—5 poll. longa 6—9 lin. lata.

Var. δ . FENDLERI Baker.

Blechnum Fendleri Hook. Sp. Fil. III. 48. t. 158. Moore, Ind. Fil. II. 196. Hook. et Baker, Syn. Fil. 185.

Lamina tenuior, praesertim subtus tenuiter griseo-pubescentis, raches stramineae, pinnae laterales subpatentes 3—4-jugae lineari-ligulatae acuminatae, inferiores 3— $3\frac{1}{2}$ poll. longae 6—8 lin. latae basi auriculatae, venis gracilibus in arcus costales anastomosantibus.

Filia per Brasiliam, Peruviam Columbianque usque in Mexicum et insulas Antillanas divulgata. Intra Brasiliae limites lecta est forma typica in prov. Goyaz: Burchell 7396!; ad Caldas, Gongo

Soco et Lagoa Santa prov. *Minarum*: Lindberg 604!, Bunbury!, Warming!; var. β . in *sylvis montosis* prov. *Rio de Janeiro* frequens: Martius, Sello!, Gardner 184!, Burchell 2163! aliique collectores; ad *Lagoa Santa*: Warming!; var. γ . item in prov. *Rio de Janeiro*: Burchell!; var. δ . in *sylvis umbrosis prope urbem Goyaz*: Burchell 6460!

8. BLECHNUM OCCIDENTALE LINN. paleis parvis membranaceis lanceolatis brunneis, stipitibus fasciculatis strictis stramineis deorsum paleaceis, frondibus oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 20—30-jugis lineari-ligulatis acutis integris, inferioribus sejunctis basi solutis cordatis, superioribus adnatis, imis reliquis subaequalibus vel paulo brevioribus saepe deflexis, apice frondis plerumque pinnatifido; soris costalibus continuis.

Tabula nostra XXVI. Fig. 10. (apex frondis).

Plumier Fil. t. 62 B.

Blechnum occidentale Linn. *Sp. Plant.* 1534. *Richard in Act. Soc. Hist. Nat. Paris. I.* 114. *Jacq. Ic. Rar. III.* t. 869. *Swartz, Syn. Fil. 113. Willd. Sp. Plant. V.* 412. *Raddi, Fil. Bras. t. 53. Ettingsh. Farnkr. t. 68. fig. 5. t. 70. fig. 4. t. 74. fig. 8. 9. t. 75. fig. 4. 13.*

Blechnum cartilagineum Schkuhr, *Fil. t. 108 b.*

Blechnum caudatum Cav. *Praelect. 1801. n. 649. Poir. Enc. Suppl. I.* 643. *Swartz, Syn. Fil. 114. Willd. Sp. Plant. V.* 411. *Ettingsh. l. c. t. 74. fig. 1.*

Blechnum falcatum Loddiges *Cat. Kunze Linnaea XXIII.* 239.

CAUDEX suberectus, paleis membranaceis lanceolatis brunneis 3—4 lin. longis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, 6—12 poll. longi, subgraciles, stricti, glabri, deorsum paleacei. LAMINA chartacea vel subcoriacea, utrinque nuda, subconcolor, obscure viridis, oblongo-lanceolata, 9—18 poll. longa, 4—8 poll. lata, simpliciter pinnata. PINNAE 20—30-jugae, oppositae vel alternae; mediae subpatentes vel paullulum falcato-adscedentes, lineari-ligulatae, 3—4 poll. longae, 4—8 lin. latae, in apicem acutum sensim angustatae, marginibus integris, basi solutae sessiles aequales vel dilatatae cordatae; superiores sensim breviores; apex frondis pinnatifidus; inferiores mediis subaequales vel paulo breviores, pleraeque deflexae. VENAE graciles, modice laxae, subpatentes, simplices vel unifurcatae. SORI secundum costas pinnarum continui, apice et interdum basi exceptis, $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ latitudinis pinnarum occupantes. INDUSIUM nudum, brunneum, membranaceum.

Var. β . CUNNINGHAMI Baker.

Blechnum Cunninghamii Moore, *Ind. Fil. II.* 195.

Pinnae 10—12-jugae, inferiores mediis aequales, 2 poll. longae, 4—6 lin. latae; apex frondis linearis, pinnis consimilibus, 2—2 $\frac{1}{2}$ poll. longus, deorsum paullulum repandus.

Var. γ . DISTANS Baker.

Blechnum distans Presl, *Tent. Pter. 103. Epim. Bot. 105.*

Blechnum cognatum Presl, *Epim. Bot. 107. Fée, Gen. Fil. 73.*

Blechnum glandulosum Link, *Enum. Hort. Berol. II.* 462. *Mart. Hb. Fl. Bras. n. 373. (forma tenerior, lamina et rachibus breviter glanduloso-pubescentibus).*

Lomaria campylotis Kunze, *Linnaea XVII.* 567. *XVIII.* 326. (*forma pinnis inferioribus basi utrinque auriculato-dilatatis*).

Blechnum meridionale Presl, *Del. Prag. I.* 186. *Tent. Pter. 103.*

Minor, lamina 3—4 poll. longa, 15—18 lin. lata, pinnis confertis paucioribus obtusis vel subobtusis.

Filix frequentissime per totam Americam tropicam et austro-temperatam obvia. Intra Brasiliae limites lecta est forma typica in provinciis Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Geraes et Goyaz: Fox!, Raddi!, Burchell 5930!, Gardner!, Glaziou 426!, Blanchet 2296!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 311!, Princ. Neuwied, Raben, Ackermann, D'Orbigny, Bunbury etc.; var. β . circa Rio de Janeiro, in Serra dos Orgãos, ad Itheos, Lagoa Santa etc.: Cunningham, Gardner 184!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 373!, Warming! Var. γ . circa Rio de Janeiro: Sello!, Burchell!, et in Uruguay: Gibert!

9. BLECHNUM SERRULATUM RICH. paleis parvis rigidis linearibus, stipitibus nudis strictis fasciculatis griseo-stramineis, frondibus oblongo-lanceolatis rigide coriaceis simpliciter pinnatis, pinnis 20—30-jugis lineari-ligulatis acutis vel subobtusis argute denticulatis basi articulatis cuneatis vel rotundatis, imis reliquis subaequalibus; soris costalibus continuis.

Tabula nostra XXV. Fig. 11—13 (pinnulae).

Blechnum serrulatum Rich. *Act. Soc. Hist. Nat. Par. I.* 114. *Mich. Fl. Bor. Am. II.* 264. *Swartz, Syn. Fil. 113. Willd. Sp. Plant. V.* 411. *Hook. Sp. Fil. III.* 54. *Lowe, Ferns IV.* 43. *Ettingsh. Farnkr. t. 72. fig. 3. 6.*

Blechnum angustifolium Willd. *Sp. Plant. V.* 414. *Presl, Tent. Pter. 103. Meyer, Prim. Fl. Esseq. 290. Splitg. Enum. Fil. Surin. 31.*

Blechnum calophyllum Langsd. et Fisch. *Fil. t. 23. Willd. Sp. Plant. V.* 415.

Blechnum angustatum Schrad. *Goett. Gel. Anz. 1824. p. 87.*

Blechnum stagninum Raddi, *Fil. Bras. 54. t. 62.*

Blechnum striatum R.Br. *Prodr. Fl. Nov. Holl. 152. Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI.* 284. *Hook. Sp. Fil. III.* 55. *t. 159.*

Blechnum stramineum Labill. *Sert. Austro-Caled. 2. t. 3. Presl, Tent. 103.*

Blechnum moluccanum Desv. *Berl. Mag. V.* 325., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, suberectus, paleis parvis rigidis linearibus castaneis dense vestitus. STIPITES fasciculati, stricti, erecti, griseo-straminei, nudi, basi solum paleacei, 9—15 poll. longi. LAMINA rigide coriacea, utrinque nuda, subconcolor, siccitate griseo-fuscescens, oblongo-lanceolata, simpliciter pinnata, 1—2 pedes longa, 6—10 poll. lata. PINNAE 20—30-jugae, subpatentes vel erecto-patentes, lineari-ligulatae, 3—6 poll. longae, 5—9 lin. latae, apice acutae vel subobtusae, marginibus totis argute denticulatis, basi cuneatae vel rotundatae articulae omnino sessiles, inferiores reliquis subaequales contiguae vel sublaevae, superiores sensim reductae, apice frondis pinnis consimilibus deorsum sinuato. VENAE subpatentes, graciles, confertae, simplices vel furcatae. SORI secundum costas pinnarum continui, apice et interdum basi exceptis, $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ latitudinis pinnarum occupantes. INDUSIUM tenerum, nudum, occultum.

Per totam Brasiliam, Guyanam, Peruviam, Panamam, insulas Antillanas, Floridam, Australiam orientalem, insulam Borneo et Malaccam diffusa. In prov. Rio Grande do Sul: Fox!; S. Catharina: Langsdorff!; Rio de Janeiro: Sello!, Gardner 183!, Burchell 2607!, Raben, Bunbury etc.; Espiritu Santo: Princ. Neuwied; Minas Geraes: Stephan; Bahia: Luschnath!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 370!, Sattmann!, Blanchet 2466!; Goyaz: Pohl!, Burchell 9646!; Maranhão: G. Don 141!; Para: Spruce 35! 653! Locos praediligit arenosoglebosus et paludosos, magnopere pro stationibus varians.*

§ 2. SALPICHLAENA.

10. BLECHNUM VOLUBILE KAULF. frondibus amplis nudis coriaceis bipinnatis, stipitibus et rachibus nudis stramineis late scandentibus, pinnis oblongo-deltaideis patulis longe petiolatis, pinnulis petiolatis patentibus lineari-ligulatis integris 2—8-jugis soris costalibus continuis.

Tabula nostra XLIV. Fig. V. (analysis).

Blechnum volubile Kaulf. Enum. Fil. 159. Kunze, Anal. Pter. 20. t. 13. Hook. Gen. Fil. t. 93. Gard. Ferns t. 15. Sp. Fil. III. 63. Hook. et Baker, Syn. Fil. 187.

Salpichlaena volubilis J. Smith, Gen. Ferns 56. Fée loc. cit. Presl, Epim. Bot. 122.

Blechnum scandens Bory, Duperrey's Voy. 272. t. 36.

Salpichlaena scandens Presl, Epim. loc. cit.

Blechnum hymenoneuron Klotzsch Mss.

CAUDEX lignosus, late repens, paleis subnullis. STIPITES straminei, validi, nudi, ad altitudinem 20—40 pedum more *Lygodii* scandentes. LAMINA bipinnata, coriacea, utrinque nuda, subnitida, pallide viridis, infra pallidior. RACHES primaria straminea, nuda, plus minus scandens, inferne crassiem 3—4 lin. attingens. PINNAE patentes, oblongo-deltoidae, 1—2 pedes longae et latae, petiolis 2—4 poll. longis instructae. RACHES pinnarum stramineae, strictae, antice profunde canaliculatae. PINNULAE 2—8, pleraeque 4—8-jugae, oppositae vel suboppositae, patentes vel erecto-patentes vel inferiores paullulum deflexae, 12—18 lin. distantes, lineari-

ligulatae, 6—12 poll. longae, frondis fertilis 6—12 lin., sterilis 1—2 poll. latae, marginibus incrassato-corneis crispatis integerrimis vel extrorsum denticulatis, acutae vel acuminatae, basi rotundatae, petiolis 1—3 lin. longis instructae. Pinnula terminalis reliquis consimilis. VENAE subpatentes, confertae, conspicuae, simplices vel unifurcatae. SORI secundum costas pinnularum continui, apice et interdum basi exceptis. INDUSIUM latum, rigidum, nudum, brunneum, primum revolutum, demum explanatum et dilaceratum, cum soris adnexis frustulatim delabens.

Var. β . LOMARIOIDEA Baker.

Lomaria volubilis Hook. Sp. Fil. III. 39. t. 150. Hook. et Baker, Syn. Fil. 182.

Pinnulae fertiles omnino lomarioideae, lamina nulla.

In Brasilia, Guyanis, Peruvia usque ad insulas Antillanas divulgatum. Observata est forma typica in prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Setto!, Burchell 2602!, 3072!, Gardner 185! etc.; Minas Gerais: Gardner 5306!; Bahia: Blanchet 2487!; Ceara, Serra de Araripe: Gardner! — Var. β . ad Manãos et prope Panuré ad Rio Uaupés, prov. do Alto Amazonas: Spruce 1263! 2800!, et in Guyana anglica: Appun 995!

TRIBUS VI. ASPLENIEAE.

SORI secundum venas decurrentes, lineares vel oblongi, INDUSIIS superis homomorphis simplicibus vel geminatis extrorsum apertis.

CAUDEX plerumque erectus, interdum plus minus repens. STIPITES cum caudice continui, plerique graciles, nudi, basi solum paleacei, straminei, castanei vel ebenei. FRONDES conformes, quoad magnitudinem texturam et divisionem valde variabiles, segmentis parvis vel magnis. VENAE pinnatae vel raro plus minus flabellatae, liberae vel in speciebus paucis anastomosantes (Asplenii §§ Anisogonium, Hemidictyum), accedente subinde venula externa intramarginali recta. SORI lineares, secundum venas decurrentes, quoad laminam perfecte dorsales vel raro ob angustiam segmentorum submarginales (Asplenii § Darea), solitarii, vel geminati (Asplenii §§ Diplazium, Anisogonium), vel oblongi, plus minus curvati, saepe subhippocrepiformes (Asplenii § Athyrium), explanati vel tumidi. INDUSIUM semper margine interiore ad venam adnexum, margine exteriori aperto liberum, vel in *Allantodia bullatum* irregulariter longitrorsum disruptum. — Species circa 300, per totum orbem terrarum dispersae.

Genus brasiliense unicum XIII. ASPLENIUM.

XIII. ASPLENIUM LINN.

ASPLENIUM Linn. Gen. n. 1178. Swartz, Syn. Fil. 74. Willd. Sp. Plant. V. 303. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 30. et Aucet. — DAREA Juss. Gen. 15. Willd. l. c. 295. — CAENOPTERIS Bergm. Act. Nov. Petropol. VI. 11. tab. 7. Swartz, Syn. Fil. 87., non Presl. — ATHYRIUM Roth, Tent. II. 61. Presl, Tent. 97. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 16. — NEOTTOPTERIS J. Smith, Gen. Ferns 63. Fée, Gen. Fil. 202. — THAMNOPTERIS Presl, Tent. 105. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 113 B. — DIPLAZIUM Swartz, Syn. Fil. 4. Willd., Sp. Plant. V. 351. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 55 B. et 56 B. — HYPOCHLAMYS Fée, Gen. Fil. 200. — ANISOGONIUM Presl, Tent. 115. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 56 A. — DIGRAMMARIA Presl, Tent. 116. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 56 C. — CETERACH Willd. Sp. Plant. V. 136. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 113 A. — HEMIDICTION Presl, Tent. 110. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 55 A. — LOTZEA Klotzsch, Linnaea 1847. p. 358. — OXYGONIUM Presl, Tent. 117. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 116. — CALLIPTERIS Bory, Voy. t. 1. p. 282. J. Smith, Gen. Ferns. 67. — TARACHIA Presl, Epim. 74. — ACROPTERIS Link, Sp. Fil. 79. — ALLANTODIA R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 149., nec Wallich. — PTERIGLYPHIS Fée, Gen. Fil. 219.

SORI lineares vel oblongi, quoad laminam dorsales vel submarginales, solitarii vel geminati, INDUSIIS homo-

morphis superis, margine interiore venae adnexo, exteriori libero.

Tabula nostra XLIV. Fig. VI. t. XLV. Fig. I—III.

Characteres reliqui ut in tribu, indusii tamen haud bullatis nec irregulariter longitrorsum rumpentibus.

CLAVIS SPECIERUM DESCRIPTARUM.

§ 1. EUASPENIUM. Venae liberae. Sori perfecte dorsales, lineares vel oblongi, solitarii. — Tabula nostra XLIV. Fig. VI.

A. Lamina simplex, lanceolata, utrinque angustata.

1. Sori paene ad marginem frondis producti.

1. A. ANGUSTUM.

2. Sori in trientem anteriorem frondis haud producti

2. A. SERRATUM.

B. Lamina parva, rhomboidea, inferne ad tertiam pinnatifida 3. A. TRILOBUM.

C. Lamina simpliciter pinnata (raro 2- v. 3-pinnata, cf. *A. rhizophorum* β . γ ., *auritum* β . γ .)

a. Pinnae basi subsymmetrice cuneatae.

1. Rachis tota distincte alata; pinnae sessiles.

4. A. ALATUM.

2. Rachis vix sursum alata; pinnae inferiores petiolatae.
 * Pinnae ensiformes, integerrimae vel obscure denticulatae 5. A. SALICIFOLIUM.
 ** Pinnae oblongo-lanceolatae, inciso-crenatae. 6. A. OLIGOPHYLLUM.
- b. Pinnae basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata.
 1. Rachis castanea, apice semper radicans 7. A. RHIZOPHORUM.
 2. Rachis grisea vel raro subbenea, apice raro radicans.
 α. Lamina herbacea vel membranacea.
 * Pinnae sessiles, 20—40-jugae, inferiores decrescentes 8. A. LUNULATUM.
 ** Pinnae 6—15-jugae, inferiores reliquis subaequales, breviter petiolatae.
 † Pinnae 10—15-jugae, 6—9 lin. latae; sori ultra dimidium latitudinis pinnarum producti.
 Lamina membranacea, caudex breviter repens. 9. A. OBTUSIFOLIUM.
 Lamina herbacea, caudex erectus. 10. A. ABSCESSUM.
 †† Pinnae 6—12-jugae; sori aegre ultra dimidium latitudinis pinnarum producti. 11. A. ANISOPHYLLUM.
- β. Lamina coriacea.
 * Pinnae 4—6 lin. latae 12. A. AURITUM.
 ** Pinnae 9—18 lin. latae 13. A. SERRA.
- c. Pinnae basi superiore cum rache parallela, inferiore late cordata 14. A. AURICULATUM.
- d. Pinnae basi superiore cum rache parallela, dimidio vel triente interiore lateris inferioris exciso.
 1. Lamina linearis, 6—9 lin. lata.
 α. Rachis firma, castanea; pinnae 30—40-jugae. 15. A. FORMOSUM.
 β. Rachis pertenuis, viridis; pinnae 10—15-jugae. 16. A. PULCHELLUM.
 2. Lamina lanceolata, 2—4 poll. lata. 17. A. LAETUM.
- D. Lamina bipinnatifida, pinnis profunde pinnatifidis vel inferne pinnatis.
 a. Rachis griseo-ebenea, paleis fibrillosis obscure purpureis vestita 18. A. CAUDATUM.
 b. Rachis castanea, nuda, apice radicans.
 1. Stipites 6—12 lin. longi; lamina deorsum sensim decrescens 19. A. HALLII.
 (2. Stipites 4—8 poll. longi; lamina deorsum aequalis. 7. A. RHIZOPHORUM, β. *alleopterum*.)
 c. Rachis griseo-viridis.
 1. Lamina flaccida, membranacea, deltoidea, stipitibus 3—5 poll. longis 20. A. PUMILUM.
 2. Lamina flaccida, tenero-membranacea, elongato-lanceolata, stipitibus 6—18 lin. longis 21. A. MUCRONATUM.
 (3. Lamina rigide coriacea, erecta, stipitibus 4—8 poll. longis 12. A. AURITUM, β. *sulcatum*.)
- E. Lamina 3—4-pinnatifida vel -pinnata.
 a. Lamina coriacea vel subcoriacea.
 1. Laciniae ultimae obovato-cuneatae, venis subflabellatis.
 α. Raches pilis paleaceis obscure purpureis plus minus vestitae 22. A. FURCATUM.
 β. Raches griseae, nuda.
 * Laciniae ultimae 3—3½ lin. latae. 23. A. CUNEATUM.
 ** Laciniae ultimae 1½—2 lin. latae. 24. A. DIVERGENS.
 (2. Laciniae ultimae angustae, lineares, venis mediis solummodo obviis 12. A. AURITUM, γ. *foeniculaceum*.)

Polypod.

- b. Lamina herbacea, lacinis ultimis 3—6 lin. latis.
 1. Lamina deorsum perfecte bipinnata, pinnulis imis dentatis vel subpinnatifidis.
 α. Rachis castanea; sori crassi 25. A. PSEUDONITIDUM.
 β. Rachis grisea; sori angustati, interdum geminati. 26. A. ANGUSTATUM.
 2. Lamina deorsum perfecte 3—4-pinnata. 27. A. SCANDINICUM.
- c. Lamina herbacea, lacinis ultimis linearibus, venis medianis solummodo obviis.
 1. Apex frondis haud radicans 28. A. CICUTARIUM.
 2. Apex frondis radicans.
 α. Rachis complanata, tota utrinque alata. 29. A. GIBERTIANUM.
 (β. Rachis teres, exalata 7. A. RHIZOPHORUM, γ. *rachirhizon*.)
- § 2. ATHYRIUM. Venae liberae. Sori dorsales, oblongi, saepe apice plus minus recurvati. — *Tabula nostra XLV. Fig. I.* 30. A. DECURTATUM.
- § 3. DIPLAZIUM. Venae liberae. Sori dorsales, lineares, inferiores plus minus geminati. — *Tabula nostra XLV. Fig. II.*
 A. Lamina simplex 31. A. PLANTAGINEUM.
 B. Lamina in triente vel quadrante inferiore pinnata, sursum pinnatifida 32. A. RIEDELIANUM.
 C. Lamina perfecte pinnata.
 a. Pinnae integrae 33. A. LECHLERI.
 b. Pinnae subintegrae vel deorsum ad dimidium pinnatifidae, venis pinnatis.
 α. Pinnae subcoriacea, deorsum 1½—2 poll. latae. 34. A. CELTIDIFOLIUM.
 β. Pinnae herbaceae, deorsum 8—12 lin. latae. 35. A. SYLVATICUM.
 c. Pinnae ultra dimidium pinnatifidae.
 α. Pinnae deorsum symmetricae, basi recte truncata. 36. A. LINDBERGII.
 β. Pinnae deorsum inaequales, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata. 37. A. SHEPHERDI.
 γ. Pinnae basi cordatae 38. A. BLANCHETII.
 d. Pinnae deorsum usque ad costam pinnatae. 39. A. CRENULATUM.
- D. Lamina perfecte bipinnata, pinnulis profunde pinnatifidis. 40. A. RADICANS.
 E. Lamina 4-pinnatifida 41. A. GLAZIOVII.
- § 4. HEMIDICTYUM. Venae extrorsum anastomosantes. Sori dorsales, lineares, haud geminati. — *Tabula nostra XLV. Fig. III.* 42. A. MARGINATUM.

§ 1. EUASPLENIUM.

1. ASPLENIUM ANGUSTUM SWARTZ: paleis ebeneis lineari-acuminatis, stipitibus brevibus validis griseis nudis, frondibus nudis subcoriaceis anguste ligulatis simplicibus utrinque sensim angustatis integris vel inconspicue denticulatis, venis liberis erecto-patentibus simplicibus vel unifurcatis; soris paene ad costam et marginem usque productis.

Asplenium angustum Swartz, Stockholm. Vet. Akad. Handl. VI. 6. t. 4. fig. 1. Kunze, Anal. Pter. 21. t. 14. Mett. Asplen. 88. Hook. Sp. Fil. III. 89.

Asplenium loriforme Hook. I. Cent. Ferns t. 26.

Asplenium surinamense Fée, Gen. Fil. 192.

Asplenium Weigelti Kaulf. Mss.

CAUDEX breviter repens, robustus, PALEIS nigricantibus lineari-subulatis 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES validi, erecti, nudi, grisei, 1—2 poll. longi. LAMINA 1—2 pedes longa, 9—15 lin. lata, chartaceo-coriacea, utrinque nuda, subconcolor, pallide viridis, ligulata, in apicem

longe acuminatum basi in stipitem sensim angustata, margine sub-integro vel remote et leviter denticulato. VENAE erecto-patentes, rectae vel leviter curvatae, parallelae, simplices vel unifurcatae, pleraeque $\frac{3}{4}$ lin. distantes. SORI totam laminam, basi et summo apice exceptis, occupantes, lineares, 2—8 lin. longi, paene usque ad costam et marginem producti. INDUSIUM firmum, nudum, griseum.

Var. β . APPUNIANUM Baker.

Lamina magis papyracea, supra nitidior viridis, medio 18 lin. lata, venis confertioribus, soris longioribus (mediis 9—11 lin. longis), marginem et costam paene tangentibus.

An species distincta?

Crescit forma typica in prov. Minarum: Freyreiss!; ad fluv. Tanai et Rio Acara prov. Paraensis: Spruce n. 18!; in Guyana anglica: Rob. Schomburgk 611!, Appun 412!, et in Surinamo: Weigelt, Kegele 1380—1, Hostmann 183a. 610, Wulfschlaegel! — Varietas in Guyana anglica: Appun 1496! — Vaga et Extrabras.

2. ASPLENIUM SERRATUM LINN. paleis teneris lineari-subulatis griseo-ferrugineis, stipitibus dense caespitosis validis nudis brevibus vel subnullis, frondibus subcoriaceis, supra nudis, infra ad costam inconspicue furfuraceis, ligulato-lanceolatis utrinque angustatis, marginibus repando-serratis vel subintegris, venis liberis confertis simplicibus vel unifurcatis; soris elongatis angustis, trientem frondis exteriorem non excedentibus.

Tabula nostra XXVII. Fig. 23. (apex frondis), et XLIV. Fig. VIa. (analysis).

Plumier Fil. t. 124.

Asplenium serratum Linn. Sp. Plant. 1538. Swartz, Syn. Fil. 74. Schkuhr, Fil. t. 61 et 64. Mart. Hb. Fl. Bras. n. 376. Hook. Fil. Exot. t. 70. Sp. Fil. III. 81. Mett. Asplen. 78. Vell. Fl. Flum. XI. t. 102. Ettingsh. Farnkr. t. 80. fig. 11.

Asplenium Nidus Raddi, Fil. Bras. 34. t. 53., non Linn. *Asplenium crenulatum* Presl, Tent. 106. Link, Sp. Fil. 87. Fée, Gen. Fil. 190.

Asplenium Poeppigii Presl l. c.

Asplenium integrum Fée, Gen. Fil. 193.

Asplenium Schomburgkianum Klotzsch, Linnæa XX. 350. Fée, Gen. Fil. 191.

CAUDEX robustus, erectus, PALEIS griseo-ferrugineis lineari-subulatis teneris siccitate crispatis 6—9 lin. longis sursum vestitus. STIPITES dense caespitosi, erecti, validi, dorso acute angulati, antice canaliculati, nudi, 3—4 lin. crassi, 1—2 poll. longi, nunc subnulli. LAMINA chartaceo-coriacea, utrinque subconcolor griseo-viridis, supra nitida, subtus ad costam paleis minutis ovatis ferrugineis vestita, ligulata, 1—3 pedes longa, 1—4 poll. lata, utrinque angustata, margine plus minus sinuato-denticulato interdum subintegro. COSTA valida, grisea; VENAE erecto-patentes vel subpatentes, subconspicuae, simplices vel unifurcatae, in medio frondis $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. SORI inde e costâ usque ad trientem exteriorem frondis currentes, 6—24 lin. longi. INDUSIUM nudum, angustum, griseum, subcoriaceum, persistens.

Var. β . BLANCHETIANUM Baker.

Lamina angustior, 12—18 lin. lata, venis magis distantibus, soris crassioribus 6—9 lin. longis. — Habitu ad *A. angustum* accedens, sed differt triente exteriore frondis sterili.

Habitat in sylvis umbris ubique in regionibus orientalibus Brasiliae et Guyanae, ab omnibus fere collectoribus reportata (Mart. Hb. Fl. Bras. 376, Blanchet 2431 etc.), etiam in Mexico et Cuba et in insulis Societatis disseminata. — Varietas in prov. Bahia, Pernambuco, Para et Alto Amazonas: Blanchet 2458!, Gardner 1223!, Spruce 1113! 2291! — Vaga et Extrabras.

Species habitu perfecte respondet *Asplenio Nido* Lin., veteris orbis incolae, sed defectu venae intramarginalis apices venularum transversalium connectentis, quali sectio *Thamnopteris* denotatur, differt.

3. ASPLENIUM TRILOBUM CAV. paleis lineari-subulatis teneris griseo-ferrugineis, stipitibus fasciculatis griseis nudis, frondibus parvis coriaceis utrinque nudis rhomboideis acutis dentatis, dimidio inferiore ad $\frac{1}{3}$ latitudinis 1- vel 2-lobatis, venis liberis e costa mediana irregulari flabellatis; soris crassis confertis erecto-patentibus.

Asplenium trilobum Cav. Praelect. 1801. p. 255. Willd. Sp. Plant. V. 306. Hook. II. Cent. Ferns t. 11. Sp. Fil. III. 90. Cl. Gay, Fl. Chil. VI. 499. Mett. Aspl. 146.

Asplenium trapezoides Swartz, Syn. Fil. 76. Willd. Sp. Plant. V. 306. Schkuhr, Fil. t. 67. Cl. Gay, l. c. 499. Mett. Aspl. 146.

Tarachia trapezoides Presl, Epim. 75.

Asplenium parvulum Hook. Icones pl. t. 222.

CAUDEX coriaceus, suberectus, PALEIS teneris linearibus griseo-ferrugineis 3—4 lin. longis siccitate crispatis vestitus. STIPITES fasciculati, nudi, grisei, firmi, 1—2 poll. longi. LAMINA coriacea, utrinque nuda, opaco-viridis, siccitate subbrunnea, rhomboidea, 1—2 poll. longa, 9—15 lin. lata, dimidio superiore subdeltoideo acuto dentato, inferiore utrinque uni- vel bilobato, lobis ovato-deltoides dentatis erecto-patentibus ad quartam vel tertiam latitudinis ingredientibus, basi integra in stipitem cuneato-angustata. VENAE immersae, e costa mediana irregulari dichotome flabellatae, apice incrassatae, marginem non attingentes. SORI lineares, crassi, conferti, 6—8 utrinque secundum costam, brevioribus inferne et extrorsum intermixtis, erecto-patentes, 3—6 lin. longi, marginem non attingentes. INDUSIUM angustum, nudum, coriaceum, demum occultum.

Habitat in Brasilia maxime australi, loco accuratius non indicato, forte in prov. Rio Grande do Sul: Tweedie! Item Chile et Peruviam incolit. — Napaea et Extrabras.

4. ASPLENIUM ALATUM H.B.K. paleis subnullis, stipitibus herbaceis debilibus griseis nudis superne alatis, frondibus ligulato-lanceolatis papyraceo-herbaceis obscure viridibus simpliciter pinnatis, rachibus totis distincte alatis, pinnis 12—20-jugis sessilibus patentibus ligulato-lanceolatis 3—4-plo longioribus quam latis subaequilatis dentatis, venis liberis pinnatis; soris 10—12-jugis, marginem fugientibus.

Asplenium alatum H.B.K. Nov. Gen. 14. Willd. Sp. Plant. V. 319. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 137. Mett. Fil. Hort. Lips. 72. Aspl. 119. Hook. Sp. Fil. III. 122.

Asplenium pterophorum Presl, Tent. 107.

CAUDEX erectus, sublignosus. STIPITES fasciculati, erecti, 2—6 poll. longi, nudi, grisei, debiles, sursum alâ angustâ praediti. LAMINA papyraceo-herbacea, utrinque nuda, subconcolor, saturate viridis, ligulato-lanceolata, 12—18 poll. longa, 3—4 poll. lata, simpliciter pinnata, interdum apice radicans. RACHIS debilis, nuda, grisea, tota utrinque alâ membranaceâ integrâ $\frac{1}{2}$ lin. latâ donata, ad nodos emarginata. PINNAE 12—20-jugae, alternae, laxae vel subcontiguae, sessiles, subpatentes, ligulatae, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, 6—8 lin. latae, apice acuto vel subobtusato, marginibus conspicue inciso-dentatis, basi subsymmetricè lateque cuneata, superiores sensim reductae, inferiores mediis paulo breviores. COSTA pinnarum ad apicem progrediens; VENAE laxae, graciles, immersae, erecto-patentes, leviter decurvatae, pleraeque unifurcatae. SORI erecto-patentes, in pinnis mediis utrinque juxta costam 10—12, 3—4 lin. longi, neque marginem nec costam attingentes. INDUSIUM griseum, angustum, membranaceum, evanescent.

Habitat in Serra dos Orgãos sylvis umbris ad margines rivulorum: Gardner 670! 5940!, et inde e Peruvia ad insulas Antillanas. — Dryas et Extrabras.

5. ASPLENIUM SALICIFOLIUM LINN. paleis parvis fibrillosis castaneis, stipitibus fasciculatis gracilibus nudis griseis, frondibus oblongo-rhomboides vel lanceolatis chartaceo-herbaceis

obscure viridibus simpliciter pinnatis, rachibus interdum sursum subulatis, pinnis 4—12-jugis ensiformibus 6—8-plo longioribus quam latis acuminatis integris vel leviter denticulatis basi symmetrice cuneatis, inferioribus maximis distincte petiolatis, venis liberis pinnatis; soris 12—20-jugis in quadrantem anteriorem non productis.

Plumier Fil. t. 60.

Asplenium salicifolium Linn. *Sp. Plant.* 1538. Swartz, *Syn. Fil.* 77. Willd. *Sp. Plant.* V. 313. Mett. *Aspl.* 100. Hook. *Sp. Fil.* III. 112., non Raddi.

Asplenium juglandifolium Lam. *Encycl. I.* 307. (teste Metten.), non Hook.

Asplenium integerrimum Spreng. *Nov. Act. Nat. Cur.* 1821. p. 231. Presl, *Tent.* 107.

Asplenium Kapplerianum Kunze, *Linnaea* XXI. 216.

Asplenium neogranatense Fée, *VII. Mem.* 47. t. 14. fig. 1. (forma pinnis paucis valde elongatis).

Asplenium ocannense Karst. *Fl. Columb. I.* 179. t. 86.

CAUDEX suberectus, lignosus, pilis mollibus lanosis ferrugineis et PALEIS fibrillosis castaneis 3—4 lin. longis vestitus. STIPITES fasciculati, erecti, graciles, griseo-virides, firmi, angulati, 6—12 poll. longi. LAMINA oblongo-rhomboida vel lanceolata, 9—18 poll. longa, 6—10 poll. lata, herbacea vel paulo chartacea, utrinque nuda, subconcolor, obscure viridis. RACHIS gracilis, nuda, interdum sursum anguste alata. PINNAE 6—12-jugae, alternae, subpatentes vel erecto-patentes, lineari-ensiformes; inferiores maximae, 3—5 poll. longae, 8—12 lin. latae, in eodem latere $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. distantes, per dimidium superius in apicem longe acuminatum angustatae, marginibus remote denticulatis vel integris, basi subsymmetrice cuneata interdum utrinque auriculata, petiolis 1—2 lin. longis instructae; superiores breviores, sessiles. VENAE pinnatae; VENULAE erecto-patentes, graciles, immersae, modice confertae, superiores semel, inferiores bis furcatae. SORI 8—9 lin. longi, costam non tangentes nec in quadrantem anteriorem pinnarum producti. INDUSIUM nudum, angustum, griseum, persistens.

In prov. Rio de Janeiro, Corcovado, Serra dos Orgãos etc.: Langsdorff!, Schott, Gardner 1731, Lady Calcott!, Glaziou 9251; ad fluv. Acara et Tanã, prov. Para: Spruce 371; item per Guianas anglicam batavam gallicamque et inde e Peruvia usque ad Cubam disseminata. — Vaga et Extrabrazil.

6. ASPLENIUM OLIGOPHYLLUM KAULF. paleis teneris lineari-subulatis griseis, stipitibus fasciculatis griseis nudis, frondibus oblongo-lanceolatis chartaceo-herbaceis moderate viridibus simpliciter pinnatis, rachibus sursum vix alatis, pinnis 3—8-jugis oblongo-lanceolatis 4—6-plo longioribus quam latis acuminatis inciso-crenatis basi subsymmetrice cuneatis, inferioribus distincte petiolatis, venis liberis pinnatis; soris 12—20-jugis, nec costam nec marginem attingentibus.

Asplenium oligophyllum Kaulf. *Enum.* 166. Spreng. *Syst.* IV. 82. Link, *Sp. Fil.* 87. Presl, *Tent.* 107. Mett. *Fil. Hort. Lips.* 72. *Asplen.* 95., et Auert.

Asplenium lineatum Wawra, Maximil. *Reise* 195. t. 98., non Swartz.

CAUDEX erectus, validus, PALEIS lineari-subulatis griseis membranaceis 4—6 lin. longis vestitus. STIPITES fasciculati, 6—12 poll. longi, firmi, nudi, grisei, modice graciles. LAMINA herbacea vel subchartacea, utrinque concolor, nuda, moderate viridis, oblongo-lanceolata, 1—2 pedes longa, 6—12 poll. lata, tota simpliciter pinnata. RACHIS nuda, grisea, apice solum leviter alata. PINNAE 3—8-jugae, alternae, in eodem latere 1—2 poll. separatae, erecto-patentes, oblongo-lanceolatae, 4—6 poll. longae, 9—18 lin. latae, apice acuminatae, margine inciso-crenatae, basi integrae et subsymmetrice cuneatae, inferiores distincte petiolatae, terminalis saepe reliquis major. COSTA pinnarum crassa, plana; VENAE laxae, gra-

ciles, immersae, pleraeque unifurcatae, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes SORI 6—9 lin. longi, nec costam nec marginem attingentes, utrinque secundum costam 12—20. INDUSIUM nudum, angustum, griseum, persistens.

In provinciis Brasiliae austro-orientalibus. S. Catharina: Chamisso; S. Paulo: Bowie et Cunningham!; Rio de Janeiro: Sello!, Schott, Wawra et Maty 511, Gardner 172!, Glaziou 1774! 2815—61; Minas Geraës, ad Gongo Soco et Caldas: Gardner 5310!, Lindberg 631! — Praeterea Columbianam et Andes Ecuadorenses inhabitat. — Vaga et Extrabrazil.

7. ASPLENIUM RHIZOPHORUM LINN. paleis parvis lanceolatis griseo-castaneis, stipitibus fasciculatis gracilibus nudis nitidis castaneis, frondibus subcoriaceis vel herbaceis oblongo-lanceolatis apice productis et radicantibus simpliciter pinnatis, pinnis ligulato-lanceolatis acutis subsessilibus, basi superiore cum rache subparallela, inferiore cuneato-truncata, imis mediisque subaequalibus, vel frondibus bipinnatifidis nunc 2- v. 3-pinnatis, segmentis parvis lineari-oblongis, venis liberis pinnatis; soris nec costam nec marginem attingentibus.

Var. α . CIRRHATUM Baker. (*Hook. Sp. Fil.* III. t. 187 A.)

Asplenium cirrhatum Rich. in Willd. *Sp. Plant.* V. 321. Poir. *Encycl. Suppl.* II. 508. Spreng. *Syst. Veg.* IV. 84. Presl, *Tent.* 107. Klotzsch, *Linnaea* XX. 352.

Asplenium Karstenianum Klotzsch l. c. 353. Fée, *Gen. Fil.* 192. Moore, *Ind. Fil.* II. 138.

Asplenium mastigophyllum Fée, *VIII. Mem.* 83.

Asplenium comptum Kunze Mss. Houlst. et Moore, *Gard. Mag.* II. 252.

CAUDEX erectus, lignosus, PALEIS membranaceis vel subrigidis lanceolatis castaneo-griseis 2—3 lin. longis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, graciles, erecti, nudi, nitidi, castanei, 4—8 poll. longi. LAMINA subcoriacea vel papyraceo-herbacea, utrinque nuda, obscure viridis, oblongo-lanceolata, 9—18 poll. longa, 2—4 poll. lata, tota simpliciter pinnata, apice plerumque elongato radicante prolifero. RACHIS gracilis, nitida, nuda, exalata. PINNAE 15—25-jugae, subpatentes vel leviter falcato-adscedentes, subsessiles, ligulato-lanceolatae, 12—24 lin. longae, 6—8 lin. latae, acutae, subintegerrimae vel inciso-crenatae, basi superiore cum rache subparallela interdum auriculâ deltoideâ instructa, inferiore cuneato-truncata, mediae contiguae, superiores secundum apicem elongatum sensim breviores et laxiores, imae mediis subaequales. VENAE immersae, laxae, graciles, erecto-patentes, superiores simplices, inferiores furcatae, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. SORI lateris superioris 6—12, 2—3 lin. longi. INDUSIUM nudum, angustum, membranaceum, evanesens.

Var. β . ALLEOPTERON Baker. (*Hook. l. c. tab.* 187 B.)

Asplenium rhizophorum Linn. *Herb.*

Asplenium alleopteron Kunze, *Linnaea* XXIII. 303. Klotzsch, *ibid.* XX. 353.

Asplenium cyrtopteron Kunze l. c. 233. Mett. *Fil. Hort. Lips.* 75. t. 10. fig. 3—4.

Asplenium radicans Lowe, *Ferns* 5. t. 12 B.

Asplenium flabellulatum var. α . Mett. *Aspl.* 130.

PINNAE profunde pinnatifidae vel inferne pinnatae, lacinis oblongis vel lineari-oblongis.

Var. γ . RACHIRHIZON Baker. (*Hook. l. c. t.* 187 D.)

Asplenium rachirhizon Raddi, *Fil. Bras.* 39. t. 56. Kunze, *Linnaea* XXIII. 237. Fée, *Gen. Fil.* 192. Lowe, *Ferns* 5. t. 34. Moore, *Ind. Fil.* II. 159.

Asplenium uniseriale Raddi, *Syn. Fil.* n. 100.

Asplenium amabile Liebm. *Mex. Bregm.* 99.

Asplenium flabellulatum var. β . Mett. *Aspl.* 131.

STIPITES 9—15 poll. longi; LAMINA magis herbacea, major, interdum 2 pedes longa, deorsum 10—12 poll. lata; PINNAE lanceolatae, 4—6 poll. longae, 12—15 lin. latae, bipinnatae; PINNULAE contiguae, asymmetricae deltoideae, deorsum usque ad rachem pinnatae, segmentis obovato-oblongis vel oblanceolatis 1—2 lin. latis extrorsum incisae; VENAE in segmentis ultimis saepe medianae solum obviae; SORI totam segmentorum latitudinem occupantes.

Varietas insignis, habitu ad *A. cicutarium* prope accedens, sed cum typo formis intermediis gradatim conjuncta.

Inde e Mexico et insulis Antillanis usque in Peruviam divulgata. Intra Brasiliae limites lecta est var. *a.* in Serra dos Orgãos: Gardner 171!, 5941!, Glaziou 2808!; var. *γ.* ibidem aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Raddi!, Martius!, Gardner 176!, Glaziou 1691!, 2337!; ad S. Sebastião prov. S. Pauli: Fox!, et in prov. Minas, e. gr. ad Caldas: Langsdorff!, Lindberg n. 621!. Var. *β.* in Guyana anglica observata est (Rich. Schomburgk 1206!), typus speciei etiam in insulis s. d. Salomonis (Mittl!) — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

8. ASPLENIUM LUNULATUM SWARTZ: paleis parvis fibrillosis rigidis castaneis, stipitibus fasciculatis nudis gracilibus griseis vel raro ebeneis, frondibus herbaceis moderate viridibus ligulato-lanceolatis totis simpliciter pinnatis, rachibus exalatis vel anguste alatis, pinnis 20—40-jugis sessilibus patentibus inaequaliter ligulatis vel lanceolatis contiguis obtusis acutisque distincte dentatis, basi superiore recta cum rache parallela interdum auriculata, inferiore distincte truncata, inferioribus reductis, venis liberis pinnatis; soris nec costam nec marginem attingentibus.

Tabula nostra XXVII. Fig. 9. 10. 22. (frons et ejus partes).

Asplenium lunulatum Swartz, Syn. Fil. 80. Willd. Sp. Plant. V. 324. Poir. Encycl. Suppl. II. 509. Metten. Aspl. 121. Ettingsh. Farnkr. t. 83. fig. 2.

Asplenium falcatum Thunb. Prodr. 172., non Lam.

Asplenium regulare Swartz, Stockholm. Vetensk. Akad. Handl. 1817. p. 67.

Asplenium tenerum Raddi, Syn. Fil. 93., non Forst.

Asplenium brasiliense Raddi, Fil. Bras. 36. t. 51.

Asplenium auricularium Desv. Ann. Soc. Linn. Paris. VI. 273.

Asplenium consanguineum Gaud. Freyc. Voy. 315., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, erectus, PALEIS castaneis firmis fibrillosis 3—4 lin. longis sursum vestitus. STIPITES dense fasciculati, graciles, firmi, nitidi, 1—4 poll. longi, grisei vel raro ebenei. LAMINA herbacea, utrinque nuda, moderate viridis, ligulato-lanceolata, 6—18 poll. longa, 1—2 poll. lata, tota simpliciter pinnata, interdum apice radicans. RACHES graciles, strictae, nuda, griseae vel raro ebeneae. PINNAE 20—40-jugae, contiguae, patentae, asymmetricae ligulatae, 6—12 lin. longae, 3—5 lin. latae, subobtusae, distincte inciso-crenatae, basi superiore recta integra cum rache parallela saepe plus minus auriculatim producta, inferiore subhorizontaliter truncata, omnes sessiles, inferiores laxiores breviores deflexae. VENAE erecto-patentes, graciles, immersae, modice laxae, imae lateris superioris furcatae vel subpinnatae, reliquae simplices. SORI lateris superioris 6—10, 1½—2½ lin. longi. INDUSIUM nudum, angustum, membranaceum.

Var. *β.* ERECTUM Baker.

Tabula nostra XXVII. Fig. 11. 12. (pinnae, sub titulo Boryano specifico A. erecti).

Asplenium erectum Bory in Willd. Sp. Plant. V. 328. Poir. Encycl. Suppl. II. 510. Mett. Fil. Hort. Lips. 73. Aspl. 122. Hook. Sp. Fil. III. 106. (ex parte) tab. 178.

Asplenium harpeodes Kunze, Linnaea XVIII. 329. Liebm. Mex. Breg. 90. Moore, Ind. Fil. II. 135. Ettingsh. Farnkr. t. 83. fig. 5—7.

Asplenium falcatum Mart. et Gal. Fil. Mex. 58., non Lam. *Asplenium pendulum* Fée, Gen. Fil. 196.

Lamina major, 1—2 pedes longa, 3—5 poll. lata; pinnae mediae 1½—2½ poll. longae, e triente inferiore in apicem acutum vel saepe longe acuminatum angustatae, profunde dentatae, basi inferiore minus truncata.

Var. *γ.* PTEROPUS Baker.

Asplenium pteropus Kaulf. Enum. Fil. 170. Spreng. Syst. IV. 83. Kunze, Regensb. Flora 1839. II. 40. Mett. Aspl. 119. Hook. Sp. Fil. III. 122. t. 177.

Pinnae obtusae vel acutae; rachis plana, anguste alata.

Species cosmopolita per regiones calidiores utriusque orbis sparsa, in Brasilia provincias orientales inde e Bahia usque Rio Grande do Sul inhabitat, ab omnibus fere botanicis reportata. Var. *β.* in Serra dos Orgãos: Gardner 164!; var. *γ.* in prov. S. Catharina, S. Paulo, Rio de Janeiro et Bahia: Chamisso, Fritz Müller!, Burchell 3836! 4588!, Pohl, Martius. — Vaga et Extrabrazil.

9. ASPLENIUM OBTUSIFOLIUM LINN. stipitibus segregatis nudis, frondibus oblongo-lanceolatis membranaceis obscure viridibus simpliciter pinnatis, rachibus sursum vix alatis, pinnis 10—15-jugis ensiformibus 4—5-plo longioribus quam latis acutis obtusisve inciso-crenatis, basi superiore cum rache parallela plerumque auriculata, inferiore cuneato-truncata, inferioribus petiolatis, venis liberis pinnatis; soris 8—12-jugis, nec costam nec marginem attingentibus.

Plumier Fil. t. 67.

Asplenium obtusifolium Linn. Sp. Plant. 1538. Swartz, Syn. Fil. 76. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 239. Mett. Aspl. 100. Hook. et Baker, Syn. Fil. 202. (nomen malum et decipiens).

Asplenium salicifolium Spreng. Anl. III. 3. t. 3. fig. 28. Raddi, Fil. Bras. 35. t. 50., non Linn.

Asplenium riparium Liebm. Mex. Breg. 92. Hook. Sp. Fil. III. 119. t. 169.

Asplenium repandulum Kunze, Linnaea IX. 65. Metten. Fil. Hort. Lips. 73. Ettingsh. Farnkr. t. 89. fig. 13. t. 90. fig. 6.

Asplenium laetum Sieb. Syn. Fil. n. 199.

Asplenium coriaceum Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 70.

Asplenium aquaticum Klotzsch et Karsten, Linnaea XX. 354.

CAUDEX firmus, gracilis, breviter repens, paleis subnullis. STIPITES segregati, firmi, nudi, 4—8 poll. longi. LAMINA membranacea, obscure viridis, utrinque nuda, membranacea, tenera, oblongo-lanceolata, 1—2 pedes longa, 6—8 poll. lata, tota simpliciter pinnata. PINNAE 10—15-jugae, ensiformes, subpatentes, contiguae vel subcontiguae, 2—4 poll. longae, 6—9 lin. latae, acutae vel subobtusae, crenato-denticulatae, basi superiore cum rache subparallela saepe auriculā deltoideā plus minus distinctā instructa, inferiore cuneato-truncata, inferiores breviter petiolatae, superiores sensim breviores sessiles basi secundum rachem paullulum alato-decurrentes. VENAE graciles, laxae, erecto-patentes, 1- v. 2-furcatae, saepe 1 lin. distantes. SORI 4—6 lin. longi, utrinque secundum costam 8—12.

Inde e Mexico insulisque Antillanis in Peruviam et Brasiliam vagans, locis sylvaticis humidis saepe inundatis praecipue degens. In prov. Rio de Janeiro, e. gr. Serra dos Orgãos etc.: Martius, Langsdorff, Raddi!, Gardner 168! Schott aliique; Minas Gerais, ad Lagoa Santa: Warming!, et in districtu Ilheos Bahiae: Martius. — Vaga et Extrabrazil.

10. ASPLENIUM ABCISSUM Willd. paleis parvis linearibus, stipitibus fasciculatis gracilibus nudis griseis, frondibus herbaceis moderate viridibus ligulato-lanceolatis totis simpliciter pinnatis, rachibus exalatis, pinnis 10—15-jugis inaequaliter ligulatis vel lanceolatis obtusis vel acutis denticulatis, basi superiore recta cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, inferioribus reliquis subaequalibus breviter petiolatis, venis liberis pinnatis; soris nec costam nec marginem attingentibus.

Tabula nostra XXVII. Fig. 8. (pinna, lapsu sub nomine Kunzeano A. firmum).

Asplenium abscissum Willd. *Sp. Plant. V. 321. (ex parte). Spreng. Syst. IV. 84. Presl, Tent. 107. Klotzsch, Linnaea XX. 341. Metten. Asplen. 101. Ettingsh. Farnkr. t. 81. fig. 1. Asplenium firmum* Kunze, *Bot. Zeitg. III. 283. Metten. Fil. Hort. Lips. 73. Hook. Sp. Fil. III. 134. t. 174.*

Asplenium bidentatum Kunze, *Linnaea IX. 66., non Willd. Asplenium polymorphum* Mart. et Gal. *Fil. Mex. 56. t. 16. fig. 2.*

Asplenium platyclamys Fée, *VII. Mem. 48. t. 14. fig. 3. Asplenium Ruizianum* Klotzsch, *Linnaea XX. 354. Asplenium falcatum* Vell. *Fl. Flum. XI. t. 103., non Lam.*

CAUDEX lignosus, erectus, PALEIS parvis linearibus rigidis obscure brunneis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, stricti, grisei, nudi, 4—6 poll. longi. LAMINA herbacea, utrinque nuda, moderate viridis, ligulato-lanceolata, 6—12 poll. longa, 2—3 poll. lata, tota simpliciter pinnata, interdum apice radicans. RACHES strictae, nuda, graciles, griseae. PINNAE 10—15-jugae, contiguae vel inferiores sublaxae, omnes patentēs, inaequaliter lanceolatae vel ligulatae, 1—1½ poll. longae, 6—8 lin. latae, subobtusae vel acutae, dentatae, basi superiore recta integra cum rache parallela interdum subauriculata, inferiore cuneata vel decurvata; inferiores breviter petiolatae, mediis subaequales; superiores sessiles. VENAE erecto-patentes, modice laxae, superiores simplices, inferiores unifurcatae, imae lateris superioris subpinnatae. SORI lateris superioris 6—12, 3—4 lin. longi. INDUSIUM nudum, membranaceum.

E Mexico et insulis Antillis in Peruviam, Guyanam, usque in Brasiliam australem dispersa. In prov. do Alto Amazonas ad oram meridionalem fluv. Amazonum, ad ostium fluv. Solimões: Spruce 1623; Minas Geraës: Lindberg 627; Rio de Janeiro: Burchell 3085!, Glaziou 416!; Rio Grande do Sul: Fox! — Vaga et Extrabrazil.

Obs. Exemplar *A. marini* Linn. adest in herbario Hookeriano ad Brasiliam (Rio Grande do Sul, Fox!) adscriptum, sed errore, ut conjiciam. Cfr. Spec. Fil. III. 96.

11. ASPLENIUM ANISOPHYLLUM KUNZE: paleis membranaceis lanceolatis castaneis, stipitibus subfasciculatis griseis sursum nudis deorsum paleaceis, frondibus subcoriaceis obscure viridibus oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 6—12-jugis breviter petiolatis ligulato-lanceolatis acutis crenatis, basi superiore cum rache subparallela, inferiore cuneato-truncata, imis reliquis subaequalibus, venis liberis pinnatis; soris crassis lineari-oblongis, e costâ vix ultra dimidiam pinnarum latitudinem procurrentibus.

Asplenium anisophyllum Kunze, *Linnaea X. 511. Fée, Gen. Fil. 191. Pappé et Rawson, Syn. Fil. Afr. Austr. 18. Metten. Asplen. 99. tab. 4. fig. 12. Hook. Sp. Fil. III. 111. Asplenium sanguinolentum* Kunze *Mss. Mett. Aspl. 98. tab. 4. fig. 10. Hook. Sp. Fil. III. 114.*

Asplenium nigricans Hook. *fil. Linn. Transact. XX. 170. Asplenium nubilum* Moore, *Ind. Fil. II. 150.*

CAUDEX breviter repens, PALEIS lanceolatis membranaceis castaneis vestitus. STIPITES subfasciculati, firmi, stricti, grisei, 6—9 poll. longi, sursum nudi, deorsum paleacei. LAMINA subcoriacea, utrinque nuda, sub-Polypod.

concolor, obscure viridis, oblongo-lanceolata, 12—18 poll. longa, 6—10 poll. lata, tota simpliciter pinnata. RACHIS grisea, nuda, exalata. PINNAE breviter petiolatae, 6—12-jugae, laxae, subpatentes vel erecto-patentes, ligulato-lanceolatae, 3—5 poll. longae, 8—12 lin. latae, e triente inferiore in apicem acutum vel acuminatum sensim angustatae, leviter crenatae, basi superiore cum rache parallela vel leviter cuneata, inferiore cuneato-truncata. PINNAE imae reliquis subaequales. VENAE erecto-patentes, graciles, modice laxae, pleraeque profunde furcatae. SORI utrinque secundum costam 10—15, lineari-oblongi, 3—4 lin. longi. INDUSIUM latum, griseum, nudum, scarosum, persistens.

In sylvis prov. Rio de Janeiro, rara: Beyrich, Gardner 5942!; Minas Geraës ad Caldas: Regnell III. 1468!. Praeterea Venezuelam, Panamam, Cubam, insulas Galapagos et Africam australem inhabitat. — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

12. ASPLENIUM AURITUM SWARTZ: paleis parvis membranaceis lanceolatis griseis, stipitibus fasciculatis strictis nudis griseis vel subbeneis, frondibus oblongo-lanceolatis coriaceis pallide viridibus 1- v. 2-pinnatis, rachibus strictis plus minus alatis, pinnis 15—25-jugis sessilibus inaequaliter lanceolatis acutis vel obtusis serratis vel pinnatifidis nunc pinnatis, basi superiore cum rache subparallela, inferiore cuneato-truncata, venis liberis inconspicuis pinnatis; soris lineari-oblongis ad costam nec tamen ad marginem productis.

Tabula nostra XLIV. Fig. VII. (analysis).

a. SERRATUM Baker.

Tabula nostra XXVIII. Fig. 4. (frons).

Polypodium serratum Aublet, *Guian. II. 962. Lam. Encycl. V. 525.*

Asplenium auritum Sw. *Fl. Ind. Occ. III. 1816. Syn. Fil. 78. Schkuhr, Fil. 199. t. 130b. Willd. Sp. Plant. V. 326. Mart. Hb. Fl. Bras. n. 348. Ettingsh. Farnkr. t. 89. fig. 6., et Auctt. Asplenium macilentum* Kunze *Mss. Klotzsch, Linnaea XX. 351. Fée, Gen. Fil. 192. (forma pinnis obtusis, rachibus totis distincte alatis).*

Asplenium bidentatum Willd. *Sp. Plant. V. 318. Poir. Encycl. Suppl. II. 506.*

Asplenium curvatum Kaulf. *Enum. Fil. 168.*

Asplenium monodon Liebm. *Mex. Bregm. 95.*

Asplenium umbrosum Schrad. *Mss. Kaulf. Enum. 168. Presl, Tent. 106.*

CAUDEX erectus, PALEIS parvis membranaceis lanceolatis griseis vestitus. STIPITES fasciculati, firmi, grisei, nudi, stricti, raro subbenei, 4—8 poll. longi. LAMINA oblongo-lanceolata, 6—15 poll. longa, 2—4 poll. lata, coriacea, utrinque nuda, pallide viridis, siccitate grisea, usque ad rachem simpliciter pinnata. RACHIS stricta, grisea, gracilis, plus minus alata. PINNAE 15—25-jugae, subsessiles, subpatentes vel leviter falcato-ascendentes, laxae vel subcontiguae, inaequaliter lanceolatae, 1—2 poll. longae, 4—6 lin. latae, obtusae vel acutae nunc acuminatae, plus minus serratae, basi superiore cum rache parallela saepe auriculata, inferiore cuneato-truncata, imae mediis subaequales. VENAE immersae, inconspicuae, laxae, erecto-patentes, superiores simplices, inferiores furcatae, imae subpinnatae. SORI lineari-oblongi, crassi, 2—3 lin. longi, non ad marginem producti, demum saepe totam fere faciem frondis occupantes, INDUSIUM coriaceum.

Var. β . SULCATUM Baker.

Asplenium sulcatum Lam. *Encycl. II. 308. Raddi, Fil. Bras. 38. Spreng. Syst. IV. 87. Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 277. Ettingsh. l. c. t. 84. fig. 4. et Auctt.*

Asplenium rigidum Swartz, *Stockholm. Vetensk. Akad. Handl. 1817. p. 68. Spreng. Syst. IV. 89. Klotzsch, Linnaea XX. 352.*

Asplenium dispersum Kunze, *Linnaea XXIII. 304. Metten. Fil. Hort. Lips. 76. t. 9. fig. 5—6. Asplen. 104.*

Asplenium Schottii Presl, *Del. Prag. I. 179. Tent. Pter. 106.*

Asplenium prolixum Schrad. Goett. Gel. Anzeig. 1824. p. 870.

Asplenium recognitum Kunze, Linnaea XXII. 577.

Asplenium pyramidatum Liebm. Mex. Bregn. 97.

Pinnæ prope rachem plus minus iterato-pinnatæ, pinnulis oblongis vel lineari-oblongis plus minus inciso-dentatis.

Var. γ . FOENICULACEUM Baker.

Asplenium foeniculaceum H.B.K. Nov. Gen. 1. 15. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 92.

Asplenium coriifolium Liebm. Mex. Bregn. 97.

Asplenium abrotanoides Presl, Rel. Haenk. I. 47. t. 8. fig. 2.

Asplenium tenellum Fée, Gen. Fil. 198.

Asplenium delicatulum Presl, Rel. Haenk. I. 47. t. 7. fig. 3. Hook. Ic. Plant. t. 918. Sp. Fil. III. 182.

Lamina tripinnata, segmentis anguste linearibus acutis.

Per totam Brasiliam et reliquis Americæ tropicæ terras, itemque in ins. Borbonia et montibus Neilgherriensibus disseminata. α . in omnibus Brasiliæ provinciis: Blanchet 2471!, Spruce 2275!, Mart. Hb. Fl. Bras. 348! etc. etc.; var. β . item in omnibus provinciis dispersa: Blanchet 3929!, Gardner 41! 182! 5311!, Burchell 1950! 5042! omnesque fere collectores reliqui; var. γ . ad Alegre prov. S. Paul. Burchell 4677!, et in Serra dos Orgãos: Burchell 2087!, Glaziou!. — Vaga et Extrabrazil.

13. ASPLENIUM SERRA LANGSD. et FISCH. paleis linearibus griseo-castaneis, stipitibus segregatis nitidis nudis castaneis, frondibus magnis chartaceo-coriaceis oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 12—30-jugis inaequaliter lanceolatis acuminatis dentatis, basi superiore cum rache parallela vel late cuneata, inferiore acutius cuneata, inferioribus petiolatis reliquis subaequalibus, venis liberis pinnatis; soris cum costa contiguis vix obliquis.

Tabula nostra XXVII. Fig. 18—21. (pinnæ).

Asplenium Serra Langsd. et Fisch. Ic. Fil. 16. t. 16. Willd. Sp. Plant. V. 312. Mett. Asplen. 151. Hook. Sp. Fil. III. 155. Mart. Hb. Fl. Bras. n. 343. Ettingsh. Farnkr. t. 85. fig. 13. t. 86. fig. 1. 3. 4., et Auct.

Asplenium woodwardioides Gardn. Lond. Journ. Bot. I. 547.

Asplenium Poeppigii Presl, Tent. 106. t. 3. fig. 21.

Asplenium insigne Liebm. Mex. Bregn. 94.

CAUDEX lignosus, modice validus, repens, PALEIS membranaceis linearibus griseo-castaneis 3—4 lin. longis vestitus. STIPITES segregati, castanei, nitidi, nud vel deorsum paleacei, 8—12 poll. longi, antice profunde canaliculati. LAMINA chartaceo-coriacea, utrinque nuda, obscure viridis, siccitate grisea, oblongo-lanceolata, 2—4 pedes longa, 8—12 poll. lata, tota simpliciter pinnata. PINNÆ 12—30-jugæ, ascendentes vel patentes, laxæ vel subcontiguæ, 4—6 poll. longæ, 6—12 lin. latæ, inaequaliter lanceolatae, acuminatae, inciso-dentatae. VENÆ graciles, contiguæ, extrorsum erecto-patentes, introrsum cum costâ subparallelæ, pleraque profunde furcatae. SORI haud ultra tertiam vel dimidiam latitudinis pinnarum egredientes, 3—9 lin. longi, crassi. INDUSIUM nudum, coriaceum.

Var. β . CAMPTOSORUM Baker.

Asplenium camptosorum Metten. ex Kuhn in Linnaea XXXVI. 101.

Lamina glaberrima; sori ad medium pinnarum producti, curvati, interdum 1 poll. longi.

In tota Brasilia, Guyana, Peruvia, Venezuela, Guatemala, Cuba, etiam in Fernando Po et montibus Cameroon. S. Catharina: Barclay!, Langsdorff!; Rio de Janeiro frequentissime: Langsdorff!, Sello!, Burchell!, Gardner! etc. etc.; Bahia, Ilheus, Villa Viçosa etc.: Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 343), Princ. Newwied; Minas Geraes, Serra da Piedade, Gongo Soco, Caldas rel.: Gardner 5312! 5309!, Bunbury, Lindberg! etc.; Para: Martius. Var. β . in prov. Minarum: Freyress. — Vaga et Extrabraz.

14. ASPLENIUM AURICULATUM SWARTZ: paleis parvis lanceolatis, stipitibus fasciculatis gracilibus nudis griseis, frondibus subcoriaceis obscure viridibus ligulato-lanceolatis totis simpliciter pinnatis, pinnis 10—15-jugis inaequaliter lanceolatis acutis profunde inciso-crenatis, basi superiore late cordata, inferiore cuneato-truncata, inferioribus breviter petiolatis, imis reliquis paulo brevioribus, venis liberis pinnatis; soris nec costam nec marginem attingentibus.

Tabula nostra XXVII. Fig. 17. (pinnæ).

Asplenium auriculatum Swartz, Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 68. Spreng. Syst. Veg. IV. 82. Kunze, Linnaea XXI. 217. Moore, Ind. Fil. II. 114. Hook. Sp. Fil. III. 118. t. 171.

Asplenium Falx Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 275. Fée, Gen. Fil. 191. t. 17 C. fig. 2. Kunze l. c. 216. Ettingsh. l. c. t. 81. fig. 7.

Asplenium semicordatum Raddi, Fil. Bras. 36. t. 52. fig. 1.

Presl, Tent. 106. Kunze, Linnaea XIII. 141. Metten. Aspl. 102.

Asplenium discolor Kunze, Linn. IX. 65. Mart. et Gal. Fil. Mex. 56.

Asplenium pimpinellifolium Fée, VII. Mem. 52. t. 25. fig. 5.

Asplenium salicifolium β . *semicordatum* Splitg. Enum. Fil. Surin. 31.

CAUDEX suberectus, PALEIS parvis membranaceis lanceolatis brunneis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, graciles, stricti, nudi, grisei, 2—6 poll. longi. LAMINA subcoriacea, utrinque nuda, obscure viridis, lanceolato-ligulata, 6—12 poll. longa, 3—6 poll. lata, tota simpliciter pinnata. PINNÆ 10—15-jugæ, patentes, laxæ vel subcontiguæ, inaequaliter lanceolatae, 1½—3 poll. longæ, 5—9 lin. latæ, e basi in apicem acutum sensim angustatae, marginibus conspicue inciso-crenatis, basi superiore late cordata interdum auriculâ profunde solutâ praedita, basi inferiore cuneato-truncata; inferiores breviter petiolatae; imae reliquis paulo breviores. VENÆ erecto-patentes graciles, immersae, laxæ, superiores simplices, inferiores furcatae. SORI 4—6 lin. longi, in latere pinnarum superiore 6—12. INDUSIUM firmum, griseum, persistens.

Per totam Brasiliam, Guyanam, Peruviam, usque in Mexicum et insulas Antillanas divulgatum. In prov. S. Pauli, Serra do Mar: Martius; Rio de Janeiro frequens: Raddi!, Langsdorff, Martius, Pohl, Burchell 2180!, Gardner 161! etc.; Minas Geraes: Freyress, Lindberg 626!; Bahia: Blanchet 3928!; Mato Grosso et Goyaz: Pohl; Para: Spruce 38! — Vaga et Extrabrazil.

15. ASPLENIUM FORMOSUM WILLD. paleis parvis linearibus, stipitibus brevibus dense fasciculatis nudis nitidis castaneo-ebeneis, frondibus subcoriaceis linearibus utrinque attenuatis simpliciter pinnatis, pinnis 30—40-jugis contiguis sessilibus inaequaliter lanceolatis obtusis profunde inciso-pinnatifidis, basi superiore cum rache parallela, inferiore horizontaliter truncata, venis liberis pinnatis; soris oblongis subtransversalibus, 1—3 pro pinna, plerumque in latere inferiore obviis.

Asplenium formosum Willd. Sp. Plant. V. 329. Poir. Encycl. Suppl. II. 510. Presl, Tent. 107. H.B.K. Nov. Gen. I. 15. Hook. Fil. Exot. t. 16. Sp. Fil. III. 143. Metten. Asplen. 134. Beddome, Fil. S. Ind. t. 124. Ettingsh. Farnkr. t. 86. fig. 6. 8.

Asplenium nanum Willd. l. c. 323. Poir. Encycl. Suppl. II. 508. et Auct.

Asplenium subalatum Hook. et Arn. Bot. Beech. 312. t. 71.

Asplenium odontophyllum Wall. Cat. n. 2216.

CAUDEX erectus, PALEIS parvis linearibus castaneo-ebeneis sursum vestitus. STIPITES dense caespitosi, erecti, 6—12 lin. longi, graciles, stricti, nitidi, nudi, castaneo-ebenei. LAMINA subcoriacea, utrinque nuda,

subconcolor, obscure viridis, linearis, 6—12 poll. longa, 8—12 lin. lata, utrinque angustata, simpliciter pinnata. RACHIS gracilis, stricta, nuda, nitida, castaneo-ebenea. PINNAE 20—40-jugae, contiguae, patentes, sessiles, inaequaliter lanceolatae, mediae 5—6 lin. longae, 2—3 lin. latae, obtusae, marginibus ad dimidium latitudinis inciso-pinnatifidis, basi superiore recta integra cum rache parallela, inferiore horizontaliter truncata, inferiores laxiores sensim decrescentes, imae subdeltoideae deflexae. COSTA obscura; VENAE immersae, obscurae, lateris superioris pinnarum 4—6, superiores simplices, imae subpinnatae, lateris inferioris magis obliquae 2—4. SORI crassi, oblongi, 1—3 pro pinna, plerumque in latere inferiore solum obvii. INDUSIUM latum, scariosum.

In prov. *Minarum*: Freyreiss, Pohl, Gardner 5313!, et Goyaz: Pohl!, Burchell 5153! — *Praeterea in Guyana anglica* (Rich. Schomburgk 1661, Appun 1601!), *Bolivia* (D'Orbigny), *Peruvia hincque usque ad Mexicum et insulas Antillanas, nec non in Angola et Congo Africae tropicae et in India orientali disseminatum.* — *Oreas et Extrabasil.*

16. ASPLENIUM PULCHELLUM RADDI: paleis parvis linearibus castaneis, stipitibus fasciculatis viridibus nudis, frondibus membranaceo-herbaceis linearibus simpliciter pinnatis, pinnis 10—15-jugis contiguis subdimidiato-lanceolatis, lateribus exterioribus profunde inciso-dentatis, interiore integro cum rache parallelo, inferioribus breviter petiolatis mediis aequalibus, venis liberis pinnatis; soris oblongis neque costam nec marginem attingentibus.

Tabula nostra XXVI. Fig. 11—13. et XXVII. Fig. 24.

Asplenium pulchellum Raddi, Fil. Bras. 37. t. 52. fig. 2. Presl, Tent. 107. Kunze, Linnaea IX. 66. Metten. Asplen. 123. Hook. Sp. Fil. III. 129. Etingsh. Farnkr. t. 78. fig. 8. 12. 13., non Wallich.

CAUDEX gracilis, erectus, paleis parvis rigidis subulatis castaneo-ebeneis vestitus. STIPITES fasciculati, pergraciles, virides, nudi, 6—18 lin. longi. LAMINA membranaceo-herbacea, moderate viridis, utrinque nuda, concolor, linearis, 2—4 poll. longa, 8—12 lin. lata, basi truncata. RACHIS subcapillaris, nuda, viridis. PINNAE 10—15-jugae, contiguae, erecto-patentes vel leviter falcatae, subdimidiato-lanceolatae, margine superiore et exteriori profunde inciso-dentato, interiore integro cum rache parallelo, inferiore subrecto, inferiores breviter petiolatae mediis aequales. VENAE graciles, immersae, lateris superioris pinnarum 6—9, superiores furcatae, imae subpinnatae, lateris inferioris magis obliquae. SORI oblongi, 1 lin. longi, neque ad costam nec ad marginem producti, lateris superioris 4—6, inferioris 1—2. INDUSIUM nudum, membranaceum.

Var. β . OTITES Mett.

Asplenium Otites Link, Enum. Fil. Hort. Berol. 91. Mett. Fil. Hort. Lips. 74. t. 9. fig. 1—4.

Asplenium pulchellum Moore et Houlst. Gard. Mag. Bot. III. 259. Love, Ferns 5. t. 31A.

Pinnae obtusiores, magis rhomboideae, minus inciso-dentatae.

In *rupibus humidis Serra d'Estrella, similibusque locis prope Corrego Seco et Mandioca ad radicem montium Organensium: Raddi!, Langsdorff, Glaziou 419!*; ad *Villa do Rio das Contas prov. Bahia: Martius. Var. β . ad Baixo da Serra d'Itaguahi, prov. Rio de Janeiro: Pohl.* — *Typus etiam Peruviam et Venezuelam inhabitat.* — *Dryas et Extrabasil.*

17. ASPLENIUM LAETUM SWARTZ: paleis parvis linearibus, stipitibus nudis subfasciculatis castaneis vel griseis, frondibus membranaceis lanceolatis totis simpliciter pinnatis obscure viridibus, pinnis 15—20-jugis inaequaliter lanceolatis acutis vel subobtusis incis, basi superiore cum rache parallela, dimidio vel triente interiore lateris inferioris exciso, inferioribus breviter petiolatis reliquis subaequalibus, venis liberis pinnatis; soris neque ad costam nec ad marginem productis.

Asplenium laetum Swartz, Syn. Fil. 79. et 271. Willd. Sp. Plant. V. 317. Schkuhr, Fil. 65. t. 70. Hook. Sp. Fil. III. 133. t. 173. et Auctt., non Wallich.

Asplenium abscissum Willd. ex parte teste Mettenio. Sieb. Syn. Fil. 179.

Asplenium Schkuhrianum Presl, Tent. 107. Klotzsch, Linnaea XX. 355. Metten. Asplen. 133. tab. 4. fig. 15—16.

Asplenium virens Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 273.

Asplenium drepanophyllum Kunze, Linnaea IX. 66.

Asplenium miradoreense et lugubre Liebm. Mex. Bregm. 91.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, paleis parvis castaneis linearibus subulatis vestitus. STIPITES subsegregati, firmi, nudi, castanei vel grisei, 4—6 poll. longi. LAMINA lanceolata, 6—12 poll. longa, 2—4 poll. lata, membranacea, utrinque nuda, obscure viridis, tota simpliciter pinnata. RACHIS stricta, nuda, gracilis, castanea vel viridis. PINNAE 15—20-jugae, contiguae, subpatentes, inaequaliter lanceolatae, 1—2 poll. longae, 4—6 lin. latae, apice acuto vel subobtus, marginibus conspicue inciso-crenatis, latere superiore producto, basi cum rache parallela, lateris inferioris dimidio vel triente interiore exciso, imae breviter petiolatae mediis subaequales. VENAE pinnatae, erecto-patentes, graciles, laxae, superiores simplices, inferiores furcatae vel subpinnatae. SORI 2—3 lin. longi, lateris superioris pinnarum 6—10. INDUSIUM membranaceum.

Species inter *A. firmum Kunze* et *A. resectum Smith* (veteris orbis civem) medium fere tenens.

Habitat in prov. Rio Grande do Sul: Tweedie!; Rio de Janeiro: Lyall!; do Alto Amazonas ad Manaqueri: Spruce 1623! — Etiam in Guyana gallica, Peruvia, Venezuela ad Mexicum insulasque Antillanas et in ins. Galapagos obvium. — *Vaga et Extrabasil.*

18. ASPLENIUM CAUDATUM FORST. paleis linearibus castaneis, stipitibus fasciculatis griseo-ebeneis fibrillosis, frondibus subcoriaceis lanceolatis bipinnatifidis utrinque angustatis, pinnis 20—30-jugis sessilibus inaequaliter lanceolatis ad medium fere pinnatifidis et profunde inciso-dentatis, basi superiore cum rache subparallela, inferiore cuneato-truncata, inferioribus sensim reductis, venis liberis pinnatis; soris linearibus ad dimidium interiorem pinnarum restrictis.

Asplenium caudatum Forst. Prodr. 80. Swartz, Syn. Fil. 82. Willd. Sp. Plant. V. 335. Schkuhr, Fil. t. 77., et Auctt.

Tarachia caudata et truncatiloba Presl, Epim. 77—9.

Asplenium multisectum Blume, Enum. 185.

Forma brasiliensis: LACINULATUM Schrad. Mss.

CAUDEX suberectus, paleis linearibus 3—4 lin. longis dense vestitus. STIPITES fasciculati, griseo-ebenei, 4—6 poll. longi, paleis fibrillosis patentibus debilibus obscure purpureis sparse vestiti. LAMINA subcoriacea, obscure viridis, utrinque nuda, lanceolata, 1—2 pedes longa, 5—6 poll. lata, utrinque angustata, bipinnatifida. RACHES strictae, griseo-ebeneae, plus minus sicut stipites vestitae. PINNAE 20—40-jugae, sessiles, inaequaliter lanceolatae, mediae $2\frac{1}{2}$ —3 poll. longae, dorsum 5—8 lin. latae, lateribus ad medium pinnatifidis, laciniis rhomboideis extrorsum argute incis, basi superiore cum rache subparallela, inferiore cuneato-truncata, inferiores laxiores multaeque sensim reductae, imae 1 poll. longae vel minores. VENAE erecto-patentes, modice laxae, mediae unifurcatae, imae lateris superioris pinnatae. SORI e costâ ad medium pinnarum curvantes, 3—4 lin. longi. INDUSIUM nudum, angustum.

Habitat ad Campos Novos prov. Rio de Janeiro et in prov. Bahia: Princ. Neuwied!; in prov. Minas Gerais: Freyreiss! — Item incolit Ecuador (Jameson 15!) et per regiones tropicas veteris orbis late vagat. — *Dryadi-Oreas et Extrabasil.*

19. ASPLENIUM HALLII HOOK. paleis parvis linearibus, stipitibus brevibus nudis castaneis, frondibus membranaceo-herbaceis obscure viridibus apice radicanibus oblongo-lanceolatis

utrinque angustatis bipinnatifidis, pinnis sessilibus 20—30-jugis patentibus lanceolatis ultra dimidium pinnatifidis, segmentis linearibus obtusiusculis, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, venis liberis pinnatis; soris brevibus basi segmentorum impositis.

Asplenium Hallii Hook. II. Cent. Ferns t. 30. Sp. Fil. III. 202. Hook. et Baker, Syn. Fil. 212.

Asplenium pectinatum Moore, Ind. Fil. II. 152., non Wallich.

CAUDEX erectus, PALEIS parvis linearibus castaneis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, nitidi, nudi, stricti, castanei, 6—12 lin. longi. LAMINA membranaceo-herbacea, subhorizontaliter patens et saepe apice radicans, obscure viridis, oblongo-lanceolata, bipinnatifida, utrinque angustata, 6—9 poll. longa, 1½—2 poll. lata. RACHIS castanea, stricta, nitida, nuda. PINNAE 20—30-jugae, contiguae, sessiles, patentes, lanceolatae, mediae maximae, 9—10 lin. longae, deorsum 4—5 lin. latae, subobtusae, profunde pinnatifidae, segmentis linearibus erecto-patentibus obtusiusculis, inferioribus vix costam attingentibus, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, inferiores et superiores sensim decrescentes. VENAE graciles, immersae, in segmentis exterioribus mediae solummodo obviae. SORI lineari-oblongi, 1—1½ lin. longi, ad basin segmentorum solitarii, e costâ ad dimidium latitudinis pinnarum currentes. INDUSTIUM nudum, angustum, membranaceum.

Habitat ad S. Gabriel prov. do Alto Amazonas, in sylvis dictis Caatingas: Spruce 2357! Item incolit Andes Ecuadorenses: Col. Hall!, Spruce 5692! — *Najas* et Extrabrazil.

20. ASPLENIUM PUMILUM SWARTZ: stipitibus fasciculatis elongatis deorsum castaneo-ebeneis, frondibus parvis pallide viridibus membranaceis deltoideis bi—tripinnatifidis, rachibus griseo-viridibus, pinnis solutis 2—3-jugis, superioribus sessilibus lanceolatis basi cuneato-angustatis, imis maximis inaequaliter deltoideis petiolatis profunde pinnatifidis, pinnulis late foliaceis dentatis, venis liberis extrorsum flabellatis; soris valde inaequalibus, nec costam nec marginem attingentibus.

Asplenium pumilum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1610. Syn. Fil. 76. Willd. Sp. Plant. V. 308. Hook. Sp. Fil. III. 174. Ettingsh. Farnkr. 136. t. 89. fig. 2. 3. 8., et Aucutt.

Asplenium anthriscifolium Jacq. Coll. II. 102. t. 2. fig. 3—4. Sieb. Hb. Martin. n. 261.

Asplenium heterophyllum Presl, Rel. Haenk. I. 40.

Asplenium minimum Mart. et Gal. Fil. Mex. 55. t. 15. fig. 1.

Asplenium Schimperianum et *tenerrimum* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss.

CAUDEX tenuis suberectus, PALEIS paucis nigris fibrillosis 2—3 lin. longis sursum vestitus. STIPITES caespitosi, graciles, 3—6 poll. longi, glabri, deorsum castaneo-ebeneis, sursum griseo-virides. LAMINA deltoidea, tripinnatifida, 2—4 poll. longa et lata, membranacea, utrinque pallide viridis, glabra vel paullulum griseo-pubescentis. Apex frondis lanceolatus vel deltoideus, pinnatifidus, pinnis erecto-patentibus oblongo-lanceolatis obtusis vel subacutis dentatis. PINNAE solutae 2—3-jugae, superiores lanceolatae, sessiles vel subsessiles, basi cuneatae; imae longe maximae, breviter petiolatae, patentes, inaequaliter deltoideae, postice productae, profunde pinnatifidae. PINNULAE late foliaceae, obovatae vel oblongo-lanceolatae, basi angustato-cuneatae, dentatae. RACHIS griseo-viridis, sursum sensim alata. VENAE extrorsum flabellatae, venulis furcatis cum costâ angulum 30° efformantibus. SORI lineares, valde inaequales, 1—4 lin. longi. INDUSTIUM angustum, membranaceum, cito evanescentis.

Habitat in prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa, in rupibus calcareis: Warming!; et prov. S. Paulo ad Retiro da Lagem: Regnell III. 1470!. E Columbia praeterea ad Mexicum et insulas Antillanas divulgata incolit quoque Abyssiniam et ditionem Zambesiacam (Kirk!). — *Oreas* et Extrabrazil.

21. ASPLENIUM MUCRONATUM PRESL: paleis parvis rigidis subulatis castaneis, stipitibus brevibus nudis griseis, frondibus teneris flaccidis membranaceis elongato-lanceolatis utrinque angustatis bipinnatifidis apice radicanibus, pinnis 30—40-jugis contiguis sessilibus lanceolatis ultra dimidium pinnatifidis, segmentis lanceolatis mucronatis, basi symmetrice subcordatis, inferioribus deflexis sensim decrescentibus, venis liberis pinnatis; soris brevibus nec costam nec marginem attingentibus.

Asplenium mucronatum Presl, Del. Prag. I. 178. Hook. Ic. Plant. t. 917. Sp. Fil. III. 129. Metten. Asplen. 122. Fée, Gen. Fil. 191. Moore, Ind. Fil. II. 147.

Asplenium angustatum Desv. Ann. Lin. Soc. Paris. VI. 274., non Presl.

Asplenium retortum Kaulf. Enum. Fil. 171.

Asplenium lassum Raddi, Syn. Fil. n. 96. Fil. Bras. 37. t. 22 bis. fig. 4.

CAUDEX gracilis, erectus, PALEIS perparvis rigidis subulatis sursum vestitus. STIPITES dense fasciculati, nudi, grisei, 6—18 lin. longi. LAMINA flaccida, tenera, membranacea, pallide viridis, elongato-lanceolata, 12—18 poll. longa, 6—18 lin. lata, utrinque angustata, apice saepe radicans. RACHIS flaccida, tenera, tota alâ angustâ membranaceâ praedita. PINNAE 30—40-jugae, contiguae, sessiles, mediae maximae, patentes, 3—9 lin. longae, 3—4 lin. latae, acutae, ultra dimidium vel deorsum paene ad costam pinnatifidae, segmentis erecto-patentibus lanceolatis mucronatis, basi symmetrice subcordatae, super costam paullum imbricatae; inferiores sensim decrescentes plus minus deflexae. VENAE conspicuae, laxae, utrinque 5—6 pro pinna, in segmentis mediae solum evolutae. SORI oblongi, 1—1½ lin. longi. INDUSTIUM membranaceum, nudum.

Habitat frequens in prov. Rio de Janeiro, e. gr. Serra dos Orgãos atisque locis: Pohl, Martius, Gardner 162!, Raddi, Glaziou 420!, omnesque fere collectores; in prov. S. Catharina: Chamisso, Fritz Müller!, prov. Rio Grande do Sul: Tweedie 567! — *Dryas*, *Napaea*.

22. ASPLENIUM FURCATUM THUNB. paleis copiosis lineari-subulatis obscure purpureis, stipitibus fasciculatis griseo-castaneis vestitis, frondibus coriaceis oblongo-lanceolatis 2—3-pinnatifidis, pinnis 12—15-jugis lanceolatis distincte petiolatis inferioribus vix reductis, pinnulis sessilibus imis rhomboideis, dimidio inferiore integro cuneato, superiore dentato et flabellatim pinnatifido, superioribus ligulato-obovatis subintegris, venis liberis sorisque flabellatis.

Asplenium furcatum Thunb. Prodr. Fl. Cap. 172. Swartz, Syn. Fil. 83. Willd. Sp. Plant. V. 340. Beddome, Fil. South-Ind. t. 145. Ettingsh. Farnkr. t. 87. fig. 2., et Aucutt.

Asplenium praemorsum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1620. Syn. Fil. 83. R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. 150., et Aucutt.

Asplenium canariense Willd. l. c. 339., et Aucutt.

Asplenium nigricans Kunze, Linnaea IX. 69. Presl, Tent. 106. Fée, Gen. Fil. 192.

Tarachia nigricans, geminaria, furcata et *Browniana* Presl, Epim. 79. 80. 260.

Acrostichum filare Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 184., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS rigidis lineari-subulatis purpureo-ebeneis 3—4 lin. longis dense vestitus. STIPITES fasciculati, griseo-castanei, 4—6 poll. longi, PALEIS fibrillosis obscure purpureis patentibus plus minus vestiti. LAMINA coriacea, obscure viridis, utrinque nuda vel subtus paleis iis stipitis similibus paullum furfuracea, oblongo-lanceolata, 6—15 poll. longa, 3—5 poll. lata, 2—3-pinnatifida vel -pinnata. RACHIS stricta, pilis paleaceis obscure purpureis plus minus vestita. PINNAE 12—15-jugae, contiguae, sursum pinnatifidae, deorsum usque ad costam

pinnatae, inferiores distincte petiolatae patentes lanceolato-deltaeidae $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. longae 8—12 lin. latae acutae, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, imae mediis subaequales, superiores sensim decrescentes. PINNULAE 4—5-jugae, laxae, inferiores rhomboideae, dimidio inferiore cuneato integro, superiore inciso-dentato et plus minus flabellatim dissecto, superiores erecto-patentes angustiores extrorsum dentatae, sed aegre dissectae. VENAE conspicuae, contiguae, flabellatae. SORI irregulares, flabellati, angusti, 3—5 lin. longi, haud ad marginem producti. INDUSIUM angustum nudum.

Species cosmopolita in regionibus calidioribus totius orbis disseminata, intra Brasiliae limites observata est in prov. Rio de Janeiro, e. gr. Serra dos Orgãos etc.: Martius, Schott, Gardner 181!, Princ. Newwed, Glaziou 2334!; frequens in prov. Minarum, ad Inficionado, Ouro Preto, Caidas, Conçouhas do Campo: Martius!, Pohl, Langsdorff, Stephan; et in prov. Goyaz: Pohl. — Dryadi-Oreas et Extrabras.

23. ASPLENIUM CUNEATUM LAM. paleis lineari-subulatis, stipitibus fasciculatis vel subsegregatis nudis griseis vel subcastaneis, frondibus chartaceo-herbaceis oblongo-lanceolatis 2—3-pinnatis, pinnis 15—25-jugis lanceolatis distincte petiolatis, inferioribus mediis aequalibus, pinnulis petiolatis inaequaliter lato-rhomboideis, dimidio inferiore cuneato integro, superiore irregulariter dentato saepe ad costam dissecto, venis liberis sorisque subflabellatis.

Asplenium cuneatum Lam. Encycl. II. 309. Swartz, Syn. Fil. 84. Willd. Sp. Plant. V. 344. Schkuhr, Fil. 73. t. 78., et Auctt.

Tarachia cuneata Presl, Epim. 81.

Asplenium crenatum Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 279.

Asplenium cristatum Brackl. Fil. Un. St. Explor. Exped. 161. t. 21. fig. 3., non Wallich.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, PALEIS lineari-subulatis griseo-castaneis dense vestitus. STIPITES fasciculati vel subsegregati, grisei vel subcastanei, nudi, stricti, modice graciles, 4—9 poll. longi. LAMINA chartaceo-herbacea, utrinque nuda, moderate viridis, saepe siccitate grisea, oblongo-lanceolata, 6—18 poll. longa, 3—8 poll. lata. RACHIS nuda, stricta. PINNAE 15—25-jugae, mediae contiguae, subpatentes, distincte petiolatae, lanceolatae, 2—4 poll. longae, 9—18 lin. latae, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, imae mediis aequales, superiores sensim decrescentes. PINNULAE distincte petiolatae, pinnarum maximarum 6—12-jugae, inaequaliter rhomboideae, dimidio inferiore integro cuneato, superiore irregulariter dentato saepe ad costam dissecto, segmentis cuneato-obovatis 1—2 lin. latis. VENAE e basi segmentorum subflabellatae, immersae, contiguae. SORI irregulares, 1—3 lin. longi, marginem paene attingentes.

Species in regionibus calidioribus totius orbis sat frequenter disseminata in Brasilia rarius occurrere videtur. In ditone Rio de Janeiro: Meyen (teste Goldmann in Pl. Meyen. 462), et ad Tanai et Rio Acara prov. Paraënsis: Spruce 8! In Guyana anglica lecta est a Rob. Schomburgk n. 340!, Parker! et Appun n. 373!

24. ASPLENIUM DIVERGENS METT. paleis paucis linearibus griseis, stipitibus fasciculatis nudis griseis, frondibus coriaceis oblongo-lanceolatis tripinnatifidis, pinnis 20—30-jugis lanceolatis distincte petiolatis, inferioribus mediis aequalibus, pinnulis petiolatis inaequaliter anguste rhomboideo-cuneatis flabellatim pinnatifidis extrorsum dentatis, venis liberis sorisque subflabellatis.

Asplenium divergens Metten. Mss. in Herb. Hook.

Asplenium scandicium Hook. Sp. Fil. III. 183. t. 204., non Kaulf.

CAUDEX lignosus suberectus, PALEIS sparsis membranaceis griseis linearibus sursum vestitus. STIPITES fasciculati, 6—12 poll. longi, graciles, erecti, grisei, nudi. LAMINA coriacea, utrinque nuda, obscure viridis, ob-

Polypod.

longo-lanceolata, 12—18 poll. longa, 6—10 poll. lata, 3-pinnatifida vel -pinnata. RACHES graciles, nuda, strictae, griseae. PINNAE 20—30-jugae, contiguae, lanceolatae, adscendentes, mediae 3—6 poll. longae, deorsum 12—18 lin. latae, petioli 3 lin. longis instructae, inferiores mediis subaequales. PINNULAE pinnarum maximarum 12—18-jugae, inaequaliter rhomboideae, adscendentes, breviter petiolatae, pinnatifidae vel deorsum subpinnatae, basi superiore cum rache subparallela vel paullulum cuneato-truncata, inferiore perfecte cuneato-truncata, segmentis contiguis rhomboideis erecto-patentibus extrorsum inciso-dentatis. VENAE graciles, confertae, inconspicuae, subflabellatae. SORI angusti, lineares, 2—3 lin. longi, 4—6 pro pinnulis imis, haud ad marginem producti. INDUSIUM firmum, nudum, angustum, griseum.

Habitat in Serra dos Orgãos, et ad Praia d'Alegre prov. S. Pauli: Burchell 2374! 4671!; in prov. S. Catharinae: Tweedie! — Dryas, Napaea.

25. ASPLENIUM PSEUDONITIDUM RADDI: stipitibus nitidis nudis castaneis, frondibus herbaceis saturate viridibus lanceolato-deltaeidae 2-pinnatis vel 3-pinnatifidis, pinnis 12—15-jugis lanceolatis breviter petiolatis, inferioribus reliquis subaequalibus vel paullulum majoribus, pinnulis inaequaliter deltoideis, inferioribus saepe petiolatis profunde pinnatifidis, segmentis latis obovatis, venis liberis pinnatis laxis; soris crassis linearibus, costam et marginem fugientibus.

Tabula nostra XXVIII. Fig. 5. (apex pinnae).

Asplenium pseudonitidum Raddi, Fil. Bras. 39. t. 55. Fée, Gen. Fil. 191. Metten. Aspl. 127. t. 5. fig. 21. Hook. Sp. Fil. III. 184. (ex parte). Hook. et Baker, Syn. Fil. 217. Etingsh. Farnkr. t. 87. fig. 1.

Asplenium martinicense Raddi, Syn. Fil. n. 98., non Willd.

Asplenium Lindeni Hook. Sp. Fil. III. 185.

Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES stricti, nitidi, castanei, nudi, 8—12 poll. longi. LAMINA herbacea, utrinque nuda, saturate viridis, lanceolato-deltaeidae, 12—24 poll. longa, 8—15 poll. lata. RACHES saturate castaneae, nitidae, nuda. PINNAE 12—15-jugae, erecto-patentes vel subpatentes, lanceolatae, inferiores 6—8 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. latae, imae mediis subaequales vel paullulum majores, sursum profunde pinnatifidae, deorsum perfecte pinnatae. PINNULAE inferiores inaequaliter deltoideae, breviter petiolatae, basi superiore cum rache subparallela, inferiore arcuato-truncata, 6—12 lin. latae, inciso-crenatae vel deorsum pinnatifidae, segmentis obovato-rotundatis extrorsum inciso-crenatis. VENAE laxae, immersae, modice conspicuae, erecto-patentes. SORI 2—3 lin. longi. INDUSIUM membranaceum, griseo-brunneum.

Species quoad rachem, texturam, dissectionem et soros ad A. rhizophorum Sw. accedens.

Habitat in Serra dos Orgãos aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Raddi, Gardner 180!, Glaziou 2474! 2814!, et in prov. S. Catharina: Fritz Müller! — Item incolit Aude Ecuadorenses (Jamesson!) et Novo-Granatenses (Schlim 608!, Lindig 357!). — Dryas et Extrabrasit.

26. ASPLENIUM ANGUSTATUM PRESL: paleis subnullis, stipitibus fasciculatis nudis griseis, frondibus herbaceis laete viridibus utrinque nudis lanceolato-deltaeidae 2—3-pinnatifidis, pinnis 8—12-jugis lanceolatis vel linearibus lanceolatis, inferioribus maximis breviter petiolatis, pinnulis rhomboideis deorsum confluentibus vel petiolatis, venis liberis pinnatis laxis; soris linearibus angustis, inferioribus interdum geminatis, costam attingentibus.

Tabula nostra XXVIII. Fig. 3. (apex frondis).

Asplenium angustatum Presl, Tent. 167. Fée, Gen. Fil. 191. Metten. Asplen. 167. tab. 5. fig. 22. Hook. et Baker, Syn. Fil. 217. Ettingsh. Farnkr. t. 89. fig. 15., non Desvauz nec Blume. *Asplenium attenuatum* Kaulf. Enum. Fil. 174., non R.Br. *Asplenium sulcatum* β. *attenuatum* Moore, Ind. Fil. 171.

CAUDEX suberectus, paleis subnullis. STIPITES fasciculati, 8—12 poll. longi, angulati, grisei, modice graciles, nudī. LAMINA herbacea, utrinque nuda, pallide viridis, 8—12 poll. longa, 6—8 poll. lata, lanceolato-deltaeidea. PINNAE infra apicem pinnatifidum 8—12-jugae, subcontiguae, erecto-patentes, lanceolatae vel lineari-lanceolatae, 3—4 poll. longae, 8—18 lin. latae, pinnatifidae vel deorsum usque ad costam pinnatae, inferiores breviter petiolatae, imae paullo majores. PINNULAE imae rhomboideae, 3—6 lin. latae, dimidio inferiore integro inaequaliter cuneato, superiore extorsum dentato. VENAE erecto-patentes, laxae, modice graciles. SORI lineares, angusti, inferiores 3—4 lin. longi, interdum geminati, e costa vix ad quadrantem anteriorem pinnulae procurrentes. INDUSIUM nudum, griseum, membranaceum.

Var. β. LANGSDORFFII Mart. Mss.

Asplenium angustatum c. Mett. Asplen. l. c.

Asplenium pseudonitidum Hook. Sp. Fil. III. 185. ex parte, non Raddi.

Major, 12—18 poll. longa, magis composita; pinnae mediae et inferiores deltoideae, 3—4 poll. longae, 2—2½ poll. latae, petiolis 4—6 lin. longis instructae; pinnulae distinctae 3—4-jugae, ovato-lanceolatae, 12—18 lin. longae, 7—9 lin. latae, distincte petiolatae, interdum deorsum profunde pinnatifidae.

Forma typica in prov. S. Catharina: Pabst; in prov. Rio de Janeiro, Serra d'Estrella etc.: Martius!, Schott; Bahia, ad Itheos, in via Fetisbertia: Blanchet 2513!, Princ. Neuwied! — Var. β. in prov. S. Paulo, inter Santos et S. Paulo etc.: Burchett 4240! 4705—11!; in Serra dos Orgãos: Gardner 179!; in prov. Minarum: Langsdorff! — Dryas, Oreas.

27. ASPLENIMUM SCANDICINUM KAULF. paleis nigris copiosis fibrillosis, stipitibus subfasciculatis debilibus nudis griseo-stramineis, frondibus herbaceis laete viridibus utrinque nudis lanceolato-deltaeideis 4—5-pinnatifidis, pinnis 8—12-jugis longe petiolatis deltoideis, inferioribus maximis, divisionibus ultimis obovato-cuneatis, laciniis profundis contiguis linearibus erecto-patentibus, venis liberis pinnatis, laciniarum ultimarum mediis solummodo evolutis; soris confertis longis linearibus.

Asplenium scandicinum Kaulf. Enum. Fil. 177. Presl, Tent. 108. Mett. Asplen. 116. Ettingsh. Farnkr. t. 83. fig. 1. t. 84. fig. 6—7. Wawra, Maximil. Reise 196. t. 99., non Hook. *Asplenium adiantoides* Hook. Sp. Fil. III. 186. ex parte.

CAUDEX suberectus, breviter repens, paleis membranaceis subnigris lineari-subulatis 2—3 lin. longis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, 6—9 poll. longi, debiles, nudī, griseo-straminei, modice graciles. LAMINA herbacea, utrinque nuda, pallide viridis, lanceolato-deltaeidea, 4—5-pinnatifida vel -pinnata, 12—24 poll. vel ultra longa, 9—15 poll. lata. RACHIS debilis, nuda, gracilis, griseo-straminea. PINNAE compositae 8—12-jugae, alternae, erecto-patentes, deltoideae, longe-petiolatae, inferiores 4—8 poll. longae, 2—6 poll. latae, imae maximae petiolis 12—18 lin. longis instructae. PINNULAE contiguae, lanceolato-deltaeideae, longe petiolatae, inferiores maximae; divisiones ultimae petiolatae, inaequaliter rhomboideae, 1½—3 lin. latae, flabellatim pinnatifidae, laciniis linearibus erecto-patentibus. VENAE graciles, immersae, erecto-patentes. SORI copiosi, inferiores 3—4 lin. longi. INDUSIUM nudum, griseum, membranaceum.

Var. β. GARDNERIANUM Baker.

Asplenium adiantoides Raddi, Fil. Bras. 40. t. 51. Metten. Asplen. 127. t. 5. fig. 20. Hook. Sp. Fil. III. 186., ex parte.

Raches nitide castaneae vel subebeneae, lamina utrinque saturate viridis, petioli pinnarum et pinnularum breviores, sori pauciores breviores, inferiores 1½—2 lin. longi.

Frequens in Brasiliae provinciis austro-orientibus itemque Jamaicae incolae. Forma typica in prov. S. Catharinae: Chamisso, Macrae!, Forbes!, Beechey!, Fritz Müller!; prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos, Petropolis etc.: Raddi, Burchett 3508!, Gardner 178!, Schott, Glaziou 928! 1230!, Wawra et Maly 401, et alii. — Var. β. in prov. S. Paulo: Bowie et Cunningham!; in Serra dos Orgãos: Gardner 177!, Glaziou 2338! 2813!; Minas Gerais: Raddi. — Dryadi-Oreas et Extrabasil.

28. ASPLENIMUM CICUTARIUM SWARTZ: paleis griseo-brunneis lineari-subulatis, stipitibus griseis nudis dense fasciculatis, frondibus oblongo-lanceolatis herbaceis gramineo-viridibus 3—4-pinnatifidis e medio utrinque decrescentibus, rachibus griseis teretibus exalatis, pinnis 20—30-jugis contiguis sessilibus lanceolatis, pinnulis sessilibus contiguis inaequaliter deltoideis usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, segmentis superioribus linearibus simplicibus, inferioribus lateris superioris flabellatim pinnatifidis, venis laciniarum medianis solummodo evolutis; soris linearibus nec costam nec marginem attingentibus.

Asplenium cicutarium Swartz, Prodr. Fl. Ind. Occ. 130. (excl. syn.). Presl, Tent. 108. Kunze, Linnaea IX. 71. Metten. Fil. Hort. Lips. 71. t. 13. fig. 3. Asplen. 116. Hook. Sp. Fil. III. 198. Lowe, Ferns 5. t. 20. Ettingsh. Farnkr. t. 84. fig. 5. 10., et Auctt.

Darea cicutaria Smith, Mem. Acad. Taurin. V. 409. Willd. Sp. V. 300.

Caenopteris cicutaria Thunb. Nov. Act. Petrop. IX. 158. t. C. fig. 1. Swartz, Syn. Fil. 88.

Asplenium cristatum Lam. Encycl. II. 310.

Asplenium dissectum Link, Hort. Berol. II. 68.

Athyrium Haenkeanum Presl Tent. 98., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus erectus, paleis firmis lineari-subulatis griseo-brunneis sursum dense vestitus. STIPITES dense fasciculati, erecti, modice graciles, nudī, grisei, 3—12 poll. longi. LAMINA herbacea, utrinque nuda, 9—18 poll. longa, 4—6 poll. lata. RACHES griseae, nuda, subteretes, exalatae. PINNAE compositae 20—30-jugae, sessiles, contiguae, lanceolatae, subpatentes, mediae 2—3 poll. longae, 6—9 lin. latae. PINNULAE pinnarum maximarum 10—12-jugae, 3—4 lin. longae, 2—2½ lin. latae, basi superiore cum rache prorsus contigua, inferiore cuneato-truncata, laciniis superioribus erecto-patentibus linearibus simplicibus, inferioribus lateris superioris flabellatim pinnatifidis. SORI in laciniis solitarii, ¾—1 lin. longi. INDUSIUM membranaceum, nudum, pallidum.

E Peruvia et Bolivia usque in Mexico et Cubam divulgata, Abyssiniam quoque, Africae montes Cameroon, terram Natalensem, insulam Fernando Po inhabitans, intra Brasiliam lecta est frequens in prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Schott, Martius, Karwinski aliique; in Minas Gerais: Freyreiss, e. gr. ad Lagoa Santa in rupibus calcareis: Warming!; in prov. Bahia, circa Ilheus et ad Almeida: Blanchet!, Princ. Neuwied! — Dryadi-Oreas et Extrabasil.

(29.) ASPLENIMUM GIBERTIANUM HOOK. paleis griseo-nigris lineari-subulatis, stipitibus brevissimis complanatis castaneis dense fasciculatis, frondibus lanceolatis bi—tripinnatifidis herbaceis gramineo-viridibus e medio frondis utrinque sensim decrescentibus, rachibus complanatis anguste alatis, pinnis 20—25-jugis sessilibus confertis inaequaliter lanceolatis profunde pinnatifidis, venis laciniarum solitariis; soris lineari-oblongis ultra dimidiam longitudinis laciniarum non attingentibus.

Asplenium Gibertianum Hook. II. Cent. Ferns t. 22. Hook. Sp. Fil. III. 199. Hook. et Baker, Syn. Fil. 219.

Asplenium inciso-alatum Moore, Ind. Fil. 137.

CAUDEX crassus, herbaceus, erectus, PALEIS griseo-nigris membranaceis lineari-subulatis 2—3 lin. longis sursum dense vestitus. STIPITES dense fasciculati, 4—8 lin. longi, complanati, castanei. LAMINA herbacea, gramineo-vididis, utrinque nuda, lanceolata, 5—6 poll. longa, 10—12 lin. lata, apice nudo paullulum producto radicans. RACHIS primaria pallide viridis, insigniter complanata, tota utrinque alia angustâ herbaceâ instructa. PINNAE 20—24-jugae, contiguæ, sessiles, e medio frondis utrinque sensim decrescentes, mediae 5—6 lin. longae, deorsum $2\frac{1}{2}$ —3 lin. latae, basi superiore recta cum rache contigua, inferiore cuneato-truncata, lacinis superioribus erecto-patentibus linearibus aristatis, imis lateris superioris flabellatim inciso-pinnatifidis. VENAE inconspicuae, immersae. SORI lineari-oblongi, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. longi. INDUSIUM angustum, pallidum, membranaceum.

Habitat ad Assumpcion Paraguariae: Gibert 28!, forte etiam in Brasilia contermina.

§ 2. ATHYRIUM.

30. ASPLENIUM DECURTATUM LINK: paleis ovatis membranaceis, stipitibus nudis fasciculatis substramineis, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis utrinque viridibus et praecipue ad costas breviter griseo-pubescentibus, pinnis 24—30-jugis lineari-ligulatis sessilibus contiguis profunde pinnatifidis vel deorsum pinnatis, pinnulis ligulatis 20—30-jugis obtusis subintegris contiguis paullulum falcatis, venis pinnularum regulariter pinnatis, venulis simplicibus 6—7-jugis; soris medianis.

Tabula nostra XLV. Fig. I. (analysis).

Asplenium decurtatum Kunze, *Linnaea* XXIII. 233. Link, *Sp. Fil.* 94. Metten, *Fil. Hort. Lips.* 77. t. 13. fig. 17—18. *Asplen.* 201. Lowe, *Ferns* 5. t. 45. Hook, *Sp. Fil.* III. 226. *Athyrium decurtatum* Presl, *Tent.* 98. Fée, *Gen. Fil.* 186. Moore, *Ind. Fil.* 181.

Asplenium pubescens Houlst. et Moore, *Gard. Mag. Bot.* III. 262.

Diplazium pubescens Lowe, *Ferns* 5. t. 52.

CAUDEX subarborescens, erectus, spithameus, sursum PALEIS ovatis teneris pallide brunneis vestitus. STIPITES erecti, fasciculati, nudi vel deorsum paleacei, substraminei, modice graciles, 12—15 poll. longi. LAMINA supra gramineo-vididis, infra pallidior, 2—3 pedes longa, 10—15 poll. lata. RACHES stramineae, nuda, complanatae. PINNAE compositae 24—30-jugae, mediae 6—8 poll. longae, 9—12 lin. latae, usque ad alam costae angustam pinnatifidae vel deorsum perfecte pinnatae, imae reductae; PINNULIS 20—30-jugis contiguis ligulatis obtusis subintegris $1\frac{1}{2}$ lin. latis paullulum falcatis, inferioribus cum costa primaria contiguis haud reductis. VENULAE erecto-patentes, 7—8-jugae, simplices. SORI oblongi, $\frac{1}{2}$ lin. longi, neque costam nec marginem attingentes, 6—7-jugi, apice saepe decurvati. INDUSIUM membranaceum, pallidum.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas, in stagno sylvae primaevalis: Lindberg 620! — Species in hortis Europae jam ex longinquo culta, verisimiliter aliis quoque locis ac indicato obvia, quos tamen ab auctoribus haud notatos habemus.

§ 3. DIPLAZIUM.

31. ASPLENIUM PLANTAGINEUM LINN. paleis parvis linearibus, stipitibus fasciculatis nudis griseis, frondibus chartaceo-herbaceis lanceolatis simplicissimis acuminatis subintegerrimis vel leviter serratis, venulis fasciculorum 2—3-jugis; soris linearibus, exterioribus longissimis.

Tabula nostra XXVIII. Fig. 7. 8. (frondes).

Asplenium plantagineum Linn. *Sp. Plant.* 1537. *Lam. Encycl.* II. 303. Metten, *Fil. Hort. Lips.* 74. *Asplen.* 161. Hook, *Sp. Fil.* III. 237. *Ettingsh. Farnkr.* t. 93. fig. 3. 4.

Diplazium plantagineum Swartz, *Syn. Fil.* 91. t. 2. fig. 4. Schkuhr, *Fil.* t. 85. Willd. *Sp. Plant.* V. 351., et *Auctt.*

Diplazium repens Raddi, *Syn. Fil.* 103.

Diplazium acuminatum Raddi, *Fil. Bras.* 41. t. 57. fig. 2. Link, *Hort. Berol.* II. 70.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS subnigris 1 lin. longis sursum vestitus. STIPITES 6—9 poll. longi, stricti, firmi. LAMINA utrinque nuda, supra saturate viridis, infra pallidior, 6—9 poll. longa, 2— $2\frac{1}{2}$ poll. lata, basi rotundata vel subcuneata. VENAE pinnatae, graciles, modice laxae; VENULAE extorsum subparallelae, primae superne e venâ medianâ exeuntes, exteriores inferne arcuatae, mediae angulo 60—70° a costa abeuntes. SORI irregulariter secundum venas decurrentes, angusti, 3—12 lin. longi, e costâ fere ad marginem attingentes. INDUSIUM nudum, membranaceum, demum brunneum.

Habitat ad Ilheos Bahiae: Luschnath! (Mart. *Hb. Fl. Bras.* n. 336!), Blanchet 2262!; in Serra dos Orgãos aliisque locis prov. Rio de Janeiro, in sylvis montosis, locis umbrosissimis: Raddi!, Gardner 30!, Martius, Schott, *Glaziou* 2347! etc.; in prov. Minas ad Lagoa Santa: Warming!, et in prov. S. Catharina: Fritsch Müller! — E Peruvia praeterea usque in Mexicum et insulas Antillanas divulgatum.

32. ASPLENIUM RIEDELIANUM BONG. paleis parvis brunneis linearibus, stipitibus fasciculatis nudis griseo-brunneis, frondibus papyraceo-herbaceis lanceolato-deltaeideis, sursum ultra dimidium pinnatifidis, in triente vel quadrante inferiore pinnatis, pinnis lanceolatis denticulatis, imis longe maximis breviter petiolatis, venulis fasciculorum maximorum bijugis, soris linearibus.

Tabula nostra LXI. (habitus et analysis).

Asplenium Riedelianum Bongard Mss. Kuhn in *Linnaea* XXXVI. 102.

Diplazium Riedelianum Kunze Mss.

CAUDEX erectus, sursum PALEIS vestitus. STIPITES 8—12 poll. longi, stricti, sursum nudi, basi paullulum paleacei. LAMINA utrinque nuda, supra saturate viridis, infra pallidior, 9—12 poll. longa, deorsum 5—6 poll. lata. Pars frondis pinnatifida lanceolata, 5—6 poll. longa, deorsum 2—3 poll. lata, medio circiter ad dimidium latitudinem, basi ad costam anguste alatum dissecta, lacinis lanceolatis subpatentibus. PINNAE solutae (partis inferioris) 2—3-jugae, subcontiguæ, imae multo maximae, falcato-adscendentes, 3—4 poll. longae, 10—12 lin. latae, sensim acuminatae, e basi subsymmetricae rotundata breviter petiolatae. VENAE immersae, distinctae; VENULAE fasciculorum maximorum 3—4, extorsum subparallelae, exteriores deorsum arcuatae. SORI venularum inarum 3—5 lin. longi, saepe geminati. INDUSIUM latum, nudum, membranaceum.

Habitat in prov. S. Catharinae: Fritsch Müller!; Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming!; loco nobis incognito Brasiliae: Riedel. — Oreas, Napaea.

33. ASPLENIUM LECHLERI METTEN. paleis linearibus castaneis, stipitibus segregatis validis stramineis praeter basin nudis, frondibus coriaceis oblongo-rhomboides simpliciter pinnatis, pinnis 4—6-jugis laxis lanceolato-ligulatis subintegris, superioribus ad rachem adnatis, inferioribus solutis breviter petiolatis, venis confertis parallelis simplicibus vel basi furcatis; soris copiosis e costâ paene ad marginem currentibus.

Asplenium Lechleri Metten, *Fil. Lechler.* 16. t. 2. fig. 10. *Asplen.* 170. Hook, *Sp. Fil.* III. 244. Hook, et Baker, *Syn. Fil.* 231.

Diplazium Lechleri Moore, *Ind. Fil.* 331.

CAUDEX repens, epigeus (teste APPUN). PALEAE 6—9 lin. longae. STIPITES pro genere validi, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes vel ultra longi, stricti, basi castanei et paullulum paleacei, sursum nudi straminei. LAMINA utrinque nuda, obscure viridis, oblongo-rhomboides, 2—3 pedes longa, $1\frac{1}{2}$ —2

pedes lata, imparipinnata. PINNAE laterales 4—6, ligulato-lanceolatae, 6—10 poll. longae, 1½—2 poll. latae, erecto-patentes, laxae, acuminatae, subintegerrimae, superiores ad rachem plus minus adnatae, inferiores reliquis subaequales, e basi subcuneata breviter petiolatae, 2—2½ poll. distantes, terminalis reliquis similis. COSTAE pinnarum validae stramineae; VENAE graciles, immersae, subpatentes. SORI copiosi, plerumque geminati, 9—12 lin. longi. INDUSIUM nudum, membranaceum, angustum, demum brunneum.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad Barra do Rio Negro, nunc Manaos: Spruce 3832!; in Guiana britannica: Appun 1861, et in Peruvia: Lechler 2269!, Spruce 4687!. — Najas et Extrabrazil.

34. ASPLENIUM CELTIDIFOLIUM METT. paleis castaneis linearibus, stipitibus fasciculatis griseo-brunneis plus minus paleaceis, frondibus subcoriaceis oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis apice pinnatifidis, pinnis 12—24-jugis subpatentibus ligulato-lanceolatis acuminatis subintegris vel paullulum pinnatifidis, basi latiore inaequaliter truncata vel subcordata, inferioribus breviter petiolatis, venis pinnatis, venulis fasciculorum 2—5-jugis; soris longe linearibus.

Tabula nostra XXVIII. Fig. 1—2. (pinnae) et XLV. Fig. IIa. (analysis).

Asplenium celtidifolium Metten. Fil. Hort. Lips. 75. t. 12. fig. 3—4. Asplen. 178. Hook. Sp. Fil. III. 240. Hook. et Baker, Syn. Fil. 216. Ettingsh. Farnkr. t. 93. fig. 8. t. 97. fig. 1.

Diplazium celtidifolium Kunze, Bot. Zeitg. III. 285. Linnaea XXIII. 309. Klotzsch, Linnaea XX. 359. Moore, Ind. Fil. 324.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS membranaceis 4—6 lin. longis sursum dense vestitus. STIPITES firmi, stricti, grisei vel griseo-brunnei, 12—18 poll. longi. LAMINA utrinque nuda, supra saturate viridis, infra pallidior, 2—4 pedes longa, 12—18 poll. lata, praeter apicem pinnatifidum tota simpliciter pinnata. PINNAE inferiores 6—9 poll. longae, 1½—2 poll. latae, acuminatae, deorsum interdum ad dimidium pinnatifidae, basi saepe plus minus auriculatim dilatatae, superiores versus apicem frondis deltoideum pinnatifidum sensim decrescentes, ad rachem plus minus adnatae, imae mediis subaequales breviter petiolatae. VENAE immersae, graciles; VENULIS fasciculorum 2—5-jugis, parallelis, inferioribus deorsum arcuatis. SORI lineares, angusti, copiose geminati, e costâ paene ad marginem procurrentes, inferiores 6—9 lin. longi. INDUSIUM angustum, nudum, membranaceum.

Crescit circa Rio de Janeiro: Glaziou 424! 425! 2346!, Bowie et Cunningham!, et prope Bahiam: Blanchet 3939!. Praeterea in Columbia insulisque Antillanis. — Dryas et Extrabrazil.

35. ASPLENIUM SYLVATICUM PRESL: paleis castaneis linearibus, stipitibus fasciculatis stramineo-brunneis basi excepta nudis, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis praeter apicem pinnatifidum totis simpliciter pinnatis, pinnis 12—20-jugis ligulato-lanceolatis acuminatis paullulum pinnatifidis e basi aequali symmetrice truncata breviter petiolatis, venulis fasciculorum 4—6-jugis; soris linearibus.

Asplenium sylvaticum Presl, Rel. Haenk. I. 42. Metten. Fil. Hort. Lips. 74. Asplen. 179. Hook. Sp. Fil. III. 248. Hook. et Baker, Syn. Fil. 232.

Diplazium sylvaticum Swartz, Syn. Fil. 92. Mart. Herb. Fl. Bras. n. 335. Beddome, Fil. South-Ind. t. 161. Love, Ferns. 5. t. 49.

Callipteris sylvatica Bory, Voy. I. 282.

Asplenium mutilum Mett. Asplen. 180. Hook. Sp. Fil. III. 248.

Diplazium mutilum Kunze in Regensb. Flora 1839. I. 37. Fée, Gen. Fil. 214. Moore, Ind. Fil. 333.

Asplenium Ottonis Hook. Sp. Fil. III. 343., excl. syn. A. rhoifolii Mett.

Diplazium Ottonis Klotzsch, Linnaea XX. 360.

Diplazium Hilsenbergianum Presl, Epim. 84.

Asplenium elatum Mett. Aspl. 180.

Diplazium elatum Fée, Gen. Fil. 214.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS 4—6 lin. longis sursum vestitus. STIPITES erecti, stricti, sursum stramineo-brunnei, basi castanei paleacei. LAMINA utrinque nuda, supra plene viridis, infra pallidior, 1½—2 pedes longa, 8—12 poll. lata. PINNAE paullulum ascendentes, contiguae vel sublaevae, 4—7 poll. longae, 8—12 lin. latae, marginibus interdum deorsum ad dimidium latitudinem pinnatifidis, superiores sessiles, versus apicem deltoideum frondis sensim decrescentes, imae reliquis subaequales. VENAE pinnatae, graciles, modice conspicuae, VENULIS fasciculorum parallelis, inferioribus basi arcuatis. SORI angusti, lineares, paene marginem attingentes, exteriores 4—6 lin. longi. INDUSIUM membranaceum, nudum.

Species cosmopolita per regiones tropicas utriusque orbis divulgata in Brasilia observata est in prov. Rio de Janeiro ad montes Serra Tingua: Schott, et in prov. Bahiae ad Ilheus alibique: Luschath! (Mart. Herb. Fl. Bras. n. 335!), Blanchet 2509! 2474!. — Dryas et Extrabrazil.

36. ASPLENIUM LINDBERGHII METTEN. paleis lanceolatis obscure castaneis, stipitibus fasciculatis nudis subcastaneis, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis solutis 10—20-jugis erecto-patentibus subsessilibus ligulato-lanceolatis usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, basi aequali recte truncata, pinnulis contiguis oblongis denticulatis, venulis 8—12-jugis; soris lineari-oblongis aegre ultra dimidium laciniarum latitudinem attingentibus, indusiis cito evanescentibus.

Asplenium Lindbergii Mett. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 236. Hook. et Baker, Syn. Fil. 236.

CAUDEX erectus, lignosus, PALEIS 3—4 lin. longis sursum vestitus STIPITES erecti, 10—15 poll. longi, praeter basia paullulum paleaceum nudum. LAMINA utrinque nuda, supra saturate viridis, infra pallidior, 1½—2 pedes longa, 10—15 poll. lata, praeter apicem simpliciter pinnatifidum tota bipinnatifida. PINNAE subcontiguae, mediae 5—8 poll. longae, 12—15 lin. latae, acuminatae, marginibus in medio frondis ultra dimidium, deorsum usque ad alam 1—1½ lin. latam pinnatifidis, laciniis oblongis paullulum falcatis denticulatis 3—4 lin. latis, basi aequali utrinque recte truncata, haud vel perbreve petiolata; pinnae imae mediis aequales. VENAE in laciniis pinnatae, modice conspicuae; VENULAE fasciculorum imorum 8—12-jugae, parallelae, omnes simplices. SORI 1—2 lin. longi. INDUSIUM tenuissimum, angustum.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas in sylvis primaevis: Lindberg 543!. Item incolit Novam Granatam et Mexicum. — Oreas et Extrabrazil.

37. ASPLENIUM SHEPHERDI SPRENG. paleis lanceolatis obscure castaneis, stipitibus fasciculatis nudis griseo-stramineis, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis solutis 10—15-jugis subpatentibus breviter petiolatis lanceolatis ad dimidium vel infra saepe usque ad costam anguste alatum pinnatifidis, basi inaequaliter antice recto- postice cuneato-truncata, pinnulis oblongo-lanceolatis vel deltoideis denticulatis, venulis 4—6-jugis; soris linearibus costam et marginem aegre attingentibus, indusiis subpersistentibus.

Tabula nostra XXVII. Fig. 13—16. (pinnae) et XLV. Fig. IIb. (analysis).

Asplenium Shepherdii Spreng. *Nova Acta Nat. Cur.* X. (1820.) 231. t. 17. fig. 5—6. *Syst. Veg.* IV. 82. *Metten. Fil. Hort. Lips.* 75. *Asplen.* 164. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 233. *Ettingsh. Farnkr.* 148. t. 95. fig. 1.

Asplenium striatum Linn. in *Herb. Hook. Sp. Fil.* III. 245., non Swartz nec Metten.

Diplazium Shepherdii Presl, *Tent.* 114. *Link, Hort. Berol.* II. 70. *Mart. Hb. Fl. Bras.* n. 344.

Asplenium ambiguum Raddi, *Fil. Bras.* 38. t. 54. 54 bis.

Diplazium ambiguum J. Smith, *Cat. Ferns.* 47. *Lowe, Ferns* 5. t. 47., non Raddi.

Diplazium coarctatum Link, *Hort. Berol.* II. 69. *Kunze, Linnæa* XXIII. 250. *Metten. Fil. Hort. Lips.* 75.

Diplazium denticulosum Gaud. *Freyc. Voy.* 322.

Asplenium gradatum Vell. *Fl. Flum.* XI. t. 105., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS membranaceis 2—3 lin. longis sursum vestitus. STIPITES erecti, stricti, sursum nudi griseo-straminei, basi paullulum paleacei. LAMINA utrinque nuda, superne gramineo-viridis, subtus pallidior, oblongo-lanceolata, 12—24 poll. longa, 8—12 poll. lata, praeter apicem pinnatifidum bipinnatifida. PINNAE solutae 10—15-jugae, subpatentes, lanceolatae, mediae 4—6 poll. longae, deorsum 12—15 lin. latae, in apicem acuminatum sensim angustatae, lacinis contiguis oblongo-deltoides vel lanceolatis 4—5 lin. latis paullulum falcatis, basi breviter petiolatae, latere ejus antico cum rache subparallelo saepe auriculato, postico cuneato-truncato, lacinis imis reductis; pinnae imae mediis aequalae, superiores decrescentes saepe subintegrae. VENAE modice conspicuae, in lacinis pinnatae; VENULAE fasciculorum imorum 4—6-jugae, inferiores interdum furcatae. SORI lineares, saepe geminati, inferiores 3—4 lin. longi. INDUSIUM angustum, membranaceum, nudum.

Inde e Mexico insulis Antillanis in Peruviam, Guyanam gallicam (Leprieur!), et Brasiliam usque fere ad limites ejus australes disseminatum. In prov. S. Catharina: Fritz Müller!; ad S. Sebastião prov. S. Pauli: Fox!; prov. Rio de Janeiro, in sylvarum recessibus densis umbrosis frequens, itemque in Bahiensi, ad capitalem, Ilheus etc.: Raddi, Langsdorff!, Gardner 46! 169!, Princ. Neuwied!, Setto!, Luschnath! (*Mart. Hb. Fl. Bras.* n. 344!), Blanchet 2231, 2476!, Glaziou 1775! 2343! aliique collectores; ad Para: Martius; et in sylvis prov. do Alto Amazonas: Spruce 3911. — Vaga et Extrabras.

38. ASPLENUM BLANCHETII METT. stipitibus lividis, frondibus membranaceis glabris lanceolatis bipinnatifidis, pinnis lanceolato-oblongis petiolatis basi cordatis, infimis paullulum reductis, pinnulis abbreviatis, infimis maximis, venulis pinnularum 3—4-jugis, infimis furcatis; soris linearibus costam marginemque fere attingentibus.

Asplenium Blanchetii Mett. ex Kuhn in *Linnæa* XXXVI. 104.

„FOLIA membranacea, siccitate opaco-viridia, glabra; petiolus (STIPES nob.) 7 poll. longus, cum rachi lividus. LAMINA ultra-petalis, sublanceolata, pinnatisecta, apice pinnatifida; segmenta (PINNAE nob.) laxè disposita patentia, inferiora manifestius petiolata, 3 poll. longa, lanceolato-lanceolata, media brevius petiolata, 4 poll. longa, 10—11 lin. lata, e basi cordata oblonga sensim attenuata, acuminata, pinnatifida, apice argute serrata. Lobi (PINNULAE nob.) abbreviati, truncati, denticulati, basales maximi; COSTULAE sub angulo 70° decurrentes; Nervi utrinque 3—4, plerumque indivisi, supra sinum marginem adcentes vel bini antici infimi secus sinum confluentes, loborum basium furcati. SORI elongato-lineares, antici infimi diplazioidei, sinus non attingentes, superiores asplenoidei, e costula fere ad marginem extensi; INDUSIUM membranaceum, fuscum“ (ex KUHN l. c.).

Habitat ad Bahiam: Blanchet 2474. — Dryas.

Polypod.

39. ASPLENUM CRENULATUM BAKER: caudice subarboreo, paleis castaneis lanceolatis, stipitibus erectis nudis griseis vel subcastaneis, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatis, pinnis lanceolatis basi utrinque recte truncatis, inferioribus maximis petiolatis inferne plerumque usque ad costam pinnatis, mediis profunde pinnatifidis, pinnulis contiguis ligulato-lanceolatis inciso-crenatis, venulis pinnularum 10—15-jugis, inferioribus furcatis; soris linearibus costam marginemque fere attingentibus.

Asplenium crenulatum Baker in *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 236., non Presl.

Diplazium crenulatum et amplum Liebm. *Mex. Bregm.* 102. 104.

Asplenium striatum Metten. *Asplen.* 186. *Griseb. Fl. Brit. West-Ind. Isl.* 686., non Linn. herb., nec *Hook. Sp. Fil.* III. 245.

CAUDEX erectus interdum 6—12 pedes altitudine attingens, PALEIS membranaceis saturate castaneis 3—4 lin. longis sursum vestitus. STIPITES stricti, 12—18 poll. longi, praeter basin paullulum paleaceam nudi. LAMINA utrinque nuda, saturate viridis, 2—3 pedes longa, 10—18 poll. lata, medio bipinnatifida, basi bipinnata. PINNAE solutae 15—20-jugae, lanceolatae, subcontiguae; inferiores maximae, 6—9 poll. longae, 2—3 poll. latae, distincte petiolatae, acuminatae, deorsum perfecte pinnatae, PINNULIS oblongo-ligulatis inciso-dentatis 3—4 lin. latis, basi utrinque aequaliter recteque truncatis. VENAE pinnatae, modice conspicuae; VENULAE pinnularum imarum 12—15-jugae, imae furcatae. SORI 3—4 lin. longi. INDUSIUM nudum, angustum, membranaceum.

Habitat circa Rio de Janeiro: Glaziou 415! 1776!, et in prov. Minas Geraes ad Caldas: Regnell III. 1473 ex parte!. Praeterea e Columbia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Dryadi-Oreas et Extrabras.

40. ASPLENUM RADICANS SCHUKER: caudice subarboreo, paleis castaneis lineari-lanceolatis, stipitibus erectis validis griseo-stramineis deorsum paleaceis, frondibus magnis herbaceis deltoideis tripinnatifidis, rachibus interdum pubescentibus, pinnis inferioribus maximis oblongo-lanceolatis petiolatis, pinnulis 12—20-jugis ligulato-lanceolatis subsessilibus basi aequilateraliter recteque truncatis plus minus pinnatifidis, segmentis oblongis contiguis denticulatis, venis pinnatis, venulis simplicibus 4—6-jugis; soris linearibus, e costâ paene ad marginem currentibus.

Tabula nostra XXVIII. Fig. VI. (pinnula) et LXX. Fig. III. (caudex).

Asplenium radicans Schuker, *Crypt.* 70. t. 76., non Swartz. *Willd. Sp. Plant.* V. 337. (excl. syn.). *Griseb. Fl. Brit. W.-Ind.* 686. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 241.

Diplazium radicans Desv. *Ann. Linn. Soc. Par.* VI. 281. *Presl, Tent.* 114.

Asplenium dubium Metten. *Asplen.* 184. *Hook. Sp. Fil.* III. 261. (ex parte). *Ettingsh. Farnkr.* t. 92. fig. 13. t. 98. fig. 5.

Asplenium expansum Presl, *Rel. Haenk.* I. 46.

Diplazium expansum Willd. *Sp. Plant.* V. 345. *Presl, Tent.* 114. *Mart. Hb. Fl. Bras.* n. 337., et *Auctt.*

Diplazium Haenkeanum Presl, *Tent. Pter.* 114.

Asplenium obtusum Mett. *Asplen.* 187.

Diplazium subalatum Heward *Mss.*

CAUDEX 6—12 pedes attingens. PALEAE membranaceae, 4—6 lin. longae. STIPITES 12—18 poll. longi, stricti, validi, griseo-straminei, deorsum paleacei. LAMINA utrinque nuda vel infra paullulum pubescens, gramineo-viridis, deltoidea, 4—6 pedes longa, 2—3 pedes lata, tripinnatifida. RACHES strictae, substramineae, nuda vel paullulum pubescentes. PINNAE patentes, inferiores maximae, petiolatae, oblongo-lanceolatae, 12—18 poll. longae, 6—8 poll. latae. PINNULAE ligulato-lanceolatae, pinnarum maximarum 12—20-jugae, mediae 3—4 poll. longae, 8—10 lin. latae, subpatentes, contiguae, sessiles vel inferiores breviter petiolatae, acuminatae,

basi aequilaterali recte truncata, lateribus plus minus saepe ultra dimidiam pinnatifidis, segmentis oblongis contiguis denticulatis 3—4 lin. latis. VENAE pinnatae, modice conspicuae; VENULAE segmentorum imorum 5—6-jugae, omnes simplices. SORI lineares, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longi. INDUSIUM angustum, nudum, membranaceum.

Var. β . AMBIGUUM Baker.

Diplazium ambiguum Raddi, *Fil. Brus.* 41. t. 58. Spreng. *Syst.* V. 69. Presl, *Tent. Pter.* 114., et Auctt.

Pinnulae breviores, angustiores ($1\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, 6—8 lin. latae), deorsum aegre ultra quartam vel tertiam latitudinis pinnatifidae, venulis 3—4-jugis, inferioribus magis ascendentibus.

E Mexico insulisque Antillanis in Peruviam et per totam fere Brasiliam disseminatum. Forma typica in prov. S. Catharina: Fritz Müller; et cum varietate in prov. Rio de Janeiro sylvis aboriginibus Serra do Mar, Serra dos Orgãos, Serra Tingua etc.: Raddi, Burchell 3345! 3839!, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 337!, Gardner 45! (forma pinnulis cuspidatis = Diplaz. longicuspae Kunze Mss.), 5937!, Glaziou 926—7! 1673—5! 1777! 2330—2!; Pohl!; prope Ilheos, in via Felisbertia atibique prov. Bahiensis: Princ. Neuwied!, Luschnath! aliique collectores; denique in prov. Minas Geraës ad Caldas: Regnell III. 1473 ex parte!, et ad Lagoa Santa: Warming!.

41. ASPLENUM GLAZIOVII BAKER: frondibus magnis herbaceis quadripinnatifidis glabris, rachibus nudis griseo-stramineis, pinnis ovato-lanceolatis petiolatis, pinnulis 18—20-jugis lanceolatis petiolatis ad costam peranguste alatum dissectis, segmentis 10—12-jugis oblongo-lanceolatis obtusis sessilibus basi utrinque cuneatis profunde inciso-pinnatifidis, laciniis ligulatis confertis subintegris erecto-patentibus, venis liberis pinnatis; soris frequenter diplazioideis in laciniis plerumque solitariis, e costa ad basin sinuum ultimorum currentibus.

Caudicem et paleas non vidi. LAMINA utrinque omnino nuda, supra saturate viridis, infra pallidior nitidior, deltoidea?, deorsum 3—4 pedes lata. RACHES primariae et secundariae rectae, griseo-stramineae, omnino nuda. PINNAE inferiores subpatentes, late ovato-lanceolatae, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes longae, 9—10 poll. latae, petiolo 6—10 lin. longo instructae. PINNULAE compositae (infra apicem pinnae pinnatifidum) 18—20-jugae, subcontiguae, superiores sessiles, inferiores subpatentes distincte petiolatae, 4—5 poll. longae, 14—15 lin. latae, basi subhorizontaliter truncatae, imae mediis paullulum minores. SEGMENTA oblongo-lanceolata, 10—12-juga (summis integris exclusis), obtusa, maxima 6—8 lin. longa, 3—4 lin. lata, sublaxa, subpatentia, ad dimidiam latitudinem pinnatifida, laciniis 6—8-jugis erecto-patentibus confertis subintegris, basi utrinque (antice paullo argutius) cuneatis. VENAE in laciniis superioribus segmentorum furcatae, in inferioribus subpinnatae; VENULIS erecto-

patentibus 1—2-jugis. SORI e costa segmentorum egredientes, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longi, saepe ad venulas anticatas inferiores laciniarum restricti, venula ima postica laciniarum interdum soro parvo adhuc instructa.

Cum *A. gracilescente* Mett., *Sandwichiano* Mett. et *divisissimo* Baker gradu dissectionis frondium congruit.

Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou 2061! — Dryas.

§ 4. HEMIDICTYUM.

42. ASPLENUM MARGINATUM LINN. caudice subarboresco, stiptibus erectis validis brunneo-stramineis basi paleaceis, frondibus magnis tenuiter herbaceis ovato-deltoideis simpliciter pinnatis, pinnis magnis oppositis sessilibus ligulato-lanceolatis integris basi cordatis, venulis in triente pinnae exteriori intra venam distincte intramarginalem anastomosantibus; soris longe linearibus, ad venularum partem indivisam restrictis.

Tabula nostra XLV. Fig. III. (analysis).

Plumier *Fil.* t. 88.

Asplenium marginatum Linn. *Sp. Plant.* 1539. Swartz, *Syn. Fil.* 76. Willd. *Sp. Plant.* V. 309. Hook. *Sp. Fil.* III. 271. *Fil. Exot.* t. 63. Vell. *Fl. Flum.* XI. t. 101. Mart. *Hb. Fl. Bras.* n. 378., et Auctt.

Hemidictyum marginatum Presl, *Tent.* 111. t. 3. fig. 24. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 55 A.

Hemidictyum peruvianum Presl, *Epimel.* 74.

Asplenium limbatum Willd. *Sp. Plant.* V. 310.

Asplenium Mikani Presl, *Del. Prag.* I. 177.

CAUDEX erectus, altitudinem humanam attingens (teste MARTIO). PALEAE membranaceae, castaneae, lineari-lanceolatae, 4—6 lin. longae. STIPTES stricti, 2—3 pedes longi, glabri, deorsum 6—8 lin. crassi, paleacei. LAMINA utrinque nuda, supra plene viridis, infra pallidior, ovato-deltoidea, 4—6 pedes longa, 2—3 pedes lata, tota simpliciter pinnata. PINNAE subpatentes, 12—18 poll. longae, 2—4 poll. latae, acutae, subintegerrimae, basi symmetrice cordatae. VENAE per duas tertias interiores latitudinis pinnarum simplices vel basi furcatae, parallelae, subpatentes, rectae, liberae, in triente exteriori intra venam distincte intramarginalem in maculas hexagonas copiosas anastomosantes, venulis inclusis liberis nullis. SORI e costa secundum venarum partem rectam simplicem procurrentes, 8—12 lin. longi, partes anastomosantes prorsus evitantes. INDUSIUM angustum, nudum, membranaceum.

E Mexico et insulis Antillanis in Peruviam et Brasiliam disseminatum. In prov. Bahia ad Ilheos: Luschnath! (Mart. Herb. Fl. Bras. n. 378!); ad viam Felisbertiam: Princ. Neuwied!; in provinciis Rio de Janeiro et Minarum frequens: Raddi, Langsdorff!, Gardner 31!, Pohl!, Glaziou 3162, Warming!, omnesque fere collectores.

TRIBUS VII. SCOLOPENDRIEAE.

SORI secundum venas decurrentes lineares vel oblongi, INDUSIIS superis homomorphis constanter geminatis introrsum apertis.

CAUDEX erectus vel repens, nunquam arborescens. STIPTES fasciculati vel segregati, cum caudice continui vel basi articulati (*Micropodium* Mett.). FRONDES conformes, herbaceae vel coriaceae, plerumque simplicissimae et integrae, interdum apice radicales. VENAE pinnatae vel flabellatae, liberae vel extrorsum plus minus in maculas irregulariter hexagonas anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI lineares vel lineari-oblongi, secundum venas currentes, quoad laminam perfecte dorsales, per paria in venulis finitimis approximati, subrecti et prorsus contigui (§ *Eusclopendrium*), vel subrecti spatio angusto interjecto (§ *Antigramma*, *Schaffneria*), vel curvati medioque solum contigui (§ *Camptosorus*). INDUSIA supera homomorpha, in eodem pari semper extrorsum affixa (contra morem *Diplazii*) introrsum aperta. — Species 9, praecipue per regiones boreali-temperatas late dispersae.

Genus unicum brasiliense XIV. SCOLOPENDRIUM.

XIV. SCOLOPENDRIUM SMITH.

SCOLOPENDRIUM *Smith, Mem. Acad. Taurin. V. 410. t. 9. fig. 2. Swartz, Syn. Fil. 89. Willd. Sp. Plant. V. 349. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 37 B. Hook. Sp. Fil. IV. 1., et Auctt. — CAMPTOSORUS Link, Fil. Hort. Berol. II. 83. Presl, Tent. 121. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 57 C. — ANTIGRAMMA Presl, Tent. 120. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 57 A. — SCHAFFNERIA Fée, VIII. Mem. 56. t. 17. Hook. Kew-Gard. Misc. 9. t. 9. — Micropodium Metten. Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 233. (ex parte). — Asplenii spec. Linn., Swartz, et Auctt.*

Characteres omnino tribus.

Tabula nostra XLV. Fig. IV.

SPECIES BRASILIENSES.

§ 1. ANTIGRAMMA. Venae pinnatae; venulae extrorsum anastomosantes. — Tabula nostra XLV. Fig. IV.

1. Stipites 1—2 poll. longi nunc subnulli; lamina basi sensim angustata 1. SC. BRASILIENSE.
2. Stipites 8—12 poll. longi; lamina basi plerumque late cordata 2. SC. PLANTAGINEUM.

1. SCOLOPENDRIUM BRASILIENSE KUNZE: stipitibus brevibus vel subnullis, frondibus coriaceis ligulato-lanceolatis integerrimis vel paullulum crenulato-crispatis, deorsum sensim angustatis, maculis venularum biserialibus.

Tabula nostra XLV. Fig. IV. (analysis).

Scolopendrium brasiliense Kunze, *Linnaea* XXIII. 291. *Hook. Sp. Fil. IV. 3. Hook. et Baker, Syn. Fil. 247.*
Asplenium brasiliense Swartz, *Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 65. t. 3. fig. 1.*
Antigramma brasiliensis Moore, *Ind. Fil. 78.*
Asplenium dubium Gaudich. *Freye. Voy. 314.*
Scolopendrium ambiguum Raddi, *Fil. Bras. 40. t. 57. fig. 1. Mart. Hb. Fl. Bras. n. 377. Metten. Fil. Hort. Lips. 67. Etingsh. Farnkr. t. 72. fig. 2.*
Antigramma repanda et oblongata Presl, *Tent. 120.*
Antigramma subsessilis Fée, *Gen. Fil. 210.*

CAUDEX CRASSUS, erectus, PALEIS castaneo-ebeneis lanceolatis membranaceis 2—3 lin. longis sursum vestitus. STIPITES dense fasciculati, grisei, erecti, 1—2 poll. longi, plus minus paleacei, interdum subnulli. LAMINA utrinque nuda, obscure viridis, 9—15 poll. longa, 1½—2½ poll. lata, e medio in apicem acutum et deorsum sensim in stipitem angustata. COSTA distincta, facie complanata, dorso angulata. VENULAE graciles, immersae, modice laxae, erecto-patentes, simplices vel basi furcatae, in triente frondis exteriori in maculas hexagonas bi- vel raro subtriseriatis anastomosantes. SORI ultra partes venarum simplices nunquam procurrentes, lineares, per paria approximati, subrecti, paralleli, spatio angusto interjecto. INDUSIUM angustum, nudum, membranaceum.

Habitat in sylvis aboriginibus ad arbores semiputridas montium Serra do Mar atiorumque per provincias S. Catharinae, S. Pauli, Rio de Janeiro, Espiritu Santo et Bahia: Raddi, Pohl!, Princ. Neuwied, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 377!, Sello!, Langsdorff!, Fritz Müller 24!, Glaziou 2348! etc. etc. — Vaga.

2. SCOLOPENDRIUM PLANTAGINEUM SCHRAD. stipitibus longis gracilibus, frondibus subcoriaceis ovato-lanceolatis subintegerrimis basi plerumque late cordatis, maculis venularum triserialibus.

Scolopendrium plantagineum Schrad. *Mss. Kunze, Linnaea* XXIII. 291. *Hook. et Baker, Syn. Fil. 247.*

Antigramma plantaginea et populifolia Presl, *Tent. 120.*

Asplenium Douglasii Hook. et Grev. *lc. Fil. t. 150.*

Scolopendrium Douglasii Hook. *Sp. Fil. IV. 3.*

Camptosorus rumicifolius Link *Fil. 83.*

Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES stricti vel paullulum flexuosi, grisei, glabri, nudi, 8—12 poll. longi. LAMINA utrinque nuda, obscure viridis, 8—12 poll. longa, 3—5 poll. lata, acuta, integerrima vel margine leviter repandula, basi rotundata vel plerumque late cordata. COSTA distincta, gracilior quam in specie antecedente; VENULAE subpatentes, graciles, immersae, subparallelae, profunde furcatae, in triente frondis exteriori in maculas hexagonas triseriatis anastomosantes. SORI ultra venularum partes simplices haud procurrentes, interdum 12—15 lin. longi, paralleli, demum subcontigui. INDUSIUM angustum, nudum, cito evanescent.

Habitat circa Bahiam: Blanchet!; et in prov. Rio de Janeiro Serra dos Orgãos etc.: Gardner 148!, Douglas!, Langsdorff, Glaziou 1690! aliisque. — Dryas.

TRIBUS VIII. ASPIDIEAE.

SORI quoad venas dorsales vel terminales, quoad laminam dorsales vel raro submarginales, rotundati vel subrotundati, INDUSIIS homomorphis superis, marginibus ex parte majore vel totis liberis.

CAUDEX plerumque erectus, raro repens vel subarborescens. STIPITES ut plurimum fasciculati, plus minus paleacei, cum caudice continui vel raro prope basin articulati (*Oleandra*). FRONDES conformes vel subconformes, quoad texturam dissectionem et magnitudinem valde variabiles, herbaceae vel coriaceae nunc membranaceae, raro parvae simplicesque, saepe mediocres 2- vel frequentius 3—4-pinnatifidae, raro magnae. VENAE pleraeque liberae, pinnatae, saepe in pinnulis frondis bipinnatifidae regulariter pinnatae, VENULIS inferioribus liberis vel confluentibus (*Eunephrodium*, *Cyclodium*), frondis late foliaceae interdum copiose et irregulariter anastomosantibus (*Euaspidium*, *Sagenia*). PINNAE interdum (*Nephrolepis*) basi insigniter articulae, in planta sicca prompte deciduae, apicibus venularum in paginâ superiore frondis punctis cretaceis notatis. SEGMENTA ultima plerumque parva, subintegra vel dentibus saepe aristatis (*Polystichum*) instructa. RACHES saepe insigniter paleaceae. SORI rotundati vel subrotundati, plerique quoad laminam et venas perfecte dorsales, raro quoad venas terminales (*Didymochlaena*, *Nephrolepis*). INDUSIUM rotundatum vel raro oblongum, cum lamina centro vel basi plus minus distincte emarginata colligatum, margine omnino vel majore ex parte libero. — Species circa 300, per regiones tropicas et temperatas totius orbis ubique dispersae.

CLAVIS GENERUM BRASILIENSIIUM.

1. Sori quoad venas terminales. Indusium magnum oblongum, receptaculo centrali lineari cum lamina colligatum XV. DIDYMOCHLAENA.
2. Sori quoad venas dorsales. Frondes plus minus compositae, basi haud articulae.
 - a. Indusium rotundatum, centro peltatum cum lamina colligatum . . . XVI. ASPIDIUM.
 - b. Indusium reniforme, basi emarginata cum lamina colligatum . . . XVII. NEPHRODIUM.
3. Sori quoad venas terminales. Indusium parvum subrotundato-reniforme, basi plus minus emarginata cum lamina colligatum XVIII. NEPHROLEPIS.
4. Sori quoad venas dorsales. Frondes simplicissimae, prope basin articulae XIX. OLEANDRA.

XV. DIDYMOCHLAENA DESV.

DIDYMOCHLAENA Desv. Berl. Mag. V. 303. tab. 7. fig. 6. Kaulf. Enum. Fil. 184. Presl, Tent. 90. t. 2. fig. 28. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 8. Hook. Sp. Fil. IV. 5., et Auctt. — MONOCHLAENA Gaud. Freyc. Voy. 340. — TEGULARIA Reinw. Syllog. (1825.) II. 3. — Adiantum, Asplenium et Diplazium sp. Auctt.

SORI oblongi, quoad venas terminales, quoad laminam dorsales, INDUSIIS oblongis receptaculo centrali lineari cum lamina colligatis.

Tabula nostra XLV. Fig. V.

Characteres vegetativos legas infra in descriptione speciei. — Species 2, quarum altera insulas peninsulamque Malayanas, altera regiones tropicas utriusque orbis incolit.

1. DIDYMOCHLAENA LUNULATA Desv. frondibus subcoriaceis totis bipinnatis, pinnis subsessilibus ligulato-linearibus, pinnulis 20—30-jugis sessilibus rhomboideo-subdimidiatis, venis subflabellatis.

Tabula nostra XXIX. Fig. 7. 8. (pinna) et XLV. Fig. V. (anastasis).

Didymochlaena lunulata Desv. Mem. Linn. Soc. Par. VI. 282. Kunze in Schkuhr Suppl. I. 203. Hook. Gard. Ferns. t. 17. Sp. Fil. IV. 5.

Didymochlaena sinuosa Desv. l. c. Gaud. Freyc. Voy. t. 12. fig. 13. Mart. Ic. Sel. Crypt. Bras. 95. t. 28 et 29. fig. 1. Hb. Fl. Bras. n. 328. Etingsh. Farnkr. tab. 135. fig. 13., et Auctt.

Adiantum lunulatum Houtt. Syst. XIII. 252. t. 100. fig. 1.

Didymochlaena dimidiata Kunze, Linnaea XVIII. 122. Schkuhr, Suppl. I. 200. t. 84. Etingsh. l. c. tab. 129. fig. 3.

Diplazium pulcherrimum Raddi, Fil. Bras. 42. t. 59.

Aspidium truncatulum Swartz, Syn. Fil. 52. Willd. Sp. Plant. V. 256.

Asplenium fruticosum Vell. Fl. Flum. XI. t. 104., et synonyma multa alia.

CAUDEX erectus, subarbores, PALIS linearibus membranaceis ferrugineis 9—15 lin. longis dense vestitis. STIPITES dense caespitiosi, erecti, validi, basi digiti minoris crassitie, 12—18 poll. longi, straminei, toti plus minus paleacei et adpresse lanosi. LAMINA subcoriacea, utrinque nuda, obscure viridis, ovato-rhomboidea, 2—4 pedes longa, 1½—2 pedes lata, tota bipinnata, pinna terminali reliquis consimili. RACHES strictae, stramineae, plus minus furfuraceae. PINNAE 10—20-jugae, subsessiles, adscendentes, lineari-ligulatae, 9—12 poll. longae, 1—2 poll. latae, con-

tiguae vel inferiores laxae. PINNULAE sessiles, patentes, 20—30-jugae, contiguae, rhomboideo-subdimidiatae, 6—12 lin. longae, 3—4 lin. latae, margine interiore recto cum rache parallelo, exteriori rotundato vel superne plus minus producto, cum superiore subrecto paullulum inciscrenato, inferiore horizontaliter subrecto. VENULAE immersae, graciles, basi pinnularum e venâ centrali indistincta subflabellatae, inferiores lateris superioris copiose subpinnatae. SORI leviter immersi, praecipue infra marginem superiorem pinnularum impositi, 4—6 pro pinnula, quoad venulas laterales fasciculorum terminales, saepe etiam 1—2 prope basin marginis exterioris obvii. INDUSIUM nudum, membranaceum, brunneum.

Species per regiones tropicas totius orbis late disseminata in Brasilia lecta est in prov. S. Catharina, Rio de Janeiro, Minas Geraes et Bahia: Fritz Müller!, Chamisso, Raddi!, Selto, Pohl!, Schott, Gardner 40! 5322!, Raben, Bunbury, Blanchet 5322!, Princ. Neuwied, Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 328!), Regnell II. 330!, Glaziou 2327! etc. — Vaga et Extrabrisil.

XVI. ASPIDIUM SWARTZ.

ASPIDIUM Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 4. et Syn. Fil. 42 (ex parte). R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. 147. Willd. Sp. Plant. V. 211. (ex parte). Metten. Phegopt. et Aspid. 32. (ex parte). Hook. Sp. Fil. IV. 6. (Sagenia exclusa). Hook. et Baker, Syn. Fil. 248. — POLYSTICHUM Roth, Tent. Fl. Germ. III. 69. (ex parte), non Koch. — TECTARIA Cav. Prael. 250. — HYPOPELTIS Rich. in Mich. Fl. Bor. Am. 266. — RUMOHRIA Raddi, Op. Scient. di Bologna 1819. III. 290. — BATHMIUM Link, Sp. Fil. 114. — CYRTOMIUM, CYCLODIUM et PHANEROPHLEBIA Presl, Tent. 84—6. Hook. et Bauer, Gen. Fil. 49. — AMBILIA Presl, Tent. 84. — ARACHNIODES Blume, Enum. Pl. Jac. 241. — CYCLOPELTIS J. Smith, Bot. Mag. LXXII. Suppl. p. 36. — HEMICARDIUM Fée, Gen. Fil. 282. — PODOPELTIS Fée, Gen. Fil. 286. — Polypodii sp. Linn. et Auctt.

SORI rotundati, quoad venas et laminam dorsales, INDUSIIS rotundatis centro peltatum cum lamina colligatis.

Tabula nostra XLV. Fig. VI. et XLVI. Fig. I. II.

CAUDEX plerumque erectus, interdum longe repens, nunquam arborescens. STIPITES cum caudice continui, plerique fasciculati, plus minus saepe toti paleacei. FRONDES plerumque conformes, mediocres, coriaceae, 2—4 pinnatifidae, segmentis parvis inaequaliter oblongo-deltaeideis aristato-dentatis, raro pinnatifidae vel simpliciter pinnatae, nunc herbaceae laciniisque parvis vel late foliaceis. VENAE pleraeque liberae, pinnatae, raro VENULAE fasciculorum regulariter pinnatorum oblique junctae

vel areolas copiosas hexagonas formantes. *INDUSIUM* orbiculare centro punctiformi cum lamina colligatum, marginibus circumcirca liberis, interdum cito evanescent vel omnino obsoletum. — Species 50–60, quarum paucae quidem brasilienses, per regiones tropicas et temperatas utriusque orbis late dispersae.

CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIS.

- § 1. *POLYSTICHUM* Schott. Venae omnino liberae. — *Tabula nostra XLV. Fig. VI.*
- a. Lamina membranaceo-herbacea simpliciter pinnata.
1. A. SEMICORDATUM.
- b. Lamina coriacea 2–4-pinnatifida, segmentis ultimis inaequilateraliter oblongo-rhomboides.
- α. Caudex erectus; lamina 2-pinnata vel 3-pinnatifida, dentibus aristatis 2. A. ACULEATUM.
- β. Caudex longe repens; lamina 4-pinnatifida, dentibus exaristatis 3. A. CAPENSE.
- § 2. *CYRTOMIUM* Presl. Venae oppositae fasciculorum vicinarum angulatum anastomosantes (more *Eunephrodii*). — *Tabula nostra XLVI. Fig. I.*
- a. Pinnae fertiles sterilibus subaequales 4. A. ABBREVIATUM.
- b. Pinnae fertiles conspicue reductae 5. A. MENISCOIDES.
- § 3. *EUASPIDIUM*. Lamina late foliacea; venulae in maculas parvas hexagonas copiose anastomosantes. — *Tabula nostra XLVI. Fig. II.*
- a. Lamina simplex 6. A. PLANTAGINEUM.
- b. Lamina ternata vel raro quinata 7. A. TRIFOLIATUM.

§ 1. POLYSTICHUM.

1. *ASPIDIUM SEMICORDATUM* SWARTZ: stipitibus segregatis griseis deorsum paleis subulatis vestitis, frondibus membranaceo-herbaceis oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 30–50-jugis lineari-ligulatis confertis subintegerrimis sessilibus, basi superiore cuneata, inferiore cordata, inferioribus reductis, venis gracilibus confertis pinnatis; soris in series 1–3 longas dispositis confertis, costae approximatis.

Tabula nostra XLV. Fig. VI a. (analysis).

Plumier Fil. t. 113.

Aspidium semicordatum Swartz, Syn. Fil. 45. Willd. Sp. Plant. V. 222. Metten. Aspid. 36. Hook. Sp. Fil. IV. 17. Etingsh. Farnkr. tab. 112. fig. 1–6., et Auct.

Aspidium caducum H.B.K. Nov. Gen. et Sp. I. 12. Kaulf. Enum. Fil. 233., non Wallich.

Polypodium caducum Willd. Sp. Plant. V. 193.

Lastrea caduca Presl, Tent. 77.

Cyclopetis semicordata J. Smith loc. cit. Lowe, Ferns 6. t. 3. Hemicardium Nephrolepis Fée, Gen. Fil. 262.

Hemicardium macrosorum Fée, VIII. Mem. 101.

CAUDEX lignosus, 6–9 lin. crassitiem attingens, plus minus repens, PALEIS linearibus, membranaceis, pallide ferrugineo-brunneis, 6–9 lin. longis dense vestitis. STIPITES segregati, erecti, graciles, stricti, grisei, 6–9 poll. longi, deorsum paleis subulatis membranaceis longis vestiti. LAMINA utrinque glabra, supra nitide saturateque viridis, infra pallidior, 1½–3 pedes longa, 8–12 poll. lata. RACHIS stricta, grisea, plus minus breviter brunneo-pubescent. PINNAE mediae subpatentes vel paullulum falcato-adscedentes, confertae, 4–6 poll. longae, 6–9 lin. latae, acuminatae, subintegerrimae vel leviter crenulatae, perfecte sessiles, inferiores laxae reductae. COSTAE pinnarum distinctae; VENAE graciles, immersae, confertae, in fasciculos subadscedentes venularum 2–3-jugarum solutae, venula fasciculi infima antice ad basin venae primariae abeunte, ultra dimidiam pinnae latitudinem aegre attingente. Soris utrinque secundum costam 1–3-seriales; series exterior semper a margine remota. INDUSIUM nudum, membranaceum, demum brunneum.

Polypod.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad oram meridionalem fluv. Amazonum prope ostium fluv. Solimões: Spruce 1610!; et in sylvis inter oppida Almeirim et Santarem prov. Para: Martius! — Praeterea in Peruvia indeque ad Guatemalam et insulas Antillanas disseminata, varietates quoque nonnullas (Hemicardium Cumingianum, subbatatum, crenatum et Cochinchinae Fée) in Malacca et insulis vicinis atit.

2. *ASPIDIUM ACULEATUM* SWARTZ: stipitibus fasciculatis plus minus paleaceis, frondibus subcoriaceis oblongo-lanceolatis apice excepto 2–3-pinnatifidis, pinnis subsessilibus ligulato-linearibus, pinnulis sessilibus vel breviter petiolatis inaequilateraliter oblongo-rhomboides aristato-dentatis interdum profunde pinnatifidis, basi superiore cum rache parallela, inferiore subhorizontaliter truncata, venulis pinnatis; soris in pinnulis superne utrinque prope costam uniseriatis, indusiis saepe obsoletis.

Tabula nostra XLV. Fig. VI b. (analysis).

Polypodium aculeatum et muricatum Linn. Sp. Plant. 1552–5.

Aspidium aculeatum et lobatum Swartz, Syn. Fil. 53.

Aspidium aculeatum, angulare, lobatum et muricatum Willd. Sp. Plant. V. 257–264.

Aspidium squarrosum, hastulatum, affine, Moritzianum, ordinatum, lobatum, Braunii, microphyllum, taticopterum, amblyotus, proliferum, mucronifolium, Wallichianum, Hartwegii, crenatum, stramineum, subintegerrimum, subinerme, luctuosum et haleakalense Metten. Pheg. et Asp. 46–52., et synonyma multa alia.

Varietates brasilienses:

Var. β. *PEGOPTEROIDEUM* Baker: indusio nullo.

Tabula nostra XXVIII. Fig. 9–12. (pinnae).

Aspidium caudatum Swartz, Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 62! (v. s. in Herb. Martii).

Polypodium monteverdense Spreng. Syst. Veg. IV. 59.

Polypodium rigidum Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 163.

Polypodium rigidum et pycnolepis Hook. Sp. Fil. IV. 246–7.

Phegopteris rigida, cochleata et pycnolepis Metten. Pheg. et Asp. 10–11.

Nephrodium polyphyllum Presl, Rel. Haenk. 37. t. 6. fig. 1.

Polystichum microphyllum Klotzsch Mss.!, et synonyma multa alia.

CAUDEX suberectus. STIPITES dense fasciculati, 12–18 poll. longi, straminei, stricti, PALEIS valde variis lanceolatis vel linearibus castaneis vel ferrugineis firmis vel debilibus deorsum vel toti vestiti. LAMINA subcoriacea, supra saturate viridis glabra, infra pallidior interdum paullulum furfuracea, oblongo-lanceolata, 1–3 pedes longa, 8–12 poll. lata, 2–3-pinnatifida. RACHES stramineae, subnuda vel plus minus fibrillosae, paleis inaequalibus membranaceis ferrugineis vel castaneis. PINNAE apice excepto perfecte pinnatae, 12–20-jugae, contiguae, lineari-ligulatae, 4–6 poll. longae, 10–15 lin. latae, subsessiles, plus minus adscedentes, basi aequaliter truncatae. PINNULAE pinnarum imarum 12–20-jugae, contiguae, sessiles vel breviter petiolatae, inaequilateraliter oblongo-rhomboidae, 5–8 lin. longae, 3–4 lin. latae, aristatae, marginibus aristato-dentatis vel deorsum pinnatifidis, basi superiore producta cum rache parallela saepe auriculata, inferiore subhorizontaliter truncata. VENAE pinnatae, graciles; VENULAE lateris superioris pinnularum 6–9, erecto-patentes, mediae furcatae, imae pinnatae, lateris inferioris pauciores magis adscedentes. Soris parvi, utrinque prope costam uniseriati, deorsum antice saepe biseriati et in auriculā iterum pinnati. INDUSIUM prorsus obsoletum.

Var. γ. *PLATYPHYLLUM* Baker.

Tabula nostra XXXII. Fig. 4–6. (pinnae).

Aspidium platyphyllum Willd. Sp. Plant. V. 255. Metten. Fil. Hort. Lips. 88. t. 22. fig. 1–2. Etingsh. Farnkr. t. 113. fig. 1. 10. 11.

Polystichum platyphyllum Presl, Tent. 84.
Phegopteris platyphylla Mett. Pheg. et Asp. 12.
Polypodium polystichoides Klotzsch, Linnaea XX. 383.
Phegopteris polystichiformis Fée, Gen. Fil. 247.
Polypodium platyphyllum Hook. Sp. Fil. IV. 249., non Swartz.
Phegopteris polystichops Wawra, Maximil. Reise 101. t. 102.

Lamina magis deltoidea; pinnae pauciores, lanceolatae, inferiores 8—9 poll. longae, 2½—3 poll. latae; pinnulae majores, inferiores 15—18 lin. longae, 8—9 lin. latae, deorsum profunde pinnatifidae, segmentis inaequaliter obovatis.

Filix frequentissima et maxime variabilis per regiones tropicas, subtropicas et praecipue temperatas totius orbis divulgata. Var. β. intra Brasiliae limites degit in prov. Rio Grande do Sul: Fox!; prov. S. Pauli: Martius; Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Gardner 132! 133!, Burchell 2082—3!, Glaziou 1783! 2065! 2354—7!; Minas Geraës, Caldas, Gongo Soco, Rio Abaité, Lagoa Santa etc.: Lindberg!, Bunbury!, Pohl, Regnell 1. 476!, Warming!; et Goyaz ad Limoeiro: Pohl! — Var. γ. in Serra dos Orgãos aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Gardner 54!, Wawra et Maty 502 et al.

3. ASPIDIUM CAPENSE Willd. stipitibus segregatis basi paleaceis, frondibus coriaceis deltoideis quadripinnatifidis, pinnis longe petiolatis lanceolato-deltoideis, imis maximis, pinnulis lanceolatis basi inaequaliter cuneatis, inferioribus petiolatis, segmentis oblongo-lanceolatis saepe pinnatifidis, dentibus exaristatis, venulis gracilibus pinnatis; soris magnis utrinque secundum costam uniseriatis.

Tabula nostra XXIX. Fig. 3. 4. (sub titulo Swartziano A. coriacei, pinnae.)

Polypodium capense Linn. Suppl. 445.
Aspidium capense Willd. Sp. Plant. V. 267. Lowe, Fil. 6. t. 46. Hook. et Baker, Syn. Fil. 254., non Swartz.
Rumohria aspidioides Raddi, Fil. Bras. 28. t. 43.
Aspidium coriaceum Swartz, Syn. Fil. 57. Willd. Sp. Plant. V. 268. Schkuhr, Fil. t. 50. Hook. Sp. Fil. IV. 32., et Auctt.

Tectaria Calahuala Cav. Prael. 1801. n. 61.

Polypodium adiantiforme Forst. Prodr. 82.

Aspidium discolor Langsd. et Fisch. Fil. Bras. 16. t. 18., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti, longe repens, paleis membranaceis ferrugineis linearibus lanceolatis dense vestitus. STIPITES segregati, erecti, stricti, validi, deorsum crassitiem 3—4 lin. attingentes, 12—18 poll. longi, straminei, basi excepta nudi. LAMINA utrinque nuda, supra nitide obscure viridis, infra pallidior, 1—3 pedes longa, 9—18 poll. lata. PINNAE compositae 10—15-jugae, contiguae vel paullulum imbricatae, erecto-patentes, imae maximae, inferiores lanceolato-deltoideae, distincte petiolatae, 6—9 poll. longae, 4—6 poll. latae, superiores sensim decrecentes. PINNULAE lanceolatae, basi inferiore magis cuneata, contiguae, inferiores distincte petiolatae, imae maximae. SEGMENTA oblongo-lanceolata, basi subaequaliter cuneata, inferiora petiolata, deorsum pinnatifida vel dentata, dentibus acutis vel subobtusis, nunquam aristatis. VENAE pinnatae, graciles, immersae, confertae; VENULAE erecto-patentes. SORI ½—¾ lin. lati. INDUSIUM membranaceum, nudum, deciduum.

Intra Brasiliae limites in prov. S. Catharina: Fox 241!, Langsdorff!, Fritz Müller!; Rio de Janeiro, e. gr. Serra dos Orgãos: Raddi!, Schott, Langsdorff, Raben, Gomez!, Mart. Hb. Fl. Bras. 313!, Glaziou 1657! 1778—9! 2383! aliisque; Minas Geraës, Serra da Piedade, Caldas, Lagoa Santa: Gardner 5321!, Regnell III. 1453!, Warming!; prov. Bahia ad cataractas Almadenses: Princ. Newwied!. Etiam in ditone Montevicensi (Capit. King!, Gibert!), in Sierra de Tondil Argentinae (Tweddie!), et per Chile, Boliviam, Peruviam etc. usque in insulas Antillanas, etiam in regionibus austro-temperatis veteris orbis disseminatum.

§ 2. CYRTOMIUM.

4. ASPIDIUM ABBREVIATUM Schrad. stipitibus segregatis stramineis, frondibus homomorphis subcoriaceis vel papyraceo-herbaceis oblongo-lanceolatis 1-pinnatis vel 2-pinnatifidis, pinnis linearibus ligulatis crenatis vel saepe ad medium pinnatifidis, pinnulis contiguis, inferioribus petiolatis, venulis 4—9-jugis, inferioribus plerisque angulatim anastomosantibus; soris utrinque secus venas primarias uniseriatis.

Tabula nostra XXIX. Fig. 5. 6. (pinnae), XLVI. Fig. 1. (anastomosis) et LXII. (habitus).

Aspidium abbreviatum Schrad. Goett. Gel. Anz. 1824. p. 869. Kunze, Regensb. Flora 1837. I. 326. Metten. Pheg. et Asp. 33. Hook. Sp. Fil. IV. 37. t. 234. Mart. Herb. Fl. Bras. n. 325. 326. Ettingsh. Farnkr. tab. 127. fig. 7. 8.
Polystichum abbreviatum Presl, Epim. 58.
Cyclodium abbreviatum Presl, Epim. 260. Moore, Ind. Fil. 275.
Nephrodium abbreviatum Fée, Gen. Fil. 306.
Polypodium colubrinum Vell. Fl. Flum. XI. t. 71.?

CAUDEX lignosus, 3—4 lin. crassus, repens, paleis squarrosis castaneo-nigris linearibus 3—4 lin. longis vestitus. STIPITES erecti, firmi, stricti, 12—18 poll. longi, basi solum paleacei. LAMINA utrinque nuda, obscure viridis, 1½—2 pedes longa, 9—12 poll. lata, praeter apicem pinnatifidum bipinnatifida. PINNAE solutae 6—12-jugae, contiguae vel sublaevae, adscendentes, lineariligulatae, 5—7 poll. longae, 12—18 lin. latae, acutae, marginibus plus minus (deorsum saepe ad medium) pinnatifidis, laciniis contiguis obtusis 3—4 lin. latis, basi utrinque cuneata, postice paullulum reducta. VENAE in laciniis pinnarum regulariter pinnatae; VENULAE 6—9-jugae, valde adscendentes, simplices vel raro furcatae, inferiores 1—3 cum venulis oppositis anastomosantes. SORI prope venas medianas laciniarum utrinque 4—6, uniseriati. INDUSIUM membranaceum, glabrum, peltatum, ½ lin. latum.

Var. β. GUIANENSE Baker.

Aspidium guianense Klotzsch, Linnaea XX. 364. Metten. Pheg. et Asp. 38.

Polystichum guianense Presl, Epim. 58.

Peltochlaena nephrodioides Fée, Gen. Fil. 289.

Lamina magis papyracea, utrinque saturatius viridis. Pinnae angustiores, 6—9 lin. latae, magis patentes, extrorsum saepe insigniter incisoserratae, marginibus vix amplius crenatis. Venulae 3—4-jugae, saepe haud vel vage anastomosantes.

Obs. Varietas a typo primo vultu insigniter differt, sed formis intermediis arte cum eo cohaeret.

Forma typica in ditone Pernambucana ad Cатуca in sylvis primaevis: Gardner 1218!; in prov. Bahia ad Almeida etc. in sylvis umbrosis: Laschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 326!), Blanchet 225! 2208!, Princ. Newwied!; ad ripas fluv. Mucuri prov. Espirito Santo: Princ. Newwied!; in monte Corcovado, in montibus inter oppidum S. Georgii insularum et vicum S. Pedro d'Alcantara, ad rupes madidas, in udis umbrosis sylvarum: Gardner 5671!, Mart. Hb. Fl. Bras. 325. Item in Jamaica: Purdie! — Var. in Guyana britannica (Parker!, Rich. Schomburgk 1157!, Appun 177! 423! 1176!), gallica (Leprieur) et batava (Hostmann 15). — Vaga et Extrabrsil.

5. ASPIDIUM MENISCOIDES Willd. stipitibus segregatis stramineis, frondibus difformibus coriaceis oblongo-deltoideis simpliciter pinnatis, pinnis sterilibus lanceolatis subintegris vel crenatis, fertilibus reductis, venulis 6—8-jugis regulariter pinnatis, inferioribus saepe angulatim confluentibus; soris utrinque secus venas primarias uniseriatis, demum saepe totam faciem pinnarum tegentibus.

Tabula nostra XXIX. Fig. 1. 2. (pinnae steriles).

Aspidium meniscioides Willd. Sp. Plant. V. 218. Kaulf. Enum. Fil. 231. Metten. Pheg. et Asp. 32. Hook. Sp. Fil. IV. 36.

Cyclodium meniscioides Presl, Tent. 85. t. 2. fig. 20. Fée, Gen. Fil. 285. Moore, Ind. Fil. 275.

Aspidium confertum Kaulf. Enum. 232. (planta indica exclusa). Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 121. Metten. Fil. Hort. Lips. 87. Ettingsh. l. c. tab. 129. fig. 6-7.

Cyclodium confertum Presl, Tent. 85.

Aspidium Hookeri Klotzsch, Linnæa XX. 364., non Baker.

Aspidium heterodon Schrad. Goett. Gel. Anz. 1824. p. 869. Metten. Pheg. et Asp. 33.

Polystichum heterodon Presl, Epim. 58.

Cyclodium heterodon Moore, Ind. Fil. 275.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti, breviter repens, PALEIS linearibus membranaceis ferrugineo-castaneis 4-6 lin. longis dense vestitus. STIPITES stricti, 12-18 poll. longi, griseo-straminei, glabri, nudi vel leviter paleacei. LAMINA coriacea, utrinque nuda, obscure viridis, 1½-2 pedes longa, 12-18 poll. lata, oblongo-deltaeidea, simpliciter pinnata. PINNAE nunc omnes nunc inferiores tantum steriles; hae 3-8-jugae, alternae, laxae vel subcontiguae, lanceolatae, 6-9 poll. longae, 1½-2 poll. latae, acutae, integerrimae vel leviter inciso-crenatae, basi superne rotundata, inferne subcuneata, inferiores mediis aequales sessiles vel breviter petiolatae, terminalis (in lamina prorsus sterili) reliquis similis vel major. PINNAE fertiles apicem laminae occupantes, 3-8-jugae, saepe valde reductae, 3-4 poll. longae, 6-9 lin. latae, marginibus crenatis. VENAE regulariter pinnatae, 6-8-jugae, validae, elevatae; fasciculi angusti, pinnae sterilium 2½-3, fertillium 1½ lin. lati; VENULAE fasciculorum vicinorum regulariter angulatum anastomosantes, venâ e quovis angulo ad angulum proximum currente. SORI utrinque prope venas primarias 6-9. INDUSIUM peltatum, glabrum.

Habitat per provincias Brasiliae septentrionales mediasque ad terram arboresque in sylvis humidis. In prov. do Alto Amazonas: Martius, Spruce 2775-6; in prov. Paraënsi: Spruce 25! 26! (forma magis papyracea, pinnis fertilibus vix reductis); prov. Piahy: Gardner 2759!; in Bahiensibus sylvis ad Almadam, viam Felisbertiam, Itheos etc.: Princ. Neuwied!, Blanchet 2519!, Luschnath! — Etiam in Guyana anglica (Parker!, Appun 166!), gallica (Leprieur!, Sagot 722!) et batava (Focke!, Kappler 1746b, Kegel 1075) et nde e Peruvia ad insulas Antillanas. — Vaga et Extrabras.

§ 3. EUASPIDIUM.

6. ASPIDIUM PLANTAGINEUM GRISEB. stipitibus subsegregatis griseis leviter paleaceis, frondibus membranaceo-vel chartaceo-herbaceis lanceolatis simplicissimis integerrimis vel leviter sinuatis, venis distinctis parallelis intra marginem evanescentibus, venulis in areolas copiosas combinatis paucisque liberis intra areolas obviis; soris secus venas primarias utrinque uniseriatis, indusiis saepe obsoletis.

Tabula nostra XXXI. Fig. III. (tapsu sub titulo Nephrodii plantaginei).

Plumier Fil. tab. 128.

Aspidium plantagineum Griseb. Pl. Carib. 138. Fl. Brit. W.-Ind. 696. Metten. Pheg. et Asp. 126. Eaton, Fil. Wright. et Fendl. 211. Hook. Sp. Fil. IV. 43. Ettingsh. l. c. t. 130. fig. 3.

Polypodium plantagineum Jacq. Coll. II. 10. t. 3. fig. 1. Swartz, Syn. Fil. 29. Willd. Sp. Plant. V. 161. Hook. Exot. Fl. t. 114.

Dryomenis plantagineum J. Smith, Bot. Her. 229.

Phymatodes plantagineum Presl, Tent. 197.

Bathmium sinuatum et macrocarpum Fée, Gen. Fil. 288.

Aspidium sinuatum Moore, Ind. Fil. 104.

Bathmium Aubletianum Fée Mss.

CAUDEX lignosus, gracilis, breviter repens, PALEIS castaneis linearibus 2-3 lin. longis vestitus. STIPITES subsegregati, stricti, grisei, 4-8 poll. longi, paullulum paleacei. LAMINA membranaceo-vel chartaceo-herbacea, supra nuda saturate viridis, infra pallidior costâ et venis primariis saepe sparse paleaceis, 6-18 poll. longa, 2-5 poll. lata, apice obtuso vel subacuto saepe prolifero, basi symmetrice saepe longe cuneata. VENAE primariae conspicuae, parallelae, leviter adscendentes, 4-6 lin. distantes, intra marginem evanescentes, spatio intermedio areolis 1½-2 lin. latis per venulas graciles formati, quibus venulae liberae paucae includuntur, expleto. SORI 6-12 in serie. INDUSIUM nudum, peltatum, membranaceum, saepe obsoletum vel cito evanescens.

Habitat ad scaturigines montosas, in rivulis ad saxa etc., rara. In Serra da Gama et Serra Sao Gabriel prov. do Alto Amazonas: Spruce 2189! In Guiana gallica (Leprieur!), britannica (Appun 409!) et e Peruvia usque ad insulas Antillanas sparsa. — Najas et Extrabras.

7. ASPIDIUM TRIFOLIATUM SWARTZ: stipitibus fasciculatis nitidis stramineo-castaneis basi solum paleaceis, frondibus membranaceo-herbaceis deltaeideis impari-1-pinnatis, pinnis laterilibus 1-3-5-jugis inaequaliter lanceolatis vel ovato-deltaeideis, basi postice productis, venis ad marginem egredientibus, venulis in areolas parvas copiosas venulis liberis inclusis instructas combinatis; soris prope venas primarias utrinque uniseriatis.

Tabula nostra XXX. Fig. 1. 2. (pinnae), et XLVI. Fig. II. (analysis).

Aspidium trifoliatum Swartz, Syn. Fil. 43. Schkuhr, Fil. t. 28. Willd. Sp. Plant. V. 213. Mett. Fil. Hort. Lips. 95. t. 22. fig. 10-12. Hook. Sp. Fil. IV. 45. Ettingsh. l. c. t. 131. fig. 4-6., et Auct.

Polypodium trifoliatum Linn. Sp. Plant. 1547. Jacq. Ic. Rar. III. t. 638. Aublet, Guian. II. 962.

Bathmium trifoliatum Link, Sp. Fil. 114.

Aspidium heracleifolium Willd. Sp. Plant. V. 217. Metten. Fil. Hort. Lips. 95.

Polypodium cordifolium Mart. et Gal. Foug. Mex. 31. t. 4. fig. 2.

CAUDEX lignosus, erectus, PALEIS lineari-lanceolatis membranaceis castaneis 2-3 lin. longis vestitus. STIPITES fasciculati, 6-12 poll. longi, graciles, nitidi, stramineo-castanei, basi paleacei. LAMINA supra nuda saturate viridis, infra interdum paullulum pubescens, 6-12 poll. longa et lata. PINNA terminalis longe petiolata, deltaeidea, acuta vel acuminata, lateribus plus minus repandis vel pinnatifidis, lacinis obtusis vel acutis, imis adscendentibus valde productis saepe basi solutis; pinnae laterales oppositae vel suboppositae, sessiles vel breviter petiolatae, late foliaceae, inaequaliter lanceolatae vel ovato-deltaeideae, basi postice valde producta. VENAE primariae parallelae, 3-6 lin. distantes. SORI 2-8 pro serie, laxè dispositi. INDUSIUM membranaceum, peltatum, glabrum.

Habitat ad oram meridionalem fluv. Amazonum ad ostium flum. Solimoës, prov. do Alto Amazonas: Spruce 1624!, in Guiana batava (Kegel 1431) et in gallica (Aublet). Praeterea e Peruvia usque ad Mexicum et insulas Antillanas. — Najas et Extrabras.

Obs. *Aspidium nobile* Schlechtend. (tabula nostra XXVIII. Fig. 13) quum in reliqua America tropica late disseminatum sit, probabiliter etiam in Brasilia adhuc invenietur, quamobrem iconem ejus (ex Ettingsh. Farnkr. t. 126. fig. 13. repetitam) addidimus.

XVII. NEPHRODIUM RICH.

NEPHRODIUM Richard in Mich. Fl. Bor. Am. II. 266. R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. 148. Hook. Sp. Fil. IV. 60. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 48 B. Hook. et Baker, Syn. Fil. 259. — PLEOCNEMIA Presl, Tent. 183. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 70 A. — LASTREA Presl, Tent. 73. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 45 A. — POLYSTICHUM Roth, Tent. Fl. Germ. III. 69. ex parte. Koch, Syn. II. edit. 977. — SAGENIA Presl, Tent. 86. — HAPLODICTYUM Presl, Epim. 50. — ABACOPTERIS, CAMPTODIUM, OCHLAMYS, PHLEBIGONIUM et CARDIOCHLAENA Fée, Gen. Fil. 297—314. — AMAUROPELTA Kunze in Schkuhr Suppl. 86. — HYPODEMATIUM Kunze, Anal. Pter. 45. — DICHASIAM A. Braun, Flora Ratisbon. 1841. p. 70. — HEMESTHEUM et LOPHODIUM Newm. Phyt. 1851. App. 16. 21. — Aspidium Swartz et Metten. ex parte. — Polypodii spec. Linn. et Auctt.

SORI rotundati, quoad venas et laminam dorsales, INDUSIIS reniformibus basi emarginata cum lamina connexis.

Tabula nostra XLVI. Fig. III. IV. V.

CAUDEX plerumque erectus, interdum plus minus repens, raro subarborescens. STIPITES cum caudice continui vel raro (Arthropteris) prope basin articulati, plerique fasciculati, saepe plus minus paleacei. FRONDES plerumque conformes, mediocres, herbaceae, saepe pinnatae, PINNIS solutis profunde pinnatifidis, laciniis parvis numerosis lineari-oblongis subintegris contiguis, interdum mediocres decompositae vel late foliaceae, raro magna decompositae, vel coriaceae decompositae aristato-dentatae, vel parvae pinnatifidae. RACHES saepe plus minus paleaceae. VENAE liberae, saepe in laciniis parvis regulariter pinnatae, venulis numerosis parallelis simplicibus, vel pinnatae venulis ultimis furcatis (Lastrea), vel regulariter pinnatae venis inferioribus fasciculorum vicinorum angulatum anastomosantibus (Eunephrodiium), vel (in laminis late foliaceis) areolas copiosas parvas formantibus (Sagenia). SORI rotundati, in speciebus nostris omnibus quoad laminam et venas perfecte dorsales. INDUSIUM reniforme, membranaceum vel coriaceum, interdum obsoletum vel cito evanescens, basi emarginata cum lamina connexum, marginibus praeter basin circumcirca liberis. — Species ultra 220, per regiones tropicas et temperatas totius orbis late dispersae.

CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIIUM.

§ 1. LASTREA. Venae liberae. — Tabula nostra XLVI. Fig. III.

I. Lamina mediocris oblongo- vel ovato-lanceolata bipinnatifida, venulis pinnularum omnino simplicibus.

1. Pinnae vix ultra quartam latitudinis incisae, venulae 3—4-jugae.
 1. N. SANCTI-GABRIELI.
2. Pinnae vix ultra dimidiam latitudinem incisae, venulae 5—6-jugae. 2. N. SUBOBLIQUATUM.
3. Pinnae usque ad costam anguste alatae dissectae.

a. Pinnae inferiores mediis subaequales.

α. Pinnae inferiores subsessiles, pinnulis imis haud vel vix reductis.

* Pinnae basi glandulis nullis vel inconspicuis instructae 3. N. PATENS.

** Pinnae basi glandulis conspicuis instructae. Chartacea, venulis 10—15-jugis 4. N. LEPRICURII. Herbacea, venulis 8—9-jugis 5. N. SUBFUSCUM.

β. Pinnae inferiores distincte petiolatae, basi horizontaliter truncatae, pinnulis imis conspicue reductis.

* Lamina herbacea.

† Raches et lamina infra negre paleaceae.

Rachis straminea, lamina supra glabruscula.

Venulae 6—8-jugae 6. N. CHRYSOLOBUM.

Venulae 10—15-jugae 7. N. CAMPENSIS.

Rachis castanea sparse paleacea, lamina supra breviter pubescens 8. N. FALCICULATUM.

Rachis ferruginea paleis fibrillosis squarrososis dense vestita 9. N. RAMENTACEUM.

†† Raches et lamina infra dense paleaceae

10. N. VESTITUM.

** Lamina chartacea.

† Raches haud paleaceae, venulae 9—10-jugae.

Pinnae 5—6 poll. longae 11. N. ALSOPHILACRUM.

Pinnae 2—3 poll. longae 12. N. GARDNERIANUM.

†† Raches dense paleaceae, venulae 15-jugae

13. N. CRETENSIS.

γ. Pinnae inferiores sessiles, pinnulis imis conspicue reductis 14. N. TETRAGONUM.

δ. Pinnae inferiores distincte petiolatae, basi utrinque cuneata subintegra 15. N. TRISTE.

b. Pinnae inferiores multae sensim et insigniter decrescentes.

α. Pinnae omnino sessiles; pinnulae imae reliquis aequales vel longiores.

* Stipites graciles, 3—4 poll. lg. 16. N. CONTERMINUM.

** Stipites validiusculi, 6—12 poll. longi.

Venulae 6—8-jugae 17. N. PALUSTRE.

Venulae 10—12-jugae 18. N. SPRENGELII.

β. Pinnae omnes sessiles; pinnulae imae utrinque sensim reductae 19. N. TRICHOPHORUM.

γ. Pinnae inferiores distincte petiolatae, pinnulis imis reductis.

* Pinnae mediae lanceolatae, 1½ poll. longae.

20. N. FISCHERI.

** Pinnae mediae lineari-ligulatae, 2—2½ poll. longae 21. N. PTARMICA.

II. Lamina mediocris oblongo-lanceolata bipinnata, venulis pinnularum furcatis 22. N. FLIX-MAS.

III. Lamina mediocris, subdeltoidea, 3—4-pinnatifida.

1. Herbaceae.

a. Caudex erectus; stipites fasciculati 23. N. PATULUM.

b. Caudex repens; stipites segregati 24. N. PROTENSUM.

2. Coriacea, polystichoidea 25. N. DENTICULATUM.

IV. Lamina ampla, 3—5-pinnatifida.

1. Lamina herbacea, segmentis obtusis.

a. Raches flexuosae; pinnulae 8—9-jugae

26. N. FLEXUOSUM.

b. Raches strictae; pinnulae 15—20-jugae

27. N. VILLOSUM.

2. Lamina subcoriacea, segmentis acutis.

a. 3-pinnatifida, laciniis ultimis mediocribus

28. N. ACUTUM.

b. 4—5-pinnatifida, laciniis ultimis parvis.

α. Raches furfuraceae; sori mediocres

29. N. AMPLISSIMUM.

β. Raches nudaе, sori parvi 30. N. EFFUSUM.

3. Lamina coriacea 31. N. MACROSTEGIUM.

§ 2. EUNEPHRODIUM. Venae oppositae inferiores fasciculorum vicinorum angulatum confluentes. — *Tabula nostra XLVI. Fig. IV.*

I. Venulae 6—9-jugae.

- a. Caudex late repens, venulae confertae 32. N. UNITUM.
b. Caudex breviter repens, venulae laxae 33. N. SUBCUNEATUM.
c. Caudex erectus vel suberectus.

1. Lamina subtus dense pubescens . . . 34. N. MOLLE.
2. Lamina utrinque glabra . . . 35. N. REFRACTUM.

II. Venulae 16—18-jugae . . . 36. N. CONNEXUM.

§ 3. SAGENIA. Lamina late foliacea, venulis copiose in maculas hexagonas anastomosantibus. — *Tabula nostra XLVI. Fig. V.* . . . 37. N. MACROPHYLLUM.

§ 1. LASTREA.

1. NEPHRODIUM SANCTI-GABRIELI BAKER: stipitibus griseis glabris basi sparse paleaceis, frondibus papyraceo-herbaceis utrinque glabris oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis solutis 20—24-jugis lineari-ligulatis vix ultra quartam pinnatifidis, lacinii obtusis, basi superiore recte truncata, inferiore rotundata, imis breviter petiolatis, venulis laxis arcuatis simplicibus 3—4-jugis; soris subcostalibus.

Polypodium Sancti-Gabrieli Hook. Sp. Fil. IV. 233. Hook. et Baker, Syn. Fil. 394.

Caudex et paleas basales non vidi. STIPITES erecti, stricti, grisei, nitidi, 12—18 poll. longi, basi PALEIS paucis lanceolatis castaneis adpressis vestiti. LAMINA supra saturate subnitide viridis, infra pallidior, 1½—2 pedes longa, 10—12 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. PINNAE inferiores laxae, 5—6 poll. longae, 8—9 lin. latae, acutae, lacinii obtusis integris 1½ lin. latis, imae breviter petiolatae mediis aequales. VENAE in lacinii pinnatae, VENULIS inferioribus intra marginem evanescentibus. SORI prope venas majores utrinque uniseriati, 3—4 in serie, hinc in pinna utrinque secus costam irregulariter 3—4-seriati. INDUSIUM firmum, glabrum, medio cre.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad S. Gabriel da Cachoeira juxta fluv. Rio Negro: Spruce 2153! — Najas.

2. NEPHRODIUM SUBOBLIQUATUM BAKER: stipitibus subsegregatis nudis stramineis, frondibus chartaceo-herbaceis utrinque glabris oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis solutis 2—18-jugis lineari-ligulatis aegre ultra medium pinnatifidis, basi superiore recta subaequali, inferiore cuneata sensim reducta, inferioribus distincte petiolatis, lacinii lineari-oblongis integerrimis obtusis, venulis 5—6-jugis laxis simplicibus; soris medialibus.

Nephrodium subobliquatum Baker in Hook. et Baker Syn. Fil. 261.

Polypodium subobliquatum Hook. Sp. Fil. IV. 240.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS linearibus castaneis membranaceis 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES firmi, erecti, nitidi, 12—18 poll. longi. LAMINA obscure viridis, 1—2 pedes longa, 6—10 poll. lata, praeter apicem pinnatifidum bipinnatifida. PINNAE subpatentes vel erecto-patentes, contiguae vel sublaxae, 3—5 poll. longae, 9—12 lin. latae, acutae. PINNULAE s. laciniae contiguae, 2 lin. latae, patentes vel leviter ascendentes, imae sensim reductae. SORI medi inter costam et marginem, 4—5 pro serie. INDUSIUM membranaceum, glabrum, cito evanescentis.

Habitat in prov. Para prope Tanaü ad Rio Acara: Spruce 36!, et in Guiana britannica (Schomburgk!, Anderson!, Appun 427! 975! 1694!) et batava (Hostmann 15!). — Najas.

3. NEPHRODIUM PATENS DESV. stipitibus subfasciculatis stramineis glabris vel supra pubescentibus, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis infra plus minus griseo-pubescentibus, pinnis 20—30-jugis lineari-ligulatis profunde pinnatifidis basi horizontaliter truncatis, inferioribus perfecte sessilibus mediis subaequalibus, pinnulis lineari-ligulatis contiguis plus minus falcatis, imis majoribus saepe dilatatis, venulis simplicibus 6—12-jugis; soris medialibus.

Polypod.

Tabula nostra XXX. Fig. 9. 10. (pinnae).

Nephrodium patens Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 256. Hook. Sp. Fil. IV. 95. Hook. et Baker, Syn. Fil. 262.

Aspidium patens Swartz, Syn. Fil. 49. Willd. Sp. Plant. V. 244. Langsd. et Fisch. Ic. Fil. Bras. t. 15. Raddi, Fil. Bras. 32. t. 48. Mett. Fil. Hort. Lips. 90. Ettingsh. Farnkr. t. 120. fig. 5. t. 127. fig. 9., et Auctt.

Polypodium patens Swartz, Prodr. Fl. Ind. Occ. 133.

Lastrea patens Presl, Tent. 75. Moore, Ind. Fil. 99.

Nephrodium dissimile Schrad. Gött. Gel. Anz. 1824. p. 268.

Aspidium invisum Raddi, Fil. Bras. 32. (ex descriptione).

Aspidium albicaule et pauper Fée, VIII. Mem. 102—3.

Polypodium odorum Vell. Fl. Flum. XI. t. 78.

Polystichum patens et nymphale Gaud. Freyc. Voy. 329. 330.

Nephrodium Raddii Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 258?

CAUDEX suberectus vel breviter repens, PALEIS lanceolatis, ferrugineis membranaceis, 3—4 lin. longis vestitus. STIPITES stricti, 6—12 poll. longi. LAMINA supra glabruscula viridis, infra pallidior et plus minus breviter griseo-pubescentis, 1—3 pedes longa, 9—18 poll. lata, praeter apicem bipinnatifida. RACHIS straminea, stricta, saepe plus minus pubescentes. PINNAE contiguae, perfecte sessiles, 4—9 poll. longae, 6—12 lin. latae, PINNULIS acutis vel subobtusis integris 1½—2 lin. latis, inferiores mediis subaequales v. breviores et saepe deflexae. SORI parvi, medii inter costam et marginem, 6—10 pro serie. INDUSIUM membranaceum, hispidum vel subglabrum, subsistentis.

Var. β . STIPULARE Baker.

Plumier Fil. t. 23.

Aspidium stipulare Willd. Sp. Plant. V. 239.

Nephrodium stipulare Desv. Ann. Lin. Soc. Par. VI. 256.

Nephrodium conspersum Schrad. Gött. Gel. Anz. 1824. p. 869! (v. s. in Herb. Mart.).

Aspidium macrourum Kaulf. Enum. Fil. 239. Kunze, Linnaea IX. 93. Mett. Fil. Hort. Lips. 90. Pheg. et Asp. 87.

Nephrodium schizotis Hook. Sp. Fil. IV. 107.

Lastrea macroura, scabriuscula et Kohautiana Presl, Tent. 75.

Lastrea Leiboldiana et grossa Presl, Epim. 41.

Pinnulae imae pinnarum inferiorum plus minus dilatatae, saepe ovato-lanceolatae, profunde pinnatifidae.

Var. γ . INVISUM Baker.

Nephrodium invisum Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 257. Hook. et Baker, Syn. Fil. 263.

Polypodium invisum Sw. Fl. Ind. occ. III. 1672.

Aspidium invisum Sw. Syn. Fil. l. c., vix Raddi.

Lamina major (4—5 pedes longa), magis chartacea, supra nitida glaberrima, subtus ad venulas ciliata, pinnis 40—50-jugis interdum pedallibus, pinnulis imis reductis, venulis distinctis elevatis 15—18-jugis.

Filiæ per Americam tropicam et subtropicam, e Chile usque in Floridam divulgata incolit etiam Africam tropicam, Japoniam et insulas Oceanipacifici. Typus et var. β . intra Brasiliae limites observata sunt in provinciis S. Catharinae, S. Pauli, Rio de Janeiro, Espiritu Santo, Bahia, Minas Geraës, Goyaz: Gardner 5317! 5320!, Glaziov 389! 2359!, Burchell 1628!, Mart. Hb. Fl. Bras. 314! 390!, Blanchet 2635!, omnesque fere collectores; var. γ . prope Cajurú prov. S. Pauli: Regnell III. 1448!, etiam in Columbia (Lindig 335 etc.) et insulis Antillanis.

(4.) NEPHRODIUM LEPRIEURII Hook. stipitibus griseis sursum pubescentibus, frondibus chartaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis utrinque ad venas griseo-hispidis, pinnis 20—25-jugis lineari-ligulatis basi horizontaliter truncatis infraque glandulâ conspicuâ instructis, inferioribus sessilibus mediis subaequantibus, pinnulis lineari-ligulatis contiguis subfalcatis obtusis, imis paululum reductis, venulis simplicibus 10—15-jugis; soris medialibus.

Nephrodium Leprieurii Hook. Sp. Fil. IV. 106. (ex parte).
Hook. et Baker, Syn. Fil. 266.

Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES 12—18 poll. longi, erecti, stricti. LAMINA obscure viridis, praesertim infra et in venis griseo-hispida, 2—3 pedes longa, 9—12 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. RACHES strictae, griseae, molliter patenterque griseo-pubescentes. PINNAE contiguae, sessiles, inferiores 5—6 poll. longae, 15—16 lin. latae, ad costam anguste alatae pinnatifidae, imae deflexae vix reductae. PINNULAE 5—7 lin. longae, 2 lin. latae, imae pinnarum imarum paullulum reductae. VENULAE distinctae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. INDUSIUM parvum, membranaceum, ciliatum, persistens.

Habitat in paludosis Guianae gallicae (Leprieur!), in Guiana britannica (Appun 1269!), et in Peruvia orientali ad montem Campana (Spruce 4660!). — Probabiliter in Brasilia contermina adhuc inveniatur.

(5.) NEPHRODIUM SUBFUSCUM BAKER: stipitibus griseo-stramineis sursum breviter pubescentibus, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis utrinque sparse adpresse hispidis, pinnis 20—25-jugis lineari-ligulatis basi horizontaliter truncatis infraque glandulâ aculeiformi instructis, inferioribus sessilibus medias aequantibus, pinnulis lineari-ligulatis obtusis contiguus subpatentibus, imis haud reductis, venulis simplicibus 8—9-jugis; soris medialibus.

Nephrodium sulfuscum Baker in Hook. et Baker Syn. Fil. 267.

Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES erecti, stricti, 12—18 poll. longi. LAMINA supra obscure viridis, infra pallidior, 2—3 pedes longa, 10—12 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. RACHES strictae, griseo-stramineae, breviter griseo-pubescentes. PINNAE contiguae, sessiles, inferiores 5—6 poll. longae, 1 poll. latae, ad costam distincte alatae pinnatifidae, imae patentes haud reductae. PINNULAE 4—4½ lin. longae, 2 lin. latae. VENULAE immersae. SORI parvi, medium inter costam et marginem tenentes.

Habitat in Guiana gallica (Leprieur 23b!), forsan etiam in Brasilia amazonica.

6. NEPHRODIUM CHRYSOLOBUM FÉE: stipitibus fasciculatis stramineis nudis, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, supra subglabris, infra breviter glanduloso-pubescentibus, pinnis 10—15-jugis lineari-ligulatis profunde pinnatifidis basi horizontaliter truncatis, inferioribus breviter petiolatis medias subaequantibus, pinnulis lineari-oblongis contiguus, imis distincte reductis, venulis simplicibus 6—8-jugis; soris medialibus.

Nephrodium chrysolobum Fée, Gen. Fil. 305. Hook. et Baker, Syn. Fil. 262.

Aspidium chrysolobum Link, Sp. Fil. 102. Mett. Fil. Hort. Lips. 90. Pheg. et Aspid. 90.

Lastrea chrysoloba Presl, Tent. 75. J. Smith, Brit. et For. Ferns 155. Moore, Ind. Fil. 88.

Lastrea squamosa Klotzsch Mss.

Aspidium gemmiferum Moritz Mss.

CAUDEX erectus, PALEIS linearibus castaneis membranaceis 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES graciles, stricti, 4—6 poll. longi. LAMINA supra plene viridis, infra pallidior, interdum in costis paullulum paleacea, 6—12 poll. longa, 4—5 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. RACHES graciles, stramineae, breviter griseo-glanduloso-pubescentes. PINNAE inferiores patentes, 2—2½ poll. longae, 6—7 lin. latae, breviter petiolatae, acutae, lateribus deorsum ad alam angustam vel interdum ad costam dissectae, PINNULIS patentibus 1 lin. latis subintegris vel denticulatis, imae mediis subaequales saepe deflexae. VENULAE modice laxae. SORI medii inter costam et marginem. INDUSIUM parvum, membranaceum, cito evanescens.

Habitat in prov. Bahia: Blanchet, et in prov. Rio de Janeiro: Caley!, Sello!; item in Columbia. Species in hortis Europaeis e longinquo culta. — *Dryas* et *Extrabras*.

7. NEPHRODIUM CARIPENSE Hook: stipitibus fasciculatis stramineis deorsum dense supra sparse paleaceis, frondibus papyraceo-herbaceis utrinque glabriusculis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis 20—30-jugis lineari-ligulatis basi recte truncatis, inferioribus distincte petiolatis medias subaequantibus, pinnulis subpatentibus, imis utrinque reductis, venulis simplicibus 9—12-jugis; soris medialibus.

Nephrodium caripense Hook. Sp. Fil. IV. 99. Hook. et Baker, Syn. Fil. 265.

Polypodium caripense Willd. Sp. Plant. V. 202. H.B.K. Nov. Gen. I. 11., non Kaulf.

Aspidium caripense Metten. Fil. Hort. Lips. 90. Pheg. et Asp. 90. Ettingsh. Farnkr. t. 123. fig. 1. 8.

Polypodium submarginale Langsd. et Fisch. Ic. 12. t. 13. Willd. Sp. Plant. V. 202. Lowe, Ferns 2. t. 49.

Polypodium distans Kaulf. Enum. Fil. 113.

Nephrodium tarapotense Hook. Sp. Fil. IV. 107.

Aspidium inaequale Schrad. Mss., non Schlecht.

CAUDEX erectus, PALEIS linearibus teneris membranaceis 5—6 lin. longis dense vestitus. STIPITES 12—24 poll. longi, stricti, deorsum dense paleacei, sursum paleis parvis furfuracei. LAMINA utrinque obscure viridis nitida, interdum infra in costis paullulum paleacea, 1½—2 pedes longa, 8—12 poll. lata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. PINNAE contiguae, 5—6 poll. longae, 9—12 lin. latae, ad costam anguste alatae pinnatifidae. PINNULAE contiguae, 4—5 lin. longae, 1½—2 lin. latae, obtusae, subintegrae, inferiores pinnarum imarum utrinque reductae. VENULAE graciles, distinctae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. INDUSIUM parvum, membranaceum, cito evanescens.

Per totam fere Brasiliam, Uruguayam (Gibert!), Peruviam et Columbiam disseminata. In prov. S. Catharina: Langsdorff; Rio de Janeiro, Corcovado, Serra dos Orgãos: Martius, Glaziou 963! 1680! 2368! 2370—1! etc.; Epiritu Santo, in sylvis ad fl. Mucuri: Princ. Neuwied!; prov. Bahia: Blanchet, Martius!; Minas Geraes in sylvis primaevis ad Caldas: Lindberg 559!, Regnell I. 475!; Goyaz ad Limeiro: Pohl; Ceara, Serra de Araripe: Gardner 1900! — *Vaga* et *Extrabras*.

8. NEPHRODIUM FALCICULATUM Desv. stipitibus fasciculatis stramineo-brunneis infra dense supra sparse paleaceis et breviter ferrugineo-pubescentibus, frondibus herbaceis oblongo-deltaoideis bipinnatifidis dense breviterque ferrugineo-pubescentibus, pinnis 12—18-jugis lineari-ligulatis basi recte truncatis, inferioribus distincte petiolatis medias subaequantibus, pinnulis profundis falciculatis, imis distincte reductis, venulis simplicibus 7—10-jugis; soris medialibus.

Tabula nostra XLVI. Fig. IIIA. (analysis).

Nephrodium falciculatum Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 241. Hook. Sp. Fil. IV. 102. Hook. et Baker, Syn. Fil. 264.

Aspidium falciculatum Raddi, Fil. Bras. 31. t. 47. Mett. Pheg. et Asp. 91.

Lastrea falciculata Presl, Tent. 75. Moore, Ind. Fil. 91.

Aspidium mucronatum et *ferrugineum* Beyrich Mss.

Lastrea mucronata Presl, Tent. 75. Epim. 37.

Aspidium Schottianum Kunze Mss.!

Polypodium lanuginosum Vell. Fl. Flum. XI. t. 70.

CAUDEX erectus, PALEIS rigidis densis castaneis lineari-subulatis 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES 6—12 poll. longi. LAMINA saturate viridis, 9—15 poll. longa, 6—8 poll. lata, utrinque pubescentia brevi

densa ferruginea et infra interdum ad costas paleis paucis minutis vestita, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. RACHES stramineo-castaneae, pubescentes et sparse paleaceae. PINNAE contiguae, 3—4 poll. longae, 10—12 lin. latae, ad costam anguste alatum pinnatifidae; PINNULAE contiguae, 5—6 lin. longae, 2 lin. latae, obtusae vel subcutae, integrae vel leviter denticulatae, imae pinnarum imarum insigniter reductae. VENULAE graciles, immersae. SORI mediocres, medii inter costam et marginem. INDUSIUM membranaceum, ciliatum, cito evanescens.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad Manaos, olim Barra do Rio Negro, in sylvis: Martius; in prov. Rio de Janeiro, Serra d'Estrella etc.: Raddi, Martius, Burchell 788!; Pohl, Glaziou 957! 1658!, Sello!, Schott, et alii collectores; in prov. S. Catharina: Macrae!, Barclay!; extra Brasiliam per terras inde e Peruvia usque ad Mexicum.

9. NEPHRODIUM RAMENTACEUM BAKER: stipitibus et rachibus paleis linearibus et fibrillosis ferrugineis squarrosis membranaceis dense vestitis, frondibus herbaceis utrinque densissime brevissimeque pubescentibus et infra ad costas fibrilloso-paleaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis ligulatis 20—25-jugis sessilibus basi recte truncatis usque ad costam distincte alatum pinnatifidis, pinnulis ligulatis integris obtusis, venulis simplicibus 10—12-jugis; soris intramedialibus.

CAUDEX suberectus, PALEIS lineari-subulatis et piliformibus ferrugineis densis membranaceis 6—9 lin. longis sursum vestitus. STIPITES fasciculati, 12—18 poll. longi, paleis similibus sed brevioribus squarrosis densissimis persistentibus omnino occulti. LAMINA plene viridis, 1½—2 pedes longa, 10—15 poll. lata; PINNAE contiguae, horizontales, inferiores 5—8 poll. longae, 12—14 lin. latae, deorsum ad costam distincte alatum pinnatifidae, imae paullulum reductae. PINNULAE contiguae, leviter ascendentes, 4—5 lin. longae, 2 lin. latae, imae pinnarum imarum solum leviter reductae. SORI mediocres, costae magis quam ad marginem approximati. INDUSIUM membranaceum, breviter pubescens, cito evanescens.

Inter *N. falciculatum* et *velleum* nob. medium tenens; ad prius habitu, texturam, pubescentiam accedens, cum *velle* stipitibus et rachibus dense paleaceo-vestitis congruit.

Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou 2369! — Dryas.

Obs. Vidimus etiam specimina in Herb. Gayano, ex horto Willinkii (Amstelodamae) sub nomine *Aspidii vestiti* provenientia.

10. NEPHRODIUM VESTITUM BAKER: stipitibus fasciculatis stramineo-brunneis dense paleaceis et adpresse ferrugineo-lanosis, frondibus papyraceo-herbaceis oblongo-deltaeoidis bipinnatifidis supra subglabris infra praecipue ad costas dense paleaceis, pinnis 12—18-jugis lineari-ligulatis basi recte truncatis, inferioribus distincte petiolatis medias subaequantibus, pinnulis profundis falciculatis, imis distincte reductis, venulis simplicibus 7—10-jugis; soris ad costas approximatis.

Tabula nostra XXIX. Fig. 11. 12. (pinnae).

Nephrodium vestitum Baker in *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 265.

Polypodium vestitum Raddi, *Fil. Bras.* 24. t. 36. Kunze, *Flora Ratisbon.* 1839. I. 35.

Lastrea vestita Moore, *Ind. Fil.* 102.

Polypodium deflexum Kaulf. *Enum. Fil.* 114.

Aspidium Raddianum Metten. *Pheg. et Asp.* 91. *Ettingsh. l. c. tab. 116. fig. 8. tab. 122. fig. 7.*

Nephrodium Raddianum Hook. *Sp. Fil.* IV. 98. t. 245.

CAUDEX erectus, PALEIS castaneis membranaceis linearibus parvis vestitus. STIPITES 6—9 poll. longi, valde sulcati, toti lana ferruginea subadpressa et paleis parvis castaneis linearibus densissime vestiti. LAMINA supra saturate viridis subglabra, infra pallidior et paleis ovatis bullatis vel lanceolatis membranaceis parvis praecipue ad costas vestita, 12—18 poll. longa, 6—9 poll. lata, praeter apicem pinnatifidum bipinnatifida. RACHES ut stipites dense vestitae. PINNAE 3—4 poll. longae, 9—12 lin. latae, contiguae, basi recte truncatae, ad alam angustam vel inferne usque ad costam dissectae. PINNULAE contiguae, 5—6 lin. longae, 2 lin. latae, subintegerrimae, imae pinnarum imarum distincte reductae. SORI parvi; INDUSIUM membranaceum, ciliatum, cito evanescens.

Var. β . SQUAMIGERUM Baker.

Aspidium squamigerum Metten. *Mss. in Herb. Hooker.*

Stipites straminei, subnudi, pedales, rachis et lamina infra multo minus vestitae, pinnae longiores (inferiores 4 poll. attingentes), pinnulae numerosiores angustiores (1½ lin. latae) insigniter falcatae, sori minus ad costam approximati.

Varietas ad *A. nitidum* Bory, Africae incolam, accedens.

In *umbrosis sylvarum udarum prov. Rio de Janeiro, Espiritu Santo et Bahia: Raddi, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 324, Pohl, Milne!, Bowie et Cunningham!, Mac Gillieray!, Glaziou 965! 2373—4! etc. Var. β . ad Catdas prov. Minas Geraes; Lindberg 557! — Dryas, Oreas.*

11. NEPHRODIUM ALSOPHILACEUM BAKER: stipitibus griseo-stramineis basi sparse paleaceis, frondibus chartaceis utrinque glabris ovato-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis laxis 9—15-jugis ligulato-lanceolatis basi recte truncatis, inferioribus distincte petiolatis quam mediae paulo brevioribus, pinnulis leviter falcatis, imis utrinque distincte reductis, venulis simplicibus 9—10-jugis; soris medialibus.

Aspidium alsophilaceum Kunze in *Regensb. Flora* 1837. I. 320. Metten. *Pheg. et Asp.* 90. *Ettingsh. Farnkr. t. 121. fig. 1. 3. 5. 8.*

Lastrea tenuifolia Presl, *Epim.* 37.

Polypodium aspidioides Presl in *herb. Kunze, teste Metten. loc. cit., nec tamen in Del. Prag. I. 170. quod ad Aspidium aculeatum β . phegopteroides pertinet.*

Lastrea aspidioides Moore, *Ind. Fil.* 85., non Presl.

Caudicem non vidi. PALEAE lineari-subulatae, castaneae, 6—8 lin. longae. STIPITES erecti, stricti, 9—15 poll. longi. LAMINA utrinque obscure viridis, 2—3 pedes longa, 9—15 poll. lata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. RACHIS stricta, straminea, paleis minimis castaneis subulatis sparse vestita. PINNAE 5—8 poll. longae, 10—14 lin. latae, profunde pinnatifidae, inferiores patentes petiolo 2—2½ lin. longo instructae. PINNULAE contiguae, obtusae, subintegerrimae, 5—6 lin. longae, 2—2½ lin. latae. VENULAE laxae, distinctae, omnes simplices. SORI parvi, medii inter costam et marginem. INDUSIUM membranaceum, glabrum, cito evanescens.

Habitat prope urbem Para in sylvis primaevae: Martius; in prov. Sebastianopolitana ad montem Corcovado etc.: Martius, Gardner 16!, Pohl, Beyrich, Bowie et Cunningham! etc.; et in prov. S. Catharina: Barclay! — Dryas, Najas.

12. NEPHRODIUM GARDNERIANUM BAKER: stipitibus stramineis gracilibus epaleaceis breviter griseo-pubescentibus, frondibus chartaceis utrinque praecipue ad costas distincte ciliatis v. griseo-pubescentibus ovato-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis sublaxis lanceolatis 8—10-jugis basi recte truncatis, inferioribus distincte petiolatis quam mediae paulo brevioribus, pinnulis leviter falcatis, imis utrinque distincte reductis, venulis simplicibus 8—10-jugis; soris medialibus.

Aspidium Gardnerianum Kunze Mss. in *Herb. Martii!*, non Metten. *Pheg. et Asp.* 71. (quod ad *N. membranifolium Preslii* spectat).

Caudicem et paleas basales non vidi. STIPITES erecti, stricti, 6—8 poll. longi, sursum breviter pubescentes. LAMINA obscure viridis, 12—15 poll. longa, 6—8 poll. lata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. RACHIS gracilis, stricta, straminea, breviter griseo-pubescentis. Apex frondis lanceolatus, laciniis numerosis contiguis lanceolatis integris basi confluentibus. PINNAE solutae in medio frondis $2\frac{1}{2}$ —3 poll. longae, 10—11 lin. latae, acumine longo subintegerrimo instructae, lateribus usque ad alam $1-1\frac{1}{2}$ lin. latam dissectae, imae deflexae mediis paulo breviores. PINNULAE $4-4\frac{1}{2}$ lin. longae, $2-2\frac{1}{2}$ lin. latae, subacutae, subintegerrimae, imae pinnarum imarum utrinque distincte reductae. VENULAE distinctae, omnes simplices. SORI parvi, medii inter costam et marginem. INDUSIUM parvum, subsistentis, ciliatum.

Habitat in Serra dos Orgãos sylvis umbris humidis: Gardner 190! — *Dryas*.

13. NEPHRODIUM CTENITIS BAKER: stipitibus paleis nigrescentibus et ferrugineis prorsus vestitis, frondibus chartaceis ovato-lanceolatis bipinnatifidis, supra breviter ferrugineo-pubescentibus, infra ad costas nigro-paleaceis, pinnis lineari-ligulatis basi recte truncatis, inferioribus distincte petiolatis medias subaequantibus, pinnulis obtusis denticulatis vel subintegris, imis distincte reductis, venulis simplicibus 15-jugis; soris intramedialibus.

Nephrodium Ctenitis Baker in *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 265.

Aspidium Ctenitis Link, *Fil. Hort. Berol.* 101. Metten. *Pheg. et Aspid.* 91.

Lastrea Ctenitis Moore, *Ind. Fil.* 89.

Aspidium demissum Kunze Mss. (forma pinnulis subintegris).

Aspidium pellucidum Beyrich Mss.

Species nobis nondum visa, quamobrem descriptionem b. METTENII repetimus. „FOLIA coriacea vel subcoriacea. Petiolus (STIPES) $1\frac{1}{4}$ (pedes?) longus, e basi ad apicem paleis nigrescentibus, basi ciliatis, aliisque ferrugineis multifido-laceris obsitus. LAMINA 2 pedes longa, ovata, pinnatisecta. SEGMENTA (pinnae nob.) e basi versus apicem decrescens, petiolulo 2—3 lin. longo imposita, infra ad costam paleis nigrescentibus adspersa, supra pills ferrugineis breviter tomentosa, infima 8—9 poll. longa, 15—18 lin. lata, e basi subcordata elongato-oblonga, sensim attenuata, acuminata, profunde pinnatifida, apice serrulata vel subintegra. LACINIAE (pinnulae nob.) oblongae vel elongato-oblongae, superne paullulum dilatatae, obtusae, serratae, lateris inferioris adhaerentes, basales basi attenuatae, subdistinctae, proximae subdistantes, ala angustissima confluentes, sinibus rotundatis vel dilatatis distinctae, superiores approximatae, sensim decrescens, oblongae, subfalcatae, obtusae; NERVI tertiarum utrinque 15, infimi supra sinum marginem attingentes; SORI costulae laciniarum potius quam margini approximati; INDUSIUM reniforme, subcoriaceum, glabrum, rufescens, persistens.“

Habitat in prov. Rio de Janeiro ad Matthias Ramos et in Serra d'Agua: Pohl. — *Dryas*.

14. NEPHRODIUM TETRAGONUM HOOK. stipitibus griseo-stramineis sursum paullulum pubescentibus, frondibus subchartaceis ovato-lanceolatis bipinnatifidis, supra glabriusculis saturate viridibus, infra pallidioribus ad nervos ciliatis, pinnis contiguis 15—20-jugis lineari-ligulatis, inferioribus sessilibus deflexis quam mediae paullulum brevioribus, pinnulis obtusis leviter falcatis, inferioribus utrinque distincte reductis, venulis simplicibus 10—12-jugis; soris medialibus.

Tabula nostra XXXI. Fig. 2. (pinna, lapsu sub titulo *N. lugubre*).

Nephrodium tetragonum Hook. *Sp. Fil.* IV. 103. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 266.

Aspidium tetragonum Mett. *Pheg. et Asp.* 95.

Lastrea tetragona Presl, *Tent.* 76?

Aspidium setosum Klotzsch, *Linnaea* XX. 371.

Aspidium lugubre Mett. *Pheg. et Asp.* 94. Ettingsh. *Farnkr. tab.* 126. fig. 3—5.

Polypodium lugubre Kunze Mss.

CAUDEX lignosus, erectus, PALKIS lanceolatis ferrugineis membranaceis 3—4 lin. longis vestitus. STIPITES fasciculati, stricti, nitidi, 8—12 poll. longi. LAMINA $1\frac{1}{2}$ —2 pedes longa, 8—10 poll. lata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. RACHIS griseo-straminea, stricta, paullulum pubescens. PINNAE mediae horizontaliter patentes, 4—5 poll. longae, 9—10 lin. latae, usque ad alam $1-1\frac{1}{2}$ lin. latam pinnatifidae, basi recte truncatae, omnes sessiles. PINNULAE contiguae, subintegerrimae, $4-4\frac{1}{2}$ lin. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae, inferiores pinnarum imarum insigniter reductae. SORI parvi, medii inter costam et marginem. INDUSIUM parvum, ciliatum, cito evanescens.

Habitat ad Caldas in prov. Minarum: Lindberg 558!, Regnell III. 1450!; in monte Corcovado aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Pohl, Burchell 2568!, Glaziou 962!; et inde e Peruvia usque ad Guatemalam. — *Dryadi-Oreas et Extrabrazil.*

15. NEPHRODIUM TRISTE HOOK. stipitibus griseis nudis, frondibus chartaceis utrinque glabriusculis ovato-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis 15—20-jugis lineari-ligulatis plerisque distincte petiolatis, basi utrinque subintegerrima anguste cuneata, imis medias aequantibus, pinnulis subintegerrimis leviter falcatis, venulis simplicibus 12—15-jugis; soris medialibus.

Tabula nostra XXXI. Fig. 1. (pinnae pars).

Nephrodium triste Hook. *Sp. Fil.* IV. 104. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 266.

Polypodium triste Kunze in *Linnaea* IX. 47.

Aspidium triste Metten. *Pheg. et Asp.* 94. Ettingsh. l. c. t. 122. fig. 4.

Aspidium monostichum Metten. l. c.

Aspidium monosorum Kunze Mss.

Lastrea monosora Presl, *Epim.* 36.

Polypodium monosorum Presl, *Tent.* 181.

Caudicem et paleas basales non vidi. STIPITES stricti, 12—18 poll. longi. LAMINA utrinque saturate viridis glabriuscula vel infra ad costas breviter ciliata, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes longa, 10—12 poll. lata, praeter apicem pinnatifidum bipinnatifida. PINNAE subcontiguae, mediae subpatentes, 5—6 poll. longae, 12—18 lin. latae, usque ad costam $1-2$ lin. latam pinnatifidae, cum inferioribus distincte petiolatae. PINNULAE contiguae, obtusae vel subacutae, 4—6 lin. longae, 2—3 lin. latae, inferiores supra basin cuneatam paullulum reductae. SORI parvi, medii inter costam et marginem; INDUSIUM parvum, ciliatum, cito evanescens.

In prov. Rio de Janeiro ad Matthias Ramos et in prov. Goyaz: Pohl; in prov. S. Pauli, e. gr. ad Rio das Pedras: Burchell 3065! 3858!; in Guyana batava (Hostmann 466!), et in Peruvia et Columbia. — *Dryadi-Oreas et Extrabrazil.*

16. NEPHRODIUM CONTERMINUM DESV. stipitibus fasciculatis brevibus griseo-stramineis epaleaceis paullulum pubescentibus, frondibus chartaceo-herbaceis lanceolatis utrinque attenuatis bipinnatifidis, supra glabriusculis, infra breviter griseo-pubescentibus, pinnis 30—40-jugis omnino sessilibus e basi ad apicem sensim attenuatis, inferioribus multis decrescens, imis distantibus auriculiformibus, pinnulis lineari-vel deltoideo-oblongis, imis majoribus, venulis 4—9-jugis simplicibus; soris intramarginalibus, indusiis evanescentibus.

Tabula nostra XXX. Fig. 3. (pinnae).

Nephrodium conterminum Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 255. Hook. Sp. Fil. IV. 91. Hook. et Baker, Syn. Fil. 268.

Aspidium conterminum Willd. Sp. Plant. V. 249. Metten. Pheg. et Asp. 78.

Polystichum conterminum Gaud. Freyc. Voy. 328.

Lastrea contermina Presl, Tent. 75. Moore, Ind. Fil. 88.

Polypodium rivulorum Raddi, Fil. Bras. 23. t. 35.

Aspidium rivulorum Link, Sp. Fil. 102. Metten. Fil.

Hort. Lips. 89. Pheg. et Asp. 80.

Polypodium subulatum Vell. Fl. Flum. XI. t. 67.

Nephrodium panamense Presl, Rel. Haenk. I. 35.

Aspidium polyphyllum Kaulf. Enum. Fil. 238.

Aspidium (*Oochlamys*) *pachychlamys* et *strigosum* Fée, Fil. Ant. tab. 21—2., et synonyma alia.

CAUDEX CRASSUS erectus interdum altitudinem 1 ped. attingens, PALEIS linearibus brunneis membranaceis 2—3 lin. longis sparse vestitus. STIPITES dense caespitosi, graciles, 3—4 poll. longi, glabri vel sursum breviter pubescentes. LAMINA supra saturate viridis, plq. praeter costas glabriuscula, infra breviter et inconspicue griseo-pubescentis, 1—2 pedes longa, 6—8 poll. lata, utrinque sensim attenuata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. RACHIS griseo-straminea, paullulum pubescens. PINNAE mediae 3—4 poll. longae, deorsum 5—6 lin. latae, basi recte truncatae, interdum infra glandulâ instructae. PINNULAE in medio pinnae 1½—2 lin. longae, obtusae vel subacutae, subintegerrimae, leviter falcatae, inferiores accrescentes, imae maximae lineari-oblongae 2½—3 lin. longae. VENAE omnes simplices 4—6- vel pinnularum imarum 8—9-jugae. SORI conferti, margini potius quam costae approximati. INDUSIUM obsoletum vel cito evanescens.

Var. β. OLIGOCARPUM Baker.

Tabula nostra XXIX. Fig. 9. 10. (pinnae).

Polypodium oligocarpum Willd. Sp. Plant. V. 201. Klotzsch, Linnaea XX. 385. Kunze, ibidem XXIII. 320.

Aspidium oligocarpum H.B.K. Nov. Gen. I. 13. Metten. Fil. Hort. Lips. 90. Pheg. et Asp. 77.

Nephrodium oligocarpum Hook. Sp. Fil. IV. 90.

Polypodium retusum Swartz, Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 61.

Polypodium pubescens Raddi, Fil. Bras. 23. t. 34.

Polypodium leptosorum Kunze, Linnaea l. c.

Polypodium consanguineum et *oligosorum* Klotzsch, Linnaea XX. 387.

Aspidium (*Oochlamys*) *Rivoirei* Fée, Fil. Ant. t. 21. fig. 3., et synonyma multa alia.

Lamina magis herbacea et plerumque etiam magis pubescens. Raches interdum dense villosae. Pinnae aequaliter sessiles, magis ligulatae. Pinnulae longiores, angustiores, 3—4 lin. longae, saepe aegre ultra 1 lin. latae, lateribus subparallelis, acutae vel obtusae, imae minus productae, pinnarum imarum saepe paullulum reductae.

Obs. Typus et varietas ex iconibus bonis Raddianis valde diversae videntur, formis tamen intermediis arte coherent. Descriptio *A. Kaulfussii* Link, plantae ad Brasiliam adscriptae, a. b. METTENIO in Fil. Hort. Lips. 90 proposita omnino cum var. β. nostra congruit, praeter „indusium coriaceum persistens“, sed specimen Antillanum autographum in Herb. Kewensi asservatum ad plantam nostram pertinet.

Habitat speciei typus in tota America tropica. Intra Brasiliae limites in prov. Rio Grande do Sul: Tweedie!; prov. S. Catharina: Fox!, Fritz Müller!; S. Paulo: Burchell 4177!; Rio de Janeiro: Raddi!, Pohl, Princ. Newwied!, Burchell 1747! 2301!, Gardner 28!, Glaziou 391! 2358! 2360—1! 2364—5! etc.; Minas Geraës: Bunbury!, Burchell 6056!, Freyreiss!, Lindberg 552! 555!, Gardner

Polypod.

5316! 5318!, Regnell III. 1446! etc.; prov. Bahia et Piahy: Martius; Goyaz: Pohl, Burchell 7260! — Var. β. in prov. S. Catharinae: Barclay!; Rio de Janeiro, Serra d'Estrella: Raddi, Burchell 3706!; Minas Geraës: Pohl, Gardner 5319!, Warming!; Guyana britannica: Appun 1138! — Vaga et Extrabrazil.

17. NEPHRODIUM PALUSTRE BAKER: stipitibus stramineis nudis, frondibus herbaceis glabris oblongo-lanceolatis bipinnatifidis utrinque attenuatis, pinnis 30—40-jugis lineari-ligulatis omnino sessilibus erecto-patentibus, inferioribus ad aurículas decrescentibus, pinnulis lineari-oblongis integris falcatis, imis reliquis aequalibus, venulis simplicibus 6—8-jugis; soris medialibus medio-cribibus.

Nephrodium palustre Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. 270.

Aspidium palustre Metten. Mss. in herb. Kew.

Caudicem et paleas nondum vidi. STIPITES nitide straminei, modice validi, 6—12 poll. longi. LAMINA gramineo-viridis, 2—2½ pedes longa, 8—10 poll. lata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. RACHIS nitida, nuda, straminea. PINNAE contiguae, erecto-patentes, mediae 4—5 poll. longae, 8—9 lin. latae, usque ad costam anguste alatum dissectae, basi recte truncatae, inferiores laxiores et ad aurículas sensim reductae. PINNULAE 3—4 lin. longae, 1 lin. latae, acutae, imae reliquis aequales vel paullulum longiores. SORI totam latitudinem pinnularum inter costam et marginem paene occupantes. INDUSIUM membranaceum, ciliatum, sub-persistens.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas, in fossa aqua impleta: Lindberg 633! — Oreas.

18. NEPHRODIUM SPRENGELII Hook. stipitibus stramineis nudis, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis bipinnatifidis, supra glabris, infra minute glandulosis et griseo-pubescentibus, pinnis 30—40-jugis lineari-ligulatis omnino sessilibus, inferioribus decrescentibus, imis auriculiformibus deflexis, pinnulis anguste lineari-ligulatis integris, imis reliquis subaequantibus, venulis 10—12-jugis simplicibus; soris medialibus parvis.

Nephrodium Sprengelii Hook. Sp. Fil. IV. 94. Hook. et Baker, Syn. Fil. 268.

Aspidium Sprengelii Kaulf. in Regensb. Flora 1823. p. 365. Enum. Fil. 239. Metten. Pheg. et Asp. 81.

Lastrea Sprengelii Presl, Tent. 75. Moore, Ind. Fil. 104.

Aspidium glanduliferum Karsten et Klotzsch in Linnaea XX. 369.

Polypodium Balbisi Spreng. Nov. Act. Nat. Cur. X. pars I. 228.

Aspidium (*Oochlamys*) *Berteroanum* Fée, Fil. Ant. t. 21. fig. 3.

Caudicem et paleas non vidi. STIPITES 6—9 poll. longi, nitidi, epaleacei, glabri. LAMINA gramineo-viridis, 2—4 pedes longa, 10—15 poll. lata, praeter apicem pinnatifidum bipinnatifida. RACHIS stricta, nitide straminea, subnuda. PINNAE subcontiguae, mediae horizontaliter patentibus, 5—8 poll. longae, 10—12 lin. latae, ad costam anguste alatum pinnatifidae, basi recte truncatae et subtus glandulâ conspicuâ instructae. PINNULAE 4—5 lin. longae, 1 lin. latae, subacutae, leviter falcatae, imae reliquis aequalibus vel paullulum longiores. SORI medii inter costam et marginem. INDUSIUM parvum, tenerrimum, ciliatum, cito evanescens.

Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou 390! 2367!, itemque in Guatemala et insulis Antillanis (Sieber Hb. Martin. 355! etc.). — Dryas et Extrabrazil.

19. NEPHRODIUM TRICHOPHORUM BAKER: stipitibus segregatis griseis sursum breviter pubescentibus basi solum paleaceis, frondibus chartaceo-herbaceis supra glabris infra ad venas ciliatis ovato-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis 12—16-jugis sessilibus ligulato-lanceolatis basi recte truncatis, inferioribus reductis, pinnulis ligulatis leviter falcatis, imis reductis, venulis simplicibus 8—10-jugis; soris medialibus magnis, indusiis persistentibus hispidis.

Nephrodium trichophorum Baker in Hook. et Baker, -Syn. Fil. 265.

Aspidium trichophorum Fée, Fil. Antill. t. 23.

CAUDEX lignosus, distincte repens, sursum paleis membranaceis lanceolatis 2—2½ lin. longis vestitus. STIPITES erecti, stricti, 12—18 poll. longi, sursum dense breviter griseo-tomentelli. LAMINA superne obscure, infra plene viridis, ad costas et venas griseo-ciliata, 12—18 poll. longa, deorsum 7—9 poll. lata. RACHIS primaria stricta, dense griseo-tomentella. PINNAE superiores subcontiguae, inferiores laxiores, imae reflexae et plus minus reductae, illae 3½—4½ poll. longae, 10—11 lin. latae, basi utrinque recte truncatae, ad costam anguste alatum pinnatifidae, PINNULIS 1¼—1½ lin. latis, imis utrinque sensim reductis. VENULAE semper simplices. SORI paene totam latitudinem pinnularum occupantes. INDUSIUM membranaceum, brunneum, dense griseo-hispidum.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming!, et praeterea in insulis Antillanis. — Oreas et Extrabrasil.

20. NEPHRODIUM FISCHERI BAKER: stipitibus brevibus nudis stramineis, frondibus chartaceis lanceolatis bipinnatifidis utrinque angustatis glaberrimis, pinnis 12-jugis contiguis lanceolatis, inferioribus breviter petiolatis sensim decrescentibus, imis distantibus auriculiformibus, pinnulis lineari-oblongis, imis reductis, venulis 4—6-jugis simplicibus; soris medialibus.

Aspidium Fischeri Metten. Pheg. et Asp. 80.

Aspidium obscurum Fisch. et Meyer, Ann. Sc. Nat. II. Ser. V. 128. Kunze, Linnaea XXIII. 301., non Blume.

Lastrea obscura Moore, Ind. Fil. 98.

CAUDEX erectus. STIPITES fasciculati, 2—3 poll. longi. LAMINA saturate viridis, 6—8 poll. longa, 2½—3 poll. lata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. RACHIS stricta, straminea, glabra, deorsum inconspicue adpresse paleacea. PINNAE mediae 1½ poll. longae, 6 lin. latae, acutae, ad costam anguste alatum pinnatifidae, breviter petiolatae. PINNULAE 2½ lin. longae, 1—1¼ lin. latae, contiguae, integrae, leviter falcatae, imae pinnarum imarum distincte reductae. SORI conferti, totam latitudinem pinnularum inter costam et marginem paene occupantes. INDUSIUM griseum, glabrum, persistens.

In Brasilia indigenum in Horto Caes. bot. Petropolitano colitur, testibus Fisch. et Mey. loc. cit., ceteroquin haud cognitum, nec mihi in speciminibus autochthonis visum.

21. NEPHRODIUM PTARMICA BAKER: stipitibus nudis brunneis, frondibus chartaceo-herbaceis glabriusculis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis bipinnatifidis, pinnis 20-jugis contiguis lineari-ligulatis, inferioribus breviter petiolatis, imis insigniter reductis, pinnulis lineari-oblongis, imis decrescentibus, venulis 4—6-jugis simplicibus; soris medialibus.

Aspidium Ptarmica Kunze Mss. Metten. Pheg. et Asp. 80. *Lastrea Ptarmica* Moore, Ind. Fil. 101.

Caudicem non vidi. PALEAE lanceolatae, membranaceae, brunneae, 2—3 lin. longae. STIPITES 4—5 poll. longi, stricti, basi paleacei, ceterum glabri. LAMINA saturate viridis, utrinque glabriuscula, 8—12 poll. longa, 4—5 poll. lata, apice pinnatifido excepto bipinnatifida. PINNAE mediae 2—2½ poll. longae, 4½—5 lin. latae, breviter petiolatae, imae paucae laxiores et insigniter reductae. PINNULAE contiguae, 1½—2 lin. longae,

1 lin. latae, integrae, leviter falcatae, obtusae vel subacutae, imae pinnarum imarum distincte reductae. SORI conferti, totam latitudinem pinnularum inter costam et marginem paene occupantes. INDUSIUM glabrum, cito evanescens.

Habitat in Serra d'Estrella prov. Rio de Janeiro: Martius; et in Serra dos Orgãos: Gardner 113! — Dryas.

22. NEPHRODIUM FILIX-MAS RICH. stipitibus fasciculatis rachibusque paleis ferrugineis lineari-subulatis membranaceis prorsus obtectis, frondibus herbaceis supra nudis infra ad costas primarias leviter paleaceis oblongo-lanceolatis bipinnatis, pinnis 20—40-jugis sessilibus ligulatis contiguis, inferioribus paulo reductis, ad costam vel alam angustam dissectis, pinnulis confertis ligulatis obtusis parallelis subintegris, venulis pinnularum 6—8-jugis plerisque furcatis; soris subcostularibus.

Nephrodium Filix-mas Rich. Cat. Jard. Médec. Paris. 1801. p. 120. Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 260. Hook. Syn. Fil. IV. 116. Brit. Ferns. t. 15. Fil. Exot. t. 98., et Auct.

Polypodium Filix-mas Linn. Sp. Plant. 1551.

Aspidium Filix-mas Swartz, Syn. Fil. 55. Schkuhr, Crypt. t. 44.

Lastrea Filix-mas Swartz, Presl Tent. 76.

Forma brasiliensis:

Aspidium parallelogrammum Kunze, Linnaea XIII. 146. A. Braun in Regensb. Flora 1841. p. 710.

Aspidium crinitum Mart. et Gal. Foug. Mex. 67. t. 17. fig. 2.

CAUDEX lignosus, erectus. PALEAE basales densae, lineares, membranaceae, ferruginae, 6—9 lin. longae. STIPITES erecti, straminei, 4—9 poll. longi, paleis iis caudicis similibus sed angustioribus patentibus dense vestiti. LAMINA supra plene viridis nuda, infra pallidior et ad costas pinnarum paulo paleacea, 1½—2 pedes longa, 8—12 poll. lata. RACHIS primaria straminea, glabra, stricta, paleis lineari-subulatis saturate ferrugineis patentibus 2—3 lin. longis prorsus obtecta. PINNAE confertae, parallelae, e basi truncata in apicem acuminatum angustatae, mediae 4—6 poll. longae, deorsum 8—12 lin. latae, inferiores paulo reductae, omnes usque ad costam vel alam angustam pinnatim dissectae, PINNULIS subrectis obtusis extrorsum leviter denticulatis, inferioribus 4—6 lin. longis, 2 lin. latis. VENAE pinnularum regulariter pinnatae. SORI 8—12 pro lacinia, ad costam approximati. INDUSIUM glabrum, firmum, convexum.

Species cosmopolita, praecipue in regionibus temperatis veteris orbis divulgata, in Brasilia rarissima. Observata est in sylvis Serra dos Orgãos: Gardner 5944!, Glaziou 2823!, et ad Caldas prov. Minarum: Regnell III. 1451!. — Oreadi-Dryas et Extrabras.

23. NEPHRODIUM PATULUM BAKER: stipitibus fasciculatis glabris stramineis, frondibus herbaceis pallide viridibus ovato-lanceolatis tri- vel quadripinnatifidis utrinque glabris, pinnis 12—18-jugis, inferioribus breviter petiolatis inaequaliter lanceolato-deltaeoides medias subaequantibus, pinnulis sessilibus inaequaliter lanceolatis vel oblongo-ligulatis dentatis vel pinnatifidis obtusis vel acutis, venis in laciniiis ultimis pinnatis, venulis inferioribus furcatis; soris prope costas utrinque laxe uniseriatis, indusiis firmis glabris.

Tabula nostra XLVI. Fig. IIIb. (analysis).

Aspidium patulum Swartz, Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 64. Metten. Pheg. et Asp. 58.

Lastrea patula Moore, Ind. Fil. 99.

Aspidium mexicanum Presl, Rel. Haenk. I. 38. Kunze, Linnaea XIII. 37. Metten. Pheg. et Asp. 64.

Nephrodium mexicanum Hook. Sp. Fil. IV. 138. t. 267.
Hook. et Baker, Syn. Fil. 276.

Lastrea mexicana Presl, Tent. 76. Moore, Ind. Fil. 96.

Aspidium paupertinum Roem. ex Kunze in Linnaea XVIII. 344.

Aspidium leptorachis Kunze l. c. 341.

Lastrea paupertina et *leptorachis* Liebm. Mex. Breg. 120.

Aspidium imbecille Kunze Mss. Ettingsh. Farnkr. t. 107. fig. 10. t. 109. fig. 1.

CAUDEX erectus, crassus, lignosus, PALEIS linearibus membranaceis ferrugineis 6—9 lin. longis sursum dense vestitus. STIPITES 6—9 poll. longi, stricti, nitidi, sparse paleacei. LAMINA 9—18 poll. longa, 6—10 poll. lata, subtus inconspicue glandulosa. RACHIS stricta, straminea, nitida, nuda. PINNAE subcontiguæ, oppositæ vel alternæ, inferiores 4—6 poll. longæ, 1—3 poll. latæ, subpatentes vel ascendentes, superne ad costam anguste alatum pinnatifidæ, deorsum solemniter pinnatæ, latere inferiore paululum reducto et basi magis cuneato, superiores sensim decrescentes, imæ mediis subæquales. PINNULAE in dimidio inferiore reductæ et basi distinctius cuneatæ, imæ $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{4}$ poll. longæ, 5—7 lin. latæ, reliquæ æquales vel gradatim paulo decrescentes. VENAE immersæ, graciles; VENULAE erecto-patentes, inferiores furcatæ. SORI mediocri magnitudinis. INDUSIUM persistens.

Var. β . CHAEROPHYLLOIDES Baker.

Aspidium chaerophylloides Moritz Mss.

Major, lamina 2—3 pedes longa, 15—18 poll. lata, perfecte quadri-pinnatifida, pinnis inferioribus 8—9 poll. longis, pinnulis lanceolato-deltoidis acutis $\frac{1}{2}$ —2 poll. longis deorsum subpinnatis, segmentis contiguis erecto-patentibus.

Habitat in prov. Minarum, e. gr. ad fluvium Abaité, Caldas, et in Serra da Piedade: Freyreiss, Pohl!, Regnell III. 1452!, Warming!; et in prov. Rio de Janeiro ad Matthias Ramos: Pohl! — Varietas item ad Caldas prov. Minas Geraës: Lindberg 632!. — Species præterea e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas divulgata. — *Oreadi-Dryas* et *Extrabras*.

24. NEPHRODIUM PROTENSUM BAKER: stipitibus segregatis brunneis sparse paleaceis sursum breviter ferrugineo-pubescentibus, frondibus deltoideis 3—4-pinnatifidis præter costas glabriusculis herbaceis saturate viridibus, pinnis imis deltoideis distincte petiolatis longe maximis, latere inferiore valde producto, pinnulis pinnarum mediarum oblongo-lanceolatis sessilibus vel breviter petiolatis obtusis plus minus pinnatifidis, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, venis in laciniis ultimis pinnatis, venulis inferioribus furcatis; soris parvis intramarginalibus, indusiis firmis ciliatis.

Aspidium protensum Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 36. Syn. Fil. 51. Kuhn, Fil. Afr. 139.

Lastrea protensa Moore, Ind. Fil. 105.

Aspidium subquinquefidum Beauv. Fl. d'Oware I. 34. t. 9. (1804). Swartz, Syn. Fil. 71. Willd. Sp. Plant. V. 214. Metten. Pheg. et Asp. 71., et Auctt.

Nephrodium subquinquefidum Hook. Sp. Fil. IV. 130. Hook. et Baker, Syn. Fil. 281.

Lastrea subquinquefida Presl, Tent. 76.

Aspidium funestum Kunze, Linnaea IX. 96. Metten. Pheg. et Asp. 71. Kuhn, Fil. Afr. 133.

Nephrodium funestum Hook. Sp. Fil. IV. 129. t. 259.

Lastrea funesta Moore, Ind. Fil. 92.

Aspidium cicutarium Willd. Sp. Plant. V. 215. ex parte, teste Klotzsch. Kunze, Flora Ratisbon. 1839. I. 33. Mart. Hb. Fl. Bras. n. 321. Klotzsch, Linnaea XX. 371. Splitg. Enum. Fil. Sur. 26., non Swartz.

Nephrodium Vogelii Hook. Sp. Fil. IV. 130.

Aspidium fraternum Mett. Mss. Kuhn, Fil. Afr. 132.

Polypodium pubescens Schum. et Thonn. Beskr. Pl. Guin. 453., et synonyma alia.

CAUDEX firmus, hypogæus, perfecte repens, PALEIS parvis linearibus castaneis sursum vestitus. STIPITES erecti, stricti, 6—12 poll. longi, deorsum vel toti plus minus paleacei. LAMINA 6—18 poll. longa et lata, ad costas breviter ferrugineo-hispida. RACHES graciles, obscure castaneæ, ferrugineo-pubescentes et paleis deciduis vestitæ. PINNAE imæ oppositæ, inaequilateraliter deltoideæ, superiores subsymmetrice lanceolatæ sensim decrescentes. PINNULAE imæ pinnarum imarum lanceolatæ, valde productæ, interdum 5—6 poll. longæ; pinnarum mediarum oblongo-vel ovato-lanceolatæ, contiguæ, plus minus saepe profunde pinnatifidæ, segmentis obtusis dentatis. VENAE immersæ, graciles, modice laxæ, VENULIS erecto-patentibus. SORI modice laxi. INDUSIUM membranaceum, castaneum, ciliatum, subsistentens.

Species quoad magnitudinem et dissectionem valde varia.

Per provincias Brasiliæ æquatoriales et orientales, itemque in Guyanis, insulis Antillanis, Africa tropica occidentali inde ab insulis Capverdicis ad Angolam, insulis Mascarenis et Nissobe. Prov. Rio de Janeiro et Espiritu Santo in sylvis densis montosis; Mart. Hb. Fl. Bras. 321; prov. Bahia: Blanchet 2128! 2485!; prov. Para: Martius, Spruce 5! 11! 33!; et prov. do Alto Amazonas: Martius, Spruce 2129!. — Vaga et Extrabras.

25. NEPHRODIUM DENTICULATUM Hook. stipitibus fasciculatis gracilibus, basi castaneis paleaceis, sursum stramineis nudis, frondibus ovato-deltoidis 3—5-pinnatifidis utrinque obscure viridibus nitidis nudis, pinnis distincte petiolatis deltoideis, imis maximis latere inferiore productis, pinnulis pinnarum mediarum petiolatis deltoideis, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, laciniis ultimis parvis obovato-cuneatis extrorsum aristato-dentatis, venulis immersis pinnato-flabellatis; soris sparsis medialibus, indusiis firmis glabris.

Tabula nostra XXX. Fig. 11. (pinna).

Nephrodium denticulatum Hook. Sp. Fil. IV. 148. Hook. et Baker, Syn. Fil. 287.

Polypodium denticulatum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1692.

Aspidium denticulatum Swartz, Syn. Fil. 57. Willd. Sp. Plant. V. 272. Metten. Pheg. et Asp. 68. Ettingsh. tab. 117. fig. 4.

Polystichum denticulatum J. Smith, Ferns Brit. et For. 351.

Lastrea denticulata Moore, Ind. Fil. 90.

Aspidium laetum Swartz, Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 63. t. 4. fig. 3. (forma minor). Metten. Pheg. et Asp. 67.

Polystichum laetum Presl, Tent. 94.

Aspidium Klotzschii Hook. Ic. Plant. t. 923.

Polystichum aspidioides Klotzsch Mss.

CAUDEX crassus, lignosus, erectus, PALEIS linearibus ferrugineis membranaceis 6—9 lin. longis sursum dense vestitus. LAMINA chartaceo-coriacea, 12—24 poll. longa, 8—12 poll. lata. RACHES stramineæ, nitidæ, nuda. PINNAE compositæ 12—18-jugæ, contiguæ, inaequilateraliter deltoideæ, imæ maximæ 6—9 poll. longæ 3—5 poll. latæ, superiores sensim decrescentes, latere inferiore reducto, basi cuneato-truncata. PINNULAE pinnarum mediarum inaequilateraliter deltoideæ, contiguæ, inferiores petiolatæ, segmentis inferioribus deltoideis, laciniis ultimis obovato-cuneatis 1— $\frac{1}{2}$ lin. latis extrorsum aristato-dentatis. VENAE immersæ obscuræ, in laciniis ultimis introrsum pinnatæ, extrorsum flabellatæ, venulis inferioribus furcatis. SORI mediocri magnitudinis; INDUSIUM persistens.

E Mexico insulisque Antillanis in Columbian, Guyanam britannicam (Rich. Schomburgk 1152!) et Brasiliam austro-orientalem dispersum. In prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Gardner 1881! 5943!, Glaziou 2053! 2382! 2462—3!; Minas Geraës: Freyreiss!, Langsdorff, Pohl, Bunbury! etc. — *Dryadi-Oreas* et *Extrabrazil*.

26. NEPHRODIUM FLEXUOSUM BAKER: frondibus tripinnatifidis herbaceis utrinque inconspicue pubescentibus infraque ad costas sparse paleaceis, rachibus primariis insigniter angulatis flexuosis adpresse paleaceis, pinnis oblongo-lanceolatis breviter petiolatis, pinnulis ligulatis ad medium vel ultra pinnatifidis, segmentis oblongis obtusis contiguis, venis in segmentis regulariter pinnatis, venulis simplicibus 6—7-jugis; soris medialibus.

Hujus speciei novae et insignis solam partem frondis mediam vidi. LAMINA utrinque plene viridis et breviter pubescens, ad costas infra sparse minuteque paleacea. RACHIS primaria (ut in *N. undulato* Baker et *Asplenio* (*Diplazio*) *flexuoso* Presl) insigniter angulatis flexuosa, gracilis, straminea, pilis lanosis paucis et PALEIS lanceolatis membranaceis pallide brunneis circa 1 lin. longis subadpressis modice vestita. PINNAE mediae 8—9 poll. longae, 3½—4 poll. latae, horizontales, contiguae, breviter petiolatae, deorsum subreductae, praeter apicem pinnatifidum pinnatae, rachibus leviter flexuosis densius paleaceis. PINNULAE solutae 8—9-jugae, contiguae, mediae 2 poll. longae, 8 lin. latae, superiores sessiles, rectae, basi utrinque recte truncatae, inferiores leviter deflexae breviter petiolatae, basi postice producta, antice cuneato-truncata. SEGMENTA contigua integerrima, inferiora 2½—3 poll. longa, 2 lin. lata. SORI parvi. INDUSIUM parvum, membranaceum, glabrum, evanescens.

Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou 2458! — Dryas.

27. NEPHRODIUM VILLOSUM PRESL: caudice subarboreo, stipitibus stramineis validis plus minus paleaceis, frondibus herbaceis amplis subdeltoideis tripinnatis utrinque plus minus griseo-pubescentibus vel subglabris, pinnis subsessilibus symmetrice oblongo-lanceolatis, pinnulis subsessilibus patentibus ligulato-lanceolatis basi recte truncatis, segmentis oblongo-ligulatis contiguis obtusis integris vel dentatis, venis pinnatis; soris utrinque secus costas uniseriatis, indusiis mediocribus saepe obsoletis.

Tabula nostra XXX. Fig. 12. (pinnula).

Nephrodium villosum Presl, *Rel. Haenk. I. 38. Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 262. Hook. Sp. Fil. IV. 134. t. 264. Hook. et Baker, Syn. Fil. 286.*

Aspidium villosum Swartz, *Syn. Fil. 56. Willd. Sp. Plant. V. 271. Schkuhr, Fil. 194. t. 46 B. Lowe, Ferns 6. t. 37. Metten. Pheg. et Asp. 115.*

Lastrea villosa Presl, *Tent. 76.*

Aspidium anisopterum Kunze Mss.

CAUDEX lignosus. PALEAE lineari-subulatae, membranaceae, castaneae, 6—9 lin. longae. STIPITES erecti, 2 pedes vel ultra longi. LAMINA utrinque plene viridis, 4—6 ped. longa, 2—3 ped. lata. RACHES stramineae, pubescentes vel villosae et interdum laxae paleaceae. PINNAE inferiores patentibus, breviter petiolatae, 12—18 poll. longae, 6—9 poll. latae. PINNULAE solutae pinnarum imarum 15—20-jugae, contiguae, apice excepto perfecte pinnatae, basi horizontaliter truncatae, segmentis 4—6 lin. longis 2—3 lin. latis dentatis. VENAE in segmentis pinnatae, VENULIS inferioribus furcatis. SORI mediocres, 8—12 pro segmento. INDUSIUM membranaceum, ciliatum, subsistentens.

Var. β . SUBINCISUM Baker.

Rachis stramineae, subglabrae, interdum paleis linearibus deciduis vestitae. Lamina utrinque plene viridis, glabruscula vel ad costas griseo-ciliata. Segmenta contigua, obtusa, integra. Indusium prorsus obsoletum.

Polypodium subincisum Willd. *Sp. Plant. V. 202. Kaulf. in Flora Ratisbon. 1823. I. 364. Kunze, Bot. Zeitg. II. 342. Mart. Ic. Sel. Crypt. Bras. 89. t. 64. Hook. Sp. Fil. IV. 260.*

Phegopteris subincisa Fée, *Gen. Fil. 243. Metten. Pheg. et Asp. 30.*

Alsophila martinicensis Spreng. *Syst. Veg. IV. 124. Sieber, Fil. Exsicc. 162. Hb. Martinic. 348. Hook. Sp. Fil. I. 48.*

Polypodium spectabile Kaulf. *Enum. Fil. 121. Hook. Sp. Fil. IV. 259.*

Phegopteris spectabilis Fée, *Gen. Fil. 243. Metten. Fil. Hort. Lips. 83. t. 17. fig. 10. Pheg. et Asp. 30. Ettingsh. Farnkr. tab. 104. fig. 1. 5. 7. 9.*

Polypodium inaequale Link, *Sp. Fil. 133.*

Polypodium vastum Kunze, *Linnæa IX. 50.*

Phegopteris dilatata Fée, *Fil. Ant. 52. t. 14. fig. 1.*

Var. γ . CANESCENS Baker.

Habitu et soris ad β . accedens, sed paleis 6 lin. longis coriaceis nigricantibus subulatis, lamina praecipue infra rachibusque breviter griseo-canescens discrepans.

Polypodium canescens Kunze Mss. *Hook. Sp. Fil. IV. 262.*

Phegopteris canescens Mett. *Pheg. et Asp. 30.*

Phegopteris Blanchetiana Kunze Mss.

Habitat per Americam tropicam inde ex Antillanis usque in Chile et Brasiliam australem. Intra Brasiliae fines typus in vicinia Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Gardner 189!; et in sylvis provinciarum Para, Bahia, Minas Geraes et Rio de Janeiro frequens: Mart. Hb. Fl. Bras. 320, Gardner!, Lindberg!, Glaziou 393!, 967! 1781! 2350—1! 2394!, Regnell III. 1447! aliique collectores. — Var. γ . in prov. Bahia: Blanchet 2454! — Vaga et Extrabras.

Species subarborea amplitudine frondium Cyatheaceas simulans. *Phegopteris Karstenianum* Mett. (Pheg. et Asp. 30) formam sistit quartam, frondibus infra dense griseo-villosis, indusiis obsoletis.

28. NEPHRODIUM ACUTUM HOOK. stipitibus subnudis brunneo-stramineis, frondibus chartaceo-coriaceis utrinque glabrusculis deltoideis tripinnatifidis, rachibus stramineis furfuraceis, pinnis imis maximis distincte petiolatis inaequilateraliter deltoideis, superioribus subsymmetrice lanceolatis, pinnulis pinnarum mediarum lineari-lanceolatis acuminatis basi decurrentibus ad costam late alatum pinnatifidis, segmentis ligulato-lanceolatis serrulatis apice aristatis, venis pinnatis; soris parvis medialibus.

Nephrodium acutum Hook. *Sp. Fil. IV. 147. tab. 271. (excl. planta Peruviana et fig. 1.).*

Lastrea acuta Klotzsch Mss.

Caudicem et paleas non vidi. STIPITES erecti, stricti, glabri, sursum paullulum furfuracei. LAMINA utrinque obscure viridis, infra ad costas paullulum ferrugineo-furfuracea, 2—3 pedes longa, 1½—2 pedes lata. RACHES paleis minutis subulatis castaneis paullulum furfuraceae. PINNAE solutae compositae 12—15-jugae, imae 9—12 poll. longae, deorsum 6—9 poll. latae, latere inferiore producto, superiores cito decrescentes sessiles. PINNULAE pinnarum mediarum 3—4 poll. longae, 6—8 lin. latae, apice acuminato aristato-serrato, segmentis falcatis contiguis 1½ lin. latis. VENAE distinctae, VENULIS erecto-patentibus simplicibus vel furcatis. SORI parvi, quoad lacinias mediales, saepe apicibus venularum intra marginem evanescentium impositi. INDUSIUM minimum, cito evanescens.

Quoad texturam, soros et dentes ad *N. effusum* accedens; differt tamen rachibus paullulum furfuraceis, frondibus multo minus compositis etc.

Habitat inter Campos et Victoria: Sello! — Dryas.

29. *NEPHRODIUM AMPLISSIMUM* Hook. stipitibus fasciculatis brunneo-stramineis sursum subnudis, frondibus amplis chartaceo-coriaceis utrinque obscure viridibus glabriusculis deltoideis 4—5-pinnatifidis, rachibus stramineis sparse paleaceis, pinnis imis distincte petiolatis inaequaliter deltoideis, superioribus lanceolato-deltoideis, pinnulis et segmentis inaequaliter lanceolatis, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, laciniis ultimis inaequaliter lanceolatis subobtusis, dentibus falcatis obtusis vel subacutis, venis pinnatis; soris medialibus, indusiis modice persistentibus.

Nephródium amplissimum Hook. Sp. Fil. IV. 145.

Aspidium amplissimum Metten. Pheg. et Asp. 68.

Polystichum amplissimum Presl, Tent. 84. *Epim. Bot.* 58. J. Smith, Brit. et For. Ferns 151.

Lastrea amplissima Moore, Ind. Fil. 85.

Acrophorus fallax Regel Mss.

Lastrea fallax Hort.

Aspidium multifidum Beyrich Mss.

Aspidium polymerum Kunze Mss.

CAUDEX erectus, PALEIS lineari-subulatis castaneis sursum vestitus. STIPITES stricti, nitidi, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes longi, deorsum paleacei, sursum subnudi. LAMINA 3—4 pedes longa, 2—3 pedes lata. PINNAE compositae 12—15-jugae, imae maximae, 12—18 poll. longae, 8—12 poll. latae, petiolis $\frac{1}{2}$ —1 poll. longis instructae, latere inferiore productae, superiores minus asymmetricae. PINNULAE pinnarum mediarum petiolatae, 2—4 poll. longae, 1— $1\frac{1}{2}$ poll. latae, deorsum usque ad costam pinnatae, segmentis parti primariae similibus. VENAE immersae, VENULIS erecto-patentibus. SORI copiosi, mediocres, mediales vel ob angustiam segmentorum submarginales. INDUSIUM glabrum.

In Brasilia austro-orientali frequens. Prov. S. Catharina: Barclay!; S. Paulo, Morro de Lobo etc.: Martius!; Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Gardner 191! 5945!, Burchell 2460!, Langsdorff, Setto!, Bowie et Cunningham!, Karwinski!, Glaziou 979! 1782! 2389—91! 2393!; Minas Geraës, Gongo Soco, Caldas, Retiro da Lagem; Bunbury!, Regnell III. 1454!. Praeterea in Guyana anglica (Rich. Schomburgk 1151!, perperam a Klotzsch ad A. coriaceum ductum, Appun 1108!). — Dryas, Oreas et Extrabras.

30. *NEPHRODIUM EFFUSUM* Baker: stipitibus subsegregatis stramineis glabris, frondibus amplis chartaceo-coriaceis utrinque plene viridibus glabriusculis deltoideis quadripinnatifidis, rachibus stramineis nudis, pinnis imis distincte petiolatis inaequaliter oblongo-lanceolatis, superioribus symmetrice lanceolatis, pinnulis pinnarum mediarum distincte petiolatis lanceolatis acuminatis dimidio inferiore reductis ad basin cuneato-truncatis profunde pinnatifidis, segmentis lanceolatis argute inciso-dentatis, venis pinnatis; soris parvis copiosis medialibus, indusiis saepe obsoletis.

Tabula nostra XXX. Fig. 4. 5. (pinnularum partes).

Nephródium effusum Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. 287.

Polypodium effusum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1690. Syn.

Fil. 41. Willd. Sp. Plant. V. 208. Schkuhr, Fil. 27. t. 26 c.

Phegopteris effusa Fée, Gen. Fil. 243.

Aspidium effusum Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 690.

Polypodium divergens Swartz, Syn. Fil. 73. Willd. Sp.

Plant. V. 209. Schkuhr, Fil. t. 26 b. Hook. Sp. Fil. IV. 265.

Phegopteris divergens Fée, Gen. Fil. 243. Metten. Fil.

Hort. Lips. 83. Pheg. et Asp. 14.

Polypodium multifidum Jacq. Ic. Pl. Rar. t. 643.

Polypod.

Polypodium dilatatum Liebm. Mex. Breg. 56. Hook. Sp. Fil. IV. 264.

Polystichum melanostictum Liebm. Mex. Breg. 124.

Aspidium excultum Metten. Pheg. et Asp. 69.

Nephródium excultum Hook. Sp. Fil. IV. 149.

Polypodium miserum Heward, Mag. Nat. Hist. 1832. p. 453. (forma depauperata).

CAUDEX breviter repens, PALEIS linearibus castaneis membranaceis 6—9 lin. longis sursum vestitus. STIPITES 2 pedes vel ultra longi, stricti, erecti, basi solum paleacei. LAMINA subnitide gramineo-viridis, glabriuscula vel infra ad costas inconspicue griseo-pubescentis, 3—4 pedes longa, 2—3 pedes lata. RACHES strictae, nuda vel secundariae sursum alatae breviter griseo-pubescentes. PINNAE compositae 12—18-jugae, imae patentes maximae 12—18 poll. longae 6—12 poll. latae, superiores sensim decrescentes. PINNULAE pinnarum mediarum 2—3 poll. longae, 9—12 lin. latae, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, ad costam anguste alatum pinnatifidae. VENAE immersae, graciles. INDUSIUM parvum, glabrum.

Habitat in sylvis primaevis per Brasiliae provincias orientales. Ad Caldas prov. Minas Geraës: Lindberg 551!, Regnell II. 323!; in prov. Bahia: Princeps Max. Neovidensis, Martius!; Rio de Janeiro: Riedel, Gardner 120!, Pohl, Glaziou 387! 960! 2392!, Burchell 2563!, et alii collectores; prov. S. Pauli: Martius!; et S. Catharinae: Macrae, Fritz Müller! E Peruvia praeterea ad Mexicum et insulas Antillanas disseminatum. — Dryadi-Oreas et Extrabras.

31. *NEPHRODIUM MACROSTEGIUM* Hook. stipitibus fasciculatis griseis sursum nitidis nudis, frondibus rigide coriaceis utrinque nitide obscure viridibus glabris deltoideis 4—5-pinnatifidis, rachibus griseis nudis, pinnis imis distincte petiolatis inaequaliter deltoideis, superioribus lanceolato-deltoideis, pinnulis et segmentis inaequaliter deltoideis, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, laciniis ultimis inaequaliter oblongo-lanceolatis obtusis, dentibus plerumque obtusis, venis pinnatis; soris medialibus, indusiis conspicuis persistentibus.

Nephródium macrostegium Hook. Sp. Fil. IV. 148.

CAUDEX erectus, PALEIS lineari-subulatis 6—9 lin. longis castaneis membranaceis sursum dense vestitus. STIPITES 2—3 pedes longi, stricti, erecti, basi paleacei. LAMINA 2—3 pedes longa, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes lata. RACHES strictae. PINNAE compositae 15—20-jugae, contiguae; imae longe maximae 12—18 poll. longae, 8—12 poll. latae, petiolis 1 poll. longis instructae, latere inferiore valde productae; superiores sensim decrescentes, breviter petiolatae, subsymmetrice lanceolato-deltoideae. PINNULAE pinnarum mediarum inaequaliter lanceolato-deltoideae, distincte petiolatae, 2—3 poll. longae, 1— $1\frac{1}{2}$ poll. latae, segmentis contiguis conformibus profunde pinnatifidis, dentibus laciniarum nunquam aristatis. VENAE immersae, graciles, obscurae. SORI copiosi, mediocres, modice conferti. INDUSIUM firmum, glabrum, $\frac{1}{2}$ lin. latum, planum.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad S. Carlos do Rio Negro, et ad ripas fluvii Uaupés in sylvis humilioribus „Caatingas“ dictis: Spruce 2545!; itemque in montibus Roraima Guyanae britannicae: Appun 959! — Najas et Extrabras.

§ 2. EUNEPHRODIUM.

32. *NEPHRODIUM UNITUM* R.Br. stipitibus nudis segregatis, frondibus herbaceis vel subchartaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, supra saturate viridibus glabris, infra glandulosis vel tenuiter pubescentibus, pinnis 20—30-jugis lineari-ligulatis ad dimidiam latitudinem pinnatifidis, inferioribus aegre petiolatis medias aequantibus, venis laciniarum pinnatis confertis, venulis simplicibus 6—12-jugis imis conjunctis; soris parvis confertis medialibus.

Tabula nostra XXX. Fig. 13. (pinna) et XLVI. Fig. IV. (analysis).

Nephrodium unitum R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 148. Hook. et Baker, Syn. Fil. 289., non Hook. Sp. Fil. IV. 81.

Polypodium unitum Linn. Sp. Plant. 1548. (quoad plantas *Burmanni* — v. s. in Hb. Mus. Brit. — et *Sloanei*, non *Plukenetii*, nec Linn. Herb., quae ad *N. cucullatum* nob. spectant).

Aspidium unitum Swartz, Syn. Fil. 47. Willd. Sp. Plant. V. 241. Schkuhr, Fil. 34. t. 33 b. Metten. Fil. Hort. Lips. 91. et in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 230., et Auctt.

Aspidium gongyloides Schkuhr, Fil. 193. t. 33 c. Meyer, Prim. Fl. Esseq. 239. Metten. Pheg. et Asp. 101. Ettingsh. Farnkr. tab. 127. fig. 8.

Polystichum gongyloides Gaud. Freyc. Voy. 326.

Aspidium Pohlianum Presl, Del. Prag. I. 173.

Nephrodium Pohlianum, resiniferum et microcarpum Presl, Tent. 81.

Peris crenata Vell. Fl. Flum. XI. t. 86., non Swartz.

Aspidium contiguum Kaulf. Mss.

Aspidium Ecklonii Kunze, Linnaea X. 546. Metten. Pheg. et Asp. 101.

Aspidium resiniferum Kaulf. Enum. 237., et synonyma multa alia.

CAUDEX firmus, gracilis, hypogaeus, longe et late repens. STIPITES erecti, stricti, grisei vel substraminei, 1—2 pedes longi. LAMINA 1—2 pedes vel ultra longa, 6—10 poll. lata, subtus glabra. RACHIS stricta, nuda, substraminea. PINNAE subcontiguae, adscendentes vel inferiores subpatentes, 4—6 poll. longae, 5—8 lin. latae, acutae vel subobtusae, ad dimidiam latitudinem pinnatifidae; laciniae rotundatis obtusis, vel deltoideis subacutis, 1½—2 lin. latis, basi subsymmetrice recte truncatis. VENAE graciles, confertae, in laciniae pinnatae; VENULAE 6—12-jugae, omnes simplices, imae cito anastomosantes. INDUSIUM subglabrum, parvum, modice persistens. SPORANGIA nuda.

Var. β . PROPINQUUM Baker.

Lamina infra tenuiter griseo-pubescentis. Indusium ciliatum.

Tabula nostra XXX. Fig. 14—15 (pinnae).

Nephrodium propinquum R.Br. Prodr. 148. Hook. Sp. Fil. IV. 79.

Aspidium propinquum Swartz, Adnot. Bot. 67. Metten. Pheg. et Asp. 102. Ettingsh. Farnkr. t. 124. fig. 3. t. 125. fig. 13.

Nephrodium paludosum Liebm. Mex. Bregm. 123.

Nephrodium Schaffneri Fée, VIII. Mem. 108.

Aspidium consanguineum Kunze Mss., non Fée.

Goniopteris cheilocarpa Fée, Gen. Fil. 251., et synonyma multa alia.

Filix frequentissima in regionibus calidioribus totius orbis, sylvas paludosas praediligens. Intra Brasiliae limites observata est in prov. Rio Grande do Sul: Fox!; S. Catharina: Barclay!; Rio de Janeiro: Mart. Hb. Fl. Bras. 311, Raddi!, Pohl!, Schott!, Miers!, Bowie et Cunningham!, Burchell 1535! 2292! 2462!, Glaziou 1224! 2362—3! etc.; Minas Geraës: Martius!; Bahia: Blanchet 2501!; Para: Spruce 459!; Alto Amazonas in sylvis ad Indos Miranhas dit. Yapurensis: Martius. — Vaga et Extrabrazil.

(33.) NEPHRODIUM SUBCUNEATUM BAKER: stipitibus subsegregatis griseis sursum breviter griseo-hispidis, frondibus chartaceo-herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis supra nudis infra ad costas breviter griseo-hispidis, pinnis patentibus 6—9-

jugis ligulato-lanceolatis ad tertiam latitudinis pinnatifidis basi subsymmetrice cuneatis, inferioribus deorsum reductis breviter petiolatis, imis medias aequantibus, venulis laxis 6—9-jugis simplicibus, imis tarde conjunctis; soris parvis medialibus.

CAUDEX lignosus, breviter repens, paleis subnullis. STIPITES 6—9 poll. longi, erecti, stricti. LAMINA 6—9 poll. longa, 4½—5 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. RACHIS grisea, dense breviter griseo-hispida. Apex frondis lanceolato-deltaeoides 2—3 poll. longus profunde pinnatifidus, laciniae adscendentibus contiguas subintegris. PINNAE solutae 2—2½ poll. longae, 9—10 lin. latae, LACINIAE obtusis subintegris paullulum falcatis 2 lin. latis. VENAE distinctae, inferiores valde arcuatae. INDUSIUM parvum, membranaceum, hispidum, subpersistens.

Habitat in Guianae gaticae rupestribus montis Matouri: Leprieur! — Forte in Brasilia amazonica adhuc detegetur.

34. NEPHRODIUM MOLLE R.Br. stipitibus subfasciculatis stramineis griseo-pubescentibus, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis utrinque praecipue infra molliter griseo-pubescentibus, pinnis 20—30-jugis lineari-ligulatis profunde pinnatifidis omnibus sessilibus, imis subreductis deflexis, pinnulis lineari-ligulatis subintegris, imis saepe maximis, venulis simplicibus 6—9-jugis, 1—2 imis cito conjunctis; soris mediocribus medialibus.

Tabula nostra XXX. Fig. 6—8. (pinnae).

Nephrodium molle R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 149. Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 258. Hook. Sp. Fil. IV. 67., et Auctt.

Aspidium molle Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 34. Syn. Fil. 49. Willd. Sp. Plant. V. 246. Metten. Pheg. et Asp. 103. Ettingsh. tab. 123. fig. 4. 6. 7. tab. 124. fig. 1., et Auctt. *Polypodium molle* Jacq. Coll. III. 188. Ic. t. 646. Lam. Enc. V. 536.

Polypodium parasiticum Linn. Sp. Plant. 1551 (nomen primum, quamobrem planta jure *Nephr. parasiticum* appellanda esset, sed *N. molle* nunc ubique admissum nobis retineatur).

Aspidium parasiticum Sieb. ex Swartz in Schrad. Journ. 1803. II. 280. Syn. Fil. 49.

Nephrodium parasiticum Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 260. *Aspidium violascens* Link, Sp. Fil. 101. (forma rache violaceae). Metten. Pheg. et Asp. 247.

Nephrodium Hilsenbergii Presl, Tent. 81.

Polypodium hirtum Vell. Fl. Flum. XI. 79.

Aspidium polytrichum Schrad. Mss.

Aspidium diversilobum Mett. Pheg. et Asp. 100.

Nephrodium diversilobum Presl, Epim. 47.

Goniopteris asymmetrica Fée, Gen. Fil. 253.

Nephrodium patens J. Smith, Ferns Brit. et For. 140., non Desv. (forma minus pubescens, stipitibus dense fasciculatis), et synonyma multa alia.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, paleis linearibus pallide brunneis membranaceis 4—6 lin. longis sursum sparse vestitus. STIPITES erecti, stricti, 6—12 poll. longi, sursum plus minus griseo-pubescentes. LAMINA utrinque pallide viridis 1—2 pedes longa, 8—12 poll. lata. RACHIS straminea, griseo-pubescentis. PINNAE ad alam ½—1½ lin. latam pinnatifidae, contiguae, mediae horizontales, 4—6 poll. longae, 6—9 lin. latae, basi recte truncatae. PINNULAE 3—4 lin. longae, 1—1½ lin. latae, contiguae, obtusae vel subacutae, subintegrae, leviter falcatae, imae reliquis saepe distincte majores et interdum (ut in *A. patens* var. *stipulari*) dilatatae inciso-crenatae. VENAE omnes simplices, imae 1—2 cito anastomosantes areolam ¼—½ lin. altam efformantes. INDUSIUM membranaceum, subpersistens, dense hispidum.

Var. β . POHLIANUM Baker.

Lamina utrinque glabra; pinnae haud ultra dimidiam pinnatifidae, imae numerosae insigniter reductae; pinnulae imae anticae valde dilatatae; venulae inferiores fasciculorum 3—4 conjunctae; indusium glabrum.

Varietas (?) insignis ad *N. truncatum* Gaudich. accedens. Specimen unicum tantum vidi.

Var. γ . JAMESONI Baker.

Nephrodium Jamesoni Hook. Sp. Fil. IV. 66.

Lamina minor (5—6 poll. longa, deorsum 2—3 poll. lata); pinnae aegre ultra $\frac{1}{2}$ latitudinis pinnatifidae; venulae pinnularum 4—6-jugae.

Divulgatum per regiones calidiores totius orbis. Intra Brasiliae fines in prov. S. Pauli: Burchell 4473!; Rio de Janeiro et Bahia: Burchell 2104!, Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 315!), Pohl, Lady Cattcott!, Princ. Newwied!, Blanchet 2457!; Minas Geraës et Goyaz: Freyreiss, Pohl; Ceara: Gardner 1902!; Alto Amazonas: Spruce 1107! — Var. β . in Brasilia, loco accuratius non indicato: Pohl! — Var. γ . ad Cajurú prov. S. Pauli: Regnell III. 1449!, et in prov. Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming! — Vaga et Extrabras.

35. NEPHRODIUM REFRACTUM Hook. stipitibus fasciculatis stramineis nudis, frondibus chartaceo-herbaceis hastato-lanceolatis bipinnatifidis utrinque nudis, pinnis sessilibus lineariligulatis acuminatis paullulum pinnatifidis deorsum asymmetricis, basi superiore ad costam adnata, inferiore libere producta, inferioribus insigniter deflexis quam mediae paullo majoribus, venulis 6—9-jugis simplicibus, 3—4 conjunctis; soris mediocribus subbasalibus.

Nephrodium refractum Hook. Sp. Fil. IV. 162. t. 252. Hook. et Baker, Syn. Fil. 292.

Aspidium refractum A. Braun, Ind. Sem. Hort. Berol. 1856. Metten. Pheg. et Asp. 100.

Polypodium refractum Fisch. et Mey. teste Kunze in Linn. XXIII. 321. Regel in Linnaea XXVIII. 376. Lowe, Ferns 2. t. 48.

Goniopteris refracta J. Smith, Cat. Cult. Ferns 20.

CAUDEX lignosus, erectus, paleis subnullis. STIPITES erecti, stricti, 12—18 poll. longi. LAMINA utrinque plene viridis 12—18 poll. longa, 6—8 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. PINNAE solutae 12—16-jugae, superiores subsymmetricae, mediae $2\frac{1}{2}$ —3 poll. longae, 6—8 lin. latae, praecipue in latere inferiore pinnatifidae, lacinii obtusis 1—1 $\frac{1}{2}$ lin. profundis, inferiores sensim accrescentes et magis deflexae, imae cum rachi angulum 30—45° formantes 4—6 poll. longae. VENAE in lacinii pinnarum pinnatae, venulis gracilibus. SORI prope costam in lineâ confertâ dispositi. INDUSIUM parvum, nudum, cito evanescens.

E Brasiliâ a. cl. Fischero in hort. bot. Petropolitano introductum, unde in alios Europae hortos translatum est. Specimina autochthona nondum vidi.

(36.) NEPHRODIUM CONNEXUM KUHN: stipitibus tenuiter pubescentibus, frondibus subcoriaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis utrinque tenuiter pubescentibus, pinnis sessilibus ligulatis profunde pinnatifidis basi glandulâ callosâ instructis, pinnulis lanceolatis acutis subintegris subfalcatis, venulis simplicibus densis 16—18-jugis, paucis anastomosantibus; soris parvis subbasalibus.

Nephrodium connexum Kuhn Mss.

Aspidium connexum Mett. Mss.

„Rhizoma deest. FOLIA ampla subcoriacea scaberula, utrinque unâ cum rachi tenuiter pubescentia. RACHIS pubescens. LAMINA pinnatisecto-pinnatipartita; SEGMENTA numerosa, approximata, patentia, sessilia, infra ad insertionem aërophoro calloso praedita, ad 10 poll. longa, 15 lin. lata, linearia, sensim attenuata, acuminata; LACINIAE ala 3 lin. lata ad sinus hyalinos confluentes, oblongo-lanceolatae, subfalcatae, acutae, basales internae elongatae; NERVI densi numerosi (16—18-jugi), infimi anastomosantes, proximi 2—3 secus sinus hyalinos conniventes. SORI costulae approximati; INDUSIUM manifestum, membranaceum; SPORANGIA setifera, setis 1—2 abbreviatis; pedicelli sporangiorum hinc inde glanduligeri“. KUHN in litt.

Habitat in Guiana gallica (Martin, Leprieur), forte in Brasilia amazonica invenendum. — Frustulum pinnae speciei hujus singularis solum vidi, descriptionem benignitati cl. KUHN debeo. Ad N. Haenkeanum Presl accedit.

§ 3. SAGENIA.

37. NEPHRODIUM MACROPHYLLUM BAKER: stipitibus nudis castaneis, frondibus papyraceo-herbaceis utrinque glabris oblongo-lanceolatis pinnatis vel deorsum bipinnatifidis, pinnis 4—8-jugis late-foliaceis ligulato-lanceolatis subintegerrimis vel repandis, venis majoribus e costâ ad marginem arcuatim procurrentibus, areolis copiosis venulas liberas includentibus intermediis; soris utrinque prope venas majores laxè uniseriatis.

Tabula nostra XXXI. Fig. 4. (pinna) et XLVI. Fig. V. (analysis).

Nephrodium macrophyllum Baker in Hook. et Baker Syn. Fil. 300.

Aspidium macrophyllum Swartz, Syn. Fil. 43. et 239. Willd. Sp. Plant. V. 217. Metten. Fil. Hort. Lips. 95. t. 22. fig. 13. Pheg. et Asp. 122. Splitg. Enum. Fil. Surin. 26., et Auct.

Sagenia macrophylla Moore, Ind. Fil. 96.

Cardiochlaena macrophylla Fée, Gen. Fil. t. 24. fig. B1.

Bathium macrophyllum Link, Sp. Fil. 114.

Polypodium hastatum Vell. Fl. Flum. XI. t. 68.

Aspidium fraxinifolium Schrad. Gött. Gel. Anzeig. 1823. p. 268. Spreng. Syst. Veg. IV. 96.

Aspidium bifidum Presl, Del. Prag. I. 173.

Aspidium Poeppigii Presl, Epim. 62. Mett. Pheg. et Asp. 123.

Polypodium repandum Vahl, Eclog. III. 53., et synonyma multa alia.

CAUDEX erectus, paleis paucis lanceolatis brunneis membranaceis 4—6 lin. longis vestitus. STIPITES erecti, stricti, 12—18 poll. longi. LAMINA supra saturate viridis, infra pallidior, 2 3 pedes longa, 12—18 poll. lata, apice excepto simpliciter pinnata vel deorsum bipinnatifida. RACHIS stricta, nuda, brunnea. Apex frondis deltoideus deorsum profunde pinnatifidus, lacinii lanceolatis acuminatis ascendentibus. PINNAE laxae vel subcontiguae, superiores basi ad rachem adnatae, inferiores liberae interdum breviter petiolatae, basi rotundata vel subcuneata, 6—9 poll. longae, 1—3 poll. latae, acuminatae, imae submajores et interdum prope basin lateris inferioris pinnulis 1—2 lanceolatis instructae. VENAE majores distinctae, 3—4 lin. distantes, areolis angustis. SORI mediocres, 4—8 pro serie. INDUSIUM membranaceum, glabrum, subpersistens.

Habitat in prov. do Alto Amazonas: Martius; in Bahiensi: Blanchet 2481!; prov. Rio de Janeiro: Mart. Hb. Fl. Bras. 312, Langsdorff, Pohl, Burchell 3061!, Gardner 52!, Glaziou 405—61 968—9! 971! 1682!, atique collectores; in prov. S. Catharina: Beechey! — Praeterea in Guiana britannica (Appun 168!), gallica (Leprieur), batava (Hostmann 239!, Splitgerber, Kappler 1734, Kegel 241, 334), et inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Vaga et Extrabras.

XVIII. NEPHROLEPIS SCHOTT.

NEPHROLEPIS Schott, *Gen. Fil.* t. 3. Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 25. et 48 A. Presl, *Tent.* 78. t. 2. fig. 14. Fée, *Gen. Fil.* 319. t. 23. fig. C2. Metten. *Fil. Hort. Lips.* 14 et 99. Hook. *Sp. Fil.* IV. 151. — LEPIDONEURON Fée, *Gen. Fil.* 301. tab. 23. fig. C1. — Aspidii sp. Swartz etc. — Polypodii sp. Linn. — Nephrodii sp. R.Br. etc.

SORI subrotundati, quoad venas terminales, quoad laminam dorsales vel submarginales, INDUSIIS plus minus reniformibus basi plus minus emarginata cum lamina colligatis.

Tabula nostra XLVI. Fig. VI.

CAUDEX erectus, stoloniferus, interdum bulbigerus. STIPITES erecti, fasciculati, breves, stricti, nitidi, cum caudice continui vel prope basin articulati (Arthropteris J. Sm. ex parte). LAMINA papyraceo-vel chartaceo-herbacea, ligulata vel oblongo-lanceolata, tota simpliciter pinnata, pinnis numerosis subintegerrimis lineari-ligulatis sessilibus, basi articulatis, plantae siccae cito deciduis. RACHES strictae, nudae vel ferrugineo-furfuraceae. COSTAE pinnarum validae; VENAE graciles, immersae, confertae, parallelae, pleraeque unifurcatae, intra marginem evanescentes, apice incrassato in superiore frondis facie puncto calcareo notatae, anteriores utriusque jugi apice plus minus intra marginem pinnarum soros gerentes. SORI mediocres, subrotundati, utrinque secus costas laxe uniseriati. INDUSIUM subrotundato-reniforme, membranaceum, basi paullulum (Nephrolepis Fée) vel valde (Lepidoneuron Fée) emarginatum. — Species 5—6 per regiones calidiores utriusque orbis late dispersae.

SPECIES BRASILIENSES.

1. Sori in serie 6—12; indusium firmum, basi lata paullulum emarginata 1. N. CORDIFOLIA.
2. Sori in serie 12—40; indusium tenerum, basi angustata profunde emarginata 2. N. EXALTATA.

1. NEPHROLEPIS CORDIFOLIA PRESL: frondibus ligulatis utrinque attenuatis, pinnis 50—60-jugis contiguis lineari-ligulatis obtusis vel subacutis, basi superiore auriculata recte truncata, inferiore rotundata vel cuneato-truncata; soris 6—12 pro serie oblique submarginalibus, indusiis firmis, basi lata leviter emarginata.

Tabula nostra XLVI. Fig. VIa. (analysis).

Nephrolepis cordifolia Presl, *Tent.* 79. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 300.

Polypodium cordifolium Linn. *Sp. Plant.* 1549.

Aspidium cordifolium Swartz, *Syn. Fil.* 45.

Aspidium undulatum Swartz l. c.

Aspidium obtusifolium Willd. *Sp. Plant.* V. 231.

Varietates brasilienses:

Var. α . TUBEROSA Baker.

Nephrolepis tuberosa Presl, *Tent.* 79. Mett. *Fil. Hort. Lips.* 100. Hook. *Sp. Fil.* IV. 151. ex parte, et Auctt.

Aspidium tuberosum Bory in Willd. *Sp. Plant.* V. 234. *Nephrodium tuberosum* Bory, Duperr. *Voy.* 268. Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris.* VI. 252.

Aspidium imbricatum Kaulf. in Spreng. *Syst. Veg.* IV. 97. *Nephrolepis imbricata* Presl, *Tent.* 79.

CAUDEX firmus, gracilis, late vagans, bulbigerus. STIPITES fasciculati, 1—4 poll. longi, erecti, stricti, grisei, nitidi, basi PALEIS paucis minimis castaneis sparse vestiti. LAMINA chartaceo-herbacea, utrinque nuda, anguste ligulata, 12—18 poll. longa, 12—18 lin. lata. RACHIS stricta, erecta, nuda. PINNAE horizontales, sessiles, mediae 6—9 lin. longae, 3—4 lin. latae, denticulatae, inferiores laxiores sensim decrescentes. VENAE confertae, graciles, immersae. SORI 5—6 pro serie. INDUSIUM late reniforme, glabrum, persistens.

Var. β . PECTINATA Baker.

Tabula nostra XXXI. Fig. 13. 14. (frondis partes, titulo N. pectinatae).

Nephrolepis pectinata Schott, *Gen. fasc. 1.* Presl, *Tent.* 80. Metten. *Fil. Hort. Lips.* 100. Ettingsh. *Farnkr.* t. 135. fig. 11. 12.

Aspidium pectinatum Willd. *Sp. Plant.* V. 223.

Aspidium trapezoides Schkuhr, *Crypt.* t. 29 b., non Swartz.

Nephrolepis occidentalis Kunze, *Linnaea* XVIII. 243.

Caude non bulbigerus, lamina magis herbacea 1½—1¼ poll. lata, pinnae subacutae paullulum falcatae, basi inferiore minus producta cuneata vel subhorizontaliter truncata, sori pro serie 8—10.

Var. γ . PENDULA Hook.

Aspidium pendulum Raddi, *Fil. Bras.* 30. t. 45.

Nephrolepis pendula Fée, *Gen. Fil.* 319. Metten. *Ann. Sc. Nat. V. Ser.* II. 260.

Caude nunquam bulbigerus, stipites longiores; frondes majores, 2—3 pedes longae, 3—4 poll. latae, graciliter pendulae; pinnae laxiores, paullulum falcatae, inciso-crenatae, e medio in apicem acutum sensim angustatae; sori pro serie 8—12.

Per regiones tropicas utriusque orbis late disseminata, in America e Mexico et insulis Antillanis usque in Peruviam et Brasiliam australem obvia. Forma α . in prov. Rio de Janeiro: Sello!, Glaziou 412!; ad Caldas prov. Minarum: Regnell III. 1475!; ad Para: Graham! — Var. β . circa Goyaz: Gardner 4081! — Var. γ . in prov. S. Catharina: Fox!; frequens in prov. Rio de Janeiro: Raddi!, Gardner 186!, Burchell 1105—95!, Glaziou 260! 411! 937—8!, Miers!, et reliqui collectores; in prov. Bahia: Blanchet 2237!, Wavra et Maty 202. — Vaga et Extrabras.

2. NEPHROLEPIS EXALTATA SCHOTT: frondibus lanceolato-ligulatis utrinque angustatis, pinnis 30—60-jugis lineari-ligulatis contiguis vel subclavis-plerisque acutis, basi superiore recte truncata auriculata, inferiore rotundata; soris distincte intramarginalibus 12—40 pro serie, indusiis membranaceis rotundatis, basi angusta profunde emarginata.

Tabula nostra XXXI. Fig. 11. 12. (pinnae), et XLVI. Fig. VIb. (analysis).

Nephrolepis exaltata Schott, *Gen. fasc. 1.* Presl, *Tent.* 79. Hook. *Sp. Fil.* IV. 152. Metten. *Fil. Hort. Lips.* 100. Ettingsh. *Farnkr.* t. 132. fig. 3—6. 10. t. 134. fig. 2.

Polypodium exaltatum Linn. *Sp. Pl.* 1548. Aublet, *Guian.* 962. *Aspidium exaltatum* Swartz, *Syn. Fil.* 45. Schkuhr, *Fil.* 32 b.

Raddi, *Fil. Bras.* 30. t. 46.

Aspidium paraense Willd. *Sp. Plant.* V. 231.

Nephrodium paraense Presl, *Tent.* 79.

Nephrolepis neglecta, valida et intramarginalis Kunze, *Linnaea* XIII. 148. XXI. 229. XXIII. 301.

Nephrolepis falciformis J. Smith, *Ferns. Brit. et For.* 287.

CAUDEX lignosus, gracilis, late vagans, nunquam bulbigerus. STIPITES fasciculati, 1—4 poll. longi, erecti, stricti, grisei, nitidi, basi PALEIS linearibus ferrugineis 2—3 lin. longis vestiti. LAMINA herbaceo-subpapyracea, utrinque subnuda, 1½—3 pedes vel ultra longa, 3—4 poll. lata. RACHIS stricta vel pendula, nuda vel furfuracea. PINNAE 40—60-jugae, contiguae, 1½—2 poll. longae, 3—5 lin. latae, acutae vel subobtusae, marginibus subintegerrimis vel extrorsum paullulum incisio-crenatis, inferiores obtusae sensim decrescentes. VENAE immersae, obscurae. SORI 12—18 pro serie.

Var. β . BISERRATA Baker.

Tabula nostra XXXI. Fig. 6—10. (Pinna, titulo Prestiano N. acutae).

Aspidium biserratum Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 32.

Aspidium biserratum, ensifolium, punctulatum et acutum, Swartz, Syn. Fil. 46. Schkuhr, Fil. 31. 32. 33 c.

Aspidium gibbosum, splendens, sesquipedale et acuminatum Willd. Sp. Plant. V. 220—2.

Nephrolepis punctulata, subcordata, splendens, ensifolia, biserrata, acuminata, acuta, gibbosa et sesquipedalis Presl, Tent. 79 sq. Ettingsh. Farnkr. t. 134. fig. 14. 15. etc.

Nephrolepis platyotis Kunze, Linnaea XXIII. 312.

Nephrolepis Zollingeriana De Vriese in Ann. Sc. Nat. VI. 114., et synonyma multa alia.

Lamina magis papyracea, brevior, latior, ligulato-lanceolata, utrinque subnuda vel infra breviter subpubescens; pinnae pauciores, laxiores, e medio in apicem acutum vel acuminatum sensim angustatae, 2—6 poll. longae, 5—9 lin. latae, horizontales vel paullulum falcatae, subintegrae vel incisio-crenatae, basi inferiore late cordata. Sori 15—40 pro serie. Indusium tenerum, membranaceum, basi angusta profunde emarginata cum lamina colligatum, demum margine fere circumcirca libero.

Var. γ . HIRsutula Baker.

Polypodium hirsutulum Forst. Prodr. n. 439.

Aspidium hirsutulum Swartz, Syn. 45. Schkuhr, Fil. t. 33. excl. fig. C.

Aspidium pilosum Langsd. et Fisch. Ic. Fil. t. 16.

Aspidium paludosum Raddi, Fil. Bras. t. 44.

Aspidium rufescens Schrad. in Goett. Gel. Anz. 1824. p. 629.

Nephrolepis hirsutula, Sieberi et pilosa Presl, Tent. 79.

Nephrolepis rufescens Wawra, Maximil. Reise 200. t. 101.

Nephrodium rufescens Splitg. Enum. Fil. Surin. 27., et synonyma multa alia.

Habitus, sori et indusia omnino praecedentis, sed lamina utrinque praecipue infra plus minus dense breviterque ferrugineo-pubescens.

Filix frequentissima per regiones calidiores totius orbis vagat. Intra Brasiliam typus observatus est in udibus sylvarum, ad rupes muscosas, saepe alte dependens, in prov. Para, Piahy, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, S. Paulo et S. Catharina: Spruce 19!, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 317!, Gardner 1221!, Glaziou 2353!, et omnes reliqui collectores. — Var. β . in prov. do Alto Amazonas et Para: Spruce 1292! 20! 21!; in ditone Pernambucana: Gardner 1222!, et in Goyazana: Burchell 9308! — Var. γ . in prov. Para: Spruce 45! 547!; Goyaz: Pohl; Bahia: Blanchet, Mart. Hb. Fl. Bras. 318! 322!; et Rio de Janeiro: Raddi!, Gardner 187!, Miers!, Langsdorff etc. — Vaga et Extrabras.

XIX. OLEANDRA Cav.

OLEANDRA Cav. Praelect. 1801. p. 252. Presl, Tent. 77. tab. 2. fig. 12. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 45 B. Hook. Sp. Fil. IV. 156. — NEURONIA Don, Prodr. Fl. Nep. 6. — OPHIOPTERIS Reinw. Syllog. Ratisbon. II. 3. — Aspidii sp. Swartz, Willd. — Polypodii sp. Lam.

SORI subrotundati, ad medium venarum vel infra obvii, INDUSIIS reniformibus basi emarginata cum lamina colligatis.

Polypod.

Tabula nostra XLVII. Fig. I.

CAUDEX epigeus, late repens vel scandens, lignosus et strictus, vel herbaceus et flexuosus, PALEIS ferrugineis adpressis vel squarrosis dense vestitus. STIPITES segregati vel fasciculati, interdum verticillati, ad medium vel infra distincte articulati. LAMINA simplicissima integerrima ligulato-lanceolata, utrinque angustata, papyracea vel chartaceo-herbacea. COSTAE validae; VENAE confertae, graciles, horizontales, omnino liberae, parallelae, simplices vel prope basin unifurcatae. SORI parvi, rotundati, utrinque secus costam irregulariter 1—3-seriati. INDUSIUM membranaceum. — Species 6, per regiones calidiores utriusque orbis late dispersae.

SPECIES BRASILIENSES.

1. Paleae membranaceae, lineares, adpressae; sori irregulariter 1-seriati 1. O. NERIIFORMIS.
2. Paleae fibrilloso-subulatae, patentes vel squarrosae; sori irregulariter 2—3-seriati 2. O. NODOSA.

1. OLEANDRA NERIIFORMIS Cav. caudicibus strictis lignosis, paleis adpressis linearibus vestitis, stipitibus brevibus plerumque ad basin articulatis, frondibus ligulato-lanceolatis utrinque glabris vel breviter sericeo-pubescentibus; soris praecipue prope costam irregulariter uniseriatis.

Oleandra neriiformis Cav. Prael. 1801. n. 623. Hook. Fil. Exot. t. 58. Hook. Sp. Fil. IV. 156. ex parte. Metten. in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 241., et Auctt.

Oleandra neriifolia Presl, Tent. 78.

Aspidium neriiforme Swartz, Syn. Fil. 42 et 237. Willd. Sp. Plant. V. 58. Kunze in Schkuhr Suppl. 35. t. 18.

Ophiopteris verticillata Reinw. Syll. Ratisbon. II. 3.

Aspidium pistillare Swartz in Schrad. Journ. 1801. II. 30. Kunze in Schkuhr l. c.

Aspidium (Oleandra) salaccense Kunze in Bot. Zeitg. IV. 461.

Oleandra bantamensis, micrantha, phyllarthron et lomatosus Kunze l. c. IV. 346—9.

Varietates brasilienses:

Var. β . PILOSA Baker.

Oleandra pilosa Hook. Gen. Fil. t. 45 B. Miquel, Diar. Inst. Bat. 1843. p. 6.

Oleandra hirtella Miquel ex Kunze in Schkuhr Suppl. II. 70. t. 129. Mett. Fil. Hort. Lips. 96.

Oleandra mollis Presl, Epim. 41.

Oleandra trujillensis Karsten, Fl. Columb. I. 147. t. 73. Metten. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 248.

Oleandra tomentosa Leprieur Mss.

Aspidium (Oleandra) pendulum Splitg. Enum. Fil. Surin. 24.

CAUDEX late scandens, 2—3 lin. crassus, PALEIS ferrugineis 2—3 lin. longis. STIPITES sparsi vel fasciculati, 6—18 lin. longi, grisei, nitidi, stricti, nudi vel sparse furfuracei. LAMINA membranaceo-vel subchartaceo-herbacea, utrinque obscure subnitideque viridis, eleganter sericeo-pubescens et ciliata, 8—12 poll. longa, 1—2 poll. lata, utrinque angustata. COSTA valida, grisea; VENAE graciles, distinctae, ¼—½ lin. distantes, simplices et unifurcatae intermixtae. Sori infra medium praecipue prope costam irregulariter uniseriati. INDUSIUM membranaceum, ciliatum.

Var. γ . HIRTA Baker.

Oleandra hirta Bracken. *Fil. Un. St. Expl. Expedi.* 214. t. 29. *Hook. Sp. Fil. IV.* 157.

Indumentum etc. praecedentis, sed stipites longiores (3 poll. attingentes), graciles, stricti, grisei, nitidi, ad medium articulati.

Typus habitat in Asia calidior; varietas β . in prov. Para: Spruce 53!; in Guyana gallica (Leprieur!), batava (Focke!, Kegel, Splitgerber etc.), anglica (Rich. Schomburgk 416!) et in Columbia; var. γ . hucusque solummodo e prov. Rio de Janeiro cognita est: Brackenridge! — Dryas, Najas et Extrabasil.

2. OLEANDRA NODOSA PRESL: caudicibus flexuosis late repentibus, paleis fibrilloso-subulatis firmis patentibus vel squarrosis vestitis, stipitibus longioribus infra medium articulatis, frondibus lanceolato-ligulatis supra nitidis utrinque glabris; soris intra medium frondis irregulariter 2—3-seriatis.

Tabula nostra XXXI. Fig. 5. (laminae pars), et XLVII. Fig. 1. (analysis).

Oleandra nodosa Presl, *Tent.* 157. Kunze, *Bot. Zeitg.* IX. 345. *Hook. Sp. Fil. IV.* 157. Lowe, *Ferns* 7. t. 17. *Elttingsh. Farnkr. tab.* 129. fig. 4.

Aspidium nodosum Willd. *Sp. Plant. V.* 211. *Hook. Exot. Flora* t. 117. Griseb. *Fl. Brit. West-Ind.* 696. *Splitg. Enum. Fil. Surin.* 34.

Oleandra micans Kunze in *Bot. Zeitg.* IX. 346.

CAUDEX sublignosus, crassitiem 2—3 lin. attingens, PALEIS ferrugineis 2—3 lin. longis. STIPITES segregati, erecti, nudi, grisei, stricti, fertiles 3—6 poll. longi. LAMINA chartaceo-herbacea, supra obscure viridis nitidissima, infra pallidior, 8—15 poll. longa, 1½—3 poll. lata, acuta vel acuminata, basi anguste cuneata. COSTA valida, grisea, subtus paullulum paleacea; VENAE graciles, distinctae, ¼—½ lin. distantes, simplices et unifurcatae intermixtae. SORI in medio frondis vel intra in series 2—3 valde irregulares dispositi. INDUSIUM membranaceum, castaneum, nudum.

In Brasilia hucusque solummodo e vicinia Rio de Janeiro innotuit, ubi indefessus Glaziou nuperius eam detexit et sub n. 2153! cum Herbario Martii communicavit. Praeterea in Guyana batava (Kappler 1747, Kegel 1378, Splitgerber), britannica (Rich. Schomburgk 270!, Appun 188!), gallica (Leprieur!, Sagot 716!), et in insulis Antillanis. — Dryas et Extrabasil.

TRIBUS IX. POLYPODIEAE.

SORI exindusiati, rotundati vel raro oblongi, quoad laminam plus minus distincte dorsales.

CAUDEX plerumque epigeaeus, dense paleaceus, plus minus repens, v. saepe etiam hypogaeus erectus vel suberectus, nunquam arborescens. STIPITES basi articulati vel cum caudice continui. LAMINA magnitudine textura et dissectione valde variabilis, herbacea vel coriacea raro membranacea, saepe parva vel mediocris, simplex vel simpliciter pinnatifida vel pinnata divisionibus obtusis, raro ampla vel decomposita segmentis ultimis parvis dissectis. VENAE pinnatae, liberae vel saepe vario modo anastomosantes. SORI rotundati vel raro oblongi (Grammitis Swartz), quoad laminam dorsales vel submarginales, quoad venas dorsales vel terminales. — Species circiter 400, per regiones praecipue intertropicales utriusque orbis dispersae.

Genus unicum brasiliense XX. POLYPODIUM.

XX. POLYPODIUM LINN.

POLYPODIUM Linn. *Gen. Plant.* 784. (ex parte). Swartz, *Syn. Fil.* 25. Willd. *Sp. Plant. V.* 144. *Hook. et Bauer, Gen. Fil.* t. 69 B. *Hook. Sp. Fil. IV.* 163. — PHEGOPTERIS Fée, *Gen. Fil.* 242. Metten. *Pheg. et Asp.* 1. — GONIOPTERIS Presl, *Tent.* 181. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. I.* 38. — DICTYOPTERIS Presl, *Tent.* 194. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 71 B. — PHEBODIUM R. Brown, *Plant. Jav. Rar.* 4. *J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV.* 58. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 112. — GONIOPHEBIUM Blume, *Fl. Jav.* 132. Presl, *Tent.* 185. — PHYMATODES Presl, *Tent.* 195. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 29. — CRASPEDARIA, CHRYSOPTERIS et MICROSORIUM Link, *Sp. Fil. Hort. Berol.* 117. 120. 135. — MARGINARIA Presl, *Tent.* 187. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 14. 51. — PLEURIDIUM Fée, *Gen. Fil.* 273. — CAMPYLONEURON Presl, *Tent.* 189. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 71 A. — CALYMODON Presl, *Tent.* 203. — NIPHOBOLUS Kaulf. *Enum. Fil.* 124. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 73. — PLEOPELTIS Humb. et Bonpl. ex Willd. *Sp. Plant. V.* 211. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 18. — DRYNARIA Bory in *Ann. Sc. Nat. I. Ser. V.* 464. t. 12—14. — AGLAOMORPHA Schott, *Gen. Fil. fasc. 4. t. 4.* *Hook. et Bauer, Gen. Fil. t.* 91. — DIPTERIS Reinw. *Syll. Ratisbon. II.* 3. — XIPHOPTERIS Kaulf. *Enum. Fil.* 85. — Grammitis Swartz, *Syn. Fil.* 21. ex parte, et synonyma multa alia.

Characteres omnino tribus.

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIIUM.

Series I. PHEGOPTERIS METTEN. Stipites cum caudice continui. Frondes mediocres, rarius parvae aut amplae, habitu omnino aspidioidae. Sori plerumque quoad venas dorsales.

§ 1. EUPHEGOPTERIS (Phegopteris Fée). Venae liberae. — *Tabula nostra XLVII. Fig. II.*

- a. Lamina oblongo-lanceolata, 2-pinnatifida vel -pinnata; venae in laciniis pinnatae, venulis omnino simplicibus.
 - α. Pinnae haud ultra medium dissectae.
 - Lamina membranacea; rachis nuda 1. P. ROTUNDATUM.
 - Lamina herbacea; rachis fibrilloso-paleacea 2. P. TIJUCANUM.
 - β. Pinnae ad costam vel alam angustam dissectae.
 - Pinnulae confertae, integerrimae; venulae pinnularum 20—30-jugae 3. P. DECUSSATUM.
 - Pinnulae laxae, conspicue inciso-crenatae; venulae pinnularum 10—15-jugae 4. P. CAUDATUM.
- b. Lamina deltoidea, 2-pinnata, venulis pinnularum furcatis.
 - 5. P. PTEROIDRUM.
- c. Lamina deltoidea, 2—3-pinnatifida, segmentis late foliaceis obtusis 6. P. MACROPTERUM.
- d. Lamina oblongo-lanceolata, 3-pinnatifida, segmentis parvis; caudex erectus 7. P. HIRSUTUM.
- e. Lamina deltoidea, 4-pinnatifida, segmentis parvis; caudex longe repens 8. P. PUNCTATUM.

§ 2. GONIOPTERIS PREST.: Venae pinnarum in fasciculis pinnatae, venulis inferioribus more *Eunephrodii* angulatim anastomosantibus. — *Tabula nostra XLVII. Fig. III.*

- a. Pinnae subintegrae vel repando-crenatae.
 Venulae 1—2 anastomosantes 9. P. DIVERSIFOLIUM.
 Venulae 6—8 anastomosantes 10. P. CRENATUM.
- b. Pinnae ad quartam vel dimidium pinnatifidae.
 11. P. ANDROGYNUM.

Series II. POLYPODIUM METT. Stipites basi articulati. Frondes saepe parvae, plus minus coriaceae. Sori plerumque quoad venas terminales.

§ 3. EUPOLYPODIUM. Venae liberae. — *Tabula nostra XLVII. Fig. IV.*

- a. Sori oblongi, utrinque secus costas primarias 1-seriati. (*Grammitis* Auct.)
- α. Lamina simplex.
 Margo frondis concolor 12. P. GRAMINEUM.
 Margo frondis cito ebeneus 13. P. MARGINELLUM.
- β. Lamina anguste ligulata, 1—3-ies dichotome furcata.
 14. P. FURCATUM.
- γ. Lamina anguste ligulata, profunde pinnatifida, pinnis rotundatis 15. P. ORGANENSE.
- δ. Lamina anguste ligulata, deorsum vel tota pectinato-pinnatifida vel -pinnata 16. P. SERRULATUM.
- b. Sori rotundati, plerumque 2—4 vel plures pro pinna.
- α. Lamina ad costam anguste alata pinnatifida.
 Lamina membranaceo-herbacea, utrinque nuda, pinnis ovato-deltoides repandis 17. P. TOVARENSE.
 Lamina subcoriacea, utrinque pubescens, pinnis integerrimis ovato-deltoides 18. P. KEGELIANUM.
 Lamina coriacea, supra nuda, infra dense albo-pruinata, pinnis integerrimis oblongo-ligulatis 19. P. DISCOLOR.
- β. Lamina simpliciter pinnata.
1. Lamina 3—6 lin. lata.
 * Sori solitarii 20. P. TRICHOMANOIDES.
 ** Sori plures pro pinna.
 † Erecta; sori 2—4 pro pinna 21. P. MONILIFORME.
 †† Pendulae; sori 6—10 pro pinna.
 Lamina glabra; sori distincte immersi.
 22. P. JUBAEFORME.
 Lamina dense vestita, sori superficiales.
 23. P. CULTRATUM.
var. elasticum.
2. Lamina 6 lin. vel ultra lata.
 * Plantae perfecte pendulae.
 † Lamina subsessilis; pinnae inferiores sensim reductae.
 Membranacea, glabra 24. P. PENDULUM.
 Subcoriacea, utrinque sparse vestita.
 25. P. GRADATUM.
 Membranacea, dense vestita 23. P. CULTRATUM.
- †† Lamina longe petiolata, pinnae infimae vix reductae.
 Herbacea; sori costales 26. P. SUSPENSUM.
 Chartacea; sori submarginales 27. P. MERIDENSE.
- ** Erectae vel subpendulae.
 † Pinnae pleraeque basi perfecte contiguae.
 Lamina siccitate nec nigrescens nec convoluta.
 Lamina rigida 6—12 lin. lata.
 Lamina utrinque nuda 21. P. MONILIFORME,
var. rigescens.
 Lamina infra et margine pills longis sparse vestita 28. P. PILOSISSIMUM.
 Lamina chartacea, 12—18 lin. lata, pinnis
 1 lin. latis 29. P. APICULATUM.
 Lamina membranacea, 3—4 poll. lata, pinnis
 3—4 lin. latis 30. P. CRNOOPHORUM.
 Lamina siccitate nigrescens et plus minus convoluta.
 Pinnae inferiores multae sensim reductae.
 Venulae obscurae 31. P. ELASTICUM.
 Venulae distinctae 32. P. PECTINATUM.
 Pinnae infimae vix reductae 33. P. RECURVATUM.

- †† Pinnae pleraeque basi distinctae sejunctae.
 Pinnae 6—9 lin. longae, 1—1½ lin. latae.
 34. P. OTITES.
 Pinnae 2—3 poll. longae, 2—3 lin. latae.
 35. P. PLEBEIUM.

γ. Lamina bipinnatifida 36. P. ACHILLEAEFOLIUM.

§ 4. GONIOPHLEBIUM BLUME: Venae regulariter pinnatae, venulae oppositae arcuatim anastomosantes, areolae inter costam et marginem regulariter seriatae, venulis liberis inclusis solitariis apice fertilibus. — *Tabula nostra XLVII. Fig. V.*

- a. Lamina simplex.
- α. Sori inter costam et marginem 1-seriati.
 1. Frondes coriaceae, difformes, integrae, fertiles ligulatae.
 Caudex crassitie pennae corvinae; frondes utrinque mox perfecte nuda 37. P. VACCINIFOLIUM.
 Caudex filiformis; frondes utrinque pills et paleis pel-tatis plus minus vestitae 38. P. PILOSILLOIDES.
2. Frondes papyraceae, subconformes, repandae, budae.
 39. P. SWARTZII.
- β. Sori inter costam et marginem multiseriati.
 40. P. GLAUCOPHYLLUM.

b. Lamina simpliciter pinnata.

- α. Lamina utrinque epaleacea.
1. Pinnae basi perfecte contiguae.
 Sori constanter 1-seriati; pinnae obtusae, basi vix dilatatae 41. P. CATHABINAE.
 Sori 1—2-seriati; pinnae acutae, inferiores basi utrinque dilatatae 42. P. LORICUM.
2. Pinnae basi distincte separatae.
 Caudex breviter repens, venae insculptae, sori superficiales 43. P. BRASILIENSE.
 Caudex late scandens, venae immersae, sori subimmersi 44. P. FRAXINIFOLIUM.
- β. Lamina infra dense paleacea.
 Lamina oblongo-lanceolata, pinnis 8—20-jugis, imis non reductis 45. P. INCANUM.
 Lamina longe ligulata, pinnis 25—50-jugis, multis imis sensim decrescentibus 46. P. LEPTOPTERIS.

§ 5. PHLEBODIUM R.B. Venae macularum fertillium regulariter pinnatim anastomosantes; areolae fertiles venulis liberis geminatis apice sorum unum commune gerentibus instructae. — *Tabula nostra XLVII. Fig. VI.*

- Sori inter costam et marginem 1—2-seriati.
 47. P. AUREUM.
 Sori inter costam et marginem 4—6-seriati.
 48. P. DECUMANUM.

§ 6. CAMPYLONEURON PREST.: Venulae regulariter pinnatim anastomosantes; areolae subconformes, venulis liberis solemniter 2 non convergentibus, singulis apice sorum gerentibus praeditae. — *Tabula nostra XLVIII. Fig. I.*

- a. Lamina simplex, ligulata.
- α. Venulae liberae macularum plerumque solitariae, raro geminatae 49. P. ANGSTIFOLIUM.
- β. Venulae liberae macularum geminatae.
 Maculae 3—5-seriatae, venae primariae flexuosae.
 50. P. LARVIGATUM.
 Maculae 6—10-seriatae, venae primariae rectae.
 51. P. PHYLLITIDIS.
- b. Lamina simpliciter pinnata 52. P. DECUBRENS.

§ 7. PHYMATODES PREST. (*Pleopeltis* H.B.K.): Venae in areolas copiosas irregulariter anastomosantes. Maculae appendiculatae vel ex-appendiculatae. — *Tabula nostra XLVIII. Fig. II.*

- a. Lamina simplex.
- α. Venae primariae longe intra marginem dissolutae.
 1. Lamina utrinque nuda vel raro subtus prope costam paleis paucis vestita.

- * Sori rotundati.
 † Lamina coriacea.
 Lamina 2—6 poll. longa 53. P. LYCOPODIODES.
 Lamina 12—18 poll. longa 54. P. MEGALOPHYLLUM.
 †† Lamina papyracea . . . 55. P. LINDBERGI.
 ** Sori oblongi 56. P. PERSICARIAEFOLIUM.
 2. Lamina subtus ubique furfuraceo-paleacea.
 Sori pro serie 10—15 . . . 57. P. LANCROLATUM.
 Sori pro serie 20—30 . . . 58. P. PERCUSSUM.
 β. Venae primariae usque ad marginem rectae et insculptae (*Anaxetum Schott*, *Pleuridium Fée*).
 Sori inter venas primarias 1-seriati 59. P. CRASSIFOLIUM.
 Sori inter venas primarias 2—5-seriati 60. P. EXSUL.
 b. Lamina profunde pinnatifida . . . 61. P. ANGUSTUM.

Series I. PHEGOPTERIS.

§ 1. EUPHEGOPTERIS.

1. POLYPODIUM ROTUNDATUM WILLD. stipitibus fasciculatis glabris, frondibus membranaceis plus minus pellucidopunctatis utrinque glabris oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, rachibus nudis, pinnis 20—30-jugis lineari-ligulatis sessilibus subpinnatifidis basi adnatis deorsum antice productis, imis paullulum reductis interdum breviter petiolatis, venulis 5—6-jugis simplicibus, inferioribus intra marginem evanescentibus; soris medialibus.

Tabula nostra LXIII. (habitus et analysis).

Plum. Fil. t. 38.

Polypodium rotundatum Willd. Sp. Plant. V. 247., non Hook. (Sp. Fil. IV. 238.)

Nephrodium rotundatum Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 253.

Lastrea rotundata Presl, Tent. 77.

Polypodium flavo-punctatum Kaulf. Enum. Fil. 108. Hook.

Sp. Fil. IV. 239. Hook. et Baker, Syn. Fil. 304.

Phegopteris flavo-punctata Fée. Gen. Fil. 243. Mett. Pheg. 20.

Phegopteris Prionitis Kunze ex Mart. in Regensb. Flora 1839. Beibl. I. 29. (Hb. Fl. Bras. n. 305.)

Phegopteris Prionitis Fée et Metten. loc. cit.

Nephrodium Imrayanum Hook. Sp. Fil. IV. 86. t. 242 A.

CAUDEX erectus, PALEIS obscure castaneis linearibus membranaceis 3—4 lin. longis sparse vestitus. STIPITES modice validi, griseo-straminei, 12—18 poll. longi, basi sparse paleacei. LAMINA gramineo-viridis, 2—3 pedes longa, 9—15 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. PINNAE mediae subcontiguae, subpatentes vel paullulum adscendentes, 5—8 poll. longae, 8—12 lin. latae, acutae, ad tertiam vel quartam pinnatifidae, laciniis oblongis integerrimis vel paullulum denticulatis 2—3 lin. latis, deorsum subasymmetricae praecipue pinnula anticâ imâ productâ, postice reductae, basi plus minus adnata, superiore cum rache subparallela, inferiore cuneato-truncata; inferiores paullulum reductae, sessiles vel breviter petiolatae. COSTAE stramineae vel griseae; VENAE in laciniis pinnatae; VENULAE 5—6-jugae, arcuatae, simplices, parallelae, imae intra marginem evanescentes. SORI mediocres, dorso venarum impositi.

Habitat in sylvis primaevis provinciarum Bahia, Espiritu Santo, Rio de Janeiro et S. Catharina: Luschnath!, Mart. Hb. Fl. Bras. 305!, Blanchet 2483!, Glaziou 964! 2400!, Fritz Müller! etc. Item incolit Columbian et insulas Antillanas. — Dryas et Extrabras.

2. POLYPODIUM TIJUCANUM RADDI: stipitibus fasciculatis totis fibrillosis, frondibus herbaceis utrinque glabris oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, rachibus fibrillosis, pinnis 12—20-jugis lineari-ligulatis ad quartam vel tertiam pinnatifidis, mediis sessilibus deorsum paullulum angustatis et basi utrinque recte

truncatis, imis breviter petiolatis et basi utrinque subcuneatis, venulis 8—12-jugis simplicibus, inferioribus intra marginem evanescentibus; soris medialibus.

Tabula nostra XLVII. Fig. II. (analysis).

Polypodium Tijucanum Raddi, Fil. Bras. 25. t. 37. Hook. Sp. Fil. IV. 239. Hook. et Baker, Syn. Fil. 305.

Phegopteris Tijucana Fée, Gen. Fil. 243. Metten. Pheg. et Asp. 20.

Polypodium refulgens Klotzsch Mss. Hook. et Baker, Syn. Fil. 307.

Phegopteris refulgens Metten. Ann. Sc. nat. V. Ser. II. 240.

CAUDEX erectus, PALEIS ferrugineis subulatis membranaceis 8—12 lin. vel ultra longis dense vestitus. STIPITES 12—18 poll. longi, stramineo-brunnei, paleis fibrillosis membranaceis patentibus ferrugineis 2—3 lin. longis toti vestiti. LAMINA supra saturate viridis, infra pallidior et ad costas fibrillosa, 1½—2 pedes longa, 8—12 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. RACHIS stramineo-brunnea, uti stipes fibrillosa. PINNAE subcontiguae, mediae 5—6 poll. longae, 10—14 lin. latae, acutae vel acuminatae, ad quartam vel tertiam pinnatifidae, laciniis obtusis denticulatis contiguis 2½—3 lin. latis. COSTAE stramineo-brunneae, infra fibrillosae; VENULAE arcuatae, simplices, imae intra marginem evanescentes. SORI mediocres, mediales.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad S. Gabriel: Spruce 2100!, ad Para: Martius; et in prov. Rio de Janeiro: Raddi, Glaziou 2401! aliique. Item incolit Guianam britannicam (Rich. Schomburgk 1128!), Peruviam (Spruce 4657!) et Columbian (Lindig 582!). — Vaga et Extrabrasit.

3. POLYPODIUM DECUSSATUM LINN. stipitibus validis fasciculatis griseo-brunneis pubescentibus interdum muricatis, frondibus chartaceo-herbaceis, supra praeter costas nudis, infra tenuiter pubescentibus et glandulosis, oblongo-lanceolatis, bipinnatifidis vel bipinnatis, pinnis 30—40-jugis sessilibus ligulatis patentibus ad costam vel alam angustam dissectis deorsum symmetricis, basi recte truncatis et subtus aërophoro instructis, pinnulis confertis lineari-ligulatis patentibus integris obtusis, venis simplicibus 20—30-jugis; soris densis basalibus.

Tabula nostra XXXII. Fig. 13—14. (partes pinnarum).

Polypodium decussatum Linn. Sp. Plant. 1555. Swartz, Syn. Fil. 40. Willd. Sp. Plant. V. 204. Hook. Sp. Fil. IV. 244., et Auctt.

Glaphyopteris decussata Presl, Gefässb. 36.

Phegopteris decussata Metten. Fil. Hort. Lips. 83. t. 17. fig. 8. Pheg. et Asp. 17. Ettingsh. tab. 102. fig. 5. tab. 109. fig. 6. 7.

Phegopteris grammicum Spreng. Neue Entd. III. 6.

Gymnogramme microcarpon Fée, VII. Mem. 43. t. 20. fig. 5.

CAUDEX erectus, PALEIS lanceolatis membranaceis brunneis vestitus. STIPITES caespitiosi, erecti, 2—3 pedes longi, plus minus breviter pubescentes. LAMINA supra gramineo-viridis praeter costas nuda, infra pallidior tenuiter pubescens et glandulosa, 3—6 pedes longa, 12—24 poll. lata, apice excepto bipinnatifida vel bipinnata. PINNAE 6—12 poll. longae, 10—15 lin. latae, contiguae, deorsum haud reductae, basi recte truncatae, infra aërophoro conspicuo instructae, imae mediis subaequales. PINNULAE 5—8 lin. longae, 1—1½ lin. latae. VENAE densae, simplices, rectae, erecto-patentes. SORI parvi, utrinque prope costas dense uniseriati.

Habitat in prov. S. Pauli udis sylvarum ad Paranangaba: Martius; prope Rio de Janeiro: Glaziou 2372!; loco Brasiliae non indicato: Langsdorff. E Peruvia praeterea ad insulas Antillanas disseminatum. — Dryadi-Oreas et Extrabrasit.

4. *POLYPODIUM CAUDATUM* KAULF. stipitibus fasciculatis glabris stramineo-brunneis sparse paleaceis, frondibus membranaceo-herbaceis utrinque glabris oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, rachibus glabris substramineis sparse paleaceis, pinnis ligulatis 20—30-jugis ad costam anguste alatum pinnatifidis deorsum symmetricis omnibus sessilibus, imis reliquis aequantibus, pinnulis laxis linearibus falcatis insigniter inciso-crenatis, venis 9—15-jugis raro furcatis; soris medialibus.

Tabula nostra XXXII. Fig. 7—8. (partes pinnarum).

Polypodium caudatum Kaulf. Enum. Fil. 113. Raddi, Fil. Bras. 25. t. 39. Hook. Sp. Fil. IV. 241.

Phegopteris caudata Fée, Gen. Fil. 243. Metten. Pheg. et Asp. 27. Ettingsh. t. 104. fig. 10. 12. t. 105. fig. 8.

Polypodium pediculariaefolium Presl, Del. Prag. I. 168. t. 186.

CAUDEX validus, erectus, PALEIS linearibus pallide brunneis membranaceis vestitus. STIPITES erecti, 12—18 poll. vel ultra longi. LAMINA paullulum pellucido-punctata, supra saturate viridis, infra pallidior, 2—3 pedes longa, 12—18 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. PINNAE contiguae, subpatentes, omnes ad costam 1—1½ lin. latam pinnatifidae, inferiores 6—9 poll. longae, 15—24 lin. latae, basi recte truncatae. RACHIS straminea, glabra, paullulum paleacea. PINNULAE laxae, spatio interjecto cum sinu angulato vel rotundato pinnulam saltem aequante, inferiores 8—12 lin. longae, 2—2½ lin. latae, imae interdum productae, basi auriculatae. VENULAE distinctae, simplices vel raro furcatae, erecto-patentes, rectae. SORI mediocres.

Habitat in sylvis primaevis prov. Minas Geraës: Freyreiss; Rio de Janeiro: Raddi, Martius, Schott, Pohl, Mikau, Glaziou 395! 1223! 2396!, Gardner 131!, Burchell 3835! etc. Item incolit insulas Antillanas. — Dryas, Oreas(?) et Extrabras.

5. *POLYPODIUM PTEROIDEUM* KLOTZSCH: stipitibus fasciculatis glabris stramineis basi paleaceis, frondibus nudis deltoideis membranaceo-herbaceis perfecte bipinnatis, pinnis 30—40-jugis lanceolatis utrinque angustatis, imis valde reductis, pinnulis lineari-ligulatis sessilibus integris vel crenatis obtusis vel subacutis, mediis plerisque laxis, inferioribus deflexis reductis, venulis pinnularum plerisque furcatis; soris medialibus.

Polypodium pteroidium Klotzsch, Linnæa XX. 389. Hook. Sp. Fil. IV. 255. t. 280. Hook. et Baker, Syn. Fil. 308.

Phegopteris pteroides Metten. Pheg. et Aspid. 9.

Polypodium pseudopteris et *Pteris fallax* Kunze Mss.

CAUDEX erectus vel suberectus. STIPITES fasciculati, 1—4 pedes longi, sursum nudi straminei, deorsum PALEIS densis brunneis membranaceis lanceolatis 4—6 lin. longis instructi. LAMINA utrinque obscure viridis, ad 8—10 pedes interdum longit. attingens, pendula vel inter ramos vicinos subvolubilis (SPRUCKE), deorsum 2—3 pedes lata. PINNAE subsessiles vel breviter petiolulatae, symmetricae, inferiores 12—18 poll. longae, in medio 1—3 poll. latae, deorsum reductae, imae multo minores. PINNULAE 20—30-jugae, contiguae vel saepe laxae, anguste lineari-ligulatae, 6—18 lin. longae, 1½—3 lin. latae, basi adnatae vel mediae subsolutae, inferiores deflexae sensimque reductae. RACHES graciles, stramineae, nuda. VENULAE pinnularum distinctae, adscendentes, simplices vel furcatae vel interdum subpinnatae. SORI mediocres mediales.

Habitat ad Rio de Janeiro: Glaziou 2822!, et praeterea in Ecuador et Columbia. — Dryas et Extrabrasil.

6. *POLYPODIUM MACROPTERUM* KAULF. stipitibus fasciculatis griseo-stramineis nudis, frondibus membranaceo-vel papyraceo-herbaceis utrinque nudis lanceolato-deltoideis vel deltoideis

Polypod.

2—3-pinnatifidis, pinnis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, imis maximis petiolatis, segmentis ultimis late foliaceis obtusis integris contiguis, venis pinnatis; soris medialibus.

Var. α . *MACROPTERUM* Baker.

Polypodium macropterum Kaulf. Enum. Fil. 111.

Phegopteris macropterum Fée, Gen. Fil. 243.

Phegopteris splendida var. Metten. Pheg. et Asp. 29.

Alsophila Fischeriana Regel Mss.

Polypodium Fischerianum Baker in Hook. et Baker Syn. Fil. 455.

CAUDEX erectus, PALEIS brunneis linearibus 4—6 lin. longis vestitus. STIPITES erecti, 8—12 poll. longi, basi solum paleacei. LAMINA supra obscure viridis, infra pallidior subnitida, nuda vel ad costas infra paullulum paleacea, 1½—3 pedes longa, 1½—2 pedes lata, bipinnatifida. PINNAE solutae 9—12-jugae, anguste lanceolatae, inferiores maximae, breviter petiolatae, 6—9 poll. longae, 1½—2½ poll. latae, deorsum ad costam 1—2 lin. latam pinnatifidae; PINNULIS oblongis falcatis integris obtusis vel oblique subacutis, 8—12 lin. longis, 4—6 lin. latis. RACHIS straminea vel grisea, nuda. VENULAE pinnularum pinnatae, graciles, distinctae. SORI quoad venas mediales, mediocres, inter costam et marginem pinnularum irregulariter uni- vel biseriati.

Var. β . *SPLENDIDUM* Baker.

Tabula nostra XXXII. Fig. 2—3. (pinna et pinnula).

Polypodium splendidum Kaulf. Enum. 112. Hook. Sp. Fil. IV. 258., ex parte.

Phegopteris splendida Fée, Gen. Fil. 243. Metten. Pheg. et Asp. 28. Ettingsh. t. 103. fig. 1—3. Wawra, Maximil. Reise 202.

Polypodium formosum Raddi, Fil. Bras. 25. t. 38.

Phegopteris formosum Fée, Gen. Fil. 243.

Polypodium auriculatum Raddi, Syn. Fil. 74.

Polypodium grande Presl, Del. Prag. I. 171.

Polypodium repandum Vell. Fl. Flum. XI. t. 73.

Major, tenerior, pinnis imis 9—12 poll. longis, 4—6 poll. latis, deorsum ad costam pinnatis, pinnulis 2—3 poll. longis incisus vel pinnatifidis, venis in laciniis pinnularum pinnatis, venulis 3—4-jugis, soris inter costam et marginem 2—3-seriatis.

Var. γ . *CONNEXUM* Baker.

Tabula nostra XXXI. Fig. 24. 25. et XXXII. Fig. 1. (apices pinnularum).

Polypodium connexum Kaulf. Enum. Fil. 120. Mart. Icon. Crypt. Bras. 90. t. 65. Hook. Sp. Fil. IV. 261.

Phegopteris connexa Fée, Gen. Fil. 243. Metten. Pheg. et Asp. 29. Ettingsh. t. 105. fig. 4. t. 106. fig. 17. 18.

Major, membranacea, deltoidea, 3—4 pedes longa, 2—3 pedes lata, 3-pinnatifida, pinnis imis oblongo-lanceolatis 12—18 poll. longis, 6—8 poll. latis, apice excepto pinnatis, pinnulis solutis 12—15-jugis lineari-ligulatis ad dimidiam vel ¾ latitudinis pinnatifidis, segmentis contiguis latis obtusis integris, venulis in segmentis 6—8-jugis plerisque soriferis.

Habitat forma α . in sylvis primaevis prov. Rio de Janeiro: Pohl, Raddi!, Gardner 17! 5918!, Glaziou 966! 1676! 2398!, Mac Gillivray!, Bowie et Cunningham! etc. — Var. β . in prov. Rio de Janeiro: Glaziou 394! 958!, Wawra et Maty 409; et in prov. Bahia: Claussen 111. — Var. γ . aequae in prov. Rio de Janeiro: Gardner 134!, Burchell 1915! 1919!, Martius, Schott, Glaziou 1780! 2066! 2397! 2399! etc.; in prov. Bahia: Blanchet 2469! e. gr. in sylvis aboriginibus, locis udis suffocatis, prope S. Pedro d'Alcantara et Villa dos Ilheos: Luschnath (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 327.); prov. Minas Geraës: Freyreiss, Lindberg 546!; Goyaz: Pohl. — Dryas, Oreas.

7. *POLYPODIUM HIRSUTUM* SWARTZ: stipitibus fasciculatis pilis lanosis patentibus flavo-brunneis dense vestitis, frondibus membranaceis parvis oblongo-lanceolatis 3-pinnatifidis utrinque pilis longis nitidis hirsutis, rachibus gracilibus dense vestitis, pinnis 15—20-jugis lanceolatis breviter petiolatis, imis maximis; pinnulis contiguas oblongo-lanceolatis sessilibus basi aequaliter cuneatis inciso-pinnatifidis, segmentis adscendentibus, venis in pinnulis pinnatis; soris medialibus.

Tabula nostra LXIV. Fig. 1. (Habitus et analysis).

Polypodium hirsutum Swartz in *Stockholm. Vet. Akad. Handl.* 1817. p. 61.

Polypodium lasiernos Spreng. *Syst. Veg. IV.* 6.

Phegopteris lasiernos Metten. *Pheg. et Asp.* 28.

CAUDEX erectus, PALEIS lineari-subulatis flavo-brunneis 3—4 lin. longis dense vestitus. STIPITES graciles, 2—3 poll. longi, pilis flavo-ferrugineis lanosis patentibus vel squarrosis 1—1½ lin. longis dense vestiti. LAMINA obscure viridis, 4—9 poll. longa, 2—4 poll. lata; utrinque praecipue infra pilis longis fibrillosis nitidis vestita. RACHES sicut stipites vestitae. PINNAE contiguae, mediae patentis, 1—2 poll. longae, 5—7 lin. latae, perfecte pinnatae, deorsum symmetricae, basi cordatae, imae paulo majores interdum deflexae. PINNULAE symmetricae oblongo-lanceolatae, obtusae, 2—3 lin. longae, 1—1½ lin. latae, ad ½ latitudinis dissectae, SEGMENTIS oblongo-lanceolatis obtusis, basi utrinque cuneatae. VENULAE rectae erecto-patentes, simplices vel imae furcatae. SORI parvi, mediales.

Habitat in apricis montosis prope Ouro Preto prov. Minarum: Freyreiss!, Langsdorff!, Martius. — Oreas.

8. *POLYPODIUM PUNCTATUM* THUNB. stipitibus segregatis glanduloso-rugulosis, frondibus herbaceis utrinque breviter glanduloso-hispidis deltoideis 4-pinnatifidis, rachibus strictis glanduloso-rugulosis, pinnis oblongo-lanceolatis distincte petiolatis, imis maximis, pinnulis petiolatis patentibus lineari-ligulatis, segmentis sessilibus oblongo-lanceolatis plus minus inciso-pinnatifidis, venulis ad basin sinuum egredientibus prope apicem soriferis.

Polypodium punctatum Thunb. *Fl. Jap.* 337. Swartz, *Syn. Fil.* 41. Willd. *Sp. Plant. V.* 208. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 312. *Phegopteris punctata* Metten. in *Miq. Ann. Mus. Lugd.-Bat. I.* 222.

Polypodium rugulosum Labill. *Fl. Nov. Holl. II.* 92. t. 241. *R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl.* 147. Hook. *Sp. Fil. IV.* 272.

Polypodium Poeppigii Kunze, *Linnaea IX.* 50.

Polypodium fulvescens Hook. et Grex. *Bot. Misc. II.* 239.

Hypolepis chilensis Fée, *VIII. Mem.* 76.

Hypolepis helenensis Fée, *Gen. Fil.* 147.

Cheilanthes polypodioides Blume, *Fil. Jav.* 139.

Cheilanthes dicksonioides Endl. *Prodr. Fl. Norf.* 15.

Cheilanthes amaurorachis Kunze, *Linnaea 1850.* p. 306., et synonyma multa alia.

Forma brasiliensis: *RIGESCENS* Baker.

Tabula nostra LXV. (Habitus).

Cheilanthes rigescens Kunze *Mss. Mart. Hb. Fl. Bras. p.* 227.

CAUDEX hypogaeus, longe repens, PALEIS glandulosis minimis linearibus castaneis sursum dense vestitus. STIPITES erecti, 6—9 poll. longi, straminei, basi castanei, toti tenuiter glanduloso-furfuracei. RACHES strictae, patentis, stramineae, glanduloso-furfuraceae. LAMINA supra obscure viridis, praecipue ad costas breviter hispida, infra pallidior et pilis glandulosis griseis fur-

furacea, 1½—2 pedes longa et lata. PINNAE contiguae, patentis, imae 6—12 poll. longae, 4—5 poll. latae. PINNULAE breviter petiolatae, contiguae vel sublaeae, imae 1¼—2½ poll. longae, 4—6 lin. latae, basi recte truncatae, apice excepto pinnatae. SEGMENTA symmetricae oblongo-lanceolata, obtusa, inferiora profunde inciso-pinnatifida. VENAE in segmentis pinnatae, VENULIS simplicibus. SORI mediocres, interdum demum totam faciem inferiorem segmentorum occupantes.

Probabiliter varietatem exindusiata *Hypolepidis repentis* sinit.

Habitat in sylvis siccoribus, locis montanis prope Ilheos et atibi: Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 383!). Incolit praeterea regiones calidiores et austro-temperatas utriusque orbis.

§ 2. GONIOPTERIS.

9. *POLYPODIUM DIVERSIFOLIUM* SWARTZ: stipitibus nudis segregatis, frondibus oblongo-lanceolatis totis simpliciter pinnatis chartaceo-herbaceis utrinque nudis subnitidis interdum apice proliferis, pinnis 8—15-jugis lanceolato-ligulatis integris vel repandulis, inferioribus breviter petiolatis basi subcuneatis, imis medias aequantibus, venulis 4—6-jugis simplicibus 1—2 anastomosantibus; soris superioribus medialibus, inferioribus apicalibus confluentibus.

Polypodium diversifolium Swartz, *Stockholm. Vet. Akad. Handl.* 1817. p. 60. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 314., non *R.Br.* quod ad *P. rigidulum* Swartz spectat.

Polypodium viviparum Raddi, *Fil. Bras.* 22. t. 32.

Goniopteris vivipara Brack. *Fil. U. St. Am. Expl. Exped.* 27.

Polypodium proliferum Kaulf. *Enum. Fil.* 107.

Phegopteris prolifera Metten. *Fil. Hort. Lips.* 84. *Pheg. et Asp.* 24.

Polypodium Freyreissii Spreng. *Syst. Veg. IV.* 55.

CAUDEX lignosus, repens, crassitie digiti, PALEIS linearibus castaneis membranaceis 3—4 lin. longis vestitus. STIPITES erecti, graciles, stricti, angulati, grisei vel raro castaneo-ebenei, 6—18 poll. longi. LAMINA supra obscure viridis, infra pallidior, 12—18 poll. longa, 4—8 poll. lata. RACHIS stricta, grisea, nuda. PINNAE sessiles vel breviter petiolatae, laxae, adscendentes vel subpatentes, inferiores 3—4 poll. longae, 6—10 lin. latae, acutae, marginibus subintegris vel repandulis, basi subcuneata antice paululum producta et rotundata. VENAE pinnarum in fasciulis subpatentibus vel paullulum adscendentibus 1—1½ lin. latis pinnatae, VENULIS erecto-patentibus simplicibus 4—6-jugis, 1—2 imis anastomosantibus. SORI venularum superiorum mediales, inferiorum apicales, fasciculorum vicinorum confluentes.

Habitat in prov. Minas Geraës: Langsdorff, Martius, Freyreiss; prov. Bahia: Blanchet!, Luschnath; Rio de Janeiro: Pohl!, Raddi!, Gardner 18!, Burchett!, Glaziou 409! 1643! 1685!; prov. S. Paulo: Foa!; et S. Catharina: Fritz Müller. — Vaga.

10. *POLYPODIUM CRENATUM* SWARTZ: stipitibus segregatis griseo-stramineis sursum breviter griseo-pubescentibus, frondibus oblongo-delloideis simpliciter pinnatis membranaceis subtus breviter griseo-pubescentibus, pinnis 3—6-jugis sessilibus ligulato-lanceolatis acutis repando-crenatis, inferioribus medias aequantibus deorsum angustatis, venulis 8—12-jugis plerisque anastomosantibus; soris medialibus.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 5—6 (pinna et ejus pars).

Polypodium crenatum Swartz, *Fl. Ind. Occ. III.* 1661. *Syn. Fil.* 37. Willd. *Sp. Plant. V.* 189. Hook. *Sp. Fil. IV.* 2. *Splüg. Enum. Fil. Surin.* 22.

Goniopteris crenata Presl, Tent. 183.

Phegopteris crenata Metten. Fil. Hort. Lips. 84. Pheg. et Asp. 25.

Goniopteris Rivoirei Fée, Fil. Ant. t. 18. (forma parva).

CAUDEX repens, lignosus, crassitie digiti, PALEIS parvis linearibus membranaceis sursum sparse vestitus. STIPITES 6—15 poll. longi, erecti, stricti, modice graciles. LAMINA utrinque gramineo-viridis, infra praecipue ad venas breviter molliterque griseo-pubescentis, 12—18 poll. longa, 8—12 poll. lata, tota simpliciter pinnata. RACHIS straminea, breviter griseo-pubescentis. PINNAE contiguae, ascendentes vel subpatentes, 4—6 poll. longae, 1—2 poll. latae, superiores basi symmetrice rotundatae, inferiores mediis aequales deorsum valde angustatae, terminalis lateralibus saepe latior. VENAE pinnarum in fasciculis subpatentibus $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis pinnatae, venis medianis distinctis, venulis gracilibus erecto-patentibus 8—12-jugis plerisque anastomosantibus. SORI parvi, quoad venulas mediales.

Habitat in umbrosis prov. Bahiae: Princ. Neovidensis, Salzmann!, Lockhart!. — Praeterea in Guiana batava (Spitzgerber, Kegel 127, Kappler 1755) et e Columbia ad insulas Antillanas. — Dryas et Extrabras.

11. POLYPODIUM ANDROGYNUM POIR. stipitibus subsegregatis griseo-stramineis subnudis vel sursum breviter griseo-pubescentibus, frondibus oblongo-lanceolatis bipinnatifidis herbaceis vel paullulum papyraceis vel membranaceis utrinque subnudis vel subtus breviter griseo-pubescentibus, pinnis 6—20-jugis lineari- vel lanceolato-ligulatis ad $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ pinnatifidis, inferioribus deorsum angustatis sessilibus vel breviter petiolatis, imis paullulum reductis, venulis 6—12-jugis paucis anastomosantibus; soris ad costas approximatis.

Polypodium androgynum Poir. Enc. V. 535. (1804).

Var. α . TETRAGONUM Baker.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 1—2. (pinnae, titulo P. tetragoni) et XLVII. Fig. III. (analysis).

Polypodium tetragonum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1670. Syn. Fil. 37. Willd. Sp. Plant. V. 203. Schkuhr, Fil. 23. t. 18b. Splüg. Enum. Fil. Surin. 23., et Aucit.

Phegopteris tetragona Mett. Fil. Hort. Lips. 84. Pheg. et Asp. 22. Eüttingsh. Farnkr. t. 107. fig. 1. 9.

Polypodium subtetragonum Link, Sp. Fil. 181.

Goniopteris tetragona et *subtetragona* Presl, Tent. 182—3.

Goniopteris leptocladia, *pyramidata*, *quadrangularis*, *gudalupensis*, *rostrata* et *hastata* Fée, Fil. Ant. t. 16—18.

Plumier Fil. tab. 16., frons fertilis sinistra (bona).

CAUDEX breviter repens, PALEIS linearibus brunneis 3—4 lin. longis sparse vestitus. STIPITES 6—18 poll. longi, erecti, stricti. LAMINA supra praeter costas glabra, infra subnuda vel breviter griseo-pubescentis, 12—18 poll. longa, 6—10 poll. lata, apice excepto bipinnatifida. RACHIS griseo-straminea, subnuda vel breviter griseo-pubescentis. PINNAE solutae 9—20-jugae, lineari-ligulatae, superiores sessiles, basi recte truncatae, inferiores subpatentes sessiles vel breviter petiolatae, 3—5 poll. longae, 6—10 lin. latae, ad $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ pinnatifidae, segmentis oblongis contiguis integris $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis, deorsum angustatae, basi saepe symmetrice subcuneatae, imae mediis paullulum breviores saepe deflexae. VENAE in laciniis pinnatae, venulis erecto-patentibus 6—9-jugis, 1—2 imis anastomosantibus. SORI parvi.

Var. β . MEGALODUS Baker.

Plumier Fil. t. 16., frons sterilis dextera.

Polypodium megalodus Schkuhr, Fil. 24. t. 19b. Kaulf. Enum. Fil. 109—110., et Aucit.

Phegopteris megalodus Metten. Pheg. et Asp. 24.

Aspidium megalodus Metten. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 248.

Polypodium oblitteratum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1660.?

Polypodium ciliatum Spreng. Nov. Acta X. 229.

Polypodium Sprengelii Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 239.

Major, membranaceo-herbacea, saturatus viridis, saepe utrinque paullulum griseo-pubescentis, lamina oblongo-deltaeidea, pinnis 6—9-jugis, inferioribus 6—8 poll. longis 15—24 lin. latis ad $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ pinnatifidis, pinnulis 2—3 lin. latis, venis 9—12-jugis saepe 3—4 anastomosantibus, pinna terminali saepe lateralibus latiore.

Habitat forma α . in prov. Rio de Janeiro et Bahiae: Pohl, Schott, Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 319!), Burchell, Blanchet etc.; in prov. do Alto Amazonas: Martius, Spruce 1107!; in Guyana batava (Hostmann 465, Splitgerber, Kegel 125, Kappler 1775—6), gallica (Lepricur!) et anglica (Rich. Schomburgk 136!, Appun). — Forma β . in prov. Bahiae: Luschnath!, et Rio de Janeiro: Glaziou 2402!. — Utraque forma praeterea e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Vaga et Extrabras.

Series II. POLYPODIUM.

§ 3. EUPOLYPODIUM.

(12.) POLYPODIUM GRAMINEUM SWARTZ: frondibus perparvis longe petiolatis rigide coriaceis nudis anguste ligulatis integris margine concoloribus basi cito cuneatis, venis laxis prope basin unifurcatis; soris rotundato-oblongis, utrinque prope costas laxe uniseriatis.

Polypodium gramineum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1629, Metten. Polypod. 35. Hook. Sp. Fil. IV. 165. Hook. et Baker, Syn. Fil. 321.

Grammitis linearis Swartz, Syn. Fil. 21. Willd. Sp. Plant. V. 138. Schkuhr, Fil. 8. t. 7. Presl, Tent. 209. etc.

Grammitis caespitosa Blume, Fl. Jav. 106. t. 46, 1.

Polypodium nudum Metten. Polypod. 37.

Mecosorus nudus Klotzsch, Linnaea XX. 405.

CAUDEX gracilis, breviter repens, PALEIS lineari-subulatis membranaceis ferrugineis 1 lin. longis dense vestitus. STIPITES subsegregati, pergraciles, stricti, 6—12 lin. longi, breviter griseo-villosi. LAMINA supra griseo-viridis, infra pallidior, 2—4 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ lin. lata, sursum angustata, basi cito cuneata. VENAE immersae, laxae, erecto-patentes, omnes prope basin unifurcatae, e costâ ad marginem egredientes. SORI distincte immersis, $1\frac{1}{2}$ lin. longi, ad basin ramorum anticorum venarum impositi, utrinque secus costam 10—20 laxe uniseriati, costae magis quam margini approximati et cum ea subparalleli.

Habitat in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1650, 1187!, itemque insulas Antillanas et Javam, in Brasilia amazonica forte invenientum.

13. POLYPODIUM MARGINELLUM SWARTZ: frondibus perparvis sessilibus rigide coriaceis nudis anguste ligulatis obtusis integris, margine calloso ebeneo circumscriptis, infra medium ad basin sensim angustatis, venis simplicibus erecto-patentibus; soris rotundato-oblongis, utrinque prope costas dense uniseriatis.

Tabula nostra XLVII. Fig. IV. (analysis).

Polypodium marginellum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1631. Metten. Polypod. 34. Hook. Sp. Fil. IV. 164. Hook. et Baker, Syn. Fil. 321. Kuhn, Fil. Afr. 149. Milde, Fil. Eur. et Atlant. 15.

Grammitis marginella Swartz, Syn. Fil. 22. Willd. Sp. Plant. V. 139. Schkuhr Fil. 8. t. 7., et Aucit.

Mecosorus marginellus Klotzsch, Linnaea XX. 405.

Grammitis limbata Fée, Gen. Fil. 233. Mem. VI. G. t. 5. fig. 1.

Grammitis linearis Bory, Voy. Coquill. 257.

Grammitis quaerenda Bolle, Berliner Zeitschr. für Erdkunde XIV. 324.

CAUDEX erectus, PALEIS obscure brunneis membranaceis subulatis 1 lin. longis vestitus, FRONDIBUS aegre petiolatis dense caespitosis coronatis. LAMINA utrinque nuda, griseo-viridis, 4—8 poll. longa, 2—4 lin. lata, sursum angustata demum obtusa, deorsum infra medium ad basin sensim attenuata, margine callosa fibroso ebeneo circumscripta. VENAE laxae, parallelae, distincte intra marginem evanescentes. SORI prope basin venarum impositi, demum saepe confluentes.

In prov. Rio de Janeiro: *Glaziou 2456!*; in saxis et arboribus prov. Minas Geraës, et Alto Amazonas ad fl. Rio Negro: *Martius*. — Praeterea in Guyana britannica (*Rich. Schomburgk 1211!*) et in Peruvia ad insulas Antillanas, etiam in insula S. Helenae, insulis Capverdicis et in Africa tropica occidentali omnium. — Vaga et Extratropis.

14. POLYPODIUM FURCATUM METTEN. frondibus parvis sessilibus rigide chartaceis nudis 1—3-ies dichotome furcatis, divisionibus anguste ligulatis repandis, primariis ad basin sensim angustatis, venis laxis simplicibus erecto-patentibus; soris oblongis utrinque secus costas laxe uniseriatis.

Polypodium furcatum Metten. Polypod. 34. Hook. Sp. Fil. IV. 174. Hook. et Baker, Syn. Fil. 322., non Desv.

Grammitis furcata Hook. et Gren. Ic. Fil. t. 62. Hb. Bot. et Bauer, Gen. Fil. t. 72 B. f. 1—6. Presl, Tent. 209.

CAUDEX gracilis, erectus, PALEIS linearibus parvis ferrugineis sparse vestitus. LAMINA aegre petiolata, utrinque nuda, griseo-viridis, 2—4 poll. longa, divisionibus $\frac{1}{2}$ —1 lin. latis obtusis sinuato-crenatis, primariis ad basin sensim angustatis. COSTAE graciles, ebeneae; venae immersae, laxae, omnes simplices, intra marginem evanescentes. SORI $\frac{1}{2}$ lin. longi, ad apicem venarum impositi.

Habitat ad truncos arborum in sylvis humidis prov. do Alto Amazonas, ad ripas fluv. Jauareté: *Spruce 2452!*; in Guyana britannica (*Parker!*, *Rich. Schomburgk!*, *Appun 1005!* 1701!) et in gallica (*Leprieur!*). — *Najas et Extrabras.*

15. POLYPODIUM ORGANENSE METTEN. frondibus parvis breviter petiolatis erectis rigide chartaceis nudis anguste ligulatis totis profunde pinnatifidis, pinnis oblongis obtusis confertis integerrimis, inferioribus sensim diminutis, venis pinnarum multifurcatis; soris oblongis confluentibus utrinque prope costas primarias dense uniseriatis.

Polypodium organense Metten. Polypod. 39. Hook. Sp. Fil. IV. 177. Hook. et Baker, Syn. Fil. 324.

Grammitis organensis Gardner in Hook. Ic. Plant. t. 509.

CAUDEX erectus, PALEIS parvis rigidis castaneis sursum vestitus. STIPITES dense caespitosi, grisei, stricti, 6—12 lin. longi, subnulli. LAMINA supra obscure viridis, infra pallidior, utrinque nuda, 4—6 poll. longa, 3—4 lin. lata, usque ad costam anguste alatum pinnatifida, pinnis contiguis erecto-patentibus 1 lin. latis. VENAE in pinnis singulis multifurcatae, ramis inferioribus in pinnis mediis longe infra apicem evanescentibus, ramis superioribus ad basin sinuum egredientibus. SORI ramos superiores venarum prorsus occupantes, cito confluentes.

Habitat in Serra dos Orgãos, ad rupes et truncos arborum: *Gardner 5913!*. — *Dryas.*

Obs. Ad *P. truncotam* Klotzsch habitu accedens, sed glabritie texturaeque frondis et soris abunde differt.

16. POLYPODIUM SERRULATUM METTEN. frondibus parvis subsessilibus rigide chartaceis nudis vel paululum pubescentibus anguste ligulatis, sterilibus totis pectinato-pinnatifidis vel pinnatis, fertilibus deorsum sterilibus consimilibus, triente vel quadrante superiore integro vel pectinato-pinnatifido solum sorifero, venis simplicibus erecto-patentibus; soris oblongis utrinque prope costas dense uniseriatis, cito confluentibus.

Polypodium serrulatum Metten. Fil. Hort. Lips. 30. Polyp. 32. Hook. Sp. Fil. IV. 174. Hook. et Baker, Syn. Fil. 323. Ettingsh. tab. 20. fig. 4—8. 11—16. 18.

Grammitis serrulata Swartz, Syn. Fil. 22. Willd. Sp. Plant. V. 141. Schkuhr, Fil. 9. t. 7. (fig. 1. supera sinistra). Raddi, Fil. Bras. 11. t. 22. fig. 2., et Auct.

Asplenium serrulatum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1607.

Micropteris serrulata et orientalis Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 216.

Xiphopteris serrulata Kaulf. Enum. Fil. 85. Hook. Gard. Ferns t. 44. Spléty. Enum. Fil. Surin. 11.

Xiphopteris Jamesoni Hook. II. Cent. Ferns t. 14.

Xiphopteris extensa Fée, Fil. Ant. t. 19.

Polypodium minimum Brack. Fil. Amer. Expl. Exped. tab. 2. fig. 1.

CAUDEX pergracilis, longe repens, PALEIS linearibus parvis brunneis sparse vestitus. FRONDES difformes, vix vel breviter petiolatae, obscure virides, steriles 1—2 poll. longae, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. latae, ad $\frac{1}{2}$ latitudinis vel deorsum ad costam pectinato-dissectae, divisionibus rigidis deltoideis, margine superiore subhorizontaliter patente, basi decurrente, inferioribus reductis; fertiles longiores, parte apicali sorifera integra 6—12 lin. longa. COSTAE rigidae; VENAE simplices erecto-patentes, in parte sterili in lacinia solitariae, intra apicem dentium evanescentes. SORI ad partem subintegram frondium fertilium restricti, prope basin venarum impositi.

Var. β . MYOSUROIDES Baker.

Polypodium myosuroides Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1644. Metten. Polypod. 33. Ettingsh. tab. 20. fig. 9. 10. 24. 25.

Grammitis myosuroides Swartz, Syn. Fil. 22. Schkuhr, Fil. 9. tab. 7. Raddi, Fil. Bras. 12. t. 22 bis. fig. 3.

Xiphopteris myosuroides Kaulf. Enum. 85.

Polypodium setosum Metten. Polyp. 33. Hook. Sp. Fil. IV. 175.

Xiphopteris setosa Kaulf. Enum. Fil. 275.

Grammitis setosa Presl, Tent. 208.

Lamina breviter petiolata, utrinque breviter griseo-pubescentis, tota profunde pinnatifida vel subpinnata, divisionibus angustioribus linearidecurrentibus. Frondes fertiles et steriles conformes, fertiles praeter trientem v. quadrantem inferiorem soriferae. Sori solum ad basin laciniarum impositi, confluentes.

In regionibus tropicis late diffusum, Americam centalem cum insulis Antillanis et australem tropicam usque in Peruviam et Brasiliam australem, insulas Sandwicensis, Mascarenas, et Africam tropicam occidentalem incolit. Intra Brasiliae fines typus speciei observatus est in prov. do Alto Amazonas: *Spruce 2312!*; prov. Bahia: *Blanchet 3926!*; Rio de Janeiro: *Raddi!*, *Sello!*, *Burchell!*, *Gaudichaud!*, *Gardner 106!*, *Glaziou 1719!* 2384! etc.; prov. S. Paulo: *Burchell!*, et S. Catharina: *Fritz Müller!* — Var. β . in Serra dos Orgãos aliisque locis prov. Rio de Janeiro: *Raddi!*, *Gaudichaud!*, *Gardner!*. — Vaga et Extrabrasil.

(17.) POLYPODIUM TOVARENSE KLOTZSCH: frondibus parvis flaccidis pendulis nudis membranaceo-herbaceis anguste ligulatis, ad costam anguste alatum pinnatifidis, pinnis inaequaliter ovato-deltoideis obtusis repandis, basi superiore emarginata, inferiore longe decurrente, venis pinnarum pinnatis, venulis brevibus simplicibus 2—3-jugis; soris rotundatis 2—4 pro pinna, in pinnarum medio cito confluentibus.

Polypodium Tovarense Klotzsch, Linnaea XX. 374.

Polypodium Phlegmaria J. Smith in Hook. Lond. Journ. Bot. I. 195. (nomen absque descript.)

Polypodium subdimidiatum Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. 324.

CAUDEX gracilis, erectus, paleis subnullis. **STIPITES** dense caespitosi, 2—4 lin. longi, praegraciles, grisei, nudi. **LAMINA** pallide viridis, utrinque omnino nuda, 6—12 poll. longa, 5—6 lin. lata; **PINNAE** contiguae vel sublaeae 1½—2 lin. latae, antice productae auriculatae, basi emarginatae et inferiore longe decurrentes. **COSTA** gracilis, immersa, tota anguste alata; **VENAE** in pinnis pinnatae, **VENULIS** gracilibus erecto-patentibus cum vena primaria intra marginem evanescentibus. **SORI** quoad venas apicales.

Habitat in Guiana britannica (Rich. Schomburgk 161!, Appun 1130!), in Andibus Ecuadorensibus (Jameson 2122!) et in Venezuela ad coloniam Tovar (Fendler 207!, Moritz 251!). Forte in Brasilia amazonica detegenda.

(18.) **POLYPODIUM KEGELIANUM** KUNZE: frondibus parvis subsessilibus caespitosi subcoriaceis utrinque pubescentibus ligulato-lanceolatis ad costam anguste alatum pinnatifidis, pinnis ovato-deltaeideis obtusis integris, inferioribus decrescentibus, venulis simplicibus; soris submarginalibus, utrinque 2—3 pro pinna.

Polypodium Kegelianum Kunze, Linnaea XXI. 210. Metten. Polypod. 47. Hook. Sp. Fil. IV. 189.

Nondum vidi, igitur descriptionem cl. METTENII repeto. „**RHIZOMA** caespitosum, **PALEIS** ovatis acutis flaccidulis onustum. **FOLIA** 2—3 poll. longa, subsessilia, subcoriacea, ad basin pilis ferrugineis villosa, utrinque, infra densius, pubescenti-hirsuta, lanceolata, pinnatipartita; **LACINIAE** (pinnae nob.) 2—2½ lin. longae, ala latiuscula coadunatae, e basi latiore inferne decurrente triangulato-ovatae, obtusae, integerrimae. **NERVI** manifeste evoluti. **SORI** utrinque ad costulam 2—3, margini approximati.“

Ad *P. discolor* accedens. „*Alias huic affines non novimus*“ KUNZE.

Habitat in Guiana batava: Kegeel 1072.

(19.) **POLYPODIUM DISCOLOR** HOOK. frondibus sessilibus caespitosi flaccide coriaceis, supra nudis griseis, infra dense albo-pruinatis, ligulato-lanceolatis, ad costam anguste alatum pinnatifidis, pinnis contiguis oblongo-ligulatis obtusis integerrimis, inferioribus decrescentibus, venis in pinnis pinnatis, venulis simplicibus 5—6-jugis; soris rotundatis distinctis submarginalibus, utrinque 3—5 pro pinna.

Polypodium discolor Hook. Ic. Plant. t. 4. Sp. Fil. IV. 188. Hook. et Baker, Syn. Fil. 325.

CAUDEX gracilis, brevis, erectus, **PALEIS** rigidis lineari-subulatis castaneis sursum dense vestitus. **LAMINA** supra subnuda siccitate griseo-brunnea, infra dense et persistenter albo-pruinata, 5—6 poll. longa, 8—9 lin. lata, tota ad costam anguste alatum pinnatifida, **PINNIS** confertis paululum ascendentibus 1½—2 lin. latis, mediis 3—4 lin. longis, inferioribus sensim decrescentibus. **COSTA** immersa, obscura; **VENAE** occultae. **SORI** quoad venas apicales, submarginales, semper distincti.

Habitat in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1031! — Forte in Brasilia amazonica detegitur.

20. **POLYPODIUM TRICHOMANOIDES** SWARTZ: frondibus perparvis subsessilibus erectis chartaceo-herbaceis, pilis sparsis longis castaneis vestitis, anguste ligulatis, totis pinnatis, pinnis oblongis confertis obtusis integris basi omnino adnatis, inferioribus sensim minoribus, venis pinnarum unifurcatis; soris rotundatis in medio pinnarum prope costas primarias solitariis.

Tabula nostra XXXI. Fig. 20. 21. (frondis pars et frons integra).

Polypodium trichomanoides Swartz, Syn. Fil. 184. Willd. Sp. Plant. V. 134. Schkuhr, Fil. t. 10. Metten. Polyp. 40. Hook. Sp. Fil. IV. 178. Beddome, Ferns South-Ind. t. 2. Etingsh. tab. 21. fig. 3. 9.

Polypod.

Polypodium Riedelianum Kunze Mss.

Polypodium gibbosum Fée, Mem. VI. 8. t. 2. fig. 2.

Polypodium Serricula et nanum Fée, Gen. Fil. 238.

Polypodium sertularioides J. Smith in Hook. Journ. Bot. III. 394.

Polypodium planiusculum Metten. ex Kuhn Fil. Afr. 151.

Polypodium Beyrichianum Presl, Tent. 178.

CAUDEX erectus, **PALEIS** linearibus brunneis membranaceis 1—1½ lin. longis sursum dense vestitus. **FRONDES** dense caespitosae, subsessiles vel breviter petiolatae, **STIPITIBUS** pilis gracilibus patentibus dense vestitis. **LAMINA** utrinque pallide viridis et pilis longis gracilibus castaneis sparsis vestita, 2—6 poll. longa, 2—3 lin. lata; **PINNIS** subpatentibus ½—1 lin. latis, basi omnino adnatis vel deorsum paululum decurrentibus. **COSTAE** graciles, strictae, eburnae, vestitae. **VENA** mediana pinnarum infra apicem evanescens, ramo brevi antico uno prope basin instructa. **SORI** proportionaliter magni, ad dorsum ramorum superiorum venarum impositi, solitarii, in medio pinnarum prope costas primarias obvii.

Var. β . **TRUNCICOLA** Baker.

Tabula nostra XXXI. Fig. 22. 23. (frondis partes).

Polypodium truncicola Klotzsch in Linnaea XX. 374. Hook. Spec. Fil. IV. 178.

Pinnae haud perfecte ad rachem dissectae, pilis copiosioribus.

Habitat in prov. Bahia: Luschnath, Blanchet 3944!. Praeterea in Guiana anglica (Rich. Schomburgk 1171!), in gallica (Leprieur!), in terris inde e Peruvia usque ad insulas Antillanas, itemque in Asia subtropica et insula Ascensionis. — Var. in terris Brasiliae conterminis late vagans, probabiliter in ipsa etiam Brasilia adhuc invenietur. — Dryas et Extrabrazil.

21. **POLYPODIUM MONILIFORME** LAG. frondibus distincte petiolatis erectis rigide chartaceis nudis ligulatis totis pinnatis, pinnis oblongo-deltaeideis vel ligulatis obtusis subintegerimis basi omnino adnatis, inferioribus sensim minoribus, venulis pinnarum 2—8-jugis; soris rotundatis, utrinque 2—6 pro pinna.

Polypodium moniliforme Lagasca ex Sw. Syn. Fil. 33. Willd. Sp. Plant. V. 184. Metten. Polypod. 41. Hook. Sp. Fil. IV. 182. Etingsh. tab. 21. fig. 2. 16., et Auctt.

Polypodium subrenatum Hook. Ic. Plant. t. 719.

Polypodium melanostictum Kunze, Linnaea IX. 44. Metten. Polyp. 42.

Jamesoni adnata Kunze in Schkuhr Suppl. 80. t. 133. fig. 1.

CAUDEX plus minus saepe longe repens, **PALEIS** lanceolatis acuminatis griseo-brunneis membranaceis erecto-patentibus 2—3 lin. longis dense vestitus. **STIPITES** segregati, stricti, graciles, erecti, 1—2 poll. longi, primum pilis castaneis gracilibus patentibus vestiti, demum glabri. **LAMINA** utrinque nuda, griseo-viridis, anguste ligulata, 3—9 poll. longa, 3—4 lin. lata, tota ad costam pinnata; **PINNIS** oblongo-deltaeideis, basi omnino adnatis, 1½ lin. longis et latis, siccitate revolutis. **COSTA** stricta, conspicua, castanea; **VENAE** immersae, obscurae, unifurcatae vel pinnatae, **VENULIS** erecto-patentibus 2—4-jugis, cum vena primaria paululum intra marginem evanescentibus, apice incrassatis. **SORI** quoad venas apicales, 2—4 pro pinna, in medio cito confluentes.

Var. β . **RIGESCENS** Hook.

Polypodium rigescens Bory in Willd. Sp. Plant. V. 183. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 216. Metten. Polyp. 42. Hook. et Baker, Syn. Fil. 331.

Major, praecipue latior, lamina 6—9 poll. longa, 7—9 lin. lata, pinnis oblongo-ligulatis, mediis 4 lin. longis 1½—2 lin. latis, venulis et soris 5—6 utrinque secus costam, pinnis inferioribus sensim decrescentibus.

Var. γ . FIRMUM Baker.

Polypodium firmum Klotzsch in *Linnaea* XX. 378. Metten. *Polyp.* 44. Hook. *Sp. Fil.* IV. 185. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 335.

Lamina (in specimine suppetente unico) 5—6 poll. longa, 10—12 lin. lata, pinnis basi paullulum separatis, deorsum 1 lin. latis, marginibus siccitate revolutis.

Forma typica in Serra dos Orgãos: Gardner 108!; ad Caldas prov. Minarum: Regnell III. 1462*!; in Guyana anglica (Appun 1129!) et e Peruvia ad Mexicum insulasque Antillanas. — Var. β . item in Serra dos Orgãos: Gardner 5915—6!, Glaziou 2415!, et praeterea in Africa tropica occidentali et insulis Mascarenis. — Var. γ . in Guyana anglica (Rich. Schomburgk 1170!). — *Dryad-Oreas et Extrabras.*

22. POLYPODIUM JUBAEFORME KAULF. frondibus parvis breviter petiolatis pendulis membranaceo-herbaceis nudis ligulatis totis pinnatis, pinnis contiguis ligulatis obtusis integris basi paullulum decurrentibus, inferioribus sensim minoribus, venulis simplicibus 5—6-jugis; soris rotundatis distincte immersis, utrinque 3—5 pro pinna.

Polypodium jubaeforme Kaulf. in *Regensb. Flora* 1823. p. 364. Metten. *Polyp.* 45. Hook. *Sp. Fil.* IV. 186. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 327.

Polypodium pendulum Splitg. *Enum. Fil. Sur.* 20., non Swartz.

Polypodium suspensum Sieb. *Hb. Martin.* n. 353., non Linn.

Polypodium pendulum β . jubaeforme Griseb. *Fl. Brit. W.-Ind.* 700.

Polypodium saccatum Fée, *Mem.* VI. 10. tab. 7. fig. 3.

Polypodium confusum J. Smith, *Lond. Journ. Bot.* I. 194.

CAUDEX gracilis, erectus, PALIS paucis linearibus castaneis 1 lin. longis sursum vestitus. STIPITES dense caespitosi, graciles, grisei, nudi, 3—12 lin. longi. LAMINA plus minus pendula, pallide viridis, utrinque perfecte nuda, 4—12 poll. longa, 5—6 lin. lata; PINNIS subpatentibus $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{4}$ lin. latis. COSTA primaria praegracilis, nuda, castaneo-ebenea. VENAE pinnarum pinnatae, VENULIS brevibus erecto-patentibus intra marginem evanescentibus. SORI quoad venas apicales, medii inter costam et marginem, subtus distincte immersis, in facie superiore frondis prominuli.

Habitat in Serra dos Orgãos: Gardner 109!, Glaziou 1721!; in Guiana britannica (Rich. Schomburgk 258! 1160! 1214!, Appun 1060!) et in batava (Hostmann 74!, Weigelt, Wuttschlägel). Item incolit Columbian et insulas Antillanas. — *Dryas et Extrabrasit.*

23. POLYPODIUM CULTRATUM WILLD. frondibus subfasciculatis subsessilibus vel breviter petiolatis pendulis ligulato-lanceolatis membranaceo-herbaceis, utrinque pilis longis mollibus vestitis, totis pinnatis, pinnis ligulatis vel ovato-ligulatis obtusis integris contiguis vel laxis, basi omnino adnatis vel paullulum emarginatis, infimis reductis, venulis pinnarum simplicibus 4—10-jugis; soris rotundatis medialibus, utrinque 3—8 pro pinna.

Tabula nostra XXXI. Fig. 15—17. (Capices et medium frondis).

Polypodium cultratum Willd. *Sp. Plant.* V. 187. Mett. *Polyp.* 47. Hook. *Sp. Fil.* IV. 190.

Polypodium suspensum Mett. *Fil. Lechl.* 7., non Linn.

Polypodium asplenifolium var. β . Linn. *Sp. Plant.* 1544.

Polypodium asplenifolium Kuhn, *Fil. Afr.* 146., nec tamen Linn. quoad plantam typicam (Petiver, *Fil.* tab. 7. fig. 16.).

Polypodium mollissimum Fée, *Fil. Ant.* t. 12. fig. 2.

Cyrtopteris cultrata J. Smith Mss.

CAUDEX erectus vel suberectus, PALIS parvis inconspicuis vestitus. FRONDES laxae caespitosae, flaccide pendulae, subsessiles vel breviter petiolatae, STIPITIBUS gracilibus pilis patentibus dense vestitis. LAMINA utrinque pilis longis mollibus flavo-ferrugineis vestita, 9—24 poll. longa, 9—16 lin. lata; PINNIS contiguis integris obtusis ligulatis 5—8 lin. longis, 1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ lin. latis, patentibus vel inferioribus paullulum deflexis, basi omnino adnatis vel antice emarginatis, infimis sensim minoribus. COSTA primaria praegracilis, flaccida, castaneo-ebenea, vestita. VENULAE pinnarum erecto-patentes, 8—10-jugae, simplices, longe intra marginem evanescentes. SORI magni, rotundati, quoad venas apicales, haud immersis, medii inter costam et marginem, pilis intermixti.

Var. β . RECLINATUM Baker.

Tabula nostra XXXI. Fig. 18—19. (Apex et pars media frondis).

Polypodium reclinatum Brack. *Fil. Un. St. Am. Expl. Exped.* 46. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 335.

Polypodium semiadnatum Hook. *Sp. Fil.* IV. 222. ex parte (non II. Cent. Ferns t. 48.).

Cyrtopteris semiadnata J. Smith Mss.

Polypodium asplenifolium Ettingsh. tab. 21. fig. 10. 12—14. 22.

Lamina valde flaccida, 12—24 poll. longa, 8—18 lin. lata; pinnae latiores, latiores, ovato-lanceolatae, 4—9 lin. longae, deorsum 3—3 $\frac{1}{2}$ lin. latae, basi distincte separatae, antice et interdum etiam postice emarginatae, venulis et soris 5—9-jugis.

Var. γ . ELASTICUM Baker.

Polypodium elasticum Bory in Willd. *Sp. Plant.* V. 183. Metten. *Polypod.* 47., non Richard.

Polypodium Leveillanum Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris.* VI. 232.

Polypodium flexile Fée, *Mem.* VI. 9. tab. 2. fig. 3.

Polypodium flexile Fée, *Mem.* VII. t. 29. fig. 1. Eaton, *Fil. Fendl.* 198.

Multo minor, subsessilis, 4—8 poll. longa, 6—8 lin. lata, pinnis contiguis 3—4 lin. longis, deorsum 1 lin. latis, venulis 5—6-jugis, soris utrinque secus costam 3—4, demum saepe totam faciem inferiorem pinnarum occupantibus.

Var. δ . XANTHOTRICHUM Baker.

Polypodium xanthotrichum Klotzsch, *Linnaea* XX. 376. Metten. *Polypod.* 48.

Polypodium ellipticosorum Fée, *Gen. Fil.* 239.

Lamina crassior, brevius pilosa, 2 poll. lata (in specimine suppetente unico), pinnis contiguis ligulatis, deorsum 2 lin. latis, basi omnino adnatis, soris utrinque secus costam 12—15 conferis oblongis obliquis.

An species distincta?; specimen unicum incompletum tantum vidi.

Filix ex insulis Antillanis in Peruviam et Brasiliam australem dispersa, incolit quoque Africam tropicam occidentalem et (var. elasticum) insulas Mascarenas. Typus in Brasilia nondum observatus occurrit in vicina Guyana anglica (Appun 1105!, Rob. Schomburgk!), forte in Brasilia amazonica adhuc detegendus. — Var. β . in Serra dos Orgãos aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Gardner 112!, Brackenridge!, Burchett 2507!, Glaziou 410! 961! 1722! 2417!, Bowie et Cunningham!, Miers! etc. — Var. γ . ad Manãos prov. do Alto Amazonas: Spruce 1720!; in Guyana britannica (Appun 1000) et teste Mettenio etiam in Guyana gallica. — Var. δ . in Guyana britannica (Rich. Schomburgk 1172!). — *Dryas, Najas et Extrabrasit.*

24. POLYPODIUM PENDULUM SWARTZ: frondibus fasciculatis subsessilibus vel breviter petiolatis pendulis ligulato-lanceolatis membranaceo-herbaceis utrinque nudis totis pinnatis, pinnis contiguis vel laxis ligulatis obtusis integris basi utrinque dilatatis, infimis valde saepe ad alam costularem reductis, venulis pinnarum 6—15-jugis, sterilibus simplicibus, fertilibus furcatis; soris rotundatis indistincte immersis, utrinque 6—15 pro pinna.

Polypodium pendulum Swartz, *Syn. Fil.* 33 et 131. *Schkuhr, Fil.* 12. tab. 10. fig. dextera. Willd. *Sp. Plant.* V. 182. *Mett. Polypod.* 55. *Hook. Sp. Fil.* IV. 194.

Polypodium suspensum Ettingsh. tab. 13. fig. 3., non Linn.

CAUDEX erectus, brevis, PALEIS membranaceis lineari-subulatis ferrugineis 1 lin. longis sursum vestitus. FRONDES dense caespitosae, subsessiles, flaccide pendulae. LAMINA pallide viridis, membranaceo-herbacea, 4—9 poll. longa, 9—15 lin. lata, PINNIS subcontiguas paullulum adscendentibus 5—8 lin. longis 1—1½ lin. latis, basi utrinque paullulum dilatatis, infimis valde reductis. COSTA praegracilis, nuda, ebenea. VENULAE distinctae, erecto-patentes, 6—9-jugae, steriles simplices longe intra marginem evanescentes, fertiles in ramo perbrevi sorum gerentes. SORI utrinque 6—9 pro pinna, costae magis quam margini approximati.

Var. β. SUBSESSILE Baker.

Polypodium subsessile Baker in *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 329.

Polypodium pteropus Hook. *Sp. Fil.* IV. 192. t. 275 B., non Blume.

Major, breviter petiolata, lamina 9—18 poll. longa, 1½—2½ poll. lata, pinnis distantibus basi utrinque valde dilatato-decurrentibus, saepe 12—15 lin. longis, infimis ad alam angustam reductis, venulis et soris utrinque 9—15-jugis.

Var. γ. GARDNERIANUM Baker.

Lamina crassior, 4—12 poll. longa, 8—15 lin. lata, aegre ad costam pinnata, siccitate grisea, infra paullulum pruinato-furfuracea, pinnis contiguas erecto-patentibus, costis immersis, venulis immersis obscuris 8—9-jugis, soris utrinque secus costam 8—9 magis marginalibus.

An species distincta? Ad *P. inaequale* Fée accedens.

Ex insulis Antillanis in Peruviam et Brasiliam australem. Typus prope Rio de Janeiro: Burchell 2509!; in Guyana batava (Splitgerber) et in britannica (Rich. Schomburgk 1146!). Var. β. in Guyana britannica (Appun 1039!, Rich. Schomburgk!). Var. γ. in vicinia Rio de Janeiro: Gardner 5914!, Glaziou 2412!; ad Caldas et Lagoa Santa prov. Minas: Regnell III. 1442!, Warming!. — *Dryas, Oreas et Extrabras.*

25. POLYPODIUM GRADATUM BAKER: frondibus fasciculatis breviter petiolatis pendulis ligulato-lanceolatis totis pinnatis subcoriaceis utrinque pilis brunneis sparse vestitis, pinnis contiguas lanceolato-ligulatis obtusis integerrimis, inferioribus sensim ad aurículas rotundatas reductis, venulis simplicibus 5—6-jugis; soris rotundatis costalibus, utrinque 4—6 pro pinna.

CAUDEX erectus, brevis, PALEIS linearibus brunneis 1 lin. longis membranaceis sparse vestitis. STIPITES 6—18 lin. longi, erecti, obscure brunnei, substricti, graciles, dense breviter brunneo-pubescentes. LAMINA utrinque primum laete demum obscure viridis, pilis mollibus brevibus brunneis sparse vestita, ligulato-vel spathulato-lanceolata, 4—6 poll. longa, 8—12 lin. lata, tota paene vel perfecte ad costam pinnata; PINNIS 15—20-jugis, subpatentibus, basi contiguas aegre dilatatis, mediis 4—6 lin. longis, deorsum 2—3 lin. latis, inferioribus fere inde e medio frondis decrescentibus, infimis ad aurículas rotundatas reductis. COSTA primaria immersa, paullulum brunneo-pubescentis. VENAE immersae sed conspicuae, erecto-patentes, simplices, pinnarum maximarum 5—6-jugae, distincte intra marginem evanescentes. SORI ½ lin. lati, superficiales, paraphysisibus copiosis intermixti.

Ad var. γ. praecedentis habitu et textura accedens; differt tamen lamina utrinque pilis mollibus brunneis sparse vestita, pinnis latioribus, venis paucioribus, soris majoribus paucioribus costalibus.

Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou 2460!. — *Dryas.*

26. POLYPODIUM SUSPENSUM LINN. stipitibus segregatis mediocribus gracilibus vestitis, saepe apice arcuatis, frondibus pendulis membranaceo-herbaceis lanceolato-ligulatis, primum pilis longis mollibus patentibus vestitis, demum subnudis, totis pinnatis, pinnis contiguas lineari-lanceolatis integris subacutis basi utrinque paullulum dilatatis, infimis aegre reductis, venulis pinnarum 8—12-jugis, ramis brevibus fertilibus instructis; soris rotundatis costalibus non immersis, utrinque 8—12 pro pinna.

Polypodium suspensum Linn. *Sp. Plant.* 1544. Swartz, *Syn. Fil.* 32. Willd. *Sp. Plant.* V. 181. Metten. *Polyp.* 56. *Hook. Sp. Fil.* IV. 56.

Polypodium asplenifolium α. Linn. *Sp. loc. cit.* Swartz, Willd. et Metten. *loc. cit.* (forma villosior, pinnis latioribus obtusioribus).

Polypodium laxifrons Liebm. *Mex. Breg.* 52.

Polypodium arcuatum Moritz Mss.

Cyrtopteris suspensa J. Smith Mss.

CAUDEX lignosus, plus minus repens, PALEIS linearibus membranaceis castaneis 1—1½ lin. longis dense vestitis. STIPITES 4—8 poll. longi, stricti, castanei, pilis mollibus patentibus vestiti. LAMINA pallide viridis, 9—18 poll. longa, 1½—2½ poll. lata, tota usque ad costam pinnata, PINNIS e basi utrinque paullulum dilatata in apicem subacutum sensim attenuatis, mediis 9—15 lin. longis, deorsum 2—3 lin. latis. COSTA gracilis, stricta, ebenea, plus minus vestita. VENULAE pinnarum erecto-patentes, intra marginem evanescentes, ramis medialibus anticis perbrevibus soros gerentibus. SORI ad costam approximati, pilis paucis intermixti.

Habitat in Serra dos Orgãos: Gardner 129!, Glaziou 2409!, Miers!, et praeterea inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — *Dryas et Extrabras.*

27. POLYPODIUM MERIDENSE KLOTZSCH: stipitibus segregatis mediocribus gracilibus arcuatis castaneis nudis vel paullulum vestitis, frondibus subpendulis rigide chartaceis infra pilis paucis longis vestitis oblongo-lanceolatis totis pinnatis, pinnis contiguas linearibus integris, infimis aegre reductis, basi omnino adnatis, venulis pinnarum 10—15-jugis immersis unifurcatis; soris marginalibus utrinque 10—15 pro pinna.

Polypodium meridense Klotzsch in *Linnaea* XX. 380. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 332.

Polypodium Spixianum Mart. ex *Mett. Polyp.* 57.

Polypodium radicale Moritz Mss. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 332.

Polypodium nidulans Beyrich Mss.

CAUDEX lignosus, plus minus repens, PALEIS lineari-subulatis membranaceis castaneis 3—4 lin. longis dense vestitis. STIPITES 4—8 poll. longi, plus minus distincte arcuati, nudi vel pilis patentibus castaneis brevibus sparse vestiti. LAMINA utrinque griseo-viridis nuda vel subtus praecipue ad costam pilis iis stipitis consimilibus vestita; PINNIS patentibus obtusiusculis vel subacutis, majoribus 12—15 lin. longis deorsum 2 lin. latis. COSTA immersa. VENULAE immersae, occultae. SORI rotundati, haud immersi, ad marginem approximati.

Habitat omnino praecedentis; praecipue differt texturam et sororum positionem.

Habitat in Serra dos Orgãos etc. rupibus sylvarum: Martius, Gardner 128!, Burchell 2268!, itemque in Columbia. — *Dryas et Extrabras.*

28. POLYPODIUM PILOSISSIMUM MART. et GAL. frondibus parvis breviter petiolatis erectis rigide chartaceo-coriaceis utrinque nudis vel subtus pilis longis sparsis nigricantibus vestitis ligulatis simpliciter pinnatis, pinnis contiguas ligulatis ob-

tusis integris basi omnino adnatis, infimis sensim minoribus, venulis immersis obscuris brevibus simplicibus 4—6-jugis; soris rotundatis indistincte immersis, utrinque 3—5 pro pinna.

Polypodium pilosissimum Mart. et Gal. Foug. Mex. 39. t. 9. fig. 2. Metten. Polyp. 42. Hook. Sp. Fil. IV. 181. Hook. et Baker, Syn. Fil. 327.

Polypodium xiphopteroides Liebm. Mex. Bregm. 44.
Otenopteris nemoralis J. Smith Mss.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, PALEIS lineari-subulatis membranaceis erecto-patentibus griseo-brunneis 2—3 lin. longis dense vestitus. STIPITES subfasciculati, stricti, griseo-castanei, 6—24 lin. longi, pilis brunneis gracilibus patentibus deciduis plus minus vestiti. LAMINA 3—9 poll. longa, 6—8 lin. lata, siccitate griseo-brunnea; PINNIS subpatentibus $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. latis. COSTA rigida, castanea, plus minus vestita. SORI medii inter costam et marginem, pilis intermixtis.

Ad *P. moniliforme* var. *rigescens* prope accedens.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas: Lindberg 560!, Regnell II. 319 $\frac{1}{2}$!; in Serra dos Orgãos: Gardner 111!, Miers!, et in prov. S. Paulo: Burchell!. Praeterea in Guyana britannica (Appun!), in Columbia et Mexico. — Dryadi-Oreas et Extrabras.

29. POLYPODIUM APICULATUM KUNZE: stipitibus brevibus subsegregatis strictis griseis breviter griseo-pubescentibus, frondibus oblongo-lanceolatis utrinque angustatis erectis chartaceis subnudis opaco-viridibus totis ad costam pinnatis, pinnis anguste ligulatis integris basi paullulum dilatatis, inferioribus laxioribus sensim decreescentibus, venulis pinnarum 8—12-jugis immersis obscuris unifurcatis; soris mediocribus utrinque 8—10 pro pinna, totam latitudinem inter costam et marginem occupantibus.

Polypodium apiculatum Kunze Mss. Klotzsch, Linnaea XX. 378. Metten. Polyp. 44. Ettingsh. Farnkr. tab. 11. fig. 2.

Polypodium Pecten Fée, Gen. Fil. 240.

Polypodium hastigerum Kunze Mss.

Polypodium leptophyllum Moritz Mss. Meib. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 250.

Polypodium ferrugineum Mart. et Gal. Fil. Mex. 36. t. 7. fig. 2. Metten. Polyp. 43.

CAUDEX lignosus, suberectus vel breviter repens, PALEIS lineari-subulatis griseis membranaceis 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES 1—2 poll. longi. LAMINA nullo modo elastica, utrinque pallide opaco-viridis, subnuda vel ad costam breviter griseo-pubescentis, 4—8 poll. longa, $1-1\frac{1}{2}$ poll. lata, PINNIS contiguas patentibus vel paullulum adscendentibus, subobtusis nunc subacutis, 1 lin. latis, mediis 7—9 lin. longis, basi utrinque paullulum dilatatis omnino adnatis, inferioribus laxioribus multisque sensim decreescentibus. COSTA primaria stricta, grisea, breviter griseo-pubescentis; VENA pinnarum mediana immersa, inconspicua. SORI superficiales.

Habitat in prov. Minas Geraës: Lindberg!, Regnell II. 319**!, in Serra dos Orgãos: Gardner 110!, Glaziou 2413!, itemque in Columbia et Mexico. — Dryadi-Oreas et Extrabras.

30. POLYPODIUM CHNOOPHORUM KUNZE: stipitibus segregatis brevibus erectis, pilis griseis teneribus dense vestitis, frondibus membranaceo-herbaceis utrinque breviter griseo-villosis oblongo-lanceolatis totis pinnatis, pinnis contiguas ligulatis subintegris basi utrinque paullulum dilatatis, infimis subreductis, venulis furcatis indistinctis 10—15-jugis; soris rotundatis medialis.

Polypodium chnoophorum Kunze ex Mart. Hb. Fl. Bras. n. 323. (Flora Ratisb. 1839. Beibl. I. 34.) Metten. Polyp. 60. Hook. Sp. Fil. IV. 208.

Polypodium sublanosum Hook. Sp. Fil. IV. 221. Hook. et Baker, Syn. Fil. 330.

CAUDEX lignosus, plus minus repens, PALEIS paucis parvis linearibus membranaceis ferrugineis vestitus. STIPITES stricti, grisei, pilis subtilibus patentibus griseis $\frac{1}{2}$ lin. longis dense vestiti. LAMINA tenera, flaccida, moderate obscuro-viridis, utrinque pilis griseis mollibus brevibus tenuiter vestita, 9—12 poll. longa, in medio 3—4 poll. lata, tota ad costam pinnata; PINNIS patentibus subrectis vel leviter falcatis, basi utrinque paullulum dilatata omnino adnatis, subacutis, mediis $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longis deorsum 3—4 lin. latis, inferioribus paullulum reductis. COSTA gracilis, stricta, griseo-straminea, vestita; VENULAE pinnarum immersae, praegraciles, indistinctae, prope basin unifurcatae, ramis anticis soros ad apicem gerentibus, posticis longioribus paullulum intra marginem evanescentibus. SORI haud immersi, pinnarum mediarum 10—15-jugi, pilis brevibus intermixti.

Ad *P. vulgare* habitu accedens, sed multo tenerius. A *P. Martensii* Mett. differt stipitibus brevioribus griseis dense pubescentibus, frondibus latioribus tenerioribus, et venulis inconspicuis unifurcatis. *P. hygrometricum* Splitg. (Enum. Fil. Surin. 21.), quod nondum vidi, a *P. chnoophoro* differre dicitur statura minore, fronde atrovirescente, „laciniarum basibus non sursum adscendentibus, nec stipite flavescenti brevi pilosissimo.“

Habitat in rupibus mucosis, locis udis umbris, prov. Piauhy ad Oeiras etc.: Martius; in prov. Bahia: Blanchet!, Mart. Hb. Fl. Bras. 323!; in Serra dos Orgãos, atisque locis prov. Rio de Janeiro: Gardner 122!, Glaziou 975!; in prov. S. Catharina: Fritz Müller!. — Vaga.

31. POLYPODIUM ELASTICUM RICH. stipitibus subsegregatis brevibus strictis griseo-nigris subnudis, frondibus lanceolato-ligulatis utrinque angustatis subpendulis chartaceo-herbaceis valde elasticis, siccitate convolutis nigrescentibus, infra subnudis vel breviter griseo-glanduloso-pubescentibus, totis ad costam pinnatis, pinnis contiguas anguste lineari-ligulatis integris obtusis basi utrinque dilatatis, multis inferioribus reductis; venulis pinnarum 10—20-jugis immersis obscuris unifurcatis; soris parvis medialibus, utrinque 6—20 pro pinna.

Tabula nostra XLVII. Fig. VIa. (analysis).

Polypodium elasticum Rich. Ann. Soc. Nat. Hist. Paris. 114. Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 233., non Bory.

Polypodium elegans Poir. Encycl. V. 519. Swartz, Syn. Fil. 62., non Cav.

Polypodium inversum Vell. Fl. Flum. XI. t. 72.

Polypodium Plumula H.B.K. Nov. Gen. et Sp. I. 8. Willd. Sp. Plant. V. 178. Raddi, Fil. Bras. 18. t. 27. fig. 1. Meien. Polyp. 58. Hook. Sp. Fil. IV. 200. ex parte.

Polypodium pulchrum Mart. et Gal. Fil. Mex. 41. t. 8. fig. 2. Hook. Sp. Fil. IV. 199.

Polypodium taxifolium Hook. et Baker, Syn. Fil. 332. ex parte.

Polypodium Schkuhrii Raddi, Fil. Bras. t. 27. fig. 2. (forma pinnis imis non reductis).

CAUDEX lignosus, breviter repens vel suberectus, PALEIS lineari-subulatis castaneis 2 lin. longis vestitus. STIPITES 1—3 poll. longi, erecti. LAMINA chartaceo-herbacea, valde elastica, siccitate convoluta et nigrescens, plus minus distincte pendula, ligulato-lanceolata, superne subnuda, infra praecipue ad costam breviter griseo-glanduloso-pubescentis et interdum paleis paucis minimis instructa, utrinque sensim angustata, 9—18 poll. longa, medio $1\frac{1}{2}$ —3 poll. lata, tota usque ad costam pinnata, PINNIS patentibus $\frac{1}{2}$ —1 lin. latis. COSTA stricta, nigra, praecipue infra pilis brevibus griseis vestita. VENAe medianae pinnarum distinctae, eburnae; VENULAE immersae, omnino obscurae, unifurcatae, pinnarum mediarum 15—20-jugae, intra marginem evanescentes, ramulis anticis fertilibus. SORI parvi, superficiales, medii inter costam et marginem.

Var. β . *FILICULA* Baker.

Polypodium Filicula Kaulf. Enum. 275. Metten. Polyp. 58. Hook. Sp. Fil. IV. 199.

Multo minor, lamina subsessili vel breviter petiolata, 2—4 poll. longa, medio 9—12 lin. lata, utrinque cito angustata, pinnis patentibus $\frac{1}{2}$ lin. vel minus latis, soris saepe totam latitudinem pinnarum inter costam et marginem occupantibus.

Var. γ . *GLAZIOVII* Baker.

Tabula nostra LXIV. Fig. 11. (habitus et analysis).

Tenerior, magis pellucida; lamina membranacea, siccitate vix nigrescens, infra praecipue ad rachem pilis paucis sparsis griseis patentibus vestita; costa pinnarum gracilis flexuosa, venis plus minus distinctis perspicuis, omnibus simplicibus vel imis interdum unifurcatis.

Per totam Brasiliam terrasque adjacentes inde e Peruvia usque in Mexicum et Guatemalam sparsum (ex Antillis tamen, ubi aequae crescere dicitur, mihi nondum visum). Typus intra Brasiliae limites lectus est in prov. S. Catharinae: Fritz Müller!; in prov. Rio de Janeiro: Raddi, Pohl, Gardner 19!, Burchell 1353! 1873!, Glaziou 2410! 2070! etc.; in prov. Bahia: Princ. Neuwied; Minas Geraës: Lindberg 561!; prov. Para: Spruce 1! 400!, et prov. do Alto Amazonas: Martius. — Var. β . in prov. S. Paulo: Burchell 4961!; Rio de Janeiro: Burchell 2524!, Glaziou 972!; Minas Geraës ad Caldas et Lagoa Santa: Lindberg 562!, Regnell III. 1441!, Warming!, et in prov. Bahia: Princ. Neuwied!. — Var. γ . prov. S. Catharina: Fritz Müller!; Rio de Janeiro: Glaziou 1723! 2461!; Caldas prov. Minarum: Regnell II. 319*. — Vaga et Extrabrazil.

Obs. *P. taxifolium* Linnæi verum verisimiliter est *P. L'Hermieri* Fée (Fil. Ant. tab. 12. fig. 1.), ab *elastico* venulis ebeis distinctis semper simplicibus distinguenda. Specimina cum tabula Raddiana *P. Schkuhrii* omnino congruentia in horto Kewensi vidi ex rhizomate eodem provenientia, ac alia quae tabulae *P. Plumulae* ejusdem auctoris perfecte respondebant.

32. POLYPODIUM PECTINATUM LINN. stipitibus segregatis strictis brevibus atrocastaneis subnudis vel breviter griseo-hispidis, frondibus lanceolato-ligulatis utrinque angustatis membranaceo-herbaceis obscure viridibus saepe subelastis, utrinque praecipue infra ad costam breviter griseo-pubescentibus, totis ad costam pinnatis, pinnis contiguis patentibus anguste ligulatis obtusis plerisque integris basi utrinque paullulum dilatatis, multis inferioribus reductis, venulis distinctis uni- vel saepe bifurcatis 15—40-jugis; soris parvis medialibus, utrinque 12—30 pro pinna.

Polypodium pectinatum Linn. Sp. Plant. 1545. Swartz, Syn. Fil. 32. Willd. Sp. Plant. V. 180. Vell. Fl. Flum. XI. t. 64. Hook. Gard. Ferns t. 10. Sp. Fil. IV. 204. etc.

Polypodium Otites Willd. Sp. Plant. V. 177. Metten. Polyp. 59. Etingsh. tab. 21. fig. 19—20., non Linn.

Polypodium molle H.B.K. Nov. Gen. I. 8.

CAUDEX lignosus, plus minus repens, PALEIS subulatis ferrugineis 1 lin. longis patentibus vestitus. STIPITES erecti, 1—4 poll. longi. LAMINA 1—2 pedes longa, 2—4 poll. lata, PINNIS $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis, basi omnino adnatis. COSTA primaria ferrugineo-ebenea, plus minus griseo-pubescentibus; VENULAE distinctae, unifurcatae, pinnarum maximarum mediarum 12—20-jugae, ramis anticis sterilibus multo brevioribus, fertilibus apice soriferis. Sori superficiales, medii inter costam et marginem, utrinque 12—18 pro pinna.

Var. β . *PARADISEAE* Baker.

Tabula nostra XXXV. Fig. 13. (medium frondis).

Polypodium Paradiseae Langsd. et Fisch. Ic. Fil. 11. t. 11. Willd. Sp. Plant. V. 179. Metten. Polypod. 60. Etingsh. tab. 22. fig. 13.

Polypodium philodon Kunze, Linnæa IX. 42.

Polypod.

Major, minus elastica, ad 3—6 pedes longitudine, 6—8 poll. latitudine attingens, pinnis 2—4 lin. latis, interdum denticulatis, inferioribus multis omnino separatis ad aurículas sensim decrescentibus, venulis aequae ac soris pinnarum mediarum 20—40-jugis, saepe ramulis binis instructis.

Typus speciei cum varietate frequens per totam Brasiliam, e. gr. in prov. Rio de Janeiro: Glaziou 396! 1725! 2407! 3170!; Minas Geraës ad Caldas: Lindberg!, Regnell I. 474!, II. 319!; Goyaz: Burchell 9457!; Alto Amazonas: Spruce 2220!, et praeterea e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas vagans. — Vaga et Extrabrazil.

33. POLYPODIUM RECURVATUM KAULF. stipitibus segregatis strictis subnudis brevibus vel elongatis, frondibus chartaceo-herbaceis utrinque praeter costas subnudis siccitate nigrescentibus elongato-lanceolatis totis usque ad costam pinnatis, pinnis anguste linearibus integris subacutis siccitate revolutis, inferioribus aegre reductis basi separatis omnino adnatis, venulis immersis obscuris unifurcatis 20—30-jugis; soris mediocribus medialibus, utrinque 15—30 pro pinna.

Polypodium recurvatum Kaulf. Enum. Fil. 106. Metten. Polyp. 60. Hook. et Baker, Syn. Fil. 332.

Polypodium maenurum Link, Sp. Fil. 126.

CAUDEX lignosus, repens, PALEIS linearibus ferrugineis membranaceis parvis vestitus. STIPITES erecti, 3—12 poll. longi. LAMINA elastica, siccitate revoluta, utrinque subnuda vel ad costam breviter griseo-pubescentibus, 1—3 pedes longa, 6—8 poll. lata; PINNIS superioribus contiguis basi utrinque dilatatis, inferioribus basi separatis omnino adnatis 3—4 poll. longis 2—3 lin. latis, infimis aegre reductis. COSTA primaria griseo-ebenea, breviter griseo-pubescentibus. SORI superficiales, rotundati vel paullulum oblongi.

Ad *P. pectinatum* arcte accedens. An ejus varietas?

Habitat in sylvis umbrosis provinciarum Brasiliae orientalem, Para, Bahia, Minas Geraës, Rio de Janeiro et S. Catharina: Mart. Hb. Fl. Bras. 310!, Gardner 124! 125!, Burchell 1977! 2020!, Sello!, Glaziou 974! 1682! 1724! 2408! etc. — Vaga.

34. POLYPODIUM OTITES LINN. stipitibus segregatis strictis erectis griseis nudis, frondibus elongato-lanceolatis herbaceis, utrinque nudis vel infra ad costas aegre pubescentibus, totis ad costam pinnatis, pinnis anguste linearibus crenulatis obtusis vel subacutis, basi distincte separatis utrinque paullulum dilatatis, infimis subreductis, venulis 6—12-jugis laxis plerisque simplicibus; soris medialibus parvis obscure immersis.

Polypodium Otites Linn. Sp. Plant. 1544. (Petiver, Fil. t. 1. fig. 16.). Swartz, Syn. Fil. 34. Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 699., non Willd. nec Metten.

Polypodium tenuifolium H.B.K. Nov. Gen. I. 9. Willd. Sp. Plant. V. 185. Metten. Polyp. 51. Hook. Sp. Fil. IV. 192. Hook. et Baker, Syn. Fil. 334.

Polypodium camptoneuron Fée, Gen. Fil. 237. Mem. VII. t. 23. Plumier Fil. t. 85.

CAUDEX gracilis, lignosus, repens, PALEIS lanceolatis ferrugineis membranaceis crispis 1 lin. longis vestitus. STIPITES 2—4 poll. longi. LAMINA utrinque opaco-viridis, 4—10 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. lata; PINNIS adscendentibus, mediis 9—12 lin. longis, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. latis, infimis subreductis. RACHIS primaria stricta, grisea, nuda vel subnuda; VENA mediana pinnarum distincta, grisea, undulata; VENULAE erecto-patentes, longe intra marginem evanescentes. Sori utrinque 6—10 pro pinna, medii inter costam et marginem.

Habitat ad Novo Friburgo, in Serra dos Orgãos, aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Beyrich, Miers!, et praeterea Columbiam et insulas Antillanas incolit. — Dryas et Extrabrazil.

35. *POLYPODIUM PLEBEIUM* SCHLECHT. stipitibus segregatis strictis erectis nudis, frondibus lanceolatis coriaceis, supra nudis, infra paleis minimis peltatis ferrugineis sparsis furfuraceis, totis ad costam pinnatis, pinnis lineari-ligulatis integris vel repandulis obtusis vel subacutis basi utrinque dilatatis, inferioribus majoribus distincte separatis, venulis occultis 8—15-jugis unifurcatis; soris medialibus obscure immersis.

Polypodium plebeium Schlecht. *Linnaea* V. 607. Kunze, *ibid.* XVIII. 319. Liebm. Mex. Bregn. 46. Hook. Gard. Ferns t. 48. Syn. Fil. IV. 213.

Marginaria Karwinskiana Presl, Tent. 188.

Polypodium Karwinskiannum A. Braun ex Metten. Polyp. 66.

Polypodium leucosticton Kunze Mss. Klotzsch in *Linnaea* XX. 380., non Fée.

CAUDEX firmus, flexuosus, crassitie pennae anserinae, teres, longe vel breviter repens, PALEIS linearibus membranaceis crispis ferrugineis 1—1½ lin. longis dense imbricatis juventute vestitus. STIPITES graciles, griseo-brunnei, 4—8 poll. longi. LAMINA supra primum pallide opacoviridis, 4—12 poll. longa, deorsum 3—6 poll. lata. PINNAE 10—30-jugae, inferiores majores, 2—3 poll. longae, 2—3 lin. latae, imae iis aequales vel paulo longiores. VENULAE immersae, erecto-patentes, graciles. SORI ad apicem ramulorum anticorum venarum positi, rotundati, 8—15 pro pinna, medii inter costam et marginem, primum leviter immersi, mediocres, paraphysibus intermixti.

Habitat in vicinia Rio de Janeiro: Gardner 5920!, Glaziou 2459! 2817!; in prov. Minas Gerais ad Caldas: Regnell II. 317*!, et in terris inde e Peruvia ad Mexicum. — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

36. *POLYPODIUM ACHILLEAEFOLIUM* KAULF. stipitibus subfasciculatis perbrevis hispidis, frondibus coriaceis opacoviridibus plus minus hispidis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis erecto-patentibus anguste ligulatis profunde pectinato-pinnatifidis, pinnulis parvis lineari-decurrentibus, venulis obscuris solitariis; soris rotundatis ad costas pinnarum approximatis.

Polypodium achilleaeifolium Kaulf. Enum. Fil. 116. Kunze in Schkuhr Suppl. 91. t. 43. fig. 2. Metten. Polyp. 53. Hook. Sp. Fil. IV. 226. Wawra, Maximil. Reise 204. Ettingsh. tab. 21. fig. 4.

Polypodium piligerum Hook. Ic. Plant. t. 321.

Grammitis tenuifolia Beyrich Mss.

CAUDEX breviter repens, PALEIS ferrugineis linearibus membranaceis crispis 1½—2 lin. longis vestitus. STIPITES graciles, erecti, grisei, griseo-hispidi, 3—9 lin. longi. LAMINA coriacea, pilis firmis griseis patentibus plus minus vestita, 4—6 poll. longa, 12—15 lin. lata. PINNAE 15—25-jugae, subcontiguae, 6—9 lin. longae, 1—1½ lin. latae, profunde pectinato-pinnatifidae, basi distincte separatae, inferiores reductae; PINNULIS acutis erecto-patentibus ½ lin. longis, utrinque 6—9 pro pinna. RACHIS primaria flaccida, vestita; VENULAE immersae, in pinnulis medianae solum obviae. SORI singuli ad basin pinnularum, mediocres, rotundati, utrinque 4—6 pro pinna.

Habitat ad truncos arborum in sylvis Serra d'Estrella, Serra dos Orgãos, ad Petropolis, aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Karwinski, Riedel, Gardner 107!, Miers!, Cunningham!, Glaziou 2416!, Setto!, Wawra et Maty 406. — Dryas.

§ 4. GONIOPHLEBIUM.

37. *POLYPODIUM VACCINIIFOLIUM* LANGSD. et FISCH. caudicibus epigaeis longe vagantibus, crassitie pennae corvinae, frondibus subsessilibus subcoriaceis difformibus parvis obtusis in-

tegerimis mox utrinque nudis, sterilibus rotundato-oblongis, fertilibus ligulatis, maculis venularum 2—3-seriatis, soris utrinque secus costam uniseriatis.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 11—12. (frondes) et XLVII. Fig. Va. (analysis).

Polypodium vacciniifolium Langsd. et Fisch. Ic. Fil. 8. t. 7. Willd. Sp. Plant. V. 145. Metten. Fil. Hort. Lips. 31. Polyp. 94. Hook. Sp. Fil. IV. 35. Ettingsh. tab. 22. fig. 5. 6. tab. 23. fig. 8. 18—22., non Raddi (t. 23. fig. 2.).

Marginaria vacciniifolia Presl, Tent. 188.

Goniophlebium vacciniifolium J. Smith, Bot. Mag. LXXII. Suppl. p. 11.

Craspedaria vacciniifolia Link, Sp. Fil. 117.

Polypodium cardiophyllum Ettingsh. tab. 23. fig. 23. 24.

Polypodium Haenkeanum Presl ex Ettingsh. t. 24. fig. 1. 2.

Polypodium Cacti R.Br. Mss. in herb. Mus. Brit.

CAUDEX longe vagans, flexuosus, PALEIS lineari-subulatis 1 lin. longis primum ferrugineis squarrosos, demum albescentibus adpressis dense vestitus. FRONDES sessiles vel perbrevis petiolatae, segregatae, primum praecipue subtus inconspicue furfuraceae, mox glabrae. LAMINA sterillis oblonga vel rotundata, 1½—2 poll. longa, 6—8 lin. lata, apice obtusa, basi rotundata vel cuneata, maculis venularum inter costam et marginem 2—4-seriatis, costalibus perparvis saepe obsoletis, secundariis duplo longioribus quam latis, venula unica inclusâ simplici vel furcata e margine postico exoriente instructis, exterioribus parvis venulas liberas non includentibus; fertilibus ligulata, 2—3 poll. longa, 2—3 lin. lata, basi cuneata, maculis 2—3-seriatis, secundariis vel costalibus parvis obsoletis, primariis fertilibus latitudinis frondis majorem partem occupantibus. SORI inter costam et marginem semper uniseriati, ad apices venularum liberarum in maculis inclusarum impositi, utrinque secus costam 20—40, mediocres, submediales inter costam et marginem, paraphysibus paucis intermixti.

Habitat per provincias Brasiliae orientales ad truncos arborum frequens. In prov. Bahia: Blanchet 2504!; Princ. Max. Neovidensis, Wawra et Maty 185; Rio de Janeiro: Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 308), Pohl, Gardner 5666!, Burchell 964! 1040!, Glaziou 68! 1005!, Bowie et Cunningham!, et reliqui fere omnes collectores; prov. S. Paulo: Burchell 3118!, Lindberg!; S. Catharina: Langsdorff!, Fritz Müller!; Rio Grande do Sul ad Porto Alegre: Fox!. Etiam in Paraguay ad Assumpcion: Gibert!, ad ripas fluv. Uruguay et Parana: Tweedie!, in Columbia et insulis Antillanis. — Vaga et Extrabrazil.

38. *POLYPODIUM PILOSELLOIDES* LINN. caudicibus epigaeis longe vagantibus filiformibus, frondibus breviter petiolatis coriaceis difformibus parvis simplicibus, pilis ferrugineis et paleis minimis peltatis margine late scariosis utrinque sparse vel infra dense vestitis, sterilibus rotundato-oblongis, fertilibus anguste ligulatis, maculis biseriatis; soris utrinque secus costam uniseriatis.

Polypodium piloselloides Linn. Sp. Plant. 1542. Swartz, Syn. Fil. 25. Willd. Sp. Plant. V. 144. Metten. Polyp. 93. Hook. Gard. Ferns t. 18., et Auctt.

Formae brasilienses.

Var. β. CAYENNENSE Baker.

Polypodium cayennense Desv. Berl. Mag. 314. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 257. Metten. Polyp. 93. Ettingsh. tab. 24. fig. 3.

Polypodium ciliatum Willd. Sp. Plant. V. 144. Splitz. Enum. Fil. Surin. 17.

Goniophlebium ciliatum J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 56.

Lopholepis ciliata J. Smith, Lond. Journ. Bot. I. 195.

Craspedaria ciliata Link, Sp. Fil. 117.

Marginaria Haenkeana Presl, Tent. 187. Liebm. Mex. Bregn. 41.

Craspedaria lanceolata Fée, Icon. Nouv. 65.

CAUDEX PALEIS ferrugineis lineari-subulatis membranaceis $\frac{3}{4}$ —1 lin. longis erecto-patentibus sparse vestitus. FRONDES segregatae, pilis brevibus nitidis ferrugineis et paleis minimis peltatis centro nigris, margine late albedo-scariosis utrinque sparse vestitae, demum saepe subnuda. LAMINA sterilis oblongo-lanceolata vel oblonga, 6—18 lin. longa, 4—6 lin. lata, utrinque angustata vel basi rotundata; maculis venularum obscuris, immersis, inter costam et marginem 2- v. raro 3-seriatis, costalibus multo majoribus, duplo longioribus quam latis, venulis liberis inclusis simplicibus e latere inferiore exorientibus, exterioribus parvis venulisque inclusis nullis. Lamina fertilis ligulata, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longa, 1 lin. lata; soris utrinque secus costam 15—25, densis, majusculis ($\frac{1}{2}$ lin. latis), totam faciem inferiorem frondis occupantibus et extra marginem prominentibus, paraphysibus copiosis conspicuis intermixtis.

Var. γ . TECTUM Baker.

Tabula nostra XXXII. Fig. 10—11. (frondes).

Polypodium tectum Kaulf. Enum. Fil. 87.

Goniophlebium tectum Moore, Ind. Fil. p. LXXIV.

Polypodium aurisetum Raddi, Fil. Bras. 12. t. 23. fig. 1. Metten. Polyp. 94. Etingsh. tab. 23. fig. 1—5. 7.

Marginaria auriseta Presl, Tent. 187.

Craspedaria Gestasiana Fée, Mem. VI. 15. t. 4. fig. 2.

Polypodium piloselloides Raddi, Syn. Fil. 46.

Tenerior, minor, paleis et praecipue pilis crebrioribus et densioribus; lamina sterilis oblongo-rotundata vel rotundata, 3—12 lin. longa, 2—4 lin. lata, basi rotundata; lamina fertilis pilis densis nitidis ferrugineis, faciei inferioris soros minores 8—12-jugos extra marginem non prominentes omnino occultantibus.

Frequens in America tropica inde e Cuba per Columbianam Guayanamque in Peruviam et Brasiliam australem, ad truncos in sylvis umbrosis. Var. β . in prov. do Alto Amazonas: Spruce 2227!; Para: Burchell 9515! 9779!, et per Guyanam britannicam (Parker!, Appun!, Rich. Schomburgk 281!), gallicam (Sagot 713!, Poiteau!) et batavam (Weigelt, Wulfschlaegel!, Hostmann 324, Kegel 4. 91. 490 etc.). — Var. γ . in prov. Bahia: Martius; Rio de Janeiro: Raddi!, Gaudichaud!, Douglas!, Gardner 74!, Brackenridge!, Burchell 3013!, Glaziou 945! 2418! etc.; et S. Catharina: Chamisso, Fritz Müller!. — Vaga et Extrabrasil.

39. POLYPODIUM SWARTZII BAKER: caudice epigaeo longe repenti gracili, frondibus subconformibus parvis papyraceis, utrinque nudis, ligulatis obtusis repandis, maculis venularum 3—4-seriatis; soris inter costam et marginem medialibus uniseriatis.

Polypodium Swartzii Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. 357.

Polypodium serpens Swartz, Syn. Fil. 26. Willd. Sp. Plant. V. 148. Metten. Polypod. 95., non Forster.

Marginaria serpens Presl, Tent. 188.

Anapeltis serpens J. Smith, Ferns Brit. et For. 85.

Polypodium runcinatum Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 230. (forma monstrosa runcinata).

CAUDEX 1 lin. crassus, ramosus, PALEIS lineari-subulatis membranaceis ferrugineis adscendentibus 2—3 lin. longis juventute vestitus. STIPITES segregati, brevissimi vel ad 4—6 lineas attingentes, nudi. LAMINA moderate viridis, fertilis ligulata, 2—3 poll. longa, 3—6 lin. lata, obtusa vel subobtusata, marginibus plus minus distincte repandis, basi utrinque anguste cuneata; sterilis saepe brevior, obtusior. COSTA gracilis, nuda; maculae inter costam et marginem 3—4-seriatae, fertiles majores costulares, aut secundariae cum areolis angustis inter eas et costam interjectis, exteriores parvae. SORI 20—30-jugi, mediocres, rotundati, superficiales.

Habitat prope Rio de Janeiro: Sello!, et praeterea in insulis Antillanis. — Dryas et Extrabras.

(40.) POLYPODIUM GLAUCOPHYLLUM KUNZE: caudicibus longe repentibus cito calvatis, frondibus modice petiolatis conformibus rigide chartaceis lanceolatis acuminatis utrinque glabris saepe glaucescentibus, maculis inter costam et marginem 5—8-seriatis, plerisque fertilibus.

Polypodium glaucophyllum Kunze in Schkuhr Suppl. 227. t. 93. Klotzsch, Linnaea XX. 393. Metten. Polypod. 79. Hook. Sp. Fil. V. 18.

Goniophlebium glaucophyllum Fée, Gen. Fil. 255.

CAUDEX lignosus, crassitie pennae corvinae, juventute PALEIS minutis rotundatis peltatis centro ferrugineis margine scariosis vestitus, cito calvatus. STIPITES segregati, firmi, straminei, nudi, 3—4 poll. longi. LAMINA utrinque viridis, in plantâ typicâ albo-pruinata, 6—10 poll. longa, 18—24 lin. lata, acuminata vel cuspidata, margine integra, basi subcuneata vel leviter rotundata. COSTA gracilis, straminea, nuda; VENAE graciles, distinctae, primariae erecto-patentes 2 lin. distant. SORI superficiales, rotundati, 1 lin. lati, paraphysibus copiosis intermixti.

Habitat in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1039!, in gallica: Sagot! (varietas epruinata), in ditone Ecuador, Columbia et insulis Antillanis. — Forte in Brasilia adhuc detegitur.

41. POLYPODIUM CATHARINAE LANGSD. et FISCH. stipitibus brevibus strictis stramineis, frondibus ovato-lanceolatis subcoriaceis utrinque nudis simpliciter pinnatis, pinnis 15—30-jugis integris ligulatis obtusis contiguis, inferioribus basi aegre dilatatis; soris constanter uniseriatis.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 3—4. (partes pinnarum).

Polypodium Catharinae Langsd. et Fisch. Icon. Fil. 9. t. 9. Willd. Sp. Plant. V. 172. Kaulf. Enum. Fil. 101. Metten. Polyp. 73. Hook. Sp. Fil. IV. 21. Etingsh. tab. 25. fig. 6. 8. Wawra, Maximil. Reise 204.

Marginaria Catharinae Presl, Tent. 188.

Goniophlebium Catharinae Fée, Gen. Fil. 255.

Polypodium glaucum Raddi, Fil. Bras. 20. t. 22. fig. 1.

Goniophlebium glaucum J. Smith, Ferns Brit. et For. 81.

CAUDEX epigaeus, firmus, flexuosus, breviter repens, 3—4 lin. crassus, PALEIS membranaceis castaneis lineari-subulatis 3—4 lin. longis basi peltatis primum patentibus dense vestitus. STIPITES firmi, segregati, erecti, 3—4 poll. longi. LAMINA erecta, glauco-viridis, 6—12 poll. longa, deorsum 5—6 poll. lata. PINNAE contiguae, inferiores 2—3 poll. longae, 5—6 lin. latae, obtusae vel subobtusae, basi aegre dilatatae, superiores (supra medium frondis) sensim breviores, imae reliquis aequales vel paullo breviores saepe deflexae. MACULAE VENARUM distinctae, inter costam et marginem pinnarum 2—3-seriatae, venulis inclusis liberis praeditae. SORI ad maculas costales restricti, pro pinnis maximis 15—20-jugi, paraphysibus nullis.

Ad *P. toriceum* arcte accedens; differt stipitibus brevioribus, pinnis obtusis confertioribus, soris semper uniseriatis. Vix tamen non ejus varietas.

Habitat ad saxa et truncos arborum in sylvis provinciarum Brasiliae austro-orientalium. In prov. Minas Geraës: Martius, Pohl, Ackermann, Warming!; Rio de Janeiro: Raddi, Martius, Gardner 70!, Burchell 1409! 1943!, Wawra et Maly 454, 471; S. Paulo: Burchell 3564!, et S. Catharina: Langsdorff!. — Dryas, Oreas.

42. POLYPODIUM LORICEUM LINN. stipitibus elongatis strictis stramineis, frondibus elongato-oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis plerumque subcoriaceis utrinque nudis, pinnis 30—40-jugis lineari-ligulatis contiguis, inferioribus basi cito dilatatis; soris utrinque secus costas 1- v. 2-seriatis.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 7—10. (pinnae) et XLVII. Fig. Vb. (analysis).

Polypodium loriceum Linn. Sp. Plant. 1546. Swartz, Syn. Fil. 35. Willd. Sp. Plant. V. 176. Metten. Polyp. 76. Hook. Sp. Fil. IV. 20. Ettingsh. Farnkr. tab. 25. fig. 2. 3.

Varietates brasilienses.

Var. β . LATIPES Baker.

Polypodium latipes Langsd. et Fisch. Icon. Fil. 10. t. 10. Willd. Sp. Plant. V. 170. Link, Sp. Fil. 128. Metten. Polyp. 76., et Aucutt.

Polypodium harpeodes, vacillans et pycnosorum Link, Sp. Fil. 127—8.

Marginaria latipes et harpeodes Presl, Tent. 188.

Goniophlebium Catharinae, harpeodes et vacillans J. Smith, Ferns Brit. et For. 81.

CAUDEX epigeus, firmus, flexuosus, breviter repens, 3—6 lin. crassus, PALEIS castaneis linearibus 2—3 lin. longis basi peltatis vestitus, demum calvescens. STIPITES erecti, segregati, 9—18 poll. longi. LAMINA subcoriacea, utrinque nuda, elongato-oblongo-lanceolata, 1—2 pedes longa, 8—12 poll. lata plus minus decurvata. PINNAE 30—40-jugae, contiguae, horizontales, 4—6 poll. longae, 5—8 lin. latae, saepe sensim in apicem acutum angustatae, marginibus integris vel paullulum crispato-repandulis, multae inferiores basi utrinque subito dilatatae, imae saepe subductae et deflexae. MACULAE VENULARUM inter costam et marginem pinnarum 3- vel 4-seriatae, venulis primariis distinctis elevatis, omnes venis liberis inclusis praeditae. SORI 1- v. saepius 2-seriati, mediocres, in maculis interiores impositi, pro pinnis maximis 20—35-jugi, paraphysibus nullis.

Var. γ . LAETUM Baker.

Polypodium laetum Raddi, Fil. Bras. 19. t. 28. Link, Sp. Fil. 129. Metten. Fil. Hort. Lips. 32. Polyp. 77. Ettingsh. ab. 15. fig. 1. tab. 24. fig. 5.

Marginaria laeta Presl, Tent. 188.

Goniophlebium laetum J. Smith, Bot. Herald. I. 231. Moore, Ind. Fil. 391.

Stipites breviores, 6—9 poll. longi; lamina tenerior, papyracea, utrinque saturate viridis, omnino nuda, elongato-lanceolata, 12—18 poll. longa, 8—10 poll. lata; pinnae 15—30-jugae, acutae, inferiores 3—5 poll. longae, 6—8 lin. latae; venulae graciliores, immersae; sori minores, 1- v. 2-seriati.

Var. δ . PECTINATUM Baker.

Goniophlebium pectinatum J. Smith, Bot. Herald. I. 230. Moore, Ind. Fil. 395.

Stipites multo-breviores, 2—3 poll. longi; lamina anguste lanceolata, 9—15 poll. longa, deorsum $2\frac{1}{2}$ —3 poll. lata, saturate viridis, papyracea vel subchartacea, infra aegre pubescens; pinnae 30—40-jugae, inferiores 15—18 lin. longae, $2\frac{1}{4}$ —3 lin. latae, obtusae vel subacutae, basi paullo dilatatae; maculae biseriatae, venulis gracilibus immersis; sori 1-seriati, 12—15-jugi.

Per totam Americam tropicam inde e Mexico et insulis Antillanis usque in Peruviam et Brasiliam australem. Var. β . in prov. Minas Geraes ad Caldas: Lindberg 592!, Regnell II. 317!, I. 473*!; Bahia: Princ. Neuwied; Rio de Janeiro: Gardner 5919!, Glaziou 397! 1222! 2068!; S. Paulo: Lindberg 570!, Burchett 3498! 5148!; S. Catharina: Langsdorff!, Sinclair!, Fox!; etiam in Guyana britannica: Appun 1047!. — Var. γ . in prov. Rio de Janeiro: Raddi, Gardner 121!, Pohl 3804, Glaziou 1659! 1726!; Minas Geraes ad Caldas: Lindberg 571!. — Var. δ . ad S. Gabriel da Cachoeira prov. do Alto Amazonas: Spruce 2324!, et in Guyana britannica: Appun 845!. — Vaga et Extrabrazil.

Obs. *Polypodium lanuginosum* Schrad. (Goett. Gel. Anzeig. 1824. p. 867.) nondum vidi. Probabiliter alteram hujus speciei varietatem sistit, ad *P. dasypleuron* Kunze lamina utrinque griseo-pubescente accedentem.

43. POLYPODIUM BRASILIENSE Poir. caudicibus breviter repentibus, stipitibus elongatis strictis nudis, frondibus oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis subcoriaceis utrinque glabris, pinnis 4—15-jugis ligulatis integris acutis, basi distincte separatis et plerumque plus minus angustatis, venulis distinctis elevatis; sori superficialibus utrinque secus costas 1—4-seriatis.

Polypodium brasiliense Poir. Enc. Bot. V. 525. Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 236.

Var. α . NERIFOLIUM Baker.

Tabula nostra XXXIV. Fig. 1. (*Tapsu* sub nomine Polyp. chnoodes) 8. 15. (pinnae).

Polypodium nerifolium Schkuhr, Crypt. 14. t. 15. Swartz, Syn. Fil. 37. Willd. Sp. Plant. V. 194. Raddi, Fil. Bras. 22. t. 31bis. Metten. Fil. Hort. Lips. 32. Hook. Sp. Fil. IV. 28. Ettingsh. tab. 24. fig. 6. tab. 25. fig. 10—13.

Goniophlebium nerifolium J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 57. Fée, Gen. Fil. 255.

Marginaria nerifolia et rhoifolia Presl, Tent. 189.

Polypodium Palma Vell. Fl. Flum. XI. t. 69.

Polypodium elatius et lucens Schrad. in Gött. Gel. Anz. 1824. p. 668.

Polypodium campylopodon Klotzsch, Linnaea XX. 395.

Polypodium Preslianum Link, Hort. Berol. II. 102.

Polypodium menisciifolium Langsd. et Fisch. Icon. Fil. 11. tab. 12. Willd. Sp. Plant. V. 189. Mett. Fil. Hort. Lips. 32. Hook. Sp. Fil. IV. 27. Ettingsh. tab. 25. fig. 1. 14. tab. 26. fig. 2.

Polypodium albo-punctatum Raddi, Fil. Bras. 21. t. 30.

Goniophlebium albo-punctatum, elatius, menisciifolium et nerifolium Moore, Ind. Fil. 385—393.

Polypodium longifolium Presl, Del. Prag. I. 167.

Goniophlebium intermedium Fée, Fil. Ant. tab. 18. fig. 3.

Polypodium dissimile Ettingsh. Farnkr. tab. 24. fig. 12., non Linn.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti, epigeus, breviter repens, PALEIS lanceolatis castaneis membranaceis 2—3 lin. longis juventute dense vestitus. STIPITES segregati, erecti, stramineo-castanei vel grisei, 4—12 poll. longi. LAMINA subcoriacea, 9—24 poll. longa, 9—18 poll. lata. COSTA primaria nuda, stricta. PINNAE erecto-patentes vel subpatentes, inferiores 6—9 poll. longae, 6—12 lin. latae, distincte separatae, superiores basi latae, inferiores angustae adnatae vel omnino solutae, imae mediis subaequales. VENAE erecto-patentes, elevatae, exsculptae; maculae venularum inter costam et marginem 3—4- vel in fronde sterili interdum 5—6-seriatae, omnes venulis liberis distinctis centralibus praeditae. SORI 1—2- vel raro 3—4-seriatae, in maculis interioribus impositi, $\frac{3}{4}$ —1 lin. lati, 30—50 in serie pro pinnis longioribus, paraphysibus nullis.

Var. β . ATTENUATUM Baker.

Tabula nostra XXXV. Fig. 1—4. (pinnae).

Polypodium attenuatum H.B.K. Nov. Gen. I. 10. Willd. Sp. Plant. V. 191. Raddi, Fil. Bras. 20. Klotzsch, Linnaea XX. 395. Hook. Sp. Fil. IV. 24. Splitz. Enum. Fil. Surin. 18.

Polypodium dissimile Schkuhr, Fil. 14. t. 14.

Polypodium xiphophoron Kunze ex Mett. Polypod. 73.

Polypodium gladiatum Kunze in Linnaea IX. 45. Mett. Polyp. 77. Ettingsh. tab. 25. fig. 4. tab. 26. fig. 9. 14. 15.

Polypodium Haenkei Liebm., Mex. Bregm. 52.

Marginaria gladiata et oleandriifolia Presl, Tent. 188.

Goniophlebium acuminatum Fée, Fil. Ant. tab. 19. fig. 1.

Tenuior, minus coriacea; pinnis 8—9 lin. latis, inferioribus 6—9 poll. longis, superioribus et mediis basi magis adnatis et utrinque paululum dilatatis, inferioribus basi paululum angustatis, venis gracilioribus minus distinctis magis immersis, areolis 3—4-seriatis, soris plerisque uniseriatis.

Frequens per totam Americam tropicam, in sylvis ad truncos. Enumeramus solum stationes collectoresque principales intra Brasiliam. Typus in prov. do Alto Amazonas: Martius, Spruce 2269!; prov. Para: Martius; Pernambuco: Gardner 1219!; Goyaz: Pohl; Minas Geraës: Lindberg!; in prov. Bahia, Rio de Janeiro, S. Paulo, S. Catharina et Rio Grande do Sul: Gardner 26!, Burchell!, Blanchet 3722, Luschath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 306!), Gaudichaud!, Langsdorff, Glaziou 408! 1655—6! 2067! 2403—6!, Wawra et Maty 288, etc. etc. — Var. β . in prov. do Alto Amazonas et Para: Spruce 3575! 12*! 736!; Goyaz: Pohl; Minas Geraës: Lindberg 568a!; Rio de Janeiro: Pohl. — Vaga et Extrabrazil.

44. POLYPODIUM FRAXINIFOLIUM Jacq. caudicibus longe scandentibus, stipitibus nudis elongatis, frondibus oblongo-deltoides simpliciter pinnatis subcoriaceis utrinque nudis, pinnis 4—12-jugis ligulatis vel oblongo-ligulatis integris acutis, basi articulatis distincte separatis, plerisque valde angustatis, inferioribus subsolutis, venulis immersis; soris immersis, utrinque secus costas 2—5-seriatis.

Tabula nostra XXXIV. Fig. 9—14. (pinnae).

Polypodium fraxinifolium Jacq. Icon. Pl. Rar. III. 639. Swartz, Syn. Fil. 38. Willd. Sp. Plant. V. 195. Metten. Polypod. 79. Hook. Sp. Fil. V. 26. Ettingsh. tab. 23. fig. 27. tab. 24. fig. 9. 10. 13—15.

Polypodium rhizoecaulon Willd. Sp. Plant. V. 196. Poir. Encycl. Suppl. IV. 498. Metten. Polyp. 79.

Polypodium articulatum Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 236. Metten. Polyp. 79. Ettingsh. tab. 26. fig. 13.

Polypodium distans Raddi, Fil. Bras. t. 31.

Polypodium triseriale Swartz, Syn. Fil. 38.

Polypodium cymatodes Kunze, Linnaea XXIII. 277.

Polypodium Richardii, ornatum et subulatum Klotzsch, Linnaea XX. 394. 396.

Polypodium mutabile Kunze, Linnaea IX. 46.

Polypodium polystichum Link, Fil. Hort. Ber. II. 101.

Polypodium deflexum Lowe, Ferns I. t. 45.

Polypodium Hostmanni Klotzsch, Linnaea XX. 397.?, et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, teres, crassitie pennae anserinae, longe repens vel scandens, PALEIS nigricantibus subulatis deciduis basi peltatis vestitus. STIPITES segregati, stricti, erecti, griseo-straminei, nitidi, 6—18 poll. longi. LAMINA 1—3 pedes longa, 12—18 poll. lata, obscure viridis, siccitate subgrisea. PINNAE 4—9 poll. longae, 9—24 lin. latae, paululum adscendentes, basi articolatae, omnes distincte sejunctae et plus minus angustatae, inferiores subsolutae, imae mediis aequales. VENULAE immersae, primariae erecto-patentes, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ lin. distantes; maculae inter costam et marginem 4—6-seriatae, omnes venulis liberis centralibus praeditae. SORI 2—4 vel raro 5-seriati, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. lati, distincte immersi et ad faciem superiorem frondis prominentes, paraphysisibus nullis.

Var. β . ADNATUM Baker.

Polypodium adnatum Kunze ex Klotzsch in Linnaea XX. 395. Metten. Polyp. 78. Hook. Sp. Fil. V. 79.

Goniophlebium adnatum Moore, Ind. Fil. 385.

Tenerior, minus coriacea, pinnis basi angustatis sed omnibus late adnatis.

Polypod.

Habitat typus speciei per totam Americam tropicam. Indicamus solummodo stationes collectoresque principales intra Brasiliam. In prov. S. Catharina: Fritz Müller 257!; S. Paulo: Martius; Rio de Janeiro: Raddi!, Langsdorff, Gardner 130!, Schott, Pohl, Burchell 2157!, Glaziou 1729! 2411! etc.; Bahia: Martius; Minas Geraës: Freyreiss, Lindberg 565!, Regnell I. 473!, Warming!; Alto Amazonas: Martius, Spruce 2099!. — Var. β . hucusque solummodo in Guyana britannica observata est: Rob. Schomburgk 504!, Appun 191! 433!. — Vaga et Extrabrazil.

45. POLYPODIUM INCANUM SWARTZ: frondibus coriaceis siccitate convolutis griseo-viridibus oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, supra tenuiter paleaceis vel subnudis, infra paleis minimis griseis vel ferrugineis basi peltatis dense vestitis, pinnis 6—20-jugis contiguis, imis medias subaequantibus; soris 1-seriatis subimmersis.

Polypodium incanum Swartz, Syn. Fil. 35. Willd. Sp. Plant. V. 174. Metten. Polyp. 69. Hook. Sp. Fil. IV. 209. Meyer, Esseq. 288. Splitg. Enum. Fil. Surin. 17. Ettingsh. tab. 13. fig. 2. tab. 21. fig. 5—8.

Marginaria incana Presl, Tent. 188.

Goniophlebium (*Lepicystis*) *incanum* J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 56.

Aerostichum polypodioides Linn. Sp. Plant. 1525.

Polypodium ceteracinum Michx. Fl. Bor. Am. II. 271.

Polypodium velatum Schkuhr, Fil. t. 11b.

Polypodium Eckloni Kunze in Linnaea X. 499. Metten. Polyp. 68. Hook. Sp. Fil. IV. 209.

Polypodium albidum Presl, Tent. 188.

CAUDEX firmus, flexuosus, late repens, crassitie pennae corvinae, PALEIS linearibus ferrugineis minimis adpressis juventute dense vestitus. STIPITES segregati, stricti, erecti, 1—3 poll. longi, plus minus paleacei. LAMINA 2—4 poll. longa, 12—18 lin. lata, supra griseo-viridis et tenuiter paleis griseis peltatis deciduis instructa, infra paleis minimis imbricatis membranaceis basi peltatis centro ferrugineis margine lato griseis scariosis plus minus acuminatis dense vestita. PINNAE 10—20-jugae, ligulatae, obtusae vel subacutae, 6—9 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae, horizontales, basi dilatatae, imae mediis subaequales. COSTA pinnarum obscura, immersa; VENULAE omnino occultae, sparse pinnatae, ramis plerisque anastomosantibus. SORI utrinque secus costas dense uniseriati, 6—12-jugi, immersi, ad faciem superiorem frondis prominuli.

Var. β . SQUALIDUM Baker.

Polypodium squalidum Vell. Fl. Flum. XI. t. 76.

Polypodium microlepis Fée, Gen. Fil. 235. Mem. VI. 8. t. 6. fig. 2. Wawra, Maximil. Reise. t. 103.

Pleopeltis elegans Wall. Cat. n. 55.

Minor; stipites 9—18 lin. longi; lamina 12—18 lin. longa, 6—9 lin. lata; pinnae obtusae, 8—12-jugae, 1 lin. latae, interdum basi paululum separatae; paleae mox griseae, acumine deciduo, imbricatae.

Var. γ . BURCHELLII Baker.

Minor; stipites 6—8 lin. longi; lamina 12—15 lin. longa, 6—8 lin. lata; pinnae obtusae, 1 lin. latae, 6—8-jugae; paleae aristis piliformibus longis ferrugineis persistentibus instructae.

Per totam Americam tropicam et subtropicam inde e Chile usque ad civitatem Ohio, itemque in Africa tropica et australi extratropica, ad arborea et saxa. Intra Brasiliam forma typica in prov. Minas Geraës: Freyreiss; in Bahiensi: Princ. Neuwied; in Goyazana: Burchell 9097! 9202!; et in prov. Para: Sieber (com. Hoffmannsegg), Martius, Spruce 303!. — Var. β . ad ripas fluminum in prov. Rio Grande do Sul: Tweedie!, et in contermina Uruguayae: Gibert 612!;

ad S. Catharina: Fritz Müller!; S. Paulo: Fox!; Rio de Janeiro: Raddi!, Burchell!, Mac Gillivray!, Glaziou 398! 973!, Lund! aliique; prov. Minas Geraës ad Caldas et Lagoa Santa: Regnell III. 1445!, Warming!. — Var. γ . in ditone Goyaz: Burchell 6998!. — Vaga et Extrabrazil.

46. POLYPODIUM LEPIDOPTERIS KUNZE: frondibus coriaceis siccitate convolutis griseo-viridibus longe ligulatis simpliciter pinnatis, supra sparse infra dense paleis ferrugineis longe aristatis basi peltatis vestitis, pinnis ligulatis 25—50-jugis, multis imis sensim decrescentibus; soris 1-seriatis superficialibus.

Polypodium lepidopteris Kunze, *Linnaea* XIII. 132. Metten. *Polyp.* 70. Hook. *Sp. Fil.* IV. 212. Wawra, *Maximil. Reise* 204. *Acrostichum lepidopteris* Langsd. et Fisch. *lc. Fil.* 5. t. 2. Willd. *Sp. Plant.* V. 113.

Polypodium hirsutissimum Raddi, *Fil. Bras.* 17. t. 26. *Polypodium sepultum* Kaulf. *Enum. Fil.* 104. *Goniophlebium (Lepicystis) sepultum* J. Smith in Hook. *Journ. Bot.* IV. 56.

Polypodium tricholepis Schrad. in Goett. *Gel. Anzeig.* 1824. p. 867.

Polypodium Raddii Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris.* VI. 232.

CAUDEX breviter repens, flexuosus, lignosus, 2—3 lin. crassus, PALEIS membranaceis linearibus ferrugineis 2—3 lin. longis dense vestitus. STIPITES segregati, brevissimi vel 1—4 poll. attingentes, erecti, stricti, dense paleacei. LAMINA supra sparse, infra dense paleis imbricatis basi peltatis centro ferrugineis margine lato scariosis apice longe setoso-aristatis tecta, 9—18 poll. longa, 15—30 lin. lata, longe ligulata, utrinque sensim angustata. PINNAE contiguæ, horizontales, 8—15 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae, ligulatae, basi utrinque praecipue antice dilatatae, multae inferiores sensim decrescentes, imae laxae rotundatae auriculiformes. COSTA pinnarum obscura, immersa; VENULAE omnino occultae sparse pinnatae, ramis anastomosantibus. SORI in pinnis mediis 8—12-jugi, contigui, $\frac{3}{4}$ lin. lati, in paleis immersi sed in facie superiore frondis non prominuli, medii inter costam et marginem.

Var. β . RUFULUM Baker.

Marginaria rufula Presl, *Tent.* 189.

Polypodium rufulum Presl, *Del. Prag.* l. c.

Polypodium lanosum Fée, *Gen. Fil.* 237. Hook. *Sp. Fil.* IV. 211.

Pinnæ latiores, deorsum 3—4 lin. latae, obtusae, valde crispatae; paleae pilliformes, ferrugineae vel griseae, longiores et densiores, frondis junioris paginam utramque penitus occultantes.

Diutgatum per totam Americam tropicam inde e Mexico usque in Peruviam, Brasiliam orientalem et Uruguayam, ad truncos et rupes tum umbrosas tum apertas. Intra Brasiliam typus in prov. Rio Grande do Sul: Fox!; S. Catharina: Chamisso, Tweedie!, Fritz Müller!; S. Paulo: Burchell 3926! 4795!, Lindberg!; Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos, Mandioca etc.: Luschath! (Mart. Herb. Ft. Bras. 301!), Raddi!, Lady Callcott!, Gardner 24!, Burchell!, Glaziou 974! (ex parte) 977! 2069! etc.; Bahia: Princ. Newwied; Minas Geraës: Gardner 5288!, Lindberg 584!, Regnell I. 469!, Warming!; Goyaz: Pohl; Alto Amazonas: Spruce 3798!. — Var. β . ad ripas fl. Rio Grande: Tweedie!; prope Rio de Janeiro: Glaziou 69! 1221!, Lund!. — Vaga et Extrabrazil.

§ 5. PHEBODIUM.

47. POLYPODIUM AUREUM LINN. frondibus magnis subcoriaceis utrinque nudis ovato-deltaeiformis profunde pinnatifidis vel deorsum pinnatis, pinnis 4—30-jugis sejunctis ligulatis acutis integris margine crispatis, maculis venularum 3—5-seriatis valde inaequalibus; soris 1—2-seriatis.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 17., XXXIV. Fig. 7. (capices pinnarum) et XLVII. Fig. VIa. (analysis).

Polypodium aureum Linn. *Sp. Plant.* 1546. Swartz, *Syn. Fil.* 32. Schkuhr, *Fil.* 13. t. 12. Willd. *Sp. Plant.* V. 169. Meyer, *Prim. Fl. Esseq.* 288. Spltg. *Enum. Fil. Surin.* 16. Ettingsh. *tab.* 33. fig. 8—10. Metten. *Fil. Hort. Lips.* 35. Hook. *Sp. Fil.* V. 16., et Auctt.

Pleopeltis aurea Presl, *Tent.* 197.

Phlebodium aureum J. Smith in Hook. *Journ. Bot.* IV. 59. Moore, *Ind. Fil.* p. LXXIII.

Chrysopteris aurea Link, *Sp. Fil.* 121.

Polypodium attenuatum Ettingsh. *tab.* 32. fig. 2., non Kunze.

Polypodium auratum Vell. *Fl. Flum.* XI. t. 74.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti, PALEIS membranaceis linearibus ferrugineis centro et basi castaneis 3—4 lin. longis dense vestitus. STIPITES segregati, erecti, stricti, stramineo-castanei, nitidi, 12—18 poll. longi. LAMINA ad alam angustam vel deorsum usque ad costam pinnatifida, 2—5 pedes longa, 12—24 poll. lata, rigide subcoriacea vel chartacea, utrinque pallide viridis, perfecte nuda. COSTA stricta, nitida, sursum alà 3—6 lin. latà inter pinna instructa. PINNAE 4—30-jugae, ligulatae, plus minus ascendentes, basi sinu 6—12 lin. lato angulato vel rotundato separatae, 6—12 poll. longae, 9—18 lin. latae, acutae, margine cartilagineo crispato cinctae, imae mediis aequales, superiores sensim minores, terminalis reliquis consimilis. VENAE distinctae, majores exsculptae; maculae inter costam et marginem 4—5-seriatae; costales parvae depressae; secundariae majores cum tertiariis fertiles; exteriores steriles, multo minores, venulis liberis centralibus plerisque solitariis saepe praeditae. SORI irregulariter nunc regulariter biseriati, a costà et margine remoti, $\frac{3}{4}$ lin. lati, rotundati, fere superficiales.

Var. β . AREOLATUM Baker.

Tabula nostra XXXII. Fig. 12. (apex pinnae) et XXXIII. Fig. 18. (pinna).

Polypodium areolatum H.B.K. *Nov. Gen.* I. 8. Willd. *Sp. Plant.* V. 172. Mett. *Fil. Hort. Lips.* 35. Ettingsh. *tab.* 32. fig. 1. 4. 7. 8., et Auctt.

Polypodium sporadocarpum Willd. *Sp. Plant.* V. 171. Mett. *Fil. Hort. Lips.* 36. t. 25. fig. 1—2.

Phlebodium areolatum J. Smith, Hook. *Journ. Bot.* IV. 59.

Chrysopteris sporadocarpa Link, *Sp. Fil.* 121.

Chrysopteris glauca et trilobata Fée, *Gen. Fil.* 265—6.

Polypodium araneosum et glaucinum Mart. et Gal. *Fil. Mex.* t. 3. fig. 2. et t. 5. fig. 1.

Minor, magis coriacea, utrinque distincte glaucescens; pinnæ angustiores, acutiores; venulae magis exsculptae; maculae 3—4-seriatae, secundariae fertiles, steriles venulis liberis nullis; sori semper uniseriati.

E Mexico et insulis Antillanis in Brasiliam australem. Intra Brasiliae limites forma typica hucusque solummodo lecta est in prov. Para: Martius. — Var. β . frequens in prov. Rio de Janeiro et S. Paulo, e. gr. Serra do Mar, Serra dos Orgãos etc.: Martius, Gardner 116!, Burchell 2175!, Pohl, Glaziou 1727—8! aliique; in prov. Minas Geraës, ad Caldas, Lagoa Santa, Congonha do Campo etc.: Martius, Lindberg 566!, Regnell II. 318!, Warming!, Stephan; in prov. Bahia: Blanchet!; etiam in Guiana britannica (Rich. Schomburgk 1135! 1194!). — Vaga et Extrabrazil.

48. POLYPODIUM DECUMANUM WILLD. frondibus magnis chartaceo-papyraceis utrinque nudis ovato-deltaeiformis profunde pinnatifidis vel deorsum pinnatis, pinnis 2—20-jugis contiguis ligulatis acutis margine crispatis, maculis venularum 5—8-seriatis, plerisque subaequalibus; soris 4—6-seriatis.

Tabula nostra XLVII. Fig. VIb. (analysis).

Polypodium decumanum Willd. Sp. Plant. V. 170. Metten.
Polyp. 100. tab. 2. fig. 10. Hook. Sp. Fil. V. 17., et Auctt.

Pleopeltis decumana Presl, Tent. 193.

Phlebodium decumanum J. Smith, Hook. Journ. Bot. IV. 59.

Chrysopteris decumana et dictyocallis Fée, Gen. Fil. 265.

Polypodium dictyocallis Lowe, Ferns II. t. 36. J. Smith,
Ferns Brit. et For. 84.

Phlebodium multiseriale Moore, Gard. Chron. 1855. p. 469.

CAUDEX breviter repens, lignosus, crassitie digiti, PALKIS lineari-subulatis membranaceis ferrugineis 6—9 lin. longis valde crispatis dense vestitus. STIPITES segregati, erecti, nitidi, nudi, grisei, 9—24 poll. longi. LAMINA utrinque viridis et perfecte nuda, 1—4 pedes longa, 1—2 pedes lata, ad alam angustam vel deorsum usque ad costam pinnatipartita. PINNAE basi sinu angusto separatae, 6—12 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. latae, inferiores mediis aequales vel subminores, terminalis reliquis consimilis. COSTA stricta, nitida, grisea, sursum inter pinnas ala 3—6 lin. lata instructa. VENAE graciles, distinctae, subimmersae, primariae subrectae; maculae praeter exteriores subaequales, venulis liberis geminatis apice fertilibus instructae. SORI rotundati, superficiales, in facie frondis superiore punctis calcareis notati, paraphysibus nullis.

In sylvis prov. Goyaz: Pohl!; in Pernambuco: Gardner 1220!; Para: Hoffmannsegg, Burchell 9148!, Spruce 15*! 912!, Graham!; prov. do Alto Amazonas: Martius; in Guyana gallica (Leprieur!, Sagot 718!, Poiteau), in batava (Keget 447), britannica (Rich. Schomburgk 1653!) et in Peruvia et Columbia. — Vaga et Extrabasil.

§ 6. CAMPYLONEURON.

49. POLYPODIUM ANGUSTIFOLIUM SWARTZ: frondibus ligulatis integris rigide coriaceis nitidis vel opacis utrinque longe angustatis, venulis immersis, liberis plerisque solitariis, areolis et soris 1—4-seriatis.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 13—16. (frons ejusque partes).

Polypodium angustifolium Swartz, Syn. Fil. 27. Willd. Sp. Plant. V. 153. Raddi, Fil. Bras. 14. t. 24b. Hook. Sp. Fil. V. 40., et Auctt.

Campyloneuron angustifolium Fée, Gen. Fil. 257. Moore, Ind. Fil. 222.

Margitaria angustifolia Presl, Tent. 188.

Goniophlebium angustifolium Brack. Fil. U. St. Am. Expl. Exped. 33.

Polypodium ensifolium Willd. Sp. Plant. V. 152. Presl, Rel. Haenk. I. 21., et Auctt.

Polypodium taeniosum Willd. Sp. Plant. V. 155. Metten. Fil. Hort. Lips. 34. t. 24. fig. 6a. b. Polyp. 82. Ettingsh. tab. 28. fig. 1—2. tab. 30. fig. 1. 2., et Auctt.

Polypodium loreum Kaulf. ex Mart. in Flora 1839. I. Beibl. 31.

Polypodium dimorphum Link, Fil. Hort. Berol. II. 38. (forma latior ad var. β . tendens).

Polypodium solutum Klotzsch, Linnaea XX. 399., et synonymia multa alia.

CAUDEX lignosus, flexuosus, breviter repens, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. crassus, PALKIS linearibus brunneis membranaceis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis juventute vestitus, cito calvescens tuncque insigniter glaucescens. STIPITES segregati, rigidi, straminei, nitidi, erecti, 1—2 poll. longi, nunc subnulli. LAMINA utrinque nuda opaco-viridis, anguste ligulata, 6—12 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ —3 lin. lata, in apicem acutum et deorsum in stipitem sensim angustata, marginibus integris saepe valde convolutis. COSTA straminea, rigida, dorso acute angulata. VENAE immersae nec exsculptae, primariae rectae; maculae 2—3-seriatae, costales venulis inclusis plerisque vel semper solitariis,

more *Goniophlebii* e margine postico areolarum exeuntibus, secundariae saepe venulis duabus praeditae. SORI rotundati, $\frac{3}{4}$ lin. lati, 1- vel irregulariter 2-seriati, superficiales, paraphysibus nullis.

Var. β . AMPHOSTEMON Baker.

Polypodium amphostemon Kunze Mss. Klotzsch in Linnaea XX. 339.

Campyloneuron amphostemon Fée, Gen. Fil. 258. Moore, Ind. Fil. 222.

Polypodium leucorhizon Klotzsch l. c. 400.

Multo major, caudice 3 lin. crasso, stipitibus 3—6 poll. ettingentibus; lamina 12—18 poll. longa, 12—15 lin. lata, obscure viridi, e triente inferiore sensim in stipitem angustata, margine repandulo-crispato; venulis primariis rectis leviter exsculptis; maculis 3—4-seriatis, exterioribus saepe cum venulis liberis geminatis; soris irregulariter triseriatis.

Var. γ . LUCIDUM Baker.

Polypodium lucidum Beyrich Mss. Hook. Sp. Fil. V. 41. Hook. et Baker, Syn. Fil. 348.

Campyloneuron lucidum Moore in Sims Cat. Ferns 1838. et Ind. Fil. 225.

Polypodium nitidum Hook. Fil. Exot. t. 12., non Kaulf.

Polypodium rigidum Lowe, Ferns II. t. 37 A.

Campyloneuron rigidum J. Smith, Cat. Kew-Ferns 2.

Crassior, rigide coriacea, lamina 12—18 poll. longa, 6—9 lin. lata, utrinque insigniter nitida, pallide viridis, siccitate flavo-brunnea; venulis omnino immersis, cum soris 2—3-seriatis.

In arboribus rupibusque siccis umbrosis per totam Americam tropicam inde e Mexico et Cuba usque in Peruviam et Brasiliae provinciam Rio Grande do Sul. Intra Brasiliae limites typus occurrit in prov. Goyaz: Pohl; Minas Geraes: Martius, Lindberg 577!, Regnell II. 317 $\frac{1}{2}$!, Warming!; Bahia: Luschnath (Mart. Hb. Fl. Bras. 309), Blanchet 3943!; Rio de Janeiro: Raddi!, Gardner 136!, Schott, Glaziou 959!; S. Paulo: Burchell 5320!; Rio Grande do Sul: Tweedie 554!, Fow!. — Var. β . in vicinia Rio de Janeiro: Glaziou 1001! 1733! 2818—20!, et in Guyana britannica (Rich. Schomburgk 1145!). — Var. γ . in prov. Rio de Janeiro frequens: Beyrich, Lady Callcott!, Macrae!, Swainson!, Burchell!, Schott, Glaziou 2073!, et in prov. S. Paulo: Burchell 3096!. — Vaga et Extrabasil.

50. POLYPODIUM LAEVIGATUM Cav. frondibus ligulatis integris rigide chartaceis utrinque opaco-viridibus nudis, apice et basi longe angustatis, venulis primariis flexuosis exsculptis ad marginem immersis, maculis 3—5-seriatis, costalibus venulas liberas solitarias, exterioribus geminatas includentibus; soris 3—4-seriatis.

Tabula nostra XXXIV. Fig. 2—4. (frondes et frondis pars.)

Polypodium laevigatum Cav. Praelect. 245. Swartz, Syn. Fil. 28. Willd. Sp. Plant. V. 159., et Auctt.

Campyloneuron laevigatum Presl, Tent. 190. Fée, Gen. Fil. 258.

Polypodium lapathifolium Poir. Enc. V. 514. Swartz, Syn. Fil. 28. Willd. Sp. Plant. V. 160. Raddi, Fil. Bras. 15. t. 24. fig. 3., et Auctt.

Polypodium fasciale Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Plant. V. 156. Kaulf. Enum. Fil. 91. Metten. Polyp. 82. Hook. Sp. Fil. V. 41. Ettingsh. tab. 27. fig. 7. tab. 29. fig. 5. 6., et Auctt.

Campyloneuron lanciforme Presl, Tent. 190. tab. 7. fig. 15. Fée, Gen. Fil. 258.

Campyloneuron minus et cubense Fée, Gen. Fil. 257—8.

Polypodium aphanophlebium Kunze, Flora Ratisb. III. 288., et synonymia multa alia.

CAUDEX lignosus, breviter repens, flexuosus, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. crassus, PALEIS linearibus castaneis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis sparse vestitus, cito calvescens. STIPITES segregati, erecti, stricti, straminei, 3—18 lin. longi. LAMINA 6—12 poll. longa, 8—12 lin. lata, acuta vel acuminata, margine repundulo-crispata, e triente inferiore in stipitem sensim angustata. COSTA grisea vel straminea, elevata. VENAE primariae 2— $3\frac{1}{2}$ lin. distantes. Maculae 3—5-seriatae, costales venulis liberis solitariis, exteriores duabus praeditae. SORI rotundati, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. lati, superficiales, inter costam et marginem 3—4-seriati, paraphysibus nullis.

Per totam Americam tropicam ad arbores sylvarum etc. Intra Brasiliae limites observatum est in prov. S. Catharina: Beechey!; in provinciis S. Paulo, Rio de Janeiro, Bahia et Minas Geraës: Raddi!, Martius, Gaudichaud!, Pohl, Burchell 2474! 3084!, Dr. Hooker!, Glaziou 402! 2419! 2457!, Warming! etc.; in prov. do Alto Amazonas ad ripas fluv. Solimões: Spruce 3912! — Vaga et Extrabras.

Obs. *Campyloneuron macrosorum* Fée (Icon. Nouv. 96) differt texturam magis coriaceam, soris majoribus; *Camp. Fendleri* Moore (Ind. Fil. p. 224) inter hanc et praecedentem ambigit, nervaturam *P. angustifolii*, habitu laevigati.

51. POLYPODIUM PHYLLITIDIS LINN. frondibus simplicibus late ligulatis integris rigide coriaceis vel chartaceis, utrinque opaco- v. subnitido-viridibus vel nitidis, in basin et apicem sensim angustatis, venis primariis rectis ad marginem exsculptis, maculis 6—10-seriatis, costalibus venulas liberas solitarias, exterioribus 2 v. 3 apice soriferas includentibus.

Tabula nostra XXXIV. Fig. 5—6 (frondis partes) et XLVIII. Fig. I. (analysis).

Polypodium Phyllitidis Linn. Sp. Plant. 1543. Swartz, Syn. Fil. 28. Willd. Sp. Plant. V. 157. Poir. Enc. V. 513. Hook. Sp. Fil. IV. 38. Meyer, Esseq. 287. Splitg. Enum. Fil. Surin. 19. Ettingsh. tab. 29. fig. 7. 8., et Auett.

Polypodium porrectum Willd. Sp. Plant. V. 161. Ettingsh. tab. 28. fig. 3.

Campyloneuron Phyllitidis Link, Sp. Fil. 124. Fée, Gen. Fil. 258.

Cyrtophlebium Phyllitidis J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 58.

Polypodium nitidum Kaulf. Enum. Fil. 92. Metten. Polyp. 83. Ettingsh. tab. 27. fig. 10. 11. tab. 30. fig. 7. (forma minor rigida utrinque nitida).

Polypodium costatum Kunze, Linnaea IX. 38. Klotzsch, ibid. XX. 401. Mett. Polyp. 84. (forma mediocris venis minus exsculptis).

Campyloneuron latum Moore, Ind. Fil. 225. (forma magna rigida subnitida).

Polypodium opacum Mett. Mss. (forma magna minus coriacea, utrinque opaco-viridis).

Campyloneuron polyanthum, crispum, Moritzianum, Sieberianum, undulatum, costatum et walapense Fée, Gen. Fil. 258.

Polypodium gladiatum Vell. Fl. Flum. XI. t. 59., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, breviter repens, 3—6 lin. crassus, PALEIS ovato-lanceolatis griseis vel brunneis 2—3 lin. longis vestitus, cito calvescens. STIPITES subsegregati, erecti, straminei, rigidi, nudi, 2—4 poll. longi, antice plani, dorso rotundati. LAMINA 1—2 pedes longa, $1\frac{1}{2}$ —4 poll. lata, late ligulata, rigide coriacea, utrinque perfecte nuda, opaco- vel subnitide viridis, acuta vel subobtusata, deorsum e triente inferiore in stipitem angustata. VENAE primariae in medio laminae 2—3 lin. distantes; maculae 6—10-seriatae; costales minores, venas primarias ambas non attingentes, venula singula libera praeditae; exteriores subaequales, venulis liberis duabus vel saepe tribus instructae. SORI rotundati, superficiales, paraphysibus nullis, 6—9-seriati.

Var. β . REPENS Baker.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 19—20. (frondis partes).

Polypodium repens Aublet, Guian. 962. Swartz, Syn. Fil. 29. Willd. Sp. Plant. V. 156. Hook. Sp. Fil. IV. 39., et Auett.

Campyloneuron repens Presl, Tent. 190. Fée, Gen. Fil. 258.

Campyloneuron caespitosum et brevifolium Link, Sp. Fil. 124—5.

Polypodium chrysopodium Klotzsch, Linnaea XX. 401.

Polypodium oligophlebium Kunze, Linnaea XXIII. 281., et synonyma multa alia.

Minor, minus coriacea, utrinque opaco-viridis, caudice tenuiori, longius repenti, saepe late scandenti, maculis 6—9-seriatis, venulis liberis macularum geminatis.

Per totam Americam tropicam, in sylvis ad truncos arborum et ad terram, frequentissimum. Enumeramus solummodo stationes collectorum principales intra Brasiliam. Typus in prov. Rio Grande do Sul: Fox!; S. Catharina: Pabst 221, Fr. Müller!; S. Paulo et Rio de Janeiro: Mart. Hb. Fl. Bras. 303!, Gardner 20! 136! 138! 5289!, Schott!, Burchell!, Glaziou 401! 990! 1730—1!; Minas Geraës: Lindberg 584!; Bahia: Princ. Newwied, Blanchet 2452!; Goyaz: Pohl; Para: Burchell 9406!, Spruce 23!; Alto Amazonas in ditone fl. Madeira et Yapurá: Martius. — Var. β . in prov. Minas Geraës: Regnell I. 471!; etiam in Guyana gallica (Sagot 1775!), britannica (Rich. Schomburgk 1675!, Appun 135!). — Vaga et Extrabras.

52. POLYPODIUM DECURRENS RADDI: frondibus deltoideis simpliciter pinnatis rigide coriaceis utrinque nudis opaco-viridibus, pinnis 1—6-jugis ligulatis integris acutis basi decurrentibus, venis primariis rectis ad marginem exsculptis, maculis 6—9-seriatis venulas liberas plerumque 2 apice soriferas includentibus.

Tabula nostra XXXII. Fig. 15—18. (pinna et partes pinnarum).

Polypodium decurrens Raddi, Fil. Bras. 23. t. 33. Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 236. Metten. Fil. Hort. Lips. 34. Polypod. 85. Hook. Sp. Fil. V. 42. Lowe, Ferns II. t. 4. Ettingsh. tab. 27. fig. 9. tab. 28. fig. 4. 5. 7.

Campyloneuron decurrens Presl, Tent. Pter. 190. Link, Sp. Fil. 125. Fée, Gen. Fil. 258. Moore, Ind. Fil. 223.

Cyrtophlebium decurrens J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 58.

Polypodium sinifolium Goldm. Pl. Meyen. 454.?

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS minimis lanceolatis obscure brunneis vestitus. STIPITES erecti, subsegregati, straminei, stricti, nudi, nitidi, 1—2 pedes longi. LAMINA 1—2 pedes longa et lata (junior saepe simplex subsessilis frondem *P. laevigati* simulans). PINNAE alternae, 6—12 poll. longae, 9—18 lin. latae, acutae vel acuminatae, marginibus repandulis, basi superiore ad costam cuneatim angustata, inferiore plus minus decurrente; inferiores basi in eodem latere 1—2 poll. distantes, mediis ceterum aequales. RACHIS nuda, stricta, straminea. COSTAE pinnarum validae, stramineae; VENAE primariae rectae, paene ad marginem exsculptae, parallelae, 3—4 lin. distantes; maculae inter costam et marginem 6—9-seriatae, costalibus submajoribus exceptis fere aequales, venulis liberis 2 vel raro 3 instructae. SORI parvi, superficiales, paraphysibus nullis.

Habitat in sylvis ad solum et truncos. In prov. Minas Geraës: Freyress, Gardner 5292!, Warming!; passim in sylvis montanis prov. Rio de Janeiro et S. Pauli: Raddi, Douglas!, Gardner 104! 5665!, Glaziou 403! 404! 970! 1684! 1748—50. 2388. Item incolit Peruviam (Spruce 3963!). — Dryadi-Oreas et Extrabras.

§ 7. PHYMATODES.

53. POLYPODIUM LYCOPODIOIDES LINN. caudicibus gracilibus longe vagantibus, frondibus simplicibus coriaceis parvis integris conformibus vel difformibus, utrinque nudis vel raro infra prope costam squamulosis, ligulatis vel elongato-oblongis, maculis immersis vel insculptis plus minus appendiculatis; soris rotundatis uniseriatis medialibus plus minus immersis.

Tabula nostra XXXV. Fig. 5-7. (frondes).

Polypodium lycopodioides Linn. *Sp. Plant.* 1542. *Swartz, Syn. Fil.* 25. *Willd. Sp. Plant. V.* 150. *Mett. Polyp.* 97. *Hook. Sp. Fil. V.* 34. *Ettingsh. Farnkr. t.* 33. *fig. 4. t.* 35. *fig. 1. 2. 6. 7., et Auctt.*

Pleopeltis lycopodioides Presl, *Tent.* 193.

Anapeltis lycopodioides et nitida J. Smith, *Ferns Brit. et For.* 86.

Polypodium ligustrifolium et Kunthii Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris. VI.* 225. 226.

Polypodium ovarianense et lagopodioides Desv. *Berlin. Mag. V.* 313. 314.

Polypodium mauritianum Willd. *Sp. Plant. V.* 150.

Polypodium Mackenii Baker in *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 357.

Polypodium pilosella Vell. *Fl. Flum. XI.* t. 57., et synonyma multa alia.

CAUDEX epigeus, flexuosus, longe vagans, 1½—2 lin. crassus, PALEIS lineari-acuminatis 2—3 lin. longis, primum ferrugineis adscendentibus, demum pallidis dense vestitus. FRONDES longe segregatae, subsessiles vel breviter petiolatae, coriaceae nec tamen rigidae, utrinque opacovirides, perfecte nudaе, plus minus difformes. LAMINA sterilis oblonga vel elongato-oblonga, 2—6 poll. longa, 9—18 lin. lata, obtusa vel acuta, marginibus integerrimis, basi in stipitem cuneatim angustata, fertiles angustiores et acutiores. VENAE immersae; primariae ad medium latitudinis frondis simplices rectae, deinde dichotome furcatae; areolae venularum copiosae, irregulariter hexagonae, inaequales, venulis liberis brevibus paucis instructae. SORI mediales inter costam et marginem, uniseriati, 20—30 pro serie, rotundati, subimmersi, 1 lin. lati, paraphysis intermixti.

Var. β. GEMINATUM Baker.

Polypodium geminatum Schrad. in *Gött. Gel. Anz.* 1824. p. 667. *Mett. Polyp.* 97. *tab. 2. fig. 14—15.* *Hook. Sp. Fil. IV.* 97.

Anapeltis geminata J. Smith, *Ferns Brit. et For.* 86.

Polypodium iteophyllum Link, *Fil. Hort. Ber. II.* 88. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 36.

Caudex lignosus, rigidus; frondes saepe geminatae (altera subinde fertili, altera sterili) ex apice ramulorum brevium orientes; lamina sterilis oblongo-lanceolata, acuta, 3—4 poll. longa, 12—15 lin. lata, fertili aequilonga sed 5—9 lin. tantum lata; venae primariae ad medium latitudinis frondis insculptae; sori profunde immersis et in facie frondis superiore prominentes.

Var. γ. SURINAMENSE Baker.

Polypodium surinamense Jacq. *Coll. III.* 285. t. 21. *fig. 4.*

Pleopeltis surinamensis et salicifolia Presl, *Tent.* 193.

Polypodium salicifolium Willd. *Sp. Plant. V.* 149. *H.B.K. Nov. Gen. I.* 6. *Mett. Polyp.* 96. *Splitg. Enum. Fil. Sur.* 15. *Ettingsh. tab. 31. fig. 2. 3. 7. 8. t. 32. fig. 5. 6.*

Polypodium funiculosum Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris. VI.* 226.

Polypodium rosmarinifolium Kunth ex *Spreng. Syst. Veg. IV.* 46.

Polypod.

Polypodium vacciniifolium Raddi, *Fil. Bras. 13.* t. 23. *fig. 2., non Langsd. et Fisch.*

Pleopeltis Leprieurii Moore, *Ind. Fil.* 262.

Polypodium dictyophyllum Kunze ex *Mett. Polyp.* 96.

Caudex flexuosus, paleis ferrugineis longe aristatis; frondes segregatae, subconformes, anguste ligulatae, 2—4 poll. longae, 4—6 lin. latae, acutae vel subobtusae; venae primariae insculptae; venulae liberae numerosiores; sori leviter immersis.

Var. δ. SQUAMULOSUM Baker.

Polypodium squamulosum Kaulf. *Enum.* 89. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 35. *Polyp.* 95. *Lowe, Ferns I. t.* 50. *II. t.* 29 B.

Pleopeltis squamulosa Presl, *Tent.* 193.

Anapeltis squamulosa J. Smith, *Ferns Brit. et For.* 86.

Polypodium myrtillifolium Hort.

Forma habitu etc. ad praecedentem prope accedens, sed lamina subtus paleis paucis scariosis adpressis prope costam instructa.

Var. ε. VENULOSUM Baker.

Polypodium venulosum Desv. *Berlin. Mag. V.* 314. *Ann. Linn. Soc. Paris. VI.* 226.

Phlebodium venosum Moore et *Houlst. Exot. Cult. Ferns* 34.

Polypodium venosum Lowe, *Ferns I. t.* 35.

Polypodium stigmaticum Presl, *Rel. Haenk. I.* 20. t. 3. *fig. 2.* *Mett. Polyp.* 97. *Hook. Sp. Fil. V.* 36.

Anapeltis stigmatica J. Smith, *Ferns Brit. et For.* 86.

Forma habitu cum var. γ. congruens, sed venulae omnes atro-brunneae pulcherrime insculptae, venulis liberis inclusis numerosioribus vel manifestioribus.

Filix per totam Americam tropicam et australem temperatam, in Africa tropica et australi extratropica, insulis Mascarenis, in Java et insulis Sandwicensibus divulgata, ad arbores sylvarum umbrerosarum praecipue degens. Indicamus nonnisi stationes collectoresque principales intra Brasiliam. Typus in prov. Rio Grande do Sul: Foz!; prov. Rio de Janeiro: Glaziou 2072!; Bahia: Martius!, Wawra et Maly 224; Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming!; Goyaz: Pohl; Para: Martius, Spruce 34! — Var. β. in prov. Rio de Janeiro: Burchell 863! 2866!, Glaziou 2071!; Bahia: Lusch-nath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 302!), Blanchet!; Goyaz: Pohl. — Var. γ. ad Rio de Janeiro: Raddi!; prov. Para et Alto Amazonas: Spruce 360!; frequens praeterea in Guyanis gallica, batava et britannica (Rob. Schomburgk 302!, Sagot 714!, Kegel 169, 608, 1043, Hostmann 163, 1169 etc.). — Var. δ. ad Rio de Janeiro: Karwinski, Gardner 5291!; S. Catharina: Chamisso, Fritz Müller 295! — Var. ε. in prov. Rio de Janeiro: Miers!, Gardner 195!, Glaziou 989!; Minas Geraes ad Caldas et in Serra da Piedade: Lindberg 580!, Regnell III. 1440!, Warming!, itemque in Guyana britannica (Parker). — Vaga et Extrabrazil.

54. POLYPODIUM MEGALOPHYLLUM DESV. caudicibus crassis longe vagantibus, frondibus simplicibus coriaceis medio-cribus conformibus integris lanceolato-ligulatis acutis v. acuminatis basi cuneatis utrinque nudis, maculis venularum prorsus immersis copiose appendiculatis; soris plerisque rotundatis superficialibus magnis, costae magis quam margini approximatis.

Polypodium megalophyllum Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris. VI.* 226.

Polypodium Schomburgkianum Kunze in *Schkuhr Fil. Suppl.* 88. t. 42. *Mett. Polyp.* 98. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 355.

Polypodium Schomburgkii Hook. *Sp. Fil. V.* 68.

Mecosorus Schomburgkii Klotzsch, *Linnaea XX.* 406.

Phymatodes Schomburgkianus J. Smith in *Hook. Journ. Bot. I.* 196.

CAUDEX epigeus, flexuosus, longe repens, 6—12 lin. crassus, PALEIS lanceolato-acuminatis dense imbricatis 2—3 lin. longis, centro ferrugineis, margine late scariosis vestitus. STIPITES longe segregati, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longi, stricti, erecti, nitidi, nudi, ferrugineo-straminei. LAMINA utrinque prorsus nuda, supra subnitida, infra opaca, 12—18 poll. longa, 2—3 poll. lata. VENAE prorsus immersae, primariae ad medium latitudinis frondis simplices rectae, deinde furcatae et dissolutae; areolae copiosae, irregulares, venulis liberis copiosis instructae. SORI uniseriati, 30—40 pro serie, rotundati, 2 lin. lati, vel transverse oblongi, paraphysibus intermixti.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ditone fl. Rio Negro, e. gr. ad S. Gabriel da Cachoeira: Martius, Spruce 1511! 2329!, et in prov. Para ad cataractas fluv. Aripicuri: Spruce 582!; item in Guyana britannica (Rob. Schomburgk 992!, Ayres!). — Najas.

55. POLYPODIUM LINDBERGHII METT. caudicibus longe repentibus, frondibus simplicibus sessilibus elongato-lanceolatis integris papyraceo-herbaceis utrinque praecipue ad costam paleis minutis linearibus vestitis, venis gracilibus immersis, primariis intra medium latitudinis dispersis, maculis exterioribus appendiculatis; soris uniseriatis costae magis quam margini approximatis, rotundatis, fere superficialibus, 20—30 pro serie.

Polypodium Lindbergii Metten. Mss. Hook. et Baker, Syn. Fil. 358.

CAUDEX flexuosus, longe repens, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. crassus, aegre lignosus, PALEIS lineari-subulatis ferrugineis membranaceis $1\frac{1}{2}$ lin. longis dense imbricatis vestitus. FRONDES conformes, pallide opaco-virides, 6—8 poll. longae, 12—18 lin. latae, acutae, basi longe cuneatae. VENULARUM areolae costales parvae, depressae, regulariter seriatae; secundariae maximae, fertiles, venulis inclusis conjunctis; exteriores sensim minores, venulis inclusis liberis distinctis vel furcatis. SORI $\frac{3}{4}$ lin. lati, paraphysibus nullis.

Inter sequens et *P. lycopodioides* medium tenens.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas in sylva primaeva ad arboreas repens: Lindberg 576!, Regnell I. 471!; et ad Lagoa Santa ejusdem prov.: Warming! — Oreas.

56. POLYPODIUM PERSICARIAEFOLIUM SCHRAD. caudicibus longe vagantibus, frondibus simplicibus subsessilibus elongato-lanceolatis integris papyraceis utrinque nudis, venis gracilibus immersis, primariis in medio latitudinis dissolutis, maculis exterioribus appendiculatis; soris uniseriatis costae magis quam margini approximatis, transverse v. oblique oblongis, superficialibus, 20—30 pro serie.

Tabula nostra XXXV. Fig. 8—11. (frondes) et XLVIII. Fig. 11 b. (analysis).

Polypodium persicariaefolium Schrad. in Goett. Gel. Anz. 1824. p. 667. Metten. Fil. Hort. Lips. 37. t. 25. fig. 20. Polyp. 98. Hook. Sp. Fil. V. 55. Hook. et Baker, Syn. Fil. 358. Ettingsh. tab. 34. fig. 1. 3. 4. 7. 8.

Polypodium lycopodioides Meyer, Prim. Fl. Esseq. 287. Schkuhr, Fil. 187. t. 8c., non Linn.

Microgramma persicariaefolia Presl, Tent. 213. t. 9. fig. 7. Splitg. Enum. Fil. Surin. 13.

Mecosorus persicariaefolius Klotzsch, Linnaea XX. 406.

CAUDEX flexuosus, $1\frac{1}{2}$ lin. crassus, lignosus, PALEIS ferrugineis membranaceis lineari-aristatis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. lg. dense imbricatis vestitus. FRONDES longe segregatae, conformes, subsessiles vel breviter petiolatae, opaco-virides, 4—6 poll. longae, 9—15 lin. latae, acutae, basi cuneatae. VENAE primariae conspicuae, subrectae, in medio latitudinis frondis furcatae; maculae copiosae, irregulares, interiores exappendiculatae, exteriores venulis liberis distinctis saepe furcatis instructae. SORI majusculi, $1\frac{1}{2}$ lin. longi, raro rupti, paraphysibus nullis.

Habitat ad arboreas in sylvis primæris prov. Rio de Janeiro: Sello!, et in Bahiensi: Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 384!), Princ. Neuwied, Blanchet, Wawra et Maty 294; in prov. Goyaz: Pohl, Burchell 7404!; prope Maypures ad fl. Orenoco (Spruce 3218), frequens in Guyanis anglica, batava et gallica, in insula Trinitatis, Columbia et Guatematica. — Vaga et Extrabrazil.

57. POLYPODIUM LANCEOLATUM LINN. caudicibus repentibus, frondibus simplicibus integris coriaceis breviter petiolatis elongato-lanceolatis vel linearibus, praecipue subtus paleis minutis peltatis vestitis, venis occultis, primariis indistinctis, maculis exappendiculatis; soris uniseriatis magnis rotundatis vel oblongis, subimmersis, 10—15 pro serie.

Tabula nostra XXXII. Fig. 9. (frons parva).

Polypodium lanceolatum Linn. Sp. Plant. 1542. Swartz, Syn. Fil. 26. Willd. Sp. Plant. V. 153., et Auctt.

Polypodium macrocarpum et marginale Willd. Sp. Plant. V. 147—9.

Polypodium lepidotum Willd. ex Schlecht. Adumbr. 17. t. 8. Mett. Polyp. 88. t. 3. fig. 16. Hook. Sp. Fil. V. 56. Ettingsh. tab. 29. fig. 2. tab. 30. fig. 9.

Pleopeltis lanceolata, macrocarpa et linearis Kaulf. Enum. Fil. 245—6.

Pleopeltis Kaulfussiana et Helenae Presl, Tent. 193.

Polypodium ensifolium Hook. Exot. Flora t. 62.

Polypodium polylepis Roem. ex Kunze Linnaea XIII. 131. Metten. Polyp. 89.

Grammitis revoluta Willd. Sp. Plant. V. 139.

Drynaria compacta Fée, Gen. Fil. 270., et synonyma multa alia.

CAUDEX flexuosus, sublignosus, longe repens, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. crassus, PALEIS linearibus ferrugineis saepe centro castaneis 1 lin. longis dense imbricatis vestitus, demum calvescens. STIPITES segregati, stricti, grisei, nitidi, nudi, erecti, 6—24 lin. longi. LAMINA utrinque praecipue subtus tota paleis minimis peltatis centro ferrugineis margine scariosis dense confertis vestita, 3—8 poll. longa, 6—12 lin. lata, acuta, integra vel raro sinuato-repanda, basi longe cuneata. COSTA distincta, castaneo-ebenea; VENAE immersae, prorsus occultae; maculae copiosae, irregulares, exappendiculatae. SORI rotundati vel verticaliter oblongi, 2—3 lin. lg., dense pulvinati, subimmersi, paleis peltatis intermixti.

Per regiones tropicas et austro-temperatas utriusque orbis late vagans, ad rupes et truncos praecipue degens, intra Brasiliam tamen limites raro hucusque observatum est, ita in prov. S. Catharina, ex herb. Hooker, collectore tamen haud indicato, et in prov. Rio de Janeiro: Pohl, Schott, Burchell 1941!, Gardner 193!, Glaziou 1735! 2386!. — Dryas et Extrabrazil.

58. POLYPODIUM PERCUSSUM CAV. caudicibus repentibus, frondibus simplicibus integris rigide coriaceis breviter petiolatis elongato-lineari-lanceolatis, praecipue infra paleis minutis peltatis vestitis, venis immersis, primariis indistinctis, maculis exterioribus sparse appendiculatis; soris uniseriatis rotundatis immersis, 20—30 pro serie.

Tabula nostra XXXV. Fig. 12. (frons).

Polypodium percussum Cav. Prael. 1801. p. 243. Swartz, Syn. Fil. 26. Willd. Sp. Plant. V. 57. Langsd. et Fisch. Ic. Fil. 8. t. 6. Raddi, Fil. Bras. t. 24. fig. 1. Hook. Sp. Fil. V. 55. Fil. Exot. t. 59. Ettingsh. tab. 35. fig. 8., et Auctt.

Phlebodium percussum J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 59.

Pleopeltis percussa Presl, Tent. 193. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 67. Kunze, Linnaea IX. 53.

Polypodium avenium Desv. Berlin. Mag. 1811. p. 314.

Polypodium cuspidatum Presl, Rel. Haenk. I. 20. t. 1. fig. 3.

CAUDEX longe repens, lignosus, 1—1½ lin. crassus, PALEIS lanceolato-subulatis ferrugineis 1½—2 lin. longis primum dense vestitus. STIPITES longe segregati, ½—3 poll. longi, erecti, stricti, griseo-straminei, plus minus furfuracei. LAMINA 6—9 poll. longa, 9—15 lin. lata, praecipue subtus tota paleis minimis dense confertis peltatis centro ferrugineis margine late scariosis, et ad costam paleis paucis consimilibus ovato-lanceolatis vestita, acuminata, subintegerrima, basi longe cuneata. COSTA grisea, modice valida; areolae immersae et subtus omnino occultae sed siccitate in facie superiore frondis perspicuae, copiosae, irregulares, exteriores interdum venulis liberis brevibus instructae. SORI dense pulvinati, medii inter costam et marginem, distincte immersi, 1 lin. lati, paraphysisibus numerosissimis et paleis peltatis intermixti.

Ad arborea sylvae frequens per totam Americam tropicam. Intra Brasiliam in prov. S. Paulo ad Santos: Lindberg 581!; prov. Rio de Janeiro: Raddi, Mart. Herb. Fl. Bras. 304, Gardner 21! 22! 194!, Burchell!, Glaziou 400! 1002! 2387! etc.; prov. Bahia: Princ. Newwied, Blanchet 2505, Wawra et Maty 187!; Minas Geraës, e. gr. ad Caldas et Lagoa Santa: Vauthier, Regnell I. 471½!, Warming!; in prov. Para: Sieber, com. Hoffmannsegg, Spruce 272!; et prov. do Alto Amazonas: Martius, Spruce 1365! 2405!. — Vaga et Extrabrazil.

59. POLYPODIUM CRASSIFOLIUM LINN. caudicibus breviter repentibus, frondibus simplicibus integris magnis elongato-lanceolatis breviter petiolatis utrinque nudis, venis primariis usque ad marginem rectis parallelis distinctis, maculis immersis copiose appendiculatis; soris rotundatis superficialibus, inter venas primarias uniseriatis, inter costam et marginem 4—10-seriatis.

Tabula nostra XLVIII. Fig. IIa. (analysis).

Polypodium crassifolium Linn. Sp. Plant. 1543. Swartz, Syn. Fil. 27. Willd. Sp. Plant. V. 161. Vell. Fl. Flum. XI. t. 58. Mett. Fil. Hort. Lips. 37. t. 20. fig. 5. G. Hook. Sp. Fil. V. 62., et Auctt.

Anaxetum crassifolium Schott, Gen. Fil. fasc. 1.

Pleuridium crassifolium Fée, Gen. Fil. 274.

Phymatodes crassifolia Presl, Tent. 197.

Polypodium coriaceum Raddi, Fil. Bras. 16. t. 25.

Polypodium acrosorum et anocarpos Kunze, Linnaea IX. 39—40. (formae angustiores).

Polypodium Vittaria Mett. Fil. Lechler. I. 8.

Pleuridium albo-punctatissimum J. Smith, Ferns Brit. et For. 95. (forma infra glauca, supra insigniter albo-punctata), et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS ovato-lanceolatis griseis membranaceis 2 lin. longis vestitus. STIPITES subsegregati, nudi, validi, erecti, substraminei, ½—3 poll. longi. LAMINA rigide coriacea, utrinque prorsus nuda, supra plus minus albo-punctata, 1—4 pedes longa, 1—5 poll. lata, in apicem plerumque acutum et in stipitem longe angustata. VENAE primariae erecto-patentes, usque ad marginem distinctae rectae parallelae conspicuae, in medio frondis 3—4 lin. distantes; maculae immersae, occultae, parvae, venulis liberis copiosis instructae. SORI rotundati, 2 lin. diam., superficiales vel receptaculis rotundatis elevatis insidentes, paraphysisibus intermixti.

In sylvis umbrosis frequens per totam Americam tropicam. Intra Brasiliam observatum est in prov. S. Paulo: Fox!, prov. Rio de Janeiro: Raddi, Martius, Korwinski, Gardner 139! 140! 2057!, Speke!, Glaziou 1732! etc.; prov. Minas Geraës, e. gr. ad Caldas, Lagoa Santa: Pohl, Regnell I. 472!, Warming!; prov. Bahia: Princ. Newwied; Goyaz: Gardner 5293!; Para: Spruce 14! 573!; et Alto Amazonas: Martius. — Vaga et Extrabrazil.

60. POLYPODIUM EXSUL METT. caudicibus repentibus, frondibus simplicibus subintegris oblongo-lanceolatis aegre petiolatis utrinque nudis, venis primariis usque ad marginem parallelis distinctis, maculis immersis appendiculatis; soris rotundatis superficialibus, inter venas primarias 2—3- rarius 4—5-seriatis, inter costam et marginem 6—7-seriatis.

Polypodium exsul Mett. ex Kuhn in Linnaea XXXVI. 138. *Pleopeltis macrophylla* Klotzsch Mss. teste Kuhn.

„RHIZOMA repens, elongatum, crassitiam pennae corvinae paullulum superans, squarrose paleaceum, PALEIS rufis c. basi ovata adpressa. FOLIA disticha, 1 poll. distantia, membranacea, 8½ poll. longa, sub 2 poll. lata, breviter petiolata (petiolo 5 lin. longo), lanceolata vel oblonga, utrinque aequaliter attenuata, breviter acuminata, integerrima vel vix sinuata. COSTULAE prominulae, 3 lin. distantes, sub angulo 70° decurrentes; maculae immersae translucens 6—7-seriatae, costales angustae breviter appendiculatae vel in maculas secundarias divisa. SORI plerumque radios occupantes arcibus approximati, inter costulas 2—3- rarius 4—5-seriati, rotundati, superficiales, hinc inde confluentes; paraphyses nullae vel paucissimae, articulatae, abbreviatae.

Inter *Polypodia* soris inter costulas plus quam biseriatis *P. membranaceo* Don proximum; sed palearum conditione, maculis immersis 6—7-seriatis, praesertim substantia laminae rigidiore insigne. (Kuhn loc. cit.)

Inter Campos et Victoria prov. Espiritu Santo: Sello. — Dryas.

61. POLYPODIUM ANGUSTUM METT. frondibus subcoriaceis distincte petiolatis rhomboideis, ad costam anguste alatum pinnatifidis, utrinque praecipue infra paleis minutis subpeltatis furfuraceis, pinnis anguste ligulatis 1—6-jugis, venis primariis indistinctis, maculis immersis exappendiculatis; soris rotundatis vel oblongis, inter costam et marginem pinnarum uniseriatis.

Polypodium angustum Mett. Polyp. 90. Hook. Sp. Fil. V. 76. Hook. et Baker, Syn. Fil. 363. Ettingsh. tab. 33. fig. 11. *Pleopeltis angusta* H.B.K. Nov. Gen. I. 9. t. 1. Willd. Sp. Plant. V. 211. Presl, Tent. 193.

Polypodium pleopeltifolium Raddi, Fil. Bras. 16. t. 21. Hook. Exot. Fl. t. 61.

Pleopeltis Raddiana Gaud. Freyc. Voy. 350.

Drynaria torulosa et stenoloma Fée, Mem. VI. 17—18.

Polypodium sectifrons Kunze ex Mett. Polyp. 99.

Polypodium palmatum Vell. Fl. Flum. XI. t. 63., non Blume.

CAUDEX breviter repens, lignosus, crassitie pennae cygneae, PALEIS lineari-subulatis minimis atro-castaneis dense vestitus. STIPITES subsegregati, stricti, nitidi, grisei vel castanei, 2—5 poll. longi, primum furfuracei, demum nudi. LAMINA utrinque pallide opaco-viridis, praecipue infra paleis minimis subpeltatis centro ferrugineis margine anguste scariosis vestita, 6—9 poll. longa et lata; PINNIS erecto-patentibus, 2—5 poll. longis, 3—4 lin. latis, acutis, integris vel repandis vel superne dentatis, imis medias aequantibus vel excedentibus. COSTA pinnarum griseo-castanea, modice valida; maculae venularum parvae. SORI saepe totam pinnarum latitudinem occupantes, ad pinnas inferiores 12—20-jugi, superficiales, rotundati vel verticaliter oblongi, 1½—2 lin. lati, paraphysisibus paucis intermixti.

In arboribus per magnam Americae tropicae partem. Intra Brasiliae fines in prov. Rio Grande do Sul: Fox!, Tweedie 552!; prov. S. Catharina: Fritz Müller!; S. Paulo: Burchell 3433!, Lindberg!, Rio de Janeiro: Raddi!, Burchell!, Gardner 23!, Glaziou 399! 978! etc.; prov. Espiritu Santo et Bahia: Princ. Newwied, Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 307!), Blanchet 2474!; Minas Geraës, ad Caldas, Lagoa Santa etc.: Martius, Lindberg 575!, Regnell I. 470½!, Warming!; Para: Martius. Item Mexicum, Guatemalam et insulas Antillanas incolit. — Vaga et Extrabrazil.

TRIBUS X. GYMNOGRAMMITIDEAE.

SORI exindusiati, lineares vel oblongo-lineares, marginales vel dorsales.

CAUDEX plerumque hypogaeus, suberectus, raro epigaeus, longe repens, nunquam (in generibus nostris) arborescens. STIPITES plerumque cum caudice continui, raro basi articulati (Selligera). FRONDES magnitudine texturâ et dissectione valde variabiles, interdum simplices integrae, plerumque parvae et plus minus dissectae. VENAE pleraeque liberae, interdum vario modo anastomosantes. SORI marginales continui vel interrupti, vel frequentius dorsales cum costâ et margine paralleli, 1- v. 00-seriati, nunc irregulariter secundum venas liberas anastomosantesve decurrentes. Indusium verum nullum. — Species cc. 200, pleraeque tropicae, extra Tropicos rarae.

CLAVIS GENERUM.

- a. Sori marginales vel paullulum intramarginales.
1. Sori primum rotundati vel oblongi, demum confluentes . . . XXI. NOTHOLAENA.
 2. Sori prorsus continui, lineares XXII. VITTARIA.
- b. Sori perfecte dorsales.
1. Sori lineares, cum costa contigui XXIII. MONOGRAMME.
 2. Sori oblongi vel elongati, secundum venas decurrentes.
 - Sori non reticulati XXIV. GYMNOGRAMME.
 - Sori imperfecte reticulati XXV. ANTROPHYUM.
 - Sori perfecte reticulati XXVI. HEMIONITIS.
 3. Sori irregulariter oblongi, inter costam et marginem multiseriati XXVII. MENISCIUM.

XXI. NOTHOLAENA R. BR.

NOTHOLAENA v. NOTHOCHLAENA R. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* 145. *Kaulf. Enum. Fil.* 133. *Presl, Tent.* 224. *Hook. et Bauer, Gen. Fil.* t. 76. *Hook. Sp. Fil.* V. 107., et *Auctt.* — CINCINALIS *Desv. Berlin. Mag.* V. 311. *Fée, Gen. Fil.* 160. *J. Smith, Ferns Brit. et For.* 178. — *Cheilanthes ex parte Metten. Farrngatt. V. 19.* — *Gymnogrammitidis et Acrostichi species Auctt.*

Indusium nullum vel spurium. SORI oblongi v. lineares, in lineâ marginali dispositi, primum plus minus interrupti, demum confluentes.

Tabula nostra XLVIII. Fig. III.

CAUDEX hypogaeus, breviter repens vel suberectus. STIPITES cum caudice continui, segregati vel fasciculati, nudi, graciles, castanei, nitidi, vel robustiores squamosi. FRONDES conformes, semper parvae, 2-3-pinnatifidae vel -pinnatae, in specie una nuda, pleraeque utrinque praecipue subtus pilis vel squamis densis vestitae, vel supra nuda et infra farina ceracea alba vel flava tectae (Cincinalis, subgenus extrabraziliense). VENAE occultae immersae, pinnatae, semper liberae. SORI quoad laminam marginales, quoad venas terminales, indusio nullo, nunc frondis margine paullulum revoluti et mutato indusium mentiente. — Species cc. 30, per regiones tropicas et austro- et boreali-temperatas novi orbis itemque per austro-temperatas Africae et Australiae dispersae, 2 etiam per Europam et terras vicinas late vagantes.

Genus *Cheilanthes*, inter genera involucreta, habitu satis respondens, vix ullo caractere certo et insigni ab eo distinctum.

SPECIES BRASILIENSES.

- § 1. LEPICHOSMA J. SMITH: Lamina subtus squamis dense imbricatis vestita 1. N. SCARIOSA.
- § 2. ERIOCHOSMA J. SMITH: Lamina esquamata, pilis copiosis vestita.
- Lamina deltoidea, pedatim 2-3-pinnatifida, subtus dense lanosa 2. N. ERIOPHORA.
 - Lamina elongato-lanceolata, bipinnata, pilis tenuiter vestita 3. N. POHLIANA.

§ 1. LEPICHOSMA.

1. NOTHOLAENA SCARIOSA BAKER: stipitibus fasciculatis validis dense paleaceis, frondibus oblongo-lanceolatis profunde bipinnatifidis, praecipue infra paleis linearibus et subulatis centro ferrugineis margine et apice pallidioribus dense imbricatis vestitis, pinnis sessilibus 8-12-jugis lanceolato-ligulatis obtusis, inferioribus reductis, pinnulis oblongis contiguis obtusis subintegris.

Acrostichum scariosum Swartz, Syn. Fil. 16. *Willd. Sp. Plant.* V. 125., et *Auctt.*

Nothochlaena Peruviana Desv. Ann. Linn. Soc. Par. VI. 220.

Cheilanthes squamosa Gillies ex Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 151. *Presl, Tent.* 160. *Hook. Sp. Fil.* II. 81. *Mett. Cheil.* 22.

Nothochlaena squamosa Fée, Cat. Lith. Foug. Mex. 10. *Lowe, Ferns I. t.* 17 B. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 371.

Nothochlaena Gilliesii Fée, Gen. Fil. 159.

Cheilanthes brachypus Kunze, Linnaea XXIII. 243. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 49. *Cheil.* 22.

Nothochlaena squamata Moore et Houlst. Gard. Mag. Bot. III. 20.

CAUDEX validus, suberectus, PALEIS lineari-subulatis membranaceis 3—4 lin. longis dense vestitus. STIPITES 3—7 poll. longi, flexuosi, castanei, nitidi, juventute paleis linearibus membranaceis griseo-ferrugineis adscendentibus dense vestiti. LAMINA subcoriacea, siccitate valde convoluta, supra pallide opaco-viridis et sparse paleacea, 5—6 poll. longa, 15—18 lin. lata. PINNAE laxae, usque ad costam anguste alatum pinnatifidae, PINNULIS contiguis 6—8-jugis, mediae 6—9 lin. longae, deorsum 4—5 lin. latae, inferiores reductae laxiores. RACHES castaneae, nitidae, dense vestitae; VENULAE liberae, omnino occultae. SORI secundum margines pinnularum demum continui in lineâ angustâ, margine frondis paululum revoluto.

Habitat in republica Argentina: Gillies!, in Guyana batava: Hostmann 199!, et in terris inde e Peruvia ad Mexicum. In Brasilia probabiliter adhuc inveniendâ.

§ 2. ERIOCHOSMA.

2. NOTHOLAENA ERIOPHORA FÉE: stipitibus segregatis longis gracilibus castaneis pilosis, frondibus deltoideis pedatim 2—3-pinnatifidis, supra sparse subtus dense pilis lanosis griseo-ferrugineis vestitis, pinnis imis longe maximis asymmetricis deltoideis, superioribus integris vel pinnatifidis.

Tabula nostra LXXVI. (habitus et analysis).

Notholaena eriophora Fée, Gen. Fil. 159. t. 13. fig. 3. Hook. et Baker, Syn. Fil. 372.

Cheilanthes eriophora Metten. Cheil. 23.

Polypodium eriophorum Hook. Ic. t. 991. Sp. Fil. IV. 229.

Nothochlaena palmatifida Kunze in Schkuhr Suppl. 148.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS minimis subrigidis subulatis ferrugineis dense vestitus. STIPITES stricti, 4—6 poll. longi, pilis mollibus tenuiter vestiti. LAMINA 1½—2½ poll. longa et lata, supra pallide opaco-viridis et tenuiter sericeo-lanosa, subtus pilis griseo-ferrugineis lanosis dense congestis vestita. PINNAE basi confluentes, imae pinnulis lateris inferioris productis, infimisque plus minus pinnatifidis asymmetricis; superiores multo minores (in speciminibus Gardnerianis in tabulâ Hookerianâ depictis ligulatae obtusae simplices, in specimine Kunzeano tabulae adnexae LXXVI. majores profunde pinnatifidae). VENAE occultae, pinnatae, liberae. SORI obscuri demum confluentes, margine frondis haud revoluto.

Habitat in vicinia urbis Oeiras prov. Piahy, in rupibus montosis umbrosis: Gardner 2390 l. — Hamadryas.

3. NOTHOLAENA POHLIANA KUNZE: stipitibus subfasciculatis gracilibus ebeneis nudis, frondibus lanceolatis bipinnatis utrinque pilis mollibus tenuiter vestitis, pinnis sessilibus 15—20-jugis ligulato-lanceolatis obtusis, imis maximis, pinnulis ovato-oblongis 3—6-jugis obtusis sessilibus contiguis inciso-crenatis.

Tabula nostra XLVIII. Fig. III. (analysis).

Nothochlaena Pohliana Kunze Mss. Hook. Sp. Fil. V. 118. t. 286 B. Hook. et Baker, Syn. Fil. 372.

Cheilanthes Pohliana Mett. Cheil. 23.

CAUDEX breviter repens, PALEIS minimis rigidis subulatis sursum vestitus. STIPITES 2—4 poll. longi, nitidi. LAMINA subchartacea, pallide opaco-viridis, utrinque pilis mollibus longis griseo-ferrugineis tenuiter vestita, lanceolata, e basi ad apicem sensim decrescens, 3—4 poll. longa, deorsum 15—18 lin. lata. RACHES pinnarum et pinnularum graciles, ebeneae, supra subtiliter pilosae. PINNAE subpatentes, imis exceptis contiguae, usque ad costam pinnatae, imae 6—8 lin. longae, 3½—4 lin. latae. VENAE in pinnulis pinnatae, occultae, liberae. SORI in lineâ angustâ continua demum confluentes, frondis margine paululum revoluto.

Habitat ad Goyaz: Pohl; in Serra da Natividade prov. Goyaz: Gardner 3551 l. — Hamadryas.

Polypod.

XXII. VITTARIA SMITH.

VITTARIA Smith, Mem. Acad. Taur. V. 413. t. 9. Swartz, Syn. Fil. 109. Willd. Sp. Plant. V. 404. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 68 B. Hook. Sp. Fil. V. 176. Fée, Mem. III. cum tabulis. — TAENIOPSIS J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 67. — TAENIOPTERIS Hook. Gen. Fil. t. 76 B. — HAPLOPTERIS Presl, Tent. 141. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 120 D. — PTEROPSIS Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 218. (ex parte). Presl, Tent. 225. — DICRANOGLOSSUM J. Smith, Bot. Herald I. 232. — CUSPIDARIA Fée, Gen. Fil. 88. — NEURODIUM Fée, Gen. Fil. 93. — PALTONIUM Presl, Epim. Bot. 156.

Indusium verum nullum. SORI lineares, prorsus continui, marginales vel paullulum intramarginales.

Tabula nostra XLIX. Fig. V. VI.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, PALEIS densis griseis membranaceis laxè cellulosis vestitus. STIPITES cum caudice continui, fasciculati vel paullulum segregati, breves, epaleacei, nunc subnulli. LAMINA plerumque simplicissima, chartacea vel membranacea, anguste elongato-ligulata, graminioidea, utrinque nuda, in specie una digitato-pinnatifida subtusque paleis minutis sparsis peltatis vestita. VENAE distantes, simplices, erecto-patentes, e costâ ad receptaculum procurrentes, perfecte parallelae (Euvittaria, Taeniopsis), vel in areolas hexagonas cum vel sine venulis liberis inclusis anastomosantes (Pteropsis, Cuspidaria). SORI in sulcum marginalem spurie involucreatum (Euvittaria, subgenus extrabrazilense ad Lindsayaceas valde accedens) vel paullulum intramarginalem (Taeniopsis, Pteropsis) immersi, vel superficiales in parte frondis superiore contracta ad margines impositi (Cuspidaria). SPORANGIA saepius paraphysibus copiosis (sporangiastris" Fée) interdum cyathiformibus vel clavato-cucullatis intermixta. — Species 10—12, in subgenere Taeniopsis difficile distinguendae, per regiones calidiores totius orbis dispersae.

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIVM.

§ 1. TAENIOPSIS. Linea sororum paullulum intramarginalis, immersa. Venae liberae. — Tabula nostra XLIX. Fig. V.

Sporangiastra clavato-cuculliformia . . . 1. V. SCABRIDA.

Sporangiastra cyathiformia 2. V. STIPITATA.

Sporangiastra intestinaeformia 3. V. LINEATA.

§ 2. PTEROPSIS. Linea sororum paullulum intramarginalis, immersa. Venae anastomosantes 4. V. ANGUSTIFOLIA.

§ 3. CUSPIDARIA. Sori superficiales, in parte frondis superiore contracta ad margines impositi. Venae anastomosantes. — Tabula nostra XLIX. Fig. VI.

Lamina simplex, anguste lanceolata . . . 5. V. LANCEOLATA.

Lamina digitato-pinnatifida 6. V. FURCATA.

§ 1. TAENIOPSIS.

1. VITTARIA SCABRIDA KLOTZSCH: paleis linearibus 6—8-ies longioribus quam latis indistincte dentatis, frondibus perparvis anguste ligulatis graminiformibus opacis complanatis, soris immersis paullulum intramarginalibus, venis liberis, sporangiastris clavato-cuculliformibus.

Vittaria scabrada et squamosa Klotzsch Mss. (v. s. in herb. Reg. Kew.)

Vittaria scabrada Fée, Mem. III. 20. Hook. Sp. Fil. V. 182. Hook. et Baker, Syn. Fil. 395.

CAUDEX breviter repens. PALAEAE acuminatae, e cellulis deorsum 6—8-seriatis conflatae, dentibus aegre distinctis. Stipites nulli. LAMINA obscure viridis, non pellucida, 2—3 poll. longa, 1 lin. lata, utrinque perfecte nuda. COSTA indistincta, immersa; VENAE liberae, occultae. SORI in sulcum profundum immersi. SPORANGIASTRA copiosa, clavato-cucullata. SPORAE cylindricae paullulum reniformes, 2—3-ies longiores quam latae.

Habitat in Serra dos Orgãos: Burchell 2288!, Glaziou 453! 1689! 2804!; loco Brasiliae australis non indicato: Setto. — Dryas.

2. VITTARIA STIPITATA KUNZE: paleis lineari-subulatis 8—10-ies longioribus quam latis distincte dentatis, frondibus anguste ligulatis complanatis membranaceis distincte stipitatis, soris immersis intramarginalibus, venis liberis, sporangiastris cyathiformibus.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 12. (pars frondis) et XLIX. Fig. V. (analysis).

Vittaria stipitata Kunze, Analect. Pter. 28. t. 18. fig. 1. Fée, Mem. III. 16. t. 3. fig. 4. Hook. Sp. Fil. IV. 179. Ettingsh. tab. 17. fig. 19.

Vittaria Gardneriana Fée, Mem. III. 15. t. 3. fig. 1. Hook. Sp. Fil. IV. 178.

Vittaria Ruiziana Fée, l. c. 16. t. 3. fig. 3. Hook. l. c.

CAUDEX breviter repens. PALAEAE e cellulis deorsum 4—8-seriatis conflatae, dentibus productis. LAMINAE saepius distincte stipitatae, graminiformes, $\frac{1}{2}$ —2 pedes longae, in medio 2—3 $\frac{1}{2}$ lin. latae, pellucido-membranaceae, acutae, deorsum longe angustatae, utrinque prorsus nuda. COSTA immersa, conspicua; VENAE distinctae. SORI distincte intramarginales, in sulcum profundum immersi. SPORANGIASTRA copiosa. SPORAE cylindricae et paullulum reniformes, 3-ies longiores quam latae.

Habitat in prov. Bahia, ad arbores sylvarum prope Ilheos et alibi: Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 386.); in vicinia Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos etc.: Gardner 147!, Glaziou 1736!; in prov. S. Paulo: Burchell 3848! (forma parva); S. Catharina: Fritz Müller!, et in terris e Peruvia ad Columbianam. — Vaga et Extrabrazil.

3. VITTARIA LINEATA SWARTZ: paleis lineari-acuminatis 8—12-ies longioribus quam latis acute dentatis, frondibus anguste ligulatis graminiformibus coriaceis, marginibus saepe revolutis, soris immersis paullulum intramarginalibus, venis liberis, sporangiastris intestinaeformibus.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 9—11. (frondis partes).

Vittaria lineata Swartz, Syn. Fil. 109. Willd. Sp. Plant. V. 404. Schkuhr, Fil. 93. tab. 101b. Fée, Mem. III. 17. Hook. Sp. Fil. V. 180. Ettingsh. Farnkr. tab. 17. fig. 4—6.

Pteris lineata Linn. Sp. Plant. 1530.

Vittaria Schkuhrii Raddi, Fil. Bras. 51.

Vittaria graminifolia Kaulf. Enum. Fil. 192.

Taeniopsis graminifolia J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 67.

Vittaria curvidentata et pachydietyon C. Müller in Bot. Zeitg. XII. 545—6.

Vittaria filiformis Cav. Prael. 1801. n. 671?, et synonyma multa alia.

CAUDEX breviter repens. PALAEAE densae, griseae, cellulis deorsum 4—8-seriatis, plerisque duplo longioribus quam latis, parietibus in dentes acutos protuberantibus. STIPITES subnulli vel perbreves straminei. LAMINA $\frac{1}{2}$ —2 pedes longa, $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, marginibus saepe revolutis. COSTA distincta; VENAE liberae, laxae, prorsus occultae. SORI in sulcum profundum immersi. SPORANGIASTRA copiosa, intestinaeformia. SPORAE cylindricae, paullulum reniformes, 2—3-plo longiores quam crassae.

Ad arbores sylvarum frequens per totam Americam tropicam. Intra Brasiliam in prov. do Alto Amazonas ad ripas fl. Rio Negro: Martius; prov. Para: Martius, Burchell 9402! 9925! 9456/2!, Spruce 4!, Graham!; in prov. Pernambuco: Gardner 1227!; Minas Geraës e. gr. ad Caldas: Mart. Hb. Fl. Bras. 385., Regnell 1484!; prov. Bahia: Martius, Wawra et Maty 572., Lockhart!; Rio de Janeiro: Burchell 2375!, Gardner 72! 146!, Schott, Glaziou 924! 1737! 2421! 2802!. — Vaga et Extrabrazil.

§ 2. PTEROPSIS.

4. VITTARIA ANGUSTIFOLIA BAKER: paleis lineari-acuminatis griseis teneris distincte dentatis, frondibus rigidulis subcoriaceis utrinque nudis anguste ligulatis complanatis acutis vel acuminatis deorsum longe angustatis, soris immersis paullulum intramarginalibus, venis in areolas verticales inter costam et marginem 4—5-seriatis anastomosantibus, sporangiastris intestinaeformibus.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 17—19. (frondes).

Pteris angustifolia Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1599. Syn. Fil. 95. Willd. Sp. Plant. V. 95.

Pteropsis angustifolia Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 218. Fée, Mem. III. 24.

Taenitis angustifolia R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 154. Hook. Sp. Fil. V. 187. Splitg. Enum. Fil. Surin. 12. Ettingsh. tab. 17. fig. 8. 9. tab. 18. fig. 17.

CAUDEX breviter repens. PALAEAE densae, 8—10-ies longiores quam latae, cellulis deorsum 4—5-seriatis, parietibus in dentes acutos protuberantibus. LAMINA 3—18 poll. longa, 3—6 raro 8 lin. lata, sessilis v. in stipitem brevem longe attenuata. COSTA immersa; VENAE graciles, in maculas verticales anguste hexagonas 3—4-plo longiores quam latas, in medio frondis inter costam et marginem 4—5-seriatis anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI in sulcum profundum immersi. SPORANGIASTRA copiosa, intestinaeformia. SPORAE cylindricae et paullulum reniformes, triplo longiores quam latae.

In arboribus sylvarum aboriginum pendula, per totam fere Americam tropicam. In Brasilia, loco accuratius non indicato: Mart. Hb. Fl. Bras. n. 329.; prov. Goyaz: Pohl; prov. Para: Burchell 9191! 9458!, Spruce 10!; Graham!. Praeterea in Guyana gallica (Leprieur!), batava (Hostmann 1101!, Splitgerber, Kegel 165, Kappler 1742.), britannica (Rob. Schomburgk 322!, Rich. Schomburgk 627, Appun 421!), in Columbia, Guatemala, Cuba et in insulis Galapagos. — Vaga et Extrabrazil.

§ 3. CUSPIDARIA.

(5.) VITTARIA LANCEOLATA BAKER: paleis rigidis minimis, frondibus subcoriaceis utrinque nudis anguste lanceolatis, basi apiceque longe angustatis, venis in areolas hexagonas inter costam et marginem 4—6-seriatis anastomosantibus, venulis liberis inclusis copiosis furcatis; soris superficialibus prorsus marginalibus, ad partem frondis superiorem subcontractam restrictis.

Pteris lanceolata Linn. Sp. Plant. 1530. Swartz, Syn. Fil. 94. Willd. Sp. Plant. V. 356.

Taenitis lanceolata R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 154. Kaulf. Enum. 130. Mett. Fil. Hort. Lips. 27. Hook. Sp. Fil. V. 186.

Pteropsis lanceolata Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 218. Hook. Fil. Exot. t. 45.

Paltonium lanceolatum Presl, Epim. 156.

Neurodium lanceolatum Fée, Gen. Fil. 93. t. 8., et synonyma multa alia.

CAUDEX crassus, strictus, breviter repens, paleis rigidis minimis brunneis lineari-subulatis vestitus. STIPITES subsegregati, stricti, $\frac{1}{2}$ —2 poll. longi, nitidi, nudi, straminei vel eburnei. LAMINA 6—12 poll. longa, 7—18 lin. lata, apice subobtusata, parte superiore subcontracta 2—4 poll. longa sola fertili, margine partis sterilis passim crispulo. COSTA distincta, straminea, moderate valida; VENAE immersae, obscurae, in maculas obliquas late hexagonas inter costam et marginem 4—6-seriatis anastomosantes; venulae inclusae copiosae, furcatae, apice claviculatae. SORI in lineâ latâ superficiali prorsus marginali ad partem superiorem frondis subcontractam obviis. SPORANGIASTRA copiosa, intestinaeformia. SPORAE oblongae.

Habitat in Guiana gallica: Poiteau!, in Panama et insulis Antillarum, forsitan in Brasilia adhuc detegenda.

6. VITTARIA FURCATA BAKER: paleis lineari-acuminatis teneris griseis dentatis, frondibus subcoriaceis supra nudis, subtus paleis minutis ferrugineis peltatis sparse furfuraceis, obdeltoideis digitatim pinnatifidis, pinnis 1—3-jugis linearibus erecto-patentibus, venis liberis vel in maculas angustas 1- v. raro 2-seriatis anastomosantibus, venulis liberis inclusis nullis; soris superficialibus prorsus marginalibus, ad partem frondis superiorem subcontractam restrictis.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 13—16. (pinnarum partes) et XLIX. Fig. VI. (analysis).

Pteris furcata Linn. Sp. Plant. 1531. Swartz, Syn. Fil. 95. *Taenitis furcata* Willd. Sp. Plant. V. 136. Hook. Sp. Fil. V. 188. Klotzsch, Linnaea XX. 431. Ettingsh. tab. 16. fig. 4., tab. 17. fig. 2. 3., tab. 18. fig. 1—4.

Pteropsis angustifolia Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 218. Presl, Tent. 226.

Cuspidaria furcata Fée, Mem. III. 25.

Pteris tricuspidata Linn. Sp. Plant. 1531.?

Varietas brasiliensis β .: DESVAUXII Baker.

Taenitis Desvauzii Klotzsch, Linnaea XX. 431. Mett. Fil. Hort. Lips. 27. Ettingsh. tab. 20. fig. 17.

Cuspidaria subpinnatifida Fée, Gen. Fil. 88. t. 8A. fig. 1. Mem. III. 26.

Dicranoglossum subpinnatifidum Moore, Ind. Fil. 316.

Taenitis furcata Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 7. Splitz. Enum. Fil. Sur. 13.

CAUDEX ligosus, breviter repens, hypogaeus. PLEAE densae, distincte dentatae, deorsum cellulis 6—8-seriatis. LAMINA obscure viridis, 6—10 poll. longa, 3—6 poll. lata, inferne integra in basin vel stipitem brevem angustata, superne usque ad alam 1—2 lin. latam digitatim pinnatifida, PINNIS 1—3-jugis alternis vel oppositis lineari-ligulatis acutis integris 2—5 poll. longis 2—4 lin. latis. COSTAE angustae, argute prominentes, substramineae; VENAE immersae, graciles, erecto-patentes, unifurcatae. SORI in lineâ superficiali continua vel plus minus interrupta dispositi, paraphysisibus nullis.

In arboribus per totam fere Americam tropicam. In prov. Rio de Janeiro, S. Paulo in Serra do Mar, Bahia e. gr. ad Ilheos etc.: Mart. Hb. Fl. Bras. 330!, Lund!, Wawra et Maly 337, Blanchet 1790; in prov. Para et Alto Amazonas: Spruce 7! 2370!. Frequens praeterea in tota Guyana, in Ecuador etc. usque ad insulas Antillanas. — Vaga et Extrabrazil.

XXIII. MONOGRAMME COMM.

MONOGRAMME Comm. ex Schkuhr Crypt. 82. t. 87. Presl, Tent. 206. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 84 A. et B. Hook. Sp. Fil. V. 121. — COCLEIDIUM Kaulf. Enum. 86. Schott, Gen. Fil. cum icone. — PLEUROGRAMME Blume, Fl. Jav. 69. (cum sectione Antrophyi). Presl, Tent. 223. Hook. et Bauer, Gen. Fil. tab. 72 A., 75 A., 84., ex parte. — Micropteris Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 217 ex parte. — VAGINULARIA Fée, Gen. Fil. 97. tab. 9 B. — DICLIPTERIS Brack. Fil. Un. St. Am. Expl. Exped. 135. t. 17. — Grammitidis, Taenitidis etc. sp. Aucti.

Indusium verum nullum. SORI costales, lineares, continui.

Tabula nostra XLVIII. Fig. IV. V.

PLANTAE parvae inconspicuae. CAUDEX suberectus vel repens. FRONDES sessiles vel subsessiles, segregatae vel caespitosae, prorsus nudaе, membranaceae vel subcoriaceae, lineares, simplices, integerrimae, saepe peranguste graminiformes, in specie una dichotome furcatae. COSTA distincta; VENAE aut nullae (Monogramme), aut simplices laxae erecto-patentes (Pleurogramme). SORI prope costam secundum totam longitudinem frondis vel in parte solummodo superiore dispositi, superficiales vel immersi, velisque subinvolutis praediti. — Species 9—10, per regiones tropicas totius orbis late sparsae.

Genus inter Exinvolutas et Involutas ambigens, Blechno affine.

SPECIES BRASILIENSES.

- § 1. EUMONOGRAMME. Venae praeter costam nullae. — Tabula nostra XLVIII. Fig. IV. . . . 1. M. GRAMINOIDES.
§ 2. PLEUROGRAMME. Lamina venis simplicibus distinctis praedita. — Tabula nostra XLVIII. Fig. V. . . . 2. M. SEMINUDA.

§ 1. EUMONOGRAMME.

1. MONOGRAMME GRAMINOIDES BAKER: frondibus fasciculatis parvis subcoriaceis anguste linearibus dichotome furcatis, venis nullis; soris superficialibus, solummodo in apice frondis cochleato-dilatato obviis.

Tabula nostra XLVIII. Fig. IV. (analysis).

Monogramme graminoides Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. 375.

Acrostichum graminoides Swartz, Prodr. 128.

Asplenium graminoides Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1608. Willd. Sp. Plant. V. 141.

Grammitis graminoides Swartz, Syn. Fil. 22. t. 1. fig. 5.

Pleurogramme graminoides Fée, Gen. Fil. 101. Mem. III. 37.

Monogramme furcata Desv. Journ. Bot. I. 23. Presl, Tent. 206. Hook. Sp. Fil. V. 121.

Cochlidium graminoides Kaulf. Enum. 86.

CAUDEX suberectus, paleis (in specimenibus nostris) nullis. FRONDES sessiles, dense caespitosae, erectae, 12—15 lin. longae, in parte simplici $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ lin. latae, utrinque nudaе, simplices vel dichotome furcatae, ramis erecto-patentibus 3—6 lin. longis, apice cochleato-dilatato-concavo $1\frac{1}{2}$ —2

lin. longo $\frac{1}{2}$ lin. lato solummodo fertili. COSTA nuda, valida, infra valde proëminens; VENAE nullae vel prorsus occultae. SORI in lineâ continuâ confluyente supra costam ad apicem frondis dilatatum obvii. Paraphyses nullae. SPORAE rotundae.

Habitat in prov. Minas Geraës: Langsdorff, e. gr. in rupibus apricis schistosis ad Mariana urbem: Martius. Item incotit Guyanam gallicam (Rudge!), insulas Antillanas et insulam S. Helenae (fide specim. in herb. Hooker, a Menziesio reportato). — Oreas et Extrabrazil.

§ 2. PLEUROGRAMME.

2. MONOGRAMME SEMINUDA BAKER: frondibus subfasciculatis parvis subcoriaceis linearibus simplicibus vel raro furcatis, venis erecto-patentibus simplicibus; soris plus minus immersis in dimidio vel triente superiore frondis haud dilatato obviis.

Tabula nostra XLVIII. Fig. V. (analysis).

Monogramme seminuda Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. 375.

Blechnum seminudum Willd. Phytol. 13. t. 8. fig. 2. Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 10.

Grammitis seminuda Willd. Sp. Plant. V. 140.

Taenitis seminuda Kuhn, Fil. Afr. 59.

Pleurogramme linearis, pumila et graminifolia Fée, Mem. III. 37—8.

Grammitis punctata Raddi, Fil. Bras. 11. t. 22 bis. fig. 1.

Micropteris blechnoides Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 217.

Taenitis pumila Kaulf. Enum. 132.

Monogramme graminifolia Hook. Sp. Fil. V. 124.

Taenitis graminifolia Hook. Exot. Fl. t. 77., et synonyma multa alia.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, PALIS linearibus subulatis membranaceis ferrugineis $\frac{1}{2}$ —2 lin. longis sursum vestitus. FRONDES sessiles, caespitosae, subcoriaceae, utrinque nudaе, 2—8 poll. longae, 1—2 lin. latae, anguste linearibus ligulatae, raro apice furcatae, complanatae, integerrimae, in basin et apicem obtusiusculum longe angustatae. COSTA nuda, grisea, distincta; VENAE immersae, inconspicuae, erecto-patentes, simplices, distincte intra marginem evanescentes. SORI super costam omnino confluentes, leviter immersi, saepe totam frondis latitudinem occupantes. Pars fertillis frondis marginibus plus minus distincte conduplicatis in sectione horizontali subdeltoidea. Paraphyses nullae.

Var. β . LINEARIFOLIA Baker.

Monogramme linearifolia Desv. Journ. Bot. I. 22. t. 2. fig. 2.

Pleurogramme immersa Fée, Mem. III. 37. t. 4. fig. 5.

Monogramme immersa Hook. Sp. Fil. V. 125. Hook. et Baker, Syn. Fil. 376.

Habitus plantae typicae, sed sori in sulcum profundum immersi.

Typus in fissuris rupium et ad arbores, praecipue in montibus, per totam fere Americam tropicam. In prov. Rio de Janeiro: Raddi, Gardner 105!, Burchell 2300!, Miers!, Glaziou 1738! 2385!; prov. Bahia: Claussen 254!; Minas Geraës, Serra da Piedade: Gardner 5286!. Praeterea in Guiana gallica (Leprieur!) et batava (Kegel 643, Focke, Kappler 1759), in Columbia insulisque Antillanis (a Willdenowio etiam Guineae adscripta, an lapsu calami pro Guiana?). — Var. β . in Guiana gallica (Leprieur 126, teste Fée) et in britannica (Appun 643!). — Vaga et Extrabrazil.

XXIV. GYMNOGRAMME DESV.

GYMNOGRAMME Desv. in Berlin. Mag. V. 304. Kaulf. Enum. 69. Presl, Tent. 217. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 37 et 72 B. fig. 7. Hook. Sp. Fil. V. 125. — Grammitis Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 3. ex parte. Presl, Tent. 208. ex parte. — SELLIGUEA Bory, Dict. Class. VI. 587. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 74 A. Presl, Tent. 215. — STEGNOGRAMME Blume, Fl. Jav. 173. Presl, Tent. 209. — LOXOGRAMME Blume (tamquam sectio). Presl, Tent. 214. — CEROPTERIS, NEUROGRAMME et ANOGRAMME Link, Sp. Fil. 137—8. — SYNGRAMME et LEPTOGRAMME J. Smith in Hook. Lond. Journ. IV. 51. 168. t. 7—8. — HECISTOPTERIS J. Smith l. c. I. 193. — DIGRAMMARIA Presl, Tent. 117. — PTEROZONIUM, TRISMERIA, CONIOGRAMME, PLEUROSORUS et CALLOGRAMME Fée, Gen. Fil. 169—179. — Polypodium et Phegopteris ex parte Mett.

Indusium nullum. SORI dorsales, lineares vel lineari-oblongi, plerumque secundum venas decurrentes.

Tabula nostra XLVIII. Fig. VI. et XLIX. Fig. I. II.

CAUDEX hypogaeus, erectus vel suberectus, lignosus vel herbaceus, raro repens vel annuus (Anogramme). STIPITES cum caudice continui, castanei vel griseo-straminei, nudi vel raro ad basin paleacei, nunc breves et ad basin articulati (Selliguela). FRONDES conformes vel subconformes, mediocres vel parvae, dissectione et textura valde variabiles, integrae lateque foliaceae vel 1—4 pinnatae, divisionibus ultimis saepe parvis, nudaе vel utrinque pubescentes, raro viscosae vel sparse paleaceo-furfuraceae, interdum subtus pulvere ceraceo albo vel flavo vestitae (Ceropteris). VENAE saepissime liberae, pinnatae vel raro flabellatae, confertae vel laxae, saepe in divisionibus ultimis linearibus medianae solummodo evolutae, in sectione Syngramme prope marginem anastomosantes, in sectione Selliguela more Phymatodis anastomosibus copiosissimis junctae. SORI saepe ramosi sed nunquam reticulati, saepissime demum confluentes, in § Leptogramme tamen lineari-oblongi regulariter seriati distincti. — Species 80—90, per regiones praecipue calidiores utriusque orbis late dispersae.

Genus inter Exinvolucratas fere sese habet ut *Asplenium* inter Involutatas.

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIIUM.

§ 1. LEPTOGRAMME. Stipites cum caudice continui, griseo-straminei. Frondes mediocres, aspidioides, bipinnatifidae, venis pinnularum pinnatis, venulis simplicibus. Sori oblongi vel lineari-oblongi. — *Tabula nostra XLVIII. Fig. VI.*

a. Lamina utrinque angustata; caudex erectus.

Pinnae 3—5 lin. latae; venulae pinnarum 2—3-jugae

1. G. ASPIDIOIDES.

Pinnae 6—10 lin. latae; venulae pinnarum 8—12-

jugae 2. G. DIPLAZIOIDES.

b. Lamina deorsum aequalis; caudex breviter repens

3. G. POLYPODIOIDES.

§ 2. EUGYMNOGRAMME. Stipites cum caudice continui, solemniter castanei. Frondes parvae vel mediocres, cheilanthoides. Sori lineares, demum confluentes. Lamina subtus haud ceraceo-pulverulenta. — *Tabula nostra XLIX. Fig. I.*

- a. Lamina perparva, simplex, coriacea, depresso-rotundata
4. G. BENIFORMIS.
- b. Lamina perparva, anguste obdeltoidea, dimidio superiore digitatim dissecto 5. G. PUMILA.
- c. Pinnae vel pinnulae late foliaceae, venulis multis confertis, omnibus longe soriferis.
Lamina simpliciter pinnata 6. G. RUFA.
Lamina saepissime bipinnata, interdum tripinnata 7. G. TOMENTOSA.
Lamina bipinnata, pinnulis obtusis parvis. 8. G. SELLOWIANA.
- d. Lamina 3—4-pinnatifida, segmentis parvis.
1. Lamina parva (3—6 poll. longa).
Lamina lanceolata, subchartacea, sparse hispida 9. G. SCHOMBURGKIANA.
Lamina deltoidea, membranacea, nuda 10. G. CHAEROPHYLLA.
2. Lamina medioeris (perfecte evoluta ultra-pedalis).
Membranacea, utrinque viscoso-pubescentis 11. G. MYRIOPHYLLA.
Chartacea, utrinque hirsuto-hispida 12. G. INSIGNIS.
- § 3. CEROPTERIS. Lamina infra pulvere ceraceo albo vel flavo vestita, ceterum ut § 2.
Pinnae solemniter ad basin usque trifurcatae, segmentis lineari-ligulatis subintegris 13. G. TRIFOLIATA.
Pinnae pinnatae, pinnulis numerosis parvis lineari-lanceolatis integris vel pinnatifidis 14. G. CALOMELANOS.
- § 4. SELLIGUEA. Caudex repens. Stipites ad basin articulati. Lamina coriacea, integra, ligulata. Venae copiose anastomosantes. — *Tabula nostra XLIX. Fig. II.* 15. G. ELONGATA.

§ 1. LEPTOGRAMME.

1. GYMNOGRAMME ASPIDIODES KAULF. stipitibus brevibus fasciculatis, frondibus herbaceis subnudis lanceolatis bipinnatifidis utrinque attenuatis, pinnis 15—25-jugis lineari-ligulatis ad $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ pinnatifidis breviter petiolatis deorsum inaequalibus, basi superiore horizontaliter truncata, inferiore cuneata, pinnulis oblongis integris, venis pinnularum pinnatis, venulis simplicibus 2—3-jugis, soris lineari-oblongis.

Gymnogramme aspidioides Kaulf. Enum. 81. Desv. Mem. Linn. Soc. Paris. VI. 214., non Hook.

Ceterach aspidioides Willd. Sp. Plant. V. 137. Raddi, Fil. Bras. 10. t. 21. fig. 1.

Leptogramme aspidioides Klotzsch, Linnæa XX. 415.

Phegopteris aspidioides Mett. Fil. Hort. Lips. 82. t. 17. fig. 1—4. Pheg. 16. Ettingsh. Farnkr. t. 37. fig. 2.

Gymnogramme asplenioides Swartz in Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 56. t. 3. fig. 4. Kaulf. Enum. Fil. 80. Hook. Sp. Fil. V. 132.

Grammitis asplenioides Presl, Del. Prag. I. 163.

Polypodium saxicola Swartz, Stockholm. Vet. Akad. Handl. l. c. 59. t. 3. fig. 5.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS lanceolato-subulatis obscure brunneis membranaceis 1— $1\frac{1}{2}$ lin. longis sursum vestitis. STIPITES grisei, erecti, subglabri, 2—3 poll. longi, deorsum paleacei. LAMINA utrinque viridis, nuda vel subnuda, lanceolata, in basin et apicem sensim angustata, 6—12 poll. longa, 3—4 poll. lata. PINNAE compositae 15—25-jugae, leviter adscendentes, subcontiguae, lineari-ligulatae, acutae vel sub-obtusae, apice subintegrae, lateribus pinnatifidae, PINNULIS contiguis adscendentibus $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. latis, superiores sessiles, mediae $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, 3—5 lin. latae, inferiores multae sensim decrescentes. COSTA stricta, stramineo-grisea, subnuda vel breviter griseo-pubescentis. SORI saepe e sporangiis paucis laxè dispositis compositi.

Polypod.

Habitat in sylvis umbris et paludosis prov. Rio de Janeiro, e. gr. Corcovado, Serra d'Estrella etc.: Raddi, Burchell 2152! 2580! 3010!, Martius, Setto!, Glaziou 258! 930! etc.; in prov. Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming!; et e Peruvia ad Panamam. — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

2. GYMNOGRAMME DIPLAZIOIDES DESV. stipitibus fasciculatis mediocribus, frondibus herbaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis utrinque angustatis solemniter breviter griseo-pubescentibus, pinnis 15—25-jugis sessilibus ligulatis ultra medium pinnatifidis acutis basi truncatis, inferioribus laxioribus multisque decrescentibus, pinnulis contiguis oblongis obtusis integris, venis pinnularum pinnatis, venulis simplicibus 6—9-jugis, soris lineari-oblongis.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 5. (pinna).

Gymnogramme diplazioides Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 214. Hook. et Baker, Syn. Fil. 377.

Phegopteris diplazioides Mett. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 241.

Gymnogramme polypodioides Link, Hort. Ber. II. 50., non Spreng.

Grammitis Linkiana Presl, Tent. 209.

Gymnogramme Linkiana Kunze, Linnæa XVIII. 310. Hook. Sp. Fil. V. 140.

Gymnogramme rupestris Kunze, Linnæa XXIII. 310.

Hook. Sp. Fil. V. 140.

Phegopteris Linkiana et rupestris Mett. Fil. Hort. Lips. 82.

Phegopteris Duchassaingiana Fée, Fil. Ant. t. 14. fig. 3.

Polypodium botryosorum Sieb. ex Steud. Nom. Crypt. 340.

CAUDEX lignosus, erectus, PALEIS linearibus obscure brunneis membranaceis 2—4 lin. longis sursum vestitis. STIPITES 3—12 poll. longi, erecti, stricti, griseo-straminei, basi paleacei, sursum saepe breviter griseo-pubescentes. LAMINA utrinque gramineo-viridis, subnuda vel saepius praecipue subtus breviter griseo-pubescentis, 1—2 pedes longa, 4—9 poll. lata. PINNAE subcontiguae, horizontaliter patentès, mediae 2—4 poll. longae, 6—10 lin. latae, pinnulis patentibus 2—4 lin. longis, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ lin. latis, basi symmetricè utrinque horizontaliter truncatae, multae inferiores laxiores et valde decrescentes. COSTA grisea, stricta, plus minus breviter griseo-pubescentis. SORI regulariter seriati, oblongi vel infimi lineares, neque costam nec marginem attingentes.

Habitat in sylvis umbris prov. Goyaz: Poht; Minas Geraës, e. gr. ad Caldas: Poht, Lindberg 556!; prope Rio de Janeiro: Martius, Setto!, et in terris inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Dryadi-Oreas et Extrabrazil.

3. GYMNOGRAMME POLYPODIOIDES SPRENG. stipitibus mediocribus segregatis, frondibus herbaceis utrinque nudis oblongo-deltoideis bipinnatifidis, pinnis 6—10-jugis lanceolato-ligulatis ultra medium pinnatifidis, inferioribus breviter petiolatis basi cuneata subintegra, imis medias aequantibus, pinnulis oblongis integris contiguis leviter falcatis, venis pinnularum pinnatis, venulis simplicibus 8—12-jugis, soris lineari-oblongis.

Tabula nostra XLVIII. Fig. VI. (analysis).

Gymnogramme polypodioides Spreng. Syst. IV. 40. Hook. Sp. Fil. V. 139. Hook. et Baker, Syn. Fil. 377.

Ceterach polypodioides Raddi, Fil. Bras. 10. t. 22.

Leptogramme polypodioides J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 51.

Grammitis polypodioides et severa Presl, Tent. 209.

Gymnogramme Raddiana Link, Sp. Fil. 137.

Phegopteris polypodioides Mett. Fil. Hort. Lips. 82.

Polystichum gymnogrammoides Gaudich. Freyc. Voy. 324.

CAUDEX breviter repens, crassitie pennae anserinae, PALEIS linearibus brunneis membranaceis sursum vestitus. STIPITES erecti, stricti, griseo-straminei, nudi, 6—9 poll. longi. LAMINA supra saturate subnitideque viridis, infra pallidior, 9—18 poll. longa, 8—12 poll. lata. PINNAE subcontiguae, leviter adscendentes, apice subintegrae, deorsum ultra medium pinnatifidae, pinnulis obtusis vel oblique subacutis, mediis 3—4 lin. longis 2—3 lin. latis, superiores sessiles, inferiores 4—6 poll. longae, 9—12 lin. latae, breviter petiolatae, basi utrinque ad alam costularem brevem cuneatam subintegram reductae, imae mediis aequales. COSTA grisea, nuda, vix pubescens. SORI regulariter lineari-oblongi, e costâ secundum venas paene ad marginem procurentes.

Habitat in sylvis umbris prov. Minas Geraës: Martius!; Bahiae: Blanchet 3925!, et Rio de Janeiro: Raddi!, Gardner 119!, Mac Gillivray 157!, Glaziou 413! etc. — Dryas, Oreas.

§ 2. EUGYMNORAMME.

4. GYMNOGRAMME RENIFORMIS MART. stipitibus fasciculatis nudis castaneis, frondibus perparvis rigide chartaceis glabris depresso-rotundatis, margine exteriori denticulatis, inferiore truncatis vel cuneatis, venis liberis confertis flabellatis, soris linearibus zonam latam concentricam cum margine exteriori parallelam efformantibus.

Tabula nostra XLIX. Fig. I. (analysis).

Gymnogramme reniformis Mart. Icon. Crypt. Bras. 86. t. 26. Hook. II. Cent. Ferns t. 9. Hook. Sp. Fil. V. 126. Hook. et Baker, Syn. Fil. 378.

Pterozonium reniforme Fée, Gen. Fil. 178. t. 16 A. —

CAUDEX crassus, erectus, PALEIS erectis membranaceis praegracilibus ferrugineis 3—4 lin. longis dense vestitus. STIPITES dense fasciculati, 1—2 poll. longi, stricti, nitidi. LAMINA primum obscure viridis, siccitate grisea, utrinque perfecte nuda, 9—15 lin. longa, 12—18 lin. lata, margine exteriori rotundato denticulato, inferiore integro cuneato vel subtruncato. VENAE obscurae, ex apice stipitis flabellatae, dichotome furcatae, rectae, confertae. SORI secundum venas decurrentes, cito lateraliter confluentes, zonam continuam 2—3 lin. latam cum margine exteriori parallelam et ab eo 1—2 lin. distantem efformantes.

Habitat in prov. do Alto Amazonas sylvis umbris ad montem Cupati in ripa fluv. Yapurá: Martius. Item incolit Peruviam orientalem (Spruce 4641!). — Najas et Extrabrazil.

5. GYMNOGRAMME PUMILA SPRENG. frondibus caespitosis perparvis subsessilibus nudis anguste obdeltoideis, dimidio inferiore integro, superiore profunde digitatim dissecto, segmentis linearibus acutis, venis liberis flabellatis dichotome furcatis, soris linearibus inaequalibus.

Gymnogramme pumila Spreng. Syst. Veg. Suppl. 31. Kunze, Anal. Pter. II. t. 8. fig. 1. Hook. II. Cent. Ferns t. 8. Sp. Fil. V. 126. Splitg. Enum. Fil. Sur. 18. Hook. et Baker, Syn. Fil. 379.

Hecistopteris pumila J. Smith, Lond. Journ. Bot. I. 193. Fée, Gen. Fil. 179. t. 16 B.

CAUDEX filiformis, inter nodos repens, PALEIS filiformibus minimis fibrillosis ferrugineis vestitus. FRONDES membranaceo-chartaceae, utrinque omnino nuda, saturate virides, 9—15 lin. longae, superne 3—6 lin. latae, dimidio inferiore integro in basin longe cuneatim angustato, dimidio vel triente superiore profunde et irregulariter digitatim-dissecto, segmentis ultimis linearibus acutis. VENAE in parte frondis integra flabellatae, dichotomae, in segmentis solummodo medianae obviae, distincte infra apicem evanescentes. SORI secundum venas in parte superiore frondis decurrentes, saepe ramosi.

Habitat in sylvis humidis ad truncos arborum, muscis intermixta, in prov. Para: Spruce 57! 58!, Bates!, Wallace!; porro in Guiana britannica (Appun 1495!), gallica (Leprieur!), batava (Weigelt, Spitzgerber, Kappler 176!, Hostmann 199, Kege! 2), itemque in Panama, Guatemala et insulis Antillis. — Najas et Extrabrazil.

6. GYMNOGRAMME RUFa DESV. stipitibus fasciculatis castaneis paleis sericeis vestitis, frondibus mediocribus herbaceis utrinque breviter pubescentibus elongato-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 6—9-jugis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis foliaceis integris, venis liberis pinnatis, venulis confertis plerisque bifurcatis, soris linearibus ramosis ad venas omnes decurrentibus.

Gymnogramme rufa Desv. Berlin. Mag. V. 304. Presl, Tent. 218. Hook. Sp. Fil. V. 145.

Acrostichum rufum Linn. Sp. Plant. 1525.

Hemionitis rufa Swartz, Syn. Fil. V. 20 et 210. Schkuhr, Fil. 8. t. 17 et 21. Willd. Sp. Plant. V. 130.

Neurogramme rufa Link, Sp. Fil. 137.

Gymnogramme acuminata Kaulf. Enum. 70.

CAUDEX lignosus, erectus, PALEIS filiformibus ferrugineis sericeis 1—1½ lin. longis sursum dense vestitus. STIPITES dense fasciculati, 3—12 poll. longi, erecti, stricti, paleis iis caudicis similibus patentibus plus minus vestiti. LAMINA supra plene viridis, infra pallidior, utrinque pilis brevibus adpressis nitidis albo-griseis pubescens, 6—15 poll. longa, 4—6 poll. lata. RACHIS stricta, castanea, pilis sericeis patentibus plus minus vestita, internodiis inferioribus 1—2 poll. longis. PINNAE oppositae vel suboppositae, patentes, 2—3 poll. longae, 6—12 lin. latae, acutae, integrae, basi utrinque late rotundatae, imae mediis aequales interdum auriculatae; petioluli castanei 1—1½ lin. longi. VENAE e costâ mediana gracili pinnatae, adscendentes, curvatae, centrales plerumque bifurcatae. SORI angusti, praegraciles, e costâ per totam longitudinem pinnarum paene ad marginem procurentes.

Habitat locis udusculis et apricis prope Para et Santarem ad ripas fl. Amazonum: Spruce 401!; Minas Geraës, ad Lagoa Santa in rupibus calcareis prope Lapa vermelha: Warming!; in Guyana britannica (Appun 1600! 1685! 1891!), et e Columbia ad Guatemalam et Cubam. — Oreas, Najas, et Extrabrazil.

7. GYMNOGRAMME TOMENTOSA DESV. stipitibus fasciculatis castaneis paleis sericeis tenuiter vestitis, frondibus mediocribus herbaceis utrinque breviter pubescentibus lanceolatis vel deltoideis 2- v. raro 3-pinnatifidis vel -pinnatis, pinnis 6—9-jugis, imis maximis saepe longe petiolatis, pinnulis foliaceis ovato-lanceolatis integris vel pinnatifidis vel raro deorsum pinnatis, venis liberis pinnatis, venulis confertis plerisque bifurcatis, soris linearibus ramosis ad venas omnes decurrentibus.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 3—4. (pinnae partes).

Gymnogramme tomentosa Desv. Berl. Mag. V. 304. Swartz in Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1813. p. 36. t. 4. fig. 2. Presl, Tent. 218. Hook. Sp. Fil. V. 144. Eitingsh. tab. 38. fig. 15. tab. 39. fig. 1. 7.

Asplenium tomentosum Lam. Encycl. II. 308.

Hemionitis tomentosa Raddi, Fil. Bras. 8. t. 19.

Neurogramme tomentosa Link, Sp. Fil. 137.

Ceterach lobatum Presl, Del. Prag. V. 1. p. 162.

Hemionitis asplenioides et pumila Vell. Fl. Flum. XI. t. 93—4.

CAUDEX erectus, lignosus, PALEIS sericeis sursum vestitus. STIPITES erecti, stricti, 3—12 poll. longi, juventute paleis iis caudicis similibus vestiti. LAMINA supra plene viridis, infra pallidior, utrinque breviter

griseo-pubescentis, 4—12 poll. longa, 4—6 poll. lata. PINNAE oppositae vel suboppositae, superiores integrae oblongo-lanceolatae breviter petiolatae, mediae longius petiolatae deorsum utrinque auriculatae vel pinnatifidae; inferiores saepe (sed non semper) multo majores erecto-patentes 2—4 poll. longae, lanceolatae vel deltoideae, petioli 6—18 lin. longis et pinnulis pluribus distinctis oblongis lanceolatis integris vel pinnatifidis vel raro deorsum pinnatis instructae. VENAE et SORI omnino praecedentis.

An varietas magis composita speciei praecedentis? quicum textura, stipitibus, paleis, venatione et soris omnino congruit.

Habitat locis adiusculis apricis, tum in terra et rupibus tum in ligno putrido, per Brasiliae provincias medias et austro-orientales: Mart. Hb. Fl. Bras. 358. Prov. Goyaz: Pohl, Gardner 4077!; Minas Geraes: Lindberg 541—2!; Bahia: Princeps Neuwied, Blanchet!; Rio de Janeiro: Raddi!, Gaudichaud!, Lady Callcott!, Gardner 11!, Burchell 2765!, Glaxiu 447!, et alii collectores; S. Paulo: Martius; S. Catharina: Fritz Müller. Item incolit Peruviam. — Vaga et Extrabrazil.

8. GYMNOGRAMME SELLOWIANA METT. stipitibus brevibus flexuosis superne pubescentibus hispidisve, frondibus lineari-lanceolatis parvis chartaceis, supra glabris, infra hispidis v. pubescentibus, bipinnatis, pinnis numerosissimis confertis patentibus subsessilibus lineari-oblongis obtusis, pinnulis parvis oblongis paucidentatis, infimis solutis, venis liberis laxis, soris linearibus.

Gymnogramme Sellowiana Mett. Mss. ex Kuhn in Linnæa XXXVI. 69.

Cheilanthes Sellowiana Presl, Tent. 160.

CAUDEX breviter repens, setis fuscis numerosis dense vestitus. STIPITES subsegregati, flexuosi, castanei, 2—4 poll. longi, breviter griseo-pubescentes v. hispidi. LAMINA utrinque obscure viridis, supra subglabra, subtus hispida v. minute griseo-pubescentis, 4—6 poll. longa, 6—8 lin. lata. PINNAE compositae 30—35-jugae, horizontaliter patentes, mediae 3—4 lin. longae, deorsum $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latae, inferiores laxiores sensimque breviores. PINNULAE pinnarum mediarum 4—5-jugae, obcuneato-rotundatae, marginibus valde revolutis, sessiles, confertae. VENAE simplices, paucae, inconspicuae. RACHES primariae et secundariae strictae, pilis brevibus patentibus griseis vel castaneis dense vestitae. SORI e basi ad apicem venularum procurrentes.

Species distinctissima, pinnulis parvis bullatis *Cheilanthis* § *Phy-sapteridem* simulans.

Habitat in cacumine montis Serra da Piedade prov. Minas Geraes: Warming!; loco Brasiliae non indicato: Sello. — Oreas.

(9.) GYMNOGRAMME SCHOMBURGKIANA KUNZE: stipitibus longis fasciculatis nudis castaneis, frondibus parvis chartaceo-herbaceis utrinque tenuiter griseo-hispidis lanceolatis tripinnatifidis vel tripinnatis, pinnis 8—12-jugis lanceolato-deltoideis obtusis breviter petiolatis basi inaequalibus, e basi frondis ad apicem sensim diminutis, pinnulis cuneato-rotundatis paucis sessilibus confertis, infimis pinnatifidis vel pinnatis, venis liberis laxis subflabellatis, soris linearibus confluentibus.

Gymnogramme Schomburgkiana Kunze ex Klotzsch in Linnæa XX. 408. Hook. II. Cent. Ferns t. 92. Sp. Fil. V. 127. Hook. et Baker, Syn. Fil. 382.

Anogramme Schomburgkiana Fée, Gen. Fil. 184.

CAUDEX suberectus, PALEIS paucis subulatis castaneis 1— $1\frac{1}{2}$ lin. longis sursum vestitus. STIPITES castanei, nitidi, flexuosi, frondis sterilis 4—6, fertillis 6—9 poll. longi. LAMINA utrinque plene viridis, utrinque praecipue infra sparse griseo-hispida, 3—5 poll. longa, deorsum 12—15 lin. lata, e basi ad apicem sensim decrescens. PINNAE confertae, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, mediae per-

breviter petiolatae, deorsum usque ad costam pinnatae, PINNULIS contiguis confertis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis extrorsum crenulatis; imae maximae, pinnulis 4—6-jugis confertis, infimis profunde pinnatifidis. RACHIS castanea, stricta, tenuiter griseo-hispida. VENAE in pinnulis pinnato-flabellatae, distinctae, dichotome furcatae, in apices loborum singulorum egredientes. SORI inaequales, demum totam faciem pinnularum, margine excepto, occupantes.

Habitat in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1196!, Appun 1091!, forte in Brasilia amazonica detegenda.

10. GYMNOGRAMME CHAEROPHYLLA DESV. caudicibus annuis, stipitibus fasciculatis elongatis debilibus nudis sursum stramineis, frondibus membranaceis nudis pallide viridibus deltoideis quadripinnatifidis, pinnis 8—12-jugis distincte petiolatis lanceolatis basi inaequalibus, imis multo majoribus deltoideis, segmentis ovato-rhomboides, divisionibus erecto-patentibus linearibus, venis liberis in divisionibus ultimis medianis solummodo evolutis, soris linearibus confluentibus.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 2. (frons parvula).

Gymnogramme chaerophylla Desv. Berlin. Mag. V. 307. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 215. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 45. Presl, Tent. 219. Metten. Fil. Hort. Lips. 136. Hook. Sp. Fil. V. 218. Ettingsh. Farnkr. t. 36. fig. 5. tab. 39. fig. 9. Hemionitis chaerophylla Poir. Encycl. Suppl. III. 38. Anogramme chaerophylla Link, Sp. Fil. 137.

CAUDEX erectus, debilis, radicellis fibrillosis, paleis subnullis. STIPITES graciles, basi castanei, sursum nitide straminei, frondis sterilis 1—3, fertillis 4—8 poll. longi. LAMINA tenera, utrinque pallide viridis, prorsus nuda, $2\frac{1}{2}$ —6 poll. longa et lata. PINNAE superiores lanceolatae, distincte petiolatae, basi inferiore cuneata, imae 2—4 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ poll. latae. PINNULAE infimae distincte petiolatae, basi inferiore cuneata, superiore cum rache parallela; SEGMENTA sessilia, ovato-rhomboides, $1\frac{1}{2}$ —3 lin. lata, basi cuneata, divisionibus erecto-patentibus linearibus, frondis sterilis latioribus et paucioribus. VENAE distinctae. SORI lineares, ramosi, saepe confluentes.

Habitat locis umbrosis prov. Minas Geraes: Freyreiss, Pohl, Martius; prope Rio de Janeiro: Schott, Lady Callcott!, Tweedie!, Gardner 14!; in Buenos Ayres: Tweedie!, et ad Montevideo: D'Orbigny 62, Gibert 610. Item incolit Guatemalam et insulas Antillanas. — Vaga et Extrabrazil.

11. GYMNOGRAMME MYRIOPHYLLA SWARTZ: stipitibus fasciculatis gracilibus castaneis debilibus, frondibus mediocribus membranaceis teneris glandulosis breviter griseo-pubescentibus elongato-lanceolatis quadripinnatifidis, pinnis 15—25-jugis lanceolatis petiolatis, imis medias subaequantibus, pinnulis oblongo-lanceolatis, segmentis parvis dissectis contiguis inaequilateraliter oblongo-rotundatis, venis liberis in divisionibus ultimis medianis solummodo obviis, soris linearibus confluentibus.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 1. (pinna).

Gymnogramme myriophylla Swartz in Stockholm. Vet. Akad. Handl. 1817. p. 58. Hook. Sp. Fil. V. 134. Hook. et Baker, Syn. Fil. 383. Ettingsh. tab. 36. fig. 4.

Gymnogramme spectabilis Klotzsch Mss.

Hypolepis Sellowiana Klotzsch Mss. Fée, Gen. Fil. 147. Cheilanthes glandulosa Fée, Gen. Fil. 158.?

CAUDEX suberectus debilis, paleis nullis. STIPITES flexuosi, 6—12 poll. longi, sursum viscosi et juventute breviter pubescentes. LAMINA tenera, siccitate facile convoluta, modice viridis, utrinque praecipue infra viscoso-glandulosa et breviter griseo-pubescentis, 6—18 poll. longa, de-

orsum 3—6 poll. lata. RACHIS debilis, castanea, glanduloso-pubescentis. PINNAE subcontiguae, mediae et inferiores $1\frac{1}{2}$ —3 poll. longae, 6—12 lin. latae, vix petiolatae, ad costam usque pinnatae, imae laxiores medias subaequant. PINNULAE 6—12-jugae, contiguae, sessiles, oblongo-lanceolatae, obtusae, majores 4—6 lin. longae, 2—3 lin. latae, pinnatae vel profunde pinnatifidae, SEGMENTIS iterum pinnatifidis, lacinias linearibus. VENAE pinnatae, inconspicuae. SORI irregulares, in medio segmentorum saepe demum confluentes.

Habitat locis saxosis umbrosis prov. Minas Geraës ad Gongo Soco, Caldas etc.: Freyress, Pohl, Bunbury, Lindberg!; in prov. Bahia: Luschnath (teste Fée); prope Rio de Janeiro: Schott, Burchell 2215!, Miers 27!, Gardner 102! 5922! etc.; et in prov. S. Paulo: Burchell 3707! 3874!. — Dryas, Oreas.

12. GYMNOGRAMME INSIGNIS METTEN. stipitibus longissimis castaneis hispidis, frondibus chartaceis utrinque hispidis elongato-lanceolatis 3—4-pinnatifidis, rachibus flexuosis, pinnis ovato-lanceolatis obtusis laxis petiolatis, pinnulis inaequaliter ovatis obtusis, infimis breviter petiolatis pinnatifidis, segmentis obovatis pinnatifidis vel dentatis, venis liberis, soris linearibus.

Gymnogramme insignis Metten. Mss. ex Kuhn in Linnæa XXXVI. 70.

„RHIZOMA abbreviatum setis fuscis dense vestitum. FOLIA membranacea, rigidula, ubique hispidio-hirsuta. PETIOLUS ad 2 pedes longus, fuscus. RACHIS divaricata. LAMINA ad 15 poll. longa, 2— $3\frac{1}{2}$ poll. lata, oblongo-lanceolata, bipinnatisecto-pinnatifida. SEGMENTA primaria (pinnae nob.) distantia, petiolata, 3—4 poll. longa, ovato-oblongo-lanceolata, obtusa, reflexa, mox sursum falcata; secundaria (pinnulae nob.) petiolulata, patentissima vel subreflexa, inaequaliter ovata, obtusa, pinnatifida; laciniae paucae, obovatae, incisae, vel oblongae, infimae subsolutae, pinnatifidae, dentes marginati. NERVI ultimi sinus dentium aduentes. SPORANGIA setis intermixta, apicem nervorum non attingentia.“ (KUHNS loc. cit.)

Habitat in Serra Negra, in fine prov. Rio de Janeiro et Minas Geraës: St. Hilaire (non vid.). — Dryas.

§ 3. CEROPTERIS.

13. GYMNOGRAMME TRIFOLIATA DESV. stipitibus validis castaneis basi paleaceis, frondibus rigide chartaceis elongato-lanceolatis pinnatis, solemniter subtus pulvere ceraceo albo vel sulphureo obtectis, pinnis petiolatis imbricatis plerumque usque ad basin trifurcatis, pinnulis lineari-ligulatis subintegris, venulis confertis subparallelis, soris copiosis cito prorsus confluentibus.

Gymnogramme trifoliata Desv. Berlin. Mag. V. 305. Journ. Bot. I. 25. Kaulf. Enum. 72. Spreng. Syst. IV. 38. Hook. Gard. Ferns t. 4. Sp. Fil. V. 149. Ettingsh. tab. 39. fig. 3. 6. tab. 40. fig. 10.

Acrostichum trifoliatum Linn. Sp. Plant. 1527. Swartz, Syn. Fil. 13. Schkuhr, Fil. III. t. 3 et 22. Willd. Sp. Plant. V. 119.

Hemionitis trifoliata H.B.K. Nov. Gen. et Sp. I. 4.

Gymnogramme diphylla Klotzsch Mss.

Trismeria argentea, aurea et microphylla Fée, Gen. Fil. 165.

CAUDEX brevis, lignosus, suberectus. STIPITES fasciculati, basi fere crassitie digiti minoris, stricti, 8—12 poll. longi, deorsum PALEIS patentibus membranaceis brunneis lineari-subulatis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis dense vestiti. LAMINA utrinque viridis vel plerumque subtus pulvere, 1—4 pedes vel ultra longa, 4—6 poll. lata, tota pinnata. PINNAE contiguae, subhorizontaliter patentibus, breviter petiolatae, superiores simplices lineari-ligulatae, 3—4 poll. longae, 4—6 lin. latae, acutae vel subobtusae, marginibus subintegris leviter revolutis serrulato-crispulis, basi cuneatae, mediae

et inferiores usque ad basin 2- v. pleraeque 3-furcatae, pinnulis consimilibus, imae laxae et reductae. RACHIS stricta, nuda, castanea, antice profunde canaliculata; COSTA pinnularum gracilis, distincta; VENAE adscendentes, subparallelae, pleraeque bifurcatae. SORI lineares, demum totam faciem inferiorem pinnularum occupantes.

Habitat locis udis apricis prov. Minas Geraës: Langsdorff!, Pohl, Martius, Warming!; ad ripas fluv. Rio Doce: Princeps Neuwied; prope Rio de Janeiro: Glaziou 2430!; loco Brasiliae non indicato: Sello; in Uruguaya: Gibert 619!, et inde e Peruvia ad Guatemalam et Cubam. — Dryas, Oreas et Extrabras.

Obs. Plantam pulvere sulphureo praeditam e Brasilia nondum vidi.

14. GYMNOGRAMME CALOMELANOS KAULF. stipitibus gracilibus elongatis nudis solemniter castaneo-ebeneis, frondibus chartaceis oblongo-lanceolatis vel deltoideis glabris bipinnatis vel tripinnatifidis, subtus pulvere albo vel flavo vestitis, pinnis lanceolatis acutis breviter petiolatis basi inaequalibus, pinnulis lineari-lanceolatis acutis obtusisve laxis vel contiguis integris vel profunde pinnatifidis, venis inconspicuis subflabellatis, soris copiosis cito prorsus confluentibus.

Tabula nostra XXXV. Fig. 14—16. (pinnae).

Gymnogramme calomelanos Kaulf. Enum. Fil. 76. Kunze, Linnæa IX. 85. Mett. Fil. Hort. Lips. 41. Presl, Tent. 218. Hook. Gard. Ferns t. 50. Sp. Fil. V. 148. Splitg. Enum. Fil. Surin. 9. Ettingsh. t. 35. fig. 5., 36. fig. 6., 38. fig. 5—7. 14.

Acrostichum calomelanos Linn. Sp. Plant. 1529. Swartz, Syn. Fil. 15. Schkuhr, Fil. 4. t. 5. Langsd. et Fisch. Ic. Fil. t. 3., et Auctt.

Ceropteris calomelanos et distans Link, Sp. Fil. 141—2. Fée, Gen. Fil. 183.

Gymnogramme bidentata Presl, Rel. Haenk. 18. t. 2. fig. 3. Ettingsh. tab. 38. fig. 8—10.

CAUDEX suberectus, PALEIS lineari-subulatis vel subulatis ferrugineis membranaceis 2—3 lin. longis sursum sparse vestitis. STIPITES fasciculati, 6—12 poll. longi, prorsus castaneo-ebeneis. LAMINA supra obscure viridis, infra pulvere albo dense vestita, oblongo-lanceolata, 1—2 pedes longa, 6—12 poll. lata, tripinnatifida. PINNAE compositae 15—20-jugae, breviter petiolatae, plus minus adscendentes, lanceolatae, acutae, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneato-truncata, PINNULIS multijugis sessilibus, saepe laxis, inaequaliter lineari-lanceolatis, acutis, deorsum profunde pinnatifidis; inferiores 4—6 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. latae; imae mediis subaequales. RACHIS gracilis, stricta, castaneo-ebenea. VENAE segmentorum e costâ indistinctâ in dimidio inferiore subflabellatae, confertae, inconspicuae. SORI copiosi, in pulverem immersi, cito confluentes.

Var. β . TARTAREA Baker.

Gymnogramme tartarea Desv. Berl. Mag. V. 305. Kaulf. Enum. Fil. 75. Mett. Fil. Hort. Lips. 41. Hook. Sp. Fil. V. 148. Ettingsh. tab. 38. fig. 3. t. 39. fig. 10.

Acrostichum tartareum Cav. Praelect. 1801. n. 591. Swartz, Syn. Fil. 15.

Hemionitis dealbata Willd. Sp. Plant. V. 131. Hort. Berol. t. 40.

Ceropteris tartarea Link, Sp. Fil. 142. Fée, Gen. Fil. 183.

Gymnogramme dealbata Link. Hort. Berol. 253. Presl, Rel. Haenk. 18. t. 3. fig. 1.

Lamina minor oblongo-lanceolata, aegre ultra bipinnatam secta, pulvere albo dense vestita; rachis cum stipite castaneo-ebenea; pinnulae contiguae subintegrae saepe obtusae.

Var. γ . OCHRACEA Baker.

Gymnogramme ochracea Presl, *Rel. Haenk.* 17. *Tent.* 218.

Lamina oblongo-lanceolata bipinnata, subtus pulvere flavo tenuiter vestita, pinnulis linearibus acutis integris contiguis.

Var. δ . FARINOSA Baker.

Allosorus farinosus Kunze in *Schkuhr Fil. Suppl.* II. 5. tab. 103.

Gymnogramme ornithopteris et guianensis Klotzsch, *Linnaea* XX. 413.

Lamina subdeltoidea, rigide chartacea, 8—12 poll. longa, deorsum 5—6 poll. lata, subtus pulvere albo dense vestita. Stipites et rachis multo pallidiores, stramineo-ferruginei. Pinnae compositae 8—12-jugae, e basi ad apicem frondis sensim minores; imae maximae, subdeltoideae, 3—4 poll. longae, 15—18 lin. latae, pinnulis subcontiguis plerumque oblongo-ligulatis obtusis integris, marginibus revolutis, infimis profunde pinnatifidis.

Locis rupestribus umbris frequens per totam Americam tropicam, itemque in insulis Samoënsibus et Africae tropicae occidentalis nec non in terra Natalensi obvia. Indicamus solummodo stationes collectoresque principales intra Brasiliam. Typus in prov. S. Catharina: Fritz Müller! (forma pulvere subnullo); S. Paulo: Martius, Burchell!, Lindberg!; Rio de Janeiro: Raddi!, Gaudichaud!, Burchell 769!, Glaziou 252! 363!; Bahia: Blanchet 2511!; Minas Geraës: Freyreiss, Langsdorff, Regnell I. 470!; Goyaz et Piahy, c. gr. in Serra da Boa Vista: Mart. Hb. Fl. Bras. 188. — Var. β . prope Rio de Janeiro: Glaziou 1757!; ad Cajurú prov. S. Paulo: Regnell I. 470!; prope Goyaz: Burchell 7318!; ad ripas Rio Negro prov. do Alto Amazonas: Spruce 2969!. — Var. γ . in prov. S. Catharina: Fritz Müller 15! 253!; prope Rio de Janeiro: Miers!, Gardner 12!. — Var. δ . in Brasilia nondum observata in contermina Guyana britannica occurrit: Rich. Schomburgk 1154!. — Vaga et Extrabrazil.*

§ 4. SELLIGUEA.

15. GYMNOGRAMME ELONGATA Hook. stipitibus brevibus ebeneis, frondibus parvis coriaceis, praecipue subtus paleis minimis ferrugineis peltatis sparsis furfuraceis, anguste ligulatis integerrimis, e medio in basin et apicem sensim angustatis, venis in areolas angustas erecto-patentes copiose anastomosantibus, soris oblongis vel linearibus immersis utrinque secus costam verticaliter uniseriatis.

Gymnogramme elongata Hook. *Sp. Fil.* V. 157. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 387.

Grammitis elongata Swartz, *Syn. Fil.* 22. *Willd. Sp. Plant.* V. 140.

Synammia elongata Presl, *Tent.* 212.

Mecosorus elongatus Klotzsch, *Linnaea* XX. 406.

Polypodium elongatum Metten. *Polyp.* 88.

Grammitis lanceolata Schkuhr, *Fil.* 9. t. 7.

Gymnogramme squamulosa Splitg. *Enum. Fil. Surin.* 10.

Drynaria elongata et Prieurii Fée, *Gen. Fil.* 271.

CAUDEX firmus, $\frac{3}{4}$ —1 lin. crassus, longe repens, ferrugineo-tomentosus. STIPITES segregati, erecti, 6—12 lin. longi, nudi, superne e basi frondis decurrente alati. LAMINA obscure viridis, 4—9 poll. longa, 3—6 lin. lata. COSTA distincta, complanata, ebenea. VENAE graciles, immersae, erecto-patentes, areolis venularum venulas liberas paucas includentibus. SORI oblongi vel saepe confluentes et lineares, $\frac{3}{4}$ —1 lin. crassi, distincte immersi.

In arboribus et ad rupes prov. Piahy: Martius; Minas Geraës: Freyreiss; Rio de Janeiro: Raddi!, Gardner 192!, Milne, Mac Gillivray!, Glaziou 1170! 1734!, Burchell 1887!; praeterea in Guyana gallica (Leprieur), in batava (Spitgerber!, Kegel 883) et in terris inde e Peruvia ad Cubam. — Vaga et Extrabrazil.

Polypod.

XXV. ANTROPHYUM KAULF.

ANTROPHYUM Kaulf. *Enum. Fil.* 197. *Hook. et Bauer, Gen. Fil.* t. 109 A. *Fée, Mem. IV. Mett. Fil. Hort. Lips.* 25. *Hook. Sp. Fil.* V. 167. — *Antrophya genuina* Blume, *Fil. Jav.* 72. — *POLYTAENIUM* Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris.* VI. 218. *Hook. et Bauer, Gen. Fil. tab. 107.* — *SCOLIOSORUS* Moore, *Ind. Fil. p. XXIX.* — *LOXOGRAMME* Presl, *Tent.* 214, ex parte. — *Hemionitis* § ANTROPHYUM Presl, *Tent.* 220. — *ANETIUM* Splitg. *Enum. Fil. Surin.*

Indusium verum nullum. SORI dorsales, secundum venas decurrentes, lineares, irregulares, saepe plus minus distincte reticulati.

Tabula nostra XLIX. Fig. IV., L. Fig. II.

CAUDEX suberectus vel repens, herbaceus, RADICELLIS copiosis ferrugineo-tomentosis complicatis instructus. PALLEAE (ut in *Vittaria*) densae, griseae, lineari-subulatae, laxae cellulosae. STIPITES nulli vel breves, grisei, complanati, cum caudice continui. LAMINA carnosulo-membracea vel chartacea, prorsus nuda, simplex et integra, in speciebus nostris ligulato-linearis vel lanceolata, deorsum longe angustata. COSTA saepe prope basin frondis evanescens, sed in speciebus nostris plerisque distincta percurrentis. VENAE solemniter in areolas copiosas anguste hexagonas 2—4-plo longiores quam latas verticales vel obliquas anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis; in § *Polytaenio* venae primariae cum costa et margine parallelae, rectae, venulis brevibus horizontalibus conjunctae. SORI superficiales vel saepe profunde immersi, in § *Anetio* superficiales et in facie frondis extra venas copiose sparsi. — *Species 14, in utroque orbe per sylvas humidis ad arbores provenientes, vix Tropicos excedentes.*

Genus fructificatione ad *Hemionitidem* et *Selligueas* prope accedens, sed habitu facile recognoscendum; § *Anetium* soris *Acrosticho* simile sese habet.

CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM.

- § 1. POLYTAENIUM. Sori et venae primariae cum costâ et margine parallela 1. A. LINEATUM.
- § 2. EUANTROPHYUM. Venae in areolas anguste hexagonas anastomosantes. Sori subreticulati. — *Tabula nostra XLIX. Fig. IV.*
Lamina 4—8 lin. lata; areolae inter costam et marginem 3—4-seriatae 2. A. LANCEOLATUM.
Lamina 12—24 lin. lata; areolae inter costam et marginem 6—8-seriatae 3. A. CAYENNENSE.
- § 3. ANETIUM. Venae in areolas anguste hexagonas anastomosantes. Sori in facie frondis extra venas copiose sparsi. — *Tabula nostra L. Fig. II.* 4. A. CITRIFOLIUM.

§ 1. POLYTAENIUM.

1. ANTROPHYUM LINEATUM KAULF. frondibus subsilibus anguste ligulatis, e medio utrinque longe angustatis, costis percurrentibus, venis utrinque secus costam 3—4 rectis et cum costa perfecte parallelis, per venulas breves horizontales irregulariter conjunctis, soris rectis continuis parallelis profunde immersis.

Tabula nostra XXXIII. Fig. 20—22. (frondes).

Antrophyum lineatum Kaulf. Enum. Fil. 199. Fée, Antroph. 47. Hook. Sp. Fil. V. 175. Ettingsh. Farnkr. tab. 15. fig. 2. tab. 18. fig. 20. 21.

Hemionitis lineata Swartz, Prodr. 129.

Vittaria lanceolata Swartz, Syn. Fil. 109. Willd. Sp. Plant. V. 407. Schkuhr, Fil. t. 101.

Polytaenium lanceolatum Desv. Journ. Bot. I. 218.

CAUDEX crassus, herbaceus, breviter repens. PALAEAE densae, griseae, lineari-subulatae, denticulatae, laxae cellulosae, 2—3 lin. longae. FRONDES saturate virides, carnosulo-chartaceae, 4—15 poll. longae, 3—8 lin. latae, integerrimae, e medio ad basin et apicem acutum longe angustatae. COSTA distincta, percurrentis, sursum immersa, deorsum insculpta; VENAE quasi quoad laminam longitudinales. SORI secundum venas verticales per totam frondis longitudinem decurrentes, paralleli, profunde immersi, substantia folii utrinque involucri ad instar elevata.

Habitat ad arbores in sylvis humidis prov. Para: Martius; prov. Goyaz: Pohl; Minas Gerais e. gr. ad Caidas et Lagoa Santa: Lindberg 618!; Warming!; Regnell II. 1466!; Rio de Janeiro: Gardner 145!, Glaziou 454! 455! 1688! 2803!. Praeterea in terris inde ab Ecuador ad Mexicum et Cubam. — Vaga et Extrabras.

§ 2. EUANTROPHYUM.

(2.) ANTROPHYUM LANCEOLATUM KAULF. frondibus subsessilibus anguste ligulatis, e medio utrinque longe angustatis, costis percurrentibus, areolis venularum verticalibus inter costam et marginem 3—4-seriatis, 3—4-plo longioribus quam latis, soris superficialibus.

Antrophyum lanceolatum Kaulf. Enum. Fil. 198. Klotzsch, Linnaea XX. 416. Kunze, Linnaea XXIII. 213. Fée, Antroph. 50. Moore, Ind. Fil. 80. Hook. Sp. Fil. V. 176., non Blume.

Hemionitis lanceolata Linn. Sp. Plant. 1535 (excl. syn.). Swartz, Syn. Fil. 20. Schkuhr, Fil. 6. tab. 6 et 18. Willd. Sp. Plant. V. 127., et Auctt.

Antrophyum Féei Schaffn. Mss. Fée, Icon. Nouv. t. 22. fig. 1. *Asplenium plantagineum* Lam. Enc. II. 301.

CAUDEX breviter repens, RADICELLIS ferrugineo-tomentosis copiosis complicatis. PALAEAE densae, griseae, erectae, lineari-subulatae, laxae cellulosae, 1—1½ lin. longae. FRONDES membranaceo-carnosulae, saturate virides, prorsus nudaе, anguste ligulatae, apice acutae, 6—18 poll. longae, 4—8 lin. latae, flaccidae, pendulae. COSTA gracilis, distincta, grisea, tota paullum insculpta; VENAE graciles. SORI angusti, saepe paucis sporangiis compositi, secundum venas decurrentes, saepe reticulati.

Habitat in sylvis umbris ad arbores pendula in Guyana gallica: Leprieur; in batava: Kegel, et in terris inde e Columbia usque ad Mexicum et insulas Antillanas, in Brasilia probabiliter adhuc invenienda.

3. ANTROPHYUM CAYENNENSE KAULF. frondibus subsessilibus vel breviter petiolatis chartaceis lanceolatis praecipue deorsum angustatis, costis percurrentibus distincte exsculptis, areolis obliquis duplo longioribus quam latis, inter costam et marginem 6—8-seriatis, soris subsuperficialibus.

Tabula nostra XXXVII. Fig. 1—2. (frondes) et XLIX. Fig. IV. (analysis).

Antrophyum cayennense Kaulf. Enum. Fil. 192. Kunze, Anal. Pter. 30. tab. 19. fig. 2. Klotzsch, Linnaea XX. 416. Fée, Antroph. 47. Mett. Fil. Hort. Lips. 25. Hook. Sp. Fil. V. 171. Ettingsh. tab. 20. fig. 21. 23.

Hemionitis cayennensis Desv. Berlin. Mag. V. 311. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 216. Presl, Tent. 221.

Hemionitis reticulata Raddi, Syn. Fil. 37., non Forst.

Hemionitis reticulata β. *brasiliensis* Raddi, Fil. Bras. 8.

Hemionitis brasiliensis Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 216.

Antrophyum subsessile Kunze, Anal. 29. t. 19. fig. 1. Linnaea XXIII. 224. Fée, Antroph. 47. Hook. Sp. Fil. V. 171.

Antrophyum spathulatum Fée, Antroph. 46. t. 4. fig. 6.

Antrophyum discoideum Kunze, Bot. Zeitg. VI. 702. Fée, Antroph. 47.

CAUDEX breviter repens, RADICELLIS ferrugineo-tomentosis copiosis complexis. PALAEAE densae, erectae, griseae, lineari-subulatae, laxae cellulosae, dentatae, 2—3 lin. longae. STRIPITES subnulli (*A. subsessile* Kunze) vel 1—3 poll. longi, grisei, nudi, antice complanati, sursum per laminam decurrentem alati. LAMINA erecta, 6—15 poll. longa, 1—2 poll. lata, utrinque prorsus nuda, integra, acuta, e medio praecipue deorsum longe angustata. COSTA distincte exsculpta; VENAE graciles. SORI angusti, leviter immersi, saepe reticulati.

Habitat in sylvis umbris ad arbores prov. do Alto Amazonas et Para: Spruce 31! 2369!; Bahia, in sylvis prope Ilheos: Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 369!), Wawra et Maly 221, 387; prope Rio de Janeiro: Raddi, Gaudichaud!, Martius etc.; S. Catharina: Fritz Müller!. Praeterea frequens in terris Guyanensibus et e Peruvia ad Guatemalam et Cubam. — Vaga et Extrabrasit.

§ 3. ANETIUM.

4. ANTROPHYUM CITRIFOLIUM FÉE: frondibus subsessilibus vel breviter petiolatis, carnosulo-membranaceis, lanceolatis, praecipue deorsum longe angustatis, costis ad medium frondis vel supra evanescentibus, areolis obliquis, interioribus 2—3-plo longioribus quam latis, inter costam et marginem 6—10-seriatis, soris superficialibus praegracilibus secundum venas etiamque inter eas dispositis.

Tabula nostra L. Fig. II. (analysis).

Antrophyum citrifolium et pendulum Fée, Mem. IV. 51.

Acrostichum citrifolium Linn. Sp. Plant. 1513. Swartz, Syn. Fil. 9. Willd. Sp. Plant. V. 108.

Anetium citrifolium Splitg. Enum. Fil. Surin. 7. Moore, Ind. Fil. 72.

Hemionitis parasitica Linn. Sp. Plant. 1535.

Hemionitis spathulata Presl, Tent. 221.

Anetium Sprucei Hook. Mss. Moore, Ind. Fil. 72.

CAUDEX longe repens, herbaceus, crassitie pennae corvinae, RADICELLIS copiosis ferrugineo-tomentosis instructis. PALAEAE densae, griseae, lineari-subulatae, laxae cellulosae, 1½—2 lin. longae, denticulatae. STRIPITES segregati, nunc subnulli nunc 1—3 poll. longi, grisei, complanati, subnudi. LAMINA pendula, pallide viridis, integerrima, 6—24 poll. longa, 1—3 poll. lata, acuta vel subobtusata, deorsum longe angustata. COSTA deorsum gracilis, postice alata, ad medium frondis v. supra evanescens. VENAE pergraciles, distinctae; areolae exteriores interioribus multo minores, praecipue breviores. SORI in lineis praegracilibus secundum venas decurrentes et insuper inter venas irregulariter et leviter sparsi.

Habitat in sylvis humidis, ex arboribus pendula, in prov. do Alto Amazonas: Spruce 2368!; Para: Burchett 9749! 10101!, Spruce 45! 52! 274!, Graham!, et prope Ilheos prov. Bahiae (ex Mart. Hb. Fl. Bras. 369, 1). Praeterea in Guyana gallica (Leprieur!), in batava (Splitgerber, Kegel 1434!) et in terris inde e Columbia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Dryas, Najas et Extrabrasit.

XXVI. HEMIONITIS LINN.

HEMIONITIS Linn. Gen. Plant. 944. (ex parte). Swartz, Syn. Fil. 20. (ex parte). Willd. Sp. Plant. V. 126. (ex parte). Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 74 B. Hook. Sp. Fil. V. 191. (excl. Anetio). — HEMIONITIS § Hemionitis Presl, Tent. 221. — DICTYOCLINE Moorè, Gard. Chron. 1855. p. 854. Ind. Fil. p. LIX.

Indusium nullum. SORI dorsales, secundum venas omnes decurrentes, copiose et regulariter reticulati.

Tabula nostra L. Fig. 1.

CAUDEX erectus. STIPITES fasciculati, cum caudice continui, plerumque castanei vel eburnei, vestiti. FRONDES solemniter parvae, diffformes, vestitae, integrae vel simpliciter pinnatifidae vel pinnatae. COSTA percurrens, nunc evanescentis; VENAE primariae rectae (in § Dictyocline, extrabraziliensi, solum obviae), vel saepius omnes in areolas anguste hexagonas anastomosantes, venulis liberis inclusis nullis. SORI angusti demum plus minus confluentes. — Species 7, 4 Americae tropicae peculiariae, 1 in insulis Vitiensibus, reliquae in India orientali et Asia subtropica obviae.

1. HEMIONITIS PALMATA LINN. stipitibus fasciculatis castaneis tomentosis, frondibus papyraceo-herbaceis utrinque tomentosis palmatis quinquepartitis, divisionibus superioribus frondis fertilibus lanceolatis subpinnatifidis, frondis sterilibus brevioribus, costis castaneis evanescentibus, areolis venularum copiosis anguste hexagonis.

Tabula nostra L. Fig. 1. (analysis).

Hemionitis palmata Linn. Sp. Plant. 1535. Swartz, Syn. Fil. 20. Willd. Sp. Plant. V. 129. Schott, Gen. Fil. tab. 9. Hook. Exot. Fl. t. 53. Sp. Fil. V. 192.

Gymnogramme palmata Link, Fil. Hort. Ber. II. 49. Mett. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 213. Ettingsh. tab. 39. fig. 2. tab. 40. fig. 2—4.

CAUDEX erectus, PALIS lineari-subulatis membranaceis ferrugineis 1—1½ lin. longis sursum vestitus. STIPITES graciles, erecti, nitidi, frondis sterilibus 1—2, frondis fertilibus 4—9 poll. longi, toti pilis patentibus flavo-ferrugineis plus minus vestiti. LAMINA pallide viridis, utrinque pilis mollibus flavo-ferrugineis plus minus vestita; fertilibus 3—6 poll. longa et lata, segmento terminali lanceolato acuto, ad ¼ v. ½ latitudinis pinnatifido, lobis latis obtusis, basi utrinque profunde cuneata, divisionibus mediis terminalibus aequalibus sed basi haud angustata, basalibus minoribus subdeltoideis deflexis. Lamina sterilibus minor, divisionibus obtusis brevioribus. COSTAE graciles, castaneae, vix ultra dimidiam longitudinem divisionum attingentes; VENAE in areolas obliquas parvas anguste hexagonas inter costam et marginem 6—12-seriatis anastomosantes. SORI superficiales, angusti, secundum venas omnes decurrentes, copiose reticulati.

Habitat in prov. Bahia prope Cachoeira: Lieut. Carr!; in Guiana britannica: Appun 1682!; Rich. Schomburgk 1655, et in terris inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Dryas et Extrabraz.

XXVII. MENISCIUM SCHREB.

MENISCIUM Schreb. Gen. Plant. VIII. ed. II. 757. Swartz, Syn. Fil. 19. Willd. Sp. Plant. V. 133. Presl, Tent. 210. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 40. Hook. Sp. Fil. V. 162. — Phegopteridis spec. Metten. Fil. Ind. in Miq. Ann. Mus. Lugd.-Bat. I. 264.

Indusium nullum. SORI dorsales, oblongo-deltoidei, inter costam et marginem multiseriati.

Tabula nostra XLIX. Fig. III.

CAUDEX hypogaeus, firmus vel lignosus, suberectus vel breviter repens. PALEAE parvae, obscure brunneae, membranaceae. STIPITES erecti, stramineo-brunnei, elongati, stricti, basi cum caudice continui. FRONDES conformes vel raro parumper diffformes, chartaceae, nudae vel subnudaе, plerumque (in speciebus nostris omnibus) magnae vel mediocres, oblongo-lanceolatae, totae simpliciter pinnatae, PINNIS multijugis sessilibus ligulatis. COSTA percurrens; VENAE primariae copiosae e costâ ad marginem procurrentes, parallelae, exsculptae, venulis transversalibus regulariter arcuatim anastomosantibus (more Eunephronii), areolas copiosas inter costam et marginem multiseriatis formantibus, singulis venula unica libera centrali instructis. SORI in medium venarum brevium transversalium omnium impositi, secundum venas liberas breviter decurrentes. — Species 8—10 inter se arcte affines, praecipue americanae, vix Tropicos excedentes.

A Polypodii § Goniopteride, subgenere species multas habitu valde similes includente, solummodo soris oblongo-deltoideis differt.

CLAVIS SPECIERUM DESCRIPTARUM.

- Lamina fertilibus sterili minor, areolis pinnarum inter costam et marginem 4—8-seriatis 1. M. ANGUSTIFOLIUM.
- Lamina fertilibus sterili aequalis, areolis inter costam et marginem 10—20-seriatis.
 - Pinnae argute inciso-serratae 2. M. SERRATUM.
 - Pinnae subintegrae 3. M. RETICULATUM.

(1.) MENISCIUM ANGUSTIFOLIUM WILLD. frondibus oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis paullulum difformibus, pinnis 6—18-jugis anguste lineari-ligulatis acuminatis integris deorsum angustatis basi longe cuneatis; pinnis fertilibus angustioribus, areolis et soris 4—8-seriatis.

Menisium angustifolium Willd. Sp. Plant. V. 133. Presl, Tent. 211. Hook. Sp. Fil. V. 164. Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 687.

Phegopteris angustifolia Metten. Fil. Lechl. fasc. II. 22. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 242.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti minoris, breviter repens, PALIS linearibus membranaceis obscure brunneis 1½—2 poll. longis sursum sparse vestitus. STIPITES subsegregati, erecti, stricti, 6—18 poll. longi, straminei, basi brunnei, sparse paleacei. LAMINA sterilibus 1—2 pedes longa, 8—12 poll. lata, chartaceo-herbacea, supra glabra plene viridis, infra pallidior vel breviter et inconspicue griseo-pubescentis. RACHIS stricta, straminea, epaleacea, glabra vel inconspicue griseo-pubescentis. PINNAE subpatentes vel leviter adscendentes, subcontiguae, sessiles vel imae breviter petiolatae, 4—8 poll. longae, 6—9 vel raro 12 lin. latae, longe acuminatae, integerrimae, deorsum angustatae, basi longe cuneatae, imae mediis aequales. VENAE primariae erecto-patentes, subnitidae, leviter exsculptae, ¾—1 lin. distantes; areolae inter costam et marginem 6—12-seriatae. Frondes fertiles minores, pinnis 4—8 lin. latis, areolis et soris inter costam et marginem 4—8-seriatis. SORI cito confluentes.

Habitat in Guiana britannica (Appun 1894!) et in terris inde e Peruvia ad insulas Antillanas. Forte in Brasilia etiamdum detegitur.

2. *MENISCIMUM SERRATUM* Cav. frondibus oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis conformibus, pinnis 12—20-jugis vel ultra, ligulatis acutis v. acuminatis distincte inciso-serratis, deorsum paululum latioribus, basi late cuneatis, areolis et soris 12—20-seriatis.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 6. (pinnae pars).

Meniscium serratum Cav. Praelect. 1803. p. 548. Swartz, Syn. Fil. 19. Willd. Sp. Plant. V. 134. Presl, Tent. 211. Hook. Sp. Fil. V. 165. Splitg. Enum. Fil. Surin. 10.

Phegopteris serrata Metten. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 243.

Meniscium dentatum Presl, Del. Prag. I. 162. Tent. 211.

Meniscium palustre Raddi, Fil. Bras. 9. t. 20. Metten. Fil. Hort. Lips. 84. Ettingsh. Farnkr. t. 133. fig. 9.

Meniscium rostratum Fée, Gen. Fil. 224. t. 18. fig. 3.

Meniscium Jürgensii Fée, Gen. Fil. 225.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS paucis linearibus membranaceis brunneis sursum sparse vestitus. STIPITES subfasciculati, 1—3 pedes longi, stricti, validi, erecti, nudi, stramineo-brunnei. LAMINA chartacea, utrinque obscure viridis, glabra, 1—4 pedes longa, 9—18 poll. lata. RACHIS glabra, stricta, stramineo-brunnea. PINNAE plus minus adscendentes, sessiles vel imae breviter petiolatae, 4—9 poll. longae, 9—18 lin. latae. VENAE primariae plus minus adscendentes, prominulae, in medio pinnae 1—1½ lin. distantes; areolae inter costam et marginem 12—20-seriatae. SORI oblongo-deltaeidei, cito confluentes.

Habitat praecipue locis paludosis frequens per totam Brasiliam. In prov. do Alto Amazonas, ad ripas fluv. Yapurá et Rio Negro: Martius; ad Para: Burchell 9882!, Spruce 36!; in prov. Ceara: Gardner 1905!; Minas Geraës: Freyreiss, Bunbury!; Bahia: Blanchet 2450!, Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 357!); prov. Rio de Janeiro: Raddi, Burchell 1529!, Bowie et Cunningham!, Pohl, Gardner 15!, Glaziou 407!, et alii collectores; S. Catharina: Fritz Müller!. Praeterea per terras Guyanenses et inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Vaga et Extrabrazil.*

3. *MENISCIMUM RETICULATUM* SWARTZ: frondibus oblongo-lanceolatis vel deltaeideis simpliciter pinnatis conformibus, pinnis 1—20-jugis vel ultra, ligulatis vel ligulato-lanceolatis acutis v. acuminatis integris vel obsolete repandulis, basi late cuneatis, areolis et soris 10—25-seriatis.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 7—8. (pinnae) et XLIX. Fig. III. (analysis).

Meniscium reticulatum Swartz, Syn. Fil. 19. Schkuhr, Fil. 5. t. 5. Willd. Sp. Plant. V. 134. Presl, Tent. 211. Hook. Sp. Fil. V. 166. Ettingsh. tab. 133. fig. 11.

Polypodium reticulatum Linn. Sp. Plant. 1549.

Meniscium sorbifolium Willd. Sp. Plant. V. 134. Langsd. et Fisch. Ic. Fil. 6. t. 4. Ettingsh. tab. 134. fig. 8.

Asplenium sorbifolium Jacq. Coll. II. 106. t. 3. fig. 2.

Meniscium arborescens Willd. Sp. Plant. V. 133.

Meniscium Kapplerianum, Salzmanni et guyanense Fée, Gen. Fil. 223—4.

Meniscium falcatum Liebm. Mex. Bregn. 31.

Meniscium repandum et sessilifolium Pohl Mss.

Meniscium longifolium Klotzsch Mss. Ettingsh. tab. 129. fig. 5., tab. 133. fig. 10.

CAUDEX lignosus, saepe crassitie digiti, suberectus vel breviter repens, PALEIS obscure brunneis membranaceis linearibus paucis sursum vestitus. STIPITES subfasciculati, 1—3 pedes longi, straminei vel stramineo-brunnei, validi, stricti, nudi, glabri. FRONDES conformes. LAMINA chartacea, utrinque obscure viridis, glabra vel subtus inconspicue griseo-pubescens, 1—4 pedes longa, 12—24 poll. lata. PINNAE sessiles vel imae breviter petiolatae, plus minus adscendentes, plerumque subcontiguae, 6—12 poll. longae, 9—18 lin. latae, imae mediis subaequales. VENAE primariae plus minus adscendentes, distincte prominulae, 1—1½ lin. distantes; areolae inter costam et marginem 10—20-seriatae. SORI oblongo-deltaeidei, demum saepe confluentes.

Var. β . *MACROPHYLLUM* Baker.

Meniscium macrophyllum Kunze in Schkuhr Fil. Suppl. 93. tab. 44. Mart. Hb. Fl. Bras. n. 363. Hook. Sp. Fil. V. 166. Wawra, Maximil. Reise 208.

Lamina magis papyracea, glabra, oblongo-deltaeidea; pinnae pauciores, 1—6-jugae, latiores, 3—4 poll. latae, integrae, areolis inter costam et marginem 20—25-seriatis.

Habitat Filia frequentissima praecipue locis paludosis per totam Americam tropicam. Intra Brasiliae limites typus in prov. S. Catharina: Langsdorff; S. Paulo: Lindberg!; Rio de Janeiro: Burchell 2365!, Gardner 103!, Gaudichaud!, Glaziou 1169! 1747! 2375! etc.; Espiritu Santo et Bahia: Princ. Neuwied!, Blanchet 3984!; Minas Geraës: Martius!, Warming!, Regnell III. 1444!; Goyaz: Pohl!; Ceara: Gardner 1904!; Alto Amazonas: Spruce 1241! 1243!. — Var. β . ad Rio de Janeiro, Ilheos, et in Serra do Mar: Mart. Hb. Fl. Bras. 363!; atibi in prov. Bahia: Blanchet 2228! 2477!; ad Para: Spruce 32!.* — Vaga et Extrabrazil.

Obs. *M. giganteum* Metten. (Fil. Lechler. 19) verisimiliter varietatem alteram simplicifoliam magnam speciei antecedentis sistit. In Horto Kewensi saepe stirpes *M. macrophylli* vidi frondibus prorsus simplicibus et paucijugi-pinnatis ex eodem caudice oriundis simul instructas.

TRIBUS XI. ACROSTICHEAE.

SPORANGIA totam faciem inferiorem foliorum occupantes, receptaculis specialibus nullis.

CAUDEX plerumque lignosus, plus minus repens, saepe late scandens, raro herbaceus filiformis, nunquam arborescens. STIPITES cum caudice continui, nudi vel paleacei, breves vel elongati, griseo-straminei, raro castanei. FRONDES plerumque plus minus difformes, saepe integerrimae ligulatae vel lanceolatae (Acrostichi § Elaphoglossum), steriles interdum pinnatae pinnis late foliaceis, raro magis dissectae, fertiles integrae vel 1- vel interdum 2—4-pinnatae divisionibus ultimis convexo-cylindricis brevibus vel elongatis (Acrostichi §§ Polybotrya, Soromanes, Olfersia), in speciebus nostris nunquam utrinque soriferis. VENAE liberae, simplices vel pinnatae vel in paucis e nostris speciebus variemode anastomosantes. SPORANGIA super totam faciem inferiorem frondium fertile, vel raro pinnarum superiorum (A. aureum) dispersa, aut in Platycerio, genere Florae nostrae alieno, soros magnos distincte limitatos rotundatos vel irregulariter circumscriptos efformantes. — Species circa 150, pleraeque tropicae, perpauciae extra Tropicos obviae.

Genus unicum brasiliense XXVIII. ACROSTICHUM.

XXVIII. ACROSTICHUM LINN.

ACROSTICHUM Linn. Gen. n. 785. Swartz, Syn. Fil. 9. Willd. Sp. Plant. V. 100. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 81. Fée, Mem. Acrostich. 8 et 27. t. 1-24. Hook. Sp. Fil. V. 194. — GYMNOPTERIS Bernhardt in Schrad. Journ. 1801. II. 121. Presl, Tent. 242. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 85. Fée, Acrostich. 18 et 83. t. 43-6. — POLYBOTRYA Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Plant. V. 99. H.B.K. Nov. Gen. II. 28. t. 2. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 78 B. — LEPTOCHILUS Kaulf. Enum. 147. t. 1. fig. 10. — OLFERSIA Raddi, Op. Sci. Bologn. III. 28. t. 11. Presl, Tent. 232. (extens.). — ACONIOPTERIS Presl, Tent. 236. Fée, Acrost. 15 et 79. t. 40 et 42. — SOROMANES Presl, Tent. 237. Fée, Acrost. 16. 17 et 82. t. 43. — CAMPIDIUM Presl, Tent. 238. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 80 A. — POECILOPTERIS Presl, Tent. 241. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 81 B. — ELAPHOGLOSSUM, EGENOLFIA, RHIPIDOPTERIS et BOLBITIS Schott, Gen. Fil. — LOMARIOPSIS Fée, Acrost. 10 et 66. t. 25-33. — CHEILOLEPTON, NEUROCALLIS, HYMENODIUM, HETERONEURON et CHRYSODIUM Fée, Acrost. 19-22. — STENOCHLAENA J. Smith in Hook. Journ. Bot. III. 401. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 105. — PHOTILOPTERIS J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 155. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 92. — JENKINSIA Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 75. — LOMARIOBOTRYA Fée, Gen. Fil. 45. — PSOMIOPARPA Presl, Epim. 161. — CHEIROPLEURIA Presl, Epim. 189.

Characteres tribus.

CLAVIS SPECIERUM DESCRIPTARUM.

§ 1. ELAPHOGLOSSUM SCHOTT (= *Acrostichum* Fée): Lamina integerrima, lineari-ligulata vel lanceolata. Venae liberae, parallelae, simplices vel unifurcatae. — *Tabula nostra* L. Fig. III.

* Nudae. Lamina sterilis utrinque nuda vel subnuda, margine haud ciliato.

1. Lamina sterilis lanceolata vel oblongo-lanceolata, 3-4-plo longior quam lata.
 - Lamina sterilis 12-21 lin. lata . . . 1. A. CONFORME.
 - Lamina sterilis 2-3 poll. lata . . . 2. A. LINGUA.
2. Lamina sterilis lineari-lanceolata, utrinque e medio longe angustata, multoties longior quam lata.
 - a. Lamina sterilis subsessilis.
 - α. Stipites frondis fertis ebenei, 9-14 poll. longi.
 - 3. A. NIGRESCENS.
 - β. Stipites frondis fertis griseo-straminei, 1-4 poll. longi.
 - Lamina sterilis papyracea, 9-15 poll. longa, 12-18 lin. lata . . . 4. A. FLACCIDUM.
 - Lamina sterilis chartacea, 1½-3 pedes longa, 12-18 lin. lata . . . 5. A. HERMINIERI.
 - b. Lamina sterilis modice vel longe petiolata.
 - Lamina sterilis 3-12 lin. lata . . . 6. A. SIMPLEX.
 - Lamina sterilis 2-4 poll. lata . . . 7. A. LATIFOLIUM.

** Ciliatae. Lamina sterilis utrinque nuda vel subnuda, margine et saepe praeterea subtus ad costam paleis ciliata.

1. Paleae stipitis lineares vel subulatae.
 - Paleae caudicis firmas, subulatae, atro-castaneae; lamina sterilis 3-4-plo longior quam lata . . . 8. A. HYBRIDUM.
 - Paleae caudicis lineares, modice brunneae, crispatae; lamina sterilis 8-12-ies longior quam lata . . . 9. A. SCOLOPENDRIFOLIUM.
2. Paleae stipitis ovato-lanceolatae, 2-2½ lin. latae.
 - 10. A. DECORATUM.

*** Oligolepidae. Lamina paleis tenuiter vel sparse vestita.

1. Lamina sterilis chartaceo-coriacea.
 - a. Lamina sterilis parva, 1-3 poll. longa.
 - Caudex filiformis, longe repens, copiose ramosus . . . 11. A. OVATUM.
 - Caudex lignosus, vix repens . . . 12. A. SPATHULATUM.

Polypod.

b. Lamina sterilis 4-12 poll. longa.

Lamina sterilis lanceolato-ligulata, obtusa, 4-6-plo longior quam lata . . . 13. A. GARDNERIANUM.

Lamina sterilis anguste ligulata, e medio sensim angustata, 12-18-ies longior quam lata . . . 14. A. PACHYDERMUM.

2. Lamina sterilis membranacea vel papyracea.

a. Paleae frondis minutae, peltatae.

Paleae caudicis firmas, lineari-subulatae, castaneae. . . 15. A. VISCOSUM.

Paleae caudicis lineares, membranaceae, modice brunneae. . . 16. A. BURCHELLII.

b. Paleae frondis lineari-subulatae flavo-rufescentes. . . 17. A. ACROCARPUM.

c. Paleae frondis prorsus filiformes, castaneae vel ferrugineae.

α. Lamina fertis subsessilis . . . 18. A. AFODUM.

β. Lamina fertis longe petiolata.

Lamina sterilis membranacea, 4-8-plo longior quam lata, modice vestita . . . 19. A. VILLOSUM.

Lamina sterilis papyracea, 10-12-ies longior quam lata, sparse vestita.

Lamina sterilis 4-5 lin. lata, venis inconspicuis. . . 20. A. LINEARE.

Lamina sterilis 6-12 lin. lata, venis distinctis. . . 21. A. AUBERTII.

**** Polylepidae. Lamina subtus vel utrinque paleis dense vestita.

1. Lamina sterilis 6-12 lin. lata.

Paleae minutae, peltatae, adpressae . . . 22. A. TECTUM.

Paleae laxae, lineares, ferrugineae, imbricatae . . . 23. A. STRICTUM.

2. Lamina sterilis 12-24 lin. lata.

a. Lamina sterilis rigide chartacea.

Paleae minutae, adpressae, peltatae . . . 24. A. LAMINARIOIDES.

Paleae laxae, ferrugineae, lineares, leviter ciliatae, infra dense imbricatae . . . 25. A. MUSCOSUM.

b. Lamina sterilis papyraceo-herbacea.

Paleae rubro-ferrugineae in pilis stellatos prorsus dissectae . . . 26. A. AURICUM.

Paleae lanceolatae, flavo-ferrugineae, pleraeque adpressae, leviter ciliatae . . . 27. A. PERLEGANS.

Paleae lanceolatae, griseo-ferrugineae, insigniter plumoso-ciliatae, in facie inferiore frondis dense imbricatae . . . 28. A. SQUAMOSUM.

§ 2. LOMARIOPSIS FÉE: Lamina evoluta simpliciter pinnata. Venae pinnarum excusplatae, confertae, liberae, pleraeque simplices, raro unifurcatae. — *Tabula nostra* L. Fig. IV.

Species unica brasiliensis . . . 29. A. SORBIFOLIUM.

§ 3. POLYBOTRYA H.B.K. Laminae fertis et sterilis 2-4-pinnatae; venae pinnularum vel segmentorum copiose pinnatae liberae. — *Tabula nostra* L. Fig. V.

Lamina sterilis 2-pinnata, pinnulis distinctis 4-6-jugis . . . 30. A. ACUMINATUM.

Lamina sterilis 3-pinnatifida vel -pinnata, pinnulis distinctis 12-20-jugis; lamina fertis 2-pinnata, pinnulis elongatis . . . 31. A. CAUDATUM.

Lamina sterilis 4-pinnatifida vel -pinnata, pinnulis distinctis 12-20-jugis; lamina fertis 3-4-pinnata, divisionibus ultimis oblongis vel lineari-oblongis . . . 32. A. OSMUNDACEUM.

§ 4. RHIPIDOPTERIS SCHOTT: Lamina sterilis parva, in planta nostra flabellatim dissecta; venae in divisionibus medianae solummodo evolutae. Lamina fertis integra. — *Tabula nostra* L. Fig. VI.

Species unica brasiliensis . . . 33. A. PELTATUM.

§ 5. OLFERSIA RADDI: Venae pinnarum simplices, parallelae, confertae, apice venula distincta intramarginali conjunctae. — *Tabula nostra* LI. Fig. I.

Species unica brasiliensis . . . 34. A. CERVINUM.

§ 6. SOROMANES FÉE: Venae pinnarum in fasciculis regulariter pinnatae, venulis plerisque apice anastomosantibus. — *Tabula nostra LI. Fig. II.*

Species unica 35. A. CAENOPTERIS.

§ 7. GYMNOPTERIS PRESL.: Venae copiose anastomosantes; venae primariae ad $\frac{3}{4}$ latitudinis pinnarum vel ultra distinctae et parallelae. — *Tabula nostra LI. Fig. III.*

1. Lamina sterilis sursum pinnatifida, deorsum pinnata, pinnis plus minus distincte pinnatifidis . . . 36. A. ALIENUM.
2. Lamina sterilis tota simpliciter pinnata, pinnâ terminali distinctâ.
Pinnae integrae, 1—3 poll. latae; areolae copiose appendiculatae 37. A. NICOTIANAEFOLIUM.
Pinnae repando-serratae, 10—15 lin. latae; areolae exappendiculatae 38. A. SERRATIFOLIUM.

§ 8. CHRYSODIUM FÉE: Venae copiose anastomosantes, primariae (i. e. distinctae parallelae) nullae; areolae in speciebus nostris exappendiculatae. — *Tabula nostra LI. Fig. IV.*

- Caudex late scandens; pinnae 10—15 lin. latae, serratae; fertiles difformes 39. A. GUIANENSE.
- Caudex erectus; pinnae 1—3 poll. latae, integrae; fertiles subconformes 40. A. AURUM.

§ 1. ELAPHOGLOSSUM.

* Nudae.

1. ACROSTICHUM CONFORME SWARTZ: frondibus sterilibus modice vel longe petiolatis rigide chartaceis, utrinque nudis vel subtus sparse minute punctato-furfuraceis, lanceolatis, 3—4-plo longioribus quam latis, acutis, basi cito cuneatis vel paullulum rotundatis, venis plerisque conspicuis modice laxis, frondibus fertilibus longius petiolatis angustioribus sed aequilongis.

Acrostichum conforme Swartz, *Syn. Fil.* 10. et 192. t. 1. fig. 1. Willd. *Sp. Plant.* V. 107. Blume, *Fil. Jav.* 23. t. 5. Fée, *Acrost.* 30. Lowe, *Ferns* 7. t. 44. Hook. *Sp. Fil.* V. 198. *Ettingsh. Farnkr. tab.* 1. fig. 22. tab. 3. fig. 6.

Elaphoglossum conforme Schott, *Gen. Fil. sub tab.* 15. Moore et Houlst. *Gard. Mag. Bot.* III. 94. tab. 22. Moore, *Ind. Fil.* 353.

Acrostichum oblongum Desv. *Berlin. Mag.* V. 308.

Acrostichum angustatum Schrad. in *Goett. Gel. Anz.* 1818. p. 915.

Acrostichum laurifolium Thouars, *Fl. Trist. d'Accunha* 31. Fée, *Acrost.* 37. t. 7. fig. 1.

Acrostichum marginatum Wall. *Cat. n.* 17. Fée, *Acrost.* 31.

Acrostichum aplebium Kunze *Mss. Klotzsch, Linnaea* XX. 419.

Acrostichum vagans Mett. *Mss. Kuhn in Linnaea* XXXVI. 58.

Acrostichum alatum Fée, *Acrost.* 35. t. 5. fig. 2. (forma parva longe petiolata, dimidio superiore stiptitis e basi decurrente frondis anguste alato), et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. crassus, modice repens, PALEIS membranaceis brunneo-ferrugineis lanceolatis patentibus 2—3 lin. longis juvenute vestitus. STIPTES plus minus segregati, erecti, stricti, modice validi, nudi vel raro juvenute sparse paleacei, frondis sterilis 3—6, frondis sterilis 6—10 poll. longi. LAMINA sterilis pallide viridis, 3—6 poll. longa, 12—21 lin. lata, acuta vel subacuta, basi cito cuneata vel supra alam decurrentem stiptitis paullulum rotundata, margine cartilagineo distincto evenoso cincta. COSTA lata, complanata, straminea, nuda; VENAE pleraeque modice distinctae, haud exsculptae, leviter adscendentes, simplices vel unifurcatae, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. distantes. Lamina fertilibus minor, praecipue angustior, 3—6 poll. longa, 6—12 lin. lata.

Var. β . DISCOLOR Baker.

Acrostichum discolor Kuhn, *Linnaea* XXXVI. 53.

Acrostichum Spruceanum Fée *Mss., teste Kuhn.*

Stiptes et lamina subtus paleis minutis lanceolatis dilaceratis ferrugineis sparse vestita; lamina sterilis 3—6 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 9—12 lin. lata, basi in petiolum alâ decurrens.

Ad A. *Gardnerianum* accedens.

Habitat per regiones calidiores totius orbis, tum novi tum antiqui. Intra Brasiliam in regione maxime australi, loco tamen accuratius haud indicato: Tweedie!; circa Rio de Janeiro: Miers!; Glaziou 947! 2150! 2431! 2799!; in prov. Minas Geraes, ad Caldas et Lagoa Santa: Lindberg 539!, Regnell III. 1435! 1436!, Warming!. — Var. β . ad S. Gabriel da Cachoeira et prope Panuré ad Rio Uaupés, prov. do Alto Amazonas: Spruce 2245! 2309! 2869! — Typus speciei praeterea intra Americam per Guianas et inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas vagat. — Vaga et Extrabrazil.

2. ACROSTICHUM LINGUA RADDI: frondibus sterilibus modice vel longe petiolatis rigide chartaceis utrinque nudis oblongo-lanceolatis 3—4-plo longioribus quam latis, basi rotundatis vel late cuneatis, venis modice conspicuis et confertis, frondibus fertilibus longius petiolatis multo angustioribus saepe brevioribus.

Tabula nostra XXXVII. Fig. 9. (frons).

Acrostichum Lingua Raddi, *Fil. Bras.* 5. t. 14. fig. 4. *Desv. Ann. Linn. Soc. Paris.* VI. 208. Kunze, *Linnaea* IX. 27. Fée, *Acrost.* 33. *Gen. Fil.* 43. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 402. *Ettingsh. tab.* 3. fig. 3.

Olfersia Lingua Presl, *Tent.* 235.

Elaphoglossum Lingua Brack. *Fil. U. St. Am. Expl. Exped.* 74.

Acrostichum latifolium Hook. *Sp. Fil.* V. 202. (ex parte).

Acrostichum scandens Bory *Mss. Fée, Acrost.* 33.

Acrostichum Funckii Fée, *Acrost.* 36. tab. 6. fig. 1.

CAUDEX lignosus, $1\frac{1}{2}$ —3 lin. crassus, modice vel longe repens, juvenute PALEIS linearibus saturate brunneis membranaceis 2—3 lin. longis vestitus, cito calvescens. STIPTES segregati, stricti, nudi, straminei raro brunnei, frondis sterilis 2—8, frondis fertilibus 4—12 poll. longi. LAMINA sterilis pallide viridis, utrinque perfecte nuda vel sparse et inconspicue punctato-furfuracea, 5—9 poll. longa, 2—3 poll. lata, acuta vel subobtusata, basi late cuneata vel paullulum vel distincte rotundata, margine distincto cartilagineo evenoso instructa. COSTA valida, straminea, nuda; VENAE leviter adscendentes, modice conspicuae, aegre exsculptae, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertilibus anguste lanceolata, 4—6 poll. longa, 6—12 lin. lata.

Vix non varietas A. *latifolii* lamina brevior.

Habitat per totam Americam tropicam, inde e Peruvia ad insulas Antillanas. Intra Brasiliae limites in prov. S. Catharina: Fritz Müller 243!; S. Paulo: Burchett 3255!; Rio de Janeiro: Raddi, Gardner 97!, Sello!, Langsdorff!, Burchett 2261!, Glaziou 2152! etc. — Dryas, Oreas et Extrabrazil.

(3.) ACROSTICHUM NIGRESCENS HOOK. frondibus sterilibus subsessilibus rigidule chartaceis, utrinque nudis, anguste ligulatis 8—12-ies longioribus quam latis, acutis, dimidio inferiore ad basin sensim angustatis, venis distantibus distinctis conspicue intra marginem evanescentibus, frondibus fertilibus longe petiolatis quam steriles multo brevioribus et angustioribus.

Acrostichum nigrescens Hook. *Sp. Fil.* V. 214. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 400.

CAUDEX lignosus, suberectus, crassitie digiti minoris, paleis nullis. STIPITES fasciculati, frondis sterilis subnulli, fertis 9—14 poll. longi graciles stricti nudi subebeni. LAMINA sterilis 4—8 poll. longa, 5—8 lin. lata, apice cito angustata subacuta, deorsum e medio in alam angustam costularem sensim angustata, margine haud cartilagineo. COSTA gracilis, nuda, brunnea; VENAE distinctae, leviter exsculptae, plus minus adscendentes, simplices vel unifurcatae, extrorsum $\frac{1}{4}$ lin. distantes, distincte intra marginem evanescentes, apice clavellatae. Lamina fertis 2—3 poll. longa, 3 lin. lata, acuta, anguste ligulata.

Habitat in Guiana britannica: Rob. Schomburgk, in Brasilia amazonica forte detegenda.

4. ACROSTICHUM FLACCIDUM FÉE: frondibus sterilibus subsessilibus papyraceis omnino nudis, anguste ligulatis 8—10-ies longioribus quam latis, acutis, e medio utrinque longe angustatis, venis conspicuis distantibus plerumque vix exsculptis, fertilibus modice vel longe petiolatis multo brevioribus et angustioribus.

Acrostichum flaccidum Fée, *Acrost.* 37. t. 7. *Gen. Fil.* 43. *Klotzsch, Linnæa* XX. 420. *Hook. Sp. Fil.* V. 204. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 401.

Elaphoglossum flaccidum Moore, *Ind. Fil.* 356.

Elaphoglossum simplex Hook. et Bauer, *Gen. Fil.* t. 105 A.

Polypodium rigidum Aublet, *Guian.* 963! (v. s. in *Herb. Banks.*)

Acrostichum Lechlerianum Mett. *Fil. Lechl.* 3. (varietas caudice longius repente).

Elaphoglossum Miersii Heward *Mss.*

Acrostichum cartilagineum Mett. *Mss. ex Kuhn in Linnæa* XXXVI. 58.

CAUDEX lignosus, breviter repens, 2—3 lin. crassus, PALEIS linearibus obscure brunneis membranaceis patentibus $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis juventute vestitus. STIPITES subsegregati, nudi, stricti, griseo-straminei, frondis sterilis infra alam 6—12 lin., fertis 2—4 poll. longi. LAMINA sterilis tenuiter vel rigide papyracea, utrinque perfecte v. fere nuda, obscure viridis, siccitate saepe subbrunnea, 9—15 poll. longa, 12—18 lin. lata, e medio in apicem acutum et in basin aequaliter sensimque angustata, margine cartilagineo subnullo. COSTA griseo-straminea, modice valida, nuda; VENAE vix exsculptae modice conspicuae leviter adscendentes, simplices vel unifurcatae, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina sterilis multo minor, 4—6 poll. longa, 6—9 lin. lata, e medio utrinque longe et aequaliter angustata.

Var. β . PALLIDUM Baker.

Acrostichum pallidum Beyrich in herb. Kunze, teste Mettenio.

Lamina sterilis angustior, siccitate subbrunnea, 9—12 poll. longa, 9—12 lin. lata, venis modice conspicuis saepe 1 lin. distantibus; stipites frondium fertilibus multo longiores, 12—15 poll. longi, graciles, ebeni (ut in *A. nigrescente*), perfecte nudi.

Var. γ . OXYPHYLLUM Baker.

Acrostichum oxyphyllum Brongn. *Mss.*

Elaphoglossum oxyphyllum Moore, *Ind. Fil.* 362.

An *A. calophyllum* Kunze, *Linnæa* IX. 27?

Lamina sterilis tenuior, latior, papyracea, siccitate pallide grisea, 12—16 poll. longa, 18—24 lin. lata, venis magis exsculptis laxioribus saepe 1 lin. distantibus, margine distincto cartilagineo; frondes fertiles plantae typicae, stipite substramineo 6—7 poll. longo.

Habitat typus speciei per totam fere Americam tropicam, inde ab insulis Antillanis usque in Peruviam et Brasiliam australem. Intra Brasiliam in Serra dos Orgãos: Miers 11, teste Moore; prov. Bahia: Blanchet 3923!; ad arbores juata fluv. Tanau prov. Para, et in prov. do Alto Amazonas: Spruce 9*! 1770! 2309!. In Guiana gallica plantam legerunt: Leprieur! et Aublet!, et in Guiana anglica: Rob. Schomburgk 448!, Rich. Schomburgk, Appun 153!. — Var. β . in prov. Minas Geraes ad Caldas: Lindberg!, et ad S. Gabriel da Cachoeira prov. do Alto Amazonas: Spruce 2187!. — Var. γ . in Guiana gallica: Sagot 927!. — Vaga et Extrabrazil.

5. ACROSTICHUM HERMINIERI BORY: frondibus sterilibus subsessilibus rigide chartaceis, utrinque pallide viridibus nitidis plq. nudis, ligulato-ensiformibus 20—30-ies longioribus quam latis, e medio utrinque longe angustatis, venis immersis modice confertis, frondibus fertilibus breviter petiolatis lanceolatis 3—4-plo longioribus quam latis.

Acrostichum Herminieri Bory *Mss. Fée, Acrost.* 43. t. 11. *Gen. Fil.* 43. *Klotzsch, Linnæa* XX. 421. *Hook. Sp. Fil.* V. 216. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 402.

Elaphoglossum Herminieri Moore, *Ind. Fil.* 357.

CAUDEX lignosus, breviter repens, crassitie digiti, PALEIS linearibus membranaceis saturate ferrugineis 8—12 lin. longis patentibus dense vestitus. STIPITES perbreves, complanati, validi, straminei, nudi, paene ad basin alati. LAMINA sterilis utrinque nuda vel minute inconspicue ferrugineo-furfuracea, $1\frac{1}{2}$ —3 pedes longa, medio 12—18 lin. lata, margine cartilagineo distincto instructa. COSTA complanata, pallide straminea, nuda, deorsum valida; VENAE immersae, occultae, leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. Lamina fertis 3—5 poll. longa, 12—18 lin. lata, acuta, basi paullulum rotundata, stipite 1—2 poll. longo.

Habitat in prov. Bahia: Blanchet (teste Fée); in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 242!, Appun 187!, in gallica: Leprieur!, et in insulis Antillanis. — Dryas? et Extrabrazil.

6. ACROSTICHUM SIMPLEX SWARTZ: frondibus sterilibus modice petiolatis rigide chartaceis, utrinque omnino nudis, lineari-ligulatis 10—20-ies longioribus quam latis, e medio ad basin et apicem acutum longe angustatis, venis occultis modice confertis, frondibus fertilibus longius petiolatis similibus sed saepe minoribus.

Acrostichum simplex Swartz, *Fl. Ind. Occ.* 1587. *Syn. Fil.* 10. *Willd. Sp. Plant.* V. 100. *Klotzsch, Linnæa* XX. 421. *Fée, Acrost.* 36. *Hook. Sp. Fil.* V. 205. *Griseb. Fl. Brit. W.-Ind.* 676. *Ettingsh. tab.* 3. fig. 1.

Elaphoglossum simplex Schott, *Gen. Fil. sub t.* 15. *Moore, Ind. Fil.* 366.

Acrostichum brasiliense Spreng. *Mss. Kuhn in Linnæa* XXXVI. 54.

Acrostichum nudum Kunze *Mss. Klotzsch, Linnæa* XX. 422.

Acrostichum Gayanum Fée, *Acrost.* 37. t. 19. fig. 2.

Acrostichum affine Mart. et Gal. *Foug. Mex.* 24. t. 3. fig. 1.

Acrostichum unitum Bory *Mss. Fée, Acrost.* 44.

Olyeria nigrescens Klotzsch *Mss.*

Acrostichum minutum Pohl *Mss. Fée, Acrost.* 39. t. 10. fig. 3.

Acrostichum sp. indeterminata Ettingsh. *tab.* 1. fig. 19.

CAUDEX lignosus, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. crassus, modice repens. PALEAE ovato-lanceolatae, ferrugineo-brunneae, patentes, membranaceae, deciduae, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longae. STIPITES plus minus segregati, erecti, stricti, straminei, nudi vel raro juventute paleacei, frondis sterilis 1—2, fertis interdum 3—4 poll. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, 3—9 poll. longa, medio 6—12 lin. lata, margine distincto cartilagineo crenato instructa. COSTA nuda, griseo-straminea, complanata; VENAE occultae, leviter adscendentes, haud exsculptae, simplices vel unifurcatae, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. distantes. Lamina fertis minor, 4—6 poll. longa, 4—6 lin. lata, utrinque inde e medio longe angustata.

Var. β . MARTINICENSE Baker.

Tabula nostra XXXVII. *Fig.* 6. (frons parva).

Acrostichum martinicense Desv. *Berlin. Mag.* V. 309. *Fée, Acrost.* 45. t. 16. fig. 3. *Hook. Sp. Fil.* V. 218. *Ettingsh. tab.* 1. fig. 16.

Elaphoglossum martinicense Moore, *Ind. Fil.* 361.

Acrostichum glabellum Klotzsch, *Linnaea* XX. 421.

Elaphoglossum glabellum J. Smith in *Lond. Journ. Bot.* I. 197.

Acrostichum durum Kunze, *Linnaea* XXII. 575.

Acrostichum leptophyllum Fée, *Acrost.* 45. t. 17. fig. 1. *Hook. Sp. Fil.* V. 218.

Stipites frondis sterilis 1—4, fertilis 3—8 poll. longi; lamina sterilis crassior, rigide coriacea, 3—12 poll. longa, 2—9 lin. lata, margine interdum siccitate revoluta, e medio utrinque sensim angustata; lamina aequilata sed saepe brevior, venis omnino occultis.

Habitat typus in prov. Goyaz: Pohl; Rio de Janeiro: Gardner 95!; in Brasilia australi, loco accuratius non indicato: Langsdorff!, Sello!; in Guiana anglica (Rich. Schomburgk 1649), et in terris inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Var. β . in prov. Bahia: Blanchet 548; Minas Geraes ad Caldas: Lindberg 532!, Regnell II. 337!; Alto Amazonas: Spruce 1426! 2308!; in Guiana gallica (Leprieur) et in britannica (Rob. Schomburgk 447!, Appun 138!). — Vaga et Extrabrazil.

7. ACROSTICHUM LATIFOLIUM SWARTZ: frondibus sterilibus breviter vel modice petiolatis rigide chartaceis, utrinque nudis vel sparse minute punctato-furfuraceis, lanceolatis 4—6-ies longioribus quam latis, acutis, e medio ad apicem et basin sensim angustatis, venis modice conspicuis et confertis, frondibus fertilibus plerumque longius petiolatis similibus sed minoribus.

Tabula nostra XXXVI. Fig. 23. et XXXVII. Fig. 3. (frondes).

Acrostichum latifolium Swartz, *Syn. Fil.* 9. *Willd. Sp. Plant.* V. 105. *Hook. Fil. Exot.* t. 42. *Hook. Sp. Fil.* V. 202. (excl. syn. *A. Lingua*). *Ettingsh. Farnkr. tab.* 4. fig. 3.

Acrostichum scalpellum Mart. *lc. Crypt. Bras.* 86. *Fée, Acrost.* 82. t. 10. *Hook. Sp. Fil.* V. 200. *Ettingsh. tab.* 3. fig. 4. *tab.* 4. fig. 4.

Acrostichum callaefolium Blume, *Fil. Jav.* 22. t. 4. *Fée, Acrost.* 28. *Hook. Sp. Fil.* V. 196.

Acrostichum crassinerve Kunze, *Linnaea* XXIII. 213. *Fée, Acrost.* 29. *Love, Ferns* 6. *tab.* 57.

Acrostichum Schomburgkii Fée, *Acrost.* 32. *tab.* 8.

Acrostichum luridum Fée, *Acrost.* 35. t. 19.

Acrostichum alismaefolium Fée, *Acrost.* 28. t. 3.

Acrostichum consobrinum Kunze ex Mart. in *Regensb. Flora* 1839. *Beibl.* I. 44.

Acrostichum andicola Fée, *Acrost.* 28. t. 2. fig. 1., et synonyma multa alia.

CAUDEX lignosus, 2—4 lin. crassus, breviter repens, paleis linearibus membranaceis patentibus modice brunneis 2—3 lin. longis juventute dense vestitus. STIPITES subfasciculati vel paullulum segregati, erecti, stricti, straminei vel raro brunnei, nudi vel raro sparse paleacei, frondis sterilis 1—12, fertilis 4—12 poll. longi. LAMINA sterilis rigide chartacea, pallide viridis, siccitate grisea, 6—18 poll. longa, 2—3 vel raro 4 poll. lata, margine distincto cartilagineo instructa. COSTA valida, griseo-straminea, nuda vel raro sparse furfuracea; VENAE leviter adscendentes, aegre vel leviter exsculptae, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertilis lanceolata, utrinque longe angustata, 4—12 poll. longa, 1—2 poll. lata.

Var. β . RUBICUNDUM Baker.

Acrostichum rubicundum Pohl *Mss. Ettingsh. l. c. t. 3. fig. 2.*

Textura omnino plantae typicae, sed lamina (6—9 poll. longa, 15—18 lin. lata) apice subobtusata v. rotundata, deorsum e medio sensim angustata, stipites frondis sterilis subnulli vel 4—6 poll. longitudine attingentes.

Var. γ . BLANCHETHI Baker.

Acrostichum Blanchethii Mett. *Mss. ex Kuhn in Linnaea* XXXVI. 55.

Paleae ovato-lanceolatae, fuscae, ciliatae; lamina sterilis pallidior, minus rigide chartacea, acuminata, 10—12 poll. longa, 8—12 lin. lata, subtus ad costam paleis paucis minutis dilaceratis adpressis squamulosa; lamina fertilis 6 poll. longa, 6 lin. lata.

Habitat typus speciei per totam Americam tropicam et subtropicam itemque in Asia tropica. Intra Brasiliae fines observata est in prov. do Alto Amazonas: Martius, Spruce!; Goyaz: Gardner 4079; Minas Geraes: Stephan!, Regnell III. 1435*!; Bahia: Blanchet 3922!, e. gr. ad Itheos: Luschnath! (*Mart. Hb. Fl. Bras.* 362!); Rio de Janeiro: Burchell 2069!, Glaziou 948! 2151!; S. Paulo: Burchell 3630/32!; S. Catharina: Fritz Müller 244!. — Var. β . in prov. Goyaz: Pohl!; ad Caldas prov. Minarum: Regnell III. 1437!. — Var. γ . in prov. Bahia: Blanchet 3923; Minas Geraes ad Caldas: Lindberg 534!. — Vaga et Extrabrazil.

Obs. Planta exstat in herb. Martii a cl. GLAZIOU in vicinia Rio de Janeiro lecta, sub n. 2434 missa, quae probabiliter speciem novam hujus affinitatis sinit. Lamina gaudet sterili tenuiter membranacea, plene viridi, omnino nuda, elongato-lanceolata, 2 ped. longa, $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ poll. lata, e medio utrinque longe angustata, stipite nudo griseo tenero 7—9 poll. longo. Laminam fertile, paleas et caudicem nondum vidimus.

** Ciliatae.

8. ACROSTICHUM HYBRIDUM BORY: paleis caudicis subulatis firmis atro-castaneis, stipitibus mediocribus gracilibus paleis squarrosis vel patentibus subulatis atro-castaneis deciduis sparse vestitis, frondibus sterilibus papyraceo-chartaceis utrinque nudis vel subtus ad costam ciliatis, lanceolatis 3—4-plo longioribus quam latis, acutis v. acuminatis, basi rotundatis, marginibus paleis iis stipitis similibus sed minoribus plus minus ciliatis, venis laxis modice conspicuis, frondibus fertilibus consimilibus sed multo minoribus.

Tabula nostra L. Fig. III. (analsis).

Acrostichum hybridum Bory, *Voyage Afriq.* III. 96. *Swartz, Syn. Fil.* 11. *Willd. Sp. Plant.* V. 107. *Hook. et Grev. Ic. Fil.* t. 21. *Fée, Acrost.* 40. t. 9. fig. 4. *Hook. Sp. Fil.* V. 210. *Ettingsh. t. 4. fig. 6.*

Acrostichum ciliare Pet. *Thouars, Fl. Tristan d'Accunha* 32. *Carmich. in Linn. Soc. Transact.* XII. 510.

Acrostichum villosum Sieber, *Syn. Fil.* 27., non Swartz.

Acrostichum ciliatum Desv. *Berlin. Mag.* V. 310.

Acrostichum Lindbergii Metten. *Mss. in Herb. Kew. Kuhn, Linnaea* XXXVI. 16.

Olfersia hybrida Presl, *Tent.* 235. t. 10. fig. 13.

Elaphoglossum hybridum Moore, *Ind. Fil.* 358.

An satis differunt *A. melanopus* Kunze *Linnaea* XXIII. 214. *Metten. Fil. Hort. Lips.* 19. t. 1. fig. 10—12. et *A. stramineum* Metten. *Ann. Sc. Nat.* V. Ser. II. 200?.

CAUDEX suberectus, lignosus, paleis densis 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES graciles, erecti, stricti, straminei, subfasciculati, frondium fertile et sterile 4—8 poll. longi, paleis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis sparsis. LAMINA sterilis pallide viridis, 4—9 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. lata, paleis marginalibus $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longis. COSTA straminea, nuda vel subtus paleis paucis iis stipitis similibus ciliata; VENAE leviter adscendentes, distinctae, leviter exsculptae, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertilis anguste lanceolata, 2—4 poll. longa, 8—12 lin. lata.

Var. β . MINOR Baker.

Acrostichum Lindeni Hook. Sp. Fil. V. 223., quoad plantam Brasiliensem, sed vix Boryanam.

Minor; lamina sterilis 3—3½ poll. longa, 1 poll. lata, subtus ad costam totam paleis iis stipitis similibus ciliata, fertilis 12—18 lin. longa, 6—8 lin. lata; stipites graciles, 3—4 poll. longi, sparse paleacei.

Varietas ad *A. Lindeni* (quoad plant. Boryanam) accedens, sed textura et venatione magis cum *A. hybrido* congruit.

Typus speciei intra Brasiliam observatus est in prov. S. Paulo: Burchell 5152!; ad Rio de Janeiro: Gaudichaud; et in rupibus sylvaticis ad Caldas prov. Minas Geraës: Lindberg 537! Praeterea incolit insulas Tristan d'Accunha, Mascarenas et continentem Africam tropicam. — Var. β . in Serra dos Orgãos ad rupes cacuminis: Gardner 5925!. — *Dryas*, *Oreas* et *Extrabrazil*.

9. ACROSTICHUM SCOLOPENDRIFOLIUM RADDI: paleis caudicis linearibus modice brunneis membranaceis crispatis, stipitibus mediocribus paleis consimilibus vel subulatis atro-castaneis vestitis, frondibus papyraceis utrinque praeter costas nudis ligulatis 8—12-ies longioribus quam latis utrinque longe angustatis marginibus dense ciliatis, venis laxis modice conspicuis, frondibus fertilibus lanceolatis multo minoribus.

Acrostichum scolopendrifolium Raddi, Fil. Bras. 4. t. 16. (excl. syn.) Link, Sp. Fil. 149. Fée, Acrost. 42. Lowe, Ferns 7. t. 45. Hook. Sp. Fil. V. 211.

Elaphoglossum scolopendrifolium J. Smith, Bot. Mag. 1846. App. 17.

Olfersia scolopendrifolia Presl, Tent. 235.

Acrostichum fimbriatum Cav. Ann. Nat. Hist. 1. 1028?.

Acrostichum erinaceum Fée, Acrost. 41. Klotzsch, Linnaea XX. 420.

Acrostichum Hystrix Kunze, Linnaea IX. 26. Fée, Acrost. 45. Hook. Sp. Fil. V. 212.

CAUDEX lignosus, suberectus, PALEIS densis 3—6 lin. longis. STIPITES subfasciculati, stricti, straminei, 1—6 poll. longi, paleis patentibus vel squarrosis modice vel saturate brunneis 2—3 lin. longis plus minus copiosis. LAMINA sterilis utrinque pallide vel obscure viridis, siccitate saepe obscure brunnea, 9—24 poll. longa, 1½—3 poll. lata, acuta, e medio utrinque longe angustata, basi cuneata vel paullulum rotundata, marginibus paleis iis stipitis similibus sed multo minoribus dense ciliatis. COSTA subtus paleis iis stipitis similibus plus minus ciliata; VENAE leviter adscendentes, modice conspicuae, extrorsum ¾—1 lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertilis lanceolata, 3—6 poll. longa, 12—18 lin. lata.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas: Regnell III. 1438!; ad Lagoa Santa (forma venis multis anastomosantibus): Warming!; circa Rio de Janeiro, in Serra dos Orgãos etc.: Raddi!, Douglas!, Miers 16, Glaziou 950! 2059! 2436!. Praeterea in Guiana batava (Hostmann 1082!) et in terris inde et Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — *Dryas*, *Oreas* et *Extrabrazil*.

(10.) ACROSTICHUM DECORATUM KUNZE: stipitibus mediocribus paleis magnis ovato-lanceolatis brunneis membranaceis integris dense vestitis, frondibus sterilibus chartaceis elongato-lanceolatis 4—6-ies longioribus quam latis, utrinque nudis, apice acutis subobtusisve, basi rotundatis vel late cuneatis, margine paleis parvis orbiculatis imbricatis dense ciliatis, venis modice confertis et conspicuis, frondibus fertilibus similibus sed minoribus.

Polypod.

Acrostichum decoratum Kunze, Linnaea IX. 25. Analect. Pter. 9. t. 6. Fée, Acrost. 27. t. 22. fig. 4. Hook. Sp. Fil. V. 195. Hook. et Baker, Syn. Fil. 404.

Olfersia decorata Presl, Tent. 235.

Elaphoglossum decoratum Moore, Ind. Fil. 355.

CAUDEX crassitie digiti, breviter repens, lignosus, PALEIS linearibus plene brunneis membranaceis crispatis patentibus densis 6—9 lin. longis vestitis. STIPITES erecti, griseo-straminei, 4—8 poll. longi, paleis 3—4 lin. longis 2—2½ lin. latis patentibus acutis vel subobtusis. LAMINA sterilis siccitate brunnea, utrinque omnino nuda, 9—18 poll. longa, 3—4 poll. lata, paleis marginis membranaceis brunneis obtusis ⅓—½ lin. longis. VENAE leviter adscendentes, modice conspicuae, leviter exsculptae, extrorsum ⅓—½ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertilis sterili omnino similis, aequaliter petiolata sed minor, in speciminibus nostris 9—12 poll. longa, 2—2½ poll. lata.

Habitat in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1647!, in Peruvia et insulis Antillanis, in Brasilia forte adhuc invenienda.

*** Oligolepidae.

11. ACROSTICHUM OVATUM HOOK. caudice filiformi copiose ramoso, frondibus sterilibus distincte petiolatis chartaceis utrinque minute sparse ferrugineo-furfuraceis, ovato-oblongis obtusis nondum 2-plo longioribus quam latis, basi late cuneatis, venis distantibus immersis, frondibus fertilibus longius petiolatis similibus saepe paullulum majoribus.

Acrostichum ovatum Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 140. Fée, Acrost. 52. t. 14. fig. 7. Gen. Fil. 43. Hook. Sp. Fil. V. 228. Hook. et Baker, Syn. Fil. 408.

Elaphoglossum ovatum Moore, Ind. Fil. 362.

Acrostichum rhabdolepis Fée, Gen. Fil. 42. t. 1. fig. 1.

Acrostichum ramosissimum Fée, Acrost. 53. tab. 22. fig. 3. Etlingsh. tab. 2. fig. 6—9.

Acrostichum crispatum Fée, Mem. VI. 2. tab. 1. fig. 2.

Acrostichum nanum Liebm. Mex. Bregm. 19.

CAUDEX late repens, ramis divaricatis, PALEIS linearibus vel subulatis ferrugineis patentibus 1—1½ lin. longis vestitis. STIPITES distincte segregati, firmi, grisei, paleis piliformibus brevibus patentibus ferrugineis deciduis plus minus vestiti, frondis sterilis 3—6 lin., fertilis 12—18 lin. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, siccitate grisea, utrinque paleis minimis linearibus ferrugineis sparse furfuracea, demum calvescens, 6—9 lin. longa, 3—6 lin. lata. COSTA grisea, immersa, deorsum subtus leviter exsculpta; VENAE laxae, immersae, erecto-patentes, pleraequae simplices.

Habitat ad arbusculas in sylvis prope cacumen Serra dos Orgãos: Gardner 5923!; praeterea in Columbia et Mexico. — *Dryas* et *Extrabrazil*.

12. ACROSTICHUM SPATHULATUM BORY: caudice lignoso suberecto v. breviter repente, frondibus sterilibus distincte petiolatis coriaceo-herbaceis utrinque paleis piliformibus ferrugineo-castaneis prorsus vestitis, perparvis oblongo- vel lanceolato-spathulatis 2—6-ies longioribus quam latis, obtusis, basi cuneatis, venis laxis immersis inconspicuis, frondibus fertilibus longius petiolatis aequalibus 2—3-plo brevioribus.

Acrostichum spathulatum Bory, Voyage Afr. I. 363. t. 20. fig. 1. Swartz, Syn. Fil. 10. Willd. Sp. Plant. V. 106. Fée, Acrost. 51. t. 14. fig. 3. Hook. et Baker, Syn. Fil. 408.

Olfersia spathulata Presl, Tent. 233.

Elaphoglossum spathulatum Moore, Ind. Fil. 14. Beddome, Fil. South-Ind. t. 213.

Acrostichum ciliare Thouars, *Fl. Tristan d'Accunha* 32.
Acrostichum spathulatum Raddi, *Fil. Bras.* 3. t. 15. fig. 2.
Acrostichum Raddii et *tenellum* Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris.* VI. 209—210.

Acrostichum Raddianum Hook. et Grev. *Ic. Fil.* t. 4.
Acrostichum piloselloides Presl, *Rel. Haenk.* 14. t. 2. fig. 1.
Fée, Acrost. 51. t. 14. fig. 6. *Hook. Fil. Exot.* t. 29. *Hook. Sp. Fil.* V. 227. *Ettingsh. tab.* 2. fig. 12—15.
Acrostichum Jamesoni Hook. et Grev. *Ic. Fil.* t. 86. *Ettingsh. tab.* 2. fig. 10—11.

Acrostichum Pilosella Spreng. *Syst. Veg.* IV. 34.
Acrostichum pumilum Mart. et Gal. *Foug. Mex.* 23. t. 2. fig. 2.
Acrostichum horridulum Kaulf. *Enum.* 58. *Fée, Acrost.* 52. t. 14. fig. 4., et *synonyma multa alia.*

CAUDEX crassitie pennae corvinae. STIPITES fasciculati, substraminei, PALEIS piliformibus firmis ferrugineo-castaneis patentibus inaequalibus $\frac{1}{2}$ —1 lin. longis dense vestiti, frondis sterilis $\frac{1}{2}$ —2, fertilis 1—3 poll. longi. LAMINA sterilis 1—3 poll. longa, 3—6 lin. lata; COSTA immersa, dense ciliata; VENAE erecto-patentes, pleraeq. simplices. Lamina fertilis oblongo-rotundata, 6—12 lin. longa, 3—6 lin. lata.

Habitat locis umbrosis intra Brasiliam, praecipue in provinciis mediis. In prov. Goyaz: Burchell 6727!, e. gr. ad Arrajas: Gardner 4078!; Bahia: Claussen 253; Minas Geraës ad Caldas: Regnell III. 1434!; Rio de Janeiro: Raddi!, Gaudichaud!, Sello!, Glaziou 946! 2440!. Praeterea in terris inde e Peruvia ad Cubam et Mexicum, itemque per regiones calidiores veteris orbis late dispersa. — Dryas, Oreas et Extrabrazil.

13. ACROSTICHUM GARDNERIANUM KUNZE: stipitibus paleis mediocribus patentibus lanceolatis pallide ferrugineis dense vestitis, frondibus sterilibus breviter petiolatis rigide chartaceis, praecipue subtus paleis minutis lanceolato-subulatis fimbriatis pallide ferrugineis modice vestitis, ligulato-lanceolatis obtusis 4—6-ies longioribus quam latis, venis distinctis modice laxis, frondibus fertilibus aequae longis angustioribus, stipitibus multoties longioribus.

Tabula nostra XXXVII. Fig. 7. (frons).

Acrostichum Gardnerianum Kunze *Mss. Fée, Acrost.* 55. *tab.* 15. fig. 3. *Gen. Fil.* 43. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 405. *Ettingsh. tab.* 1. fig. 20.

Acrostichum Gardneri Hook. *Sp. Fil.* V. 233.
Elaphoglossum Gardnerianum Moore, *Ind. Fil.* 357.
Elaphoglossum intermedium Brack. *Fil. U. St. Am. Expl. Exped.* 69.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, lignosus, PALEIS membranaceis linearibus castaneis patentibus 3—6 lin. longis dense vestitis. STIPITES subfasciculati, erecti, straminei, paleis membranaceis 1 lin. longis, frondis sterilis 6—24 lin., fertilis 3—5 poll. longi. LAMINA sterilis utrinque pallide viridis, siccitate grisea, 4—6 poll. longa, 9—12 lin. lata, basi late cuneata, marginibus per magnam longitudinis partem subparallelis, incrassatis, anguste cartilagineis, evenosis. VENAE leviter ascendentes, paullulum exsculptae, extrorsum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertilis 4—6 poll. longa, 4—6 lin. lata, subobtusata.

Ad A. conforme inter *Nudas* habitu et texturâ accedit.

Habitat ad arbores in sylvis umbrosis prov. Para: Spruce!; in prov. Minas Geraës ad Caldas: Regnell!, Lindberg 533!; Rio de Janeiro, Serra dos Orgãos: Gardner 93!, Brackenridge!, Miers 18!, Glaziou 2439!. Item incolit Novam Granatam (Lindig!). — Vaga et Extrabrazil.

14. ACROSTICHUM PACHYDERMUM FÉE: frondibus sterilibus modice petiolatis rigide chartaceis utrinque paleis piliformibus nigrescentibus stellatis sparse vestitis, anguste ligulatis 12—18-ies longioribus quam latis, e medio longe angustatis, marginibus siccitate revolutis, frondibus fertilibus similibus sed minoribus longiusque petiolatis.

Acrostichum pachydermum Fée, *Acrost.* 47. *Gen. Fil.* 43. *Kunze, Linnaea* XXII. 575. *Hook. Sp. Fil.* V. 221.
Elaphoglossum pachydermum Moore, *Ind. Fil.* 211.

Plantam ipsam nondum vidi, igitur descriptionem cl. FÉÉ loc. cit. repeto: „FRONDBUS linearibus, firmis, coriaceis, spissis, sterilibus utrinque acutis, basi angustissime decurrentibus, margine revolutis, squamis (PALEIS nob.) piliformibus stellatis in duabus laminis sitis, mesoneuro supra canaliculato, infra plano, quadrangulari, apice frondis acuto, petiolis robustis, basi nigrescenti endosa squamosaque; fertilibus minoribus; RHIZOMATE crasso, squamis lanceolatis laceris fulvo-pallidis; SPORANGIIS ovoideis subrotundisque, pedicello longiusculo; SPORIS obscure ovoideis, episporio opaco granulato vestitis.“ — Dimensiones: frondes steriles 34—36 cent. lg.; petiolo vix tertiam partem hujus longitudinis aequante, 17—18 millim. latae. Planta dura crassa coriacea opaca rigida, margine convoluto et basi decurren-te. Utraque pagina paleas exhibet piliformes, sparsas et in stellulis nigricantibus dispositas.

Habitat in prov. Minas Geraës, secundum specimen herbarii A. Richard (teste Fée).

15. ACROSTICHUM VISCOSUM SWARTZ: stipitibus brevibus vel elongatis, subnudis vel minute adpresse furfuraceis, frondibus sterilibus papyraceis utrinque inconspicue adpresse furfuraceis et interdum viscoso-punctatis demum subnudis, elongato-ligulatis 8—12-ies longioribus quam latis, e medio sensim angustatis, venis conspicuis modice laxis, frondibus fertilibus multo angustioribus et brevioribus saepe longius petiolatis.

Tabula nostra XXXVII. Fig. 8. (frons).

Acrostichum viscosum Swartz, *Syn. Fil.* 10. 193. *Willd. Sp. Plant.* V. 103. *Hook. et Grev. Ic. Fil.* t. 61. *Blume, Fl. Jav.* 27. *Fée, Acrost.* 45. *Hook. Sp. Fil.* V. 220. *Ettingsh. tab.* 1. fig. 15., *tab.* 2. fig. 1.

Elaphoglossum viscosum Schott, *Gen. Fil.* *tab.* 15. *J. Smith, Hook. Journ. Bot.* IV. 148. *Beddome, Fil. South-Ind.* t. 196.

Acrostichum Blumeianum Fée, *Acrost.* 62.
Acrostichum lancifolium Desv. *Berlin. Mag.* V. 310.
Acrostichum neriofolium Wall. *Cat. n.* 16.
Acrostichum petiolatum Swartz, *Fl. Ind. Occ.* III. 1588.
Acrostichum salicifolium Willd. *Mss. Kaulf. Enum. Fil.* 58. *Ettingsh. tab.* 1. fig. 21., et *synonyma multa alia.*

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS lineari-subulatis firmis patentibus atro-castaneis densis $\frac{1}{2}$ —3 lin. longis vestitis. STIPITES graciles, subsegregati, griseo-straminei, frondis sterilis 1—12, fertilis 2—12 poll. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, utrinque praecipue subtus paleis minutis pilosis vel peltatis profunde fimbriatis griseo-ferrugineis subinconspicuis sparse furfuracea et interdum sed non semper minute viscoso-punctata, 6—12 poll. longa, 6—18 lin. lata, acuta, basi cuneata, margine non distincte ciliato, interdum siccitate subrevoluto. COSTA praecipue infra minute furfuracea; VENAE leviter ascendentes, extrorsum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertilis sterili similis sed minor, 4—6 poll. longa, 3—6 lin. lata, utrinque e medio sensim angustata.

Var. β . XANTHONEURON Baker.

Acrostichum xanthoneuron Kunze *Mss.*, teste *Mett. in Eaton Fil. Wright. et Fendl.* 194.
Acrostichum dissimile Kunze, *Linnaea* IX. 28. *Fée, Acrost.* 44.?

Major; stipites frondis steriles 6—12 poll., fertiles 12—18 vel (in specimen unico) 24 poll. longi; lamina sterilis membranacea inconspicue punctato-furfuracea, 12—18 poll. longa, 15—18 lin. lata; fertiles 6—12 poll. longa, 4—8 lin. lata, e medio sensim angustata.

Typus speciei ad rupes et in arboribus per regiones calidiores utriusque orbis divulgatus, in Brasilia observatus est in prov. S. Paulo: Burchell 5156!; Rio de Janeiro: Gardner 99!, Burchell 2187!, Glaziou 2455! etc.; prov. Bahia: Claussen; Minas Gerais ad Caldas et Lagoa Santa: Lindberg 535!, Warming!. — Var. β . ad Rio de Janeiro: Glaziou 952! 2433! 2800!. — Dryas, Oreas et Extrabras.

16. ACROSTICHUM BURCHELLII BAKER: stipitibus nudis elongatis, frondibus sterilibus rigide papyraceis subtus nudis, supra paleis minimis membranaceis albidis adpressis sparsis, anguste ligulatis 12—20-ies longioribus quam latis acutis, e medio utrinque longe aequaliter angustatis, venis gracilibus confertis modice conspicuis, frondibus fertilibus multo brevioribus et angustioribus.

Acrostichum Burchellii Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. 401.

Acrostichum punctulatum Mett. Mss., non Swartz.

CAUDEX lignosus, 2—3 lin. crassus, breviter repens, juventute PALEIS linearibus saturate brunneis patentibus membranaceis 1—1½ lin. longis vestitus. STIPITES fasciculati, erecti, stricti, nitidi, substraminei, modice validi, omnino nudi, frondis steriles 8—12 poll. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, siccitate subbrunnea, 12—18 poll. longa, medio 10—12 lin. lata, margine cartilagineo distincto nullo. COSTA gracilis, substraminea, nuda; VENAE leviter adscendentes, non exsculptae, ¼ lin. distantes, ad marginem egredientes. Lamina fertiles 3—4 poll. longa, 3—4 lin. lata, e medio utrinque angustata.

Probabiliter inter varietates speciei praecedentis mittenda.

Habitat in sylvis umbris at Mugimerim prov. S. Paulo: Burchell 5155!. — Oreas.

17. ACROSTICHUM ACROCARPUM MART. stipitibus paleis lineari-subulatis flavo-rufescentibus patentibus dense vestitis, frondibus sterilibus breviter petiolatis papyraceis, utrinque paleis iis stipitis similibus modice vestitis, ligulatis 8—10-ies longioribus quam latis acutis, e medio sensim angustatis, venis conspicuis laxis, frondibus fertilibus minoribus, stipitibus multoties longioribus.

Acrostichum acrocarpum Mart. Ic. Crypt. Bras. 85. t. 23. Fée, Acrost. 39., nec tamen Hook. Sp. Fil. V. 208. quoad descriptionem (quae ad A. Huacсаро Ruiz. spectat).

Olfersia acrocarpa Presl, Tent. 234.

Elaphoglossum acrocarpum Moore, Ind. Fil. 350.

CAUDEX lignosus, suberectus vel breviter repens, crassitie digiti minoris vel pennae cygnaeae. STIPITES subfasciculati, paleis ½—1 lin. longis, frondis steriles 6—12 lin., fertiles 4—8 poll. longi. LAMINA sterilis utrinque viridis, 4—6 poll. longa, 6—8 lin. lata. VENAE leviter adscendentes. Lamina fertiles 2—2½ poll. longa, 3—4 lin. lata.

Habitat ad arbores vetustas et rupes locis umbris prov. Minas Gerais: Martius. — Oreas.

18. ACROSTICHUM APODUM KAULF. frondibus sterilibus subsessilibus papyraceis, praecipue ad costam subtus marginemque paleis brevibus piliformibus ferrugineo-castaneis plus minus dense vestitis, elongato-oblancoelatis 9—12-ies longioribus quam latis acutis, in dimidio inferiore sensim angustatis, venis laxis distinctis, frondibus fertilibus subsessilibus multo brevioribus et angustioribus.

Acrostichum apodum Kaulf. Enum. Fil. 59. Spreng. Syst. Veg. IV. 34. Hook. et Grev. Icon. Fil. t. 99. Fée, Acrost. 42. Hook. Sp. Fil. V. 213.

Elaphoglossum apodum Schott, Gen. Fil. t. 15.

Olfersia apoda Presl, Tent. 233.

Acrostichum platyneuron Fée, Acrost. 43. t. 4. fig. 1.

Elaphoglossum villosum Moore et Houlst. Gard. Mag. Bot. III. 95. cum tab., non J. Smith.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti vel ultra, suberectus vel breviter repens, PALEIS linearibus membranaceis crispatis pallide ferrugineis patentibus 3—6 lin. longis dense vestitus. STIPITES frondium fertiliū et steriliū subnulli vel perbreves, PALEIS piliformibus castaneis patentibus ½—1 lin. longis vestiti. LAMINA sterilis utrinque pallide obscure viridis, paleis ½—1 lin. longis demum saepe evanescentibus, 9—18 poll. longa, supra medium 12—18 lin. lata. VENAE leviter adscendentes, extorsorum ¾—1 lin. distantes. Lamina fertiles multo minor, 5—8 poll. longa, 5—6 lin. lata, e medio utrinque sensim angustata.

Var. β . SPRUCEI Baker.

Major, magis chartacea; lamina steriles 12—18 poll. longa, 2—2½ poll. lata, interdum stipite 2 poll. longo instructa, paleis piliformibus castaneis copiosis praecipue ad costam et marginem vestita; lamina fertiles 9—18 lin. lata, basi ad stipitem longe decurrente alam angustam 3—4 poll. longam efformante.

Filix per totam fere Americam tropicam divulgata, rupes et arbores locis umbris praeditigens, in Brasilia tamen rara videtur. Typus prope Tanai ad Rio Acara prov. Paraensis observatus est: Spruce!; varietas eodem loco: Spruce!, et in sylvis Caatingas prope S. Gabriel da Cachoeira prov. do Alto Amazonas: Spruce 2186!. — Najas et Extrabrasil.

19. ACROSTICHUM VILLOSUM SWARTZ: stipitibus gracilibus brevibus paleis piliformibus ferrugineis dense vestitis, frondibus sterilibus membranaceis paleis iis stipitis similibus utrinque copiose vestitis, elongato-lanceolatis 4—8-ies longioribus quam latis, e medio sensim angustatis, marginibus interdum repandulis, venis gracilibus distantibus, frondibus fertilibus parvis lanceolatis, stipitibus subaequilongis.

Acrostichum villosum Swartz, Syn. Fil. 10. Willd. Sp. Plant. V. 103. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 95. Fée, Acrost. 49. Hook. Sp. Fil. V. 225. Ettingsh. tab. 4. fig. 1., et Auctt.

Elaphoglossum villosum J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 148.

Olfersia villosa Presl, Tent. 233.

Acrostichum podotrichum Desv. Berlin. Mag. V. 309.

Acrostichum undulatum Willd. Sp. Plant. V. 105. Kaulf. Enum. 61. Fée, Acrost. 42.

Acrostichum Moritzianum Klotzsch, Linnaea XX. 423. Ettingsh. tab. 1. fig. 14.

Acrostichum Plumieri Fée, Acrost. 50. Gen. Fil. 43. (forma tenera angusta, margine repandulo).

Acrostichum recognitum Kunze Mss.

Acrostichum setosum Liebm. Mex. Bregm. 17. (forma parva).

Acrostichum sejunctum Kuhn, Fil. Afr. 47.

CAUDEX lignosus, crassitie pennae cygnaeae, breviter repens, PALEIS piliformibus gracilibus ferrugineis 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES subfasciculati, fragiles, stramineo-brunnei, frondium fertiliū 1—4 poll. longi, paleis iis caudicis similibus squarrosis inaequalibus 1—2 lin. longis. LAMINA utrinque obscure pallide viridis, 3—12 poll. longa, 9—18 lin. lata, apice acuta vel raro subobtusata. COSTA gracilis, straminea, dense ciliata; VENAE immersae, praegraciles, leviter adscendentes, extorsorum 1½—2 lin. distantes, distincte intra marginem evanescentes, apice clavellatae. Lamina fertiles multo minor, lanceolata utrinque angustata, vel oblonga, 1—2½ poll. longa, 6—8 lin. lata.

Habitat circa Rio de Janeiro, in Serra dos Orgãos etc.: Miers, Glaziou 949! 2432! (forma ad var. Plumieri accedens); in terris inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas, et praeterea in Africa tropica occidentali. — Dryas et Extrabrazil.

20. ACROSTICHUM LINEARE FÉE: frondibus sterilibus breviter petiolatis papyraceo-herbaceis, praecipue ad margines et subtus ad costam paleis piliformibus firmis castaneis sparse vestitis, anguste lineari-ligulatis 12—20-ies longioribus quam latis, e medio sensim angustatis, venis distantibus immersis, frondibus fertilibus longius petiolatis aequilatis multoties brevioribus.

Tabula nostra XXXVII. Fig. 4—5. (frons et ejus pars).

Acrostichum lineare Fée, Acrost. 47. tab. 15. fig. 2. Gen. Fil. 43. Hook. Sp. Fil. V. 221. Hook. et Baker, Syn. Fil. 406. Etingsh. tab. 1. fig. 17—18.

Elaphoglossum lineare Moore, Ind. Fil. 360.

Acrostichum oligotrichum Kunze Mss.

CAUDEX lignosus, crassitie pennae cygneae, breviter repens, PALEIS lineari-subulatis saturate brunneis membranaceis densis patentibus 2—3 lin. longis vestitus. STIPITES subfasciculati, erecti, graciles, straminei, frondis sterilis 1—2 poll., fertilis 3—6 poll. longi, paleis patentibus vel squarrosis castaneis subulatis $\frac{1}{2}$ —1 lin. longis modice vestiti. LAMINA sterilis plene viridis, 6—12 poll. longa, 4—5 lin. lata, acuta vel sub-obtusa. COSTA straminea; VENAE indistinctae, pleraeque simplices, erecto-patentes, saepe 2—2 $\frac{1}{2}$ lin. distantes, intra marginem evanescentes, apice clavellato saepe pellucido. Lamina fertilis 2—4 poll. longa, 4—6 lin. lata, e medio utrinque sensim angustata.

Probabiliter varietatem *A. Aubertii* Desv. sistit, a quo praecipue differt lamina multo angustiore venisque immersis occultis.

Habitat in Serra dos Orgãos ad rupes umbrosas: Gardner 98! 5927!, Miers 10!, in Guatemala (Salvin et Godman!) et insulis Mascarenis. — Dryas et Extrabrazil.

21. ACROSTICHUM AUBERTII DESV. frondibus sterilibus breviter petiolatis papyraceo-herbaceis, praecipue ad margines et costam subtus paleis piliformibus firmis castaneis sparse vestitis, lineari-ligulatis 10—15-ies longioribus quam latis, acutis, margine interdum repandulis, e medio longe angustatis, venis distantibus distinctis, frondibus fertilibus multoties brevioribus lanceolatis basi rotundatis.

Acrostichum Aubertii Desv. Berlin. Mag. V. 309. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 209. Fée, Acrost. 45. t. 18. fig. 1. Hook. Sp. Fil. V. 219. Kuhn, Fil. Afr. 43.

Elaphoglossum Aubertii Moore, Ind. Fil. 352.

Acrostichum Klotzschii Moritz Mss. Eaton, Fil. Wright. et Fendl. 194.

Acrostichum alpestre Gard. in Field. et Gard. Sert. Plant. tab. 25. Hook. et Baker, Syn. Fil. 405.

Acrostichum eximium Metten. Ann. Sc. Nat. V. Ser. II. 199.

Acrostichum Reichenbachii Moritz Mss.

CAUDEX lignosus, 2—3 lin. crassus, breviter repens, PALEIS firmis castaneis nitidis 2—3 lin. longis patentibus dense vestitis. STIPITES subsegregati, graciles, erecti, frondis sterilis 1—4 poll., fertilis 4—12 poll. longi, paleis firmis patentibus subulatis ferrugineo-castaneis 1—1 $\frac{1}{2}$ lin. longis modice vel dense vestiti. LAMINA sterilis utrinque plene viridis, paleis $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longis, 9—15 poll. longa, 6—12 lin. lata, basi anguste cuneata vel interdum leviter rotundata. COSTA straminea; VENAE di-

stinctae, adscendentes, pleraeque simplices, extrorsum 2—2 $\frac{1}{2}$ lin. distantes, intra marginem evanescentes. Lamina fertilis 2—4 poll. longa, 4—8 lin. lata, lanceolata, basi saepe distincte rotundata.

Habitat in Serra dos Orgãos, ad rupes umbrosas prope cacumen montis: Gardner 5924!. Item incolit Columbianam, et regiones calidiore Africae continentalis et insularis. — Dryas et Extrabrazil.

**** Polylepidae.

22. ACROSTICHUM TECTUM WILLD. frondibus sterilibus modice petiolatis chartaceis, utrinque praecipue subtus paleis minutis deciduis adpressis peltatis centro ferrugineis margine late scariosis laxisque profunde fimbriatis vestitis, anguste ligulatis 12—20-ies longioribus quam latis, e medio longe angustatis, venis immersis confertis, frondibus fertilibus longius petiolatis angustioribus et brevioribus.

Acrostichum tectum Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Plant. V. 102. Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 209. Klotzsch, Linnaea XX. 426. Hook. et Baker, Syn. Fil. 410.

Olfersia tecta Presl, Tent. 234.

Elaphoglossum tectum Moore, Ind. Fil. 368.

Acrostichum rubiginosum Fée, Acrost. 47. tab. 5. fig. 1. Gen. Fil. 43. Hook. Sp. Fil. V. 222.

Acrostichum brachyneuron Fée, Acrost. 49. tab. 22. fig. 1.

Acrostichum nivosum Kunze, Bot. Zeitg. III. 281.

Acrostichum Schiedeii Kunze, Anal. Pter. 10. Linnaea XIII. 129. Mart. et Gal. Foug. Mex. 23. Liebm. Mex. Bregm. 15.

CAUDEX lignosus, 1 $\frac{1}{2}$ —2 lin. crassus, breviter repens, PALEIS firmis gracilibus subulatis nitide nigris patentibus 1 $\frac{1}{2}$ —2 lin. longis dense vestitus. STIPITES subsegregati, stramineo-brunnei, PALEIS minutis membranaceis peltatis centro ferrugineis margine griseo-scariosis plus minus dense vestiti, frondis sterilis 2—4 poll., fertilis 3—12 poll. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, siccitate brunnea, anguste ligulata, 6—12 poll. longa, 3—9 poll. lata. COSTA stramineo-brunnea, dense furfuracea; VENAE obscurae, leviter adscendentes. Lamina fertilis brevior et angustior, 6—9 poll. longa, 4—6 lin. lata, e medio sensim angustata.

Var. β . ELONGATUM Baker.

Acrostichum elongatum Kunze, Linnaea IX. 31. Fée, Acrost. 58. Gen. Fil. 43. Hook. Sp. Fil. V. 236.

Major; lamina sterilis magis papyracea, undulata, 8—15 poll. longa, 9—15 lin. lata, e medio longe angustata, paleis minutis inconspicuis peltatis rotundatis flavo-ferrugineis ciliatis utrinque penitus vestita, stipite interdum pedali; fertilis 8—9 poll. longa, 3—4 lin. lata.

Habitat typus in fissuris rupium Serra dos Orgãos: Gardner 5928!; in prov. Minas Gerais, e. gr. ad Caldas: Vauthier 663—4, Regnell II. 336!; et in terris inde e Peruvia ad Mexicum. — Var. β . inter gramina ad Caldas: Lindberg 538! — Oreas et Extrabrazil.

23. ACROSTICHUM STRICTUM RADDI: frondibus sterilibus breviter petiolatis subcoriaceis, praecipue subtus paleis parvis membranaceis imbricatis linearibus insigniter ciliatis ferrugineis dense vestitis, anguste ligulatis 8—12-ies longioribus quam latis, acutis, e medio sensim angustatis, venis immersis modice distantibus, frondibus fertilibus longius petiolatis subaequilongis sed duplo angustioribus.

Acrostichum strictum Raddi, Fil. Bras. 3. t. 15. fig. 3. Mart. Icon. Crypt. Bras. 84. t. 22. Fée, Acrost. 49. Klotzsch, Linnaea XX. 438. Hook. Sp. Fil. V. 225.

Olfersia stricta Presl, Tent. 234. t. 10. fig. 16.

Elaphoglossum strictum Moore, Ind. Fil. 368.

CAUDEX lignosus, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. crassus, breviter repens, PALEIS membranaceis lineari-acuminatis castaneis ciliatis patentibus $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis dense vestitis. STIPITES subfasciculati, straminei, paleis iis caudicis similibus sed minoribus patentibus deciduis vestiti, frondis sterilis 6—12 lin., fertilis $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longi. LAMINA sterilis utriusque viridis, 6—8 poll. longa, 6—9 lin. lata. COSTA straminea, complanata; VENAE obscurae, leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. Lamina fertilis 6—8 poll. longa, 3—4 lin. lata, e medio longe angustata.

Habitat locis sylvaticis umbrosis inter rupes graniticas prov. Minas Geraës: Martius, Lindberg!, et in Serra dos Orgãos: Radcl., Martius atique. — Oreas.

24. ACROSTICHUM LAMINARIOIDES BORY: frondibus sterilibus longe petiolatis rigide chartaceis, praecipue subtus paleis minutis peltatis centro ferrugineis margine fimbriatis lateque griseo-scariosis dense vestitis, ensiformibus 12—20-ies longioribus quam latis, e medio longe angustatis, venis immersis occultis modice confertis, frondibus fertilibus brevius petiolatis multoties brevioribus et angustioribus.

Acrostichum laminarioides Bory Mss. Fée, *Acrost.* 57. tab. 12. *Gen. Fil.* 43. *Hook. Sp. Fil.* V. 235.

Elaphoglossum laminarioides Moore, *Ind. Fil.* 358.

Acrostichum acidophyllum Kunze Mss.

CAUDEX lignosus, 2—3 lin. crassus, breviter repens, PALEIS firmis linearibus patentibus nitide castaneis 2—3 lin. longis modice vestitis. STIPITES subfasciculati, griseo-straminei, paleis iis caudicis similibus paucis et allis peltatis minimis numerosis centro ferrugineis margine late scariosis vestiti, frondis sterilis 8—12 poll., fertilis 3—4 poll. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, 18—24 poll. longa, 12—18 lin. lata. COSTA modice valida, dense furfuracea; VENAE leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. Lamina fertilis 6—8 poll. longa, 6—8 lin. lata, acuta, basi paullulum rotundata.

Habitat in Guiana gallica: Leprieur; in britannica ad Quatung-Creek: Appun 1033!, et in Mexico: Schaffner 32. — Forte in Brasilia adhuc detegetur.

25. ACROSTICHUM MUSCOSUM SWARTZ: frondibus sterilibus longe petiolatis subrigide chartaceis, supra demum subnudis, subtus paleis membranaceis imbricatis lanceolatis integris vel leviter ciliatis centro ferrugineis margine griseo-scariosis penitus vestitis, elongato-lanceolatis 6—8-ies longioribus quam latis acutis, e medio longe angustatis, venis immersis modice distantibus, frondibus fertilibus sublongius petiolatis brevioribus et angustioribus.

Acrostichum muscosum Swartz, *Fl. Ind. Occ.* 1591. *Syn. Fil.* 10. *Willd. Sp. Plant.* V. 104. Fée, *Acrost.* 54. *Hook. Sp. Fil.* V. 231. *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 676.

Elaphoglossum muscosum Moore, *Ind. Fil.* 362.

Olfersia muscosa Presl, *Tent.* 233.

Acrostichum Langsdorffii Hook. et Grev. *Icon. Fil.* t. 164. *Mart. Icon. Crypt. Bras.* 83. t. 21. Fée, *Acrost.* 56. *Hook. Sp. Fil.* V. 234.

Acrostichum actinotrichum Mart. *Icon. Crypt. Bras.* 86.

Acrostichum squamosum Schkuhr, *Crypt. t. 1 bis.*, non Swartz.

Acrostichum Lindigii Karsten, *Fl. Columb.* 5. t. 3.

CAUDEX lignosus, plus minus repens, 2—3 lin. crassus, PALEIS firmis linearibus castaneis ciliatis patentibus 2—3 lin. longis dense vestitis. STIPITES subfasciculati vel paullulum segregati, stramineo-brunnei, paleis linearibus vel lanceolatis adscendentibus membranaceis centro pallide ferrugineis margine late griseo-scariosis vestiti, frondis sterilis 6—12 poll., fertilis 8—12 poll. longi. LAMINA sterilis supra primum tenuiter vestita, cito subnuda, subtus paleis in diagnosi descriptis $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. longis im-

Polypod.

bricatis vestita, 6—12 poll. longa, 1—2 poll. lata. COSTA brunnea, dense paleacea; VENAE interdum supra distinctae, leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. Lamina fertilis 4—8 poll. longa, 6—12 lin. lata, interdum basi rotundata.

Habitat ad rupes montosas prov. Minas Geraës: Langsdorff!; Goyaz: Bunbury!; Rio de Janeiro: Burchell 2188!, Gardner 94. 5929!, Glaziou 1763! 3555., Vauthier 661; et in terris inde e Peruvia ad insulas Antillanas. — Dryas, Oreas et Extrabrazil.

Obs. *A. lepidotum* Willd., *A. Engetii*, rupestre, *deorsum*, *caulolepia* et *truncicola*, omnia in Karsten *Fl. Columb.* tab. 59 et 60 pulcherrime delineata, verisimiliter cum *A. vestito* Schlecht. et Griseb., *A. rufo-fescente* Liebm., *A. polylepide* Kunze et *A. Dombeyano* Fée, varietates ejusdem speciei sistunt.

26. ACROSTICHUM AURICOMUM KUNZE: frondibus sterilibus longe petiolatis herbaceis vel chartaceo-papyraceis, utriusque praecipue infra paleis brevibus stellatis prorsus pilosis saturate ferrugineis dense vestitis, elongato-lanceolatis 10—15-ies longioribus quam latis acutis, e medio longe angustatis, venis immersis modice confertis, frondibus fertilibus longius petiolatis subduplo brevioribus et angustioribus.

Acrostichum auricomum Kunze, *Linnaea* IX. 28. Fée, *Acrost.* 59. *Gen. Fil.* 43. *Hook. Sp. Fil.* V. 238. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 410.

Olfersia auricoma Presl, *Tent.* 234.

Elaphoglossum auricomum Moore, *Ind. Fil.* 352.

Acrostichum tanajense Kuhn, *Linnaea* XXXVI. 50.

CAUDEX lignosus, 2—3 lin. crassus, breviter repens, PALEIS firmis linearibus castaneis 2—3 lin. longis dense vestitis. STIPITES subsegregati, stramineo-brunnei, paleis linearibus membranaceis et minutis pilosis ferrugineis patentibus dense vestiti, frondis sterilis 1—12 poll., fertilis 4—12 poll. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, 9—18 poll. longa, 9—15 lin. lata. COSTA brunnea, modice valida, infra dense paleacea; VENAE inconspicuae, leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. Lamina fertilis 9—12 poll. longa, 4—6 lin. lata, e medio longe angustata.

Habitat in sylvicis umbrosis praecipue ad truncos arborum prov. do Alto Amazonas, e. gr. ad S. Gabriel da Cacheira: Spruce 2185!; in prov. Para: Spruce 16! et 421, teste Kuhn; Minas Geraës ad Caldas: Regnell III. 1433!; Rio de Janeiro: Setto!, Glaziou 951! 2435! 2437! 2438!, et e Peruvia (Poeppig!) ad Mexicum (Bourgeau 2110!). — Vaga et Extrabrazil.

27. ACROSTICHUM PERELEGANS FÉE: frondibus sterilibus longe petiolatis papyraceis, supra sparse infra dense paleis minutis lanceolatis flavo-ferrugineis vix ciliatis plerumque adpressis vestitis, elongato-lanceolatis 6—8-plo longioribus quam latis acutis, e medio longe angustatis, venis distinctis confertis, frondibus fertilibus longius petiolatis subduplo brevioribus et angustioribus.

Tabula nostra XXXVII. *Fig.* 11—12. (*frondis partes*).

Acrostichum perelegans Fée, *Acrost.* 55. t. 23. *Gen. Fil.* 43. *Hook. Sp. Fil.* V. 232. *Hook. et Baker, Syn. Fil.* 411. *Ettingsh. tab. 2. fig. 4—5. tab. 4. fig. 5.*

Elaphoglossum perelegans Moore, *Ind. Fil.* 363.

Acrostichum circumscriptum Bory Mss.

Acrostichum paleaceum Pohl Mss.

Acrostichum muscosum Kunze in *Linnaea* IX. 29., non Swartz.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS firmis castaneis linearibus subulatis 2—3 lin. longis dense vestitus. STIPITES graciles, stramineo-brunnei, leviter palacei, frondis sterilis 4—8 poll., fertilis 6—12 poll. longi. LAMINA sterilis supra subnitide viridis tenuiter furfuracea, subtus et margine paleis in diagnosi descriptis prorsus vestita, 9—12 poll. longa, 18—21 lin. lata. COSTA gracilis, brunnea, furfuracea; VENAE leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ lin. distantes. Lamina fertilis 5—6 poll. longa, 5—6 lin. lata.

Habitat ad rupes umbrosas prov. Goyaz: Pohl; prope Rio de Janeiro: Vauthier; et e Peruvia ad insulas Antillanas. — Dryas, Oreas et Extrabras.

28. ACROSTICHUM SQUAMOSUM SWARTZ: frondibus sterilibus breviter petiolatis crasse papyraceo-herbaceis, supra tenuiter infra dense paleis membranaceis linearibus imbricatis griseo-ferrugineis insigniter plumoso-ciliatis vestitis, elongato-lanceolatis 6—10-ies longioribus quam latis acutis, e medio longe angustatis, venis immersis modice laxis, frondibus fertilibus longe petiolatis subduplo brevioribus et angustioribus.

Tabula nostra XXXVII. Fig. 10. (lamina).

Acrostichum squamosum Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 11. Syn. Fil. 10 et 195. Liebm. Mec. Breg. 24. Hook. Sp. Fil. V. 239. Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 676.

Elaphoglossum squamosum J. Smith in Hook. Journ. Bot. IV. 148.

Acrostichum hirtum Swartz, Syn. Fil. 194. Willd. Sp. Plant. V. 104. Fée, Acrost. 61.

Acrostichum vestitum et paleaceum Hook. et Grev. Ic. Fil. ab. 235.

Acrostichum splendens Bory in Willd. Sp. Plant. V. 104. Kaulf. Enum. 60. Gaudich. Freyc. Voy. 303. Fée, Acrost. 60. tab. 21. fig. 2.

Acrostichum plumosum Fée, Acrost. 54. tab. 20. fig. 1. Klotzsch, Linnæa XX. 426. Hook. Sp. Fil. 232. Ettingsh. tab. 2. fig. 3.

Acrostichum Wageneri Kunze, Linnæa XXV. 746., et synonyma multa alia.

CAUDEX suberectus vel breviter repens, lignosus, PALEIS membranaceis linearibus ciliatis pallide ferrugineis 3—4 lin. longis dense vestitus. STIPITES fasciculati, stramineo-brunnei, paleis iis caudicis similibus sed paullulum minoribus adscendentibus dense vestiti, frondis sterilis 1—3 poll., fertilis 6—12 poll. longi. LAMINA sterilis obscure viridis, 6—18 poll. longa, 12—21 lin. lata, interdum radicans et prolifera. COSTA stramineo-brunnea, modice valida, subtus dense furfuracea; VENAE suboccultae, leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes. Lamina fertilis 5—6 poll. longa, 6—9 lin. lata, acuta vel subobtusata.

Habitat in sylvis umbrosis, praecipue ad arborum truncos, interdum ad terram, in prov. do Alto Amazonas ad S. Gabriel et Mandos: Spruce 1770! 2397!, itemque in Guiana britannica: Rob. Schomburgk 446!, Rich. Schomburgk 1141!, Appun 190! 588!. Praeterea incolit Columbiam, Mexicum et insulas Antillanas, et regiones calidiores veteris orbis usque ad insulas Azoricas. — Najas et Extrabrasil.

§ 2. LOMARIOPSIS.

29. ACROSTICHUM SORBIFOLIUM LINN. caudice longe scandente, frondibus distincte petiolatis oblongo-lanceolatis plerumque simpliciter pinnatis raro simplicibus, sterilibus papyraceis utrinque nudis, pinnis 1—20-jugis lanceolato-ligulatis integris vel denticulatis basi conspicue articulatis, fertilibus pinnis 2—3-plo angustioribus saepe brevioribus.

Tabula nostra XXXVIII. Fig. 10—11., XXXIX. Fig. 5—7. (pinnae), et tab. L. Fig. IV. (analysis).

Acrostichum sorbifolium Linn. Sp. Plant. 1526. Lam. Encycl. I. 36. Willd. Sp. Plant. V. 115. Hook. Sp. Fil. V. 241. Hook. et Baker, Syn. Fil. 412.

Onoclea sorbifolia Swartz, Syn. Fil. 112.

Olfersia sorbifolia Presl, Tent. 152.

Lomaria sorbifolia et longifolia Kaulf. Enum. 152—3.

Stenochlaena sorbifolia et longifolia Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 674.

Lomariopsis sorbifolia Fée, Acrost. 69. Mett. Fil. Hort. Lips. 22. Ettingsh. tab. 10. fig. 6—8.

Acrostichum erythrodes Kunze Mss. Splitz. Enum. Fil. Sur. 6.

Lomariopsis erythrodes Fée, Acrost. 67. Ettingsh. tab. 7. fig. 4. 6.

Lomariopsis elongata Fée, Acrost. 67. (forma pinnis longioribus), et synonyma nulla alia.

CAUDEX lignosus, copiose ramosus, interdum crassitie digiti, ad 30—40 pedes longitudine attingens, in arboribus late scandens, PALEIS firmis membranaceis lanceolato-subulatis flavo-ferrugineis adscendentibus juventute vestitus. STIPITES segregati, substraminei, 4—6 poll. longi, deorsum paleis iis caudicis similibus sed minoribus vestiti. LAMINA sterilis 12—24 poll. longa, 8—12 poll. lata, simpliciter pinnata, saturate viridis, utrinque omnino nuda. PINNAE 12—20-jugae, laxae vel subcontiguae, patentes vel leviter adscendentes, 4—6 poll. longae, 9—12 lin. latae, acutae acuminatae vel cuspidatae, integerrimae vel denticulatae, basi cuneata subsessili distincte articulatae, imae laxiores plus minus reductae. RACHIS stricta, griseo-straminea, leviter furfuracea. VENAE distinctae, leviter adscendentes, simplices vel basi furcatae, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. distantes, ad marginem egredientes. Pinnae fertiles breviores vel aequilongae, laxiores, 3—6 lin. latae.

Var. β . YAPURENSE Baker.

Acrostichum Yapurense Mart. Icon. Crypt. Bras. 86. t. 24. Hook. Gard. Ferns. t. 57.

Stenochlaena japurensis Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 674.

Acrostichum phlebodes Kunze, Linnæa IX. 33.

Lomariopsis phlebodes Fée, Acrost. 66. Ettingsh. tab. 8. fig. 7. tab. 10. fig. 4.

Lomariopsis Prieuriana Fée, Acrost. 66. tab. 25. fig. 1.

Lomariopsis sp. indeterminata Ettingsh. tab. 8. fig. 6.

Pinnae pauciores, laxiores, 1—10-jugae, steriles 6—9 poll. longae 15—21 lin. latae, fertiles 3—4 poll. longae interdum 6—12 lin. latae.

Var. γ . PALUSTRE Baker.

Acrostichum palustre Hook. Sp. Fil. V. 214. Hook. et Baker, Syn. Fil. 402.

Lomariopsis palustris Metten. Mss. Kuhn, Fil. African. 53.

Elaphoglossum melanostictum Moore, Ind. Fil. 361. ex parte.

Textura et venatio formae typicae; paleae angustiores, saturatius ferruginae, subsquarrosae; stipites frondis sterilis $\frac{1}{2}$ —2 poll., fertilis 3—4 poll. longi; frondes simplicissimae; lamina sterilis elongato-lanceolata, 9—15 poll. longa, 18—21 lin. lata, e medio utrinque angustata, venae leviter adscendentes, extrorsum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. distantes; lamina fertilis 3 poll. longa, 6 lin. lata, e medio sensim angustata.

Species cosmopolita in regionibus calidioribus totius orbis crescit. Intra Brasiliam typus observatus est in prov. S. Catharina: Sinclair!; Rio de Janeiro: Gardner 101!, Sello!, Glaziou 371! aliique; in prov. Bahia: Luschnath! (Mart. Hb. Fl. Bras. 366!). — Var. β . ad fluv. Yapurá prov. do Alto Amazonas: Martius; prov. Para: Spruce 27! 569!; Bahia: Blanchet 2517!; Rio de Janeiro: Schott, Burchett!, Sello!, Pohl! aliique; et frequens praeterea in tota Guiana (Leprieur, Sagot 712!, Splitzgerber, Hostmann 188!, Kegel 87, Appun 128! 179! 1498! etc.). — Var. γ . in Guiana gallica: Leprieur!, et in britannica: Rich. Schomburgk!. — Vaga et Extrabrasil.

Obs. Inter omnes hujus sectionis formas, quas cl. FÉE sub specierum titulo proposuit, nullum discrimen specificum invenire potuimus.

§ 3. POLYBOTRYA.

30. ACROSTICHUM ACUMINATUM Hook. frondibus sterilibus bipinnatis, pinnis inferioribus distincte petiolatis lanceolato-deltoidis, pinnulis solutis 4—6-jugis breviter petiolatis inaequilateraliter oblongo-lanceolatis acutis subintegris vel deorsum leviter lobatis, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneata; frondibus fertilibus minoribus tripinnatis, segmentis oblongis.

Acrostichum acuminatum Hook. *Sp. Fil.* V. 245. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 414.

Aspidium scandens Raddi, *Fil. Bras.* 34. t. 39. (frons sterilis).

Polybotrya acuminata Link, *Sp. Fil.* 148. Fée, *Acrost.* 73. *Mett. Fil. Hort. Lips.* 23. t. 2. fig. 1—6.

Psomiocarpa acuminata Presl, *Epim.* 161.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti vel ultra, late scandens, PALEIS linearibus membranaceis brunneis adscendentibus 4—6 lin. longis juventute vestitus. STIPITES segregati, firmi, erecti, straminei, 6—9 poll. longi, sursum glabri, deorsum paleacei. LAMINA sterilis papyraceo-chartacea, utrinque nuda, supra nitide viridis, deltoidea, 12—18 poll. longa, 12—15 poll. lata, bipinnata (specimen multos per annos in Horto Kewensi cultum nunquam majus nec magis dissectum erat). PINNAE compositae 6—8-jugae, contiguae, 6—8 poll. longae, 3—4 poll. latae; PINNULAE (infra apicem pinnatifidum) anticae imae 2—2½ poll. longae, 8—9 lin. latae. VENAE graciles, immersae, in dimidio superiore pinnularum simplices vel furcatae, in dimidio inferiore pinnatae, venulis valde adscendentibus 2—5-jugis. Lamina fertilis deltoidea, subpedalis, segmentis integris vel deorsum lobulatis.

Habitat in sylvis primaevis prope Mandioca, prov. Rio de Janeiro: Raddi!, Langsdorff. — Dryas.

31. ACROSTICHUM CAUDATUM Hook. frondibus sterilibus plq. tripinnatifidis vel raro tripinnatis, pinnis inferioribus breviter petiolatis oblongo-lanceolatis, pinnulis solutis breviter petiolatis saepe 12—20-jugis basi plus minus asymmetricis antice productis ligulatis acutis profunde pinnatifidis vel raro pinnatis, segmentis oblongis subobtusis; frondibus fertilibus bipinnatis, pinnulis longis cylindricis nutantibus integris vel deorsum lobulatis.

Tabula nostra XXXVIII. Fig. 6—9. (pinnulae).

Acrostichum caudatum Hook. *Sp. Fil.* V. 244. (non *Io. Plant.* t. 215., quod ad *A. petiolosum* Desv. spectat). Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 414.

Polybotrya caudata Kunze, *Linnaea* IX. 23. Fée, *Acrost.* 72. t. 34. Presl, *Tent.* 231. *Splitg. Enum. Fil. Sur.* 4. tab. 16. fig. 3. 7. *Ettingsh. tab.* 4. fig. 8. tab. 5. fig. 5.

Psomiocarpa caudata Presl, *Epim.* 161.

Olfersia caudata Kunze, *Linnaea* XXI. 206.

CAUDEX lignosus, crassitie digiti vel ultra, copiose ramosus, late scandens, PALEIS linearibus membranaceis brunneis 6—9 lin. longis juventute vestitus. STIPITES segregati, griseo-straminei vel raro castanei, stricti, laevigati, 6—18 poll. longi, deorsum paleacei, interdum 4—6 lin. crassi. LAMINA sterilis chartaceo-papyracea, plene viridis, utrinque nuda, quoad magnitudinem et sectionem valde variabilis: minus evoluta aegre bipinnata, 8—12 poll. longa, 6—8 poll. lata, pinnis lanceolatis deorsum aegre pinnatis; plene evoluta (ex eodem rhizomate) deltoidea, 2—3 pedes longa et lata, tripinnatifida vel raro perfecte tripinnata. RACHES griseo-stramineae, strictae, nuda. PINNAE perfecte evolutae 12—18 poll. longae, 6—8 poll. latae; PINNULAE solutis 12—20-jugis, contiguas, 3—4 poll. longis, 8—12 lin. latis, deorsum ad dimidiam pinnatifidis, SEGMENTIS oblongis obtusis 2—3 lin. latis, vel raro 12—18 lin.

latis deorsum perfecte pinnatis. VENAE in segmentis pinnatae, VENULIS adscendentibus 4—6- vel raro 8-jugis. Frons fertilis deltoidea, 1—3 pedes longa et lata, pinnis deltoideis; pinnulis distantibus cylindricis nutantibus, inferioribus 1—3 poll. longis, integris vel deorsum lobatis.

Var. β. PUBENS Hook.

Tabula nostra XXXVIII. Fig. 1—2. (pinnulae inferiores).

Polybotrya pubens Mart. *Icon. Crypt. Bras.* 87. t. 25. Kunze, *Linnaea* IX. 23. *Splitg. Enum. Fil. Sur.* 3. Presl, *Tent.* 231. *Ettingsh. tab.* 16. fig. 2. tab. 17. fig. 15. 17.

Quoad sectionem et magnitudinem aequaliter variabilis, sed lamina sterilibus saturatius viridis, rachi pilis griseis patentibus vestita, et paginā inferiore costaque supra griseo-pubescentibus. (Paleae in planta Martiana latiores pallidiores, pinnulae fertiles breviores).

Fitix inde e Brasilia australi et Peruvia usque ad Guatemalam et insulas Antillanas sparsa. Typus in prov. Rio de Janeiro: Glaziou 2417!; et prov. do Alto Amazonas: Spruce 2116!; in Guiana batava, anglica et gallica (Hostmann 1746!, Splitgerber; Kegel 616. 719, Rich. Schomburgk 1659!, Leprieur?). — Var. β. in prov. Para et do Alto Amazonas: Martius; itemque in Guiana batava: Splitgerber. — Vaga et Extrabrazil.

32. ACROSTICHUM OSMUNDACEUM Hook. frondibus sterilibus 4-pinnatifidis vel raro 4-pinnatis, pinnis inferioribus oblongo-lanceolatis distincte petiolatis, pinnulis solutis lanceolatis breviter petiolatis saepe 12—20-jugis, segmentis lanceolatis acutis vel obtusis, basi superiore cum rache parallela, inferiore cuneata, divisionibus lineari-oblongis; frondibus fertilibus 3—4-pinnatis, divisionibus ultimis oblongis vel lineari-oblongis.

Tabula nostra XXXVIII. Fig. 3—5. (pinnulae), et tab. I. Fig. V. (analysis).

Acrostichum osmundaceum Hook. *Sp. Fil.* V. 246. Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 415.

Polybotrya osmundacea H.B.K. *Nov. Gen. et Sp.* I. 23. t. 2. Willd. *Sp. Plant.* V. 99. *Kaulf. Enum. Fil.* 56. Hook. *Gen. Fil.* t. 88 B. Fée, *Acrost.* 74. *Ettingsh. t.* 6. fig. 1.

Polybotrya cylindrica Kaulf. *Enum.* 56. Fée, *Acrost.* 74. tab. 36. *Ettingsh. tab.* 8. fig. 2. tab. 10. fig. 10—11.

Polybotrya speciosa Schott, *Gen. Fil.* 2. cum icone.

Polybotrya incisa Link, *Sp. Fil.* 148. Fée, *Acrost.* 73. tab. 35. *Metten. Fil. Hort. Lips.* 23.

Acrostichum incisum et cylindricum Hook. *Sp. Fil.* V. 245. 246.

CAUDEX lignosus, ramosus, late scandens, crassitie digiti vel ultra, PALEIS membranaceis linearibus brunneis 4—6 lin. longis juventute vestitus. STIPITES straminei, stricti, laevigati, 12—18 poll. longi, basi solum paleacei. LAMINA sterilis chartaceo-papyracea, plene viridis, utrinque nuda vel ad costas leviter griseo-pubescentibus, perfecte evoluta deltoidea, 2—3 pedes longa et lata. RACHES stramineae, nuda vel leviter griseo-pubescentes. PINNAE inferiores 12—18 poll. longae, 6—8 poll. latae; PINNULAE solutis inaequilateraliter lanceolatis, antice productis, postice reductis, basi cuneata, inferioribus distincte petiolatis. SEGMENTA inaequilateraliter ligulato-lanceolata, divisionibus linearibus raro deorsum costam attingentibus. VENAE divisionum pinnatae, venulis erecto-patentibus. Lamina fertilis deltoidea, perfecte evoluta 1½—2 pedes longa et lata, pinnis et pinnulis quam in sterili majoribus deltoideis distincte petiolatis, segmentis imis 6—12 lin. longis integris vel lobatis vel deorsum pinnatis.

Habitat in sylvis primaevis prov. Minas Gerais: Freyress; prov. Bahia: Blanchet 2488!, Martius; Rio de Janeiro: Schott, Gardner 91—2!, Burchell 2044! 2422!, Glaziou 955! 2428—9!, et alii; S. Paulo: Burchell 3062!; S. Catharina: Chamisso, Fritz Müller 227!. Praeterea incotit Columbiam et insulas Antillanas. — Dryas, Oreas et Extrabrazil.

§ 4. RHIPIDOPTERIS.

33. *ACROSTICHUM PELTATUM* SWARTZ: frondibus parvis longe petiolatis, sterilibus rotundato-cuneatis usque ad basin flabellatim dissectis, ramis 1—3-ies dichotome furcatis, divisionibus ultimis anguste linearibus; frondibus fertilibus rotundatis integris emarginatis, margine angusto crispato.

Tabula nostra XXXVIII. Fig. 12—15. (frondes steriles), et tab. L. Fig. VI. (anulysis).

Acrostichum peltatum Swartz, Syn. Fil. 11. Schkuhr, Fil. tab. 12. Willd. Sp. Plant. V. 110. Hook. Sp. Fil. V. 252. Ettingsh. tab. 1. fig. 9—13., et Aucit.

Rhipidopteris peltata Fée, Acrost. 78. (excl. syn.).

Olfersia peltata Presl, Tent. 234.

CAUDEX filiformis, longe repens, PALEIS linearibus adpressis vel leviter patentibus brunneis membranaceis $\frac{1}{2}$ —1 lin. longis vestitus. STIPITES uniseriati, segregati, filiformes, virides vel straminei, frondis sterilis $\frac{1}{2}$ —4 poll., fertilis $1\frac{1}{2}$ —4 poll. longi, deorsum vel toti paleis linearibus minutis patentibus instructi. LAMINA sterilis chartacea, utrinque nuda, plene viridis, 1—2 poll. lata, divisionibus ultimis 1—4 lin. longis, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. latis. VENAE divisionum omnium graduum medianae solummodo obviae. Lamina fertilis rotundata vel obverse oblonga, 3—6 lin. lata, apice et basi plus minus distincte emarginata.

Habitat ad rupes et truncos inter muscos prov. Rio de Janeiro: Glaziou 2441!; in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1153!, et in terris inde e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Dryas et Extrabrazil.

§ 5. OLFERSIA.

34. *ACROSTICHUM CERVINUM* SWARTZ: frondibus sterilibus longe petiolatis chartaceis utrinque nudis simpliciter pinnatis, pinnis 3—9-jugis vix petiolatis integris acutis inaequaliter lanceolatis, basi superiore rotundata, inferiore cuneata; frondibus fertilibus pinnatis, pinnis integris anguste ligulatis vel bipinnatis, pinnulis 20—40-jugis brevibus patentibus cylindricis.

Tabula nostra XXXIX. Fig. 1. 2. 8. (pinnae) et LI. Fig. I. (anulysis).

Acrostichum cervinum Swartz, Syn. Fil. 14. 200. Willd. Sp. Plant. V. 120. Hook. Sp. Fil. V. 254. Hook. et Baker, Syn. Fil. 416.

Osmunda cervina Linn. Sp. Plant. 1521.

Olfersia cervina Kunze, Bot. Zeitg. 1842. I. 312. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 81. Hook. Fil. Exot. t. 43. Fée, Acrost. 81. Presl, Tent. 235. Ettingsh. tab. 7. fig. 1. 3. tab. 8. fig. 1.

Polybotrya cervina Kaulf. Enum. 55.

CAUDEX lignosus, late scandens, longitudine 4—8 pedes attingens, crassitie saepe digiti, PALEIS linearibus brunneis membranaceis patentibus 6—9 lin. longis dense vestitus. STIPITES firmi, erecti, griseo-straminei, nudi, basi solum sparse paleacei, 12—18 poll. longi. LAMINA sterilis pallide viridis, minus evoluta integra, lanceolata, melius evoluta simpliciter pinnata, oblongo-lanceolata, 1—3 pedes longa, 12—18 poll. lata. PINNAE subcontiguae, inferiores breviter petiolatae, 6—9 poll. longae, $1\frac{1}{2}$ —3 poll. latae, integrae, imae medii aequales. COSTA griseo-straminea, gracilis, nuda; VENAE distinctae, adscendentes, raro furcatae, parallelae, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. distantes, intra marginem evanescentes, apice vena distincta cum margine parallelâ colligatae. Lamina fertilis lanceolata, 1—2 pedes longa, 8—12 poll. lata, bipinnata; pinnae anguste lanceolatae, 4—6 poll. longae, 8—15 lin. latae, pinnulis rectangulariter patentibus cylindricis distincte separatis 4—8 poll. longis.

Var. β . CORCOVADENSE HOOK.

Olfersia corcovadensis Raddi, Fil. Bras. 7. tab. 14. Fée, Acrost. 81. Presl, Tent. 235. Ettingsh. tab. 7. fig. 2.

Pteris ophioglossoides Vell. Fl. Flum. XI. t. 84.

Polybotrya corcovadensis Spreng. Syst. Veg. IV. 33.

Polybotrya Raddiana Kaulf. Enum. 55.

Polybotrya elegans et longifolia Pohl Mss.

Lamina fertilis simpliciter pinnata, pinnis interdum anguste ligulatis integerrimis 3—4 lin. latis.

Cum typo formis intermediis bene confluens.

Habitat in sylvis primaevis late dispersa, ita in prov. Goyaz: Pohl; prov. Bahia: Luschnath (Mart. Hb. Fl. Bras. 373); Rio de Janeiro: Raddi, Gardner 216!, Milne!, Douglas!, Glaziou 450! 452! 2426! etc.; S. Paulo: Burchell 3087!; Rio Grande do Sul: Foz!; et in terris inde e Peruvia ad insulas Antillanas. — Vaga et Extrabrazil.

§ 6. SOROMANES.

35. *ACROSTICHUM CAENOPTERIS* KUNZE: frondibus longe petiolatis, sterilibus chartaceis utrinque nudis oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 8—12-jugis vix petiolatis ligulato-lanceolatis integris vel leviter serrulatis, basi aequaliter cuneatis vel antice horizontaliter truncatis; frondibus fertilibus bipinnatis, pinnis lineari-ligulatis, pinnulis 20—30-jugis breviter cylindricis.

Tabula nostra LI. Fig. II. (anulysis).

Acrostichum Caenopteris Kunze Mss. Hook. Sp. Fil. V. 256. Hook. et Baker, Syn. Fil. 417.

Polybotrya serrata Bory Mss.

Soromanes serratifolium Fée, Acrost. 82. J. Smith, Ferns Brit. et For. 116.

Soromanes dentatum Fée, Acrost. t. 43.

Soromanes integrifolium Fée, Acrost. 82. t. 42. quoad laminam fertile (lamina sterilis ad Aspidium meniscioides pertinet).

Polybotrya serratifolia Klotzsch, Linnæa XX. 436. Eaton, Fil. Wright. et Fendl. 197.

Polybotrya sorbifolia Mett. Mss. Kuhn, Linnæa XXXVI. 64.

CAUDEX lignosus, late scandens, PALEIS membranaceis linearibus ferrugineo-brunneis patentibus 6—9 lin. longis dense vestitus. STIPITES segregati, 8—12 poll. longi, erecti, stricti, straminei, sparse paleacei. LAMINA sterilis utrinque subnitide pallide viridis, $1\frac{1}{2}$ —2 pedes longa, 10—15 poll. lata. PINNAE solutae (infra apicem frondis pinnatifidum) contiguae vel subcontiguae, acutae vel acuminatae, integrae vel extrorsum leviter serrulatae, basi utrinque cuneata vel antice producta, inferiores 5—8 poll. longae, 8—15 lin. latae, sessiles vel perbreve petiolatae. VENAE pinnae in fasciculis pinnatae; VENULAE adscendentes (*P. sorbifolia Mett. et Kuhn loc. cit.*) in fasciculis centralibus bijugae, aegre conjunctae sed saepe more *Cyclotii* 4—5-jugi regulariter anastomosantes, areolis costalibus deltoideis regulariter seriatis. Lamina fertilis minor, pinnis adscendentibus, 4—6 poll. longis, 3—12 lin. latis, pinnulis brevibus cylindricis horizontaliter patentibus.

Habitat in prov. Alagoas, Serra de Araripe: Gardner 1901! Praeterea incolit Columbianam et insulas Antillanas. — Hamadryas et Extrabrazil.

§ 7. GYMNOPTERIS.

36. ACROSTICHUM ALIENUM SWARTZ: frondibus sterilibus membranaceis nudis deltoideis, sursum pinnatifidis, deorsum pinnatis, pinnis solutis 3—6-jugis lanceolatis integris vel plerisque plus minus profunde pinnatifidis, imis maximis interdum postice productis, venis primariis parallelis extrorsum evanescentibus, areolis intermediis copiosis irregularibus, venulis liberis paucis vel numerosis; frondibus fertilibus lanceolatis, pinnis ligulatis integris vel leviter pinnatifidis.

Tabula nostra XXXIX. Fig. 3—4 (pinnae imae) et LI. Fig. III. (analysis).

- Acrostichum alienum Swartz, Fl. Ind. Occ. III. 1595. Syn. Fil. 13. Willd. Sp. Plant. V. 120. Hook. Syn. Fil. V. 272. Gymnopteris aliena Presl, Tent. 244. Fée, Acrost. 84. Chrysodium alienum Metten. Fil. Hort. Lips. 21. t. 10. fig. 5. Ettingsh. t. 14. fig. 6. 9. Anapausia aliena Presl, Epim. 187. Acrostichum caudatum Cav. Praelect. 1801. p. 242? Acrostichum brunneum Willd. Sp. Plant. V. 113. Acrostichum cladorhizans et portoricense Spreng. Nova Act. Nat. Cur. X. 225—6. Gymnopteris semipinnatifida Fée, Acrost. 84. t. 44. Hook. Ic. Plant. t. 971—2. Acrostichum semipinnatifidum Hook. Sp. Fil. V. 273. Acrostichum hastatum et umbrosum Liebm. Mex. Bregm. 20—22. Gymnopteris dentata Fée, Acrost. 85., et synonyma multa alia.*

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALKIS densis patentibus linearisubulatis membranaceis brunneis 3—4 lin. longis juventute vestitus. STIPITES grisei vel straminei, debiles, 12—18 poll. longi, nud vel deorsum sparse paleacei. LAMINA sterilis utrinque plene vel saturate viridis, 1—2 pedes longa, 12—18 poll. lata, apice vel dimidio superiore pinnatifida, deorsum pinnata, interdum caudata bulbifera et prolifera. PINNAE inferiores 4—9 poll. longae, 1—2 poll. latae, acutae, subintegrae vel ad $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ nunc ultra pinnatifidae, PINNULIS rotundatis vel oblongis serrulatis 3—6 lin. latis. VENAE primariae ad $\frac{1}{4}$ latitudinis pinnarum distinctae parallelae, tunc evanescentes, areolis intermediis inaequalibus copiosis, venulas liberas paucas vel multas includentibus. Lamina fertilis 9—15 poll. longa, 6—9 poll. lata, sursum pinnatifida, deorsum pinnata, pinnis remotis plerumque 3—6 lin. latis, interdum plus minus pinnatifidis.

Habitat in sylvis umbris et ad ripas rivulorum prov. do Alto Amazonas, e. gr. in Serra do S. Gabriel: Spruce 2121!; in prov. Para, ad cataractas fluvii Aripicuru: Spruce 577!; porro in Guiana gallica (Leprieur!), britannica (Appun 432!), et in terris inde e Peruvia ad Mexicum et Cubam. — Najas et Extrabrsil.

Obs. Species quoad dissectionem, magnitudinem et venationem valde variabilis.

37. ACROSTICHUM NICOTIANAEFOLIUM SWARTZ: frondibus sterilibus papyraceis nudis deltoideis simpliciter pinnatis, pinna terminali distincta oblongo-lanceolata, lateralibus lanceolatis integris sessilibus 1—3- vel raro 5—6-jugis, venis primariis paene ad marginem egredientibus, venulis transversalibus arcuatis parallelis, areolis minutis venulas copiosas includentibus; frondibus fertilibus lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis distantibus 2—3-jugis integris ligulatis.

Tabula nostra XXXIX. Fig. 9. (pinna).

- Acrostichum nicotianaefolium Swartz, Syn. Fil. 13. 199. Willd. Sp. Plant. V. 118. Hook. Gard. Ferns tab. 26. Hook. Sp. Fil. V. 275. Ettingsh. tab. 6. fig. 4.*

Polypod.

Gymnopteris nicotianaefolia Presl, Tent. 244. t. 11. fig. 6. Fée, Acrost. 86. t. 46. fig. 1. Moore et Houlst. Gard. Mag. Bot. III. 134. fig. 31.

Chrysodium nicotianaefolium Metten. Fil. Hort. Lips. 22.

Anapausia nicotianaefolia Presl, Epim. 189.

Acrostichum acuminatum Willd. Sp. Plant. V. 116.

Gymnopteris acuminata Presl, Tent. 244. Fée, Acrost. 85. t. 46. fig. 2., excl. syn.

Heteroneuron meniscioides Fée, Acrost. 93. t. 55.

CAUDEX lignosus, crassitie interdum digiti, breviter repens, PALKIS subulatis saturate brunneis patentibus membranaceis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis juventute vestitus. STIPITES segregati, modice validi, stricti, griseo-straminei, 12—18 poll. longi, deorsum sparse paleacei. LAMINA sterilis utrinque nuda, plene viridis, 12—18 poll. longa et lata. PINNA terminalis 6—12 poll. longa, 2—4 poll. lata, acuta, integra vel repandula; laterales lanceolatae, contiguae, integrae vel repandulae, acutae, 6—9 poll. longae, 1—3 poll. latae, subsessiles, basi aequaliter cuneata. VENAE primariae parallelae, adscendentes, 3—6 lin. distantes, e costâ paene ad marginem egredientes, venulis transversalibus arcuatis parallelis colligatae, areolis intermediis minutis copiosis venulas liberas conspicuas includentibus. Lamina fertilis minor, pinnis adscendentibus, 3—4 poll. longis, 6—12 lin. latis.

Habitat in sylvis humidis ad terram et arbores in prov. Para juxta Tanaú ad Rio Acara: Spruce 28!; in prov. Bahia: Blanchet!; in Guiana anglica (Appun 882!) et inde e Columbia ad Mexicum et insulas Antillanas. — Dryas, Najas et Extrabrsil.

38. ACROSTICHUM SERRATIFOLIUM MERT. frondibus sterilibus papyraceis nudis oblongo-lanceolatis totis simpliciter pinnatis, pinnis 3—10-jugis ligulatis repando-serratis, inferioribus breviter petiolatis, venis primariis parallelis extrorsum dispersis, areolis copiosis, venulis liberis inclusis nullis; frondibus fertilibus lanceolatis, pinnis 6—12-jugis distantibus ligulatis integris obtusis.

Tabula nostra XXXVIII. Fig. 18—22. (pinnae).

Acrostichum serratifolium Mert. in Kaulf. Enum. 66. Hook. Sp. Fil. V. 263. Hook. et Baker, Syn. Fil. 423.

Heteroneuron serratifolium Fée, Acrost. 94. t. 55. fig. 3.

Bolbitis serratifolia Schott, Gen. Fil. cum icon.

Acrostichum fraxinifolium Presl, Del. Prag. I. 160., non Willd.

Poecilopteris fraxinifolia Presl, Tent. 242.

Chrysodium serratifolium Ettingsh. tab. 8. fig. 3., tab. 12. fig. 1—3., tab. 13. fig. 10—11.

CAUDEX lignosus, crassitie interdum digiti, breviter repens, PALKIS linearibus membranaceis obscure brunneis $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longis vestitus. STIPITES erecti, subfasciculati, stricti, straminei, 12—18 poll. longi, deorsum sparse paleacei. Lamina sterilis utrinque plene viridis, 9—18 poll. longa, 6—12 poll. lata. PINNAE subcontiguae, leviter adscendentes, 4—6 poll. longae, 10—15 lin. latae, acutae vel acuminatae, plus minus distincte repando-serratae, basi subaequaliter cuneata, superiores sessiles, inferiores breviter petiolatae, imae mediis aequales. VENAE primariae pinnarum ad $\frac{1}{4}$ latitudinis distinctae parallelae, tunc dispersae, areolis intermediis copiosis hexagonis et trapezoides. Lamina fertilis 9—12 poll. longa, 2—4 poll. lata, pinnis 1—2 poll. longis 3—4 lin. latis.

Habitat in sylvis primaevis prov. Minas Geraës: Burchell 5929!; Rio de Janeiro: Mertens, Raddi, Langsdorff!, Gardner 217!, Dr. Hooker!, Glaziou 369! 953! 1671! 2422! etc.; S. Paulo: Burchell 3086!, e. gr. ad S. João: Regnell III. 1439!. Praeterea in Guiana gallica (Leprieur), in Peruvia et Columbia. — Dryas, Oreas et Extrabrsil.

§ 8. CHRYSODIUM.

39. ACROSTICHUM GUIANENSE BAKER: frondibus sterilibus papyraceis nudis oblongo-lanceolatis vel raro deltoideis totis simpliciter pinnatis, pinnis 8—25-jugis ligulatis acutis serrato-repandis, inferioribus distincte petiolatis, areolis costalibus deltoideis, exterioribus hexagonis, omnibus exappendiculatis; frondibus fertilibus lanceolatis, pinnis anguste ligulatis integris.

Tabula nostra XXXVIII. Fig. 16. 17. (sub titulo A. Raddiani, pinnae) et tab. LI. Fig. IV. (analysis).

Polypodium guianense et serratum Aublet, Guian. p. 962! (v. s. in *Herb. Banks.*).

Acrostichum Raddianum Kunze Mss. Hook. Sp. Fil. V. 264. Hook. et Baker, Syn. Fil. 423., non Hook. et Greu.

Heteroneuron Raddianum Fée, Acrost. 94.

Lomariopsis Raddiana Mett. ex Ettingsh. tab. 4. fig. 9. tab. 10. fig. 5.

Acrostichum scandens Raddi, Fil. Bras. 6. t. 18. (excl. syn.).

Neurocallis scandens Moore, Ind. Fil. 13.

CAUDEX lignosus, 2—4 lin. crassus, flexuosus, brunneus, late scandens, PALEIS teneribus lineari-subulatis castaneis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longis juventute vestitus. STIPITES segregati, erecti, stricti, grisei, 2—6 poll. longi, glabri, deorsum vix paleacei. LAMINA sterilis utrinque plene viridis, omnino nuda, 1—2 pedes longa, 4—15 poll. lata. PINNAE subpatentes vel leviter adscendentes, acutae vel acuminatae, basi aequaliter cuneatae, inferiores 2—8 poll. longae, 6—10 lin. latae, imae subaequales aut reductae. VENAE primariae distinctae haud obviae; areolae inter costam et marginem 3—4-seriatae, exteriores costalibus minores. Lamina fertilis 8—12 poll. longa, 4—6 poll. lata, pinnis obtusis 2—3 poll. longis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis.

In sylvis primaevis ad arbores alte scandens. In prov. Para juxta Tanai ad Rio Acara: Spruce 15! (forma deltoidea, pinnis distantibus paucijugis); prov. Rio de Janeiro: Raddi, Gardner 100!, Milne!, Glaziov 266! 372! 956! etc.; S. Paulo: Burchell 3598!. Etiam in Guiana gallica: Aublet!, Sagot 776!. — Vaga et Extrabrazil.

40. ACROSTICHUM AUREUM LINN. frondibus sterilibus magnis papyraceis vel rigide coriaceis, nudis vel subtus inconspicue hirsutis, oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis multijugis oblongo-ligulatis obtusis vel acutis integris basi aequaliter cuneatis, inferioribus petiolatis, venis primariis nullis, areolis perparvis numerosissimis exappendiculatis; frondibus fertilibus similibus, pinnis paullulum minoribus, inferioribus sterilibus.

Tabula nostra XXXIX. Fig. 10—11. (pinnae).

Acrostichum aureum Linn. Sp. Plant. 1525. Swartz, Syn. Fil. 13. Willd. Sp. Plant. V. 116. Schkuhr, Fil. t. 1. Hook. Sp. Fil. V. 266. Vell. Fl. Flum. XI. t. 92., et Auctt.

Acrostichum danaeaeifolium Langsd. et Fisch. Ic. Fil. 5. t. 1.

Acrostichum inaequale et speciosum Willd. Sp. Plant. V. 117.

Acrostichum fraxinifolium R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 145.

Chrysodium vulgare, hirsutum, inaequale, cayennense, Urvillei, sculpturatum, speciosum, fraxinifolium et danaeaeifolium Fée, Acrost. 97—101. tab. 59—62.

CAUDEX erectus, lignosus, PALEIS oblongis obtusis membranaceis pallide brunneis apice vestitus. STIPITES fasciculati, erecti, stricti, griseo-straminei vel raro castanei, nudi, angulati, 1—2 pedes longi, validi, deorsum saepe crassitie digiti. LAMINA sterilis utrinque obscure viridis, siccitate griseo-brunnea, 2—6 pedes longa, 1—2 pedes vel ultra lata. PINNAE contiguae, superiores sessiles, inferiores breviter petiolatae, 6—12 poll. vel ultra longae, 1—3 poll. latae, margine distincto cartilagineo incrassato cinctae. VENULAE plerumque utrinque plus minus distincte exsculptae; areolae numerosissimae perparvae, costalibus exceptis anguste hexagonae, omnes exappendiculatae.

Species cosmopolita per regiones calidiores et austro-temperatas totius orbis divulgata, etiam in Brasilia frequentissima, locis praecipue paludosis salsis ad littora maris degens, ab omnibus fere collectoribus reportata.

ADDENDA ET EMENDANDA.

Ad pag. 308 n. 2. *Cyathea arborea*: Var. β . REGNELLI Baker. Quoad texturam, magnitudinem, venationem et dissectionem omnino cum planta typica congruit, sed indusium multo tenerius, rachis primaria castanea nitida, raches secundariae et lamina subtus praecipue ad costas pinnularum paleis minutis albidis membranaceis linearibus vel lanceolatis instructae. Venulae solum infimae segmentorum in speciminibus suppetentibus soriiferae.

A planta typica praecipue fabrica indusii recedit et ad *Cyatheam Schanschin* vergit.

Ad Retiro da Lagem prov. S. Paulo: Regnell III. 1479!

Ad p. 314 n. 4. *Hemitelia multiflora*: Var. ϵ . BORYANA Baker.

Hemitelia Boryana Metten. ex Kuhn in Linnaea XXXVI. 161.

Ad var. β . Sprucei nostram proxime accedit. Lamina supra ad costas pinnularum inconspicue pubescens; pinnulae 3—4 poll. longae, 9—10 lin. latae; segmenta conferta 2 lin. lata, ad alam $\frac{1}{2}$ —1 lin. latam confluentia, paullulum falcata, distincte inciso-crenata; venulae 7—8-jugae, pleraeque fertiles.

Habitat in Guiana gallica: Poiteau! et Leprieur 265a, teste Kuhn loc. cit.

Ad p. 316 n. 7. *Hemitelia capensis*. Nuperrime in Serrados Orgãos a cl. GLAZIOU (n. 3583!) lecta cum pinnis accessoriis hymenophylloideis bene evolutis.

Ad p. 316. n. 8. *Hemitelia platylepis*. Addas ad descriptionem: „CAUDEX 10—15-pedalis, tenuis, super totam longitudinem basibus stipitum persistentibus obtectus. STIPITES 2-pedales et longiores“. SPRUCE in litt.

In p. 319. post *Alsophilam Taenitidem* inseratur:

2/3. ALSOPHILA GLAZIOVII BAKER: stipitibus nudis nitidis inferne muricatis, frondibus bipinnatis subcoriaceis utrinque glabris, pinnis oblongo-lanceolatis distincte petiolatis, pinnulis 12—14-jugis lineari-ligulatis acutis crenulatis basi subcuneatis omnibus distincte petiolatis, venis in fasciculo 2—5, fasciculis utrinque 20—25 pro pinna; soris irregulariter uniseriatis, costae magis quam margini approximatis.

CAUDEX arboreus. STIPITES pedales et ultra, griseo-castanei, glaberrimi, deorsum dense muricati, basi dense paleacei. PALEAE brunneae, firmo-membranaceae, margine inconspicue fimbriato-ciliatae, inferiores lineares, acuminatae, 12—15 lin. longae, superiores breviores et latiores (basi 2 lin. latae). LAMINA perfecte bipinnata, in speciminibus nostris 2 pedes lata, supra plene viridis, subtus pallidior. RACHES griseae, nuda. PINNAE

12—14 poll. longae, 4—4½ poll. latae, horizontaliter patentes, petiolis interdum 1 poll. longis instructae. PINNULAE laxae, 12—15-jugae, patentes, alternae vel suboppositae, inferiores 2—2¼ poll. longae, 6—7 lin. latae, omnes petiolis basi articulatis 1½—2 lin. longis instructae, imae haud vel vix reductae. VENAE distinctae, paullulum adscendentes, in fasciculis centralibus 3—4, in exterioribus geminatis. SORI ½ lin. lati. RECEPTACULUM globosum, paraphysibus ferrugineis dense crinitum.

Species nova pulchra a diligentissimo A. GLAZIOU in sylvis montium Serra dos Orgãos nuperrime detecta, et sub No. 3582! missa, ad *A. Taenitidem* habitu quam maxime accedit, sed facile distinguenda textura minus coriacea, pinnulis paucioribus multo brevioribus crenulatis, venis multo laxioribus (in illa utrinque 40—50 pro pinna offenduntur), soris paucioribus majoribus.

Ad p. 319 n. 3. *Alsophila elegans* etiam prope Rio de Janeiro detecta est: Glaziou 2828!

Ad p. 342 n. 4. *Dicksonia rubiginosa* etiam in prov. Minas Geraës ad Caldas occurrit: Regnell II. 322. ex partel.

In p. 342 ad tribum *Dicksoniearum* adde:

Ia. WOODSIA R.Br.

WOODSIA R. Brown, Linn. Soc. Transact. V. 173. t. 11. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 119. Hook. Sp. Fil. I. 59. — PHYSEMATIUM Kaulf. Regensb. Flora 1829. p. 341. Link, Hort. Berol. II. 133. Kunze, Anal. Pter. t. 27. — HYMENOCYSTIS C. A. Meyer, Verz. Cauc. 229. Hook. et Bauer, Gen. Fil. t. 3. — Acrostichi sp. Linn. — Polypodii sp. Swartz.

SORI globosi, quoad laminam et saepissime quoque quoad venas dorsales. INDUSIUM cupuliforme, membranaceum, margine lobato vel fimbriato.

Tabula nostra LI. Fig. VI.

CAUDEX erectus vel subdecumbens, STIPTIBUS fasciculatis interdum medio articulatis. FRONDES conformes, parvae, herbaceae, 2—3-pinnatifidae. RECEPTACULUM punctiforme. INDUSIUM inferum, sub soro omnino continuum, margine longe fimbriato (Euwoodsia), vel (in sectione nostra *Physematium*) majus, primum globosum sorum involvens, demum irregulariter ruptum. — Species 12—15, praecipue montes zonae boreali-temperatae incolunt.

1. WOODSIA MOLLIS J. SMITH: paleis lanceolatis, stiptibus fasciculatis haud articulatis basi praecipue paleaceis, frondibus herbaceis pubescentibus lanceolatis utrinque attenuatis bipinnatis, rachibus breviter glanduloso-pubescentibus, pinnis 25—30-jugis lineari-lanceolatis obtusis deorsum ad costam pinnatis sessilibus basi truncatis, inferioribus sensim decrescentibus, pinnulis oblongo-lanceolatis obtusis crenatis, venulis pinnularum 2—5-jugis plerisque furcatis; soris marginalibus, indusio membranaceo haud fimbriato.

Tabula nostra LI. Fig. VI. (analysis).

Woodsia mollis J. Smith, Gen. Fil. 79. Hook. Sp. Fil. I. 79. Lowe, Ferns 7. t. 26. Hook. et Baker, Syn. Fil. 47. Kuhn, Beitr. Mexican. Farnkr. 16.

Physematium molle Kunze, Regensb. Flora I. 341. Anal. Pter. 41. t. 27.

Woodsia fragilis Liebm. Mex. Bregn. 128.

Woodsia guatemalensis Hook. Sp. Fil. I. 60. tab. 21A. Hook. et Baker, Syn. Fil. 27.

Cheilanthes canescens Kunze in Linnaea XIII. 143. et in Schkuhr Suppl. 71. t. 35.

CAUDEX suberectus, PALEIS ferrugineis membranaceis 1½—2 lin. longis sursum dense vestitus. STIPTITES 3—5 poll. longi, fragiles, stramineo-rufescentes, basi praecipue paleacei, sursum tenuiter griseo-pubescentes. LAMINA utrinque praecipue infra pills mollibus patentibus pellucidis vestita, 6—12 poll. longa, medio 2½—3 poll. lata. RACHIS obscure straminea, fragilis. PINNAE mediae confertae, 15—18 lin. longae, 3½—4 lin. latae, deorsum ad costam pinnatae, inferiores sensim reductae, imae multo minores et laxiores. PINNULAE imae 2 lin. longae, vix 1 lin. latae, marginibus siccitate revolutis. VENAE pinnularum pinnatae, venulis 4—5-jugis erecto-patentibus plerisque furcatis. SORI magis, marginales, 2—6 pro pinnula. INDUSIUM membranaceum, irregulariter ruptum, demum penitus vel omnino occultum.

Habitat in prov. Minas Geraës ad rupes prope Caldas: Regnell III. 1445!. Praeterea incolit Andes e Peruvia ad Mexicum. — Oreas et Extrabrazil.

Ad p. 345 n. 2. *Davallia thecifera* nuperius etiam in prov. Minas Geraës ad Caldas lecta est: Regnell III. 1484!

Ad p. 346 n. 4. *Davallia Sprucei* nob., teste Kuhn in Linnaea XXXVI. 79., eadem est species ac *D. meifolia* H.B.K. Nov. Gen. I. 23. Hook. Sp. Fil. I. 189. = *Darea fumarioides* Willd. Sp. Fil. V. 299. = *Caenopteris fumarioides* Desv. Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 268.

p. 358. ad calcem generis *Lindsayae* observetur: *Lindsaya sectorifolia* Goldm. (Pl. Meyen 464.), teste KUNZIO, qui specimen originarium examinavit, nil est nisi *Adiantum flabellatum* Linn. Sed quum haec species patriam in Asia habeat, locus natalis qui *Lindsayae sectorifoliae* adscribitur, nempe mons Corcovado prope Rio de Janeiro, valde dubius mihi videtur.

Ad p. 363 n. 2. *Adiantum caudatum* var. *β. rhizophyllum* crescit etiam in prov. Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming!, et in prov. Bahia prope Cachoeira: Lieut. Carr!

Ad *Adiantum cuneatum* (p. 367.) adde var. *β. majus* Baker: segmenta aequaliter cuneata, 6—7 lin. longa et lata, ad dimidiam longitudinis dissecta, dimidio inferiore integro cuneato; vel interdum segmenta subrhomboidea in latere quoad rachem exteriore producta.

Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming!; ad Caldas: Regnell I. 488!; S. Catharina: Fritz Müller!.

Varietas ad *A. tenerum* accedens, et sub hoc nomine saepe in hortis et herbariis divulgata.

Ad p. 369 n. 11. *Adiantum sinuosum* etiam in campis argillosis prope Lagoa Santa prov. Minas Geraës occurrit: Warming!

p. 373 ad *Adiantum Lanceam* addatur:

ADIANTUM LINDENI MOORE (in Gardener's Chron. 1866. p. 778) a cl. LINDENIO e ditone amazonica in hortos introductum dictum, nobis nondum visum, species nova videtur ad *A. Lanceam* accedens: lamina magna tripinnata, stiptibus ebenis, rachibus supra tenuiter velutinis, segmentis ultimis oblongo-dimidiatis 18 lin. longis insigniter falcato-acuminatis margine superiore lobatis, lobis extrorsum dentatis, soris reniformibus vel oblongis.

ADIANTUM GLAUCINUM KUNZE MSS. (Ettingsh. Farnkr. 82. t. 48. fig. 7. Kuhn in Linnaea XXXVI. 74.) in Brasiliae loco

accuratius non cognito crescere dicitur, teste BONGARD. Exemplum authenticum nondum vidi, sed e descriptione et tabula adnexa varietas *A. Lanceae*, sensu nostro, videtur. Descriptionem KUHNII hoc loco repetere liceat:

„RHIZOMA repens, abbreviatum; FOLIA stricta, chartacea, tenuia, infra glaucescentia; PETIOLUS 18 poll. longus, cum rachibus ebeneis, basi sublaevis, superne cum rachibus paleaceo-villosus; LAMINA 18 poll. longa, subovato-oblonga, basi tripinnatisecta; SEGMENTA primaria 10—12-juga, subdistantia, petiolata, pleraque lineari-lanceolata; PINNULAE numerosae, approximatae, subsessiles, e basi inferiore dimidiata, superiore truncata, breviter auriculata, dimidiato-ovato-oblongae, obtusae, incisae, superiores in segmentum rhombeo-lanceolatum abbreviatum confluentes; lobi steriles denticulati, fertiles retusi; SORI oblongi, 2—3 in margine superiore, rarius 1—2 in margine antico.“

Ad p. 380. *Adiantum dolosum*: Ab *A. doloso* originario e Bahia proveniente cl. KUHN plantam guianensem specificè distinxit et in *Linnaea* XXXVI. 72. sub nomine *Adiantum macropteri* Miq. Mss. plene descripsit. A planta typica hoc differt pinnis basi inferiore non cuneato-truncata sed sicut basis superior anguste rotundata; sed specimina a cl. SEEMANNIO e Columbia reportata omnia pinnis multo latioribus donata inter formas illas ambigunt, et in Wilsonianis ex Antillis missis et aliis omnino similibus a cl. TATE nuperrime in Nicaragua lectis, omnium maximis, pinnae interdum 18—20 lin. latas habentibus (*A. Wilsoni* Hook. Sp. Fil. II. t. 172.), latus pinnarum inferioris saepe productum et basis late rotundata exstat. Hae omnes igitur sententia nostra speciem unicam variabilem constituunt.

Ad p. 383 n. 1. *Hypolepis repens* sententia nostra includit etiam *H. mitem* Kunze Mss., Kuhn in *Linnaea* XXXVI. 105. (Gardner 199! etc.). Hanc speciem nuperius etiam e prov. Minarum misit cl. Regnell (II. 322! ex parte).

Ad p. 396 n. 2. *Pellaea columbina* Hook. novissimo tempore in vicinia Rio de Janeiro a cl. Glaziou n. 2807! lecta est.

In p. 397 ad PELLAEAM § *Eupellaeam* adde speciem insequentem novam:

2/3. PELLAEA GLAZIOVII BAKER: frondibus chartaceo-coriaceis utrinque nudis hastato-deltoides, fertilibus palmatifidis, divisionibus 5 acutis integris, summa lanceolata ad $\frac{3}{4}$ longitudo frondis ingrediente, lateralibus brevioribus, sinu basali deltoideo, sterilibus minoribus ternatis et divisionibus latioribus obtusis, venis liberis laxis pinnatis, soris primum punctiformibus cito confluentibus.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS lineari-subulatis patentibus firmis centro castaneis marginibus cito pallidioribus $2\frac{1}{2}$ —3 lin. longis dense vestitus. STIPITES caespitosi, firmi, flexuosi, graciles, nudi, nitidi, castaneo-ebenei, frondis steriles 2—3 $\frac{1}{2}$, fertiles 5—6 $\frac{1}{2}$ poll. longi. LAMINA fertilibus utrinque concolor, pallide viridis, 3—3 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 2 poll. lata. Diviso intermedia lanceolata, 2 poll. longa, deorsum 8—9 lin. lata, acuta, integra, basi paullulum angustata; laterales lanceolato-deltoides, erecto-patentes, paullulum asymmetricae, 9—12 lin. longae, basi 6—8 lin. latae; basales deflexae, deltoideae, acutae, 4—6 lin. longae et latae. Sinus basalis deltoideus, superiores angustiores, ab apice petioli 6—7 lin. distantes. Laminae steriles divisiones fertilibus latiores et multo breviores. COSTAE ex apice petioli ad apices divisionum procurrentes; VENAE distinctae, adscendentes, curvatae, prope basin furcatae et inferiores repetito-furcatae, nunquam anastomosantes. INDUSIUM subcontinuum, modice latum, persistens, valde inciso-crenatum.

Var. β . MINOR Baker.

Typo multo minor et gracilior; frons fertilibus 6—8 lin. longa et lata, divisionibus omnibus obtusis, stipite gracillimo 3—12 lin. longo.

Ad *Pteris pedatae* var. *euchloram* habitu accedens, sed facile distinguitur venis distinctis sublaxis liberis et fructificatione *Pellaeae* genuina.

Etiam hanc speciem indefesso A. Glaziou debemus, qui eam prope Rio de Janeiro invenit et typum sub n. 2053!, varietatem sub n. 3158! 3159! transmisit.

Ad p. 399 ante n. 1. *Pteridem creticam* inseratur:

1a. PTERIS (EUPTERIS) TRIPHYLLA BAKER: paleis parvis firmis linearibus, stipitibus fasciculatis castaneis totis inconspicue paleaceis, frondibus (pro sectione perparvis) crasse coriaceis utrinque glabris pallide viridibus simplicibus, lineari-ligulatis integris acutis basi cordatis, vel tripartitis segmentis consimilibus sessilibus, lateralibus erecto-patentibus, venis liberis immersis occultis simplicibus vel unifurcatis, indusio firmo glabro.

CAUDEX lignosus, breviter repens, PALEIS centro castaneis margine pallidis membranaceis dense vestitus. STIPITES firmi, erecti, teretes, graciles, substricti, $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ poll. longi, toti paleis minutis linearibus brunneis membranaceis vestiti. LAMINA utrinque pallide viridis, nunc simplex, lineari-ligulata, 1 $\frac{1}{2}$ —2 poll. longa, 2—3 lin. lata; nunc tripartita (dimensione et circumscriptione *Cassebeeram triphyllam* aemulans), segmento centrali 2 poll. longo, lateralibus paullulum minoribus. COSTAE castaneae, paene usque ad apicem frondis vel segmentorum distinctae. VENAE adscendentes, modice laxae, parallelae, simplices vel prope basin unifurcatae. SORI omnino continui, marginem totum frondis fertilibus occupantes, indusio brunneo.

Nuperrime a cl. Glaziou ad Rio de Janeiro detecta (n. 3160!). — *Dryas*.

1b. PTERIS (EUPTERIS) LONGULA METT. (Kuhn in *Linnaea* XXXVI. 88.). „Rhizoma?; folia coriacea, supra nitida glaberrima; petiolus 1—5 poll. longus, supra sulcatus; lamina 1—4 poll. longa, 2—4 lin. lata, e basi latiore cordata elongata, indivisa, integerrima, rarius lacinia una alterave laterali praedita; nervi immersi bis furcati apice sub foveola intramarginali desinentes; sori continui; indusium latiusculum.“

Habitat in Brasilia, Serra dos Orgãos (testibus Auctt.).

„Specimina observata faciem prae se ferunt plantae involutae, sed petiolo supra sulcato ab omnibus speciebus proximis nervis liberis instructis recedens.“ Mett. et Kuhn loc. cit.

Ad p. 401 n. 3. *Pteris quadriaurita* etiam in vicinia urbis Rio de Janeiro lecta est a Lieut. Carr! et Glaziou 3567!.

In p. 418 ad calcem generis *Lomariae* adde:

§ 2. PLAGIOGYRIA KUNZE in Schkuhr Suppl. II. 61.

A § 1. *Eutomaria* insigniter recedit capsulis annulo paullulum obliquo et stipitibus basi incrassatis glanduloso-tuberculatis.

7. LOMARIA SEMICORDATA BAKER: stipitibus elongatis stramineis nudis, frondibus sterilibus oblongo-lanceolatis herbaceis utrinque glabris, pinnis contiguas 30—50-jugis anguste lineari-ligulatis argute serratis basi prorsus adnatis, inferioribus laxis reductis.

Lomaria semicordata Baker in Hook. et Baker, *Syn. Fil.* 182.

Lomariidium semicordatum Presl, *Epim.* 155.

Lomaria biserrata Mert. et Lind. Mss. Hook. Sp. Fil. III. 19.

Plagiogyria biserrata Metten. Farnghatt. II. *Plagiog.* 7. t. 15. *Ann. Sc. Nat. V. Ser. II.* 262.

Lomaria pectinata Liebm. Mex. Bregm. 13.

CAUDEX brevis erectus. STIPITES nudi, stramineo-grisei, dense-fasciculati, stricti, basi brunnei, incrassati, glanduloso-tuberculati, frondis steriles 4—12 poll., fertiles 9—18 poll. longi. LAMINA sterilibus utrinque viridis, 1—2 pedes longa, 4—6 poll. lata, simpliciter pinnata; PINNAE 30—50-jugae, patentes vel leviter adscendentes, mediae 2—3 poll. longae, 3—4 $\frac{1}{2}$ lin. latae, acutae, argute inciso-dentatae, basi prorsus adnatae vel paullulum dilatatae, superiores et mediae contiguae, inferiores laxiores

distincte reductae; VENIS distinctis liberis modice confertis, paullulum adscendentibus, plerisque ad basin unifurcatis. Lamina fertilis sterili similis, sed pinna angustioribus ($1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis) basi distincte separatis. INDUSIUM firmum, angustum, glabrum.

Fitis hucusque solummodo e terris inde e Peruvia ad Mexicum cognita, recentiore tempore etiam ad Rio de Janeiro detecta est, a. cl. A. Glaziou (n. 3326!), cui Flora Janeiroensis tam numerosa jam additamenta debet.

Ad p. 440 n. 15. *Asplenium formosum*. Ad locos natales adde: Rio de Janeiro, Glaziou n. 3561.

In p. 489 ad § *Eunephrodium* adde:

36/7. NEPHRODIUM NITIDULUM BAKER: stipitibus elongatis rufescentibus basi solum paleaceis, frondibus chartaceis nitidis subtus juventute sparse paleaceis oblongo-lanceolatis bipinnatifidis, pinnis ligulato-lanceolatis ad costam late alatum pinnatifidis, inferioribus petiolulatis basi truncatis, pinnulis ligulatis confertis obtusis subintegrissimis leviter falcatis, infimis distincte reductis, venulis 7—9-jugis omnibus simplicibus, infimis solum anastomosantibus, soris submedialibus.

Aspidium nitidulum Kunze Mss. *Ettingsh. Farnkr. t. 123. fig. 3.*

Aspidium catacolobum Kunze Mss. *Ettingsh. t. 126. fig. 9. 10.*

Aspidium anopteron Kunze Mss. *Kuhn, Linnæa XXXVI. 113.*

Aspidium lonchophyllum Kunze Mss.

Nondum vidi, igitur descriptionem cl. KUHN loc. cit. repeto: „Rhizoma deest; FOLIA chartacea, nitida, infra scabriuscula et ad costas PALEIS lanceolatis sparse obsita, denique glaberrima; PETIOLUS ad $2\frac{1}{2}$ pedes longus, livido-rufescens, basi paleis membranaceis fuscis ovato-lanceolatis setis trifurcatis minutis obsitis sparse vestitus; rachis tenuissime pubescens; LAMINA 2 pedes longa, elongato-oblonga, acuminata, pinnatisecta; SEGMENTA distantia, patentia-divergentia, petiolo 1 lin. longo insidentia, $4\frac{1}{2}$ poll. longa, 9—10 lin. lata, e basi rotundato-truncata, inaequali, superiore magis in petiolulum descendente, inferiore latiore, lanceolata vel oblonga sensim attenuata, acuminata, pinnatifida vel subcrenata; LOBI brevissimi sinibus acutis breviter hyalinis distincti, ala 3 lin. lata coadunati, semioblongi, obtusi, inferiores lateris superioris decrescentes hinc inde subsoluti, lateris superioris segmentorum paullulum abbreviati, superiorum maximi; COSTULAE sub angulo 70—80° decurrentes; NERVI manifesti, utrinque 7—9, infimi anastomosantes, proximi cum radio macularum ad sinus hyalinos anastomosantes, secusque membranam hyalinam sinuum cum proximis superioribus confluentes, superiores liberi, omnes soriferi; SORI costulis potius quam margini approximati; INDUSIUM margine setis furcatis obsitum; SPOANGIA setis bi—trifurcatis instructum.“

„Bahia: Moricand.“ KUHN loc. cit.

In p. 499 ad § *Eupheopteridem*, ante speciem 1. *Polypodium rotundatum*, adde novum:

1a. POLYPODIUM CARRII BAKER: stipitibus elongatis stramineis juventute sparse paleaceis, frondibus herbaceis saturate viridibus supra glabris subtus ad costas sparse paleaceis oblongo-lanceolatis simpliciter pinnatis, pinnis 12—16-jugis lineari-ligulatis petiolatis acuminatis crenatis deorsum inaequaliteralibus, basi superiore cum rache parallela, inferiore rotundata vel in infimis subcuneata, imis vix reductis, venulis 3—4-jugis supremis solum marginem attingentibus, soris ad costulas approximatis.

Caudicem et paleas basales non vidi. STIPITES ad minimum 9 poll. longi, stricti, modice crassi, valde sulcati, demum calvati. LAMINA supra glabra saturate viridis nitidula, infra pallidior et praecipue ad costas PALEIS minutis laxis lanceolatis ferrugineis vestita, 12—15 poll. longa, 8—9 poll. lata, apice pinnatifido excepto simpliciter pinnata. RACHIS substraminea, antice canaliculata, paleis parvis lanceolatis ferrugineis membranaceis modice vestita. PINNAE liberae leviter adscendenti-falcatae, contiguae, inferiores distincte petiolatae, lineari-ligulatae, $3\frac{1}{2}$ —4 poll. longae, deorsum 10—12 lin. latae, e basi in apicem acuminatum sensim angustatae, marginibus crenatis, dentibus obtusis paullulum falcatis $\frac{1}{2}$ —1 lin. profundis $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis. VENAE in lobis pinnatae, VENULIS oppositis distantibus adscendentibus subcurvatis. SORI parvi, 2—3-jugi.

Polypod.

Inter affines ad *Nephrodium Sancti-Gabrielii* proxime accedit; differt tamen textura herbacea, pinnis paucioribus contiguis latioribus, costulis et soris multo laxioribus, defectu indusiorum etc.

In vicinia urbis Rio de Janeiro ad Rodeio nuperrime legit Lieut. Carr!, in cujus honorem speciem nominavimus.

Ad p. 507 n. 15. *Polypodium organense* Mett. Locis natalibus adde: Rio de Janeiro, Glaziou 3573!

Ad p. 512 inter n. 23 et 24 inseratur:

23/4. POLYPODIUM CAPILLARE DESV. stipitibus fasciculatis dense pilosis interdum subnullis, frondibus subcoriaceis perfecte pendulis glabris lanceolatis utrinque angustatis simpliciter pinnatis vel raro bipinnatis, pinnis anguste lineari-ligulatis crenatis adscendentibus 30—50-jugis basi contiguis dilatatis, inferioribus laxis reductis, venulis pinnarum 10—20-jugis simplicibus vel raro furcatis, soris medialibus superficialibus.

Polypodium capillare Desv. *Ann. Linn. Soc. Paris. VI. 262. Kuhn, Linnæa XXXVI. 130.*

Polypodium decipiens Hook. *Sp. Fil. IV. 231. t. 279 b. Hook. et Baker, Syn. Fil. 329.*

Polypodium pilipes Klotzsch, *Linnæa XX. 312. Metten. Polyp. 51., non Hook.*

CAUDEX suberectus, PALEIS linearibus brunneis minimis paucis et pilis brunneis vestitus. STIPITES nunc subnulli, nunc 2—3 poll. attingentes, graciles, brunnei, juventute toti pilis brunneis patentibus suberectis $\frac{1}{2}$ lin. longis dense vestiti. LAMINA subcoriacea, utrinque glabra, pallide viridis, elongato-lanceolata, 6—12 poll. longa, 1—2 poll. lata, ut plurimum simpliciter pinnata, raro bipinnata pinnis mediis iterum pinnatis. RACHIS filiformis, ebenea, nuda vel basi pilosa. PINNAE mediae saepe valde inaequales, 12—18 lin. longae, $\frac{3}{4}$ —1 lin. latae, basi praecipue deorsum dilatatae, inferiores laxiores, multae reductae. COSTA pinnarum gracilis, immersa; VENULAE utrinque 10—20 pro pinna immersae, obscurae, laxae, simplices vel raro centrales unifurcatae, erecto-patentes, longe intra marginem evanescentes. SORI rotundati superficiales, totam latitudinem pinnarum occupantes, paraphysisibus nullis.

Habitat ad Rio de Janeiro: Glaziou 3580!. E Peruvia praeterea ad insulas Antillanas.

In p. 513 ad *Polypodium pendulum* var. γ . *Gardnerianum*. Cl. KUHN hanc formam meliorem jure, ut concedimus, sub speciei distinctae titulo, nomine *Polypodii brevistipis*, e reliquiis Mettenianis in Linnæa XXXVI. 136. plene descripsit. Species cum *P. gradato* nostro inter species suberectas ex affinitate *P. apiculati* collocanda. Diagnosin hoc loco adjicio cum adumbratione supra data conferendam.

24a. POLYPODIUM BREVISTIPES METT. et KUHN: stipitibus brevissimis fasciculatis, frondibus suberectis subcoriaceis utrinque glabris obscure viridibus lanceolatis vix ad costam pinnatis, pinnis 20—30-jugis contiguis erecto-patentibus ligulatis obtusis integris basi dilatatis confluentibus, imis ad alam costularem reductis, rachibus obscuris immersis, venulis pinnarum 8—12-jugis erecto-patentibus simplicibus distincte intra marginem evanescentibus; soris rotundatis leviter immersis, margini magis quam costae approximatis.

Var. β . SEBASTIANOPOLITANUM BAKER.

Stipites $\frac{1}{2}$ —1 poll. longi inconspicue griseo-puberuli, rachis primaria ebenea emersa, sori majores mediales.

Habitat varietas ad Rio de Janeiro: Glaziou 3577!.

24 b. POLYPODIUM ALBIDULUM BAKER: stipitibus nudis fasciculatis, frondibus subcoriaceis perfecte pendulis praecipue subtus totis albido-farinoso lanceolatis utrinque angustatis simpliciter pinnatis, pinnis anguste ligulatis adscendentibus 20—30-

jugis integris vel crenatis obtusis basi contiguis dilatatis, inferioribus laxioribus reductis, venulis pinnarum 8—9-jugis simplicibus vel raro furcatis; soris subsuperficialibus ad marginem approximatis.

CAUDEX brevis, erectus, PALEIS lineari-subulatis nitide brunneis membranaceis sursum dense vestitus. STIPITES graciles, firmi, grisei, flexuosi, nudi, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longi. LAMINA subcoriacea, obscure viridis vel paululum farinosa, subtus tota farina alba persistente obducta, 4—8 poll. longa, 9—12 lin. lata. RACHIS primaria gracilis, subimmersa. PINNAE 4—8 lin. longae, $1-1\frac{1}{2}$ lin. latae, basi contiguae prorsus adnatae praecipue infra dilatatae, imae valde reductae. COSTAE pinnarum obscurae, immersae; VENULAE omnino immersae, erecto-patentes, simplices vel raro intermediae unifurcatae, paululum intra marginem evanescentes. SORI utrinque 8—9 pro pinna, rotundati, paraphysisibus nullis.

Cum *P. capillari*, *pendulo* et *farinoso* (Hook. II. Cent. Ferns t. 47) consociandum.

Habitat in vicinia Rio de Janeiro: Glaziou 3579!

Ad p. 555 post n. 12. *Gymnogrammen insignem* adde:

12/3. GYMNOGRAMME EXTENSA BAKER: stipitibus et rachibus elongatis nitidis nudis castaneis, frondibus indefinite elongatis membranaceis pallide viridibus glaberrimis quadripinnatifidis, pinnis laxis patentibus lanceolato-deltoides breviter petiolatis, imis reductis, pinnulis contiguis, majoribus basi distinctis, segmentis oblique cuneato-flabellatis, divisionibus ultimis breviter linearibus, venis liberis ad divisiones ultimas medianis solummodo obviis, soris oblongis confluentibus.

Caudicem et paleas basales non vidi. STIPITES 8—12 poll. longi, graciles, subrecti, fragiles. LAMINA in speciminibus nostris 2—3 pedes longa, 4—6 poll. lata, utrinque pallide viridis. RACHIS omnino ut stipites, antice canaliculatae. PINNAE patentibus vel interdum leviter adscendentes vel deflexae, lanceolato-deltoides, mediae 2—3 poll. longae, deorsum 15—24 lin. latae, breviter petiolatae, in rachibus deorsum castaneis sursum anguste alatis basi 2 poll. distantes, imae multo laxiores et valde reductae. PINNULAE 7—9-jugae, oblongo-deltoides, inferiores subpetiolulatae, superiores basi cum ala angusta pinnarum confluentes, imae medii subaequales. DIVISIONES ultimae obtusae $\frac{1}{2}$ lin. latae. VENAE graciles, pellucidae. SORI parvi, oblongi, sporangii laxis, paraphysisibus nullis, demum confluentes, nunquam apices segmentorum attingentes.

Cum *Gymnogramme hirta* Desv. inter species cognitae gradu dissectionis praecipue congruit, sed longe differt frondibus glabris indefinite elongatis pinnisque distantibus etc.

In vicinia Rio de Janeiro speciem detexit cl. A. Glaziou n. 3331!

In p. 570 ad *Acrostichum simplex* var. *martinicense*. Locis natalibus adde: Rio de Janeiro, Glaziou 3316.

In p. 574 post n. 11. *Acrostichum ovatum* addatur:

11a. ACROSTICHUM SQUAMIPES HOOK. caudice longe repente sparse ramoso, frondibus longe petiolatis perparvis, steri-

libus subcoriaceis supra nudis subtus sparse paleaceis ovato-lanceolatis obtusis $1\frac{1}{2}$ —3-plo longioribus quam latis, basi spathulato-cuneatis, venis immersis modice confertis, frondibus fertilibus minoribus basi magis rotundatis.

Acrostichum squamipes Hook. Ic. Plant. t. 197. Sp. Fil. V. 228. Fée, Acrost. 53. t. 22. fig. 2. Hook. et Baker, Syn. Fil. 404.

Elaphoglossum squamipes Moore, Ind. Fil. 367.

Acrostichum ovatum Liebm. Mex. Bregm., non Hook.

CAUDEX firmus, vix ultra $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. crassus, PALEIS lanceolatis ferrugineis membranaceis 1 lin. longis haud ciliatis primum dense vestitus. STIPITES segregati, uniseriati, saepe $\frac{1}{2}$ —1 poll. distantes, firmi, stramineo-virides, paleis iis caudicis similibus sparse vestiti, frondis steriles 6—24 lin., fertiles $1\frac{1}{2}$ —3 poll. longi. LAMINA sterilis supra modice viridis, infra pallidior et paleis linearibus membranaceis ferrugineis $\frac{1}{2}$ —1 lin. longis sparse obsita, demum calvescens, 9—24 lin. longa. VENAE obscurae, intra marginem in foveolis evanescentes. Lamina fertilibus 6—9 lin. longa, 4—6 lin. lata, margine scarioso indusiiformi cincta.

Habitat ad Rio de Janeiro: Glaziou 3550!, et praeterea per terras inde e Peruvia ad Mexicum.

Sub n. 3551! cl. GLAZIOU nuperrime e vicinia Rio de Janeiro specimen unicum sterile speciei haud dubie novae misit, inter *Oligolepides* parvas juxta praecedentem collocandae sic definiendae:

11b. ACROSTICHUM PULCHELLUM BAKER: caudice erecto, paleis firmo-membranaceis saturate castaneis dentatis vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. longis dense vestito; stipitibus fasciculatis viridibus 15—21 lin. longis, paleis membranaceis lanceolatis pallide ferrugineis $\frac{1}{2}$ lin. longis pulcherrime ciliatis modice vestitis; frondibus sterilibus membranaceis pallide viridibus, praecipue subtus paleis iis stipitis consimilibus tenuiter vestitis, ovato-lanceolatis, 15—18 lin. longis, 5—8 lin. latis, acutis, basi spathulato-cuneatis; venis distinctis laxis (extrorsum $\frac{3}{4}$ lin. distantibus), in foveolis intramarginalibus evanescentibus.

Inter species cognitae maxime accedit ad *A. strictum* caractere palearum, ad *A. Lindeni* habitu universo.

Ad p. 579 n. 21. *Acrostichum Aubertii* Desv. E vicinia Rio cl. A. Glaziou nuperrime formam misit typicam (sub n. 3323! 3547!) et praeterea varietatem insequentem novam:

Var. β . SEBASTIANOPOLITANUM Baker.

Caudex minus repens; paleae caudicis et stipitis latiores, lanceolatae, obscure brunneae (in forma typica lineari-subulatae castaneae exstant); frondes steriles 12—15 poll. longae, stipitibus 3—9 poll. longis.

Var. ad Rio de Janeiro: Glaziou n. 3322! 3548! 3549!.

TABULAE EXPLICATAE.

- Tab. XX. Fig. 1—2. *Cyathea Gardneri* (p. 307), pinnula et apex pinnae.
 3—4. „ *arborea* (p. 308), pinnula et medium pinnae.
 5—6. *Alsophila aspera* (p. 325), pinnulae.
 7—8. *Dicksonia cicutaria* (p. 341), pinnulae.
 9—11. *Alsophila phalerata* (p. 326), pinnulae.
 12—13. „ *armata* (p. 331), pinnulae.
 14. „ *infesta* (p. 327 in Obs.), pinnula.
 15—16. *Davallia Speluncae* (p. 349), pinnula et apex pinnae.
 17—19. *Alsophila ferox* (p. 330), pinnulae.
 20. *Dicksonia Sellowiana* (p. 340), apex pinnae.
 21. *Hemitelia multiflora* var. *Hostmanni* (p. 314), apex pinnae.
 22. „ *grandifolia* (p. 311), pinna.
- XXI. Fig. 1—3. *Dicksonia cicutaria* (p. 341), pinnae et partes pinnarum.
 4—5. „ *rubiginosa* (p. 342), pinnulae.
 6—8. *Davallia inaequalis* (p. 348), partes pinnarum.
 9. „ *inaequalis* var. *nigricans* (p. 348 in Obs.), apex pinnae.
 10—12. „ *Speluncae* (p. 349), pinnulae.
 13—14. „ *theceifera* (p. 345), frons parva et pars frondis.
 15. „ *Saccoloma* (p. 347), pinna.
 16—17. *Lindsaya trapeziformis* (p. 355), partes pinnarum.
 18—19. „ *trapeziformis* var. *falcata* (p. 355), pinnulae.
 20—21. „ *trapeziformis* var. *arcuata* (p. 355), partes pinnarum.
 22—25. „ *stricta* (p. 353), partes pinnarum.
- XXII. Fig. 1. „ *trapeziformis* var. *laxa* (p. 355), pinna.
 2. „ *trapeziformis* var. *arcuata* (p. 355), pars pinnae.
 3—4. „ *guyanensis* (p. 354), pinnae.
 5—6. *Adiantum sinuosum* (p. 369), pinnula et apex pinnae.
 7—9. „ *tenerum* (p. 382 in Obs. I.), apices pinnarum.
 10—11. „ *lunulatum* (p. 361), frons et pars frondis.
 12—14. „ *subcordatum* (p. 365), pinnulae.
 15. „ *lucidum* (p. 376), pinna parva.
 16—19. „ *cuneatum* (p. 367), apices pinnarum.
 20—21. „ *concinnum* (p. 382 in Obs. II.), apices pinnarum.
 22—23. 27. „ *macrophyllum* (p. 378), pinnulae.
 24—26. „ *trapeziforme* (p. 368), apex frondis et pinnulae.
 28. „ *platyphyllum* (p. 363), pinna sterilis.
- Tab. XXIII. Fig. 1—2. *Adiantum pectinatum* (p. 374), apex et pars pinnae.
 3—4. „ *curvatum* var. *brasiliense* (p. 376), pinnulae.
 5—6. „ *polyphyllum* (p. 370), pinnulae.
 7. 13. „ *Lancea* (tetraphyllum, p. 373), partes pinnarum.
 8. „ *serrato-dentatum* (p. 372), apex pinnae.
 9. „ *villosum* (p. 379), apex pinnae.
 10—12. „ *pulverulentum* (p. 379), apices pinnarum.
 14. „ *intermedium* (p. 364), apex frondis.
 15—16. *Cheilanthes chlorophylla* (p. 388), apex frondis et pinnae.
 17—18. „ *radiata* (p. 387), frons parva et pinna.
 19. *Hypolepis nigrescens* (p. 384 in Obs.), apex pinnae.
 20. „ *parallelogramma* (p. 384 in Obs.), apex pinnae.
 21—22. *Pteris viscosa* (p. 404), partes superiores pinnarum.
- XXIV. Fig. 1—2. *Hypolepis repens* (p. 383), apices pinnarum.
 3. 10. *Pteris leptophylla*, var. *gracilis* (p. 413), pinnae inferiores. (Lapsu supra p. 413 tab. XXIII. citata).
 4. 8. 14. „ *quadriaurita* (p. 401), partes pinnarum.
 5—7. „ *deflexa* (p. 402), partes pinnularum.
 9. „ *denticulata* (p. 410), apex frondis.
 11—13. „ *aquilina* var. *arachnoidea* (p. 403), apices frondium.
 15. „ *incisa* (p. 408), apex pinnulae.
- XXV. Fig. 1—2. „ *pedata* var. *palmata* (p. 408) frondes.
 3. „ *sagittifolia* (p. 405), frons.
 4. „ *pedata* (p. 407), frons.
 5—6. „ *incisa* (p. 408), partes pinnarum.
 7—9. „ *decurrens* (p. 411), partes pinnarum.
 10. „ *aculeata* var. *propinqua* (p. 412), pinnula.
 11—13. *Blechnum serrulatum* (p. 426), pinnulae.
 14—15. „ *Lanceola* (pag. 420), frondes parvae.
- XXVI. Fig. 1—2. *Pteris aculeata* var. *propinqua* (p. 412), frons sterilis parva et pinna ima ejusdem.
 3. „ *denticulata* var. *brasiliensis* (p. 410), frons.
 4. „ *decurrens* (p. 411), apex pinnae.
 5—7. *Blechnum brasiliense* (p. 422), pinna et partes pinnarum.
 8—9. „ *unilaterale* (p. 422), frondes.
 10. „ *occidentale* (p. 425), apex frondis.
 11—13. *Asplenium pulchellum* (p. 441), frondes et pinna.

- Tab. XXVII. Fig. 1—3. *Blechnum asplenioides* (lapsu in tabula sub nomine *B. polypodioidis*, p. 421), frons et frondium partes.
- 4—5. „ *longifolium* var. *gracile* (p. 434), pinna fertilis et frons parva sterilis.
- 6—7. *Lomaria capensis* (procera, p. 417), pinnae.
8. *Asplenium abscissum* (firmum, p. 437), pinna.
9. 10. 22. „ *lunulatum* (p. 435), frons et frondium partes.
11. 12. „ „ var. *erectum* (p. 438), pinnae.
- 13—16. „ *Shepherdii* (p. 452), pinnae.
17. „ *auriculatum* (p. 440), pinnae.
- 18—21. „ *Serra* (p. 439), pinnae.
23. „ *serratum* (p. 431), apex frondis.
24. „ *pulchellum* (p. 441), pars frondis.
- XXVIII. Fig. 1—2. „ *celtidifolium* (p. 451), pinnae.
3. „ *angustatum* (p. 446), apex frondis.
4. „ *auritum* (p. 438), frons.
5. „ *pseudo-nitidum* (p. 446), apex pinnae.
6. „ *radicans* (p. 454), pinnula.
- 7—8. „ *plantagineum* (p. 449), frondes.
- 9—12. *Aspidium aculeatum* var. *phogopteroideum* (p. 462), pinnae et partes pinnarum.
13. „ *nobile* (p. 466 in Obs.), pinna.
- XXIX. Fig. 1—2. „ *meniscioides* (p. 464), pinnae steriles.
- 3—4. „ *capense* (coriaceum, pag. 463), pinnae.
- 5—6. „ *abbreviatum* (p. 464), pinnae.
- 7—8. *Didymochlaena lunulata* (p. 459), partes pinnarum.
- 9—10. *Nephrodium conterminum* var. *oligocarpum* (p. 477), pinnae.
- 11—12. „ *vestitum* (p. 473), pinnae.
- XXX. Fig. 1—2. *Aspidium trifoliatum* (p. 466), pinnae.
3. *Nephrodium conterminum* (p. 476), pars centralis frondis.
- 4—5. „ *effusum* (p. 485), partes pinnularum.
- 6—8. „ *molle* (p. 488), pinnae.
- 9—10. „ *patens* (p. 469), pinnae.
11. „ *denticulatum* (p. 482), pinna.
12. „ *villosum* (p. 483), apex pinnulae.
- 13—15. „ *unitum* (p. 486), pinnae.
- XXXI. Fig. 1. „ *triste* (p. 476), pars pinnae.
2. „ *tetragonum* (lapsu lugubre, p. 475), pinna.
3. *Aspidium* (lapsu *Nephrodium*) *plantagineum* (p. 465), frons.
4. *Nephrodium macrophyllum* (p. 490), pinna.
5. *Oleandra nodosa* (p. 495), pars frondis.
- 6—10. *Nephrolepis exaltata* var. *biserrata* (lapsu *acuta*, p. 493), pinnae.
- 11—12. „ *exaltata* (p. 492), pinnae.
- 13—14. „ *cordifolia* var. *pectinata* (p. 492), partes frondis.
- 15—17. *Polypodium cultratum* (p. 511), partes frondium.

- Tab. XXXI. Fig. 18—19. *Polypodium cultratum* var. *reclinatum* (p. 512), partes frondium.
- 20—21. „ *trichomanoides* (p. 509), pars frondis et frons integra.
- 22—23. „ *trichomanoides* var. *truncicola* (p. 510), partes frondium.
- 24—25. „ *macropterum* var. *connexum* (p. 502), apices pinnularum.
- XXXII. Fig. 1. „ *macropterum* var. *connexum* (p. 502), pars pinnae.
- 2—3. „ *macropterum* var. *splendidum* (p. 502), pinna et pinnula.
- 4—6. *Aspidium aculeatum* var. *platyphyllum* (p. 462), pinnae.
- 7—8. *Polypodium caudatum* (p. 501), partes pinnarum.
9. „ *lanceolatum* (p. 536), frons sterilis parva.
- 10—11. „ *piloselloides* var. *tectum* (p. 521), frondes.
12. „ *aureum* var. *areolatum* (p. 528), apex pinnae.
- 13—14. „ *decussatum* (p. 500), partes pinnarum.
- 15—18. „ *decurrens* (p. 532), pinnae et partes pinnarum.
- XXXIII. Fig. 1—2. „ *androgynum* var. *tetragonum* (p. 505), pinnae.
- 3—4. „ *Catharinae* (p. 522), pinna et apex pinnae.
- 5—6. „ *crenatum* (p. 504), pinna et ejus apex.
- 7—10. „ *loriceum* (p. 522), pinnae.
- 11—12. „ *vacciniifolium* (p. 519), frondes.
- 13—16. „ *angustifolium* (p. 529), frondes et partes frondium.
17. „ *aureum* (p. 527), pars pinnae.
18. „ var. *areolatum* (p. 528), pinna.
- 19—20. „ *Phyllitidis* var. *repens* (p. 532), partes frondium.
- XXXIV. Fig. 1. „ *brasiliense* var. *neriifolium* (lapsu *P. chnoodes*, p. 524), pinna.
- 2—4. „ *laevigatum* (p. 530), frondes et pars frondis.
- 5—6. „ *Phyllitidis* (p. 531), partes frondium.
7. „ *aureum* (p. 527), pars pinnae.
8. 15. „ *brasiliense* var. *neriifolium* (p. 524), pinnae.
- 9—14. „ *fraxinifolium* (p. 525), pinnae.
- XXXV. Fig. 1—4. „ *brasiliense* var. *attenuatum* (p. 524), pinnae et partes pinnarum.

- Tab. XXXV. Fig. 5—7. *Polypodium lycopodioides* (p. 533), frondes.
 8—11. " *persicariaefolium* (p. 535), frondes.
 12. " *percussum* (p. 536), frons
 13. " *pectinatum* var. *Paradiseae*, (p. 517), medium frondis.
 14—16. *Gymnogramme calomelanos* (p. 556), pinnae.
 XXXVI. Fig. 1. " *myriophylla* (p. 554), pinna.
 2. " *chaerophylla* (p. 554), frons parvula.
 3—4. " *tomentosa* (p. 552), apex frondis et pinnae.
 5. " *diplazioides* (p. 550), pinna.
 6. *Meniscium serratum* (p. 563), pars pinnae.
 7—8. " *reticulatum* (p. 563), pinnae.
 9—11. *Vittaria lineata* (p. 543), partes frondium.
 12. " *stipitata* (p. 543), pars frondis.
 13—16. " *furcata* (p. 545), partes pinnarum.
 17—19. " *angustifolia* (p. 544), frondes.
 20—22. *Antrophyum lineatum* (p. 558, lapsu sub tab. XXXIII. citatum), frondes.
 23. *Acrostichum latifolium* (p. 571), frons parva.
 XXXVII. Fig. 1—2. *Antrophyum cayennense* (p. 559), frondes.
 3. *Acrostichum latifolium* (p. 571), frons.
 4—5. " *lineare* (p. 579), frons et pars frondis.
 6. " *simplex* var. *martinicense* (p. 570), frons parva.
 7. " *Gardnerianum* (p. 575), frons.
 8. " *viscosum* (p. 576), frons.
 9. " *Lingua* (p. 568), frons.
 10. " *squamosum* (p. 583), frons.
 11—12. " *perelegans* (p. 582), partes frondium.
 XXXVIII. Fig. 1—2. " *caudatum* var. *pubens* (pag. 586), pinnae.
 3—5. " *osmundaceum* (p. 586), pinnulae.
 6—9. " *caudatum* (p. 585), pinnae.
 10—11. " *sorbifolium* (p. 583), pinnae.
 12—15. " *peltatum* (p. 587), frondes.
 16—17. " *guianense* (Raddianum, pag. 591), apices pinnarum.
 18—22. " *serratifolium* (p. 590), pinnae.
 XXXIX. Fig. 1. 2. 8. " *cervinum* (p. 587), pinnae.
 3—4. " *alienum* (p. 589), pinnae.
 5—7. " *sorbifolium* (p. 583), pinnae.
 9. " *nicotianaefolium* (pag. 589), pinna.
 10—11. " *aureum* (p. 592), pinnae.
 XL. Fig. Ia. *Cyathea arborea* (p. 308), segmentum, pars ejus et sporangium seu capsula.
 Ib. " *Schanschin* (p. 309), segmentum et pars ejusdem.
 II. *Hemitelia* (*Euhemitelia*) *grandifolia* (p. 311), pinnae, pars pinnae et capsula.
 III. " (*Amphicosmia*) *platylepis* (pag. 316), segmentum, pars ejus et capsula.

Polypod.

- Tab. XL. Fig. IVa. *Alsophila* (*Dicranophlebia*) *ferox* (p. 330), segmentum, sorus, sorus verticaliter sectus et capsula.
 IVb. " (*Chnoophora*) *Taenitis* (p. 319), pars pinnulae.
 V. *Dicksonia* (*Eudicksonia*) *Sellowiana* (p. 340), segmentum et partes ejus soriferae.
 VI. " (*Dennstaedtia*) *cicutaria* (p. 341), segmentum et sori.
 XLI. Fig. I. *Davallia* (*Odontoloma*) *Parkeri* (p. 344), pinnulae et partes soriferae.
 II. " (*Loxoscaphe*) *thecifera* (p. 345), pinnulae et partes soriferae.
 III. " (*Stenoloma*) *bifida* (p. 346), pinna et apices segmentorum fertiliun.
 IVa. " (*Microlepia*) *inaequalis* (p. 348), segmentum et partes ejus soriferae.
 IVb. " (*Microlepia*) *Saccoloma* (p. 347), partes pinnae.
 V. *Lindsaya* (*Eulindsaya*) *trapeziformis* (p. 355), pinnae et pars fertilis marginis.
 VI. " (*Isoloma*) *sagittata* (p. 357), frons et pars fertilis marginis.
 XLII. Fig. I. " (*Schizoloma*) *macrophylla* (p. 358), pars pinnae et marginis fertilis cum capsula unica.
 IIa. *Adiantum* (*Euadiantum*) *macrophyllum* (p. 378), pinna, pars marginis fertilis et capsula.
 IIb. " (*Euadiantum*) *cuneatum* (p. 367), segmentum, indusium cum capsulis paucis et capsula solitaria.
 III. " (*Hewardia*) *olivaceum* (p. 381), pinnula, pars ejus et capsula.
 IV. *Hypolepis repens* (p. 383), segmentum, pars ejusdem et capsula.
 V. *Cheilanthes* (*Adiantopsis*) *radiata* (p. 387), pinnula, pars ejus et capsula.
 VI. " (*Eucheilanthes*) *microphylla* (p. 390), pinna, pars ejus et capsula.
 XLIII. Fig. I. " (*Physapteris*) *Regnelliana* (p. 391), pinna, pinnula, pars fertilis ex ejus margine et capsula.
 II. *Cassebeera gleichenioides* (p. 394), pinnula, partes ejus et capsula.
 III. *Pellaea* (*Eupellaea*) *concolor* (p. 396), pinna media, pars ejus et capsula.
 IV. *Pteris* (*Eupteris*) *litobrochioides* (p. 400), partes pinnae cum capsula fertili et abortiva.
 V. " (*Ornithopteris*) *viscosa* (p. 494), pinnula, margo fertilis et capsula.
 VI. " (*Campteria*) *biaurita* (p. 404), pars pinnae, margo fertilis et capsula.
 XLIV. Fig. I. " (*Doryopteris*) *pedata* (p. 407), pinna media, pars ejus et capsula.
 II. " (*Litobrochia*) *aculeata* (p. 412), pars pinnulae, margo fertilis, capsula et paraphysis.
 III. *Lomaria capensis* (p. 417), pinna frondis sterilis et pars ejus, pinna frondis fertilis et ejus pars, capsula.
 IV. *Blechnum* (*Eublechnum*) *unilaterale* (p. 422), pinna fertilis, pars ejus et capsula.

- Tab. XLIV. Fig. V. *Blechnum* (*Salpichlaena*) *volubile* (p. 426), partes pinnulae fertis et capsula.
- Via. *Asplenium* (*Euasplenium*) *serratum* (p. 431), pars frondis, regio fertis, capsula et paraphysis.
- Vib. „ (*Euasplenium*) *auritum* (p. 438), pinna et pars ejus sorifera.
- XLV. Fig. I. „ (*Athyrium*) *decurtatum* (p. 449), pinnulae, pars sorifera et capsula.
- Iia. „ (*Diplazium*) *celtidifolium* (p. 451), pars pinnae et capsula.
- Iib. „ (*Diplazium*) *Shepherdi* (p. 452), pinna.
- III. „ (*Hemidictyum*) *marginatum* (pag. 456), pars pinnae, portio sorifera et capsula.
- IV. *Scolopendrium* (*Antigramma*) *brasiliense* (pag. 457), partes frondis et capsula.
- V. *Didymochlaena* *lunulata* (p. 459), pinnulae, portiuncula sorifera et capsula.
- Via. *Aspidium* (*Polystichum*) *semicordatum* (p. 461), pinna et ejus pars.
- Vib. „ (*Polystichum*) *aculeatum* (p. 462), pinnula, pars ejus et capsula.
- XLVI. Fig. I. „ (*Cyrtomium*) *abbreviatum* (p. 464), pinna, partes ejus et capsula.
- II. „ (*Euaspidium*) *trifoliatum* (p. 466), pars pinnae, portiuncula sorifera et capsula.
- IIIa. *Nephrodium* (*Lastrea*) *falculatum* (p. 472), pinnula.
- IIIb. „ (*Lastrea*) *patulum* (p. 480), pinnula, pars ejus et capsula.
- IV. „ (*Eunephrodium*) *unitum* (p. 486), partes pinnae et capsula.
- V. „ (*Sagenia*) *macrophyllum* (p. 490), partes pinnae et capsula.
- Via. *Nephrolepis* *cordifolia* (p. 491), pinna et pars ejus.
- Vib. „ *exaltata* var. *biserrata* (p. 493), pars pinnae et capsula.
- XLVII. Fig. I. *Oleandra* *nodosa* (p. 495), partes frondis et capsula.
- II. *Polypodium* (*Euphegopteris*) *Tijuccanum* (p. 499), partes pinnae et capsula.
- III. „ (*Goniopteris*) *androgynum* var. *tetragonum* (pag. 505), partes pinnae et capsula.
- IVa. „ (*Eupolypodium*) *elasticum* (pag. 516), partes frondis.
- IVb. „ (*Grammitis*) *marginellum* (p. 506), pars frondis et capsula.
- Va. „ (*Goniophlebium*) *vacciniifolium* (p. 519), frons sterilis, frons fertis et partes utriusque.
- Vb. „ (*Goniophlebium*) *loriceum* (pag. 522), pinna, pars ejus et capsula.
- Via. „ (*Phlebodium*) *aureum* (pag. 527), pars pinnae et capsula.
- Vib. „ (*Phlebodium*) *decumanum* (pag. 528), partes pinnarum.

- Tab. XLVIII. Fig. I. *Polypodium* (*Campyloneuron*) *Phyllitidis* (p. 531), partes frondis et capsula.
- Iia. „ (*Phymatodes*) *crassifolium* (pag. 537), pars frondis et capsula.
- Iib. „ (*Phymatodes*) *persicariaefolium* (p. 535), partes frondium.
- III. *Notholaena* *Pohlana* (p. 541), pinna, pars ejus et capsula.
- IV. *Monogramme* (*Eumonogramme*) *graminoides* (p. 546), habitus, apices frondis fertis et capsula.
- V. „ (*Pleurogramme*) *seminuda* (pag. 547), frons, partes ejus et capsula.
- VI. *Gymnogramme* (*Leptogramme*) *polypodioides* (p. 550), pinna, pinnula, pars pinnulae et capsula.
- XLIX. Fig. Ia. „ (*Eugymnogramme*) *rufa* (pag. 552, citatio tabulae supra in textu omisa), pinna et pars ejusdem.
- Ib. „ (*Eugymnogramme*) *reniformis* (p. 551), frons, pars fertis ejus et capsula.
- II. „ (*Selliguea*) *elongata* (p. 557, citatio tabulae supra in textu omisa), frons, partes ejus et capsula.
- III. *Meniscium* *reticulatum* (p. 563), partes pinnae et capsula.
- IV. *Antrophyum* *cayennense* (pag. 559), partes frondis et capsula.
- V. *Vittaria* (*Taeniopsis*) *stipitata* (p. 543), partes frondis, capsula et sporangiastrum.
- VI. „ (*Cuspidaria*) *furcata* (p. 545), partes frondis fertis et capsula.
- L. Fig. I. *Hemionitis* *palmata* (p. 561), frons fertis, pars ejus et capsula.
- II. *Antrophyum* (*Anetium*) *citrifolium* (p. 560), partes frondis et capsula.
- III. *Acrostichum* (*Elaphoglossum*) *hybridum* (pag. 572), frons sterilis, frons fertis, pars utriusque et capsula.
- IV. „ (*Lomariopsis*) *sorbifolium* (pag. 583), pinnae sterilis et fertis, pars utriusque, capsula fertis et abortiva.
- V. „ (*Polybotrya*) *osmundaceum* (pag. 586), pinnula fertis et sterilis, segmentum sterile, pars segmenti fertis et capsula.
- VI. „ (*Rhipidopteris*) *peltatum* (pag. 587), frons sterilis, pars ejus, frondes fertis et capsula.
- LI. Fig. I. „ (*Olfersia*) *cervinum* (p. 587), pinna sterilis et pars ejus, pinna fertis et pars ejus, capsula.
- II. „ (*Soromanes*) *Caenopteris* (pag. 588), pinna sterilis et fertis et pars utriusque, capsula.

- Tab. LI. Fig. III. *Acrostichum* (*Gymnopteris*) *alienum* (p. 589), pinna fertilis et sterilis et pars utriusque cum capsula.
- IV. " (*Chrysodium*) *guianense* (p. 591), pinna sterilis et fertilis, pars utriusque et capsula.
- V. *Ceratopteris thalictroides* (p. 334), frons juvenilis sterilis cum ejus parte magis aucta, pinnula fertilis, segmentum fertile, pars ejus et capsulae.
- VI. *Woodsia mollis* (p. 593), pinna, pinnula et sori cum indusio.
- LII. *Hemitelia macrocarpa* (p. 314), habitus et analysis, ut etiam in tabulis insequentibus usque LXVI.
- LIII. *Alsophila elegans* var. *crenata* (p. 320).
- LIV. " *praecincta* (p. 324).
- LIV. Fig. I. *Adiantum lunulatum* (p. 361).
- II. *Pellaea Bongardiana* (p. 397).
- LVI. *Cheilanthes* (*Adiantopsis*) *regularis* (p. 387).
- LVII. " (*Eucheilanthes*) *flexuosa* (p. 391).
- LVIII. *Pteris* (*Doryopteris*) *ornithopus* (p. 405).
- LIX. " " *lomariacea* (p. 406).
- LX. " " *lomariacea* var. *actinophylla* (p. 406).
- LXI. *Asplenium* (*Diplazium*) *Riedelianum* (p. 450).
- LXII. *Aspidium* (*Cyrtomium*) *abbreviatum* (p. 464).
- LXIII. *Polypodium* (*Phegopteris*) *rotundatum* (p. 499).
- LXIV. Fig. I. *Polypodium* (*Phegopteris*) *hirsutum* (p. 503).

- Tab. LXIV. Fig. II. *Polypodium* (*Eupolypodium*) *elasticum* var. *Glaziivii* (p. 517).
- LXV. *Polypodium* (*Phegopteris*) *punctatum* var. *rigescens* (p. 503).
- LXVI. *Notholaena eriophora* (p. 541).
- LXVII. Fig. I. *Cyathea Schanschii* (p. 309); a) trunci pars magnitudine diminuta, b) sectio ejus horizontalis, magnitudine naturali, ut in figuris reliquis hujus tabulae et tabularum insequentium.
- II. *Hemitelia setosa* (p. 315).
- III. *Alsophila Taenitis* (p. 319).
- LXVIII. Fig. I. " *Miersii* (p. 321).
- II. " *leucolepis* (p. 327).
- III. " *phalerata* (p. 326).
- LXIX. Fig. I. " *armata* (p. 331).
- II. " *pruinata* (p. 332), utraque figura magnitudine diminuta.
- III. " *ferox* (p. 330), a. et b. ut in Fig. I.
- LXX. Fig. I. *Dicksonia Sellowiana* (p. 340), utraque figura magnitudine diminuta.
- II. *Blechnum brasiliense* (p. 422, lapsu supra in textu citatio hujus tabulae ommissa), utraque figura magnitudine diminuta.
- III. *Asplenium radicans* (p. 454), a. magnitudine diminuta, b. magnitudine naturali.

SIGLA.

1. Frons; 1 = pars frondis transversalis.
2. Pinna vel pinnae.
3. Pinnae portio.
4. Pinnula.
5. Pinnulae portio.
6. Segmentum frondis (i. e. tertii gradus).
7. Pars segmenti.
8. Portio fructifera frondis v. pinnae v. segmenti, cum indusio et sori.
9. Sorus cum indusio vel absque eo.
10. Indusium.

11. Receptaculum.
12. Sporangium seu capsula, ○ abortiva; p. Paraphysis.
13. Spora.
14. Paleae v. palea.
15. Pili vel pilus.
 1. Pars lateraliter visa.
 - d. " desuper visa.
 - i. " infra v. a basi visa.
- m. n. Magnitudo naturalis.
- + Magnitudo aucta.
- " diminuta.

TABULARUM AUCTORES: Figurae in tabulis XX—XXXIX. secundum methodum quam dicunt autotypam (*Naturselbstdruck*) concinnatae, ex opere Liberi Baronis CONSTANTINI AB ETTINGSHAUSEN: *Die Farnkräuter der Jetztwelt*, consentiente cl. auctore, de promptae et ejusdem L. B. ab ETTINGSHAUSEN cura benevola et directione circumspecta in *Typographia Caes. Reg. Vindobonensi* absolutae sunt. Tabulas XL—LI., figuris analyticis ornatas, cl. BAKERO duce exhibuit cl. W. FITCH, Londinensis; tab. LXVII—LXX., truncorum icones exhibentes, item BAKERO duce cl. J. HESLEY, Londinensis; tabulae denique LII—LXVI., olim a b. KUNZE pro hac *Flora Brasiliensi* praeparatae, nec tamen, KUNZE operi per mortem auctoris interrupto, hucusque editae sunt, sola excepta tabula LXIV. quam nuperius Monachii delineandam curavit analysibusque instruxit EICHLER.

DE CYATHEACEARUM ET POLYPODIACEARUM RATIONIBUS GEOGRAPHICIS.

Quum in pertractanda plantarum distributione geographica fieri non possit quin numeris abstineamus, haud levis Filicibus exoritur difficultas ex eo, ut auctores qui de hoc ordine scripserunt valde diversas de specierum limitibus aluerint sententias. Lectorem igitur, ne prorsus erroneam sibi fingat de Filicum brasiliensium geographiam imaginem, semper ante oculos habere quaesumus rationem, quam nos supra in parte monographiae nostrae systematica secuti sumus. Quae non solum aliquantum distat ab illa, a b. STURMIO in pertractandis reliquis Filicum subordinibus, *Gleicheniaceis*, *Hymenophyllaceis* etc., olim in hoc opere adhibita, sed longe etiam a rationibus, quae majori Pteridologorum parti hodie adhuc placent. Nam, speciminum numerosissimorum, quae in Herbario Kewensi aliisque asservantur, examine ducti, nos formas permultas, quae ab aliis pro speciebus distinctis nuncupantur, varietatum tantum titulo admittimus vel penitus cum speciebus jam antea propositis conjungimus. Qua in re prorsus sequimur illustrem Filicum monographum et magistrum nostrum pio animo excolendum b. GUILIELMUM HOOKER, ita ut plane easdem specierum disponendarum rationes, quas hic olim in opere „Species Filicum“ adhibuerat et postea in „Synopsisi Filicum“, post mortem Hookeri a nobis ad finem perducta, etiam in monographia antecedente recognoscas. Sunt praeterea rationes fere eadem, quas etiam reliqui auctores fere omnes, qui in his X annis ope collectionum Kewensium libros de plantis phaenogamis conscripserunt, secuti sunt; ita cl. BENTHAM in Floris Australiensi et Hongkongensi, cl. GRISEBACH in Flora Indiae occidentalis britannicae, HARVEY et SONDER in Capensi, OLIVER in Flora Africae tropicae. Utrum quidem naturae convenient necne, hoc loco haud disputabimus; sufficiat, eas simpliciter exposuisse, ut facilius de numeris et indicationibus infra sequentibus iudicium ferre possis.

His praemissis, tabulam proponimus quâ distributionem geographicam *Cyatheacearum* et *Polypodiacearum* supra descriptarum eo illustrare studuimus, ut numeris majoribus ad sinistram positis numerus specierum omnium indicetur, quae in regionibus infra quas numeri leguntur hucusque repertae sunt; numeri contra minores, ad dextram positi, numerum specierum regionibus illis peculiarium, alibi haud crescentium, significant. Recognoscas ex hac tabula non solum, quoniam specierum numero singula genera et singulae tribus in quinque regionibus phytogeographicis, a b. MARTIO in Brasilia distinctis, inque

Guiana contermina repraesentata sint, sed etiam quot species Brasilia et Guiana cum reliqua America tropica et cum Antiquo orbe communes habeat. (Vide tabulam pag. 613—4.)

Hanc tabulam accuratius perlustrantes, sequentia observamus.

1. *Cyatheaceae*. Specierum omnium hanc tribum constituentium, quarum quidem numerus valde incertus est ob species complures ab auctoribus ad specimina insufficientia propositas, America tropica fere dimidiam, Brasilia quartam vel quintam partem alit. Cum antiquo orbe nullam offert speciem communem, unica excepta *Hemitelia capensi*, quae distributione valde singulari per zonam temperatam Africae australis inde a Capite bonae spei usque in ditionem Natal et insulas Mauriti et Comorenses dispersa, etiam in Java et in Brasilia media occurrit; cum Americae vero aliis partibus Brasilia (inclusa Guiana contermina) fere dimidium specierum communes habet, peculiare solummodo insequentibus 18, inter quas eae, quae solummodo in Guiana extrabrasiliensi hucusque repertae sunt, asterisco * notantur: *Cyathea Gardneri*; **Hemitelia subincisa*, *macrocarpa*, *setosa*, *platylepis*; *Alsophila Taenitis*, *elegans*, **marginalis*, *Miersii*, *radens*, *Arbuscula*, **oblonga*, **pungens*, *praecincta*, *leucolepis*, *nigra*, *plagiopteris*, *Glaziovii*.

E regionibus Brasiliae phytogeographicis a b. MARTIO propositis montano-nemorosa seu Dryadum maxime *Cyatheaceis* abundat, quum circa $\frac{1}{3}$ omnium specierum supra descriptarum contineat, quarum quidem pleraeque in Oreadum ditionem, nonnullae etiam in partem calidiorem provinciae Napaeorum procurunt, speciebus 3 tantum, *Alsophila radenti*, *praecincta* et *Glaziovii*, in peculiarem Dryadum aream restrictis. Computatis vero Dryadum, Oreadum et Napaeorum calidiorum regionibus pro provincia phytogeographica unica, numerus specierum huic peculiarium conspicue augetur; 11 enim: *Cyathea Gardneri*, *Hemitelia setosa*, *Alsophila Taenitis*, *elegans*, *Miersii*, *radens*, *Arbuscula*, *praecincta*, *leucolepis*, *plagiopteris* et *Glaziovii*, extra illam nondum repertae sunt.

Parcius *Cyatheaceae* in Hamadryadum seu calidissima regione repraesentari videntur; speciebus tantummodo 5, quae aut ex Oreadum vel Dryadum regionibus procurunt, aut, ut *Alsophila phalerata* et *ferox*, super totam Americam tropicam vagant. Frequentiores contra iterum in Najadum regione (calido-humida) apparent et formis quibusdam peculiaribus, *Hemitelia platylepide* et *Alsophila nigra*; aliis, ut

TABULA CYATHEACEARUM ET POLYPODIACEARUM BRASILIENSIVM DISTRIBUTIONEM EXHIBENS.

	Brasilia.						In Guiana extrabraziliensi obviae.	In alias Americae partes procurentes.	In Antiquo orbe simul obviae.	Numerus specierum brasili. (et guian.)	Numerus specierum omnium cognitarum.
	In regione Napaeorum obviae.	In regione Dryadum obviae.	In regione Orearum obviae.	In regione Hamadryadum obviae.	In regione Najadum obviae.	Stationis intra Brasiliam incertae.					
CYATHEACEAE										37	130—150
Cyathea	1.0	4.0	4.0	1.0			3.0	3		4	
Hemitelia	1.0	3.0	1.0		3.1		3.0	4		8	
Alsophila	7.0	18.3	12.0	4.0	6.1		9.4	11		25	
App. Ceratopteris	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1	1	1	1
POLYPODIACEAE.											
1. <i>Dicksoniaceae</i>										5	50
Dicksonia	2.0	3.0	3.0	1.0		1	1.0	4		4	
Woodsia			1.0					1		1	
2. <i>Davalliaceae</i>										8	80—90
Davallia	3.0	5.0	5.0	1.0	4.0		4.0	5	2	8	
3. <i>Lindsayaceae</i>										12	50
Lindsaya	2.0	4.0	5.1	2.0	6.0		10.4	3	1	12	
4. <i>Pteridaceae</i>										83	300—320
Adiantum	8.0	22.0	16.1	6.0	11.1	1	20.2	22	6	33	
Hypolepis		1.0	1.0		1.0		1.0	1	1	1	
Lonchitis		1.0						1	1	1	
Cheilanthes	4.0	4.2	6.3	2.1	1.0		1.0	6	1	12	
Cassebeera	2.1	1.0	2.1							3	
Pellaea	1.0	5.4	1.0				1.0	1	1	5	
Pteris	5.0	17.2	15.0	4.0	6.0		8.0	15	7	21	
Lomaria	4.0	6.0	3.0				2.0	7	5	7	
5. <i>Blechnaceae</i>										10	30—35
Blechnum	5.0	8.0	8.0	2.0	2.0		4.0	8	2	10	
6. <i>Aspleniceae</i>										42	300
Asplenium	17.0	33.2	26.1	5.0	12.0		15.0	34	12	42	
7. <i>Scolopendriaceae</i>										2	9
Scolopendrium	1.0	2.1								2	
8. <i>Aspidiaceae</i>										50	300
Didymochlaena	1.0	1.0	1.0				1.0	1	1	1	
Aspidium	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0		5.0	7	2	7	
Nephrodium	8.0	27.7	18.1	8.0	10.1	2	16.3	19	5	38	
Nephrolepis	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2	2	2	2	
Oleandra		2.0			1.0		2.0	2	1	2	
9. <i>Polypodiaceae</i>										65	400
Polypodium	20.0	54.5	31.0	15.0	21.0		32.2	46	9	65	
10. <i>Gymnogrammitideae</i>										35	170
Notholaena				2.2			1.0	1		3	
Vittaria	1.0	4.1	3.0	1.0	3.0		4.0	5		6	
Monogramme		1.0	2.0				2.0	2	1	2	
Gymnogramme	4.0	11.2	11.1	2.0	4.0		6.1	10	1	16	
Antrophyum	1.0	3.0	1.0		3.0		3.0	4		4	
Hemionitis		1.0						1		1	
Meniscium	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.0	3		3	
11. <i>Acrosticheae</i>										42	130—140
Acrostichum	7.0	31.2	23.4	5.0	14.0		17.1	34	10	42	
Summa	112.1	281.31	206.13	68.3	116.4	4	176.17	264	72	392.128	cc. 2000

Hemitelia grandifolia, *multiflora* et *Alsophila blechnoide*, quae quidem septentrionem versus latius distributae sunt, ad austrum fines Najadum haud transgredientibus.

In universum *Cyatheaceae* brasilienses quoad distributionem geographicam cum *Polypodiaceis* conveniunt, ut ex insequentibus clarius elucebit.

2. *Ceratopteris thalictroides*, ut in Tropicis veteris orbis, ita etiam in Americanis late vagat, intra Brasiliam regiones depressas calido-humidas praediligens.

3. *Dicksoniae*. Nonnisi tertia circiter pars specierum 50 ex hac tribu cognitarum Americam tropicam incolit, 5 tantummodo Brasiliam. Inter quas nulla huic terrae peculiaris offenditur, omnibus, quae quidem in Brasilia regiones Dryadum et Oreadum praecipue affectant, etiam in terris occidentalibus inde e Peruvia vel Columbia usque ad Americam centralem insulasque Antillanas disseminatis. — *Woodsia mollis* exemplum praebet fere unicum Filicis pro Andibus magnopere characteristicae et in iis e Peruvia ad Mexicum dispersae, quae etiam in montibus regionis nostrae Oreadum apparet.

4. *Davalliaceae*. Etiam hujus tribus formae paucae tantum in America tropica crescunt, scil. species 10, quarum quidem unam, *Davalliam bifidam*, Brasilia peculiarem habet, una praeterea, *D. Parkeri*, in Guianam britannicam restricta, reliquis latius disseminatis. Distributione valde singulari *Davallia thecifera* gaudet; sedem enim principalem seu centrum in Africae zona austro-temperata habet, unde in montes tropicos ad utramque hujus terrae oram extenditur, quum in America solummodo in montibus dos Orgãos prope Rio de Janeiro et in Andibus civitatum Ecuador et Columbiae obtingat; *D. Speluncae*, e frequentissimis Filicum tropicarum, item in Vetere orbe copiosior est. — Inter Brasiliae regiones phytogeographicas montano-nemorosa et montano-campestris, deinde calido-humida, majorem *Davalliarum* partem alunt; calido-sicca fere prorsus iis carere videtur.

5. *Lindsayaeae*. E *Lindsayearum* speciebus 50 hucusque cognitae America tropica nondum tertiam partem alit, species nempe 14, quarum vero 12 in ditione nostra occurrunt. Praecipue hae in regione calido-humida seu Najadum et in Guiana contermina vigent atque formas ibidem peculiare haud paucas offerunt, insequentes nempe 7: *Lindsayas falciformem*, *dubiam*, *pendulam*, *tenuem*, *reniformem*, *sagittatam*, *macrophyllam*, ita ut in illis terris centrum geographicum *Lindsayearum* americanarum jure accipiamus. Unica haec est Filicum tribus, quae copiosius apud Najades, quam in Dryadum et Oreadum ditionibus repraesentatur. — Oreas specifica una tantum habetur *L. botrychioides*; Oreadi-Dryas simulque in partem Napaeorum cali-

diorum excurrens item una *L. virescens*; *Lindsayae stricta*, *trapeziformis* et *guianensis* super totam fere Americam tropicam extenduntur, *trapeziformis* insuper ad Asiae et Australiae regiones calidiores.

6. *Pterideae*. Pariter ac in *Cyatheaceis*, etiam in magna conspicuaque *Pteridearum* tribu dimidia circiter specierum pars Americam tropicam, et hujus dimidia iterum fere dimidia Brasiliam inhabitat. Flora nostra praecipue abundat speciebus individuisque elegantis *Adianti* generis, deinde *Pteridibus*. *Adianta* supra 33 enumeravimus, quae majore ex parte in Dryadum et Oreadum ditione degunt; pleraeque tamen in alias quoque Americae tropicae regiones, adeo nonnullae, *A. lunulatum*, *serrato-dentatum* et *Lancea* in Antiquum orbem excurrunt, paucis tantum, *A. pectinato*, *tetragono* et *curvato* in illam Brasiliae partem restrictis; sectio autem *Hewardia*, venis anastomosantibus insignis, extra Guianam vix obvia. Memoriae praeterea dignum videtur, duas illas species, quae inter *Adianta* distributione omnium latissima gaudent et in reliqua etiam America tropica late vagant, *A. Capillus-Veneris* et *A. aethiopicum*, intra Brasiliam paucis tantum locis iisque valde disjectis hucusque observatas esse; similiterque *A. caudatum*, quod inter Tropicis Veteris orbis fere ubicunque obvium est, in Brasilia nonnisi in Dryadi-Oreadum ditione, formis quidem peculiaribus, pro speciebus distinctis olim salutatis, occurrit. — *Hypolepis repens* per totam fere Americam tropicam, *Lonchitis hirsuta* praeter in Africa, ubi centrum habere videtur, etiam in Columbia et in Dryadum nostrarum ditione offenditur; *Cassebeerae* species 3 supra enumeratae in Brasiliam australem terrasque conterminas extratropicas restrictae sunt. — Quoad *Cheilanthes* et *Pellaeam* Flora nostra, cum Andibus comparata, pauper censeatur, sed species complures peculiare offert (nominantur *Cheilanthes monticola*, *regularis*, *incisa*, *dichotoma*, *glandulosa*, *flexuosa*, *Regnelliana*; *Pellaea columbina*, *Bongardiana*, *lonchophora*, *Glaziovii*), his sicut reliquis Dryadum et Oreadum regiones vix excedentibus. Sola *Cheilanthes radiata* super totam Brasiliam reliquamque Americam tropicam vagat; contra *Cheil. farinosa*, in Tropicis Antiqui orbis et Americae extra-brasiliensis sat frequens, in Brasilia rarissima videtur, et *Pellaea* denique *concolor*, licet ceterum inter Tropicis utriusque orbis sat copiose occurrat, in Brasilia provincias tantum austro-orientales incolit. — *Pteridium* quas supra descripsimus 21, nonnullae latissima area gaudent, ita *Pteris aquilina* et *pedata*, quae per omnes Brasiliae provincias et per tropicas temperatasve utriusque orbis vagant; aliae, ut *Pt. denticulata*, *macroptera* et *decurrens*, super majorem Brasiliae et reliquae Americae tropicae partem disseminatae, nec tamen in Antiquo orbe obviam sunt, aliis denique, *Pt. cretica*,

aculeata, *quadriaurita* et *biaurita*, intra Brasiliam raris, extra eam late vagantibus. Paucas tantum *Pterides* Brasilia peculiare habet easque in Dryadum et Oreadum regione: *Pteridem triphyllam*, *longulam* et *ornithopodem*; *Pt. litobrochioides* in Najadum ditionem vicinamque Guianam restricta est. In universum, ut e tabula supra data elucet, etiam *Pteridis* genus intra Brasiliam centrum habet in regionibus montano-nemorosa et montano-campestri. — Idem de *Lomaria* valet, quod genus regiones Brasiliae calido-siccam et calido-humidam prorsus fugere videtur; nullam vero speciem hoc offert pro Brasilia peculiarem, speciebus omnibus supra descriptis praeter per regiones Oreadum, Dryadum et Napaeorum latius adhuc per Americam tropicam extrabrasiliensem, 5 etiam in Antiquum orbem disseminatis.

7. *Blechnaeae*. Circiter tertia pars specierum exiguae *Blechnearum* tribus Americam tropicam, omnesque hae, una tantummodo excepta, Floram nostram incolunt. Nullam vero inter eas Brasiliae peculiarem novimus, omnibus per alias quoque Americae tropicae terras, adeo, ut *Blechno serrulato*, in Antiquo orbe disseminatis. *Bl. australe*, per austro-temperatas utriusque orbis divulgatum, limites Florae nostrae australes vix intrat; *Bl. nitidum*, speciminibus nonnisi imperfectis e Brasilia maxime australi nobis cognitum itaque quodammodo adhuc dubium, ceterum Himalayam et insulas Malayanas inhabitat. Etiam *Blechnaeae* intra Brasiliam praecipue provincias austro-orientales mediasque praediligunt, duobus tantum *Bl. serrulato* et *volubili* super totum fere imperium divulgatis.

8. *Asplenieae*. Vix plus quam tertia pars specierum ex ampla hac tribu in America tropica, aegre septima in Brasilia reperta est. Tota *Darcae* sectio ditionem nostram fugit; *Athyrii* unam tantum speciem, *Asplenium decurtatum*, itemque unicum tantum *A. marginatum* ex *Hemidictyi* sectione venis extrorsum anastomosantibus notata habemus. Quas Brasiliae peculiare vindicamus species 7, *Aspl. mucronatum*, *divergens*, *angustatum*, *decurtatum*, *Riedelianum*, *Blanchetii* et *Glaziovii*, omnes aretis limitibus in Dryadum et Oreadum regione continentur, quam reliquae etiam, distributione latiore gaudentes, intra Brasiliam praecipue affectant, paucis tantum, ut *A. serrato*, *aurito*, *Serra*, *auriculato* et *Shepherdi*, etiam super Hamadryadum et Najadum ditiones divulgatis; nonnullis praeterea apud Najades degentibus, quae e Columbia, Peruvia vel Guiana in hanc regionem procurentes eam austrum versus haud excedunt. Non paucas Flora nostra cum Antiquo orbe communes offert species, ut cosmopolitas *A. lunulatum*, *auritum*, *Serram*, *formosum*, *caudatum*, *furcatum*, *cuneatum*, itemque *A. anisophyllum*, quod centrum habet in Africa australi, unde in

Africam tropicam et in utramque Americae australis oram extenditur, quum contra *Aspl. pumilum*, rarum quidem in Brasilia, praecipue in India occidentali, Mexico et in Andibus continentis australis vigeat, sed in Antiquo orbe nonnisi in Abyssinia et ditione Zambesi hucusque observatum sit.

9. *Scolopendriaceae*, speciebus 9 cognitae, duo solummodo in Flora nostra alunt *Scolopendria brasiliense* et *plantagineum*, utrumque vero Brasiliae peculiare, ditioni Dryadum et Napaeorum calidiorum addictum.

10. Etiam magna *Aspidiearum* tribus aegre tertia parte in America tropica, sexta intra Brasiliam Guianamque repraesentata est. *Aspidii* sectio *Polystichum*, quae in universum 40 species continet, in Brasilia nonnisi 3, *Nephrodii* sectio *Eunephrodium*, item fere 40 species amplectens, solummodo 5, et ejusdem generis sectio *Sagenia* e 25 speciebus unam tantum in Brasilia exhibet. Inter species 16, quas Brasiliae peculiare vindicamus, pleraeque regiones montano-nemorosam et montano-campestrem ornant, paucis tantum in calido-humidam conterminamque Guianam restrictis; nominantur priores *Nephrodium ramentaceum*, *vestitum*, *alophilaceum*, *Gardnerianum*, *Ctenitis*, *palustre*, *Fischeri*, *Plarnica*, *acutum*, *nitidulum*, *refractum*; posteriores *Nephrodium Sancti-Gabrielii*, *subobliquatum*, *subfuscum*, *subcuneatum* et *connexum*. Etiam aliae, quae extra Brasiliam simul occurrunt, intra eam praecipue in provinciis illis Dryadum et Oreadum degunt, *Aspidiis* tamen *semicordato*, *plantagineo* et *trifoliato*, in parte boreali Americae australis divulgatis, austrum versus Najadum ditionem haud excedentibus; aliis denique, *Aspidium dico meniscioides*, *Nephrodia patens*, *caripense*, *conterminum*, *protensum*, *villosum*, *unitum*, *molle*, *macrophyllum*, *Nephrolepides cordifolium* et *exaltatum*, sicut per reliquam Americam tropicam adeoque nonnullis in Vetere orbe, ita etiam per omnes vel plerasque Brasiliae provincias late vagantibus. — *Oleandrae* species 2, in Guiana terrisque vicinis frequenter obviae, in Brasilia perraro tantum locisque valde restrictis hucusque observatae sunt.

11. *Polypodiaceae*, amplissima inter Filicum tribus, 400 cc. speciebus constituta, in America tropica fere 170, 65 intra Brasiliam Guianamque offert. Ex his quartam circiter partem Brasilia peculiare habet, eamque fere prorsus ad regiones montano-nemorosam et montano-campestrem restrictam, paucis solummodo, *Polypodiis furcato*, *Kegeliano*, *discolore*, *recurvato* et *megalophyllo* Najadum ditioni Guanaeque conterminae addictis. Per totam Brasiliam reliquamque Americam tropicam vagant *Polypod. elasticum*, *pectinatum*, *piloselloides*, *loriceum*, *brasiliense*, *fracinifolium*, *incanum*, *lepidopteris*, *laevigatum*, *Phyllitidis*, *percussum*, *crassi-*

folium et angustum; eadem distributione et praeterea gerontogaea gaudent *P. serrulatum*, *lycopodioides* et *patens*. *Polypod. lanceolatum*, in tropicis et austro-temperatis utriusque hemisphaerii extra Brasiliam late divulgatum, intra hanc terram hucusque nonnisi in provinciis Rio de Janeiro et S. Catharinae observatum est; item *P. trichomanoides*, *moniliforme* et *cultratum*, licet in terris e Guiana et Peruvia usque in Americam centralem atque in Antiquo orbe frequenter disseminata sint, in Brasilia sparse tantum locisque arcte circumscriptis apud Dryades vel Oreades degere videntur. — Species nervatura composita donatae, ut in reliqua America tropica, ita etiam in Flora nostra rarae sunt, frequentes contra eae venis liberis instructae; sectionis *Phymatodis*, in universum 100 species includentis, Flora nostra 8 tantum alit, reliquis centrum in Asia tropica habentibus; sectio *Niphobolus* denique prorsus nos deficit.

12. *Gymnogrammitideae* in universum 170 species exhibent, quae vix dimidia parte in America tropica, aegre ultra quintam in Brasilia vivunt. *Jamesoniae* genus, in Andibus septentrionalibus abundans, limites nostros haud attingit; *Notholaenarum*, in America tropica tota cc. 15 species exhibentium, 3 solummodo in Flora nostra habemus, duas vero peculiare regioni calido-sicca (Hamadryadibus) addictas; *Vittaria*, *Monogramme* et *Gymnogramme* praecipue apud Dryades et Oreades degunt, aequae formis quibusdam peculiaribus, majore tamen parte etiam extra Brasiliam provenientibus, una tantum *Gymnogramme calomelano* per totam Brasiliam sicut reliquam Americam tropicam itemque Africam tropicam divulgata. *Antrophyi* species 4 per Brasiliam Guianamque locis disjunctis sparsae, *Hemionitis palmata* in terris e Peruvia Guianaque usque ad Mexicum et insulas Antillanas frequens nuperimeque etiam apud Bahiam lecta, *Meniscii* species 2 in tota America tropica omnibusque Brasiliae provinciis frequentes sunt, tertia tamen (*M. angustifolium*) meridiem versus Guianam haud transgredi videtur. De *Gymnogramme* etiam observandum, specierum venatione composita donatarum nos unam tantum *G. (Selliguaeae) elongatam* possidere.

13. *Acrosticheae*. Ultima haec tribus, unico *Acrostichi* genere repraesentata, fere tertiam specierum partem in Brasilia Guianaque, longe ultra dimidiam in America tropica tota alit. Flora nostra praecipue gaudet formis nervatura simplici donatis, iis compositam eam habentibus longe rarioribus. Species nonnullae distributione latissima utuntur, *Acrosticha dico conforme*, *simplex*, *latifolium*, *sorbifolium* et *aureum*, quae per regiones calidiores utriusque orbis copiosis-

simae, etiam omnes Brasiliae provincias incolunt. Pleraque tamen, etsi extra Brasiliam latius vagant, intra eam praecipue Dryadum et Oreadum regiones affectant, ut idem observabatur fere in omnibus quas antecedentibus perlustravimus tribubus. Peculiares pro Brasilia Guianaque nominantur: *Acrost. nigrescens*, *pulchellum*, *pachydermam*, *Burchellii*, *acrocarpum*, *strictum*, *acuminatum* et *guianense*; observandum vero, limites specierum in hoc genere, praecipue in sectione *Ela-phoglossi*, nimia incertitate laborare, ita ut numeri supra dati probabiliter emendationem ulteriorem subeant.

Filices nostras denique in universum contemplantes, haec observamus:

1. Flora Brasiliensis quoad Filices peculiare quid seu individuale haud offert, quum neque genus proprium habeat, neque tribu vel genere majore prorsus careat.

2. Cyatheaceae et Polypodiaceae intra Brasiliam conterminamque Guianam aegre $\frac{1}{5}$ specierum omnium hucusque cognitarum alunt, quum in universa America tropica proportione fere 45:100 repraesentatae sint, ita ut e speciebus Americanis paullo plus quam $\frac{1}{3}$ et minus quam $\frac{1}{2}$ Brasiliam Guianamque exornent.

3. Brasilia quoad Filices cum reliqua America tropica in universum bene congruit; nam in omnibus ejus partibus Flora Filicum praecipue e speciebus latius per Americam tropicam distributis composita est, quum species endemicae aegre tertiam omnium partem attingant et solemner in regiones arcte circumscriptas restrictae sint.

4. Inter regiones Brasiliae phytogeographicas a b. MARTIO propositas Filicibus ditissima est montanomenorosa seu Dryadum regio; observandum vero, hanc inter omnes perfectissime exploratam esse. Insequitur regio montano-campestris seu Oreadum, item haud male cognita, pluribus quam dimidia specierum omnium Brasiliensium adhuc exornata; pauperrima contra calido-sicca seu Hamadryadum regio videtur, quae tamen, sicut calido-humida seu Najadum provincia itemque Guiana, perfectius explorata verisimiliter numeros specierum a supra exhibitis longe diversos dabit.

5. Filices regionis extratropicae sive Napaeorum fere omnes speciebus constant, quae ceterum inter tropicos degentes Capricornum transgressae sunt, nec tamen formis peculiaribus, nec austro-temperatis quae boream versus in ditionem illam procurrunt.

6. Filices Andinae cum iis in montibus altioribus Brasiliae provenientibus affinitatem arctiorem haud praebent.

7. Fere quintam Filicum suarum partem Brasilia cum Antiquo orbe communem habet.

DE QUALITATIBUS ET USU FILICUM BRASILIENSIIUM.

Quoad qualitates subordinum jam prius a b. STURMIO expositorum fere nil compertum habemus. Narratur solummodo, *Anemiam tomentosam* Sw. myrrhas redolere, et caudicem *Osmundarum* quarundam mucilage adstringente scatentem olim contra serophulos et rhachitidem medicis inservisse; stipites *Mertensiae dichotomae* a vulgo Brasiliensi passim pro tubulis piparum adhiberi, auctor est Princeps MAXIMILIANUS NEOVIDENSIS (Reise I. 112.). Forsan, quum ab insularis Sandwicensibus *Marattiae alatae* rhizoma comedatur, hoc genus etiam Indianis brasiliensibus nutrimentum praebet.

Cyatheacearum et *Polypodiacearum* numerosae species qualitatibus apprime inter se convenire videntur. Frondes omnium mucilaginosae, leniter adstringentes, plurimarum subaromaticae. Caudex subterraneus plerarumque amarus, adstringens, acridulus, nonnullarum vi specificè anthelmintica pollet. Praeter substantiam adipo-cerosam, olea pingua et volatilia, in nonnullis major muco-sacchari et mannati copia, in quibusdam principium extractivum dulce, in aliis acidum gallicum vel tannicum residet. Plurimarum rhizomata et caudices multum amyli continent. (Endl. Enchir. 38).

Amyli copiosi praesentia, siquidem simul adeps et tanninum desunt, singularum Filicum rhizomata edulia reddit, tosta vel cocta, rarius cruda. Non multum quidem aestimantur, solummodo necessitate urgente expetita. Nominatur praecipue *Pteris esculenta*, subspecies *Pteridis aquilinae* in Australia et Oceania divulgata¹⁾; sed etiam *Pteridem aquilinam* veram premente fame in Rossia insulisque Canariensibus, panis modo tostam, comedi legimus, et forte etiam formae hujus speciei brasilienses similem usum praestant. *Cyathea medullaris*, Filix in Nova Selandia arborescens, medullam caudicis inferioris praebet, Korau vel Mamako dictam, quae tosta saporem rapae aemulat et succo rubescente gelatinoso abundans insularis in deliciis est; de *Cyatheis* vero brasiliensibus hac ratione nil nobis constat.

Ceratopteris thalictroides in Asia inter plantas oleraceas habita, praecipue herbam juniorem ad acetaria largitur (Endl. l. c.); num etiam in Brasilia simili modo adhibeatur, haud comperimus.

1) Cl. BACKHOUSE de usu hujus Filicis in Tasmania adnotavit: „Pigs feed upon the root where it has been turned up by the plough, and in sandy soils they themselves turn up the soil in search of it. The Aborigines roast it in the ashes, peel off its black skin with their teeth and eat it with their roasted Kangaroos etc. in the same way that Europeans eat bread. The roots possess much nutritive matter, yet it is to be observed that people who have been reduced to the use of it in long excursions through the bush, have become very weak though it has prolonged life.“

Frequentior, licet ordinis conspicui proportionè satis rarus, Filicum usus in medicina est. Duae species hoc respectu majorem nactae sunt famam et hodierno adhuc die in apparatu medicaminum inveniuntur, ambae etiam inter limites Brasilianos sparse obviae, *Nephrodium Filix-mas* et *Adiantum Capillus-Veneris*.

Nephrodium Filix-mas usui medicinali rhizoma offert, basibus petiolorum persistentibus obtectum, nominibus „radix Filicis maris, rhizoma Filicis mundatum, Raiz de Feto macho, Farnwurzel, Wurmfarne Wurzel, Fern-root, Racine de Fougère male“ pharmacopolis cognitum. Partem tantummodo apicalem bene adhuc vegetantem hi recipiunt, radicellas corticem partesque omnes emortuas remouent, et reliquum aut integrum aut in pulverem redactum conservant; quod quum ultra annum haud perduret, quotannis de novo praeparari debet. Saporis est primum dulcidule adstringentis, dein ingrate radentis; praeter substantias in plantis universis obvias copiosum continet oleum pingue virescens, parcum aethereum, resinam, tanninum et sacchari in crystallata sese conformantis speciem. Extractum ejus aethereum substantiam peculiarem deponit, quam „acidum Filicinum“ chemici appellarunt. Totum rhizoma vi anthelmintica pollet, quam praecipue oleo illi pingui deberi nonnulli perhibent. Usus, jam apud veteres frequens, ut plurimum contra Taenias est; pulverem administrare solent vel frequentius extractum aethereum („oleum filicis maris“). Cf. PEREIRA, Mat. med. et al.

Nuperiore tempore e terra Capensi et Natalensi rhizoma *Aspidii athamantici* Kunze, nomine radices Uncomocomo vel radices Pannae, in officinas introduxerunt, quod prius efficacia anthelmintica superare dicitur (FLÜCKIGER, Pharmacogn. 154).

In Brasilia eadem qualitate etiam *Polypodia leptopteris*, *crassifolium*, *incanum* et *percussum*, itemque *Asplenium serratum* et *trifoliatum* gaudere et contra vermes praesertim taeniam in auxilium vocari dicuntur (MARTIUS, Syst. mat. med. Bras. 62); idem PISO de „Conambaia“ sua retulit, quae verisimiliter ad *Adiantum tetragonum* spectat (Hist. II. 233).

Adiantum Capillus Veneris medicis potius frondes praestat, quas in officinis titulo „Folia Adianti, Herba Capillorum-Veneris, Herva d'Avencia v. d'Avencão, Frauenhaar, Maidenhair vel Ladies Hair, Capillaire de Montpellier“ habent. Aromaticae sunt, saporis simul dulciduli et subamari; tanninum, substantiam extractivam amaram et oleum

volatile continent, sed chemice nondum perfecte exploratae sunt. Praesertim pro remedio adstringente et aromatico inserviunt; passim usus etiam in affectionibus pectoris est. Hodie autem plerique *Adiantum pedatum* e Canada, propter aroma fortius, praeferunt, vel etiam *Adiantum trapeziforme*, in Brasilia australi haud infrequens. Inter Brasilienses praeterea *Adianta cuneatum* et *subcordatum*, porro *Cheilanthes radiata*, *regularis* et *chlorophylla*, *Pterides pedata* et *leptophylla*, denique *Asplenium auritum* et *Gymnogramme calometanos* nominantur, quae efficacia cum *Adianto Capillo-Veneris* convenient et tamquam pectorales in raucedine, pulmonum repletionem pituitosa etc. praescribantur; *Adianta* magis demulcere et diaphoretica esse, *Cheilanthes* et *Pterides* potius adstringentes dicuntur (MARTIUS, Syst. mat. med. Bras. 60).¹⁾ *Adianta caudatum* et *aethiopicum*, quae etiam in Brasilia passim occurrunt, in India orientali et Capite bonae spei, ubi frequentiora sunt, simili usu gaudere legimus.

1) Piso idem fere enarravit de duabus suis „Conambai-miri“ (Hist. II. 234), quarum altera probabiliter est *Adiantum curvatum Kaulf.*, altera *Gymnogramme calometanos* supra nominata.

Polypodii aurei et *Pteridis aquilinae* var. *arachnoideae* rhizoma sapore mucilaginoso-austero, subdulci et vellicante, adstringit, diaphoreticum est et expectorans. Usus rhizomatis recentis contusi et aqua fervida infusi, ut specierum supra nominatarum, in raucedine chronica, bronchitide chronica, pulmonum repletionem pituitosa non spernendus. Caudex *Alsophilae armatae* novellus, Rabo de Bugi Brasil., mucilage et materia adstringente pollens, involvens, expectorans, in membranarum mucosarum pectoris statu subinflammatorio, haemoptysi rel., summa laude a quibusdam medicis praedicatur (MART. l. c. 62. 63).

Adstringentes, diaphoreticae aliisque etiam virtutibus medicinalibus donatae, nimia forte laude celebrantur Peruvianae *Polypodium Calaguala* et *Acrostichum Huacsaro*, de quibus vero, quum in Brasilia haud occurrant, hoc loco verba non faciamus.

Denique observandum, paleas fibrillosas, quae in quibusdam speciebus copiosissimae sunt, ad faciendam stragula pulvinosque passim inservire vel subinde etiam pro remedio styptico.

BAKER et EICHLER.

EQUISETACEAE.

EXPOSUIT

JULIUS MILDE, PHIL. DR.,
PROFESSOR VRATISLAVIENSIS.

2

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED BY THE HOUSE OF COMMONS

ON THE 12TH MARCH 1881

AND PRINTED BY ORDER OF THE HOUSE OF COMMONS

BY W. CLAY AND COMPANY, PRINTERS, BUNGAY, SUFFOLK.

1881

EQUISETACEAE.

EQUISETACEAE L. C. Richard ap. De Candolle Flore franc. II. (1805) 580. Bartling, Ordines natural. plantar. (1830) 21. Martius, Conspectus regni vegetab. (1835). Endlicher, Gen. pl. (1836). XXV. p. 58. Enchiridion botanic. (1841) 33. Duval-Jouve, Histoire naturelle des Equisetum de France, Paris 1864. Milde, Monogr. Equisetorum in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XXXII. pars II., Dresdae 1867.

PLANTAE sporiferae s. acotyledoneae, RHIZOMATIBUS repentibus instructae. CAULES articulati; articuli clausi, apice foliis in VAGINAM dentatam connatis instructi, centro plerumque cavi, extus carinis et valleculis articulorum contiguorum alternantibus signati. Carinae singulae fasciculo vasorum annulorum in vaginarum foliola intrante percursae, omnibus fasciculis ejusdem internodii denique in septo transversali articulum claudente in anulum completum confluentibus. RAMI singuli sive verticillati, sub vaginis positi. SPICAE terminales, e verticillis foliorum fertiliū discretorum compositae. Folia fertilia sive RECEPTACULA peltata, stipitata, subtus at morphologicè in pagina superiore SPORANGIA conoidea latere interiore rima longitudinali dehiscentia sporifera gerentia. SPORAE numerosae globosae, filis duobus elasticis apicibus spathulatis circumvolutae, germinatione in prothallia antheridia simul et archegonia procreantia abeunt.

Genus unicum:

EQUISETUM LINN.

EQUISETUM Linn. Systema naturae (1735). Flora lapponica (1737). Gen. Plant. n. 1169. A. v. Haller, Enum. method. stirp. Helvet. ind. (1742). J. P. Tournefort, Instit. rei herbar. Sect. VI. (1719). Schkuhr, Crypt. t. 166—172. Bischoff, Cryptogam. Gew. 27. t. 3—6. Endl. Gen. n. 601. — Cavallinha Lusit.

Character ordinis.

ADVERSARIA IN EQUISETORUM MORPHOLOGIAM ET HISTOLOGIAM.

1. NONNULLA DE STRUCTURA EQUISETORUM EXTERNA.

RHIZOMA primarium perenne longissimum, ramosum, fistulosum sive solidum. Rhizomata secundaria ascendentia, glabra sive tomento vestita, rarius fere teretia, saepius sulcata et costata, epidermide saepe tuberculis exasperata. Vaginae rhizomatum a vaginis caulium saepe admodum differentes, saepe ex parte vel fere omnes destructae. Sub vaginis verticilli duo non alternans gemmarum inveniuntur, ex quorum altero rami rhizomatis vel caules prodeunt, dum ex altero radicae ramosae tomento

Equiset.

obductae procreantur. Interdum internodia rhizomatis in tubera oblonga, amylo farcta abbreviantur; numquam autem in rhizomatibus inveniuntur chlorophyllum, stomata, nec cellulae fibrosae.

CAULIS fere semper sulcatus est, unde carinae et valleculae existunt; carinae aut convexae aut angulatae sunt. Tres species lacunarum in caule inveniuntur: 1) centralis, 2) valleculares, 3) carinales. (Cf. tab. 72 fig. 11. 12). Lacuna centralis solum in *Equiseto scirpoide*, *E. Bogotensi* et interdum in *E. difuso* deesse solent (tab. 71 fig. 22). Lacunae valleculares valleculis caulinis respondent, et exteriores et majores quam lacunae carinales sunt, in medio fasciculi fibrovascularis sitae, carinis caulium respondentes, interiores, multo minores et cum lacunis vallearibus alternantes.

VAGINAE e foliis singulis connatis compositae sunt; quot igitur dentes in vagina observantur, tot foliola connata adsunt. Si fingis, foliola vaginae esse libera et patentissima, apparet, paginam foliolorum scabram externam esse inferiorem, paginam laevem internam autem superiorem. Ille sulcus, qui foliola singula vaginae disjungit, sulcus commissuralis appellatur (tab. 77 fig. 2c.); foliola singula ipsa plerumque carinam mediam sive carinas complures possident; carina media folioli non raro sulco carinali instructa est (tab. 71 fig. 23).

RAMI simili modo compositi sunt, quam caules; ante omnia aut solidi aut fistulosi discernuntur; semper sub vagina caulina in valleculis caulinis positi sunt. Ad basin ramorum invenitur vaginula, ochreola appellata (tab. 71 fig. 23a), quae a reliquis rami vaginulis admodum differt colore non viridi et eo quod circumcirca libera nec unquam cum ramo connata sit, denique quamvis 4—5-dentata sit, ut unum tantum ejus foliolum fasciculo vasorum praeditum sit, quum reliqua 4 foliola fasciculis vasorum omnino careant.

FOLIA FERTILIA (tab. 71 fig. 16, 17) discreta verticillata, e quibus spica terminalis composita est, semper peltiformia pentagona—hexagona stipite centrali rachi spicae affixa sunt. Spica oblonga, apice obtusa vel acuta est. Ad basin spicae annulus adest, organum intermedium inter vaginam caulinam et inter verticillum foliorum fertilium spicae, nunc sterilis, nunc sporangia singula adnata gerens (tab. 72 fig. 6, 7.).

Denique in Equisetis omnia organa et externa et interna internodiorum contiguorum regulariter inter se alternant scil. carinae et valleculae, lacunae, rami.

2. NONNULLA DE EQUISETORUM STRUCTURA INTERNA.

In Equisetorum caule pars exterior et interior discerni possunt; exterior insequentia organa continet:

- 1) Epidermidem cum stomatibus; 2) Strata fibrosa; 3) Strata chlorophyllosa; 4) Parenchyma laxum.

EPIDERMIS e cellulis elongatis formatur, quae terra silicea abundant, unde vario modo exasperatae sunt. Hae partes asperae sub microscopio nunc figuras granulorum, tuberculorum, rosularum, fasciarum, dentium, aculeorum praebent.

1. Granula omnium minutissima sunt, punctiformia et ovalia, ita ut 4—6 eorum latitudinem unius cellulae obtegant.

2. Tubercula nunc globosa nunc cubiformia sunt, semper in carinis ramorum et caulis inveniuntur totam latitudinem unius cellulae explentia.

3. Rosulae in valleculis caulis et ramorum existunt eadem latitudine qua tubercula, at forma cupulari margineque eleganter crenulatae.

4. Fasciae semper angustae, lineales, semper complures cellulas transverse obtegunt.

5. Dentes plerumque in carinis caulium *Equiseti silvatici* inveniuntur, unicellulares, longi, elongato-conici, patentissimi.

6. Aculei in carinis ramorum specierum nonnullarum observantur erecto-patentes, dissepimento verticali in cellulas duas divisi, acuminati, ut in *E. Telmateia*.

Tubercula, fasciae, dentes, aculei epidermide inflata formantur; rosulae et granula pro figuris cuticularibus habenda sunt.

STOMATA (tab. 72 fig. 2, tab. 76 fig. 4) semper in valleculis caulis observantur et e duobus paribus cellularum oblongarum composita sunt. Par superius (tab. 72 fig. 2c.) latere inferiore radiis siliceis vestitum est. Semper stomata in valleculis series binas discretas efformant, inter quas series igitur ordines cellularum nonnulli existunt, qui stomatibus destituti sunt; rarissime stomata in valleculis seriem unam latissimam fingunt (tab. 71 fig. 20). Hae series ex una aut ex compluribus stomatum lineis compositae sunt, unde series stomatum unilineatae (tab. 72 fig. 13) et series bi—multilineatae (tab. 75 fig. 2, tab. 76 fig. 5) distinguuntur; haud igitur series commutanda est cum linea. Stomata denique aut cum epidermide in eadem fere planitie sita (stomata phaneropora, tab. 72 fig. 1, 2), aut in depressione pro-

funda sub epidermide ex parte occulta apparent (stomata cryptopora, tab. 76 fig. 3, 4).

CELLULAE FIBROSAE deficiunt solummodo scapos succulentos *Equiseti arvensis* et *E. Telmateiae*, atque caules *Equiseti Bogotensis* et *E. diffusis*; omnes autem reliquae species strata magna fibrosa praesertim in carinis caulium possident, figurae plerumque triangularis in sectione transversali. Cellulae singulae interdum adeo incrassatae sunt, ut lumen earum omnino stratis secundariis expletum sit.

STRATA CHLOROPHYLLOSA e cellulis ovalibus et oblongis transverse positis laxe cohaerentibus composita sunt; grana chlorophyllosa per constrictionem augentur (tab. 72 fig. 12m).

PARENCHYMA LAXUM DECOLOR (tab. 72 fig. 12n) denique a stratis chlorophyllosis usque ad vasa fasciculorum extenditur; cellulae ejus sensim accrescunt lacunam centralem versus; cellulae hae decolores utriculares laxae hic illic interstitiis intercellularibus 3—4-gonis a se invicem distinctae sunt; rarius hae cellulae paulum incrassatae sunt, ut in sectione *Hippochaete*. In hoc parenchymate decolore lacunae illae observantur, quas propter positionem vallecularum (tab. 72 fig. 12c.) appellavimus; semper eae valleculis respondent et semper lacunis carinalibus (tab. 72 fig. 12d.) quibuscum alternant, majores et transverse oblongae vel ovaes offenduntur.

Interior pars caulis haec elementa continet:

- 1) Fasciculos vasorum; 2) Vaginam fasciculorum vasorum seu vaginam protectricem; 3) Lacunam centralem.

VAGINA illa unicellularis, quae fasciculum vasorum solitarium vel omnes fasciculos vasorum ejusdem internodii amplectitur, semper composita est e strato simplici cellularum, quarum parietes eximie undulati apparent, quae structura maculâ obscurâ ad dissepimenta cellularum vaginae hujus singularum significari solet. Hujus autem vaginae fasciculorum tres formae apud Equiseta inveniuntur.

1) Vagina fasciculorum partialis (tab. 71 fig. 19g.). Quisque fasciculus ejusdem internodii vagina partiali ovali circumdatur; adsunt igitur tot vaginae fasciculorum, quot fasciculi (*E. limosum*, *E. litorale*, *E. xylochaetum*, *E. debile*).

2) Vagina fasc. simplex communis. Omnes fasciculi vasorum ejusdem internodii vaginam fasciculorum unam communem possident, quae totum caulem in cylindrum externum et internum dividit, quasi annulum unicellularem clausum sistens (*E. palustre*, *E. Bogotense*, *E. diffusum*, *E. arvense*, *E. Telmateia*, *E. pratense*, *E. sylvaticum*, *E. scirpoides*).

3) Vagina fasc. duplex communis (tab. 72 fig. 14g.h.). Omnes fasciculi ejusdem internodii duabus vaginis communibus circumdantur, quarum altera infra (fig. cit. ad g.), altera supra (fig. cit. ad h.) fasciculos omnes caulem totum circumcurrit, ita ut caules in tres cylindros dividatur, in quorum medio fasciculi vasorum positi sunt (*E. giganteum* et affinia).

In quoque caulis fasciculo lacuna parva observatur, quae ob positionem carinae respondentem carinalis (tab. 72 fig. 14f.) appellatur; ad latera ejus saepissime vasa singula (fig. cit. ad e.) in lacunam ipsam prominentia inveniuntur, quae stratis secundariis spiralibus vel reticularibus excellunt (tab. 71 fig. 18e.).

Cellulae reliquae, quae lacunam carinalem circumdant, polygonae firmaeque sunt et in radios duos divergentes vaginam fasciculi petunt. Ad extremitates horum radiorum observantur nonnulla vasa minora eodem modo incrassata ac vasa jam descripta interiora majora. Haec vasa cum cellulis firmis corpus

lignosum fasciculi componunt, dum corpus fibrosum e tribus aliis cellularum speciebus formatur. Mediae enim inter illos radios duos inveniuntur: 1) Cellulae paucae magnae polygonae vix incrassatae, quarum parietes transversales horizontales magis incrassati, convexi et poris parvis pertusi sunt, quare cellulae cribrosae appellantur (tab. 71 fig. 18c. 19c., tab. 72 fig. 14c.). 2) Infra has cellulas proxime ad vaginam fasciculi strata nonnulla cellularum angustarum, admodum incrassatarum inveniuntur, quae in sectione longitudinali fibrosas sese praestant (tab. 71 fig. 19b., tab. 72 fig. 14b.). 3) Praeterea denique cellulae cribrosae circumdantes adsunt, quae polygonae, paullum incrassatae sunt et septis transversis a se invicem disjunguntur.

Cellulae illae, quae extra fasciculos sitae singulos fasciculos a se invicem disjungunt, laxae et elongatae nec tamen incrassatae esse solent.

Infra vaginam internodii cujusque septum transversum internodium claudens et complura strata cellularum crassum adest, in quo vasa totius internodii abbreviata et horizontaliter curvata annulum completum effingunt, ex quo fasciculi vaginae, ramorum et internodiorum contiguum exeunt.

3. DE CAULIS ET RAMORUM VAGINA.

Vaginae structura anatomica structurae caulis similis, revera tamen ab ea diversa est; nam parenchyma viride et cellulae fibrosae interdum desunt. In foliolis, e quibus vagina composita est, lacunae aëreae omnino deesse solent, semper tamen fasciculus vasorum centralis (tab. 75 fig. 3c.) ovalis adest. Pagina externa vaginae aspera stomatibus instructa exstat, quae in pagina interna laevi rarissima esse solent. Epidermis paginae internae saepe materiem rubra tinctoria est, quae totam cellulam explet.

4. SPICA.

Pedunculus spicae aut solidus aut fistulosus est, et cellulis fibrosis, fere semper quoque chlorophyllosis carere solet; neque lacunae valliculares semper adsunt, carinales tamen constanter inveniuntur. Tota tela cellulosa laxa et succulenta est. Etiam rachis spicae nunc solida nunc cava est; dissepimenta verticillos singulos receptaculorum disjunctia desunt, praeterea quoque lacunae carinales, valliculares et tela fibrosa et chlorophyllosa. Ubi fasciculi vasorum verticillo receptaculorum sese appropinquant, situm horizontalem accipiunt et ut in caulis internodio in annulum completum clausum conflunt. Ex hoc annulo fasciculus in receptaculum intrat, qui complura vasa spiralia et annulata continet; hic fasciculus siquidem in pelta ipsa advenit modo infundibuli se extendit, vasa ejus numero augentur et basin sporangiorum petunt, sub qua desinunt. Pelta receptaculi stomatibus sparsis instructa esse solet, epidermis e cellulis flexuosis composita.

Pedunculus receptaculi non raro furcatus, receptacula ipsa nunc spiraliter nunc verticillatim disposita sunt.

Sporangia omnino e cellulis spiriferis et annulatis composita sunt. Sporae globosae, granula viridia perparva et cyto-blastum centrale continent (tab. 71 fig. 1. 3.). Duo fila elastica, elateres dicta, inaequalia hygroscopica apice spatulata loco tenuiore spora affixa sunt eamque eo modo circumvolvunt, ut elater alter alteram dimidiam spora partem obvelet, alter alteram minorem; nunquam vero elater alter alterum secat. Sporae et elateres granulis minutissimis conspersa sunt (tab. 71. fig. 2. 3.).

Sporae germinantes exosporium dirumpunt (tab. 71 fig. 4.), dum membrana interna spora in radiculam elongatur

(tab. 71. fig. 5), quae mox dissepimento horizontali sejungitur, ita ut cellulae duae formentur (fig. 5), quarum altera chlorophyllo infarcta mox dissepimentis vario modo dividitur (fig. 6. 7. 8.), ita ut denique prothallium Hepaticis nonnullis simile evadat, in quo organa mascula, antheridia dicta (fig. 9x. 10.), spermatozois (fig. 12. 13.) repleta, et postea organa feminea seu archegonia (fig. 11.) procreantur. Archegonia cellulis quatuor uncinatis ornata cellulam globosam continent, ex qua denique caulis Equiseti enascitur.

5. DE CAULE ADHUC QUAE DAM.

1. Caulis apicem versus omnino ramorum naturam assumit et externam et internam, etiam in iis speciebus, quarum rami a caule diversissime formati sunt.

2. Cum crassitie caulis non aequo modo numerus angulorum apicem versus diminuitur; in apice caulis, qui e. gr. decies tenuior est, quam caulis medius, non anguli decies pauciores offenduntur, sed numerus eorum parumper tantum minor est.

3. Ubi caules basi ramosissimi inveniuntur, rami basiliares indole externae et internae intermedii sunt inter ramos et caules normales.

DE SYSTEMATE EQUISETORUM.

Equiseti species 25, quae a me accipiuntur, in duas sectiones dividuntur, quae optime tamquam genera duo probari possint. Notam autem gravissimam, qua hae sectiones: *Equisetum* sensu strictiori et *Hippochaete*, a se invicem distinguntur, stomata praebent. Sin vero reliquas etiam notas et structuram anatomicam *Equiseti* cum *Hippochaete* comparare velis, effugere nequit, duas has sectiones summopere naturales esse, et ab eo, qui iis operam dat, primo visu discerni posse. Insequentes nominantur differentiae.

Equisetum s. str.

Stomata series binas inordinatas sive unam seriem latissimam in valliculis efformantia, saepe oblique posita, cum epidermide in eadem planitie; singula stomata non lege certa a se invicem disjuncta.

Stoma exterius lamina silicea circumcirca libera obtectum, rima verticali angustissima, ostio stomatis respondente, media instructa.

Radii stomatis exterioris pauci, 7—10, rarius 14, jam a basi divergentes, saepe furcati.

Ochreola plerumque 5-carinata; carina exterior reliquis melius evoluta, sola fasciculo et stomatibus praedita.

Caules homomorphi vel dimorphi. Rami lacuna centrali praediti vel ea destituti.

Hippochaete.

Stomata series binas maxime regulares in valliculis efformantia, semper exacte verticaliter posita, in depressione profunda epidermidis sita; singula stomata non lege certa a se invicem disjuncta.

Stoma exterius lamina silicea continua foramine amplo transverso irregulariter pertuso obtectum.

Radii stomatis exterioris numerosi, 16—24, primum paralleli, tandem divergentes, rarius furcati.

Ochreola atrofusca fragilis ex parte vel omnino epidermide velata, stomatibus et fasciculo semper destituta videtur.

Caules homomorphi. Rami lacuna centrali praediti.

Primum ramorum internodium vaginâ caulina longius vel brevius.

Spica obtusa.

Rhizoma tuberculis siliceis nullis.

Species notis distinctissimis inter se differentes, pleraeque in regionibus temperatis et frigidis obvenientes.

Primum ramorum internodium vaginâ caulina semper brevius.

Spica apiculata.

Rhizoma tuberculis siliceis exasperatum.

Species notis minus distinctis inter se differentes, pleraeque in regionibus meridionalibus et tropicis provenientes.

CONSPECTUS EQUISETORUM OMNIUM CUM DISTRIBUTIONE EORUM GEOGRAPHICA.

I. EQUISETUM LINN. ex parte.

A. EQUISETA HETEROPHYADICA A. Br.

Stomata in valliculis biseriata. Fasciculi vasorum in sectione transversa triangulares. Vagina fasciculorum communis simplex semper adest. Rami solidi. Caules steriles dense verticillati.

Equiseta caulibus dimorphis instructa: alteri scapi fertiles, praecoces, primum nudi, pallidi, laeves, stomatibus et cellulis fibrosis destituti, cito pereuntes vel mox ramos proferentes, virescentes, stomata et cellulas fibrosas accipientes; alteri caules steriles virides.

a. Equiseta anomopora Milde.

Scapi normales nudi cito pereuntes. Stomata in caule sterili in media vallicula series binas approximatas e 2-6 lineis compositas efformantia vel omnino nulla.

1. E. ARVENSE Linn. Europa, America bor., Asia, Africa bor. et Caput b. sp.
2. E. TELMATEIA Ehrh. Europa, Amer. bor., Asia bor. et occ., Africa bor.

b. Equiseta stichopora Milde.

Scapi primum pallidi nudi laeves stomatibus et cellulis fibrosis destituti, mox ramos sub vaginis spicae proximis accipientes, virescentes, stomata et cellulas fibrosas proferentes, exasperati. Stomata series binas remotas ad latera carinarum sitas, ex 1-2 lineis compositas efformantia.

3. E. PRATENSE Ehrh. Europa bor. et media, Amer. bor., Asia bor.
4. E. SILVATICUM Linn. Europa, Amer. bor., Asia bor.

B. EQUISETA HOMOPHYADICA A. Br.

Stomata in valliculis unam seriem latissimam formantia. Fasciculi vasorum in sectione transversa triangulares vel ovals. Vagina fasciculorum communis simplex adest aut partialis. Rami solidi aut fistulosi. Caules steriles nudi vel ramis sparsis vel dense verticillatis vestiti.

Equiseta caulibus homomorphis instructa.

a. Equiseta bicylindrica Milde.

Vagina fasciculorum communis simplex adest. Forma fasciculorum in sectione transversa trigona.

* Rami solidi.

5. E. DIFFUSUM Don. Himalaya.
 6. E. BOGOTENSE H.B.K. America merid.
- ** Rami fistulosi.
7. E. PALUSTRE Linn. Europa, Asia bor. et occ., Amer. bor.

b. Equiseta monocylindrica Milde.

Vaginae fasciculorum partiales adsunt. Forma fasciculorum in sectione transversa ovalis.

8. E. LIMOSUM Linn. Europa, Asia bor., Amer. bor.
9. E. LITORALE Kühlew. Europa, Amer. bor.

II. HIPPOCHAETE MILDE.

A. EQUISETA PLEIOSTICHA Milde.

Stomatium series e duabus vel compluribus lineis compositae. Rami dense verticillati.

a. Equiseta monocylindrica Milde.

Vaginae fasciculorum partiales adsunt.

10. E. XYLOCHARTUM Mett.*) Peruvia, Chile.

b. Equiseta tricylindrica Milde.

Vagina fasciculorum communis duplex adest.

11. E. MARTII Milde. Peruvia, Brasilia.
12. E. GIGANTEUM Linn. America merid.
13. E. PYRAMIDALE Goldm. America merid.
14. E. SCHAFFNERI Milde. Mexico, Peruvia, Chile.

B. EQUISETA AMBIGUA Milde.

Stomatium series in eadem specie nunc uni- nunc multilinatae. Vagina fasciculorum communis duplex. Plantae nudae sive ramis sparsis sive verticillatis vestitae. Vaginae caulibus elongatae, amplatae. Carinae caulibus convexae. Rami ad summum 4-9-anguli.

15. E. RAMOSISSIMUM Desf. Europa, Asia, America, Africa.
16. E. SIEBOLDI Milde. Japonia.

C. EQUISETA MONOSTICHA Milde.

Stomatium series unilineatae. Vaginae fasciculorum aut partiales, aut communes duplices, aut communes simplices. Plantae nudae sive ramis sparsis sive verticillatis vestitae, nunc robustae elatae, nunc humillimae. Vaginae caulibus cylindricae vel amplatae. Carinae caulibus angulatae vel convexae. Rami 5-18-anguli.

a. Equiseta monocylindrica Milde.

Vaginae fasciculorum partiales adsunt.

17. E. DEBILE Roxb.***) Asia merid., Insulae Austral.

b. Equiseta tricylindrica Milde.

Vaginae fasciculorum communes duplices adsunt.

* Equiseta mexicana Milde.

18. E. MEXICANUM Milde. Mexico.
19. E. MYRIOCHAETUM Cham. et Schldl. Mexico.

** Equiseta hiemalis Milde.

20. E. ROBUSTUM A. Br. America bor., Asia trop. et subtrop.
21. E. LAEVIGATUM A. Br. America bor.
22. E. HIEMALE Linn. Europa, Asia, Amer. bor.

*** Equiseta trachyodonta Milde.

23. E. TRACHYDON A. Br. Europa.
24. E. VARIEGATUM Schleich. Europa, Asia bor., America bor.

c. Equiseta bicylindrica Milde.

Vagina fasciculorum communis simplex adest.

25. E. SCIRPOIDES Michx. Europa, America bor., Asia bor.

QUALITATES ET USUS EQUISETORUM BRASILIENSIIUM.

Epidermis Equisetorum terra silicea abundat, et *Equiseti hiemalis* analysis probavit, centum partes hujus plantae 13 partes terrae siliceae continere. Haec terra silicea vaccis admodum noxia dicitur; evocantur enim diarrhoea, mictus cruentus, abortus, macies. DESCOURTILZ in „Flore médicale des Antilles“ enarrat, aequomodo *Equisetum giganteum*, etiam in Brasilia obvium, vaccis nocere, quum equi sine damno eo vesci possint; servos autem apicibus caulium pro nutrimento uti, et caules asperos, ut in Europa *E. hiemalis*, ad polienda ligna et vasa, imprimis stanuae, adhiberi. Haec omnia sunt quae comperimus.

*) Cf. PFITZER Bonnensis me docuit, vaginas fasciculorum *Equiseti xylochaeti* et *E. debitis* (v. infra n. 18) esse partiales.

**) Cf. adnot. supra ad *E. xylochaetum*.

EQUISETA BRASILIENSIS DESCRIPTA.

1. EQUISETUM BOGOTENSE H.B.K. caulibus rugulosis profunde 4—9-sulcatis solidis, vage ramosis sive nudis; vaginis laxis ampliatis, foliolis convexis sulco medio profundo et sulcis singulis lateralibus instructis, dentibus rufis membranaceis ovato-lanceolatis basi sulcatis; spica obtusa; stomatibus phaneroporis.

Tabulae nostrae LXXIII. LXXIV. (habitus typi et varietatis β); tab. LXXI. Fig. 15—17. 20—23., tab. LXXII. Fig. 1. 2. (analysis).

Equisetum Bogotense H.B.K. Nov. Gen. et Sp. Plant. I. 42. (1815). Milde, Monogr. Equiset. (1867) p. 311.

Equisetum stipulaceum Vauch. Mon. Prél. (1822). 377.

Equisetum pratense W. J. Hooker in Botany of Beechey's Voy. (1841). 51.

Equisetum flagelliferum Kunze, Synops. Pl. Amer.-austr. Mss.

Equisetum Chilense Presl Mss.

Equisetum Quitense Fée Mss.

CAULES homophyadici transverse dense rugulosi, profunde sulcati. CARINAE 4—9 vallecularum latitudine fere aequantes. VAGINAE laxae ampliatae; FOLIOLA convexa sulco medio profundo et sulcis singulis lateralibus, sulco commissurali brevi superne dilatato; DENTES rufi membranacei ovato-lanceolati basi sulcati. RAMI 4—5-anguli dense rugulosi carinis sulcatis, dentes et vaginae cauli simillima; OCHREOLA atrofusca. STOMATA numerosa phaneropora. CARINAE caulis convexae sulcatae; lacuna centralis nulla; rami solidi. VAGINA fasciculorum vasorum communis simplex.

RHIZOMA nigrum solidum tomentosum. CAULES plerumque fasciculati, sordide virides, satis asperi, 6—10 poll., rarius 10—18 ped. alti, semper solidi, nunquam fistulosi, inter frutices scandentes, tetragoni v. ad summum 8—9-goni. VAGINAE 3—5 lin. longae, virides, dentibus rufis membranaceis. SPICA fusca 4—7½ lin. longa, oblonga, obtusa, interdum brevi-apiculata, rachis solida. RAMI nulli vel sparsi, nunquam dense verticillati, plerumque singuli—terni, rarissime 4—5-ni, nunc breves nunc ultrapedales, interdum ramulosi, steriles vel spicigeri, lacunis omnino destituti.

Var. β. FLAGELLIFERUM Kunze in Linnaea IX. (1835).

Tabula nostra LXXIV. Fig. II. (habitus).

Caulis pedalis et longior, glaucus, debilis, procumbens vel adscendens, 5—6-gonus, a basi ramosus. Rami singuli—bini longissimi, tenuissimi, flaccidi, ultrapedales, 3—4-goni, ramuli secundarii singuli minores.

Var. γ. NUDUM Milde.

Caulis erectus, pentagonus, brunneus, nudus vel ramis brevissimis vestitus.

Planta gregarie crescens cum Gynertis, Equiseto ramosissimo etc. locis humidis, ad rivus, in saxis muscosis, in quercetis ab 11000 ped. usque ad litora maris, ab insula Jamaica per Americam meridiionalem occidentalem usque ad insulam Chiloë observata, copiosissime in republ. Chile, et verosimiliter etiam in Brasilia. Var. β. in Caracas et Chile, var. γ. in Guatemala.

2. EQUISETUM XYLOCHAETUM METTEN. caulibus pallidis laevissimis; vaginis longis cylindricis pallidis, foliolis 30—40 planis, dentibus lanceolato-linealibus aterritimis sublignosis planis apice 2—4-nis connatis; ramis dense verticillatis 7—8-angulis scabris, vaginarum foliolis tricarinatis, dentibus acuminatis albis, ochreola cum primo rami internodio epidermide disrupta obvelata; spica apiculata; stomatibus cryptoporis series 2—3-lineatas sistentibus.

Tabula nostra LXXII. Fig. 3—8. (analysis).

Equiset.

Equisetum xylochaetum Metten. Fil. Lechler. fasc. II. (1859). 34. Milde, Monogr. Eq. 381.

? *Equisetum Poeppigianum Mett. l. c. fasc. I. (1856). 27.*

Equisetum giganteum W. J. Hooker in Second Century of Ferns (1861) tab. 74., non Linn.

Equisetum Lechleri Milde in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien 1861. p. 350.

CAULIS pallidus laevissimus non sulcatus; CARINAE 30—40 maxime indistinctae, valleculis angustiores, convexae. VAGINAE cylindricae pallidae; FOLIOLA plana, lineis tuberculorum singulis marginalibus notata; DENTES lanceolato-lineales, aterritimi, rigidi, sublignosi, sola basi infima sulcati, bini—quaterni apice connati, plerumque truncati basi libera persistentes, sulco commissurali angustissimo superne ampliato; OCHREOLA cum internodio contiguo toto epidermide disrupta obvelata. RAMI dense verticillati 7—8-anguli, carinae scabrae; FOLIOLA vaginarum tricarinata, dentibus lanceolato-acuminatis sphaecelatis albidis macula media coloratis. EPIDERMIS caulis nuda; STOMATUM cryptopororum series 2—3-lineatae, 16—20 cellulis interpositis. LIBER carinalis amplissima. VAGINAE fasciculorum partiales. LACUNA centralis amplissima. CARINAE ramorum tuberculis cuboideis exasperatae, VALLECULAE nuda. SPICAE rachis solida.

Rhizoma ignotum. CAULIS lignosus, 10 ped. altus, 8 lin. crassus, eburneus; internodia 3—4 poll. longa; VAGINAE exceptis dentibus 6—11 lin. longae. RAMI 1 ped. longi et longiores, cinereo-virides, simplicissimi vel ramulis sparsis vestiti, steriles vel apice spicigeri.

Habitat in America meridionali ad ripas rivorum, e. gr. ad Arica Peruviae: Lechler; ad Lima: Gaudichaud; in Chile: Besser, forte in Brasilia occidentali adhuc inveniendum.

Haec species ab insequente abunde differt caule non sulcato, vaginis fasciculorum partialibus et basi ramorum.

3. EQUISETUM MARTII MILDE: caulibus sordide viridibus scabris; vaginis caulium brevibus cylindricis, foliolis 16—52 carina media angulata brevissima vel subnulla et binis lateralibus inaequalibus notatis, dentibus lanceolato-subulatis herbaceis planis 2—3-nis connatis vel liberis albedo-marginatis; ramis dense verticillatis 7—9-angulis scabris, dentibus vaginarum lineali-subulatis atrofuscis albo-marginatis; spica apiculata; stomatibus cryptoporis series 2—5-lineatas sistentibus.

Tabula nostra LXXV. (habitus et analysis).

Equisetum Martii Milde in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien 1862. p. 1258. Monogr. Equiset. 391.

Equisetum coronatum Ruiz Mss.

CAULIS sordide viridis scaber sulcatus; CARINAE CONVEXAE 16—40—52, valleculis angustiores. VAGINAE breves cylindricae; FOLIOLA plana, carina mediâ angulatâ basilari subnulla et binis lateralibus: exteriore brevior, interiore longior; DENTES firmi persistentes, herbacei, apice truncati, non sulcati, disjuncti vel bini—terni connati, anguste albedo-marginati. RAMI dense verticillati 7—9-anguli, carinis scabris instructi; VAGINAE elongatae amplatae 3—5-carinatae, DENTIBUS lineali-subulatis atrofuscis in parte inferiore albo-marginatis. EPIDERMIS granulis obsita; STOMATUM cryptopororum series 2—5-lineatae, 8—28 cellulis interpositis; CARINAE et VALLECULAE fasciis vestitae; LIBER carinalis altus valleculari triplo longior; VAGINA fasciculorum vasorum communis duplex; LACUNA centralis amplissima; CARINAE ramorum tuberculis subcuboideis obtectae. SPICAE rachis cava.

Rhizoma ignotum. CAULIS 15 ped. altus, 3—9 lin. crassus; VAGINAE 6—7 lin. altae exceptis dentibus; internodia 2½ poll. longa et longiora. RAMI arcuati, adscendentes, 9 poll. v. ultrapedales, steriles v. spicigeri.

Habitat in vallibus udis Peruviae et Brasiliae, e. gr. in prov. Minarum ad Salgado: Martius; prope S. Caetano ejusdem prov.: Gardner, et ad Caldas: G. A. Lindberg.

Haec species differt a *E. giganteo* praecipue foliolis vaginarum caulis planis et caule robustiore.

4. *EQUISETUM GIGANTEUM* LINN. caulibus sordide viridibus fragilibus sulcatis plus minus scabris; vaginis caulium cylindricis rarissime ampliatis, foliolis 20—42 carina media angulata et singulis vel binis marginalibus instructis, dentibus membranaceis pallidis vel medio fuscis deciduis planis ex parte connatis; ramis dense verticillatis 6—9-angulis scabris, dentibus vaginarum caulinis similibus; spica apiculata; stomatibus cryptoporis series 2—6-lineatas sistentibus.

Tabula nostra LXXVI. (habitus et analysis).

- Equisetum giganteum* Linn. *Spec. plant. Ed. II. (1763). 1517. n. 7. Vell. Fl. Flum. XI. t. 51. Milde, Monogr. Equis. 397.*
Equisetum ramosissimum Humb. et Bonpl. in Willd. *Sp. Pl. V. (1810). 9., nec Desf.*
Equisetum Caracasenum DC. in *Flor. Franc. VI. (1815). 244.*
Equisetum Humboldtii Poir. *Encycl. meth. Suppl. IV. (1816). 549.*
Equisetum Humboldtianum Fendl. *Pl. Venezuel. n. 1801.*
Equisetum Poeppigianum A. Braun *Mss., nec Mett.*
Equisetum Tussaci Fée *Mss.*

CAULIS sordide viridis laevis sive scaber, plus minusve profunde sulcatus; CARINAE convexae 20—42, valleculis angustiores; VAGINAE cylindricae, rarissime ampliatae; FOLIOLA carinis singulis vel binis marginalibus et carinâ mediâ angulatâ instructa; DENTES membranacei pallidi vel medio fusci, truncati vel basi connati, decidui, non sulcati. RAMI verticillati 6—9-anguli, CARINAE scabrae, VAGINAE elongatae ampliatae; carinae et dentes caulinis similes; OCHREOLA per epermidem ex parte velata; primum internodium $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ vaginae caulinae aequans. EPIDERMIS granulis obsita, STOMATUM cryptoporum series 2—6-lineatae, 6 vel compluribus cellulis interpositis; CARINAE fasciis vestitae vel nuda. LIBER carinalis altus valleculari triplo longior; VAGINA fasciculorum vasorum communis duplex. LACUNA centralis amplissima, CARINAE ramorum tuberculis subcuboideis obiectae. SPICAE rachis solida.

Rhizoma ignotum. CAULIS 10—20—36 pedes altus, 3—9 lineas crassus, interdum laevis, plus minusve fragilis. Internodia 3—5 poll. longa. VAGINAE 3—6 $\frac{1}{2}$ lin. longae exceptis dentibus, nunc longiores quam latiores, vel eadem longitudine qua latitudine, raro latiores quam longiores; DENTES interdum basi constricti secedentes. SPICA oblonga, nigra, apiculata. RAMI patentes et patentissimi breves vel ultrapedales, hic illic ramulosi, steriles vel spicigeri.

Var. β . *POEPPIGIANUM* A. Br.

Equisetum Poeppigianum A. Braun *tamquam species.*

Caulis laevissimus admodum debilis, stomatum series bilineatae, foliola caulina tricarinata, dentes albi sphacelati basi constricti.

Var. γ . *CARACASANUM*.

Equisetum Caracasenum DC. *l. c.*

Caulis crassus scaber, stomatum series 3—6-lineatae, dentes firmiores, irregulariter secedentes, non constricti.

Var. δ . *BRASILIENSE* Milde.

Equisetum Brasiliense Milde in *Verh. zool.-bot. Gesellsch. in Wien 1862. p. 1262.*

Equisetum Tussaci Fée *Mss.*

Caulis crassus scaber, stomatum series 1—3 lineatae, vaginae breves latiores quam longiores ampliatae.

Habitat locis paludosis plerumque montosis inde ab insula St. Domingo usque ad Brasiliam et Chile. Intra Brasiliam lecta est in provincia Mato Grosso: Riedel, Weddell. Var. β . in Peruvia, var. γ . ad Caracas (Ernst), var. δ . in Brasilia: Weddell.

5. *EQUISETUM PYRAMIDALE* GOLDM. caulibus sordide viridibus validis scabris sulcatis; vaginis cylindricis, foliolis 16—24 carinâ mediâ angulatâ et binis lateralibus inaequalibus instructis, dentibus persistentibus et membrana alta basilari tandem evanescente inter se conjunctis rigidis sulcatis lanceolato-subulatis nigris; ramis dense verticillatis 7—9-angulis, dentibus vaginarum caulinis similibus; spica apiculata; stomatibus cryptoporis series 2—7 lineares sistentibus.

Tabula nostra LXXVII. Fig. I. (habitus et analysis).

- Equisetum pyramidale* Goldm. *Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XI. Suppl. I. (1843). 469. Milde, Monogr. Equis. 412.*
Equisetum giganteum C. Gay in *Histor. fis. y polít. de Chile. VI. (1853). 471.*
Equisetum giganteum v. Chilense Milde in *Verhandl. zool.-botan. Gesellsch. in Wien 1863. p. 229.*
Equisetum Chilense Steudel *Mss.*

CAULIS sordide viridis validus scaber sulcatus; CARINAE 16—24 valleculis angustiores convexae; VAGINAE cylindricae; FOLIOLA subplana carinâ mediâ angulatâ et binis marginalibus: exteriore breviori lineali, interiore completa longiore; DENTES firmi basi persistentes et membrana alta basilari tandem evanescente inter se conjuncti, nigri, lanceolato-subulati, medio sulcati. RAMI verticillati 7—9-anguli, CARINIS scabris, VAGINIS elongatis ampliatis iis cauli similibus; DENTES ovato-lanceolati basi late membranaceo-marginati medio fusci apice truncati, OCHREOLA epidermide e parte velata, primum internodium $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ vaginae caulinae aequans. EPIDERMIS granulis obsita lumine amplo; STOMATUM cryptoporum series 2—7-lineatae, 6—14—30 cellulis interpositis; CARINAE fasciis latis, VALLECULAE nullis sive obsolete vestitae. LIBER carinalis altus, valleculari triplo longior; VAGINA fasciculorum vasorum communis duplex; LACUNA centralis ampla. CARINAE ramorum tuberculis subcuboideis vestitae, VALLECULAE nuda vel rosulis obsitae. Rachis SPICAE cava.

Rhizoma ignotum. CAULIS ultraquadripedalis, 3 $\frac{1}{2}$ —5 lin. crassus, robustus, rigidus, internodia 2 $\frac{1}{3}$ —3 $\frac{1}{2}$ poll. longa, VAGINAE 4 $\frac{1}{2}$ —6 lin. altae exceptis dentibus. RAMI arcuati adscendentes ultrapedales, steriles vel spicigeri.

Habitat in America meridionali a Caracas per Brasiliam usque in republ. Chile. Intra Brasiliam in prov. Minas Geraes observatum est: Langsdorff. Etiam ad Buenos Ayres: Swaed.

Haec species ab *E. giganteo* differt caule rigidore, non fragili, foliis vaginae 5-carinatis, dentibus firmioribus nigris sulcatis.

6. *EQUISETUM RAMOSISSIMUM* DESF. caulibus sordide viridibus fragilibus plus minus scabris sulcatis; vaginis ampliatis, foliolis 6—26 carinâ mediâ angulatâ et singulis lateralibus instructis, dentibus plq. apice truncatis sphacelatis basin triangularem reliquentibus liberis vel connatis; ramis vagis vel 3—15-nis verticillatis 6-angulis, dentibus iis caulis similibus; spica apiculata; stomatibus cryptoporis series 1—4-lineatas sistentibus.

Tabula nostra LXXVII. Fig. II. (habitus) et LXXII. Fig. 9—14. (analysis).

- Equisetum ramosissimum* Desf. *Flor. Atlant. II. (1800). 398. 399. Milde, Monogr. Equis. 428.*
Equisetum ramosum DC. *Synops. Plant. in Flor. Galliae (1806). 118. n. 1457.*
Equisetum elongatum Willd. *Spec. Plant. V. (1810). 8. n. 13.*
Equisetum multiforme Vaucher, *Monogr. Prél. (1822). 380.*
Equisetum scandens Remy apud Cl. Gay, *Histor. fisic. y polít. de Chile VI. (1853). 471.*

CAULIS sulcatus plus minusve scaber 6—26-angulus; VAGINAE ampliatae dentatae; DENTES non sulcati persistentes vel decidui sed marginem vaginae fragmentis triangularibus instructum rarissime truncatum relinquentes; FOLIOLA plus minusve distincte 3—4-carinata; RAMI sparsi vel verticillati 4—9-anguli. STOMATUM cryptopororum series 1—4-lineatae; CARINAE convexae fasciis, nunquam tuberculis bilineatis vestitae. VAGINA fasciculorum vasorum communis duplex. LACUNA centralis ampla. RACHIS SPICAE solida.

RHIZOMA nigrum, scabrum, tomento destitutum. CAULIS nunc erectus usque 3—5 ped. altus, nunc decumbens, nunc inter frutices scandens, ultra 10 ped. altus, pallide viridis, denique cinerascens, plerumque scaberrimus, transverse rugulosus, rarissime sublaevis, nunquam lignosus, tenuissimus vel usque 4 lin. crassus. VAGINAE caulis et ramorum e basi cylindrica semper sensim ampliatae, plerumque elongatae. RAMI nunquam dense verticillati, plus minusve longi, steriles vel spiciferi.

Planta polymorpha. Insequuntur varietates Americanae:

a. Varietates unilineatae.

Stomatum series unilineatae. Rosulae seriales in valleculis caulis provenientes.

1. Var. MUELLERI Milde.

Caulis erectus, 2 ped. altior, scabriusculus, 15—17-angulus, 2 lin. crassus; vaginae 4 lin. longae, fere 3 lin. amplae, truncatae; foliola plana carinâ mediâ angulatâ et singulis carinis lateralibus; dentes plerumque persistentes flexuosi, fuscii, late membranaceo-marginati; carinae fasciis latis umbonatis, valleculae rosulis serialibus pulcherrime vestitae; stomatum series 15 cellulis disjunctae; rami 5 poll. longi, steriles.

b. Varietates bi—multilineatae.

Stomatum series bi—multilineatae.

2. Var. SCABERRIMUM Milde.

Caespitosum; caulis incanus, debilis, basi flexuosus, 6—8-gonus, carinis transverse serratis scaberrimus, simplex vel rarissime ramis singulis 6-angulis vestitus. Vaginae 2 lin. longae, 1½ lin. amplae; foliola 5-carinata: carinâ mediâ angulatâ et binis carinis lateralibus brevioribus; dentes lanceolato-subulati, albidii, medio nigri, plerumque truncati, membranacei. Stomatum series 3—4-lineatae, 3—5 cellulis interpositis; carinae fasciis latissimis densissime obtectae, valleculae annulis transverse serialibus ornatae.

3. Var. ANNULIFERUM Milde.

Caulis 9 poll. altus et humilior, 7-angulus, scabriusculus, cinereo-viridis; vaginae ampliatae, 1½ lin. altae, 1½ lin. amplae; foliola carinâ mediâ angulatâ et binis carinis lateralibus instructa, dentes nulli, margo vaginae irregulariter albedo-truncatus. Rami solum in caule infimo positi singuli v. bini, 1—2 poll. longi, 6-anguli. Series stomatum in caule bilineatae 8—10-cellulis disjunctae, carinae fasciis umbonatis, valleculae annulis serialibus vestitae.

4. Var. AFFINE Milde.

Equisetum giganteum Philippi, Plant. chilens. edid. R. F. Hohenacker n. 701.

Caulis erectus, scaber, glaucus, 9—15-angulus, profunde sulcatus; vaginae 4—4½ lin. longae, 2—3 lin. ore ampliato latae; foliola obsolete tricarinata; dentes atri, late-membranaceo-marginati, plerumque decidui, in margine vaginae fragmenta triangularia relinquentes; rami verticillati terni patentes 6—7-anguli, fere 3½ poll. longi, steriles, dentes decidui. Stomatum series 3—5-lineatae, 8—11 cellulis disjunctae, carinae fasciis latis et umbonibus, valleculae rosulis singulis et serialibus obsolete vestitae.

5. Var. DOLOSUM Milde.

Equisetum ramosissimum Goldm. ap. Meyen in Nov. Act. Nat. Cur. XI. Suppl. I. (1843). 469.

Caulis altus cinereo-virens, profunde sulcatus, asperimus, 9—12-angulus, 1½—2½ lin. crassus; vaginae 3½—4 lin. altae, sensim ampliatae, infimae zonâ nigrâ suprabasilarî instructae; foliola caulis infimi plana, carinâ mediâ longâ angulatâ et singulis carinis lateralibus brevioribus instructa, foliola superiora convexa; dentes albi sphaclati, lanceolato-subulati, medio atrofusci, plerumque nulli; rami bini—quini heptagoni, dentes albi sphaclati. Carinae caulis fasciis latis dense obsitae, valleculae fasciis obsolete vestitae; stomatum series 3—4-lineatae, 5—9 cellulis interpositis.

6. Var. SCANDENS.

Equisetum scandens Remy l. c.

Caulis altus arboreus scandens, debilis, incanus, profunde sulcatus, scaberrimus, 9-gonus, internodiis flexuosis; vaginae concolores, ampliatae; foliola convexa 3-carinata, dentes nigri, truncati, albedo-membranaceo-marginati; rami 3—6 poll. longi, 7-goni, spiciferi, stomatum series 2—3-lineatae, 4 cellulis disjunctae, valleculae rosulis singulis numerosis vestitae, carinae fasciis latis umbonatis obtectae.

Habitat in arenosis et locis humidis gregarie crescens, in Europa praecipue meridionali, per totam Africam, in Asia praesertim occidentali, in America boreali rarissime, copiose in republica Mexicana et in Chite, raro etiam in Brasilia. Var. 1. Mülleri, locis humidis ad Chinantla Mexici, districtus Puebla, alt. 7000 ped. (Liebmann); ad Eugenio juxta Rio blanco Mexici (Müller). — Var. 2. scaberrimum prope Valparaiso in Chite (Jelinek). — Var. 3. annuliferum in patudibus Sierrae de la Cruz prope Eugenio Mexici (Müller). — Var. 4. affine ad Lagoa Santa prov. Minas Geraes Brasiliae in virgultis humidis, ad rivulos etc. haud infrequens: Warming; ad Santiago de Chite (Philippi). — Var. 5. dolosum ad Copiapo in Chite (Meyen, Gay). — Var. 6. scandens ad S. Pedro, distr. Quillota in Chite (Bertero, Gay).

TABULAE EXPLICATAE.

Tab. LXXI. Equisetorum evolutio et analysis.

Fig. 1. Spora cum cytoblasto elateribus destituta. — Fig. 2. Spora elateribus duobus circumvoluta. — Fig. 3. Spora elateribus duobus expansis. — Fig. 4—8. Sporae germinantes. a) radícula. — Fig. 9. Prothallii fragmentum cum duobus antheridiis (x). — Fig. 10. Antheridium solitarium apertum. — Fig. 11. Fragmentum prothallii cum archegonio solitario aperto; in cellula embryonali cytoblastus adest. — Fig. 12. Spermatozoum liberum ciliis vestitum. — Fig. 13. Spermatozoum cellula matricali inclusum. — Fig. 14. Spermatozoum tinctura Jodi necatum. — Fig. 15. Spica obtusa *Equiseti Bogotensis* cum annulo (a). — Fig. 16. Receptaculum ejus solitarium stipitatum cum sporangiis. — Fig. 17. Idem admodum adauctum a latere inferiore visum. — Fig. 18. Sectio longitudinalis fasciculi vasorum *Equiseti arvensis* secundum DIPPELI figuram originalem; f. regio lacunae carinalis, e. vasa reticularia, a. d. parenchyma decolor, b. cellulae fibrosae, c. cellula cribrosa. — Fig. 19. Sectio transversalis fasciculi vasorum *Equiseti limosi*. Vagina fasciculi partialis (g) adest; f. lacuna carinalis, e. vasa reticularia, a. d. parenchyma decolor, b. cellulae fibrosae, c. cellulae cribrosae.

Fig. 20—23. *Equisetum Bogotense*.

Fig. 20. Pars valleculae caulis cum stomatibus. — Fig. 21. Pars carinae caulis cum fascia transversali. — Fig. 22. Sectio transversalis caulis. a. Lacunae valleculares, c. lacunae carinales, b. carina caulis sulco carinali notata, i. vallecula caulis (lacuna centralis nulla). — Fig. 23. Vagina caulis cum internodio primo adaucta; a. ochreola rami.

Tab. LXXII. Equisetorum analysis.

Fig. 1. 2. *Equisetum Bogotense*.

Fig. 1. Cellula epidermidis (a) cum lamina silicea (b) stoma obtegente. — Fig. 2. Stoma superius (c) radiis siliceis vestitum et stoma inferius (d). Utrumque positum est sub lamina silicea (b) figurae 1b.

Fig. 3—8. *Equisetum xylochaetum*.

Fig. 3. Vagina caulis, magnitudine naturali. — Fig. 4. Sectio transversalis rami cum lacunis; a. lacuna centralis, b. lacunae valleculares; interpositae sunt omnium minime lacunae carinales. — Fig. 5. Tubercula cuboidea carinas ramorum vestientia. — Fig. 6. Spica rami cum annulo basilari. — Fig. 7. Annulus spicae basilaris adauctus. — Fig. 8. Apex spora elateris striis notatus.

Fig. 9—14. *Equisetum ramosissimum*.

Fig. 9. Vagina caulis aducta. — Fig. 10. Spica caulis acuta. — Fig. 11. Sectio transversalis caulis cum vaginis fasciculorum et lacunis; a. carinae, b. valliculae caulis, c. lacunae carinales, d. lacunae valliculares, e. vagina fasciculorum communis externa, f. vagina fasciculorum communis interna. — Fig. 12. Fragmentum sectionis transversalis caulis; a. carina caulis, b. b. valliculae, c. c. lacunae valliculares, d. lacuna carinalis cum fasciculo vasorum, e. vagina fasciculi vasorum communis externa, f. vagina fasciculi communis interna, m. strata chlorophyllosa, n. parenchyma laxum decolor. — Fig. 13. Sectio longitudinalis epidermidis; a. cellula quadrata stomata singula disjuncta, b. stoma, c. carinarum fasciae transversales. — Fig. 14. Sectio transversalis fasciculi fibrovascularis; f. lacuna carinalis, e. vasa reticularia, a. d. Parenchyma decolor, b. cellulae fibrosae, c. cellulae cribrosae, g. vagina fasciculi communis externa, h. vagina fasciculi communis interna.

Tab. LXXIII. *Equisetum Bogotense*. Caulis primarius decumbens.

Tab. LXXIV. Fig. I. *Equisetum Bogotense*. Caule primario erecto.

Fig. II. *Equisetum Bogotense* var. *flagelliferum* Kunze.

Tab. LXXV. *Equisetum Martii*.

Fig. 1. Vagina caulis, magnitudine nat. — Fig. 2. Sectio longitudinalis epidermidis caulis; a. b. a. vallicula stomatibus (a) et fasciis transversalibus (b) instructa, a. a. series stomatum trilineatae, 10 cel-

lulis interpositis, c. carina caulis fasciis transversis vestita. — Fig. 3. Foliolum vaginae sectione transversa; a. latus internum, b. latus externum, c. fasciculus vasorum. — Fig. 4. Sectio transversalis rami cum lacunis; a. lacuna centralis, b. lacunae valliculares, c. lacunae carinales, d. carina rami, e. vallicula rami. — Fig. 5. Tubercula ramorum carinas vestientia cuboidea.

Tab. LXXVI. *Equisetum giganteum*.

Figura major habitum *Equiseti gigantei* var. *Poeppigiani* A. Br. refert. Fig. 1. Vagina aducta caulis. — Fig. 2. Var. *brasiliense*. Vagina caulis aducta. — Fig. 3. Cellula epidermidis (a) cum foramine irregulari (b), sub quod stomata condita sunt. — Fig. 4. Stoma exterius radiis siliceis vestitum (a) et interius (b), utrumque sub b. figurae 3 positum. — Fig. 5. Pars valliculae caulis seriem stomatum quadrilineatam ostendens. — Fig. 6. Pars carinae caulis fasciis transversis vestita. — Fig. 7. Sectio transversa rami cum lacunis. — Fig. 8. Tubercula carinas ramorum vestientia.

Tab. LXXVII. Fig. I. cum analysi: *Equisetum pyramidale*.

Fig. 1. Vagina caulis aducta cum internodiis rami infimis. — Fig. 2. Sectio transversalis folioli vaginae caulis: a. latus internum, b. latus externum, c. sulcus commissuralis, d. fasciculus vasorum centralis. — Fig. 3. Carina caulis fasciis vestita. — Fig. 4. Tubercula ramorum carinas vestientia. — Fig. 5. Stoma.

Tab. LXXVII. Fig. II. *Equisetum ramosissimum*, habitus. (Analysis in tab. LXXII. Fig. 9—14.)

**ISOËTACEAE, MARSILIACEAE,
SALVINIACEAE.**

EXPOSUIT

MAXIMILIANUS KUHN, PHIL. DR.,
BEROLINENSIS.

ISOËTACEAE.

ISOËTACEAE v. ISOËTEAE *Barth. Ord. nat. 16; Endl. Gen. 68.*

Plantae perennes aquaticae s. terrestres s. amphibiae, RHIZOMATE tuberoso, FOLIIS gramineis, SPORANGIIS in basi foliorum immersis iisque dorso adnatis, SPORIS dimorphis.

Genus unicum:

ISOËTES LINN.

ISOËTES *Linn. Gen. Plant. n. 1184 et Iter scandin. (1751) p. 420; A. Braun Monatsber. Berl. Akad. Wissensch. 1863. p. 554.*

RHIZOMA discoideum, centro depressum sulcis 1—2 longitudinalibus instructum, unde 2—4 lobi existunt. RADICES dichotome ramosae, e sulcis ortae. FOLIA spiraliter disposita, stricta, subulata, fragilia, dorso convexiuscula, facie canaliculata, basi in vaginam plus minus latam dilatata, quatuor lacunis aëreis percurta, per intervalla septis transversis discreta. FASCICULUS unicus medius inter lacunas e cellulis annulatis et spiralibus compositus; sub epidermide in parte posteriori, laterali atque anteriori foliorum fasciculi fibrosi mox numerosi, mox pauci inveniuntur. Species aquatica stomatibus plerumque carent, amphibiae et terrestres stomatibus vel undique vel in latere anteriori foliorum instructae sunt. SPORANGIUM in basi foliorum immersum, oblongum, membranaceum; margines hujus foveae in nonnullis speciebus ita dilatati, ut sporangium membrana tenuissima obtegant, quae velum vocatur. VELA in speciebus austro-americanis incompleta s. nulla. Supra foveam membrana perparva plerumque orbicularis

ISOËTAC.

s. triangularis observatur, quae lingula vocatur, atque squama minima in basi lingulae labium dicta. Area illa pars vaginae est, quae circa sporangium expanditur. MACROSPORAE (quae in foliis externis inveniuntur) tetraëdrico-globosae tripode notatae; costae plus minusve altae in vertice conjunctae. MICROSPORAE in foliis internis dispositae trigonae plerumque laeves.

Obs. In speciebus terrestribus squamae atro-fuscae, chartaceae inveniuntur, quae phyllades vocantur atque ex involutis foliis oriuntur.

CONSPECTUS SPECIERUM.

- A. Rhizoma bilobum. Statura elata, folia longissima flexilia
1. I. MARTII A. Br.
B. Rhizoma trilobum.
a. Velum incompletum. Macrospora obscure fuscae. Statura mediocris. Folia rigida 2. I. GARDNERIANA A. Br.
b. Velum nullum. Macrospora albae. Statura humilis.
Folia tenuiora 3. I. AMAZONICA A. Br.

1. ISOËTES MARTII A. BRAUN ined. Planta submersa fluitans; rhizoma bilobum, radicosum; folia flexilia mollissima, viridia, basi ferrugineis marginibus praedita; velum incompletum pallidum; sporangium subapertum macrosporis tetraëdrico-globosis, microsporis subovatis repletum.

Tabula nostra LXXVIII.

VEGETATIO amphibia, submersa. STATURA elata. RHIZOMA parvum 15 mm. crassum, duobus latis sulcis instructum; bulbosus subglobosus non compactus, 20 mm. crassus, paululum attenuatus. FOLIA numerosa, angustissima, 60—75 cm. longa, ad 2 mm. lata, obscure viridia, flexuosa,

mollissima, basi ferrugineis marginibus praedita, margines ferruginei 6 ad 8 cm. longi e cellulis brunneis obscuris efformati; stomata in parte superiori foliorum biserialiter disposita inveniuntur. VAGINA brevis, margine infusca; area angusta, pallida. VELUM incompletum plus quam dimidiam partem foveae tegens, pallidum, fuscescens. LABIUM productum, semicirculare, 0,25—0,50 mm. longum. LINGULA brevis, fusca, cordato-triangularis. SPORANGIUM subapertum 6—8 mm. longum, 5 mm. latum, pallidum, albo-nitens, e cellulis tenuissimis trabeculis trajectis efformatum. MICROSPORAE albae, glaberrimae, subovatae, madidae cuticula plus minus remota, 0,033—0,035 mm. longae. MACROSPORAE albissimae, 0,60—0,68 mm. diametro, tetraédrico-globosae, tripode notatae, superficie rugoso-runcinatae, rugis meandrinis confluentibus.

Habitat in prov. Minas Geraes in rivulo ad Caldas, m. Dec.: Regnell III. n. 1506, Mosén n. 2027.

Obs. Ex affinitate *Is. Engelmanni* A. Br., sed differt velo subcompleto, paucis stomatibus in superiori parte foliorum, microsporis glaberrimis, majoribus macrosporis. Fasciculi fibrosi marginales vix inveniuntur; fasciculus centralis valde evolutus. Lacunae aëreae foliorum permagnae, margine cellulis vitreis hinc inde instructae. Statura elata foliis verisimiliter fluitantibus.

2. ISOËTES GARDNERIANA A. Br. Planta submersa erecta; rhizoma robustum trilobum; folia erecta, rigida, obscure quadrangularia marginibus hyalinis instructa; velum incompletum; sporangium apertum, fuscescens, macrosporis obscure fuscis, microsporis albidis repletum.

Tabula nostra LXXIX. Fig. 1—4.

Isoëtes Gardneriana A. Braun in *Herb. Kunzei; Mitt. Fil. Lechler. II. 36; A. Braun Verhandl. d. botan. Vereins d. Prov. Brandenburg IV. 330; Baker in Journ. Bot. new ser. IX. 110.*

Isoëtes lacustris Hooker *British Ferns p. 55 partim.*

VEGETATIO amphibia, submersa. RHIZOMA crassum, 3—3,5 cm. latum, trifurcatum. FOLIA erecta, crassa, dura, rigida, 30—22 cm. longa, basi 2 mm. lata, versus apicem attenuata, obtusiuscula, obscure quadrangularia, in latere anteriori et posteriori costata; stomata undique inveniuntur. VAGINA margine lato hyalino longe procurrens; area angustissima. VELUM incompletum. LABIUM parvum subtruncatum. LINGULA triangularis, obtusa. SPORANGIUM apertum, fuscescens, 10 mm. longum,

5 mm. latum. MICROSPORAE albae glaberrimae, 0,035 mm. longae. MACROSPORAE 0,54—0,64 mm. diametro tetraédrico-globosae, madidae s. siccae obscure fuscae, ubique numerosissimis verrucis semiglobosis instructae, costae angustae.

Habitat in prov. Goyaz ad stationes missionariorum ad flumen Douro, m. Sept.: Gardner n. 3563.

Obs. Species distinctissima, colore obscure fusco macrosporangiorum atque rigiditate foliorum facile recognoscenda. Fasciculi peripherici fibrosi quatuor et in latere posteriori foliorum tres minores fasciculi. Stomata in parte anteriori foliorum inveniuntur, parum in posteriori; lacunae aëreae quatuor plus minus expansae. Statura mediocris.

3. ISOËTES AMAZONICA A. Br. Msc. Planta submersa vegetatione amphibia parvula; rhizoma trifurcatum; folia abbreviata subrigida; velum nullum; sporangium subglobosum macrosporis cinerascentibus, microsporis albidis praeditum.

Tabula nostra LXXIX. Fig. 5—6.

Isoëtes Amazonica A. Braun *Msc.; Baker in Journ. Bot. new ser. IX. 109.*

Isoëtes lacustris Hooker *British Ferns p. 55 partim.*

VEGETATIO amphibia, submersa. RHIZOMA parvum, magnitudine fructus *Pisi sativi*, trifurcatum. FOLIA pauca, 10—12, abbreviata, subrigida 5—6 cm. longa, vix 1 mm. lata, laete viridia, versus basin pallida, apice obtusa, stomatibus instructa. VAGINA pallida, late expansa. VELUM nullum. LINGULA brevis obscure triangularis. LABIUM minutum. SPORANGIUM subglobosum pallidum. MICROSPORAE albescentes 0,033—0,040 mm. longae, dilucidae, tenerrime tuberculatae. MACROSPORAE 0,43—0,61 mm. diametro albae s. cinerascentes, tetraédrico-globosae, costis elevatis, subundulatis, verrucosae; verrucae in facie basali numerosissimae, semiglobosae, in verticalibus minores minus confertae.

Habitat in prov. Pará prope Santarem locis inundatis: Spruce n. 574, 1081.

Obs. Proxima *Is. brachyglossae* A. Br. ex montibus Nilagiricis, sed statura humiliori atque confertis numerosissimis macrosporangiorum verrucis diversa. Minima species adhuc e Brasilia nota. Fasciculi peripherici fibrosi pauci inveniuntur in parte posteriori foliorum.

TABULAE EXPLICATAE.

Tab. LXXVIII. *Isoëtes Martii*, p. 646.

Fig. 1. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 2. Sporangium; a. vagina, b. area, c. velum, d. lingula, e. labium. — Fig. 3. Macrospora adacta. — Fig. 4. Microspora adacta.

Tab. LXXIX. Fig. 1—4. *Isoëtes Gardneriana*, p. 647

Fig. 1. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 2. Sporangium adactum. — Fig. 3. Macrospora adacta. — Fig. 4. Microspora adacta.

Fig. 5, 6. *Isoëtes Amazonica*, p. 648.

Fig. 5. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 6. Macrospora adacta.

Tabulas delineavit KUWNO duce cl. A. SCHULZE, Berolinensis.

MARSILIAEAE.

MARSILIACEAE v. MARSILIEAE *Bartl. Ord. nat. 15; Endl. Gen. 67.*

Plantae paludosae, rarius terrestres. CAULIS repens, prostratus, radicans, hic illic ramis brevibus sub diversis angulis egredientibus instructus, intus fasciculo cylindrico atque ductibus aëreis et lacunis septis transversis partitis praeditus. FOLIA in caulis dorso distiche alternantia, plus minus remota, petiolata, vernatione circinata, petiolis haud articulatis, foliis quatuor subverticillatis obovatis s. obcordatis s. cuneiformibus, nervis flabellatim dichotomis, s. lamina destituta foliis filiformibus graminifoliis. SPOROCARPIA pedicellata, globosa s. oblonga in axillis foliorum s. juxta petiolum s. in petiolo ipso solitaria s. aggregata, capsuliformia, coriacea, pilosa, valvis plurimis s. rima ventrali dehiscentia. SPOROCARPIA ex uno s. compluribus soris formata, qui nonnullas macrosporas et numerosissimas microsporas continent.

Genus in Brasilia unicum:

MARSILIA LINN.

MARSILIA Linn. *Gen. Plant.* 1182; *A. Braun Monatsber. d. Berlin. Akad. d. Wissensch.* 1863. p. 413 sqq.; 1870. p. 653 sqq.; 1872. p. 635 sqq.

CAULIS repens, radicans. FOLIA disticha, petiolata, lamina quadrifoliata segmentis cuneatis s. obovatis, ecostatis, nervis flabellatim dichotomis instructa. SPOROCARPIA basin petioli s. petiolum ipsum occupantia, oblonga, pilis e cellulis 2—10 formatis linearibus obtecta, carpodiis (i. e. petiolis sporocarpiorum) plus minus longis instructa soros 2—12 includentia strato gelatinoso circumdatos, ex macrosporis 12—300 (ut in *M. Ernesti* A. Braun inveniuntur) et microsporis numerosissimis formata.

Marsiliae.

CONSPECTUS SPECIERUM.

- A. Sporocarpia numerosa 6—25 supra basin petioli seriatim disposita, carpodiis brevibus cernuis insidentia
1. *M. POLYCARPA* Hook. et Grev.
B. Sporocarpia pauca (2—3) a basi petioli paullo remota, carpodiis deflexis, oblonga, pentagona
2. *M. DEFLIXA* A. Braun.

1. *MARSILIA POLYCARPA* HOOK. et GREV. Rhizoma repens elongatum ad basin foliorum multis radicibus instructum. Folia longe petiolata, lamina quadrifoliata, foliolis obovato-cuneatis, integerrimis, glabriusculis vel sparse pilosis. Sporocarpia numerosa (usque ad 25) supra basin petioli seriatim disposita, subglobosa angulis carentia, carpodiis brevibus, vix longioribus quam diametri sporocarpiorum.

Tabula nostra LXXX. Fig. 1—5.

Marsilia polycarpa Hooker et Greville, *Icones Filicum* vol. II. t. 160; Brackenridge in *Exploring expedition of C. Wilkes.* vol. XVI. *Cryptog.* p. 341; *A. Braun, Monatsber. d.*

Berlin. Akad. d. Wissensch. 1863. p. 417 et 1870. p. 722 et 1872. p. 668; Griseb. Catal. Plant. Cubens. p. 271; Fée, Histoire des Fougères des Antilles p. 166 in supplem. Filic. Cubens.; Fournier. Cryptog. du Mexique p. 143.

Marsilia Brasiliensis Mart. Icones Crypt. Brasil. select. p. 122. t. 73. fig. 2; Fée, Cryptogames vasculaires du Brésil. p. 235.

Marsilia quadrifolia Kunze in Linnaea IX. 110.

Marsilia picta Fée, Catal. d. Fougères du Mexique Mémoire IX. 47; Fournier. Cryptog. du Mexique p. 143.

RHIZOMA horizontale repens flexuosum radicibus permultis fasciculatim provenientius praesertim ad foliorum insertiones praeditum, undique rufo-villosum, mox denudatum. FOLIA ascendunt 5—25 cm. longa, erecta, locis aënois natantia, locis exsiccatis minora paullulum deflexa, quadrifoliolata, alternantia, solitaria, plus minus remota; gemmae undique in axillis foliorum. PETIOLUS filiformis in latere exteriori rotundatus, in interiori leviter canaliculatus, hinc inde pilis linearibus et paucis cellulis formati instructus, denique glaberrima; nervi flabellatim dispositi haud raro anastomosantes marginem versus liberi excurrentes. CARPOPIA $\frac{1}{2}$ —1 mm. longa, pilosa, postea denudata deorsum deflexa. SPOROCARPIA numerosa, 5—25 supra basin petioli, 10—20 mm. a rhizomate remota seriatim disposita, ovato-globosa, edentata, statu juvenili pilis erectis subulatis e 4—6 cellulis formati flavidis oblecta mox denudata, 2.5 ad 3 mm. longa, pilis remotis superficie nigrescente leviter punctata; nervi sporocarpiorum 5 raro 6, medio fructu anastomosantes atque versus suturam ventralem sporocarpium 5—6 radios liberos emittentes. SORI in quovis sporocarpio 6, rarissime 8 pinnatim dispositi, ex sporocarpium statu humido annulo gelatinoso erumpentes et 12—14 macrosporas in singulo soro 0,74 mm. longas, 0,55 mm. latis, albas verrucosas includentes; microsporas macrosporis intermixtae numerosae minutae.

Habitat in prov. Pará prope urbem Pará: Spruce n. 42. 417. anno 1849 m. Jul. et Aug. fruct. lecta; in prov. Bahia prope urbem Bahia: Blanchet n. 2409; in lacubus exsiccatis ad Joozeiro: Martius, anno 1819 m. Aprilis fruct. lect. — Invenitur praeterea in insulis Antillanis, Mexico, Guiana gallica et anglica et in insulis Societatis.

Obs. Formae variae *Marsiliae polycarpae* in Brasilia inveniuntur; aliae folia minora, brevipetiolata, utrinque stomatibus oblecta et in foliis striis interstitialibus inter nervos praedita habent, aliae folia longe stipitata, foliolis 35—40 mm. longis, striis interstitialibus carentibus et stomatibus non nisi in superficie obvisis. Hae formae certe locis aqua repletis evadunt. Exstat autem forma permagna sterilis a cl. Spruce m. Jul. 1851 (n. 1412) ad ripam australem fluminis Amazonum ad ostium fluminis Solimões collecta, a beato A. BRAUN ad interim *Marsilia stratiotes* nomi-

nata, quae foliola certe natantia habet, sed utrinque stomatibus praedita, ut jam idem cl. A. BRAUN in *Marsilia hirsuta* commemoravit (Monatsber. Berl. Akad. 1872. p. 649). Verisimiliter planta Spruceana hujus loci, sed ob defectum sporocarpiorum non certissime definiri potest. Vidi praeterea plantas duas steriles, quae habitu et multis ex aliis causis ad nostram speciem pertinent; una a beato MARTIO in prov. Bahiensis in lacubus ad Malhada (anno 1818) lecta est, altera a beato BURCHELL sine loco speciali (Burchell Catal. Geogr. Brasil. trop. n. 9488).

2. *MARSILIA DEFLEXA* A. BRAUN. Rhizoma repens elongatum. Folia longe petiolata, lamina quadrifoliolata, foliolis ovato-cuneatis integerrimis glabriusculis. Sporocarpia pauca 2—3 supra basin petioli, oblonga, pentagona, carpodiis deflexis brevibus.

Tabula nostra LXXX. Fig. 6—8.

Marsilia deflexa A. Braun in Monatsber. d. Berl. Akad. 1863. p. 421 et 1870. p. 672. 703, 724, fig. 7.

Marsilia striata Mett. Ann. scienc. naturell. sér. V. vol. III. p. 310.

RHIZOMA horizontale repens flexuosum, radicibus paucis crassis elongatis praeditum, undique pilis albescentibus pluricellularibus oblectum, mox denudatum. FOLIA ascendunt 10—20 cm. longa, erecta, natantia, quadrifoliolata, alterna, remota; gemmae in axillis foliorum haud raro adsunt. PETIOLUS filiformis, glaber, statu exsiccato haud raro flexilis. FOLIOLA 10—20 mm. longa, 10—15 mm. lata margine antico rotundato, integerrima, laete viridia, glaberrima; nervi flabellati in maculas angustas elongatas anastomosantes, ultimi arcu intramarginali conjuncti. CARPOPIA 2—5 mm. longa, sparse pilosa, mox glabriuscula manifeste deflexa. 2 mm. supra basin petioli inserta et 2 mm. inter se distantia. SPOROCARPIA bina, rarissime tria oblonga, obtusa, 4—5 mm. longa, 2 mm. lata, pentagona pilis 6—7-cellularibus oblecta, mox denudata, statu exsiccato nervorum decursu plicata; nervi sporocarpiorum 9—10, macularum series duas efformantes radiosque abbreviatis indivisos raro furcatis versus suturam ventralem sporocarpium emittentes; maculae superiores breviores, inferiores elongatae atque soros gerentes. SORI plerumque in quovis sporocarpium 7, rarissime 8; sori singuli viginti macrosporas et numerosas microsporas includentes.

Habitat in prov. Piahy, m. Jul. 1839 fruct.: Gardner n. 2760. — Invenitur etiam in republica Novo-Granatensi.

Obs. Folia in nervorum anastomosibus striis interstitialibus manifestis praedita; stomata in pagina superiori foliorum creberrima, in inferiori frustra quaesivi. Exstat nulla alia species generis *Marsiliae*, quae sporocarpia gerit simulatque foliis natantibus striis interstitialibus gaudet.

TABULAE EXPLICATAE.

Tab. LXXX. Fig. 1—5. *Marsilia polycarpa*, p. 650.

Fig. 1. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 2. Foliolum adhaerens, striis interstitialibus. — Fig. 3. Sporocarpium adhaerens. — Fig. 4. Nervatura sporocarpium. — Fig. 5. Nervatura sporocarpium et sporangia.

Tab. LXXX. Fig. 6—8. *Marsilia deflexa*, p. 652.

Fig. 6. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 7. Sporocarpium adhaerens. — Fig. 8. Nervatura sporocarpium.

Tabulam delineavit KUHNIO duce cl. A. SCHULZE, Berolinensis.

SALVINIACEAE.

SALVINIACEAE Bartl. *Ord. nat.* 15; *Endl. Gen.* p. 67; *Martius, Icon. Plant. Crypt. Brasil.* 123.

Herbae natantes; CAULIS ex internodiis compluribus formatus in *Salvinia* foliis radiciformibus, in *Azolla* radicibus genuinis instructus; FOLIA opposita s. alterna, simplicia, integerrima. SORI (conceptacula s. sporocarpia Auctt.) in eadem stirpe dimorphi, foliorum basi inserti, solitarii s. distichi s. glomerati, alii ex uno s. paucis macrosporangiis, alii e permultis microsporangiis formati: macrosporangia unam tantum macrosporam, microsporangia numerosas microsporas includunt.

GENERUM CLAVIS.

- Macrosporangia in soro complura I. SALVINIA.
Macrosporangia in soro solitaria II. AZOLLA.

I. SALVINIA MICHELI.

SALVINIA *Micheli, Nov. Gen.* 107. tab. 58; *Duvernoy, de Salvinia natante* p. 6 sqq.; *Bischoff, zur Naturgeschichte der Salvinia, Nov. Act. Nat. Cur. vol. XIV. pars I.* 47. tab. IV—VI; *Corda, Monographia Rhizospermarum et Hepaticorum* p. 9. tab. 2; *Bischoff, Kryptogamische Gewächse* p. 68. tab. IX; *Martius, Icon. Plant. Cryptogam. Brasil.* p. 128; *Griffith, On Azolla and Salvinia, Caleutta Journ. of natur. history* 1844. p. 2. tab. XVIII—XX; *Eisengrein, Pflanzenordnung der Gynatopteriden* p. 346; *Mettenius, de Salvinia* p. 5; *idem, Beiträge zur Kenntniss der Rhizocarpeen* p. 6. tab. I; *Hofmeister, Beiträge zur Kenntniss der Gefässkryptogamen II.* p. 665. tab. XIII; *Pringsheim, Jahrb. f. wissensch. Botanik III.* 485. tab. XXIV. XXV; *Juranyi, Entwicklung der Sporangien und Sporen von Salvinia natans, Berlin* 1873. cum tabulis II.

CAULIS libere nataus, fasciculo vasorum centrali e cellulis spiralibus formato percursus, axem primarium simplicem e numerosis internodiis compositum, puncto

vegetationis continuo se evolvente gaudentem et e gemmis adventitiis in basi folii aquatici radiciformis ramos emittentem effingit. FOLIA in caule ejusque ramis verticillos trimeros formantia; bina sunt folia aërea pagina inferiore in aquae superficie natantia, tertium in organum multipartitum radiciforme fasciculatum in aquam dependens transformatum. SORI dimorphi submersi in axillis folii aquatici aut distichi aut glomerati, globosi, indusio glabro v. hirsuto e membrana exteriori et interiori formato circumvelati, nonnulli tantum macrosporangia, alii microsporangia includentes; unde macrosporangiorum et microsporangiorum sori distinguendi sunt. In basi uniuscujusque sori petiolulus, cui sorus insidet, processum efformat „columella“ s. „receptaculum“ nominatum, in quo sporangia pedicellata originem ducunt. SPORANGIORUM pedicelli simplices s. ramosi, plerumque e cellulis 3—5 formati, apice in

sporangia, quorum membrana ex uno cellularum strato formata est, abeunt. Macrosporangia magnitudine decies et magis microsporangia superantia solitariam sporam, microsporangia numerosas sporas includunt.

CONSPECTUS SPECIERUM.

- A. Folia cucullata in pagina superiore glaberrima
1. S. SPRUCEI nov. spec.
- B. Folia plana supra papillis obtecta.
a. Folia ovata v. cordata, obtusa v. orbicularia, apice paullulum retusa, supra papillis setigeris distantibus vestita 2. S. AURICULATA Aubl.
b. Folia elongato-oblonga supra papillis densissimis elongatis omnem paginam superiorem obtegentibus praedita
3. S. OBLONGIFOLIA Mart.

1. SALVINIA SPRUCEI KUHN n. sp. Folia cucullata, semicircularia, in pagina superiori glaberrima, nervis parallelis proëminentibus strigosa, inferiori pilis paucis obsita.

Tabula nostra LXXXI. Fig. 11—13.

Salvinia auriculata var. *Sprucei* Baker Msc. in herb. Kew.

HERBAE natantes 2—3 cm. longae, 1—2 cm. latae, plerumque in numerosos greges (ut reliquae species generis) consociatae. CAULIS filiformis, teres vix 0,5 mm. diametro, undique pilis cylindricis paucicellularibus obtectus. FOLIA radiceformia submersa tri—quinquepartita pilis 3 ad 8-cellularibus instructa; folia aërea natantia, breviter petiolata, petiolo 0,5—1 mm. longo, undique piloso imposita, utrinque obscure viridia, 6 ad 7 mm. longa, 8—10 mm. lata, cucullata, fere semicircularia, marginibus anterioribus rotundatis, posterioribus petiolum versus abscisso-cuneatis, integerrima, non in aquae superficie explanata, sed media laminae parte saccato-sinuata imbuta, supra glaberrima, nervis parallelis proëminentibus strigosa, infra pilis paucis minutis praedita; lamina nervo medio dimidiata, nervi secundarii utrinque 14—16 anastomoses paucas (4—5) obliquas juxta nervum primarium atque in media parte iterum 3—4 anastomoses elongato-oblongas efformantes marginem versus liberi desinentes. SORI (conceptacula) microsporangiorum pauci, globosi, vix 1 mm. diametro lati, glabri; microsporangia glabra, globosa, 0,16—0,22 mm. diametro. Macrosporangia adhuc latent.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad oram meridionalem fluminis Amazonum ad ostium fluminis Solimões: R. Spruce n. 1636.

Obs. *Salvinia cucullata* Roxb. ex India orientali foliorum forma et nervorum decursa proxima, sed defectu pilorum minutissimum in laminae superficie nervisque proëminentibus satis diversa.

2. SALVINIA AURICULATA AUBL. Folia longius breviusve petiolata, suborbicularia, ovata s. cordata, apice paullulum retusa, integra s. subbiloba, supra papillis apice pilis 3-coronatis, regulariter seriatis, distantibus obsita; sori distichi subsessiles s. pedicellati.

Tabula nostra LXXXI. Fig. 9—10.

Salvinia auriculata Aublet, *Hist. Guyan.* II. 969. tab. 367; Willd. *Spec. Plant.* V. 537; Poiret, *Encycl. Suppl.* V. 29; Spreng. *Syst. Veget.* IV. 9; Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris* VI. 177; Miquel, *Observ. Plant. Surinam.* p. 10; Fournier, *Cryptogam. du Mexique* 143; Griseb. *Symbol. Flor. Argent.* 340.

Salvinia rotundifolia Willd. *Spec. Plant.* V. 537; Poiret, *Encycl. Suppl.* V. 29; Schlecht. in *Linnaea* V. 624; Raddi,

Plant. Brasil. Nov. Gen. 1. tab. 1. fig. 5; Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris* VI. 177; Brackenr. in Wilkes' *U. S. Explor. Exped.* XVI. 341; Fée, *Cryptogam. vascul. du Brésil* I. 235.

Salvinia hispida Kunth in Humb. et Bonpl. *Nov. Gen.* I. 44; Kunth, *Synops. Plant.* I. 101; Poiret, *Encycl. Suppl.* V. 29; Spreng. *Syst. Veg.* IV. 10; Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris* VI. 177; Kunze in *Flora* 1837. I. 333 et in *Linnaea* IX. 110; Griseb. *Catal. Plant. Cubens.* 271; Fée, *Histoire d. Fougér. d. Antilles* 136 et *Cryptog. vascul. Brésil* 234.

Salvinia natans Kunth, *Synops.* I. 101; Fée, *Hist. Foug. Antill.* 136.

Salvinia biloba Raddi, *Plant. Brasil. Nov. Gen.* 1. t. I. f. 4; Brackenr. in Wilkes' *U. S. Explor. Exped.* XVI. 341.

Marsilia natans Vellozo, *Flor. Flumin.* XI. tab. 111; Ladisl. Netto in *Archivos do Museu nacional do Rio de Janeiro* V. 460.

Salvinia affinis Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris* VI. 177.

Salvinia Ojersiana Klotzsch Msc. in herbar. quibusd.

Salvinia Radula Baker Msc. in herb. Kew.

HERBAE natantes ad 3—14 cm. longae. CAULIS crassus fasciculo vasorum centrali percursus undique pilosus, mox denudatus. FOLIA 5 ad 15 mm. distantia; radiceformia petiolata, petiolo ad 5 mm. longo instructa, multipartita ad 15 cm. longa, undique pilis cylindricis 5—7 cellularibus obtecta; aërea utrinque laete viridia 7—25 mm. longa, 5 ad 15 mm. lata, subsessilia v. petiolo 8—10 mm. longo praedita, suborbicularia, ovata s. cordata, basi semper manifeste cordata, apice paullulum retusa s. raro subbiloba, integra, parenchymate e cellulis hexagonis formato supra papillis inter se distantibus, seriatis dispositis, elongatis medio parenchymate inter nervos subrectis ad 0,85 mm. longis, in apice pilis 3 v. 4 ad 22 mm. longis e cellulis 3 s. 5 cylindricis compositis coronatis, mox denudata, infra primo pilis paucicellularibus obtecta postea subglabra; nervi immersi utrinque juxta nervum primarium anastomoses 7—8 regulares quadratas s. rectangulares efformantes marginem versus liberi desinentes. SORI (conceptacula) statu exsiccato flavi, globosi, apiculati, pilis 3—5 cellularibus hinc inde praediti postea glabri, distichi, subsessiles s. inferiores longius petiolati velut corymbosi, illi ad 25 macrosporangia, alii numerosissima microsporangia includentes. MACROSPORANGIA petiolata, petiolo e 2—3 seriebus cellularum formato insidentia, globosa 0,37—0,41 mm. diametro, flava, unam macrosporam includentia; microsporangia ad 0,22 mm. diametro pedicello ex una serie cellularum formato insidentia, numerosas microsporas ovaes continentia.

Habitat in prov. do Alto Amazonas in lacu Acunani: Martius; in prov. Paraënsi prope urbem Parã: Friedr. Wilh. Sieber, R. Spruce n. 418; prope Obidos ejusdem prov.: R. Spruce n. 508, 595; in prov. Pernambuco: Gardner n. 1217; in prov. Sergipe in paludibus prope S. Christovão: Luschath; in prov. Bahiensi in fluvio Itahypê et in Almadensi lacu et in lacubus prope Malhada: Martius; in prov. Rio de Janeiro prope urbem Rio de Janeiro: Commerson, Gaudichaud n. 62, Aug. St-Hilaire, Riedel, Glaziou n. 2443, 5633, 6406, 9069, Mosén n. 2738; in prov. S. Paulo in flumine Itajaki: Fritz Müller; in Brasilia sine loci designatione: Sello. — Invenitur praeterea in Antillis, America centrali, Guiana et in republica Argentina.

Obs. Exemplaria valde variant magnitudine foliorum et longitudine papillarum; conceptacula macrosporangiorum paullo minora atque densius pilosa quam illa microsporangiorum.

3. SALVINIA OBLONGIFOLIA MART. Folia petiolata, elongato-oblonga, obtusa, apice leviter biloba, basi subcordata, supra papillis minutis conicis regulariter seriatis densissime obtecta, infra sparse pilosa, petiolis alatis, ala infra in nervo primario adnata; sori (conceptacula) in ramo proprio folii radiceformis dense coacervati.

Tabula nostra LXXXI. Fig. 1—8.

Salvinia oblongifolia Martius, *Icon. Select. Plant. Crypt.* 128. tab. 75. fig. 1—17, tab. 76. fig. 18—24; Moore, *Index Filic. p. CXXIX*; Fée, *Cryptog. vascul. du Brésil.* 235.

Salvinia biloba Pohl *Msc. in herb. Vindob.*

HERBAE libere natantes ad 21 cm. longae et 15 cm. latae. CAULIS teres crassus, statu exsiccato 4 mm. diametro latus, albido-virescens, undique pilis flavidis v. ferrugineis obtectus, fasciculo vasorum centrali percursus. FOLIA 10—15 mm. distantia, radiciformia 3—4 cm. longa, compacta, petiolo crasso piloso ad 10 mm. longo praedita, ramosa, ramos 1—2 emittentia apice in fasciculum multipartitum fibrillosum undique pilosum exeuntia; aërea opposita, petiolata, elongato-oblonga, obtusa, apice leviter biloba, basi subcordata, 3—4 cm. longa, 1—1,5 cm. lata, supra laete, infra obscure viridia, in pagina superiore papillis conicis compactis ad 0,15 mm. longis apice pilis 2 v. 3 minutis ejusdem ac papillae longitudinis coronatis, densissimis, regulariter seriatis obtecta, in latere inferiore pilis articulatis dense villosula. PETIOLI foliorum aëreorum 5—10 mm. longi, alati, ala 20—30 mm. longa et 10—15 mm. lata, apicem laminae versus angustata, infra juxta nervum primum adnata, in basi fasciculo vasorum ramos numerosos 17—25 nervum primum versus emittente praedita atque pilis ferrugineis articulatis dense adpersa. NERVI foliorum superne immersi, inferne prominuli, juxta nervum primum anastomoses 9—10 subquadratas efformantes, marginem versus liberi desinentes. SORI (conceptacula) globosi s. late ovales, subapiculati, cc. 3 ad 4 mm. diametro in ramo proprio folii radiciformis 15—20 concervati, sessiles, pilis cylindricis ad 0,3 mm. longis tri-vel quadricellularibus adpersi, illi in columella ramosa macrosporangia 15—20, alii numerosissima microsporangia includentes. MACROSPORANGIA 0,41—0,45 mm. diametro tetraédrico-globosa unam macrosporam includunt; MICROSPORANGIA 0,18—0,21 mm. diametro microsporis compluribus instructa.

Habitat in prov. Paraënsi, in aquis stagnantibus limpidis prope capitalem et ad Tocantins fluvium passim: Martius; in prov. Goyaz: Pohl n. 3232; in prov. Minas Geraes: Augustin de St-Hilaire Cat. B. n. 1549.

Obs. Species maxima et pulcherrima totius generis, petioli forma et magnitudine foliorum, papillis densissimis minutis, columella ramosa facile recognoscenda.

II. AZOLLA LAM.

Azolla Lam. *Encycl. I. 343*; Willd. *Spec. Plant. V. 541*; Poir. *Encycl. Suppl. V. 567*; R. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 166*; Flinders, *Voyage to Terra australis II. 611. tab. 10*; Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris. VI. 177*; Martius, *Icon. Sel. Plant. Cryptog. 123*; Meyen, *Nov. Act. Nat. Cur. XVIII. pars I. 505*; Link, *Spec. Fil. 8*; Endl. *Gen. Plant. 67*; Griffith, *Calcutta Journ. V. 227* et *Posthum. papers crypt. plant. 553*; Brackenridge in Wilkes' *Un. St. Explor. Exped. XVI. 342*; Eisengrein, *Pflanzenordn. Gonatopterid. 414*; Mettenius, *Beiträge zur Kenntn. d. Rhizocarp. 55*, *Linnaea XX. 259*, *Filic. Hort. Lips. 126* et in *Plant. Tinnean. 51*; Moore, *Ind. Filic. CXXIX*; Strasburger, *über Azolla (Jena 1873) 76*; Berggren in Lund's *Univ. Arsskrift XVI, in Botaniska Notiser 1876. p. 177* et in *Verhandl. Bot. Ver. Brandenb. XXIV. 97. tab. I. II.* — SALVINIA Juss. *Gen. Plant. 16* ex parte. — RHIZOSPERMA Meyen l. c.

HERBAE minutae libere natantes, CAULIBUS valde racemosis, RADICIBUS in inferiore caulis parte juxta ramos singulis v. fasciculatim consociatis, caule fasciculorum vasorum centram continentem. FOLIA distiche in

Salviniac.

caulis dorso inserta, profunde biloba: lobi inaequaliter evoluti, superiore dorsum caulis tegente atque in latere interiore cavernam filis moniliformibus *Nostochinearum* repletam exhibente, inferiore submerso et lateri caulis opposito adpresso. SORI gemini v. quaterni ad infimum folium ramorum, indusio completo obtecti atque lobo inferiore folii occulti, alii in receptaculo columellaeformi macrosporangium solitarium terminale, alii microsporangia numerosa gerentes. MACROSPORANGIA unam solitariam macrosporam parte inferiore cuticula (episporio) verrucosa s. tuberculata s. irregulariter areolata s. appendicibus filiformibus minutis instructam, parte superiore corpusculis tribus vel novem pyriformibus postea aëre repletis atque inter se et cum macrospora arcte connatis includentia; MICROSPORANGIA in soro numerosa, pedicellata, massulas 2—8 glochidibus (i. e. pilis v. appendicibus hamatis) unicellularibus s. pauciseptatis praeditis gerentia; microspora in massulas conglobatae.

CONSPECTUS SPECIERUM.

- A. Glochides massularum unicellulares; episporium macrosporae tuberculis annularibus obsitum. 1. A. FILICULOIDES Lam.
B. Glochides massularum septatae; episporium macrosporae subaequaliter granulatum 2. A. CAROLINIANA Willd.

1. AZOLLA FILICULOIDES LAM. Ramificatio plerumque racemosa; folia lobis superioribus ovalibus, pilis unicellularibus basi latissima adnatis instructa; glochides massularum unicellulares; episporium parte inferiore macrosporae tuberculis annularibus obsitum.

Tabula nostra LXXXII. Fig. 7—11.

Azolla filiculoides Lam. *Encycl. I. 343. tab. 863*; Moore, *Index Filicum 189* et *Synops. CXXIX*; Metten. in *Kotschy, Plantae Tinnean. 53*; idem in *Novara-Exped. I. 228*; Strasburger, *über Azolla 78*.

Azolla Magellanica Willd. *Spec. Plant. V. 541*; Kunth in *Humb. et Bonpl. Nov. Gen. I. 43*; Kunth, *Synops. Plant. I. 100*; Dumont d'Urville, *Ann. Soc. Linn. Paris V. 597*; Spreng. *Syst. Veget. IV. 9*; Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris VI. 178*; Presl, *Reliq. Haenk. I. 84*; Metten. *Linnaea XX. 275. tab. 3. fig. 16*; Brackenr. in *Wilkes' Un. St. Explor. Exped. XVI. 342*; Gay, *Flor. Chilen. VI. 549*; Sturm, *Enum. Plant. vasc. Crypt. Chilens. 52*; Bertoloni, *Miscell. XXI. tab. V. fig. 1a*, ex *Botan. Zeitung, 1861. p. 343*; Fée, *Cryptog. vascul. Brésil I. 234*; Griseb. *Plant. Lorentzian. 225*; idem, *Symbol. Flor. Argent. 340*.

Azolla arbuscula Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris VI. 178*; Kunze, *Linnaea IX. 110*.

HERBAE minutae, natantes, laete virides ad 30—50 mm. longae atque latae in numerosos greges consociatae. CAULIS uno fasciculo vasorum percursus, racemosus, ramis alternis, radicibus singulis s. compluribus in caulis parte, qua rami abeunt, instructus. FOLIA distiche inserta, alternantia in lobos binos partita, nempe superiores imbricati inter se caulem-

que tegentes et inferiores submersi; lobi superiores ovals 0,90—1,30 mm. longi, 0,80—0,90 mm. lati utrinque stomatibus et in latere exteriori pilis unicellularibus basi latissima adnatis, medio parenchymate caverna 0,41 ad 0,49 mm. diametiente ad ostium constricto instructi; lobi inferiores ovals, majores 1,25—1,50 mm. longi, 0,87—1,2 mm. lati, pilis unicellularibus in exteriori latere praediti. Sori geminati in axilla ramuli inferioris abbreviati plerumque lobo inferiore occulti, ambo aut macro- aut microsporangia gerentes v. unus micro- et alter macrosporangio instructi. MACROSPORANGIA 0,5—0,6 mm. longa, indusio glabro obtecta, ovata, apiculata, solitariam macrosporam includentia; macrospora in dimidio inferiore utricula (episporio) tuberculis annularibus s. crateriformibus appendicibusque minutissimis filiformibus gaudente, in dimidio superiore tribus corpusculis pyriformibus apice filis minutissimis coronatis instructa; medio inter corpuscula et episporium annulo e tribus partibus formato circumcincta. MICROSPORANGIORUM sori brevipedicellati, ad 1,5 mm. diam., indusio globoso, apiculato, glabro, flavo, e duplici cellularum strato composito obtecti; microsporangia in soro numerosa, 40—60. pedicello e duobus cellularum stratis conflato imposita, massulas 5—8 globosas, 0,106 ad 0,152 mm. diam. includentia; massulae glabrae in tota superficie glochidibus unicellularibus 0,060—0,075 mm. longis praeditae, microsporas globosas 0,080—0,040 mm. diam. in massa gelatinosa involutas includentes.

Habitat in prov. do Alto Amazonas: R. Spruce n. 817; in prov. Rio de Janeiro prope capitalem: Glaziou n. 14416; in stagnis prope Capocabona: Luschmuth, Guillemín n. 768; in prov. S. Paulo: Aug. St-Hilaire Cat. C. n. 1536. — Invenitur praeterea in Nova Granata, Ecuador, Peruvia, Bolivia, Chile et republica Argentina.

2. AZOLLA CAROLINIANA Willd. Ramificatio pseudo-dichotoma; pili foliorum bicellulares, cellula terminali clavata, inferiore oblonga minuta; glochides tri- v. quadri-septatae; episporium macrospora subaequaliter granulatum.

Tabula nostra LXXXII. Fig. 1—6.

Azolla Caroliniana Willd. *Spec. Plant.* V. 541; Spreng. *Syst. Veg.* IV. 9; Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris* VI. 178; Andersson, Fregatt. *Eugen. Resa* 42; Metten. *Linnaea* XX. 278. tab. 3. fig. 9; Eaton in *Emory Mexic. Bound. Surv.* II. 236; A. Gray, *Manual* 606. tab. 14; Moore. *Ind. Fil.* 189; Chopm. *Flor. S. Unit. Stat.* 602; Metten. in Kotschy, *Plant. Tinnean.* 53; Lawson in *Canad. Natur.* I. 864; Fournier, *Cryptog. du Mexique* 143; Strasburger, über *Azolla* 78; Arcangelí, *Sull' Azolla caroliniana*, Pisa 1882.

Azolla microphylla Kaulf. *Enum.* 273; Mart. *Icones Crypt. Brasil. select.* 123. tab. 74. 75. fig. 1; Hook. et Arnott, *Beech. Voy.* 162; Kunze in *Sillim. Journ.* 2. ser. VI. 89; Metten. in *Linnaea* XX. 276. tab. 3. fig. 1—8; idem, *Fil.*

Hort. Lips. 126; Brackem. in *Wilkes' Explor. Exped.* XVI. 342; Moore, *Ind. Fil.* 189; Fée, *Histoire d. Fougér. d. Antilles* 166; Griseb. *Catal. Plant. Cubens.* 271; Fée, *Cryptog. vascul. du Brésil* 234.

Azolla cristata Kaulf. *Enum.* 274; Metten. in *Linnaea* XX. 278. tab. 2. fig. 1—21; Kunze in *Linnaea* XXI. 241; Moore, *Ind. Filic.* 189.

Salvinia Azolla Raddi, *Plant. Brasil. Nov. Gen.* I. 2. tab. I. fig. 3.

Azolla Portoricensis Spreng. *Syst. Veg.* IV. 9; Fée, *Histoire d. Foug. d. Antill.* 136.

Azolla densa Desv. *Ann. Soc. Linn. Paris* VI. 178.

Azolla Mexicana Schlechtend. in *Linnaea* V. 625; Presl, *Botan. Bemerk.* 150; Kunze in *Linnaea* XVIII. 352; Moore, *Ind. Filic.* 189; Fée, *Mémoire* IX. 47; Fournier, *Cryptog. du Mexique* 143.

Azolla Magellanica Kunze in *Linnaea* IX. 110; Miquel in *Linnaea* XVIII. 380.

Azolla Bonariensis Bertol. *Misc.* XXI. tab. 5. fig. 2. a. b, ex *Bot. Zeitung* 1861. p. 343.

HERBAE libere natantes 10—30 mm. longae aeque ac latae. CAULIS teres radicibus ad 50 mm. longis, ramulis alternis pseudo-dichotomis instructus. FOLIA laete viridia marginibus roseis; lobi superiores ovals acuminati latere exteriori pilis bicellularibus obtecti 0,75—0,87 mm. longi et 0,51—0,63 mm. lati, medio parenchymate caverna 0,37—0,44 mm. diametiente praediti, inferiores majores pilis destituti 0,90—1,24 mm. longi et 0,76—0,95 mm. lati. Sori geminati in axilla ramuli inferioris. MACROSPORANGIA 0,42—0,56 mm. longa, indusio glabro obtecta, ovata, apiculata solitariam macrosporam includentia; macrospora in dimidio inferiore ex episporio subaequaliter granulato s. irregulariter minutissime gibboso et marginibus superioribus appendicibus filiformibus instructo, medio angulo tripartito apicem versus magis elato. in dimidio superiore corpusculis tribus, ut in *Azolla filiculoide* coronatis composita. MICROSPORANGIORUM sori brevipedicellati, globosi, ad 1,25 mm. diam. indusio glabro velati, numerosa microsporangia includentes; microsporangia pedicellata e massulis 3—6 formata; massulae ad 0,196 mm. diam., glochidibus tri- v. quadri-septatis ad 0,046 mm. longis obtectae complures microsporas in massa gelatinosa involutas includentes.

Habitat in prov. Paraénsi in stagnis prope urbem Para: Martius, et prope oppidum Santarem: R. Spruce n. 596; in prov. Bahiensi in stagnis prope Joazeiro: Martius, et ad flumen Ilheos: Princ. de Neuwied; in prov. Minas Gerais prope Caldas: G. A. Lindberg, Regnell III, n. 1507; in prov. Rio de Janeiro: Aug. St-Hilaire Cat. A. n. 698; ad Santa Gallo: Th. Peckolt; prope urbem Rio de Janeiro: Raddi, Riedel, Rudol., Schottmüller n. 30, Glaziou n. 2442 — Invenitur praeterea in Guiana, America centrali et boreali.

TABULAE EXPLICATAE.

Tab. LXXXI. Fig. 1—8. *Salvinia oblongifolia*, p. 656.

Fig. 1. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 2. Folium radiciforme et folia 2 aërea petiolo alato. — Fig. 3. Superficies folii aërei. — Fig. 4. Nervatura folii aërei et petioli. — Fig. 5. Verticillus e foliis 2 aëreis et folio radiciformi tripartito formatus. — Fig. 6. Sorus microsporangiorum partim indusio velatus, adauctus. — Fig. 7. Macrosporangium adauctum. — Fig. 8. Microsporangium adauctum.

Fig. 9—10. *Salvinia auriculata*, p. 655.

Fig. 9. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 10. Nervatura folii aërei adaucta.

Fig. 11—13. *Salvinia Sprucei*, p. 655.

Fig. 11. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 12. Nervatura folii aërei et folium radiciforme quinquepartitum soris onustum, adauctum. — Fig. 13. Folium aëreum a latere visum.

Tab. LXXXII. Fig. 1—6. *Azolla Caroliniana*, p. 659.

Fig. 1. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 2. Ramulus cum foliis bilobis, adauctus. — Fig. 3. Microsporangiorum et macrosporangiorum sorus. — Fig. 4. Microsporangium. — Fig. 5. Massula glochidibus onusta. — Fig. 6. Macrosporangium (secus icon. Strasburger).

Fig. 7—11. *Azolla filiculoides*, p. 658.

Fig. 7. Habitus plantae (m. n.). — Fig. 8. Ramulus e latere superiore. — Fig. 9. Ramulus e latere inferiore, microsporangiorum soris onustus. — Fig. 10. Macrosporangium (secus icon. Strasburger). — Fig. 11. Massula glochidibus onusta.

INDEX VOLUMINIS I. PARTIS II.

QUA CONTINENTUR

MUSCI, LYCOPODIACEAE, OPHIOGLOSSAEAE, MARATTIACEAE, OSMUNDACEAE, SCHIZAEACEAE,
GLEICHENIACEAE HYMENOPHYLLACEAE, CYATHEACEAE, POLYPODIACEAE, EQUISETACEAE,
ISOËTACEAE, MARSILIACEAE, SALVINIACEAE.

- | | | |
|--|--|---|
| <p><i>ABACOPTERIS</i> Fée 467.
 <i>ABRODICTYUM</i> Presl 241.
 <i>ACHOMANES</i> Neck. 241. 251.
 <i>ACIDODONTIUM</i> Schwaegr. 38.
 " <i>Kunthii</i> Schwaegr. 38.
 <i>ACONIOPTERIS</i> Presl 565.
 <i>ACROPHORUS</i> Presl 343.
 " <i>bifidus</i> Moore 346.
 " <i>fallax</i> Regel 485.
 " <i>Parkeri</i> Moore 344.
 <i>ACROPTERIS</i> Link 427.
 <i>ACROSTICHEAE</i> 337. 563.
 <i>ACROSTICHUM</i> Linn. 565.
 " <i>acidophyllum</i> Kunze 581.
 " <i>acrocarpum</i> Mart. 577.
 " <i>actinotrichum</i> Mart. 581.
 " <i>acuminatum</i> Hook. 585.
 " <i>acuminatum</i> Willd. 590.
 " <i>affine</i> Mart. et Gal. 570.
 " <i>alatum</i> Fée 567.
 " <i>alienum</i> Swartz 589.
 " <i>alismaefolium</i> Fée 571.
 " <i>alpestre</i> Gardn. 579.
 " <i>andicola</i> Fée 571.
 " <i>angustatum</i> Schrad. 567.
 " <i>aphlebium</i> Kunze 567.
 " <i>apodum</i> Kaulf. 577.
 " <i>Aubertii</i> Desv. 579. 600.
 " <i>aureum</i> Linn. 592.</p> | <p><i>ACROSTICHUM</i> <i>auricomum</i> Kunze 582.
 " <i>Blanchetii</i> Mett 572.
 " <i>Blumeanum</i> Fée 576.
 " <i>brachyneuron</i> Fée 580.
 " <i>Brasiliense</i> Spreng. 570.
 " <i>brunneum</i> Willd. 589.
 " <i>Burchellii</i> Baker 577.
 " <i>Caenopteris</i> Kunze 588.
 " <i>callaefolium</i> Blume 571.
 " <i>calomelanos</i> Linn. 556.
 " <i>calophyllum</i> Kunze 569.
 " <i>cartilagineum</i> Mett. 569.
 " <i>caudatum</i> Cav. 589.
 " <i>caudatum</i> Hook. 585.
 " <i>cervinum</i> Swartz 587.
 " <i>ciliare</i> Thouars 572. 575.
 " <i>ciliatum</i> Desv. 572.
 " <i>circumscriptum</i> Bory 582.
 " <i>citriifolium</i> Linn. 560.
 " <i>clodorhizans</i> Spreng. 589.
 " <i>confluens</i> Pohl 416.
 " <i>conforme</i> Swartz 567.
 " <i>consobrinum</i> Kunze 571.
 " <i>crassinerve</i> Kunze 571.
 " <i>crispatum</i> Fée 574.
 " <i>cylindricum</i> Hook. 586.
 " <i>danaeaeifolium</i> L. et F. 592.
 " <i>decoratum</i> Kunze 573.
 " <i>discolor</i> Kuhn 568.</p> | <p><i>ACROSTICHUM</i> <i>dissimile</i> Kunze 576.
 " <i>durum</i> Kunze 571.
 " <i>elegans</i> Vahl 183.
 " <i>elongatum</i> Kunze 580.
 " <i>erinaceum</i> Fée 573.
 " <i>erythrodes</i> Kunze 584.
 " <i>eximium</i> Mett. 579.
 " <i>filare</i> Forsk. 444.
 " <i>fimbriatum</i> Cav. 573.
 " <i>flaccidum</i> Fée 569.
 " <i>fraxinifolium</i> Presl 590.
 " <i>fraxinifolium</i> R. Br. 592.
 " <i>Funcckii</i> Fée 568.
 " <i>Gardneri</i> Hook. 575.
 " <i>Gardnerianum</i> Kunze 575.
 " <i>Gayanum</i> Fée 570.
 " <i>glabellum</i> Kl. 571.
 " <i>graminoides</i> Swartz 546.
 " <i>Guianense</i> Baker 591.
 " <i>hastatum</i> Liebm. 589.
 " <i>Hermineri</i> Bory 570.
 " <i>heterophyllum</i> Raddi 415.
 " <i>hirtum</i> Swartz 583.
 " <i>horridulum</i> Kaulf. 575.
 " <i>hybridum</i> Bory 572.
 " <i>Hystrix</i> Kunze 573.
 " <i>Jamesoni</i> Hook. et Grev. 575.
 " <i>inaequale</i> Willd. 592.</p> |
|--|--|---|

- ACROSTICHUM *incisum* Hook. 586.
 " *Klotzschii* Moritz 579.
 " *laminarioides* Bory 581.
 " *lancifolium* Desv. 576.
 " *Langsdorffii* Hook. et Grev. 581.
 " *latifolium* Hook. 568.
 " *latifolium* Swartz 571.
 " *laurifolium* Thouars 567.
 " *Lechlerianum* Mett 569.
 " *lepidopteris* L. et F. 527.
 " *leptophyllum* Fée 571.
 " *Lindbergii* Mett. 572.
 " *Lindeni* Hook. 573.
 " *Lindigii* Karst. 581.
 " *lineare* Fée 579.
 " *Lingua* Raddi 568.
 " *luridum* Fée 571.
 " *marginatum* Wall. 567.
 " *Martinicense* Desv. 570.
 " *melanopus* Kunze 572.
 " *minutum* Pohl 570.
 " *Moritzianum* Kl. 578.
 " *muscosum* Kunze 582.
 " *muscosum* Swartz 581.
 " *nanum* Liebm. 574.
 " *neriifolium* Wall. 576.
 " *nicotianaefolium* Sw. 589.
 " *nigrescens* Hook. 568.
 " *nivosum* Kunze 580.
 " *nudum* Kunze 570.
 " *oblongum* Desv. 567.
 " *oligotrichum* Kunze 579.
 " *osmundaceum* Hook. 586.
 " *ovatum* Hook. 574.
 " *ovatum* Liebm. 600.
 " *oxyphyllum* Brongn. 569.
 " *pachydermum* Fée 576.
 " *paleaceum* Hook. et Grev. 583.
 " *paleaceum* Pohl 582.
 " *pallidum* Beyrich 569.
 " *palustre* Hook. 584.
 " *peltatum* Sw. 587.
 " *pennula* Poir. 180.
 " *perelegans* Fée 582.
 " *petiolatum* Swartz 576.
 " *phlebodes* Kunze 584.
 " *Pilosella* Spreng. 575.
 " *piloselloides* Presl 575.
 " *platyneuron* Fée 578.
 " *Plumieri* Fée 578.
 " *plumosum* Fée 583.
 " *podotrichum* Desv. 578.
 " *polypodioides* Linn. 526.
 " *Portoricense* Spreng. 589.
 " *pulchellum* Baker 600.
- ACROSTICHUM *pumilum* Mart. et Gal. 575.
 " *punctulatum* Mett. 577.
 " *Raddianum* Hook. et Grev. 575.
 " *Raddianum* Kunze 591.
 " *Raddii* Desv. 575.
 " *ramosissimum* Fée 574.
 " *recognitum* Kunze 578.
 " *Reichenbachii* Moritz 579.
 " *rhabdolepis* Fée 574.
 " *rubicundum* Pohl 571.
 " *rubiginosum* Fée 580.
 " *rufum* Linn. 552.
 " *salicifolium* Willd. 576.
 " *scalpellum* Mart. 571.
 " *scandens* Bory 568.
 " *scandens* Raddi 591.
 " *scariosum* Swartz 540.
 " *Schiedei* Kunze 580.
 " *Schomburgkii* Fée 571.
 " *scolopendrifolium* Raddi 573.
 " *sejunctum* Kuhn 578.
 " *semipinnatifidum* Hook. 589.
 " *serratifolium* Mert. 590.
 " *setosum* Liebm. 578.
 " *siliquosum* Linn. 334.
 " *simplex* Swartz 570. 599.
 " *sorbifolium* Linn. 583.
 " *spathulatum* Bory 574.
 " *spathulinum* Raddi 575.
 " *speciosum* Willd. 592.
 " *splendens* Bory 583.
 " *Spruceanum* Fée 568.
 " *squamipes* Hook. 599.
 " *squamosum* Schkuhr 581.
 " *squamosum* Sw. 583.
 " *stramineum* Mett. 572.
 " *strictum* Raddi 580.
 " *lanajense* Kuhn 582.
 " *tartareum* Cav. 556.
 " *tectum* Willd. 580.
 " *tenellum* Desv. 575.
 " *thalioides* Linn. 334.
 " *trifoliatum* Linn. 555.
 " *umbrosum* Liebm. 589.
 " *undulatum* Willd. 578.
 " *unitum* Bory 570.
 " *vagans* Mett. 567.
 " *vestitum* Hook. et Grev. 583.
 " *villosum* Sieb. 572.
 " *villosum* Swartz 578.
 " *viscosum* Swartz 576.
 " *Wageneri* Kunze 583.
 " *xanthoneuron* Kunze 576.
- ACROSTICHUM *Yapurense* Mart. 584:
 ACTINOPHELEBIA Presl 310.
 ACTINOSTACHYS Wall. 178.
 " *pennula* Hook. 180
 " *subtrijuga* Presl 179.
 " *trilateralis* J. Smith 180.
 ADIANTOPSIS Fée 385. 386.
 " *chlorophylla* Fée 388.
 " *dichotoma* Moore 389.
 " *monticola* Moore 386.
 " *radiata* Fée 387.
 " *regularis* Moore 387.
 " *spectabilis* Fée 388.
 ADIANTUM Linn. 359.
 " *acuminatum* Desv. 379.
 " *aethiopicum* Linn. 367.
 " *angustatum* Kaulf. 376.
 " *apiculatum* Schrad. 379. 380.
 " *arcuatum* Swartz 361.
 " *argutum* Splitg. 364.
 " *asperum* Desv. 377.
 " *assimile* Swartz 368.
 " *betulinum* Kaulf. 365.
 " *Bomplandi* Desv. 372.
 " *Brasiliense* Link 364.
 " *Brasiliense* Raddi 376.
 " *calcareum* Gardn. 363.
 " *canonicum* Kunze 371.
 " *Capillus-Gorgonis* Webb 362.
 " *Capillus-Veneris* Linn. 366.
 " *cardiochloena* Kunze 370.
 " *cassioides* Desv. 372.
 " *caudatum* Linn. 362. 594.
 " *Cayennense* Willd. 373.
 " *ciliatum* Blume 362.
 " *Claussenii* Fée 379.
 " *concinnum* H.B.K. 382.
 " *conicum* Vell. 365.
 " *cristatum* Linn. 371.
 " *cultatum* J. Smith 369.
 " *cuneatum* L. et F. 367. 594.
 " *curvatum* Hook. 375.
 " *curvatum* Kaulf. 375. 376.
 " *deflectens* Mart. 362.
 " *delicatulum* Mart. 362.
 " *denticulatum* Swartz 363.
 " *dichotomum* Poir. 389.
 " *digitatum* Presl 366.
 " *dilatatum* Schrad. 365.
 " *dissimile* Schrad. 362.
 " *dolabriforme* Hook. 361.
 " *dolosum* Kunze 380. 595.
 " *elatum* Desv. 374.
 " *emarginatum* Bory 368.
 " *eminens* Presl 368.
 " *falcatum* Swartz 380.
 " *falcatum* Vell. 373.

ADIANTUM *filiforme* Gardn. 362.
 „ *flabellatum* Linn. 594.
 „ *flagelliferum* Wall. 362.
 „ *flagellum* Fée 362.
 „ *formosissimum* Kl. 368.
 „ *fovearum* Raddi 364.
 „ *fructuosum* Kunze 372. 374.
 „ *fructuosum* Poepp. 380.
 „ *fuliginosum* Fée 372.
 „ *glaucescens* Kl. 370.
 „ *gracile* Fée 374.
 „ *grande* Fée 371.
 „ *gratum* Fée 368.
 „ *Guianense* Aubl. 354.
 „ *Haenkeanum* Presl 364.
 „ *Hewardia* Kunze 381.
 „ *hirsutum* Bory 362.
 „ *hirtum* Kl. 373.
 „ *hirtum* Splitg. 374.
 „ *horizontale* Mart. 369.
 „ *hypoleucum* Kunze 370.
 „ *Jacobinae* Fée 380.
 „ *intermedium* Swartz 364.
 „ *Kaulfussii* Kunze 363.
 „ *Klotzschianum* Hook. 371.
 „ *Klotzschianum* Presl 365.
 „ *Kohautianum* Presl 374.
 „ *Kunzeanum* Kl. 371.
 „ *Kunzeanum* Presl 379.
 „ *Kunzei* Miq. 372.
 „ *laetum* Presl 371.
 „ *Lancea* Linn. 373.
 „ *lanceolatum* Fée 380.
 „ *laxum* Kunze 373.
 „ *Leprieurii* Hook. 381.
 „ *Lindeni* Moore 594.
 „ *lucidum* Swartz 376.
 „ *lunatum* Cav. 361.
 „ *lunulatum* Burm. 361.
 „ *lunulatum* Houtt. 459.
 „ *macrocarpum* Presl 374.
 „ *macrocladon* Kl. 370.
 „ *macrodon* Kaulf. 364.
 „ *macrodon* Kaulf. 377.
 „ *macrophyllum* Swartz 378.
 „ *macropterum* Miq. 595.
 „ *macropus* Schrad. 364.
 „ *Matthewsianum* Hook. 370.
 „ *metanoleucum* Willd. 371.
 „ *micropteris* Poir. 390.
 „ *monosoratum* Willd. 379.
 „ *Moritzianum* Link 366.
 „ *muscosum* Plum. 275.
 „ *myriophyllum* Presl 371.
 „ *oblique-truncatum* Fée 380.
 „ *obliquum* Willd. 364.
 „ *oblongatum* Schrad. 364.

ADIANTUM *obtusum* Desv. 372.
 „ *olivaceum* Baker 381.
 „ *ornithopodum* Presl 375.
 „ *pachysorum* Reich. 374.
 „ *pectinatum* Kunze 374.
 „ *pedatum* Raddi 376.
 „ *pellucidum* Mart. et Gal. 368.
 „ *pensile* Kunze 369.
 „ *pentadactylon* L. et F. 368.
 „ *persimile* Presl 362.
 „ *Philippense* Linn. 361.
 „ *Phyllitidis* J. Smith 377.
 „ *platyphyllum* Swartz 363.
 „ *Poeppigianum* Presl 377.
 „ *politum* J. Smith 371.
 „ *polyphyllum* Willd. 370.
 „ *populifolium* Mart. 378.
 „ *prionophyllum* H.B.K. 373.
 „ *propinquum* Fée 379.
 „ *proximum* Gaud. 372.
 „ *pubescens* Raddi 376.
 „ *pulverulentum* Linn. 379.
 „ *Raddianum* Presl 367.
 „ *radiatum* Linn. 387.
 „ *regulare* Kunze 387.
 „ *rhizophorum* Swartz 362.
 „ *rhizophyllum* Schrad. 363.
 „ *rhomboideum* H.B.K. 372.
 „ *rhomboideum* Schkuhr 368.
 „ *Ripidium* Kunze 362.
 „ *sagittatum* Aubl. 357.
 „ *Seemanni* Hook. 378.
 „ *serrato-dentatum* Willd. 372.
 „ *serrulatum* Linn. 379.
 „ *sinuosum* Gardn. 369. 594.
 „ *soboliferum* Wall. 362.
 „ *speciosum* Hook. 366.
 „ *striatum* Swartz 371.
 „ *subcordatum* Swartz 365.
 „ *tenerum* Hort. 367.
 „ *tenerum* Swartz 382.
 „ *terminatum* Kunze 373.
 „ *ternatum* Willd. 373.
 „ *tetragonum* Hook. et Baker 376.
 „ *tetragonum* Schrad. 375.
 „ *tetraphyllum* Willd. 373.
 „ *thalictroides* Willd. 368.
 „ *tomentosum* Kunze 371.
 „ *trapeziforme* Linn. 368.
 „ *trapezoides* Fée 369.
 „ *tremulum* Kunze 362.
 „ *triangulatum* Splitg. 364.
 „ *trigonum* Labill. 368.
 „ *triphyllum* Lam. 393.
 „ *truncatum* Raddi 365.
 „ *umbrosum* Willd. 379.

ADIANTUM *urophyllum* Hook. 371.
 „ *varium* H.B.K. 377.
 „ *vestitum* Wall. 362.
 „ *villosum* Linn. 379.
 „ *Wilsoni* Hook. 380. 595.
AGLAOMORPHA Schott 495.
ALLANTODIA R. Br. 427.
ALEURITOPTERIS Fée 385. 386.
 „ *argyrophylla* Fée 392.
 „ *dealbata* Fée 392.
 „ *indica* Fée 392.
 „ *mezicana* Fée 392.
ALLOSORUS Presl 395. 397.
 „ *argyrophyllus* Presl 392.
 „ *Bongardianus* Kunze 397.
 „ *dealbatus* Presl 392.
 „ *farinosus* Kunze 557.
 „ *farinosus* Presl 392.
 „ *pulveraceus* Presl 392.
 „ *resistens* Kunze 404.
ALSOPHILA R. Br. 307. 317.
 „ *aculeata* Klotzsch 331.
 „ *aculeata* J. Smith 330.
 „ *acuminata* J. Smith 321.
 „ *alutacea* Kunze 327.
 „ *Arbuscula* Presl 318. 322.
 „ *armata* Mart. 330.
 „ *armata* Presl 318. 331.
 „ *armigera* Kunze 322.
 „ *articulata* J. Smith 325.
 „ *aspera* R. Br. 318. 325.
 „ *atrovirens* Presl 317. 320.
 „ *axillaris* Moore 331.
 „ *Blanchetiana* Presl 327.
 „ *blechnoides* Hook. 317. 318.
 „ *Caracasana* Klotzsch 327.
 „ *compta* Mart. 318. 324.
 „ *crenata* Kunze 320.
 „ *davallioides* Kunze 325.
 „ *elegans* Mart. 317. 319. 593.
 „ *exeelsa* Mart. 319.
 „ *ferox* Presl 318. 330.
 „ *Fischeriana* Regel 502.
 „ *fulva* Mart. et Gal. 309.
 „ *fumata* Klotzsch 324.
 „ *Gardneri* Hook. 329.
 „ *gibbosa* Klotzsch 318. 326.
 „ *Glaziovii* Baker 592.
 „ *hirsuta* Kunze 331.
 „ *hirta* Kaulf. 331.
 „ *Hookeriana* Klotzsch 321.
 „ *Hostmanni* J. Smith 314.
 „ *Humboldtii* Klotzsch 328.
 „ *humilis* J. Smith 328.
 „ *infesta* Hook. et Bak. 327.
 „ *infesta* Kunze 327.
 „ *laevis* J. Smith 313.

- ALSOPHILA** *Leprieuriana* Kunze 314.
 „ *leucolepis* Mart. 318. 327.
 „ *marginalis* Klotzsch 317. 320.
 „ *Martinicensis* Spreng. 484.
 „ *Miersii* Hook. 317. 321.
 „ *Millefolium* Desv. 332.
 „ *mollissima* Kunze 328.
 „ *mollissima* Moore 331.
 „ *monticola* Mart. 332.
 „ *multiflora* Presl 313.
 „ *munita* Kaulf. 329.
 „ *nigra* Mart. 318. 328.
 „ *nitens* J. Smith 326.
 „ *nitida* Kunze 325.
 „ *oblonga* Klotzsch 318. 323.
 „ *paleolata* Mart. 318. 329.
 „ *paleolata* Mett. 330.
 „ *phalerata* Mart. 318. 326.
 „ *plagiopteris* Mart. 318. 329.
 „ *platyphylla* Presl 324.
 „ *Pohlii* Presl 331.
 „ *praecincta* Kunze 318. 324.
 „ *procera* Kunze 318. 322.
 „ *procera* Mart. 323.
 „ *pruinata* Kaulf. 318. 332.
 „ *pubescens* Baker 330.
 „ *pungens* Kaulf. 318. 323.
 „ *pycnocarpa* Kunze 321.
 „ *Raddiana* Gaud. 330.
 „ *radens* Kaulf. 321.
 „ *radens* Mett. 317. 321.
 „ *rigidula* Mart. 328.
 „ *rostrata* Mart. 318.
 „ *Schiedeana* Presl 324.
 „ *Sellowiana* Klotzsch 329.
 „ *senilis* Klotzsch 329.
 „ *serrata* J. Smith 325.
 „ *setosa* Kaulf. 315.
 „ *Sprengeliana* Mart. 325.
 „ *stipulacea* Beyrich 315.
 „ *strigosa* J. Smith 314.
 „ *subaculeata* Splitg. 313.
 „ *Swartziana* Mart. 331.
 „ *Taenitis* Hook. 317. 319.
 „ *tomentosa* Presl 328.
 „ *unita* Kunze 321.
 „ *vestita* Presl 330.
 „ *vestita* J. Smith 331.
 „ *villosa* Desv. 318. 328.
 „ *Weigeltii* Roem. 314.
AMAUROPELTA Kunze 467.
AMBLIA Presl 460.
AMPHIBLESTRA Presl 398.
AMPHICOSMIA Gardn. 310. 312.
 „ *Beyrichiana* Moore 315.
 „ *Haffmanni* Moore 314.
 „ *laevis* Moore 313.
AMPHICOSMIA *macrocarpa* Moore 314.
 „ *multiflora* Gardn. 313.
 „ *Parkeri* Moore 314.
 „ *riparia* Gardn. 316.
 „ *strigosa* Moore 314.
AMPHIDERMIVM Schott 317.
 „ *blechnoides* Klotzsch 318.
Anagramme *chaerophylla* Link 554.
 „ *Schomburgkiana* Fée 553.
Anapausia *aliena* Mett. 589.
 „ *nicotianaefolia* Presl 590.
Anapeltis *geminata* J. Smith 533.
 „ *lycopodioides* J. Smith 533.
 „ *nitida* J. Smith 533.
 „ *serpens* J. Smith 521.
 „ *squamulosa* J. Smith 534.
 „ *stigmatica* J. Smith 534.
Anaxetum *crassifolium* Schott 537.
ANEIMIA v. **ANEMIA** Swartz 185.
 „ *abscissa* Schrad. 195.
 „ *adiantifolia* Cham. Schldl. 207.
 „ *adiantifolia* Swartz 200.
 „ *adiantoides* Pohl 199.
 „ *aemula* Pohl 211.
 „ *anthriscifolia* Schrad. 200.
 „ *asplenifolia* Swartz 200.
 „ *Breuteliana* Presl 196 sub n. 15 et 16.
 „ *bunifolia* Moore 216.
 „ *caudata* Kaulf. 197.
 „ *caudata* γ. *abscissa* Moore 196. 197.
 „ *chaerophylla* Bong. 208.
 „ *cheilanthoides* Kaulf. 204.
 „ *ciliata* Presl 207.
 „ *collina* Presl 199.
 „ *collina* Raddi 198.
 „ *cordifolia* Presl 191.
 „ *Cujabensis* Bong. 195.
 „ *delicatula* Pohl 216.
 „ *densa* Link 192.
 „ *dentata* Field. et Gardn. 213.
 „ *dichotoma* Gardn. 215.
 „ *dissecta* Presl 208.
 „ *diversifolia* Schrad. 194.
 „ *elegans* Pohl 199.
 „ *elegans* Presl 187.
 „ *ferruginea* Humb. Bonpl. 203.
 „ *filiformis* Swartz 213.
 „ *flexuosa* Raddi 204.
 „ *fraxinifolia* Raddi 188.
 „ *fulva* Swartz 201.
 „ *Gardneri* Hook. 210.
 „ *Gardneriana* Presl 211.
 „ *glareosa* Field. et Gardn. 211.
 „ *glauca* Hildenbrand 207.
 „ *Goyazana* Pohl 212.
ANEIMIA *gracilis* Schrad. 213.
 „ *Haenkei* Mart. et Gal. 190.
 „ *Haenkei* Presl 191.
 „ *hirsuta* Mart. 207.
 „ *hirsuta* Swartz 207.
 „ *hirta* Raddi 191.
 „ *hirta* Swartz 195.
 „ *hirta* Willd. 188.
 „ *humilis* Hook. 214.
 „ *humilis* Klotzsch 214.
 „ *humilis* Kunze 212.
 „ *humilis* Swartz 212.
 „ *imbricata* J. W. Sturm 205.
 „ *incisa* Moore 199.
 „ *incisa* Pohl 195.
 „ *incisa* Schrad. 194.
 „ *incisa* var. β. *obtusa* Presl 199.
 „ *inclusens* Kunze 211.
 „ *laciniata* Kaulf. 192.
 „ *laciniata* Link 193.
 „ *lanuginosa* Bongard 210.
 „ *longifolia* Raddi 191.
 „ *macrophylla* Hort. 189.
 „ *Mandiocana* Hook. 196.
 „ *Mandiocana* Raddi 197.
 „ *microphylla* Pohl 214.
 „ *Millefolium* Gardn. 215.
 „ *multifida* Bong. 216.
 „ *multifida* Pohl 208.
 „ *nervosa* Pohl 193.
 „ *obliqua* Pohl 190.
 „ *obliqua* Schrad. 187.
 „ *oblonga* J. W. Sturm 206.
 „ *oblongifolia* Swartz 210.
 „ *obtusa* Moric. 211.
 „ *pallida* Field. et Gardn. 198.
 „ *petrophila* Bongard 216.
 „ *Phyllitidis* Breutel 196.
 „ *Phyllitidis* H.B.K. 191.
 „ *Phyllitidis* Kaulf. 188.
 „ *Phyllitidis* Kunze 195.
 „ *Phyllitidis* Swartz 190.
 „ *pilosa* Presl 212.
 „ *Pohlana* J. W. Sturm 195.
 „ *polyphylla* Presl 209.
 „ *pulchra* Pohl 213.
 „ *pumila* Klotzsch 212.
 „ *Raddiana* Link 204.
 „ *radicans* Raddi 197.
 „ *radicans* β. Raddi 209.
 „ *repens* α. *minor* Raddi 214.
 „ *repens* β. *major* Raddi 207.
 „ *Riedeliana* Kunze 187.
 „ *rotundifolia* Herb. Berol. 210.
 „ *rotundifolia* Schrad. 209.
 „ *rubrostipes* Pohl 202.
 „ *rutaefolia* Mart. 202.

- ANEIMIA Schomburgkiana* Presl 214.
 „ *Schraderiana* Mart. 194.
 „ *Seemanni* Hook. 212.
 „ *sorbifolia* Schrad. 190.
 „ *tenella* Swartz 208.
 „ *tenera* Pohl 208.
 „ *tenuifolia* Presl 216.
 „ *tomentosa* Moore 203.
 „ *tomentosa* Swartz 203.
 „ *tomentosa a.* Moore 204. 206.
 „ *tomentosa γ. fulva* Moore 201.
 „ 202 sub n. 23. 24. 25.
 „ *Tweedieana* Hook. 192.
 „ *vellea* Schrad. 199.
 „ *Vespertilio* Schrad. 194.
 „ *villosa* Humb. Bonpl. 205.
 „ *villosa s. cheilanthoides* Presl 204.
 „ *villosa γ. Humboldtiana* Presl 203. 206.
 „ *villosa β. Raddiana* Presl 201. 204.
 „ *villosa δ. tomentosa* Presl 204.
ANEIMIACEAE v. ANEMIACEAE
 Link 167.
ANEMIDICTYON v. ANEMIDICTYON
 J. Smith 185. 187.
 „ *fraxinifolium* Brackenr. 189.
 „ *fraxinifolium* Presl 188. 190.
 „ *Haenkei* Presl 191.
 „ *hirtum* Moore 188. 189. 192.
 „ *hirtum* Presl 189. 192. 196.
 „ *incisum* Presl 194.
 „ *laciniatum* Presl 193.
 „ *obliquum* Presl 188.
 „ *Phyllitidis* Brackenr. 191.
 „ *Phyllitidis* Moore 190. 191. 193.
 „ *Phyllitidis* Presl 190.
 „ *Phyllitidis* J. Smith 188. 189.
 „ *Tweedieanum* Moore 192.
Anemirhiza adiantifolia J. Smith 200.
ANETIUM Splitg. 558. 560.
 „ *citrifolium* Splitg. 560.
 „ *Sprucei* Hook. 560.
ANISOGONIUM Presl 427.
ANOECTANGIUM Hook. 4.
 „ *cirrhosum* Hedw. 25.
 „ *torquatum* Hook. 5.
ANOGRAMME Link 548.
ANTIGRAMMA Presl 457.
 „ *oblongata* Presl 457.
 „ *plantaginea* Presl 458.
ANTIGRAMMA populifolia Presl 458.
 „ *repanda* Presl 457.
 „ *subsessilis* Fée 457.
ANTITRICHIA Brid. 52.
 „ *Brasiliensis* Hornsch. 52.
ANTROPHYUM Kaulf. 558.
 „ *Cayennense* Kaulf. 559.
 „ *citrifolium* Fée 560.
 „ *discoideum* Kunze 560.
 „ *Féei* Schaffn. 559.
 „ *lanceolatum* Kaulf. 559.
 „ *lineatum* Kaulf. 558.
 „ *pendulum* Fée 560.
 „ *spathulatum* Fée 560.
 „ *subsessile* Kunze 560.
APHYLLOCARPA Cav. 163.
APIOCARPA Hüben. 3.
APOTOMIA Fée 359.
ARACHNIOIDES Blume 460.
ASPIDIEAE 337. 457.
ASPIDIUM Swartz 460.
 „ *abbreviatum* Schrad. 464.
 „ *aculeatum* Swartz 462.
 „ *acuminatum* Willd. 493.
 „ *acutum* Sw. 493.
 „ *amplissimum* Mett. 485.
 „ *affine* Mett. 462.
 „ *albicans* Fée 470.
 „ *alsophilaceum* Kunze 474.
 „ *amblyotus* Mett. 462.
 „ *angulare* Willd. 462.
 „ *anisopterum* Kunze 483.
 „ *anopteron* Kunze 597.
 „ *bifidum* Presl 490.
 „ *biserratum* Swartz 493.
 „ *Braunii* Mett. 462.
 „ *caducum* H.B.K. 461.
 „ *capense* Swartz 316.
 „ *capense* Willd. 463.
 „ *caripense* Mett. 472.
 „ *catacolobum* Kunze 597.
 „ *caudatum* Swartz 462.
 „ *chaerophylloides* Moritz 481.
 „ *chrysolobum* Link 471.
 „ *cicutarium* Willd. 481.
 „ *confertum* Kaulf. 465.
 „ *confolium* Presl 388.
 „ *connexum* Mett. 489.
 „ *consanguineum* Kunze 487.
 „ *conterminum* Willd. 477.
 „ *contiguum* Kaulf. 487.
 „ *cordifolium* Swartz 491.
 „ *coriaceum* Swartz 463.
 „ *crenatum* Mett. 462.
 „ *crinitum* Mart. et Gal. 480.
 „ *Ctenitis* Link 475.
 „ *demissum* Kunze 475.
ASPIDIUM denticulatum Sw. 482.
 „ *discolor* L. et F. 463.
 „ *diversilobum* Mett. 488.
 „ *Eckloni* Kunze 487.
 „ *effusum* Griseb. 485.
 „ *ensifolium* Swartz 493.
 „ *exaltatum* Sw. 492.
 „ *excultum* Mett. 486.
 „ *falculatum* Raddi 472.
 „ *ferrugineum* Beyrich 472.
 „ *Felix-Mas* Swartz 480.
 „ *Fischeri* Mett. 479.
 „ *fraternum* Mett. 482.
 „ *fraxinifolium* Schrad. 490.
 „ *funestum* Kunze 481.
 „ *Gardnerianum* Kunze 475.
 „ *gemmiferum* Moritz 471.
 „ *gibbosum* Willd. 493.
 „ *glanduliferum* Kl. et Karst. 478.
 „ *gongyloides* Schkuhr 487.
 „ *Guianense* Kl. 464.
 „ *Haleakalense* Mett. 462.
 „ *Hartwegii* Mett. 462.
 „ *hastulatum* Mett. 462.
 „ *heracleifolium* Willd. 466.
 „ *heterodon* Schrad. 465.
 „ *hirsutulum* Swartz 493.
 „ *Hookeri* Kl. 465.
 „ *imbecille* Kunze 481.
 „ *imbricatum* Kaulf. 492.
 „ *inaequale* Schrad. 472.
 „ *invisum* Raddi 470.
 „ *Klotzschii* Hook. 482.
 „ *laetum* Swartz 482.
 „ *leptorachis* Kunze 481.
 „ *lobatum* Swartz 462.
 „ *lonchophyllum* Kunze 597.
 „ *luctuosum* Mett. 462.
 „ *lugubre* Mett. 476.
 „ *macrophyllum* Swartz 490.
 „ *macrourum* Kaulf. 470.
 „ *megalodus* Mett. 506.
 „ *meniscioides* Willd. 464.
 „ *mezicamum* Presl 480.
 „ *microphyllum* Mett. 462.
 „ *molle* Swartz 488.
 „ *monosorum* Kunze 476.
 „ *monostichum* Mett. 476.
 „ *Moritzianum* Mett. 462.
 „ *mucronatum* Beyrich 472.
 „ *mucronifolium* Mett. 462.
 „ *multifidum* Beyrich 485.
 „ *muricatum* Willd. 462.
 „ *neriiforme* Swartz 494.
 „ *nitidulum* Kunze 597.
 „ *nobile* Schlecht. 466.
 „ *nodosum* Willd. 496.

ASPIDIUM *obscurum* Fisch. et Mey. 479.
 „ *obtusifolium* Willd. 491.
 „ *oligocarpum* H.B.K. 477.
 „ *ordinatum* Mett. 462.
 „ *pachychlams* Fée 477.
 „ *paludosum* Raddi 493.
 „ *palustre* Mett. 478.
 „ *Paraënsis* Willd. 492.
 „ *parallelogramma* Kunze 480.
 „ *parasiticum* Sieb. 488.
 „ *patens* Sw. 470.
 „ *patulum* Swartz 480.
 „ *pauper* Fée 470.
 „ *pauperinum* Roem. 481.
 „ *pectinatum* Willd. 492.
 „ *pellucidum* Beyrich 475.
 „ *pendulum* Raddi 492.
 „ *pendulum* Splitg. 494.
 „ *pilosum* L. et F. 493.
 „ *pistillare* Swartz 494
 „ *plantagineum* Griseb. 465.
 „ *platyphyllum* Willd. 462.
 „ *Poeppigii* Presl 490.
 „ *Pohlmanum* Presl 487.
 „ *polymerum* Kunze 485.
 „ *polyphyllum* Kaulf. 477.
 „ *polytrichum* Schrad. 488.
 „ *proliferum* Mett. 462.
 „ *propinquum* Sw. 487.
 „ *proiensum* Swartz 481.
 „ *Ptarmica* Kunze 479.
 „ *punctulatum* Sw. 493.
 „ *Raddianum* Mett. 473.
 „ *refractum* A. Braun 489.
 „ *resiniferum* Kaulf. 487.
 „ *rivulorum* Link 477.
 „ *rufescens* Schrad. 493.
 „ *salaccense* Kunze 494.
 „ *scandens* Raddi 585.
 „ *Schottianum* Kunze 472.
 „ *semicordatum* Sw. 461.
 „ *sesquipedale* Willd. 493.
 „ *setosum* Kl. 476.
 „ *sinuatum* Moore 466.
 „ *splendens* Willd. 493.
 „ *Sprengelii* Kaulf. 478.
 „ *squamigerum* Mett. 474.
 „ *squarrosum* Mett. 462.
 „ *stipulare* Willd. 470.
 „ *stramineum* Mett. 462.
 „ *strigosum* Fée 477.
 „ *subinerme* Mett. 462.
 „ *subintegerrimum* Mett. 462.
 „ *subquinquefidum* Pal. Beauv. 481.
 „ *tacticopterum* Mett. 462.
 „ *tetragonum* Mett. 476.

ASPIDIUM *trapezoides* Schkuhr 492.
 „ *trichophorum* Fée 479.
 „ *trifoliatum* Swartz 466.
 „ *triste* Mett. 476.
 „ *truncatulum* Swartz 459.
 „ *tuberosum* Bory 492.
 „ *undulatum* Swartz 491.
 „ *unitum* Swartz 487.
 „ *villosum* Swartz 483.
 „ *violascens* Link 488.
 „ *Wallichianum* Mett. 462.

ASPLENIEAE 337. 427.

ASPLENIUM Linn. 427.

„ *abrotanoides* Presl 439.
 „ *abscissum* Willd. 437. 442.
 „ *adiantoides* Raddi, Hook. 447.
 „ *alatum* H.B.K. 432.
 „ *alleopteron* Kunze 434.
 „ *amabile* Liebm. 434.
 „ *ambiguum* Raddi 453.
 „ *angustatum* Desv. 444.
 „ *angustatum* Presl 446.
 „ *angustum* Swartz 430.
 „ *anisophyllum* Kunze 437.
 „ *anthriscifolium* Jacq. 443.
 „ *aquaticum* Kl. et Karst. 436.
 „ *attenuatum* Kaulf. 447.
 „ *auricularium* Desv. 435.
 „ *auriculatum* Swartz 440.
 „ *auritum* Swartz 438.
 „ *bidentatum* Kunze 437.
 „ *bidentatum* Willd. 438.
 „ *Blanchetii* Mett. 453.
 „ *blechnoides* Swartz 422.
 „ *Brasiliense* Raddi 435.
 „ *Brasiliense* Swartz 457.
 „ *camptosorum* Mett. 439.
 „ *canariense* Willd. 444.
 „ *caudatum* Forst. 442.
 „ *celtidifolium* Mett. 451.
 „ *cicutarium* Swartz 448.
 „ *cirrhatum* Rich. 434.
 „ *comptum* Kunze 434.
 „ *consanguineum* Gaud. 435.
 „ *coriaceum* Desv. 436.
 „ *coriifolium* Liebm. 439.
 „ *crenatum* Desv. 445.
 „ *crenatum* Baker 454.
 „ *crenatum* Presl 431.
 „ *cristatum* Brackenr. 445.
 „ *cristatum* Lam. 448.
 „ *cuneatum* Lam. 445.
 „ *curvatum* Kaulf. 438.
 „ *cystopterum* Kunze 434.
 „ *decurtatum* Link 449.
 „ *delicatulum* Presl 439.
 „ *discolor* Kunze 440.

ASPLENIUM *dispersum* Kunze 438.
 „ *dissectum* Link 448.
 „ *divergens* Mett. 445.
 „ *Douglasii* Hook. et Grev. 458.
 „ *drepanophyllum* Kunze 442.
 „ *dubium* Gaudich. 457.
 „ *dubium* Mett. 454.
 „ *elatum* Mett. 452.
 „ *erectum* Bory 435.
 „ *expansum* Presl 454.
 „ *falcatum* Mart. et Gal. 436.
 „ *falcatum* Thunb. 435.
 „ *falcatum* Vell. 437.
 „ *Falx* Desv. 440.
 „ *firmum* Kunze 437.
 „ *flabellulatum* Mett. 434.
 „ *foeniculaceum* H.B.K. 439.
 „ *formosum* Willd. 440. 597.
 „ *fruticosum* Vell. 459.
 „ *furcatum* Thunb. 444.
 „ *Gibertianum* Hook. 448.
 „ *Glaziovii* Baker 455.
 „ *gradatum* Vell. 453.
 „ *graminoides* Swartz 546.
 „ *Hallii* Hook. 442.
 „ *harpedes* Kunze 436.
 „ *heterophyllum* Presl 443.
 „ *inciso-alatum* Moore 448.
 „ *insigne* Liebm. 439.
 „ *integerrimum* Spreng. 433.
 „ *integrum* Fée 431.
 „ *juvandifolium* Lam. 433.
 „ *Kapplerianum* Kunze 433.
 „ *Karstenianum* Kl. 434.
 „ *laetum* Sieb. 436.
 „ *laetum* Swartz 441.
 „ *lassum* Raddi 444.
 „ *Lechleri* Mett. 450.
 „ *limbatum* Willd. 456.
 „ *Lindbergii* Mett. 452.
 „ *Lindeni* Hook. 446.
 „ *lineatum* Wawra 433.
 „ *loriforme* Hook. 430.
 „ *lugubre* Liebm. 442.
 „ *lunulatum* Swartz 435.
 „ *macilentum* Kunze 438.
 „ *marginatum* Linn. 456.
 „ *Martinicensis* Raddi 446.
 „ *mastigophyllum* Fée 434.
 „ *Mikami* Presl 456.
 „ *minimum* Mart. et Gal. 443.
 „ *miradorensis* Liebm. 442.
 „ *monodon* Liebm. 438.
 „ *mucronatum* Presl 444.
 „ *multisectum* Blume 442.
 „ *mutilum* Mett. 451.
 „ *nanum* Willd. 440.

- ASPLENIUM** *neogranatense* Fée 433.
 „ *Nidus* Raddi 431.
 „ *nigricans* Hook. f. 437.
 „ *nigricans* Kunze 444.
 „ *nubilum* Moore 437.
 „ *obtusifolium* Linn. 436.
 „ *obtusum* Mett. 454.
 „ *ocannense* Karst. 433.
 „ *odontophyllum* Wall. 440.
 „ *oligophyllum* Kaulf. 433.
 „ *Orites* Link 441.
 „ *Otonis* Hook. 452.
 „ *parvulum* Hook. 432.
 „ *pectinatum* Moore 443.
 „ *pendulum* Fée 436.
 „ *pimpinellifolium* Fée 440.
 „ *plantagineum* Linn. 449. 559.
 „ *platyklamys* Fée 437.
 „ *Poeppigii* Presl 431. 439.
 „ *polymorphum* Mart. et Gal. 437.
 „ *præmorsum* Swartz 444.
 „ *prolicum* Schrad. 439.
 „ *pseudonitidum* Hook. 447.
 „ *pseudonitidum* Raddi 446.
 „ *pterophorum* Presl 432.
 „ *pteropus* Kaulf. 436.
 „ *pubescens* Houlst. 449.
 „ *pulchellum* Raddi 441.
 „ *pumilum* Swartz 443.
 „ *pyramidatum* Liebm. 439.
 „ *radicans* Lowe 434.
 „ *radicans* Schkuhr 454.
 „ *recognitum* Kunze 439.
 „ *regulare* Swartz 435.
 „ *repandum* Kunze 436.
 „ *retortum* Kaulf. 444.
 „ *rhachirhizon* Raddi 434.
 „ *rhizophorum* Linn. 434.
 „ *Riedelianum* Bong. 450.
 „ *rigidum* Swartz 438.
 „ *riparium* Liebm. 436.
 „ *Ruizianum* Klotzsch 437.
 „ *salicifolium* Linn. 432.
 „ *salicifolium* Splitg. 440.
 „ *salicifolium* Spreng. 436.
 „ *sanguinolentum* Kunze 437.
 „ *scandicinum* Hook. 445.
 „ *scandicinum* Kaulf. 447.
 „ *Schimperianum* Hochst. 443.
 „ *Schkuhrianum* Presl 442.
 „ *Schomburgkianum* Kl. 431.
 „ *Schottii* Presl 438.
 „ *semicordatum* Raddi 440.
 „ *Serra* L. et F. 439.
 „ *serratum* Linn. 431.
 „ *serrulatum* Sw. 508.
- ASPLENIUM** *Shepherdi* Spreng. 452.
 „ *sorbifolium* Jacq. 564.
 „ *striatum* Linn. 453.
 „ *striatum* Mett. 454.
 „ *subalatum* Hook. et Arn. 440.
 „ *sulcatum* Lam. 438.
 „ *sulcatum* Moore 447.
 „ *Surinamense* Fée 430.
 „ *sylvaticum* Presl 451.
 „ *tenellum* Fée 439.
 „ *tenerrimum* Hochst. 443.
 „ *tenerum* Raddi 435.
 „ *theciferum* Mett. 345.
 „ *tomentosum* Lam. 552.
 „ *trapezoides* Swartz 432.
 „ *trilobum* Cav. 432.
 „ *umbrosum* Schrad. 438.
 „ *uniseriale* Raddi 434.
 „ *virens* Desv. 442.
 „ *Weigeltii* Kaulf. 430.
 „ *woodwardioides* Gardn. 439.
- ATHYRIUM** *Roth* 427. 430. 449.
 „ *decurtatum* Presl 449.
 „ *Haenkeanum* Presl 448.
- AZOLLA** *Lam.* 657.
 „ *arbuscula* Desv. 658.
 „ *Bonariensis* Bert. 660.
 „ *Caroliniana* Willd. 659.
 „ *cristata* Kaulf. 660.
 „ *densa* Desv. 660.
 „ *filiculoides* Lam. 658.
 „ *Magellanica* Kunze 660.
 „ *Magellanica* Willd. 658.
 „ *Mexicana* Schlecht. 660.
 „ *microphylla* Kaulf. 659.
 „ *Portoricensis* Spreng. 660.
- BARBULA** *Hedw.* 18.
 „ *cirrhata* Walk. Arn. 19.
 „ *linearis* Schwaegr. 19.
 „ *lurida* Hornsch. 18.
- BALANTIUM** *Presl* 339.
 „ *Beyrichii* Roem. 340.
 „ *Karstenianum* Klotzsch 340.
 „ *Sellowianum* Presl 340.
- BARTRAMIA** *Hedw.* 39.
 „ *filiformis* Hornsch. 40.
 „ *glaucescens* Hornsch. 40.
 „ *longifolia* Hook. 40.
 „ *rufiflora* Hornsch. 41.
 „ *scabriseta* Hornsch. 41.
 „ *sphaerocarpa* Schwaegr. 42.
 „ *uncinata* Brid. 41.
- BATHMIUM** *Link* 460.
 „ *Aubletianum* Fée 466.
 „ *macrocarpum* Fée 466.
 „ *macrophyllum* Link 490.
 „ *sinuatum* Fée 466.
- BATHMIUM* *trifoliatum* *Link* 466.
Belvisia *siliquosa* *Mirb.* 334.
BERNHARDIA *Willd.* 132.
 „ *dichotoma* *Willd.* 133.
- BLECHNEAE** 337. 418.
BLECHNIDIUM *Moore* 419.
BLECHNOPSIS *Presl* 419.
 „ *Brasiliensis* *Presl* 423.
 „ *nitida* *Presl* 423.
- BLECHNUM** *Linn.* 419.
 „ *angustatum* *Schrad.* 426.
 „ *angustifolium* *Willd.* 426.
 „ *angustifrons* *Fée* 421.
 „ *asplenoides* *Swartz* 421.
 „ *attemuatum* *Mett.* 415.
 „ *auriculatum* *Cav.* 420.
 „ *australe* *Linn.* 420.
 „ *Brasiliense* *Desv.* 422.
 „ *calophyllum* *L. et F.* 426.
 „ *campestre* *Hort.* 423.
 „ *cartilagineum* *Schkuhr.* 425.
 „ *caudatum* *Cav.* 425.
 „ *ceteraccinum* *Raddi* 421.
 „ *cognatum* *Presl* 425.
 „ *Corcovadense* *Raddi* 423.
 „ *Cunninghami* *Moore* 425.
 „ *distans* *Presl* 425.
 „ *elongatum* *Gaud.* 423.
 „ *falcatum* *Lodd.* 425.
 „ *Fendleri* *Hook.* 424.
 „ *Fluminense* *Vell.* 423.
 „ *fraxineum* *Willd.* 424.
 „ *fraxinifolium* *Desv.* 424.
 „ *giganteum* *Kaulf.* 415.
 „ *glandulosum* *Link* 425.
 „ *gracile* *Kaulf.* 424.
 „ *hastatum* *Kaulf.* 420.
 „ *heterocarpum* *Fée* 422.
 „ *hymenoneuron* *Kl.* 427.
 „ *intermedium* *Link* 424.
 „ *Lanceola* *Swartz* 420.
 „ *lanceolatum* *Raddi* 421.
 „ *latifolium* *Moritz* 424.
 „ *L'Herminieri* *Mett.* 416.
 „ *longifolium* *H.B.K.* 424.
 „ *meridense* *Kl.* 424.
 „ *meridionale* *Presl* 425.
 „ *moluccanum* *Desv.* 426.
 „ *nitidum* *Presl* 423.
 „ *occidentale* *Linn.* 425.
 „ *Penna-marina* *Kuhn* 414.
 „ *plantagineum* *Hook.* 421.
 „ *Pohlianum* *Presl* 422.
 „ *polypodioides* *Ettingsh.* 421.
 „ *polypodioides* *Raddi* 422.
 „ *rigidum* *Swartz* 420.
 „ *Rileyianum* *Hort.* 423.

- BLECHNUM *scabrum* Liebm. 422.
 „ *scandens* Bory 427.
 „ *Schlimense* Fée 424.
 „ *seminudum* Willd. 547.
 „ *serrulatum* Rich. 426.
 „ *stagninum* Raddi 426.
 „ *stramineum* Labill. 426.
 „ *striatum* R. Br. 426.
 „ *subarabicum* Vell. 422.
 „ *triangulare* Link 422.
 „ *triangulatum* J. Smith 422.
 „ *trifoliatum* Kaulf. 421.
 „ *unilaterale* Willd. 422.
 „ *volubile* Kaulf. 426.
 BOLBITIS Schott 565.
 „ *serratifolia* Schott 590.
 BOTRYCHUM Sw. 303.
 „ *virginicum* Sw. 304.
 BRACHYMENIUM Hook. 36.
 „ *Hornschuchianum* Mart. 36.
 „ *pulchellum* Hornsch. 36.
 BRACHYPODIUM Brid. 19.
 „ *crispatum* Brid. 20.
 BRACHYSTELEUM Reichenb. 19.
 „ *crispatum* Hornsch. 20.
 BRYACEAE Endl. 4.
 BRYUM Schwaegr. 43.
 „ *apiculatum* Schwaegr. 44.
 „ *argenteum* β. *lanatum* Hornsch. 43.
 „ *Auberti* Brid. 46.
 „ *aureum* Dill. 39.
 „ *bulbiforme* Dill. 39.
 „ *caespiticium* Linn. 44.
 „ *conicum* Hornsch. 43.
 „ *gracilisetum* Hornsch. 43.
 „ *julaceum* Schrad. 43.
 „ *lanatum* Brid. 43.
 „ *longirostrum* Brid. 46.
 „ *megalocarpon* Kunth 38.
 „ *nanum* Dill. 6.
 „ *ovatum* Dill. 44.
 „ *pendulum* Dill. 43. 44. 46.
 „ *Polla Auberti* Brid. 46.
 „ *Polla rostrata* Brid. 46.
 „ *roseum* W. Arn. 45.
 „ *rostratum* Hook. et Tayl. 46.
 „ *turbinatum* Hedw. 44.
 CAENOPTERIS Bergm. 427.
 „ *cicutaria* Thunb. 448.
 „ *fumarioides* Desv. 594.
 CALLIPTERIS Bory 427.
 „ *sylvatica* Bory 451.
 CALLOGRAMME Fée 548.
 CALLYMODON Presl 495.
 CAMPIUM Presl 565.
 CAMPTERIA Presl 398. 399. 404.
 CAMPTERIA *biaurita* Hook. et Bauer 404.
 „ *Luschnathiona* Kl. 412.
 „ *Rottleriana* Presl 404.
 CAMPTODIUM Fée 467.
 CAMPTOSORUS Link 457.
 „ *rumicifolius* Link 458.
 CAMPYLONEURON Presl 495. 498.
 „ *amphostemon* Kze 530.
 „ *angustifolium* Fée 529.
 „ *brevifolium* Link 532.
 „ *caespitosum* Link 532.
 „ *costatum* Fée 531.
 „ *crispum* Fée 531.
 „ *Cubense* Fée 530.
 „ *decurrens* Presl 532.
 „ *laevigatum* Presl 530.
 „ *lanciforme* Presl 530.
 „ *latum* Moore 531.
 „ *lucidum* Moore 530.
 „ *minus* Fée 530.
 „ *Moritzianum* Fée 531.
 „ *Phyllitidis* Link 531.
 „ *polyanthum* Fée 531.
 „ *repens* Presl 532.
 „ *rigidum* J. Smith 530.
 „ *Siberianum* Fée 531.
 „ *undulatum* Fée 531.
 „ *xalapense* Fée 531.
 CAMPYLOPUS Brid. 15.
 „ *concolor* Brid. 12.
 „ *introflexus* Brid. 16.
 CARDIOCHLAENA Fée 467.
 „ *macrophylla* Fée 490.
 CARDIOMANES Presl 241.
 CASSEBEERA Kaulf. 393.
 „ *Bongardiana* Mett. 397.
 „ *gleichenioides* Gardn. 394.
 „ *paradoxa* Fée 407.
 „ *pedata* J. Smith 407.
 „ *petiolata* Fée 394.
 „ *pinnata* Kaulf. 394.
 „ *triphylia* Kaulf. 393.
 CASSIOPTERIS Karst. 146.
 CATHARINEA Ehrh. 47.
 „ *magellanica* Brid. 47.
 „ *Pseudopolytrichum* Raddi 47.
 CATHETOGYRATAE Bernh. 335.
 Cavallinha Lusit. 629.
 CEPHALOMANES Presl 241.
 CERATOPTERIDINEAE Moore 333.
 CERATOPTERIS Brongn. 333.
 „ *cornuta* Auct. 334.
 „ *Gaudichaudii* Auct. 334.
 „ *Lockharti* Auct. 334.
 „ *Parkeri* Auct. 334.
 „ *Richardi* Auct. 334.
 CERATOPTERIS *thalictroides* Brongn. 334.
 CEROPTERIS Link 548. 549. 555.
 „ *calomelanos* Link 556.
 „ *distans* Link 556.
 „ *tartarea* Link 556.
 CETEAECH Willd. 427.
 „ *aspidioides* Willd. 549.
 „ *lobatum* Presl 552.
 „ *polypodioides* Raddi 550.
 CHAETEPHORA Brid. 61.
 „ *incurva* Hornsch. 62.
 „ *Langsdorffii* Brid. 61.
 „ *orthotrichoides* Brid. 69.
 „ *pendula* Brid. 63.
 CHEILANTHES Swartz 385.
 „ *aculeata* Kaulf. 383.
 „ *amaurorachis* Kunze 503.
 „ *brachypus* Kunze 540.
 „ *Brasiliensis* Raddi 388.
 „ *canescens* Kunze 594.
 „ *chlorophylla* Swartz 388.
 „ *crenulata* Beyrich 387.
 „ *dealbata* Don 392.
 „ *dichotoma* Swartz 389.
 „ *dicksonioides* Endl. 503.
 „ *elongata* Willd. 390.
 „ *eriophora* Mett. 541.
 „ *farinosa* Kaulf. 392.
 „ *flexuosa* Hook. et Baker 391.
 „ *flexuosa* Kunze 391.
 „ *glandulosa* Swartz 389.
 „ *glandulosa* Fée 392. 554.
 „ *hostilis* Kunze 383.
 „ *incisa* Kunze 388.
 „ *Kirkii* Hook. 396 in obs.
 „ *lonchophora* Roem. 397.
 „ *Matthewsii* Kunze 390.
 „ *microphylla* Bong. 389. 391.
 „ *microphylla* Swartz 390.
 „ *micropteris* Swartz 390.
 „ *monticola* Gardn. 386.
 „ *Pohlmanni* Mett. 541.
 „ *polypodioides* Bl. 503.
 „ *pygmaea* Kl. 390.
 „ *radiata* R. Br. 387.
 „ *Regnelliana* Mett. 391.
 „ *regularis* Mett. 387.
 „ *repens* Kaulf. 383.
 „ *rigescens* Kunze 503.
 „ *Sellowiana* Presl 384. 553.
 „ *spectabilis* Kaulf. 388.
 „ *squamosa* Gill. 540.
 „ *Tweediana* Hook. 390.
 CHEILOLEPTON Fée 565.
 CHEILOPLECTON Fée 395.
 CHEIROGLOSSA Presl 143. 145.

- CHEIROGLOSSA palmata* Presl 146.
CHEIROPLEURIA Presl 565.
CHNOOPHORA Kaulf. 317. 318.
 „ *aculeata* Kaulf. 330.
CHRYSODIUM Fée 565. 567.
 „ *alienum* Mett. 589.
 „ *Cayennense* Fée 592.
 „ *danaeae-folium* Fée 592.
 „ *fraxinifolium* Fée 592.
 „ *hirsutum* Fée 592.
 „ *inaequale* Fée 592.
 „ *nicotianaefolium* Mett. 590.
 „ *sculpturatum* Fée 592.
 „ *serratifolium* Ettingsh. 590.
 „ *speciosum* Fée 592.
 „ *Urvillei* Fée 592.
 „ *vulgare* Fée 592.
CHRYSOPTERIS Link 495.
 „ *aurea* Link 528.
 „ *decumana* Fée 529.
 „ *dictyocallis* Fée 529.
 „ *glauca* Fée 528.
 „ *sporadocarpa* Link 528.
 „ *triloba* Fée 528.
CIBOTIUM Kaulf. 339.
CINCINALIS Desv. 539.
CNEMIDARIA Presl 310. 311.
 „ *Kohautiana* Presl 312.
 „ *speciosa* Presl 312.
CNEMIPTERIDES Wallr. 238.
COCHLIDIUM Kaulf. 546.
 „ *graminoides* Kaulf. 546.
Conambaia Bras. 305.
CONIOGRAMME Fée 548.
COPTOPHYLLUM Gardn. 185. 215.
 „ *bunifolium* Gardn. 216.
 „ *Millefolium* Gardn. 215.
COSCINODON Spreng. 8.
 „ *longirostris* Brid. 9.
CRASPEDARIA Link 495.
 „ *ciliata* Link 520.
 „ *Gestasiana* Fée 521.
 „ *lanceolata* Fée 520.
 „ *vacciniifolia* Link 520.
CREPIDOMANES Presl 241.
CRYPHAEA Web. 57.
Cryptotheca densa Hornsch. 51.
Ctenopteris nemoralis J. Smith 515.
CULCITA Presl 339.
CUSPIDARIA Fée 542. 544.
 „ *furcata* Fée 545.
 „ *subpinnatifida* Fée 545.
CYATHEA Smith 307.
 „ *aculeata* Willd. 331.
 „ *arborea* Smith 307. 308. 591.
 „ *armata* Spreng. 325.
 „ *aspera* Klotzsch 313.
CYATHEA aspera Swartz 325.
 „ *badia* Klotzsch 309.
 „ *Beyrichiana* Presl 315.
 „ *Bongardiana* Kunze 315.
 „ *Capensis* Smith 316.
 „ *compta* Mart. 324.
 „ *Delgadii* Pohl 309.
 „ *elegans* Howard 308.
 „ *ferox* Presl 330.
 „ *frondosa* Karst. 309.
 „ *Gardneri* Hook. 307.
 „ *gigantea* Pohl 309.
 „ *grandifolia* Willd. 312.
 „ *Grevilleana* Mart. 308.
 „ *Guadalupensis* Spreng. 325.
 „ *hirsuta* Presl 331.
 „ *hirtula* Mart. 309.
 „ *horrida* Sieb. 312.
 „ *incurvata* Kunze 307.
 „ *Lindeniana* Presl 309.
 „ *Mexicana* Schlecht. 309.
 „ *monosorata* Willd. 316.
 „ *monticola* Presl 332.
 „ *multiflora* Smith 313.
 „ *muricata* Sieb. 325.
 „ *oligocarpa* Kunze 309.
 „ *phalerata* Mart. 326.
 „ *polypodioides* Swartz 316.
 „ *riparia* Willd. 316.
 „ *Schanschin* Mart. 307. 309.
 „ *Sellowiana* Presl 329.
 „ *Sternbergii* Pohl 308.
 „ *superfusa* Kunze 307.
 „ *vestita* Mart. 307. 309.
 „ *villosa* H.B.K. 328.
CYATHEACEAE Kaulf. 305.
CYATHEAE Hook. 305.
CYATHEOIDEAE Vent. 305.
CYCLODIUM Presl 460.
 „ *abbreviatum* Presl 464.
 „ *confertum* Presl 465.
 „ *heterodon* Moore 465.
 „ *meniscioides* Presl 465.
CYCLOPELTIS J. Smith 460.
 „ *semicordata* J. Smith 461.
Cynontodium Trematodon Pal. Beauv. 9.
CYRTOMIUM Presl 460. 461.
Cyrtophlebium decurrens J. Smith 532.
 „ *Phyllitidis* J. Smith 531.
Cyrtopteris cultrata J. Smith 511.
 „ *semiadnata* J. Smith 512.
 „ *suspensa* J. Smith 514.
CYRTOPIUS Brid. 56.
CYSTODIUM J. Smith 359.
Cystopteris vestita Presl 339 in obs.
Daltonia disticha W. Arnott 56.
 „ *bipinnata* W. Arnott 57.
Daltonia scabriseta W. Arnott 60.
 „ *undulata* W. Arnott 56.
DANAEA Smith 147. 154.
 „ *alata* Klotzsch 159.
 „ *Augustii* Karst. et Kl. 159.
 „ *dubia* Presl 156.
 „ *elliptica* Herb. Berol. 156.
 „ *elliptica* Smith 158.
 „ *geniculata* Raddi 158.
 „ *Leprieurii* Kunze 160.
 „ *longifolia* Desv. 157.
 „ *Moritziana* Presl 159.
 „ *nodosa* Herb. Monac. 156.
 „ *Sellowiana* Presl 156.
 „ *simplicifolia* Rudge 155.
 „ *trifoliata* Reichenb. 155.
DANAEACEAE Agardh 147.
DAREA Juss. 427.
 „ *cicutaria* Smith 448.
 „ *fumarioides* Willd. 594.
DAVALLIA Smith 343.
 „ *alata* Heward 348.
 „ *bifida* Kaulf. 344. 346.
 „ *Brasiliensis* Hook. 348.
 „ *campyloptera* Kunze 345.
 „ *concinna* Schrad. 345.
 „ *distans* Kaulf. 348.
 „ *flaccida* R. Br. 349.
 „ *Jamaicensis* Hook. 349.
 „ *Imrayana* Hook. 344. 347.
 „ *inaequalis* Kunze 344. 348.
 „ *Lindeni* Hook. 345.
 „ *Madagascariensis* Kunze 349.
 „ *meifolia* H.B.K. 594.
 „ *mollis* Kunze 349.
 „ *nigrescens* Kunze 348 in obs.
 „ *Parkeri* Hook. 344.
 „ *Pohliana* Kunze 348.
 „ *polypodioides* Don 349.
 „ *Saccoloma* Spreng. 344. 347.
 „ *Schimperi* Hook. 345.
 „ *Speluncae* Baker 344. 349.
 „ *Sprucei* Baker 344. 346. 594.
 „ *subvolubilis* Kunze 349.
 „ *thecifera* H.B.K. 344. 345. 594.
 „ *trichosticha* Hook. 349.
DAVALLIEAE 337. 343.
DENNSTAEDTIA Bernh. 339. 341.
 „ *cicutaria* Moore 341.
 „ *rubiginosa* Moore 342.
DESMOBRYA J. Smith 305.
DICHASIMUM A. Br. 467.
DICHOREXIA Presl 317.
DICKSONIA L'Hérit. 339.
 „ *aculeata* Spr. 383.
 „ *anthriscifolia* Kaulf. in 234 obs.

- DICKSONIA *arborea* Karst. 340.
 " *aurita* Kunze 350.
 " *Burkeana* Moore 341.
 " *chaerophylla* Schrad. 350.
 " *cicutaria* Swartz 339. 341.
 " *coniifolia* Hook. 339. 340.
 " *cornuta* Kaulf. 341.
 " *dissecta* Sieb. 341.
 " *exaltata* Kunze 341.
 " *flaccida* Raddi 341.
 " *Hookeriana* Kunze 341.
 " *Karsteniana* Moore 340.
 " *Martiana* Klotzsch 341.
 " *Montevidensis* Spreng. 339.
 " *ordinata* Kaulf. 341.
 " *organica* Miers 340.
 " *polypodioides* Swartz 349.
 " *riparia* Feyrich 340.
 " *rubiginosa* Kaulf. 339. 342. 593.
 " *Sellowiana* Hook. 339. 340.
 " *siifolia* Kunze 341.
 " *tenera* Presl 341.
 " *umbrosa* Liebm. 342.
- DICKSONIEAE 337.
- DICLIDOPTERIS Brackenr. 546.
- DICOSTEGIA Presl 149.
- DICRANOGLOSSUM J. Smith 542.
 " *subpinnatifidum* Moore 545.
- DICRANOPHLEBIA Mart. 317. 325.
- DICRANOPTERIS Bernh. 219.
- DICRANUM Hedw. 10.
 " *albicans* Schwaegr. 10.
 " *ambiguum* Hedw. 10.
 " *aretocarpum* Hornsch. 12.
 " *Beyrichii* Hornsch. 11.
 " *capitiflorum* Pal. Beauv. 16.
 " *concolor* Hook. 11.
 " *cuspidatum* Hornsch. 13.
 " *falcifolium* Hook. 90.
 " *filifolium* Hornsch. 12.
 " *introflexum* Hedw. 16.
 " *juniperoideum* Brid. 10.
 " *longicollum* Brid. 9.
 " *Martianum* Hornsch. 11.
 " *parvulum* Hornsch. 14.
 " *penicillatum* Hornsch. 13.
 " *Sellowii* Hornsch. 14.
 " *subfalcatum* Hornsch. 13.
- DICTYOCLINE Moore 561.
- DICTYOPTERIS Presl 495.
- DIDYMOCHLAENA Desv. 459.
 " *dimidiata* Kunze 459.
 " *lunulata* Desv. 459.
 " *sinuosa* Desv. 459.
- Didymodon squarrosus* Hook. 17.
- DIDYMOGLOSSUM Desv. 241. 276.
 " *Hookeri* Presl 277.
 " *Krausii* Hook. et Grev. 280.
 " *muscoides* Presl 278.
 " *punctatum* Presl 276.
 " *pusillum* Desv. 278.
 " *quercifolium* Presl 280 sub n. 52. 53.
 " *reptans* Klotzsch 278.
 " *reptans* Presl 280.
 " *sphenoides* Presl 277.
- DIELLIA Brackenr. 349.
- DIGRAMMARIA Presl 427. 548.
- DIPLAZIUM Swartz 427. 430. 449.
 " *acuminatum* Raddi 450.
 " *ambiguum* Raddi 455.
 " *ambiguum* J. Smith 453.
 " *amplum* Liebm. 454.
 " *celtidifolium* Kunze 451.
 " *coarctatum* Link 453.
 " *crenatum* Liebm. 454.
 " *denticulosum* Gaudich. 453.
 " *elatum* Fée 452.
 " *expansum* Willd. 454.
 " *Haenkeanum* Presl 454.
 " *Hilsenbergianum* Presl 452.
 " *Lechleri* Moore 450.
 " *mutilum* Kunze 452.
 " *Ottonis* Klotzsch 452.
 " *plantagineum* Swartz 449.
 " *pubescens* Lowe 449.
 " *pulcherrimum* Raddi 459.
 " *radicans* Desv. 454.
 " *repens* Raddi 450.
 " *Riedelianum* Kunze 450.
 " *Shepherdii* Presl 453.
 " *subalatum* Heward 454.
 " *sylvaticum* Swartz 451.
- DIPLOSTACHYUM Pal. Beauv. 117.
- DIPTERIS Reinw. 495.
- DISPHENIA Presl 307.
 " *arborea* Presl 308.
- DISTAXIA Presl 419.
- DISTICHIA Brid. 55.
- DORYOPTERIS J. Smith 398. 399. 405.
 " *collina* J. Smith 407.
 " *euchlora* Kl. 407.
 " *lomariacea* Kl. 406.
 " *nobilis* Hort. 408 in obs.
 " *palmata* Lowe 407.
 " *palmata* J. Smith 408.
 " *pedata* J. Smith 407.
 " *sagittifolia* J. Smith 405.
- DREPANOPHYLLUM Rich. 90.
 " *fulvum* Hook. 90.
- DRYNARIA Bory 495.
- DRYNARIA *compacta* Fée 536.
 " *elongata* Fée 557.
 " *Prieurii* Fée 557.
 " *stenoloma* Fée 538.
 " *torulosa* Fée 538.
- Dryomenis plantagineum* J. Smith 466.
- Dryptodon fontinaloides* Brid. 49.
- EGENOLFIA Schott 565.
- ELAPHOGLOSSUM Schott 565. 567.
 " *acrocarpum* Moore 577.
 " *apodum* Schott 578.
 " *Aubertii* Moore 579.
 " *auricomum* Moore 582.
 " *conforme* Schott 567.
 " *decoratum* Moore 574.
 " *flaccidum* Moore 569.
 " *Gardnerianum* Moore 575.
 " *glabellum* J. Smith 571.
 " *Hermimieri* Moore 570.
 " *hybridum* Moore 572.
 " *intermedium* Brackenr. 575.
 " *laminarioides* Moore 581.
 " *lineare* Moore 579.
 " *Lingua* Brackenr. 568.
 " *Martinicense* Moore 571.
 " *melanostictum* Moore 584.
 " *Miersii* Heward 569.
 " *muscosum* Moore 581.
 " *ovatum* Moore 574.
 " *oxyphyllum* Moore 569.
 " *pachydermum* Moore 576.
 " *perelegans* Moore 582.
 " *scolopendrifolium* J. Smith 573.
 " *simplex* Hook. et Bauer 569.
 " *simplex* Schott 570.
 " *spathulatum* Moore 574.
 " *squamipes* Moore 600.
 " *squamosum* J. Smith 583.
 " *strictum* Moore 580.
 " *tectum* Moore 580.
 " *villosum* Moore et Houlst. 578.
 " *villosum* J. Smith 578.
 " *viscosum* Schott 576.
- ELLOBOCARPUS Kaulf. 333.
- ENCALYPTA Hedw. 20.
 " *crispata* Hedw. 20.
 " *squarrosa* Brid. 17.
- EQUISETACEAE Rich. 629.
- EQUISETUM Linn. 629. 634. 635.
 " *Bogotense* H.B.K. 637.

- EQUISETUM** *Brasiliense* Milde 639.
 „ *Caracasatum* DC. 639.
 „ *Chilense* Steud., Milde 640.
 „ *Chilense* Presl 637.
 „ *coronatum* Ruiz 638.
 „ *elongatum* Willd. 640.
 „ *flagelliferum* Kunze 637.
 „ *giganteum* C. Gay 640.
 „ *giganteum* Hook. 638.
 „ *giganteum* Linn. 639.
 „ *giganteum* Philippi 642.
 „ *Humboldtianum* Fendl. 639.
 „ *Humboldtii* Poir. 639.
 „ *Lechleri* Milde 638.
 „ *Martii* Milde 638.
 „ *multiforme* Vauch. 640.
 „ *Poeppigianum* A. Braun 639.
 „ *Poeppigianum* Mett. 638.
 „ *pratense* Hook. 637.
 „ *pyramidale* Goldm. 640.
 „ *Quitense* Fée 637.
 „ *ramosissimum* Desf. 640.
 „ *ramosissimum* Goldm. 642.
 „ *ramosissimum* Humb. Bonpl. 639.
 „ *ramosum* DC. 640.
 „ *scandens* Remy 640. 642.
 „ *stipulaceum* Vauch. 637.
 „ *Tussaci* Fée 639.
 „ *xylochaetum* Mett. 637.
ERIOCHOSMA J. Smith 640.
Euphoropteris Kiedelii Roem. 187.
EUPODIUM J. Smith 149.
 „ *Kaulfussii* J. Smith 153.
FABRONIA Raddi 49.
 „ *macroblepharis* Schwaegr. 49.
FEEA Bory 241.
 „ *nana* Bory 243.
 „ *polypodina* Bory 244.
 „ *spicata* Presl 244.
FILICES ANNULATAE Swartz 335.
 „ **DESCISCENTES** Spreng. 238.
 „ **GYRATAE** Swartz 238. 335.
 „ **SPURIE AGYRATAE** Swartz 147.
 „ **SPURIE GYRATAE S.** **RIMATAE** Swartz 161. 167. 217.
Filicula digitata Plum. 292.
 „ *pyxidifera* Plum. 270.
Filix major etc. Sloane 158.
FISSIDENS Hedw. 91.
 „ *fatcifolius* Brid. 90.
 „ *flabellatus* Hornsch. 91.
 „ *serrulatus* Brid. 91.
Fontinalis crispa Swartz 56.
Fontinalis disticha Swartz 56.
FUNARIA Hedw. 39.
 „ *calvescens* Schwaegr. 39.
 „ *Fontanesii* Schwaegr. 39.
 „ *hygrometrica* Hedw. 39.
FURCARIA Desv. 333.
 „ *cornuta* Desv. 334.
 „ *thalictroides* Desv. 334.
GEOGRAPHIA Cyatheacearum et Polypodiacearum 611.
 „ **Lycopodinearum** 133.
 „ **Muscorum** 97.
 „ **Ophioglossarum, Marattiacearum, Osmundacearum, Schizaeacearum, Gleicheniacearum et Hymenophyllearum** 301.
Glyphopteris decussata Presl 500.
GLEICHENEAE R. Br. 217.
GLEICHENIA Endl. 219.
 „ *Baneroftii* Hook. 220.
 „ *glaucescens* Hook. 229.
 „ *Hermannii* Hook. et Grev. 229.
 „ *Klotzschii* Hook. 233.
 „ *longipinnata* Hook. 222.
 „ *nervosa* Hook. 236.
 „ *pectinata* Presl 229.
 „ *pubescens* Hook. 224.
 „ *remota* Spreng. 223.
 „ *revoluta* H.B.K. 227.
 „ *rufinervis* Hook. 233.
GLEICHENIACEAE Blume 217.
GLYPHOMITRIUM Brid. 20.
GONIOPHLEBIUM Blume 495. 498.
 „ *acuminatum* Fée 524.
 „ *adnatum* Moore 525.
 „ *albo-punctatum* Moore 524.
 „ *angustifolium* Brack 529.
 „ *Catharinae* Fée 522.
 „ *Catharinae* J. Smith 523.
 „ *ciliatum* J. Smith 520.
 „ *elatius* Moore 524.
 „ *glaucophyllum* Fée 522.
 „ *glaucum* J. Smith 522.
 „ *harpeodes* J. Smith 523.
 „ *incanum* J. Smith 526.
 „ *intermedium* Fée 524.
 „ *laetum* J. Smith 523.
 „ *menisciifolium* Moore 524.
 „ *neriifolium* J. Smith 524.
 „ *pectinatum* J. Smith 523.
 „ *sepultum* J. Smith 527.
 „ *tectum* Moore 521.
GONIOPHLEBIUM vacciniifolium J. Smith 520.
 „ *vacillans* J. Smith 523.
GONIOPTERIS Presl 495. 497.
 „ *asymmetrica* Fée 488.
 „ *cheilocarpa* Fée 487.
 „ *crenata* Presl 505.
 „ *Guadalupensis* Fée 505.
 „ *hastata* Fée 505.
 „ *leptocladia* Fée 505.
 „ *pyramidata* Fée 505.
 „ *quadrangularis* Fée 505.
 „ *refracta* J. Smith 489.
 „ *Rivoirei* Fée 505.
 „ *rostrata* Fée 505.
 „ *subtetragona* Presl 505.
 „ *tetragona* Presl 505.
 „ *vivipora* Brackenr. 504.
Grammitis asplenioides Presl 549.
 „ *caespitosa* Blume 506.
 „ *elongata* Swartz 557.
 „ *furcata* Hook. et Grev. 507.
 „ *graminoides* Swartz 546.
 „ *lanceolata* Schkuhr 557.
 „ *limbata* Fée 506.
 „ *linearis* Bory 506.
 „ *linearis* Sw. 506.
 „ *Linkiana* Presl 550.
 „ *marginella* Sw. 506.
 „ *myosuroides* Sw. 508.
 „ *organensis* Gardn. 507.
 „ *polypodioides* Presl 550.
 „ *punctata* Raddi 547.
 „ *quaerenda* Bolle 506.
 „ *revoluta* Willd. 536.
 „ *seminula* Willd. 547.
 „ *serrulata* Sw. 508.
 „ *setosa* Presl 508.
 „ *severa* Presl 550.
 „ *tenuifolia* Beyrich 519.
GRIMMIA Ehrh. 7.
 „ *fontinoloides* Hook. 49.
 „ *julacea* Hornsch. 7.
GYMNOGRAMME Desv. 548.
 „ *acuminata* Kaulf. 552.
 „ *aspidioides* Kaulf. 549.
 „ *asplenioides* Swartz 549.
 „ *bidentata* Presl 556.
 „ *calomelanos* Kaulf. 556.
 „ *chaerophylla* Desv. 554.
 „ *dealbata* Link 556.
 „ *diphylla* Kl. 555.
 „ *diplazioides* Desv. 550.
 „ *elongata* Hook. 557.
 „ *extensa* Baker 599.
 „ *Guianensis* Kl. 557.
 „ *insignis* Mett. 555.

- GYMNOGRAMME** *Linkiana* Kunze 550.
 " *microcarpon* Fée 500.
 " *myriophylla* Swartz 554.
 " *ochracea* Presl 557.
 " *ornithopteris* Kl. 557.
 " *palmata* Link 561.
 " *polypodioides* Link 550.
 " *polypodioides* Spreng. 550.
 " *pumila* Spreng. 551.
 " *reniformis* Mart. 551.
 " *rufa* Desv. 552.
 " *rupestris* Kunze 550.
 " *Schomburgkiana* Kunze 553.
 " *Sellowiana* Mett. 553.
 " *spectabilis* Kl. 554.
 " *squamulosa* Splitg. 557.
 " *tartarea* Desv. 556.
 " *tomentosa* Desv. 552.
 " *trifoliata* Desv. 555.
GYMNOGRAMMITIDEAE 337. 539.
GYMNOGYNUM Pal. Beauv. 117.
GYMNOPTERIS Bernh. 565. 567.
 " *acuminata* Presl 590.
 " *aliena* Presl 589.
 " *dentata* Fée 589.
 " *nicotianaefolia* Presl 590.
 " *semipinnatifida* Fée 589.
GYMNOSPHAERA Blume 317.
GYMNOSTOMUM Hedw. 4.
 " *Jamesoni* Walk. Arn. 4.
 " *micaceum* Schldl. 5.
GYMNOTHECA Presl 149.
 " *cicutaeifolia* Presl 152.
 " *obtusidens* Presl 151.
 " *podolepis* de Vriese 151.
 " *polyodon* Presl 150.
 " *Raddiana* Presl 150.
 " *Verschaffeltiana* de Vriese 153.
HAPLODICTYUM Presl 467.
HAPLOPHLEBIA Mart. 317. 320.
HAPLOPTERIS Presl 542.
HECISTOPTERIS J. Smith 548.
 " *pumila* J. Smith 551.
HELICODONTIUM Schwaegr. 69.
 " *tenuirostre* Schwaegr. 70.
HELICOGYRATAE Bernh. 238. 305.
HELICOPHYLLUM Brid. 4.
 " *torquatum* Brid. 5.
HEMESTHEUM Newm. 467.
HEMICARDIUM Fée 460.
 " *macrosorum* Fée 461.
 " *Nephrolepis* Fée 461.
HEMIDICTYON Presl 427. 430. 456.
Hemidictyon marginatum Presl 456.
HEMIONITIS Linn. 561.
 " *asplenioides* Vell. 552.
 " *Brasiliana* Desv. 560.
 " *Cayennensis* Desv. 560.
 " *chaerophylla* Poir. 554.
 " *dealbata* Willd. 556.
 " *lancofolata* Linn. 559.
 " *lineata* Swartz 559.
 " *palmata* Linn. 561.
 " *parasitica* Linn. 560.
 " *pumila* Vell. 552.
 " *reticulata* Raddi 560.
 " *rufa* Swartz 552.
 " *spathulata* Presl 560.
 " *tomentosa* Raddi 552.
 " *trifoliata* H.B.K. 555.
HEMIPHLEBIUM Presl 241. 276.
 " *Hookeri* Presl 277.
 " *pusillum* Presl 278.
 " *reptans* Presl 280.
HEMISTEGIA Presl 310.
 " *ameristoneuron* Fée 312.
 " *grandifolia* Presl 312.
 " *Willdenowii* Fée 312.
HEMITELIA R. Br. 307. 310.
 " *apiculata* Hook. 310. 312.
 " *arborea* Fée 308.
 " *Beyrichiana* Presl 315.
 " *Boryana* Metten. 591.
 " *Capensis* R. Br. 311. 316. 592.
 " *Gardneriana* Presl 316.
 " *grandifolia* Spreng. 310. 311.
 " *Hostmanni* Hook. 314.
 " *Kegeii* Kunze 313.
 " *lingulata* Presl 313.
 " *macrocarpa* Presl 311. 314.
 " *Moricandiana* Kunze 314.
 " *multiflora* R. Br. 311. 313.
 " *obtusata* Kaulf. 312.
 " *Parkeri* Hook. 314.
 " *platylepis* Hook. 311. 316. 592.
 " *servitensis* Karst. 313.
 " *setosa* Metten. 311. 315.
 " *speciosa* Kaulf. 312.
 " *spectabilis* Kunze 312.
 " *subincisa* Kunze 310. 311.
 " *subincisa* Mett. 312.
 " *Surinamensis* Miq. 314.
 " *urolepis* Kunze 314.
HETERONEURON Fée 565.
 " *meniscioides* Fée 590.
 " *Raddianum* Fée 591.
 " *serratifolium* Fée 590.
HETEROPHLEBIUM Fée 398.
HEWARDIA J. Smith 359. 361. 380.
 " *adiantoides* J. Smith 381.
 " *dolosa* Fée 380.
 " *Leprieurii* Fée 382.
 " *serrata* Fée 380.
 " *Wilsoni* Fée 380.
HIPPOCHAETE Milde 634. 635.
HOFFMANNIA Willd. 132.
 " *aphylla* Willd. 133
HOLCOCHLAENA Baker 395. 397.
HOLOMITRIUM Brid. 17.
 " *crispulum* Mart. 17.
 " *Olfersianum* Hornsch 18.
HOMOPOTES Presl 241.
 " *heterophylla* Presl 245.
HOKERIA Smith 61.
 " *gigantea* Hornsch. 67.
 " *hypnoides* Hornsch. 66.
 " *incurva* Hook. et Grev. 61.
 " *Langsdorffii* Hook. 61.
 " *laricina* W. Arn. 94.
 " *leptorhyncha* Hook. et Grev. 68.
 " *Martiana* Hornsch. 63.
 " *Merkelii* Hornsch. 62.
 " *microcarpa* Hornsch. 62.
 " *nitens* Hornsch. 65.
 " *Olfersiana* Hornsch. 64.
 " *pallida* Hornsch. 64.
 " *pendula* Hook. 63.
 " *repens* Hook. et Grev. 68.
 " *Sellovii* Hornsch. 66.
 " *strumosa* Hornsch. 69.
 " *tomentosa* W. Arnott 92.
HUMATA Cav. 343.
 " *Inrayana* Moore 347.
HYDROGLOSSUM Willd. 169.
 " *expansum* Poir. 173.
 " *hastatum* Willd. 172.
 " *heptaphyllum* Schrad. 177.
 " *hirsutum* Willd. 172.
 " *volubile* Raddi 174.
 " *volubile* Willd. 177.
HYDROPOGON Brid. 49.
 " *fontinaloides* Brid. 49.
HYMENOXYSTIS C. A. Meyer 593.
HYMENODIUM Fée 565.
HYMENOGLOSSUM Presl 281.
HYMENOPHYLLACEAE Presl 238.
HYMENOPHYLLEAE Bory 238.
HYMENOPHYLLUM Smith 242. 281.
 " *abruptum* Spruce 283.
 " *allerum* Schott 283.
 " *amoenum* Klotzsch 291.
 " *asplenioides* Swartz 282.

- HYMENOPHYLLUM** *attenuatum* Hook. 285.
 " *axillare* Raddi 263.
 " *Beyrichianum* Kunze 293.
 " *Boryanum* Raddi 292.
 " *brevifrons* Kunze 283.
 " *caudiculatum* Mart. 286.
 " *chrysothrix* Sturm 298.
 " *ciliatum* Sw. 292.
 " *curvulum* Kunze 285.
 " *clavatum* Kaulf. 288.
 " *clavatum* Kunze 287.
 " *commutatum* Van den Bosch 292.
 " *crispum* H.B.K. 292 in nota.
 " *dichotomum* Beyrich 293.
 " *dilatatum* Spreng. 286.
 " *elegans* Spreng. 294.
 " *Fendlerianum* Sturm 291 in nota.
 " *fissilabre* Kunze 285.
 " *fucoides* Swartz 284.
 " *fumarioides* Kaulf. 289.
 " *Gardnerianum* Kunze 293.
 " *Gardnerianum* Sturm 297.
 " *Guadalupense* Spreng. 277.
 " *hirsutum* Raddi 296.
 " *hirsutum* Swartz 295.
 " *imbricatum* Kunze 287.
 " *lineare* Klotzsch 295. 296.
 " *lineare* Swartz 294 in obs.
 " *lineare* Van den Bosch 294.
 " *macrostomum* Kunze 286.
 " *Martii* J. W. Sturm 287.
 " *megachilum* Presl 285.
 " *Moritzianum* Sturm 295.
 " *Organense* Hook. 293.
 " *ornifolium* Reichenb. 292.
 " *palmatum* Klotzsch 283.
 " *Plumieri* Kunze 297.
 " *plumosum* Kaulf. 299.
 " *Pöppigianum* Klotzsch 290.
- HYMENOPHYLLUM** *polyanthos* Klotzsch 289.
 " *polyanthos* Swartz 288.
 " *prionema* Kunze 284.
 " *protrusum* Hook. 290.
 " *pusillum* Schott 289.
 " *Raddianum* C. Müll. 296.
 " *remotum* Van den Bosch 292.
 " *rupestre* Raddi 263.
 " *sanguinolentum* Beyrich 288.
 " *Schomburgkii* Presl 290.
 " *Schottii* Pohl 286.
 " *sericeum* Hook. 299.
 " *stenocarpum* Kunze 285.
 " *Surinamense* Van den Bosch 292.
 " *trifidum* Hook et Grev. 294.
 " *tunbridgense* β . Hook. 286.
 " *valvatum* Hooker et Grev. 293.
 " *venustum* Desv. 296.
- HYMENOSTACHYS** *Bory* 241. 244.
 " *diversifrons* Bory 245.
 " *elegans* Presl 245.
 " *osmundoides* Presl 244.
- HYMENOSTEGIA** *J. Smith* 310.
- HYMENOSTOMUM** *R. Br.* 5.
 " *subglobosum* Hornsch. 5.
- HYPNUM** *Dill.* 74.
 " *acrorrhizon* Hornsch. 75.
 " *acuminatum* Hornsch. 76.
 " *adpressum* Hornsch. 90.
 " *apiculatum* Hornsch. 87.
 " *apicarpum* W. Arn. 72.
 " *arcuatum* Hedw. 93.
 " *Auberti* Schwaegr. 79.
 " *Beyrichii* Hornsch. 81.
 " *brevisetum* Hornsch. 78.
 " *caespitosum* Sw. 71.
 " *chlorophyllum* Hornsch. 89.
 " *circinale* Hook. 87.
 " *cirrhatum* Brid. 25.
 " *cirrhosum* Swartz 25.
 " *cirrifolium* Schwaegr. 89.
 " *cyparissoides* Hornsch. 88.
 " *delicatulum* Linn. 84.
 " *densum* Sw. 56.
 " *elegantulum* Hook. 75.
 " *erectum* Dill. 80.
 " *filicinum* Dill. 83. 84.
 " *fragile* Brid. 86.
- HYPNUM** *fulgens* Sw. 91.
 " *gracillimum* Hornsch. 78.
 " *Guadeloupense* Brid. 68.
 " *Jamaicense* Gmel. 56.
 " *inconspicuum* Hornsch. 86.
 " *imbricatum* Pal. Beauv. 55.
 " *Langsdorffii* Hook. 80.
 " *laricinum* Hook. 94.
 " *lithophilum* Hornsch. 84.
 " *longissimum* Raddi 60.
 " *Loxense* Hook. 84.
 " *macrodontium* Hornsch. 82.
 " *macrorhynchum* Hornsch. 81.
 " *megapolitanum* Web. et Mohr 80.
 " *microcarpum* Hornsch. 84.
 " *microphyllum* Sw. 89.
 " *mucronatum* Pal. Beauv. 93.
 " *Olfersii* Hornsch. 83.
 " *ornithopodioides* Linn. 93.
 " *oxypoma* Schwaegr. 77.
 " *papillosum* Hornsch. 82.
 " *pendulum* Pal. Beauv. 55.
 " *pennatum ornithopodioides* Dill. 93.
 " *pentastichum* Brid. 55.
 " *pusillum* Hornsch. 85.
 " *Raddianum* Brid. 90.
 " *Sellowii* Hornsch. 79.
 " *splendidulum* Hornsch. 77.
 " *spiniforme* Linn. 80.
 " *Stereodon circinalis* Brid. 87.
 " " *fragilis* Brid. 86.
 " " *loxensis* Brid. 84.
 " " *microphyllum* Brid. 89.
 " " *tenuirostris* Brid. 89.
 " *tamariscinum* Hedw. 83.
 " *tenuirostre* Hook. 88.
 " *tomentosum* Sw. 93.
 " *torquatum* Hedw. 33.
 " *urceolatum* Hornsch. 87.
- HYPOCHLAMYS** *Fée* 427.
- HYPODEMATIUM** *Kunze* 467.
- HYPOLEPIS** *Bernh.* 382.
 " *chilensis* Fée 503.
 " *conifolia* Presl 388.
 " *Gardneri* Hook. 386.
 " *helenensis* Fée 503.
 " *hostilis* Presl 383.
 " *mitis* Kunze 595.
 " *nigrescens* Hook. 384.
 " *parallelogramma* Hook. 384.
 " *radiata* Hook. 387.
 " *repens* Presl 383. 595.
 " *Sellowiana* Kl. 384. 554.
 " *spectabilis* Link 388.
 " *trifida* Klotzsch 389.

- HYPOPELTIS* Rich. 460.
HYPOPTERYGIUM Brid. 94.
 " *laricinum* Brid. 94.
IPPIA Noronha 132.
 " *polyquestra* Noronha 133.
 ISOËTACEAE 645.
 ISOËTEAE 645.
 ISOËTES Linn. 645.
 " *Amazonica* A. Br. 648.
 " *Gardneriana* A. Br. 647.
 " *lacustris* Hook. 647, 648.
 " *Martii* A. Br. 646.
ISOLOMA J. Smith 349, 357.
 " *reniformis* J. Smith 357.
Isothecium pentastichum Brid. 55.
Jamesonia adnata Kunze 510.
JENKINSIA Hook. et Bauer 565.
Koelreuteria hygrometrica Hedw. 39.
Lastia orthotrichoides Raddi 24.
LASTREA Presl 467, 469.
 " *acuta* Kl. 484.
 " *amplissima* Moore 485.
 " *aspidioides* Moore 474.
 " *caduca* Presl 461.
 " *chrysoloba* Presl 471.
 " *contermina* Presl 477.
 " *Ctenitis* Moore 475.
 " *denticulata* Moore 482.
 " *falciculata* Presl 472.
 " *fallax* Hort. 485.
 " *Filix-mas* Presl 480.
 " *funesta* Moore 481.
 " *grossa* Presl 470.
 " *Kohautiana* Presl 470.
 " *Leibolciana* Presl 470.
 " *leptorachis* Liebm. 481.
 " *macroua* Presl 470.
 " *mexicana* Presl 481.
 " *monosora* Presl 476.
 " *mucronata* Presl 472.
 " *obscura* Moore 479.
 " *patens* Presl 470.
 " *patula* Moore 480.
 " *paupertina* Liebm. 481.
 " *protensa* Moore 481.
 " *Ptarmica* Moore 479.
 " *rotundata* Presl 499.
 " *scabriuscula* Presl 470.
 " *Sprengelii* Presl 478.
 " *squamosa* Kl. 471.
 " *subquinquefida* Presl 481.
 " *tenuifolia* Presl 474.
 " *tetragona* Presl 476.
 " *vestita* Moore 473.
 " *villosa* Presl 483.
LECANIUM Presl 241, 275.
 " *membranaceum* Presl 275.
Index.
- Leiotheca apiculata* Brid. 24.
 " *filiformis* Brid. 24.
 " *mucronifolia* Brid. 24.
 " *Swainsoni* Brid. 23.
LEPICHOSMA J. Smith 540.
LEPIDONEURON Fée 491.
LEPIDOPILUM Brid. 60.
 " *subenerve* Brid. 60.
LEPIDOTIS Pal. Beauv. 109.
 " *repens* Pal. Beauv. 115.
LEPTOCBILUS Kaulf. 565.
LEPTOCIONIUM Presl 281.
 " *attenuatum* Van den Bosch 285.
 " *fucoides* Presl 285.
LEPTOGRAMME J. Smith 548.
 " *aspidioides* Kl. 549.
 " *polypodioides* J. Smith 550.
LEPTOPLEURA Presl 339.
LESKIA Hedw. 70.
 " *adnata* Rich. 71.
 " *affinis* Hornsch. 71.
 " *ambigua* Schwaegr. 71.
 " *apophysata* Hornsch. 74.
 " *caespitosa* Hedw. 71.
 " *cirrifolia* Schwaegr. 73.
 " *cylindrica* Hornsch. 73.
 " *flexilis* Brid. 55.
 " *fulva* Hornsch. 73.
 " *microcarpa* Brid. 72.
 " *mollis* Hedw. 55.
 " *nitens* Brid. 79.
 " *ornithopodioides* Brid. 93.
 " *orthotrichoides* Raddi 24.
 " *patens* Hornsch. 72.
 " *pellucida* Hook. 52.
LEUCODON Schwaegr. 50.
 " *pallidus* Hook. 52.
 " *Pohlil Schwaegr.* 50.
LEUCOSTEGIA Presl 343.
LINDSAYA Dryand. 349.
 " *arcuata* Kunze 355.
 " *botrychioides* St-Hil. 352.
 " *Catharinae* Hook. 356.
 " *consanguinea* Fée 355.
 " *decomposita* Willd. 355.
 " *divaricata* Klotzsch 355.
 " *dubia* Spreng. 351.
 " *elegans* Hook. 353.
 " *falcata* Dryand. 355.
 " *falciformis* Hook. 351.
 " *filiformis* Hook. 354.
 " *Gardneri* Hook. 356.
 " *genkofolia* St-Hil. 556.
 " *gracilis* Klotzsch 353.
 " *gayanensis* Dryand. 354.
 " *horizontalis* Hook. 355.
LINDSAYA javitensis H.B.K. 353.
 " *Klotzschiana* Moritz 355.
 " *Kunzei* Moritz 355.
 " *laxa* Kunze 355.
 " *Leprieurii* Hook. 356.
 " *macrophylla* Kaulf. 358.
 " *macrophylla* Marc. 380.
 " *microphylla* Presl 353.
 " *montana* Fée 355.
 " *Moritziana* Klotzsch 354.
 " *nitidissima* Willd. 355.
 " *pallida* Klotzsch 355.
 " *pendula* Klotzsch 352.
 " *pumila* Klotzsch 354.
 " *pusilla* Splitg. 353.
 " *quadrangularis* Raddi 355.
 " *Raddiana* Klotzsch 353.
 " *reniformis* Dryand. 357.
 " *rigescens* Willd. 353.
 " *sagittata* Dryand. 357.
 " *Schomburgkii* Klotzsch 356.
 " *sectorifolia* Goldm. 355, 594.
 " *serrata* Goldm. 353.
 " *Sprucei* Hook. 346.
 " *stricta* Dryand. 353.
 " *tenera* Kaulf. 351.
 " *tenuis* Klotzsch 353.
 " *trapeziformis* Dryand. 355.
 " *virescens* Swartz 356.
LINDSAYEAE 337, 349.
LINDSAYNIUM Fée 349.
LITOBROCHIA Presl 398, 399, 408.
 " *Brasiliensis* Presl 410.
 " *chrysodioides* Fée 409.
 " *decurrens* Presl 411.
 " *denticulata* Presl 410.
 " *hederacea* Presl 408.
 " *intermedia* Presl 411.
 " *leptophylla* Presl 413.
 " *macroptera* J. Smith 411.
 " *papyracea* Fée 410.
 " *pedata* Presl 407.
 " *polita* J. Smith 412.
 " *Raddiana* Presl 407.
 " *sagittifolia* Presl 405.
 " *splendens* Presl 409.
 " *tristicula* Presl 410.
 " *varians* Presl 408.
LOMARIA Willd. 413.
 " *acuminata* Desv. 415.
 " *alpina* Spreng. 414.
 " *attenuata* Willd. 415.
 " *australis* Kunze 414.
 " *biserrata* Mert. et Lind. 596.
 " *Boryana* Willd. 418.
 " *Brasiliensis* Raddi 417.
 " *Bredemeyeriana* Kl. 424.

- LOMARIA** *campylotis* Kunze 425.
 " *capensis* Willd. 417.
 " *chilensis* Kaulf. 417.
 " *cinnamomea* Kaulf. 418.
 " *circinata* Bojer 415.
 " *danaeacea* Kunze 417.
 " *decrescens* Fée 415.
 " *divergens* Kunze 416.
 " *Gayana* Fée 414.
 " *gigantea* Kaulf. 415.
 " *Gilliesii* Hook. 417.
 " *hamata* Kaulf. 415.
 " *heterophylla* Desv. 415.
 " *lanceolata* Spreng. 416.
 " *L'Herminieri* Bory 416.
 " *lineata* Willd. 417.
 " *longifolia* Kaulf. 584.
 " *magellanica* Desv. 418.
 " *martinicensis* Spreng. 416.
 " *meridensis* Klotzsch 415.
 " *microphylla* Goldm. 414.
 " *Moritziana* Kl. 418.
 " *obtusata* Labill. 416.
 " *obtusifolia* Presl 418.
 " *ornifolia* Presl 417.
 " *palustris* Schrad. 417.
 " *pectinata* Liebm. 596.
 " *Penna-marina* Mett. 414.
 " *Plumieri* Desv. 416.
 " *polypodioides* Gaudich. 414.
 " *procera* Spreng. 417.
 " *pteropus* Kunze 415.
 " *Regnelliana* Kunze 417.
 " *rufa* Spreng. 418.
 " *Ryani* Kaulf. 418.
 " *Schiediana* Presl 417.
 " *Schomburgkii* Kl. 418.
 " *Sellowiana* Presl 414. 417.
 " *semicordata* Baker 596.
 " *sorbifolia* Kaulf. 584.
 " *striata* Willd. 417.
 " *tabularis* Mett. 418.
 " *volubilis* Hook. 428.
LOMARILIUM Presl 413.
 " *Plumieri* Presl 416.
 " *semicordatum* Presl 596.
LOMARIOBOTRYS Fée 565.
LOMARIOPSIS Fée 565. 566.
 " *elongata* Fée 584.
 " *erythrodes* Fée 584.
 " *palustris* Mett. 584.
 " *phlebodes* Fée 584.
 " *Prieuriana* Fée 584.
 " *Raddiana* Mett. 591.
 " *sorbifolia* Fée 584.
LONCHITIS Linn. 384.
 " *hastata* Bongard 397.
- LONCHITIS** *heterophylla* Beyrich 397.
 " *hirsuta* Bory 385.
 " *Lindeniana* Hook. 385.
 " *macrochlamys* Fée 385.
 " *pubescens* Willd. 385.
 " *repens* Linn. 383.
 " *tomentosa* Fée 385.
LOPHIDIUM Rich. 178.
 " *elegans* Presl 183.
 " *flabellum* Presl 183.
 " *latifolium* Rich. 183.
 " *pacificans* Presl 182.
 " *spectabile* Presl 182.
LOPHODIUM Newm 467.
Lopholepis ciliata J. Smith 520.
LOPHOSORIA Presl 317.
 " *affinis* Presl 332.
 " *discolor* Presl 332.
 " *polypodioides* Presl 332.
 " *pruinata* Presl 332.
 " *Warszewiczii* Klotzsch 332.
LOTZEA Klotzsch 427.
LOXOGRAMME Blume 548.
LOXOSCAPHE Moore 343. 345.
 " *concinna* Moore 345.
 " *Lundeni* Moore 345.
 " *Schimperi* Moore 345.
LYCOPODIACEAE Lindl. 105.
LYCOPODINEAE Swartz 105.
LYCOPODIODES Dill. 117.
LYCOPODIUM Linn. 109.
 " *acerosum* Sw. 111.
 " *affine* Bory 115.
 " *albidulum* Hook. et Grev. 119.
 " *alopencuroides* Linn. 114.
 " *apodum* Linn. 119.
 " *aristatum* Humb. Bonpl. 114.
 " *asperulum* Mart. 127.
 " *biforme* Hook. 113.
 " *brasiliense* Desv. 122.
 " *brasiliense* Raddi 119.
 " *carolinianum* Linn. 115.
 " *cernuum* Linn. 114.
 " *clavatum* Linn. 114.
 " *coarctatum* Mart. 126.
 " *complanatum* Linn. 116.
 " *comptonioides* Desv. 116.
 " *contextum* Mart. 115.
 " *convolutum* W. Arn. 132.
 " *crassinervium* Desv. 119.
 " *denudatum* Hook. et Grev. 122.
 " *dichotomum* Hook. et Grev. 110.
 " *didymostachyum* Desv. 122.
- LYCOPODIUM** *distortum* Mart. 128.
 " *ericetorum* Schrad. 115.
 " *erythropus* Mart. 126.
 " *filiforme* Swartz 112.
 " *fontinaloides* Spring 112.
 " *hygrometricum* Mart. 132.
 " *intermedium* Spring 111.
 " *jungermannii* Gaudich. 122.
 " *Jussieui* Desv. 116.
 " *laevigatum* Willd. 125.
 " *linifolium* Linn. 113.
 " *longipes* Hook. et Grev. 115.
 " *mandioccanum* Raddi 110.
 " *marginatum* Gaudich. 131.
 " *marginatum* Humb. Bonpl. 127.
 " *marginatum* Raddi 121.
 " *mollicomum* Mart. 113.
 " *mudum* Linn. 133.
 " *pallidum* Gaudich. 119.
 " *paradoxum* Mart. 116.
 " *potulum* Gaudich 119.
 " *puliferum* Raddi 114.
 " *pithyoides* Cham. et Schl. 110.
 " *plumosum* Schkuhr 121.
 " *pusillum* Desv. 119.
 " *quadrangulare* Spring 112.
 " *reflexum* Lam. 109.
 " *reflexum* Presl 111.
 " *repens* Sw. 115.
 " *reversum* Presl 109.
 " *revolutum* Hook. et Grev. 132.
 " *rigidum* Gmel. 109.
 " *rubrum* Cham. 111.
 " *rupestre* Linn. 118.
 " *setaceum* Lam. 111.
 " *squarrosum* Swartz 109.
 " *stellatum* Willd. 130.
 " *stoloniferum* Raddi 122.
 " *stoloniferum* Willd. et Auct. 130.
 " *sulcatum* Desv. 130.
 " *sulcatum* Hook. et Grev. 123.
 " *tenue* Humb. Bonpl. 112.
 " *trichophyllum* Desv. 114.
 " *thyoides* Humb. et Bonpl. 116.
 " *verticillatum* Sw. 111.
 " *Willdenowii* Desv. 125.
LYGODIACEAE Presl 167.
LYGODIUM J. Smith 169.
LYGODIUM Swartz 169.
 " *acuminatum* J. W. Sturm 174.
 " *expansum* Desv. 173.
 " *hastatum* Desv. 176.

- LYGODIUM** *hastatum* Hb. Berol. 175. 176.
 „ *hirtum* Kaulf. 175.
 „ *hirtum* β . *lucens* Presl 178.
 „ *lucens* Kaulf. 174.
 „ *micans* J. W. Sturm 178.
 „ *mucronulatum* J. W. Sturm 171.
 „ *palmatilobum* J. W. Sturm 170.
 „ *Pohlianum* Presl 172.
 „ *polymorphum* Herb. Berol. 171.
 „ *polymorphum* H. B. K. 172.
 „ *polymorphum* Weigelt 177.
 „ *potentilloides* Pohl 172.
 „ *puberulum* J. W. Sturm 176.
 „ *scandens* Schkuhr 177.
 „ *varium* Link 177.
 „ *venustum* Herb. Vindob. 175.
 „ *venustum* Swartz 170. 171.
 „ *volubile* Herb. Berol. 178.
 „ *volubile* Sw. 173. 177.
- MACROMITRIUM** Brid 20.
 „ *apiculatum* Brid. 24.
 „ *cirrhosum* Brid. 25.
 „ *didymodon* Schwaegr. 22.
 „ *filiforme* Schwaegr. 24.
 „ *simbriatum* Schwaegr. 22.
 „ *longirostre* Schwaegr. 23.
 „ *macrostomum* Schwaegr. 24.
 „ *microstomum* Hornsch. 21.
 „ *mucronifolium* Hornsch. 24.
 „ *punctatum* Raddi 27.
 „ *quinquefarium* Hornsch. 26.
 „ *stellulatum* Brid. 27.
 „ *sulcatum* Brid. 27.
 „ *Swainsoni* Brid. 23.
 „ *tomentosum* Hornsch. 21.
 „ *uncinatum* Brid. 22.
 „ *viticulosum* Brid. 25.
 „ *xanthocarpum* Hornsch. 26.
- MACROTHECIUM** Brid. 38.
MARATTIA Smith 147. 149.
 „ *alata* Raddi 153.
 „ *cicutaeifolia* Kaulf. 152.
 „ *cicutaeifolia* Mart. 150. 151.
 „ *excelsa* Beyrich 152.
 „ *excelsa* Herb. Berol. 153.
 „ *fraxinea* Raddi 150.
 „ *Kaulfussii* J. Smith 153.
 „ *laevis* Kaulf. 153.
 „ *obtusidens* Presl 151.
 „ *podolepis* De Vriese 151.
 „ *polyodon* Presl 150.
 „ *Raddi* Desv. 150.
- MARATTIA** *Raddiana* Schott 150.
 „ *Verschaffeltiana* de Vriese 153.
MARATTIACEAE Kaulf. 147.
MARGINARIA Presl 495.
 „ *angustifolia* Presl 529.
 „ *auriseta* Presl 521.
 „ *Catharinae* Presl 522.
 „ *gladiata* Presl 524.
 „ *Haenkeana* Presl 520.
 „ *harpeodes* Presl 523.
 „ *incana* Presl 526.
 „ *Karwinskiana* Presl 519.
 „ *laeta* Presl 523.
 „ *latipes* Presl 523.
 „ *neriifolia* Presl 524.
 „ *oleandriifolia* Presl 524.
 „ *rheifolia* Presl 524.
 „ *rufula* Presl 527.
 „ *serpens* Presl 521.
 „ *vacciniifolia* Presl 520.
- MARSILIA** Linn. 649.
 „ *Brasiliensis* Mart. 651.
 „ *deflexa* A. Br. 652.
 „ *natans* Vell. 656.
 „ *picata* Fée 651.
 „ *polycarpa* Hook. et Grev. 650.
 „ *quadriifolia* Kunze 651.
 „ *striata* Mett. 652.
- MARSILIACEAE** 649.
Mecosorus elongatus Kl. 557.
 „ *marginellus* Kl. 506.
 „ *nudus* Klotzsch 506.
 „ *persicariaefolius* Klotzsch 535.
 „ *Schomburgkii* Klotzsch 534.
- MEGALANGIUM** Brid. 38.
 „ *Kunthii* Brid. 38.
- MENISCIUM** Schreb. 561.
 „ *angustifolium* Willd. 562.
 „ *arborescens* Willd. 564.
 „ *dentatum* Presl 563.
 „ *falcatum* Liebm. 564.
 „ *giganteum* Mett. 564 in obs.
 „ *guyanense* Fée 564.
 „ *Jürgensii* Fée 563.
 „ *Kapplerianum* Fée 564.
 „ *longifolium* Kl. 564.
 „ *macrophyllum* Kunze 564.
 „ *palustre* Raddi 563.
 „ *repandum* Pohl 564.
 „ *reticulatum* Swartz 563.
 „ *rostratum* Fée 563.
 „ *Solzmanni* Fée 564.
 „ *serratum* Cav. 563.
 „ *sessilifolium* Pohl 564.
 „ *sorbifolium* Willd. 564.
- MERINGIUM** Presl 241.
- MERTENSIA** Willd. 219.
 „ *angusta* Klotzsch 225.
 „ *Bancroftii* Hook. 220.
 „ *Beyrichiana* J. W. Sturm 236.
 „ *bifida* Willd. 227.
 „ *Brasiliana* Desv. 229.
 „ *canescens* Kaulf. 229.
 „ *cinnamomea* Beyrich 234.
 „ *decurrens* Raddi 228.
 „ *discolor* Schrad. 232.
 „ *emarginata* Raddi 229.
 „ *ferruginea* Desv. 228. 235.
 „ *flexuosa* Schrad. 230.
 „ *fureata* Hb. Berol. 222.
 „ *glaucescens* Hb. Berol. 222.
 „ *glaucescens* Humb. Bonpl. 229.
 „ *gracilis* Mart. 228.
 „ *Hermanni* Herb. Zucc. 231.
 „ *immersa* Kaulf. 228.
 „ *longipinnata* Hook. 221.
 „ *neglecta* J. W. Sturm 235.
 „ *nervosa* Kaulf. 235. 236 sub n. 24 et 25.
 „ *nigro paleacea* J. W. Sturm 222.
 „ *pectinata* Willd. 229.
 „ *pennigera* Mart. 225.
 „ *pruinosa* Mart. 226.
 „ *pubescens* Humb. Bonpl. 224.
 „ *pumila* Mart. 231.
 „ *remota* Kaulf. 223.
 „ *revoluta* Hook. 226.
 „ *revoluta* Kunth 227.
 „ *rigida* Kunze 231.
 „ *rufinervis* Klotzsch 233.
 „ *rufinervis* Mart. 232.
 „ *Schomburgkiana* J. W. Sturm 233.
 „ *seminuda* Klotzsch 234.
 „ *subflabellata* Brackenr. 227.
 „ *tomentosa* Swartz 223.
 „ *velata* Kunze 221.
- MESODMEAE** Blume 147.
MESOSORUS Hassk. 219.
MESOTHEMA Presl 419.
 „ *auriculatum* Presl 420.
 „ *australe* Presl 420.
 „ *hastatum* Presl 420.
 „ *plantagineum* Hook. 421.
 „ *remotum* Presl 420.
 „ *rigidum* Presl 420.
 „ *trilobum* Presl 420.
- METAXYA** Presl 317.
 „ *argentea* Leprieur 314.
 „ *rostrata* Presl 318.
- METEORIUM** Brid. 58.
MICROLEPIA Presl 343.

- MICROLEPIA aspidioides* Presl 350.
 „ *brasiliensis* Presl 348.
 „ *Galeottii* Fée 348.
 „ *inaequalis* Presl 348.
 „ *Lindeni* Mett. 345.
 „ *nigricans* Presl 348 in obs.
 „ *oedematosa* Fée 341.
 „ *Pohlana* Ettingsh. 348.
 „ *polypodioides* Presl 349.
 „ *Schimperii* Mett. 345.
 „ *Spéuncae* Moore 349.
MICROGONIUM Presl 241. 251.
 „ *Hookeri* Presl 251.
Microgramma persicariaefolia Presl 535.
MICROPODIUM Mett. 457.
MICROPTERIS Desv. 546.
 „ *blechnoides* Desv. 547.
 „ *orientalis* Desv. 508.
 „ *serrulata* Desv. 508.
MICROSORIUM Link 495.
MICROSTEGNUS Presl 310.
MIELICHHOFFERIA Hornsch. 8.
 „ *brevicaulis* Hornsch. 8.
MNIUM Schwaegr. 44.
 „ *Auberti* Schwaegr. 45.
 „ *Beyrichianum* Hornsch. 45.
 „ *hygrometricum* Linn. 39.
 „ *lanatum* Pal. Beauv. 43.
 „ *longirostrum* Brid. 46.
 „ *polytrichoïdes* Linn. 47.
 „ *rigidum* Hornsch. 46.
 „ *rostratum* Schwaegr. 46.
 „ *sphaericarpon* Hedw. 42.
Mohria buniifolia J. Smith 213.
 „ *Millefolium* J. Smith 215.
MONOCHLAENA Gaud. 459.
MONOGONIA Presl 398.
MONOGRAMME Comm. 546.
 „ *furcata* Desv. 546.
 „ *graminifolia* Hook. 547.
 „ *graminoides* Baker 546.
 „ *immersa* Hook. 547.
 „ *linearifolia* Desv. 547.
 „ *seminuda* Baker 547.
MUSCI Hedw. 1.
MYRIOPTERIS Fée 385.
NECKERA Hedw. 53.
 „ *amentacea* Hornsch. 53.
 „ *Beyrichii* Schwaegr. 54.
 „ *bipinnata* Schwaegr. 57.
 „ *capillacea* Hornsch. 58.
 „ *cirrhusa* Swartz 25.
 „ *crassa* Hornsch. 56.
 „ *disticha* Hedw. 56.
 „ *Distichia retusa* Brid. 56.
 „ *Domingensis* Spreng. 58.
 „ *imbricata* Schwaegr. 55.
NECKERA incurvata Hornsch. 53.
 „ *julacea* Schwaegr. 53.
 „ *obliquifolia* Hornsch. 56.
 „ *patula* Schwaegr. 58.
 „ *scabriseta* Schwaegr. 60.
 „ *straminea* Hornsch. 54.
 „ *torta* Swartz 33.
 „ *undulata* Hedw. 55.
 „ *viticuloides* Pal. Beauv. 17.
NEOTTOPTERIS J. Smith 427.
NEPHRODIUM Rich. 467.
 „ *abbreviatum* Fée 464.
 „ *acutum* Hook. 484.
 „ *alsophilaceum* Baker 474.
 „ *amplissimum* Hook. 485.
 „ *Caripense* Hook. 472.
 „ *chrysolobum* Fée 471.
 „ *connexum* Kuhn 489.
 „ *consersum* Schrad. 470.
 „ *conterminum* Desv. 476.
 „ *Ctenitis* Baker 475.
 „ *denticulatum* Hook. 482.
 „ *dissimile* Schrad. 470.
 „ *diversilobum* Presl 488.
 „ *effusum* Baker 485.
 „ *excultum* Hook. 486.
 „ *falciculatum* Desv. 472.
 „ *Filix-mas* Rich. 480.
 „ *Fischeri* Baker 479.
 „ *flexuosum* Baker 483.
 „ *funestum* Hook. 481.
 „ *Gardnerianum* Baker 474.
 „ *Hilsenbergii* Presl 488.
 „ *Inrayanum* Hook. 499.
 „ *invisum* Desv. 470.
 „ *Jamesoni* Hook. 489.
 „ *Leprieurii* Hook. 470.
 „ *macrophyllum* Baker 490.
 „ *macrostegium* Hook. 486.
 „ *mexicanum* Hook. 481.
 „ *microcarpum* Presl 487.
 „ *molle* R. Br. 488.
 „ *nitidulum* Baker 597.
 „ *oligocarpum* Hook. 477.
 „ *paludosum* Liebm. 487.
 „ *palustre* Baker 478.
 „ *panamense* Presl 477.
 „ *paraense* Presl 492.
 „ *parasiticum* Desv. 488.
 „ *patens* Desv. 469.
 „ *patens* J. Smith 488.
 „ *patulum* Baker 480.
 „ *Pohljanum* Presl 487.
 „ *polyphyllum* Presl 462.
 „ *propinquum* R. Br. 487.
 „ *protensum* Baker 481.
 „ *Ptarmica* Baker 479.
NEPHRODIUM Radhianum Hook. 473.
 „ *Radhii* Desv. 470.
 „ *ramentaceum* Baker 473.
 „ *refractum* Hook. 489.
 „ *resiniferum* Presl 487.
 „ *rotundatum* Desv. 499.
 „ *rufescens* Splitg. 494.
 „ *Sancti-Gabrielii* Baker 469.
 „ *Schaffnerii* Fée 487.
 „ *schizolis* Hook. 470.
 „ *Sprengelii* Hook. 478.
 „ *subcuneatum* Baker 487.
 „ *subfuscum* Baker 471.
 „ *subobliquatum* Baker 469.
 „ *subquinquefidum* Hook. 481.
 „ *stipulare* Desv. 470.
 „ *tarapotense* Hook. 472.
 „ *tetragonum* Hook. 475.
 „ *trichophorum* Baker 479.
 „ *triste* Hook. 476.
 „ *tuberosum* Bory 492.
 „ *unitum* R. Br. 486.
 „ *vestitum* Baker 473.
 „ *villosum* Presl 483.
 „ *Vogelii* Hook. 482.
NEPHROLEPIS Schott 491.
 „ *acuminata* Presl 493.
 „ *acuta* Presl 493.
 „ *biserrata* Presl 493.
 „ *cordifolia* Presl 491.
 „ *exaltata* Schott 492.
 „ *falciformis* J. Smith 492.
 „ *gibbosa* Presl 493.
 „ *hirsutula* Presl 493.
 „ *imbricata* Presl 492.
 „ *intramarginalis* Kunze 492.
 „ *neglecta* Kunze 492.
 „ *occidentalis* Kunze 492.
 „ *pectinata* Schott 492.
 „ *pendula* Fée 492.
 „ *pilosa* Presl 493.
 „ *platyotis* Kunze 493.
 „ *punctulata* Presl 493.
 „ *rufescens* Wawra 493.
 „ *sesquipetalis* Presl 493.
 „ *Sieberi* Presl 493.
 „ *splendens* Presl 493.
 „ *subcordata* Presl 493.
 „ *tuberosa* Presl 491.
 „ *valida* Kunze 492.
 „ *Zollingeriana* De Vriese 493.
NEUROCALLIS Fée 565.
 „ *scandens* Moore 591.
NEURODIUM Fée 542.
 „ *lanceolatum* Fée 545.
NEUROGRAMME Link 548.

- NEUROGRAMME rufa* Link 552.
 „ *tomentosa* Link 552.
NEURONIA Don 493.
NEUROPHYLLUM Presl 241. 246.
 „ *abruptum* Fée 250.
 „ *Hostmannianum* Kl. 250.
 „ *pennatum* Presl 248.
 „ *pinnatum* Klotzsch 249.
 „ *pinnatum* Presl 247.
 „ *Vittaria* Presl 246.
Neuropteris elegans Desv. 347.
NIPHOBOLUS Kaulf. 495.
NOTHOCHLAENA V. *NOTHOLAENA* R. Br. 539.
 „ *eriphora* Fée 541.
 „ *Gilliesii* Fée 540.
 „ *palmatifida* Kunze 541.
 „ *peruviana* Desv. 540.
 „ *Pohlana* Kunze 541.
 „ *scariosa* Baker 540.
 „ *squamata* Moore 540.
 „ *squamosa* Fée 540.
NOTOPHORIA Presl 310.
OCTOBLEPHARUM Hedw. 5.
 „ *albidum* Hedw. 6.
ODONTOLOMA J. Smith 343. 344.
 „ *bifidum* Mett. 346.
 „ *Parkeri* Presl 344.
ODONTOMANES Presl 241. 250.
 „ *Hostmannianum* Presl 250.
ODONTOSORIA Fée 343.
OLEANDRA Cav. 493.
 „ *bantamensis* Kunze 494.
 „ *hirta* Brackenr. 495.
 „ *hirtella* Miq. 494.
 „ *lomatosus* Kunze 494.
 „ *micans* Kunze 496.
 „ *micrantha* Kunze 494.
 „ *mollis* Presl 494.
 „ *neriifolia* Presl 494.
 „ *neriiformis* Cav. 494.
 „ *nodosa* Presl 495.
 „ *phyllanthron* Kunze 494.
 „ *pilosa* Hook. 494.
 „ *tomentosa* Leprieur 494.
 „ *trujillensis* Karst. 494.
OLFERSIA Raddi 565. 566.
 „ *acrocarpa* Presl 577.
 „ *apoda* Presl 578.
 „ *auricoma* Presl 582.
 „ *caudata* Kunze 585.
 „ *cervina* Kunze 587.
 „ *corcovadensis* Raddi 588.
 „ *decorata* Presl 574.
 „ *hybrida* Presl 572.
 „ *Lingua* Presl 568.
OLFERSIA muscosa Presl 581.
 „ *nigrescens* Kl. 570.
 „ *peltata* Presl 587.
 „ *scolopendrifolia* Presl 573.
 „ *sorbifolia* Presl 584.
 „ *spathulata* Presl 574.
 „ *stricta* Presl 580.
 „ *tecta* Presl 580.
 „ *villosa* Presl 578.
Omalia ornithopodioides Brid. 93.
Onoclea attenuata Swartz 415.
 „ *capensis* Thunb. 417.
 „ *sorbifolia* Swartz 584.
Onychium brasiliense Kunze 397.
OCHLAMYS Fée 467.
 „ *Berteroanum* Fée 478.
 „ *Rivoirei* Fée 477.
OPHIODERMA Blume 143.
OPHIOGLOSSACEAE Lindl. 141.
OPHIOGLOSSAEAE R. Br. 141.
OPHIOGLOSSUM Linn. 143.
 „ *capense* Schldl. 144.
 „ *cordifolium* Roxb. 144.
 „ *ellipticum* Hook. et Grev. 144.
 „ *flavicaule* Klotzsch 144.
 „ *lusitanicum* Thunb. 144.
 „ *macrorhizum* Kunze 145.
 „ *nudicaule* Linn. fl. 144.
 „ *ovatum* Bory 144.
 „ *palmatum* Plum. 145.
 „ *pusillum* Leprieur 145.
 „ *reticulatum* Linn. 143.
 „ *sarcophyllum* Desv. 144.
 „ *scandens* Vell. 177.
 „ *surinamense* Reichb. 144.
 „ *ypanemense* Mart. 144.
OPHIOPTERIS Reinw. 493.
 „ *verticillata* Reinw. 494.
OREAS Brid. 8.
ORNITHOPTERIS Agardh 399. 403.
 „ Bernh. 185.
 „ *adiantifolia* Bernh. 200.
ORTHODONTIUM Schwaegr. 35.
 „ *julaceum* Schwaegr. 36.
ORTHOGRAMMA Presl 413.
ORTHOTRICHUM Hook. 20.
 „ *apiculatum* Hook. 24.
 „ *cirrhosum* Hook. et Grev. 25.
 „ *crispatum* Hook. et Grev. 20.
 „ *filiforme* Hook. et Grev. 24.
 „ *fimbriatum* Pal. Beauv. 22.
 „ *Jamesoni* W. Arn. 30.
 „ *laeve* Pal. Beauv. 33.
ORTHOTRICHUM longirostre Hook. 23.
 „ *mucronifolium* Hook. et Grev. 24.
 „ *punctatum* Hook. et Grev. 28.
 „ *rugifolium* Hook. 30.
 „ *stellulatum* Hook. et Grev. 27.
 „ *sulcatum* Hook. et Grev. 27.
 „ *Swainsoni* Hook. 23.
 „ *tortum* Hook. et Grev. 33.
OSMUNDA Linn. 163.
 „ *adiantifolia* Linn. 200.
 „ *asplenifolia* Lam. 200.
 „ *Boryana* Swartz 418.
 „ *capensis* Linn. 417.
 „ *cervina* Linn. 587.
 „ *cinnamomea* Linn. 163.
 „ *filiformis* Lam. 213.
 „ *fulva* Cavan. 201.
 „ *gracilis* Link 164.
 „ *hirsuta* Linn. 207.
 „ *humilis* Cavan. 212.
 „ *imbricata* Kunze 164.
 „ *oblongifolia* Cavan. 211.
 „ *palustris* Schrad. 165.
 „ *Phyllitidis* Linn. 190.
 „ *pilosa* Wall. 164.
 „ *procera* Forst. 417.
 „ *regalis* Linn. subsp. *palustris* Schrad. 165.
 „ *scandens* Aublet 177.
 „ *spectabilis* Presl 166.
 „ *tenella* Cav. 208.
 „ *tomentosa* Lam. 204.
OSMUNDACEAE Mart. 161.
OXYGONIUM Presl 427.
PACHYPLEURIA Presl 343.
PAESIA St-Hil. 398.
 „ *viscosa* St-Hil. 404.
PALTONIUM Presl 542.
 „ *lanceolatum* Presl 545.
PARABLECHNUM Presl 413.
PARESTIA Presl 343.
PARKERIEAE Lindl. 333.
PARKERIA Hook. 333.
 „ *Lockharti* Hook. et Grev. 334.
 „ *pteridoides* Hook. et Grev. 334.
PARKERIEAE Hook. et Grev.,
PARKERIEAE Endl. 333.
PATANIA Presl 339.
PELLAEA Link 395.
 „ *Bongardiana* Baker 397.
 „ *columbina* Hook. 396.
 „ *concolor* Baker 396.
 „ *geraniaefolia* Fée 396.

- PELLAEA Glaziovii Baker 595.
 " lomariacea Hook. 406.
 " lomariacea β . columbina Hook. 396.
 " lonchophora Baker 397.
 " pedata Kunze 396.
 Peltoclaena nephrodioides Fée 464.
 PEROMNION Schwaegr. 37.
 " radiculosum Schwaegr. 37.
 PHANEROPHLEBIA Presl 460.
 PHEGOPTERIS Fée 495. 496. 499.
 " angustifolia Mett. 562.
 " aspidioides Mett. 549.
 " Blanchetiana Kunze 484.
 " canescens Mett. 484.
 " caudata Fée 501.
 " cochleata Mett. 462.
 " connexa Fée 502.
 " crenata Mett. 505.
 " decussata Mett. 500.
 " dilatata Fée 484.
 " diplazioides Mett. 550.
 " divergens Fée 485.
 " Duchassaingianu Fée 550.
 " effusa Fée 485.
 " flavo-punctata Fée 499.
 " formosum Fée 502.
 " graminicum Spreng. 500.
 " lasiernos Mett. 503.
 " Linkiana Mett. 550.
 " macropterum Fée 502.
 " megalodus Mett. 505.
 " platyphylla Mett. 463.
 " polypodioides Mett. 550.
 " polystichiformis Fée 463.
 " polystichops Wawra 463.
 " Prionitis Kunze 499.
 " prolifera Mett. 504.
 " pteroides Mett. 501.
 " punctata Mett. 503.
 " pycnolepis Mett. 462.
 " refulgens Mett. 500.
 " rigida Mett. 462.
 " rupestris Mett. 550.
 " serrata Mett. 563.
 " spectabilis Fée 484.
 " splendida Mett., Fée 502.
 " subincisa Fée 484.
 " tetragona Mett. 505.
 " Tjuccana Fée 500.
 Philonotis sphaerocarpa Brid. 42.
 " uncinata Brid. 41.
 PHEBIGONIUM Fée 467.
 PHEBODIUM R. Br. 495. 498.
 " arcولاتum J. Smith 528.
 " aureum J. Smith 528.
 " decumanum J. Smith 529.
 PHEBODIUM percussum J. Smith 536.
 " venosum Moore et Houlst. 534.
 PHOTINOPTERIS J. Smith 565.
 PHYLOGONIUM Brid. 90.
 " fulgens Brid. 90.
 " viride Brid. 91.
 PHYMATODES Presl 495. 498.
 " crassifolia Presl 537.
 " plantagineum Presl 466.
 " Schomburgkianus J. Smith 534.
 PHYSAPTERIS Presl 385. 386.
 PHYSEMATIUM Kaulf. 593.
 " molle Kunze 593.
 PILOTRICHUM Pal. Beauv. 57.
 " ambiguum Hornsch. 59.
 " auro-nitens Hornsch. 59.
 " bipinnatum Brid. 57.
 " capillaceum Hornsch. 58.
 " cirrifolium Hornsch. 60.
 " distichum Pal. Beauv. 56.
 " flagelliferum Brid. 58.
 " imbricatum Brid. 55.
 " obtusifolium Brid. 60.
 " potulum Brid. 58.
 " piniforme Brid. 57.
 " recurvifolium Hornsch. 58.
 " remotifolium Hornsch. 59.
 " scabrisetum Brid. 60.
 " undulatum Pal. Beauv. 56.
 PINONIA Gaud. 339.
 PLAGIOGYRIA Metten. 413.
 " Kunze 596.
 " biserrata Mett. 596.
 PLANANTHUS Pal. Beauv. 109.
 " angustifolius Pal. Beauv. 111.
 PLATYLOMA J. Smith 395.
 PLECOSORUS Fée 385.
 PLEOCNEMIA Presl 467.
 PLEOPELTIS Humb. Bonpl. 495. 498.
 " angusta H.B.K. 538.
 " aurea Presl 528.
 " decumana Presl 529.
 " elegans Wall. 526.
 " Helenae Presl 536.
 " Kaulfussiana Presl 536.
 " lanceolata Kaulf. 536.
 " Leprieurii Moore 534.
 " linearis Kaulf. 536.
 " lycopodioides Presl 533.
 " macrocarpa Kaulf. 536.
 " macrophylla Klotzsch 538.
 " percussa Presl 536.
 " Raddiana Gaud. 538.
 " salicifolia Presl 533.
 PLEOPELTIS squamulosa Presl 534.
 " surinamensis Presl 533.
 PLEURIDIUM Fée 495.
 " albo-punctatissimum J. Smith 537.
 " crassifolium Fée 537.
 PLEUROGRAMME Blume 546.
 " graminifolia Fée 547.
 " graminoides Fée 546.
 " immersa Fée 547.
 " linearis Fée 547.
 " pumila Fée 547.
 PLEUROMANES Presl 241.
 PLEUROSORUS Fée 548.
 PODOPELTIS Fée 460.
 POECILOPTERIS Presl 565.
 " fraginifolia Presl 590.
 POGONATUM Brid. 47.
 " brevicaulis Pal. Beauv. 47.
 " magellanicum Pal. Beauv. 47.
 " semiangulatum Brid. 48.
 POHLIA Hedw. 38.
 " flexifolia Hornsch. 37.
 " microcarpa Hornsch. 38.
 POLLIA Adans. 44.
 POLYBOTRYA Humb. Bonpl. 565.
 " acuminata Link 585.
 " caudata Kunze 585.
 " cervina Kaulf. 587.
 " corcooadensis Spreng. 588.
 " cylindrica Kaulf. 586.
 " elegans Pohl 588.
 " incisa Link 586.
 " longifolia Pohl 588.
 " osmundacea H.B.K. 586.
 " pubens Mart. 586.
 " Raddiana Kaulf. 588.
 " serrata Bory 588.
 " serratifolia Kl 588.
 " sorbifolia Mett. 588.
 " speciosa Schott 586.
 POLYPODIACEAE Kaulf. 335.
 POLYPODIEAE Endl. 335. 337. 495.
 POLYPODIUM Linn. 495.
 " achilleaeefolium Kaulf. 519.
 " acrosorum Kunze 537.
 " aculeatum Linn. 462.
 " aculeatum Raddi 330.
 " adiantiforme Forst. 463.
 " adnatum Kunze 525.
 " albidulum Baker 598.
 " albidum Presl 526.
 " albo-punctatum Raddi 524.
 " alsophilum Link 329.
 " amphostemon Kunze 530.
 " androgynum Poir. 505.

- POLYPODIUM *angustifolium* Swartz 529.
 " *angustum* Mett. 538.
 " *anocarpos* Kunze 537.
 " *aphanophlebium* Kunze 530.
 " *apiculatum* Kunze 515.
 " *araneosum* Mart. et Gal. 528.
 " *arborescens* Linn. 308.
 " *arbuscula* Beyrich 323.
 " *arcuatum* Moritz 514.
 " *areolatum* H.B.K. 528.
 " *armatum* Swartz 331.
 " *articulatum* Desv. 525.
 " *aspidioides* Presl 474.
 " *asplenifolium* Ettingsh. 512.
 " *asplenifolium* Kuhn 511.
 " *asplenifolium* Linn. 511, 514.
 " *atro-virens* Langsd. et Fisch. 320.
 " *attenuatum* Ettingsh. 528.
 " *attenuatum* H.B.K. 524.
 " *auratum* Vell. 528.
 " *aureum* Linn. 527.
 " *auriculatum* Raddi 502.
 " *aurisetum* Raddi 521.
 " *avenum* Desv. 536.
 " *axillare* Raddi 331.
 " *bacciferum* Poir. 341.
 " *Balbisi* Spreng. 478.
 " *Beyrichianum* Presl 510.
 " *blechnoides* Rich. 318.
 " *botryosorum* Sieb. 550.
 " *brasiliense* Poir. 524.
 " *brevistipes* Mett. et Kuhn 598.
 " *Cacti* R. Br. 520.
 " *caducum* Willd. 461.
 " *campylopodon* Kl. 524.
 " *camptoneuron* Fée 518.
 " *canescens* Kunze 484.
 " *capense* Linn. fil. 316.
 " *capense* Linn. 463.
 " *capillare* Desv. 598.
 " *cardiophyllum* Ettingsh. 520.
 " *caripense* Willd. 472.
 " *Carii* Baker 597.
 " *Catharinae* L. et F. 522.
 " *caudatum* Kaulf. 501.
 " *cayennense* Desv. 520.
 " *ceteracinum* Michx. 526.
 " *chnoophorum* Kunze 515.
 " *chrysopodium* Kl. 532.
 " *ciliatum* Spreng. 506.
 " *ciliatum* Willd. 520.
 " *colubrinum* Vell. 464.
 " *confusum* J. Smith 511.
 " *connexum* Kaulf. 502.
 " *consanguineum* Kl. 477.
- POLYPODIUM *corcovadense* Raddi 319.
 " *cordifolium* Linn. 491.
 " *cordifolium* Mart. et Gal. 466.
 " *coriaceum* Raddi 537.
 " *costatum* Kunze 531.
 " *crassifolium* Linn. 537.
 " *crenatum* Swartz 504.
 " *crispum* Plum. 252.
 " *cultratum* Willd. 511.
 " *cuspidatum* Presl 536.
 " *cymatodes* Kunze 525.
 " *decipiens* Hook. 598.
 " *decumanum* Willd. 528.
 " *decurrens* Raddi 532.
 " *decussatum* Linn. 500.
 " *deflexum* Kaulf. 473.
 " *deflexum* Lowe 525.
 " *denticulatum* Sw. 482.
 " *dietyocallis* Lowe 529.
 " *dietyophyllum* Kunze 534.
 " *dilatatum* Liebm. 486.
 " *dimorphum* Link 529.
 " *discolor* Hook. 509.
 " *distans* Kaulf. 472.
 " *distans* Raddi 525.
 " *divergens* Swartz 485.
 " *diversifolium* Swartz 504.
 " *dissimile* Schkuhr, Ettingsh. 524.
 " *Eckloni* Kunze 526.
 " *effusum* Sw. 485.
 " *elasticum* Bory 512.
 " *elastium* Rich. 516.
 " *elatius* Schrad. 524.
 " *elegans* Poir. 516.
 " *ellipticosorum* Fée 512.
 " *elongatum* Mett. 557.
 " *ensifolium* Hook. 536.
 " *ensifolium* Willd. 529.
 " *eriphorum* Hook. 541.
 " *exaltatum* Linn. 492.
 " *exsul* Mett. 538.
 " *fasciale* Humb. Bonpl. 530.
 " *ferrugineum* Mart. et Gal. 515.
 " *Filicula* Kaulf. 517.
 " *Filix-mas* Linn. 480.
 " *firmum* Kl. 511.
 " *Fischerianum* Baker 502.
 " *flavo-punctatum* Kaulf. 499.
 " *flexile* Fée 512.
 " *formosum* Raddi 502.
 " *fraxinifolium* Jacq. 525.
 " *Freyreissii* Spreng. 504.
 " *fulvescens* Hook. et Grev. 503.
- POLYPODIUM *funiculosum* Desv. 533.
 " *furcatum* Mett. 507.
 " *geminatum* Schrad. 533.
 " *gibbosum* Fée 510.
 " *gladiatum* Kunze 524.
 " *gladiatum* Vell. 531.
 " *glaucinum* Mart. et Gal. 528.
 " *glaucophyllum* Kunze 522.
 " *glaucum* Raddi 522.
 " *gradatum* Baker 513.
 " *gramineum* Sw. 506.
 " *grande* Presl 502.
 " *griseum* Schkuhr 332.
 " *guianense* Aubl. 591.
 " *Haenkeanum* Presl 520.
 " *Haenkei* Liebm. 524.
 " *harpeodes* Link 523.
 " *hastatum* Vell. 490.
 " *hastigerum* Kunze 515.
 " *hirsutissimum* Raddi 527.
 " *hirsutum* Forst. 493.
 " *hirsutum* Swartz 503.
 " *hirtum* Vell. 488.
 " *Hostmanni* Kl. 525.
 " *inaequale* Link 484.
 " *incanum* Swartz 526.
 " *inversum* Vell. 516.
 " *invisum* Sw. 470.
 " *iteophyllum* Link. 533.
 " *jubaeforme* Kaulf. 511.
 " *Karwinskiannum* A. Br. 519.
 " *Kegelianum* Kunze 509.
 " *Kunthii* Desv. 533.
 " *laetum* Raddi 523.
 " *laevigatum* Cav. 530.
 " *lagopodioides* Desv. 533.
 " *lanceolatum* Linn. 536.
 " *lanosum* Fée 527.
 " *lanuginosum* Schrad. 523.
 " *lanuginosum* Vell. 472.
 " *lapathifolium* Poir. 530.
 " *lasiernos* Spreng. 503.
 " *latipes* L. et F. 523.
 " *lazifrons* Liebm. 514.
 " *lepidopteris* Kunze 527.
 " *lepidotum* Willd. 536.
 " *leptophyllum* Moritz 515.
 " *leptosorum* Kunze 477.
 " *leucorhizon* Klotzsch 530.
 " *leucostictum* Kunze 519.
 " *Leveillianum* Desv. 512.
 " *ligustrifolium* Desv. 533.
 " *Lindbergii* Mett. 535.
 " *longifolium* Presl 524.
 " *loreum* Kaulf. 529.
 " *loriceum* Linn. 522.
 " *lucidum* Beyrich 530.

- POLYPODIUM *lugubre* Kunze 476.
 „ *lycopodioides* Linn. 533.
 „ *lycopodioides* Meyer 535.
 „ *Mackenii* Baker 533.
 „ *macrocarpum* Willd. 536.
 „ *macropterum* Kaulf. 501.
 „ *maenurum* Link 518.
 „ *marginale* Willd. 536.
 „ *marginellum* Swartz 506.
 „ *mauritanum* Willd. 533.
 „ *megalodus* Schkuhr 505.
 „ *megalophyllum* Desv. 534.
 „ *melanosictum* Kunze 510.
 „ *menssiefolium* L. et F. 524.
 „ *meridense* Kl. 514.
 „ *microlepis* Fée 526.
 „ *minimum* Brackenr. 508.
 „ *miserum* Heward 486.
 „ *molle* H.B.K. 517.
 „ *molle* Jacq. 488.
 „ *mollissimum* Fée 511.
 „ *moniliforme* Lag. 510.
 „ *monosorum* Presl 476.
 „ *monteverdense* Spreng. 462.
 „ *multifidum* Jacq. 485.
 „ *multiseriale* Moore 529.
 „ *muricatum* Linn. 462.
 „ *mutabile* Kunze 525.
 „ *myosuroides* Swartz 508.
 „ *myrtillifolium* Hort. 534.
 „ *nanum* Fée 510.
 „ *neriifolium* Schkuhr 524.
 „ *nidulans* Beyrich 514.
 „ *nitidum* Hook. 530.
 „ *nitidum* Kaulf. 531.
 „ *nudum* Mett. 506.
 „ *obliteratum* Sw. 506.
 „ *odorum* Vell. 470.
 „ *oligocarpum* Willd. 477.
 „ *oligophlebium* Kunze 532.
 „ *oligosorum* Kl. 477.
 „ *opacum* Mett. 531.
 „ *organense* Mett. 507. 598.
 „ *ornatum* Kl. 525.
 „ *Otites* Linn. 518.
 „ *Otites* Willd. 517.
 „ *owariense* Desv. 533.
 „ *Palma* Vell. 524.
 „ *palmatum* Vell. 538.
 „ *Paradisense* L. et F. 517.
 „ *parasiticum* Linn. 488.
 „ *Purkeri* Hook. et Grev. 318.
 „ *patens* Sw. 470.
 „ *pauciflorum* Hook. 314.
 „ *Pecten* Fée 515.
 „ *pectinatum* Linn. 517.
 „ *pediculariaefolium* Presl 501.
- POLYPODIUM *pendulum* Splitg. 511.
 „ *pendulum* Swartz 512. 598.
 „ *Penna-marina* Poir. 414.
 „ *percussum* Cav. 536.
 „ *persicariaefolium* Schrad. 535.
 „ *Phlegmaria* J. Smith 508.
 „ *Phyllitidis* Linn. 531.
 „ *piligerum* Hook. 519.
 „ *pilipes* Klotzsch 598.
 „ *Pilosella* Vell. 533.
 „ *piloselloides* Linn. 520.
 „ *piloselloides* Raddi 521.
 „ *pilosissimum* Mart. et Gal. 514.
 „ *planusculum* Mett. 510.
 „ *plantagineum* Jacq. 465.
 „ *platyphyllum* Hook. 463.
 „ *plebeium* Schlecht 519.
 „ *pleopeltifolium* Raddi 538.
 „ *Plumula* H.B.K. 516.
 „ *Foëppigii* Kunze 503.
 „ *polylepis* Roem. 536.
 „ *polystichoides* Kl. 463.
 „ *polystichum* Link 525.
 „ *porrectum* Willd. 531.
 „ *Preslianum* Link 524.
 „ *procerum* Willd. 322.
 „ *proliferum* Kaulf. 504.
 „ *pruinatum* Swartz 332.
 „ *pseudopteris* Kunze 501.
 „ *pteroideum* Klotzsch 501.
 „ *pteropus* Hook. 513.
 „ *ptilodon* Kunze 517.
 „ *pubescens* Raddi 477.
 „ *pubescens* Schum. et Thonn. 482.
 „ *pulchrum* Mart. et Gal. 516.
 „ *punctatum* Thunb. 503.
 „ *pungens* Willd. 323.
 „ *pyenolepis* Hook. 462.
 „ *pycnosorum* Link 523.
 „ *Raddii* Desv. 527.
 „ *radicale* Moritz 514.
 „ *reclinatum* Brackenr. 512.
 „ *recurvatum* Kaulf. 518.
 „ *refractum* Fisch. et Mey. 489.
 „ *refulgens* Klotzsch 500.
 „ *repandum* Vahl 490.
 „ *repandum* Vell. 502.
 „ *repens* Anbl. 532.
 „ *reticulatum* Linn. 564.
 „ *retusum* Swartz 477.
 „ *rhizocaulon* Willd. 525.
 „ *Richardii* Kl. 525.
 „ *Riedelianum* Kunze 510.
 „ *rigescens* Bory 510.
- POLYPODIUM *rigidum* Aubl. 569.
 „ *rigidum* Hook. et Grev. 462.
 „ *rigidum* Lowe 530.
 „ *riculorum* Raddi 477.
 „ *rosmarinifolium* Kunth 533.
 „ *rostratum* Willd. 318.
 „ *rotundatum* Willd. 499.
 „ *rufulum* Presl 527.
 „ *rugulosum* Labill. 503.
 „ *runcinatum* Desv. 521.
 „ *saccatum* Fée 511.
 „ *salicifolium* Willd. 533.
 „ *Sancti-Gabrielii* Hook. 469.
 „ *saxicola* Swartz 549.
 „ *Schkuhrii* Raddi 516.
 „ *Schomburgkianum* Kunze 534.
 „ *Schomburgkii* Hook. 534.
 „ *sectifrons* Kunze 538.
 „ *semiadnatum* Hook 512.
 „ *senile* Fée 512.
 „ *sepultum* Kaulf. 527.
 „ *serpens* Swartz 521.
 „ *serratum* Aubl. 438. 591.
 „ *Serricula* Fée 510.
 „ *serrulatum* Mett. 507.
 „ *sertularioides* J. Smith 510.
 „ *setosum* Mett. 508.
 „ *sifolium* Goldm. 532.
 „ *solutum* Klotzsch 529.
 „ *spectabile* Kaulf. 484.
 „ *Speluncae* Linn. 349.
 „ *spinosum* Linn. 412.
 „ *Spirianum* Mart. 514.
 „ *splendidum* Kaulf. 502.
 „ *sporocarpium* Willd. 528.
 „ *Sprengelii* Desv. 506.
 „ *squalidum* Vell. 526.
 „ *stigmaticum* Presl 534.
 „ *subcrenatum* Hook. 510.
 „ *subdimidiatum* Baker 508.
 „ *subincisum* Willd. 483.
 „ *sublanosum* Hook. 515.
 „ *submarginale* L. et F. 472.
 „ *subobliquatum* Hook. 469.
 „ *subsessile* Baker 513.
 „ *subtetragonum* Link 505.
 „ *subulatum* Kl. 525.
 „ *subulatum* Vell. 477.
 „ *surinamense* Jacq. 533.
 „ *suspensum* Eittingsh. 513.
 „ *suspensum* Linn. 514.
 „ *suspensum* Mett. 511.
 „ *suspensum* Sieb. 511.
 „ *Swartzii* Baker 521.
 „ *taeniosum* Willd. 529.
 „ *Taenitis* Roth 319.


- POLYPODIUM** *taxifolium* Hook. et Baker 516.
 " *tectum* Kaulf. 521.
 " *tenuifolium* H.B.K. 518.
 " *tetragonum* Sw. 505.
 " *Tijucanum* Raddi 499.
 " *Tovarense* Kl. 508.
 " *tricholepis* Schrad. 527.
 " *trichomanoides* Sw. 509.
 " *trifoliatum* Linn. 466.
 " *triseriale* Sw. 525.
 " *triste* Kunze 476.
 " *truncicola* Kl. 510.
 " *unitum* Linn. 487.
 " *vacciniifolium* L. et F. 519.
 " *vacciniifolium* Raddi 534.
 " *vacillans* Link 523.
 " *vastum* Kunze 484.
 " *velatum* Schkuhr 526.
 " *venosum* Lowe 534.
 " *venulosum* Desv. 534.
 " *vestitum* Raddi 473.
 " *Vittaria* Mett. 537.
 " *viriparum* Raddi 504.
 " *xanthorichium* Kl. 512.
 " *xiphophorum* Kunze 524.
 " *xiphopteroides* Liebm. 515.
- POLYSTICHUM** Roth 460. 461. 467.
 " *abbreviatum* Presl 464.
 " *amplissimum* Presl 485.
 " *aspidioides* Kl. 482.
 " *conterminum* Gaud. 477.
 " *denticulatum* J. Smith 482.
 " *gongyloides* Gaud. 487.
 " *guianense* Presl 464.
 " *gymnogrammoides* Gaud. 550.
 " *heterodon* Presl 465.
 " *laetum* Presl 482.
 " *melanostictum* Liebm. 486.
 " *microphyllum* Kl. 462.
 " *nymphale* Gaud. 470.
 " *patens* Gaud. 470.
 " *platyphyllum* Presl 463.
- POLYTAENIUM** Desv. 558.
 " *lanceolatum* Desv. 559.
- POLYTRICHUM** Linn. 47.
 " *acaulon* Dill. 47.
 " *Antillarum* Rich. 48.
 " *appressum* Brid. 48.
 " *appressum* Schwaegr. 48.
 " *brevicaule* Brid. 47.
 " *glabrum* Brid. 49.
 " *juuiperinum* Hedw. 48.
 " *magellanicum* Linn. 47.
 " *pensilvanicum* Hedw. 47.
 " *scabriusculum* Brid. 48.
- POLYTRICHUM** *semiangulatum* Hornsch. 48.
 " *strictum* Menz. 48.
 " *tenuis* Menz. 47.
POROPTERIDES Willd. 147.
PROSAPTIA Presl 343.
PSILOTUM Swartz 132.
 " *floridanum* Michx. 133.
 " *triquetrum* Swartz 133.
PSOMIOLICARPA Presl 565.
 " *acuminata* Presl 585.
 " *caudata* Presl 585.
PTERIDEAE 337. 358.
PTERIGLYPHIS Fée 427.
Pterigynandrum fulgens Hedw. 91.
PTERIS Linn. 398.
 " *actinophylla* Kunze 406.
 " *aculeata* Swartz 412.
 " *adanthoides* Vell. 355.
 " *aleicornis* Kunze 406.
 " *angustifolia* Swartz 544.
 " *apicalis* Liebm. 412.
 " *appendiculata* Kaulf. 411.
 " *aquilina* Linn. 403.
 " *arachnoidea* Kaulf. 403.
 " *argyrophylla* Swartz 392.
 " *aspera* Poir. 377.
 " *australasica* Desv. 409.
 " *Beecheyana* Agardh 412.
 " *biaurita* Linn. 404.
 " *biaurita* Swartz 401.
 " *biformis* Splitg. 412.
 " *Blanchetiana* Presl 412.
 " *brasiliensis* Raddi 410.
 " *calcarata* Bory 401.
 " *campestris* Schrad. 403.
 " *catoptera* Kunze 401.
 " *caudata* Linn. 403.
 " *chamaedryfolia* Goldm. 407.
 " *cheirophylla* Kunze 406.
 " *chenopoda* Willd. 407.
 " *chrysodioides* Hook. 409.
 " *collina* Raddi 407.
 " *concolor* Langsd. et Fisch. 396.
 " *cornute* Beauv. 334.
 " *crenata* Vell. 487.
 " *cretica* Hook. 410.
 " *cretica* Linn. 399.
 " *eruciata* Kaulf. 409.
 " *decurrens* Presl 411.
 " *decurrens* Vell. 413.
 " *deflexa* Link 402.
 " *denticulata* Swartz 410.
 " *dichotoma* Cav. 389.
 " *digitato-partita* Willd. 407.
 " *elegans* Swartz 408.
 " *elegans* Vell. 408 in obs.
- PTERIS** *elongata* Schrad. 412.
 " *fallax* Kunze 501.
 " *farinosa* Forsk. 392.
 " *felosma* J. Smith 401.
 " *furcata* Linn. 545.
 " *Gaudichaudii* Agardh 402.
 " *geminata* Agardh 404.
 " *geraniaefolia* Raddi 396.
 " *glaucescens* Bory 409.
 " *glutinosa* J. Smith 404.
 " *gracilis* Fée 413.
 " *hastata* Raddi 405.
 " *hederacea* Ettingsh. 408.
 " *heterophylla* Linn. 401.
 " *Hostmanniana* Presl 412.
 " *incisa* Thunb. 408.
 " *intermedia* Kaulf. 411.
 " *Kleiniana* Presl 404.
 " *laciniata* Vell. 396.
 " *laeta* Kaulf. 402.
 " *lanceolata* Linn. 544.
 " *lata* Kaulf. 402.
 " *leptophylla* Ettingsh. 413.
 " *leptophylla* Swartz 413.
 " *lineata* Linn. 543.
 " *litobrochioides* Klotzsch 400.
 " *lomariacea* Kunze 406.
 " *lomariacea* var. *digitato-palmata* Hook. 406.
 " *lonchophora* Mett. 397.
 " *longula* Mett. 596.
 " *lunata* Retz 361.
 " *Luschnathiana* Baker 412.
 " *macroptera* Link 411.
 " *melanopus* Leprieur 381.
 " *microphylla* Cav. 390.
 " *multiaurita* Agardh 400.
 " *nemoralis* Hook. 401.
 " *nervosa* Thunb. 400.
 " *ophioglossoides* Vell. 588.
 " *Orizabae* Mart. et Gal. 412.
 " *ornithopus* Mett. 405.
 " *pallida* Raddi 409.
 " *palmata* Vell. 410.
 " *palmata* Willd. 408.
 " *palustris* Gaudich. 402.
 " *papyrocea* Hook. 410.
 " *pedata* Linn. 407.
 " *pedatoides* Desv. 407.
 " *pentaphylla* Willd. 400.
 " *peucedanifolia* Schrad. 413.
 " *pinnata* Mett. 394.
 " *podophylla* Kunze 412.
 " *Pohlana* Presl 396.
 " *polita* Link 412.
 " *propinqua* Agardh 412.
 " *Protea* Liebm. 412.

- PTERIS** *psittacina* Presl 403.
 „ *pubescens* Kuhn 385.
 „ *pungens* Kunze 400.
 „ *pyrophylla* Blume 401.
 „ *quadriaurita* Retz. 401. 596.
 „ *repandula* Link 401.
 „ *resistens* Mett. 404.
 „ *reticulata* Desv. 410.
 „ *sagittifolia* Raddi 405.
 „ *salicifolia* Schrad. 410.
 „ *scalaris* Moritz 404.
 „ *semidentata* Fée 413.
 „ *septemloba* Kl. 406.
 „ *Serraria* Swartz 400.
 „ *serrata* Vell. 410.
 „ *spinulosa* Raddi 413.
 „ *splendens* Kaulf. 409.
 „ *stenophylla* Link 410.
 „ *stridens* Agardh 402.
 „ *sulcata* Meyen 401.
 „ *Swartziana* Agardh 401.
 „ *tabularis* Thunb. 418.
 „ *thalictroides* Willd. 334.
 „ *tricuspidata* Linn. 545.
 „ *triphylla* Baker 596.
 „ *triphylla* Mart. et Gal. 400.
 „ *triphylla* Mett. 393.
 „ *tristicula* Raddi 410.
 „ *varians* Raddi 408.
 „ *Vespertilionis* Labill. 408.
 „ *viscosa* Moore 404.
PTEROBRYON Hornsch. 50.
 „ *densum* Hornsch. 51.
 „ *obliquifolium* Hornsch. 51.
Pterogonium densum Schwaegr. 51.
 „ *fulgens* Sw. 91.
 „ *myurum* Raddi 53.
PTERONEURON Fée 343.
PTEROPSIS Desv. 542. 544.
 „ *angustifolia* Desv. 544. 545.
 „ *lanccolata* Desv. 545.
PTEROZONIUM Fée 548.
 „ *reniforme* Fée 551.
PTERYGOPHYLLUM Brid. 61.
 „ *arcuatum* Brid. 93.
PTYCHOPHYLLUM Presl 281.
PYCNODORIA Presl 398.
RACOPILUM Pal. Beauv. 92.
 „ *mnoides* Pal. Beauv. 92.
 „ *tomentosum* Brid. 92.
RAGATELUS Presl 241.
 „ *eriphorus* Presl 258.
RHIPIDOPTERIS Schott 565. 566.
 „ *pettata* Fée 587.
RHIZOGLOSSUM Presl 143.
RIPIDIUM Bernh. 178.
RUMOHRIA Raddi 460.
Ruhmoria aspidioides Raddi 463.
SACCOLOMA Kaulf. 343.
 „ *adiantoides* L'Hermin. 347.
 „ *elegans* Kaulf. 347.
 „ *Imrayana* Kunze 347.
 „ *inexquale* Mett. 348.
SACENIA Presl 467. 469.
 „ *macrophylla* Moore 490.
SALPICHLAENA J. Smith 419. 420. 426.
 „ *scandens* Presl 427.
 „ *volubilis* J. Smith 427.
SALVINIA Micheli 653.
 „ *affinis* Desv. 656.
 „ *auriculata* Aubl. 655.
 „ *auriculata* var. *Sprucei* Baker 655.
 „ *Azolla* Raddi 660.
 „ *biloba* Pohl 657.
 „ *biloba* Raddi 656.
 „ *hispida* Kunth 656.
 „ *natans* Kunth 656.
 „ *oblongifolia* Mart. 656.
 „ *Olfersiana* Klotzsch 656.
 „ *Radula* Baker 656.
 „ *rotundifolia* Willd. 655.
 „ *Sprucei* Kuhn 655.
SALVINIACEAE 653.
Samambaia Brasil. 305.
SCHAFFNERIA Fée 457.
SCHISMATOPTERIDES Willd. 161.
 167. 217.
SCHRISTIDIUM Brid. 4.
 „ *torquatum* Brid. 4.
SCHIZAEA J. Smith 169. 178.
 „ *attenuata* Beyrich 184.
 „ *bifida* Meyer 181.
 „ *dicholoma* Kunze 181.
 „ *elegans* Swartz 183.
 „ *elegans* var. *attenuata* Kunze 184.
 „ *flabellum* Mart. 183.
 „ *Fluminensis* Miers 184.
 „ *incurvata* Schkuhr 180.
 „ *pacificans* Mart. 182.
 „ *penicillata* Humb. Bonpl. 180.
 „ *pennula* Swartz 180.
 „ *Poeppigiana* J. W. Sturm 181.
 „ *spectabilis* Mart. 182.
 „ *subtrijuga* Mart. 179.
 „ *trilateralis* Schkuhr 180.
SCHIZAEACEAE Mart. 167.
SCHIZOCARNA J. Smith 307.
SCHIZOLOMA Gaud. 349. 358.
 „ *macrophyllum* Presl 358.
SCHLOTHEIMIA Brid. 28.
 „ *brachyrhyncha* Schwaegr. 25.
SCHLOTHEIMIA Chamissonis Hornsch 31.
 „ *cirrhusa* Schwaegr. 25.
 „ *fusco-viridis* Hornsch. 32.
 „ *gracilis* Hornsch. 35.
 „ *Jamesoni* Brid. 30.
 „ *julacea* Hornsch. 30.
 „ *laxa* Hornsch. 33.
 „ *longifolia* Hornsch. 34.
 „ *Martiana* Hornsch. 32.
 „ *Merkelii* Hornsch. 29.
 „ *nitida* Schwaegr. 28.
 „ *Ottonis* Schwaegr. 34. 35.
 „ *recurvifolia* Hornsch. 35.
 „ *rugifolia* Brid. 30.
 „ *rugifolia* Schwaegr. 31.
 „ *sinuata* Hornsch. 31.
 „ *Sprengelii* Hornsch. 34.
 „ *stellulata* Hornsch. 27.
 „ *sulcata* Hook. 27.
 „ *torquata* Brid. 33.
 „ *torquata* Spreng. 34.
 „ *torta* Schwaegr. 33.
 „ *trichomitria* Schwaegr. 28.
 „ *viticulosa* Raddi 25.
SCLERODONTIUM Schwaegr. 52.
 „ *pallidum* Schwaegr. 52.
 „ *pellucidum* Schwaegr. 52.
SCOLIOSORUS Moore 558.
SCOLOPENDRIEAE 337. 455.
SCOLOPENDRIUM Linn. 457.
 „ *ambiguum* Raddi 457.
 „ *brasiliense* Kunze 457.
 „ *Douglasii* Hook. 458.
 „ *plantagineum* Schrad. 458.
SCYPHULARIA Fée 343.
SELAGINELLA Spring 117.
 „ *amazonica* Spring 124.
 „ *apus* Spring 119.
 „ *asperula* Spring 127.
 „ *Bahiensis* Spring 124.
 „ *Breynii* Spring 121.
 „ *coarctata* Spring 126.
 „ *conduplicata* Spring 129.
 „ *convoluta* Spring 131.
 „ *crassineivia* Spring 119.
 „ *decomposita* Spring 123.
 „ *distorta* Spring 128.
 „ *erythropus* Spring 125.
 „ *excurrens* Spring 128.
 „ *flexuosa* Spring 122.
 „ *jungermannioides* Gaudich. 121.
 „ *laevigata* Spring 125.
 „ *macrostachya* Spring 123.
 „ *marginata* Spring 127.
 „ *muscosa* Spring 120.


- SELAGINELLA** *rupestris* Spring 118.
 „ *stellata* Spring 129.
 „ *suavis* Spring 131.
 „ *sulcata* Spring 130.
 „ *thujaefolia* Spring 120.
SELAGINOIDES Dill. 117.
SELAGO Dill. 109.
SELLIGUEA Bory 548. 549 557.
SITOLOBUM Desv. 339.
 „ *rubiginosum* J. Smith 342.
SOROMANES Presl 565. 567.
 „ *dentatum* Fée 588.
 „ *integrifolium* Fée 588.
 „ *serratifolium* Fée 588.
SPHAEROCTONIUM Presl 281.
 „ *aureum* Presl 299.
 „ *Beyrichianum* Prl. 293.
 „ *caudiculatum* Presl 286.
 „ *ciliatum* Presl 292.
 „ *commutatum* Presl 292.
 „ *crispum* Klotzsch β. 291.
 „ *Grevilleanum* Presl 292.
 „ *hirsutum* Presl 296.
 „ *trifidum* Presl 294.
 „ *vestitum* Presl 292.
SPHAEROPTERIS Bernh. 307.
SPHAGNACEAE Endl. 3.
SPHAGNUM Dill. 3.
 „ *clandestinum* Pal. Beauv. 11.
 „ *compactum* Brid. 3.
 „ *cymbifolium* Dill. 3.
 „ *iridans* Brid. 11.
 „ *Javense* Brid. 10.
 „ *macrophyllum* Brid. 11.
 „ *pennatum* Dill. 56.
 „ *squarrosum* Pers. 3.
SPICANTA Presl 413.
STACHYGYNANDRUM Brongn. 117.
 „ *laevigatum* Pal.
 Beauv. 125.
STACHYOPTERIDES Willd. 141.
STEGANIA R. Br. 413.
 „ *alpina* R. Br. 414.
 „ *lanceolata* R. Br. 416.
 „ *minor* R. Br. 417.
 „ *procera* R. Br. 417.
STEGNOGRAMME Blume 548.
STENOCHLAENA J. Smith 565.
 „ *japurensis* Griseb. 584.
 „ *longifolia* Griseb. 584.
 „ *sorbifolia* Griseb. 584.
STENOLOBUS Presl 343.
STENOLOMA Fée 343. 346.
STIBASIA Presl 149.
Synammia elongata Presl 557.
SYNAPLERIUM J. Smith 349.
SYNECHIA Fée 361.
- SYNGRAMME** J. Smith 548.
SYRRHOPODON Schwaegr. 6.
 „ *Hornschnchii* Hornsch. 6.
 „ *prolifer* Schwaegr. 7.
 „ *rufus* Hornsch. 6.
TAENIOPSIS J. Smith 542.
 „ *graminifolia* J. Smith 543.
TAENIOPTERIS Hook. 542.
Taenitis angustifolia R. Br. 544.
 „ *Desvauxii* Kl. 545.
 „ *furcata* Hook. et Grev. 545.
 „ *furcata* Willd. 545.
 „ *graminifolia* Hook. 547.
 „ *lanceolata* R. Br. 544.
 „ *pumila* Kaulf. 547.
 „ *seminuda* Kuhn 547.
TARACHIA Presl 427.
 „ *Browniana* Presl 444.
 „ *caudata* Presl 442.
 „ *cuneata* Presl 445.
 „ *furcata* Presl 444.
 „ *geminaria* Presl 444.
 „ *nigricans* Presl 444.
 „ *trapezoides* Presl 432.
 „ *truncatiloba* Presl 442.
TECTARIA Cav. 460.
 „ *Calahuata* Sw. 463.
TEGULARIA Reinw. 459.
TELEOZOMA R. Br. 333.
THAMNOPTERIS Presl 427.
THECASPERMAE Link 238.
THYSANOMITRIUM Schwaegr. 15.
 „ *griseum* Hornsch. 16.
 „ *introflexum* Hornsch.
 15.
 „ *rigidum* Hornsch. 15.
Tortula linearis Swartz 19.
 „ *lusitanica* Brid. 19.
TREMATODON Rich. 9.
 „ *ambiguus* Brid. 10.
 „ *longicollis* Rich. 9.
 „ *longirostris* Schwaegr. 9.
 „ *vulgaris* Brid. 10.
TRICHOMANES Linn. 241.
 „ *accedens* Presl 253.
 „ *amabile* Fée 273.
 „ *ambiguus* Klotzsch 271.
 „ *anceps* Hook. 266.
 „ *angustatum* Hook. 273.
 „ *angustissimum* Presl 274.
 „ *Ankersii* Klotzsch 261.
 n. 27.
 „ *Ankersii* Parker 261.
 „ *astylum* Kaulf. 256.
 „ *Bancroftii* Hook. et Grev.
 259.
 „ *bicornis* Hook. 260.
- TRICHOMANES** *botryoides* Kaulf. 243.
 „ *brachypus* Klotzsch 262.
 „ *brachypus* Kunze 262.
 „ *cellulosum* Klotzsch 269.
 „ *ciliatum* Hedw. 292.
 „ *coarctatum* Kunze 250.
 „ *cognatum* Presl 258.
 „ *commutatum* J. W. Sturm
 261.
 „ *coriaceum* Kunze 259.
 „ *cormophyllum* Kaulf. 316.
 „ *crispum* Hook. 252. 253.
 254. 257.
 „ *crispum* Linn. 251.
 „ *crispum* Presl 255.
 „ *cristatum* Kaulf. 254.
 „ *cuneiforme* Schkuhr 274.
 „ *diaphanum* Kunth 271.
 „ *elegans* Rich. 266.
 „ *elegans* Rudge 244 sub 2
 et 3.
 „ *emarginatum* Presl 272.
 „ *eriphorum* Presl 257.
 „ *eximium* Kunze 271.
 „ *fastigiatum* Sieb. 252.
 „ *filiforme* J. W. Sturm 269.
 „ *firmulum* Presl 268.
 „ *floribundum* Hook. et Grev.
 248. 250.
 „ *floribundum* Humb. Bonpl.
 247.
 „ *floribundum* β. Splltg. 246.
 „ *fucooides* Swartz 284.
 „ *fulvum* Klotzsch 272.
 „ *guianense* J. W. Sturm 262.
 „ *Haenkeanum* Presl 255.
 „ *heterophyllum* Humb. et
 Bonpl. 245.
 „ *hirsutum* Linn. 296.
 „ *Hookeri* Presl 251.
 „ *Hostmannianum* Kunze
 250.
 „ *hymenoides* Hedw. 278.
 „ *incisum* Kaulf. 258.
 „ *incisum* Thunb. 316.
 „ *intermedium* Kaulf. 273.
 „ *Kapplerianum* J. W. Sturm
 276.
 „ *Kaulfussii* Hook. et Grev.
 256.
 „ *Kaulfussii* Spruce 259.
 „ *Krausii* Hook. et Grev. 280.
 „ *lastreoides* Presl 266.
 „ *laxum* Klotzsch 254.
 „ *lucens* Hook. et Grev. 256.
 „ *Luschnathianum* Presl 263.
 „ *Mandioccanum* Raddi 267.

- TRICHOMANES *Martiusii* Presl 257.
 „ *maximum* Pohl 253.
 „ *membranaceum* Linn. 275.
 „ *montanum* Hook. 280.
 „ *muscoides* Hook. et Grev. 251
 „ *muscoides* Kunze 279.
 „ *muscoides* Swartz 278.
 „ *nanum* Hook. 243.
 „ *nigrescens* Pohl 266.
 „ *osmundoides* DC. 244.
 „ *Pabstianum* C. Müll. 279.
 „ *pellucens* Klotzsch 253. 254.
 „ *pellucens* Kunze 255.
 „ *pellucidum* Goldm. 263
 „ *pennatum* Kaulf. 248.
 „ *pennatum* var. β . Kaulf. 246.
 „ *pilosum* Mart. 257.
 „ *pilosum* Raddi 252.
 „ *pinnatifidum* Hb. Willd. 259.
 „ *pinnatum* Hedw. 247.
 „ *pinnatum* Kunze 248.
 „ *plumosum* Kunze 256.
 „ *plumula* Presl 257.
 „ *Poeppigii* Presl 258.
 „ *polyanthes* Swartz 288.
 „ *Prieurii* Kunze 266.
 „ *punctatum* Hook. 277.
 „ *punctatum* Kunze 276.
 „ *punctatum* Poir. 276.
 „ *pusillum* Spruce 276.
 „ *pusillum* Swartz 278.
 „ *pyxidiferum* Linn. 270.
 „ *pyxidiferum* Raddi 272.
 „ *quercifolium* Desv. 258.
 „ *quercifolium* Hook. 280.
 „ *radicans* Hook. et Grev. 263.
 „ *radicans* Kaulf. 264.
 „ *radicans* Klotzsch 263.
 „ *radicans* Hb. Willd. 265.
 „ *repens* Schott 264.
- TRICHOMANES *reptans* Hook. et Grev. 277.
 „ *reptans* Kunze 280.
 „ *reptans* Swartz 279. 281.
 „ *retusum* Pohl 272.
 „ *rhizophyllum* Cavan. 247.
 „ *ricciaeforme* Bong. 187.
 „ *rigidum* Hedw. 296.
 „ *rigidum* Raddi 267.
 „ *rigidum* Swartz 267.
 „ *scandens* Linn. 265.
 „ *scandens* Raddi 264.
 „ *Schiedeanum* C. Müll. 275.
 „ *Schomburgkianum* J. W. Sturm 249.
 „ *Sellowianum* Presl 253.
 „ *sinuosum* Rich. 258.
 „ *spectabile* Klotzsch 248.
 „ *sphenoides* Kunze 277.
 „ *spicatum* Hedw. 244.
 „ *spicisorum* Desv. 244.
 „ *Spruceanum* Hook. 246.
 „ *subsessile* Splitg. 263.
 „ *Tanaicum* Hook. 260.
 „ *tenellum* Hedwig 274.
 „ *tenerum* Spreng. 273.
 „ *trichoidem* Sw. 274.
 „ *Vittaria* DC. 246.
 „ *volubile* Vell. 263.
- TRICHOMANINEAE Moore 238.
 TRICHOMANOIDEAE Kunze 238.
 TRICHOPTERIS Presl 317.
 „ *crenata* Pohl 320.
 „ *denticulata* Presl 319.
 „ *elegans* Presl 319.
 „ *excelsa* Presl 319.
 „ *marginalis* J. Smith 320.
- TRICHOSORUS Liebm. 317.
 „ *densus* Liebm. 332.
 „ *frigidus* Liebm. 332.
 „ *glaucescens* Liebm. 332.
- TRICHOSTOMUM Hedw. 16.
 „ *Barbula* Schwaegr. 19.
 „ *barbuloides* Brid. 19.
 „ *squarrosus* Brid. 16.
- Trismeria argentea* Fée 555.
 „ *aurea* Fée 555.
 „ *microphylla* Fée 555.
 TRISTECA Pal. Beauv. 132.
 TROCHOPTERIS Gardn. 185.
 „ *elegans* Gardn. 187.
Ugena polymorpha Cav. 172.
 VAGINULARIA Fée 546.
 VITTARIA Smith 542.
 „ *angustifolia* Baker 544.
 „ *curvidentata* C. Müll. 543
 „ *filiformis* Cav. 543.
 „ *furcata* Baker 545.
 „ *Gardneriana* Fée 543.
 „ *graminifolia* Kaulf. 543.
 „ *lanceolata* Baker 544.
 „ *lanceolata* Swartz 559.
 „ *lineata* Swartz 543.
 „ *pachydiactylon* C. Müll. 543.
 „ *Ruiziana* Fée 543.
 „ *scabrida* Kl. 542.
 „ *Schkuhrii* Raddi 543.
 „ *squamosa* Kl. 543.
 „ *stipitata* Kunze 543.
 WEBERA Hedw. 42.
 „ *pulchella* Hornsch. 42.
 WEISSIA Funck 8.
 „ *exigua* Schwaegr. 14.
 „ *uncinata* Brid. 22.
 WIBELIA Bernh. 343.
 WOODSIA R. Br. 593.
 „ *fragilis* Liebm. 593.
 „ *guatemalensis* Hook. 594.
 „ *mollis* J. Smith 593.
 „ *obtusa* Hook. 339 in obs.
 „ *Perrimiana* Hook. 339 in obs.
 XIPHOPTERIS Kaulf. 495.
 „ *extensa* Fée 508.
 „ *Jamesoni* Hook. 508.
 „ *myosuroides* Kaulf. 508.
 „ *serrulata* Kaulf. 508.
 „ *setosa* Kaulf. 508.






I. GRIMMIA julacea.



II. MELICHHOFERIA brevicaulis.




III. HOLOMITRIUM Olfersianum.




IV. SCHLOTHEIMIA Merkelii.






I. MNIMUM Auberti.




II. FISSIDENS flabellatus.

III. FISSIDENS serrulatus.


BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




I. HOOKERIA Merkelii.



II. HOOKERIA microcarpa.




III. HOOKERIA Martiana.



IV. HOOKERIA Olfersiana.







I. HYPNUM Beyrichii.



II. HYPNUM papillosum.




III. HYPNUM microcarpum.



IV. HYPNUM urceolatum.





LYCOPodium I. quadrangulare, II. fontinaloides.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



SELAGINELLA amazonica.


BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
1911






SELAGINELLA stellata.





OPHIOGLOSSUM palmatum.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



MARATTIA Verschaffeltiana.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




DANAEA longifolia.





OSMUNDA palustris.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




LYGODIUM *expansum*.





1.2.3.4.5. *Lygodium venustum*. 6. *L. palmatilobum*. 7.8. *L. lucens*. 9. *L. mucronulatum*. 10.11. *L. Pohlmanni*. 12. *L. acuminatum*. 13.14. *L. hastatum*.
 15.16. *L. hirtum*. 17.18. *L. volubile*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




SCHIZAEA I. spectabilis, II. fluminensis.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



ANEIMIA I. elegans. II. tenuifolia. III. Millefolium. IV. dichotoma.

LIBRAIRIE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




MERTENSIA rigida.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1. *Trichomanes emarginatum*. 2. *T. eximium*. 3. *T. reptans*. 4. *T. muscoides*. 5. *T. Bankcroftii*. 6. *T. fulvum*. 7. 8. *T. tenerum*. 9. *T. trichodeum*. 10. *T. sinuosum*.
 12. *T. Mandiocanum*. 13. *T. cellulosum*. 14. *T. filiforme*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



1 & 2. *Hymenophyllum elegans*. 3. *H. polyanthos*. 4. *H. ciliatum*. 5. *H. hirsutum*. 6 & 7. *H. asplenoides*. 8. *H. Organiense*.





1. 2. *Cyathea Gardneri*. 3. 4. *C. arborea*. 5. 6. *Alsophila aspera*. 7. 8. *Dicksonia cicutaria*. 9—11. *Alsophila phalerata*. 12. 13. *A. armata*. 14. *A. infesta*. 15. 16. *Davallia Speluncae*. 17—19. *Alsophila ferox*. 20. *Dicksonia Sellowiana*. 21. *Hemitelia Hostmanni*. 22. *H. grandifolia*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1—3. *Dicksonia cicutaria*. 4. 5. *D. rubiginosa*. 6—8. *Davallia inaequalis*. 9. *D. inaeq.* var. *nigricans*. 10—12. *D. Speluncae*. 13. 14. *D. thecifera*. 15. *D. Saecoloma*. 16. 17. *Lindsaea trapeziformis*. 18. 19. *L. tr.* var. *falcata*. 20. 21. *L. tr.* var. *arcuata*. 22—25. *Lindsaea stricta*.





1. *Lindsaea trapeziformis* var. *laxa*. 2. *L. tr.* var. *arcuata*. 3. 4. *L. guianensis*. 5. 6. *Adiantum sinuosum*. 7-9. *A. tenerum*. 10. 11. *A. lunulatum*. 12-14. *A. subcordatum*. 15. *A. lucidum*.
16-19. *A. cuneatum*. 20. 21. *A. concinnum*. 22. 23. 27. *A. macrophyllum*. 24-26. *A. trapeziforme*. 28. *A. platyphyllum*.





1. 2. *Adiantum pectinatum*. 3. 4. *A. brasiliense*. 5. 6. *A. polyphyllum*. 7. 13. *A. tetraphyllum*. 8. *A. serrato-dentatum*. 9. *A. villosum*. 10-12. *A. pulverulentum*. 14. *A. intermedium*.
 15. 16. *Cheilanthes chlorophylla*. 17. 18. *Ch. radiata*. 19. *Hypolepis nigrescens*. 20. *H. parallelogramma*. 21. 22. *Pteris viscosa*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



1. 2. *Hypolepis repens*. 3. 10. *Pteris leptophylla*. 4. 8. 11. *Pt. quadriaurita*. 5-7. *Pt. deflexa*. 9. *Pt. denticulata*. 11-13. *Pt. arachnoidea*. 15. *Pt. incisa*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1. 2. *Pteris palmata*. 3. *Pt. sagittifolia*. 4. *Pt. pedata*. 5. 6. *Pt. incisa*. 7—9. *Pt. decurrens*. 10. *Pt. propinqua*. 11—13. *Blechnum serrulatum*. 14. 15. 16. *Lanceola*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1. 2. *Pteris propinqua*. 3. *Pt. brasiliensis*. 4. *Pt. decurrens*. 5-7. *Blechnum brasiliense*. 8. 9. *Bl. unilaterale*. 10. *Bl. occidentale*. 11-13. *Asplenium pulchellum*.





1-3. *Blechnum polypodioides*. 4, 5. *Bl. gracile*. 6, 7. *Lomaria procera*. 8. *Asplenium firmum*. 9, 10, 22. *A. lunulatum*. 11, 12. *A. erectum*. 13-16. *A. Shepherdii*. 17. *A. auriculatum*.
 18-21. *A. Serra*. 23. *A. serratum*. 24. *A. pulchellum*.





13.

1, 2. *Asplenium celtidifolium*. 3, *A. angustatum*. 4, *A. auritum*. 5, *A. pseudonitidum*. 6, *A. radicans*. 7, 8, *A. plantagineum*. 9—12, *Aspidium aculeatum*. 13, *A. nobile*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




1, 2. *Aspidium meniscioides*. 3, 4. *A. coriaceum*. 5, 6. *A. abbreviatum*. 7, 8. *Bitymochaena lunata*. 9, 10. *Nephrodium conterminum*, var. *oligocarpum*. 11, 12. *N. vestitum*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1. 2. *Aspidium trifoliatum*. 3. *Nephrodium conterminum*. 4. 5. *N. effusum*. 6—8. *N. molle*. 9. 10. *N. patens*. 11. *N. denticulatum*. 12. *N. villosum*. 13—15. *N. unitum*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE




1. *Nephrodium triste*. 2. *N. lugubre*. 3. *N. plantagineum*. 4. *N. macrophyllum*. 5. *Oleandra nodosa*. 6—10. *Nephrolepis acuta*. 11. 12. *N. exaltata*. 13. 14. *N. pectinata*. 15—17. *Polypodium cultratum*. 18, 19. *P. cultratum*, var. *reclinatum*. 20, 21. *P. trichomanoides*. 22, 23. *P. truncicola*. 24, 25. *P. macropterum*, var. *connexum*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1. *Polypodium macropterum*, var. *connexum*. 2. 3. *P. macropterum*, var. *splendidum*. 4—6. *Aspidium aculeatum*, var. *platyphyllum*. 7. 8. *Polypodium caudatum*. 9. *P. lanceolatum*. 10. 11. *P. piloselloides*, var. *tectum*. 12. *P. aureum*, var. *areolatum*. 13. 14. *P. decussatum*. 15—18. *P. decussatum*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1. 2. *Polypodium tetragonum*. 3. 4. *P. Catharinense*. 5. 6. *P. erenatum*. 7—10. *P. loriceum*. 11. 12. *P. saccinifolium*. 13—16. *P. angustifolium*. 17. *P. aureum*. 18. *P. aureum, var. areolatum*. 19. 20. *Phyllidius, var. repens*.






1. *Polypodium chinoides*. 2. 3. 4. *P. laevigatum*. 5. 6. *P. Phyllitidis*. 7. *P. aureum*. 8. 15. *P. brasiliense*. 9—14. *P. fraxinifolium*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



1-4. *Polypodium brasiliense*, var. *attenuatum*. 5-7. *P. lycopodioides*. 8-11. *P. persicariaefolium*. 12. *P. percussum*. 13. *P. pectinatum*, var. *Paradisiae*. 14-16. *Gymnogramma calomelanos*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



1. *Gymnogramma myrophylla*. 2. *G. chaerophylla*. 3. 4. *G. tomentosa*. 5. *G. diplazoides*. 6. *Meniscium serratum*. 7. 8. *M. reticulatum*. 9—11. *Vittaria lineata*. 12. *V. stipitata*. 13—16. *V. furcata*. 17—19. *V. angustifolia*. 20—22. *Antrophyum lineatum*. 23. *Acrostichum latifolium* var.



1. 2. *Antrophyum cayennense*. 3. *Acrostichum latifolium*. 4. 5. *A. lineare*. 6. *A. simplex*, var. *martinicense*. 7. *A. Gardnerianum*. 8. *A. viscosum*. 9. *A. Lingua*. 10. *A. squamosum*. 11. 12. *A. perelegans*.






1, 2. *Acrostichum caudatum*, var. *pubens*. 3—5. *A. osmundaceum*. 6—9. *A. caudatum*. 10, 11. *A. sorbifolium*. 12—15. *A. peltatum*. 16, 17. *A. Raddianum*. 18—22. *A. serratifolium*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



1. 8. *Acrostichum cervinum*. 3. 4. *A. alienum*. 5—7. *A. sorbifolium*. 9. *A. nicotianae-folium*. 10. 11. *A. aureum*.


BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



I. *CYATHEA* a. arborea, b. Schanschia. II. *HEMITELIA* (*Euhemitelia*) grandifolia, III. (*Amphicosmia*) platylepis. IV. *ALSOPHILA* a. ferox, b. Taenitis. V. *DICKSONIA* (*Eudicksonia*) Sellowiana; VI. (*Demstaedtia*) cicutaria.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TOULOUSE
DEPARTMENT OF BOTANY
TOULOUSE, FRANCE




DAVALLIA I. (*Odontoloma*) *Parkeri*; II. (*Loxoseaphe*) *thecifera*; III. (*Stenoloma*) *bifida*; IV. (*Microlepia*)
 a. *inaequalis*, b. *Saccoloma*.—LINDSAYA V. (*Eulindsaya*) *trapeziformis*; VI. (*Isoloma*) *sagittata*.









BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]









I. *LINDSAYA* (*Schizoloma*) *macrophylla*.— II. *ADIANTUM* (*Euadiantum*) a. *macrophyllum*, b. *euneatum*,
 III. (*Hewardia*) *olivaceum*.— IV. *HYPOLEPIS* *repens*.— V. *CHEILANTHES* (*Adiantopsis*) *radiata*,
 VI. (*Eucheilanthes*) *microphylla*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




I. CHEILANTHES (*Physapteris*) *Regnelliana*. II. CASSEBEERA *gleichenioides*. III. PELLÆA *concolor*.
PTERIS IV. (*Eupteris*) *litobrochioides*; V. (*Ornithopteris*) *viscosa*, VI. (*Campteria*) *biaurita*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE









PTERIS I. (*Doryopteris*) pedata; II. (*Litobrochia*) aculeata. III. *LOMARIA* capensis. IV. *BLECHNUM* (*Eublechnum*) unilaterale; V. (*Salpichlaena*) volubile. VI. *ASPLENIUM* (*Euasplenium*) a. serratum, b. auritum.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




ASPLENIUM I. (*Athyrium*) *decurtatum*; II. (*Diplazium*) a. *celtidifolium*, b. *Shepherdi*; III. (*Hemidictyum*) *marginatum*.— IV. *SCOLOPENDRIUM* (*Antigramma*) *brasiliense*.— V. *DIDYMOCHLAENA* *lunulata*.— VI. *ASPIDIUM* (*Polystichum*) a. *semicordatum*, b. *aculeatum*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



ASPIDIUM I. (Cyrtomium) abbreviatum, II. (Euaspidium) trifoliatum.
 NEPHRODIUM III. (Lastrea) a. falculatum, b. patulum, IV. (Eunephrodium) unittum, V. (Saegenia) macrophyllum.
 VI. NEPHROLEPIS a. cordifolia, b. exaltata var. biserrata.







I. OLEANDRA nodosa.

POLYPODIUM II. (*Euphegopteris*) *Tijuecanum*, III. (*Goniopteris*) *androgynum* var. *tetra gonum*, IV. (*Eupolypodium*) a. *elasticum*, b. *marginellum*; V. (*Goniophlebium*) a. *vaeciniifolium*, b. *loriceum*; VI. (*Phlebodium*) a. *aureum*, b. *decumanum*.

5








BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE









POLYPODIUM I. (*Campyloneuron*) *Phyllitidis*; II. (*Phymatodes*) a. *crassifolium*, b. *persicariaefolium*.
III. NOTHOCHLAENA *Pohliana*.—**IV. MONOGRAMME** (*Eumonogramme*) *graminoides*; V. (*Pleurogramme*) *seminuda*.
VI. GYMNOGRAMME (*Leptogramme*) *polypodioides*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



GYMNOGRAMME I. (Eugymnogramme) a. rufa, b. reniformis; II. (Selligëa) elongata. — III. MENISCIMUM reticulatum. — IV. ANTROPHYUM cayennense. — V. VITTARIA (Taeniopsis) stipitata; VI. (Cuspidaria) furcata.







BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
DE TOULOUSE



HEMIONITIS I. (Euhemionitis) palmata. — II. ANTROPHYUM (Anetium) citrifolium.
 ACROSTICHUM III. (Elaphoglossum) hybridum; IV. (Lomariopsis) sorbifolium; V. (Polybotrya) osmundaceum;
 VI. (Rhipidopteris) peltatum.


BIBLIOTHEQUE
DE LA CHAMBRE
DE LOUISBOURG

UNIONIST & ...
AGRICULTURE ...




ACROSTICHUM I. (*Olfersia*) *cervinum*; II. (*Soromanes*) *Caenopteris*; III. (*Gymnopteris*) *alienum*; IV. (*Chrysodium*) *guianense*. V. CERATOPTERIS *thalietroides*. VI. WOODSIA *obtusula*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



HEMITELES macrocarpa.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
DE TOULOUSE



ALSOPHILA elegans, var. *crenata*.



BIBLIOTHEQUE
UNIVERSITE
MONTREAL



ALSOPHIL




A praecineta.



I. ADIANTUM lunulatum. — II. PELLAEA Bongardiana.



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



CHEILANTHES (*Adiantopsis*) *regularis*.






CHEILANTHES flexuosa.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




PTERIS ornithopus.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



PTERIS lomariacea.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



PTERIS lomariaeae, var. *actinophylla*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE

PIERRE BARRISSE
1871-1872




ASPLENIUM Riedelianum.



ASPIDIUM abbreviatum.

THE UNIVERSITY OF
TORONTO



POLYPODIUM (Phegopteris) rotundatum.



POLYPODIUM (Phegopteris) punctatum



6i.

var. rigescens.




UNIVERSITÉ
DE TOULOUSE
BIBLIOTHÈQUE



a

I.




b

m.n.




a

II.




b

m.n.



a

III.



b

m.n.

LIBRAIRIE
DE L'UNIVERSITÉ
TALLOU



a

I.




b

m.n.



a

II.



b

m.n.



a

III.




b


m.n.

ALSOPHILA I. Miersii, II. leucolepis, III. phalerata.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
ICHOUSE




I.



II.



III.




ALSOPHILA I. armata, II. pruinata, III. ferox.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE



I.




a

b




II.



a

b



III.




a

b

m.n.

I. DICKSONIA Sellowiana, II. BLECHNUM brasiliense, III. ASPLENIUM radicans.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE











EVOLUTIO ET ANALYSIS EUISETORUM.

Fig.1-14. E. arvense. Fig 19. E. limosum, Fig 15-17. 20-23. E. Bogotense.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE

UNIVERSITY OF TOULOUSE
TOULOUSE




ANALYSIS EQUISETORUM.

Fig 1-2. *E. Bogotense* Fig 3-8. *E. xylochaetum* Fig. 9-14. *E. ramosissimum*.


BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE

ANALYSIS OF THE
MATERIALS OF THE



EQUISETUM Bogotense.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE









I.

II.


EQUISETUM Bogotense, I. normale, II. var. flagelliferum.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE




EQUISETUM Martii.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE




EQUISETUM giganteum.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE



EQUISETUM I. pyramidale, II. ramosissimum.



ISOËTES Martii.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE




Fig. 1-4. *ISOËTES Gardneriana*; Fig. 5-6. *I. Amazonica*.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




Fig. 1-5. MARSILIA polycarpa; Fig. 6-8. M. deflexa.

BIBLIOTHÈQUE
DE L'UNIVERSITÉ
TOULOUSE




Fig. 1-8. *SALVINIA* *oblongifolia*; Fig. 9-10. *S. auriculata*; Fig. 11-13. *S. Sprucei*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOULOUSE




Fig. 1-6. AZOLLA *Caroliniana*; Fig. 7-11. *A. filiculoides*.

BIBLIOTHEQUE
DE L'UNIVERSITE
TOURNAISE

